漢書

二集成新編

三

叢書集成新編　第四五冊目錄

應用科學類

醫學

儒門事親十五卷	金	張從政撰	醫統	一
張子和傷寒心鏡別集一卷	金	張從政撰	醫統	一〇五
丹溪先生心法五卷附附錄	元	朱震亨撰	醫統	一〇六
格致餘論一卷	元	朱震亨撰	醫統	一二七
雲岐子保命集論類要二卷	元	撰人不詳	濟生	一三九
祕傳證治要訣十二卷	明	戴元禮述	醫統	一五九
金匱鉤玄三卷	元	朱震亨撰	醫統	一八九
上池雜說一卷附四庫提要	明	馮時可著	學海	二一二
醫經溯洄集一卷	明	王履著	醫統	二一五
醫先一卷	明	王文祿撰	百陵	二二八
愼疾芻言一卷	清	徐靈胎著	昭進	二三〇

診斷學

王翰林註黃帝八十一難經五卷附四庫提要	周	秦越人撰	守山	二三六
	明	王九思等註解		
難經本義二卷	元	滑壽注	醫統	三七四
脈經十卷	晉	王叔和撰	醫統	四〇〇
脈訣一卷	宋	林億等類次		
脈訣刊誤二卷附附錄、四庫提要	金	劉完素撰	醫統	四五八
脈訣指掌病式圖說一卷	元	戴啟宗撰	醫統	四八六
雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法一卷	元	朱震亨著	濟生	四九九
		撰人不詳		

內科

傷寒論十卷	漢	張仲景著	醫統	五〇六
傷寒總病論六卷附音訓、藥法、札記	晉	王叔和撰次	士禮	五四九
傷寒微旨論二卷附四庫提要	宋	成無已注解	醫統	五九四
傷寒九十論一卷附四庫未收提要	宋	韓祇和撰	墨海	六〇五
新編張仲景註解傷寒發微論二卷	宋	許叔微撰	琳琅	六一九
新編張仲景註解傷寒百證歌五卷	宋	許叔微述	十萬	六二六
傷寒明理論四卷	宋	成無已撰	醫統	六五一
傷寒標本心法類萃二卷	金	劉守眞編集	醫統	六六九

傷寒直格論三卷	金	劉完素著	醫統	六七八
劉河間傷寒醫鑒一卷	元	馬宗素撰	醫統	七〇〇
傷寒心要一卷	元	鐔洪編	醫統	七〇四
傷寒證脉藥截江網一卷	明	陶華述	醫統	七〇八
傷寒一提金一卷	明	陶華述	醫統	七一二
傷寒瑣言一卷	明	陶華述	醫統	七一六
傷寒家祕的本一卷	明	陶華述	醫統	七二五
傷寒明理續論一卷	明	陶華述	醫統	七三六
殺車槌法一卷	明	陶華述	醫統	七五二
傷寒論翼二卷	清	柯琴纂	藝海	七六〇
素問玄機原病式一卷	金	劉完素述	醫統	七七八
素問病機氣宜保命集三卷	金	劉完素述	醫統	七九一
脾胃論三卷	金	李杲著	醫統	八三〇



儒門事親序

是書也戴人張子和專爲事親者著論議淵微調攝有法其術與東垣丹溪並傳名曰之義蓋以醫家與吉非儒不能明藥品酒食非孝不能備也故曰爲人子者不可不知嵗子幼失怙慈親在堂跨七望八漸齒既具未嘗不防以藥物每慮嘗有所微委之庸醫恐爲盡道之累將欲遍閱方書請家著述繁雜竊爲是皇皇者數載矣近得是書如獲寶璐執是以証何慮臆說之能惑惜其板久失傳本多玄豕之譌因付儒醫閻忠較訂鋟梓與世之事親者共云

嘉靖辛丑三月戊子復元道人邵輔序

儒門事親論方目錄

卷一

七方十劑繩墨訂
指風痺痠厥近世差玄說
立諸時氣解利禁忌
寒非解寒及鬼神辨
小兒痘疱丹毒癍瘡治微記
婦人赤白帶下錯分寒熱解
霍亂吐瀉死生如反掌說
目疾頭風出血最急說
一 過愛小兒反害小兒說
服藥一差轉成他病誡

卷二

偶有所遇厥疾獲瘳記
攻裏發表寒熱殊塗變
汗下吐三法該盡治病疹
凡在上者皆可吐式
凡在表者皆可汗式
凡在下者皆可下式
推原補法利害非輕說
口眼喎斜是經非竅說
痢本肝經宜通勿塞說
五虛五實攻補懸絕法

卷三

噦舌緩急砭藥不同解
五積六聚治同辯晰
凡十膈五噎浪分支派疏

卷四

風 暑 濕 燥 寒
火 水泄 痃痢 痛 癖
解利傷寒 中風 大便澁滯
水解論 酒食所傷
補論 骨蒸熱勞
蟲癘之生溼熱爲主訣 一切涎欬
三消之說當從火斷 風痰
九氣感疾更相爲治衍 雷頭風
嗽分六氣毋拘以寒逆 目腫
啾厥近世差玄說 風蛀牙疼
立諸時氣解利禁忌 瘦
寒非解寒及鬼神辨 便癰
小兒痘疱丹毒癍瘡治微記
婦人赤白帶下錯分寒熱解
霍亂吐瀉死生如反掌說
目疾頭風出血最急說
一 過愛小兒反害小兒說
服藥一差轉成他病誡

卷五

瘡癰瘤腫 瘡腫丹毒 凍瘡

金瘡　誤吞銅鐵　魚刺鯁苦
蛇虫所傷　杖瘡　禁蜈
落馬墜井　腰胯疼痛　頭風眩運
經血暴下　赤白帶下　月事不來
婦人無子　小產　大產
產後心風　乳汁不來　產後潮熱
乳癰　妊娠大小便下利　
妊娠病虛　雙身傷寒　身重痛癌
懷身人雜　眉煉　牙疳
夜啼　丹瘤　疳眼
身瘦肌熱　大小便不利　
久瀉不止　通身浮腫　發豬潮搐
拗哭不止　身熱吐下　風熱涎嗽
水瀉不止　瘡疥屈鼾　甜瘡
白禿瘡　癰疾不愈　腫痛氣刺
赤痼丹腫　瘡疱癮疹　

卷六

風形

因驚風搐　風搐反張　發泄
因風鼻塞　風痰　癇
手足風裂　胃脘痛　搐搦
面腫風　驚風　風溫
風水　小兒風水　腎風
勞風　中風　

暑形

中暑　瘡瘍　

火形

馬刀　項瘭　伐指痛
瘰癧　咽喉腫痛　舌痛
腰胯痛　狂　痰厥
滑泄乾嘔　笑不止　腦食中滿
目青　小兒悲哭不止　目赤
小兒手足搐　

熱形

沙石淋　膏淋　二陽病
小兒面部赤腫　頭熱病　
勞嗽　勞嗽咯血　吐血
嘔血　因藥燥熱　肺癰
瘧　口瘡　虛勞
心痛　傷寒極熱　失笑
赤目　目翳　瘕後嘔吐
熱厥頭痛　產後喘　血崩
婦人二陽病　月閉寒熱　
惡寒實熱　遇寒手熱　嘔逆不食
痙痫　牙疼　淋
口臭　

溼形

痂　水痂　
黃瘅　黃病　
水腫　涌水　停飲腫滿
溼痺　屈膝有聲　白帶
溼嗽　瀉兒　溼癖
溫壓瘡　泄瀉　洞泄
大便少而頻　暑泄　

卷八

內積形

傷冷酒　心下沈積　茶癖
腹脹水氣　痃氣　痢肩不利
冷積　積塊　
伏痰　停飲　肥氣積
沈積疑胎　是胎非積　積氣

外積形

癥　膠癥　癭
痔　

卷九

雜記九門

誤中涌法

嗽　疥　赤目　感風寒

誤中寒涼

經閉　下血　痢

臨變不惑

涌法　涌嗽

當禁不禁

病愈犯禁而死

不忌反忌

不忌口得愈　不可忌口

高技常孤

畢吉難正

誇吐　誇三法　誇峻藥

病人貧德愈後吝財

同類妒才　畢口誣數人

卷十

撮要圖　四因氣動

五運風暑溼燥寒主病

六氣主治　五氣風暑溼燥寒主治

大寒初氣至終氣小雪爲病

十二經是動爲病

風暑溼火燥寒六淫爲病并治

六門病治諸方　內經溼變五泄

金匱十全之法

金匱十全五泄後論已上之圖改校爲篇法

卷十一

治法雜論

風論　論火熱二門

風門　溼門　寒門　溼熱門

內傷　外傷治法

火類門　溼門　婦人風門

半產　小兒風門　寒門

卷十二

三法六門

吐劑

三聖散　瓜蒂散

稀涎散　蔚金散

獨仙散　碧雲散

汗劑

通聖散　雙解散

麻黃散　升麻湯

浮萍散

桂枝湯

涌劑

獨聖散

茶調散

常山散

下劑

導水丸　禹功散

神祐丸　琥珀丸

大承氣湯　小承氣湯

桃仁承氣湯　玉井散

無憂散　泄水散

四生丸　內托散

神芎丸　進食丸

玉燭散　三和湯

抵當湯　十棗湯

金匱十全之法

金匱十全五泄後論已上之圖改校爲篇法

利膈丸　三承氣湯

除溼丹

排直丸

人參補肺散　白虎湯

薺苨仁湯　益黃湯　香連丸

火門

涼膈散　黃連解毒湯　瀉心湯

八正散　調胃散　三黃丸

芍藥葉皮丸　大金花丸　清涼飲子

黃連清心湯　犀角散　黃連木通丸

燥門

神功丸　脾約丸　麻仁丸

潤燥丸

寒門

藍附湯　四逆湯　二薑湯

朮附湯　大已寒丸　理中丸

平胃散　養脾丸

兼治於內者

大柴胡湯　小柴胡湯　柴胡飲子

防風當歸飲子　白虎湯

兼治於外者

桂苓湯　麻黃湯　升麻湯

五積散　青金散

獨治於內者

陷胸湯　大黃丸　備急丸

枳殼丸　蓮殼散　木香檳榔丸

導飲丸　五香連翹散

四物湯　當歸散

又方　葛根散　定志丸

檳榔丸　小檳榔丸　雞爪散　治氣諸方

獨治於外者　敗毒散
青金散　水澄膏
魚腦丸　金絲膏
赴筵散　麝香玉線子
人參化癥丹
又方　消毒散
枯瘤散　小黃膏
木香檳榔散　刀箭藥
鉛白霜散　雄黃散　陽起石散
調治　化斑湯
無比山藥丸　當歸丸　香薷湯
石蕞散　妙功丸　人參散
茴香丸　七宣丸
烏金散　沈香降氣丹　人參調中湯
卷十三
劉河間先生三消論
豬肚丸　葛根丸　胡粉散
人參散
卷十四
扁鵲華陀察聲色定死生訣要
病機
卷十五
世傳神効諸方目錄
瘡瘍癰腫　口齒咽喉　眼目疾證
頭面諸疾　解利傷寒　腰腳疼痛
婦人雜病　咳嗽痰喘　心氣刺痛
小腸疝氣　腸風下血　小兒病證

破傷風邪　陰毒傷寒附
諸風疾證　小腫
雜證方藥　辟穀諸藥
下痢

七方十劑繩墨訂一

方有七劑有十舊矣雖有說者辯其名而已攷申明古人之意而爲之訂夫方者猶方術之謂也易曰方以類聚是藥之爲方類聚之義也或曰方謂五方也其用藥也各據其方如東方瀕海鹵斥而爲癰瘍西方陵居華食而多頭腫贅瘻南方瘴霧卑濕而多痿痂北方乳食而多藏寒滿病中州食雜而多九疸食癉中滿嘔吐酸腹脹之病蓋中州之地土之象也故脾胃之病最多其食味居處情性壽夭兼四方而有之其用藥也亦雜諸方而療之如東方之藻帶南方之丁木西方之薑附北方之參苓中州之麻黃遠志莫不輻輳而參尚故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用劑者和也方者合也故方如瓦之合劑猶藥之和也方不對病則非方劑不對疾則非劑也七方者大小緩急奇偶復也十劑者宣通補瀉輕重滑澁燥濕也

夫大方之說有二有君一臣三佐九之大方有分兩大而頓服之大方蓋治肝及在下而遠者宜頓服而數少之大方病有兼證而邪不專不可以一二味治者宜君一臣三佐九之大方王太僕以人之身三折之上爲近下爲遠近爲心肺遠爲腎肝中爲脾胃胞膈亦有遠近以予觀之身半以上其氣三天之分也身半以下其氣三地之分也中脘人之分也又手之三陰陽亦天也其氣高足之三陰陽亦地也其氣下戊巳之陰陽亦人也其氣猶中州故肝之三服可併心之七服腎之二服可併肺之七服也

小方之說亦有二有君一臣二之小方有分兩微而頻服之小方蓋治心肺及在上而近者宜分兩微而少服而頻之小方徐徐而呷之是也病無兼證邪氣專可一二味而治者宜君一臣二之小方故腎之二服可分爲肺之九服及肝之三服也

緩方之說有五有甘以緩之之緩方糖蜜棗葵甘草之屬是也蓋病在胸膈取甘能緩也有先以緩之之緩方蓋丸之比湯散其氣力宜行遲故也有品件羣衆之緩方蓋藥味衆則各不得騁其性也如萬病九七八十味遞相拘制也有無毒治病之緩方蓋性無毒則功自緩矣有氣味薄藥之緩方蓋藥氣味薄則長於補上治上比至其下藥力已衰故補上治上制之以緩緩則氣味薄也故王太僕云治上補上方若迅急則上不任而迫走於下制緩方而氣味厚則勢與急同

急方之說有五有急病急攻之急方如心腹暴痛兩陰溲便閉塞不通備急丹以攻之此藥用不宜恆蓋病不容俟也又如中風牙關緊急藥粥不入用急風散之屬亦是也有湯散蕩滌之急方蓋湯散之比丸下咽易散而施用速也有藥性有毒之急方蓋有毒之藥能上涌下泄可以奪病之大勢也有氣味厚薄之急方之說有五有急病急攻之急方如心腹暴痛兩陰氣味厚者直趨於下而氣力不衰也故王太僕云治上補上方若迅急則上不任而迫補下方之緩慢則滋道路而力又微制急方而氣味薄則力與緩等

奇方之說有二有古之單方之奇方有數合陽數之奇方在上而近者宜奇方也有數合陽數之是爲重方重方者即復方也七九皆陽之數也以藥味之數皆單也君一臣三君三臣五亦合陽之數也故奇方宜下不宜汗

偶方之說有三有兩味相配之偶方有古之復方之偶方蓋方之相合者是也病在下而遠者宜偶方也有數合陰陽之偶方謂二四六八十也皆陰之數也君二臣四君四臣六亦合陰之數也故偶方宜汗不宜下

復方之說有一方有二方三方相合之復方如桂枝越婢一湯如調胃承氣湯方芒硝甘草大黃外參以連翹薄荷黃芩梔子以爲涼腦散是本方之外別加餘味者皆是也有分兩均劑之復方如日風湯各等分是也以兩經攻之其奇偶四則反以味數奇者爲偶方下復云汗者不以奇下者不以偶及視仲景之制方桂枝湯汗藥也反以三味爲奇大承氣湯下藥也反以四味爲偶何也豈臨事制宜復有增損者乎故通因通用雖通與瀉相類大率通爲輕而瀉爲重也凡其大旨王太僕所謂汗藥如下藥如不以奇則藥毒攻而致過必如此言是奇則單行偶則併行之謂也急者下本易行故宜單況或難出下藥則不以奇則藥毒攻而致過必如此言是奇則單行偶則併行之謂也急者下本易行故宜單況或難出故宜併蓋單行則力孤而微併行則力齊而大此王太僕之意也然太僕又以奇方爲古之單方偶爲復方今此七方之中已有偶又有復者何也豈祇偶方者二方四方相合之方數不然何以相合之謂也復方者二方偶方之外又有復方者數此復字非重復之復乃反復之復何以言之蓋內經既言奇偶之方不言又有重復之方惟云奇之不去則偶之是爲重方重方者即復方也下又云偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也由是言之復之爲方反復亦不違內經之意也所謂宣劑者促人皆以宣爲瀉劑抑不知十劑之中已有通劑舉世皆曰春宜宣以爲下奪之藥抑不知仲景曰太法春宜吐以春則人病在頭故也況十劑之中獨不見通劑豈非宣劑即所謂通劑者乎內經曰高者因而越之木鬱則達之宜者升而上也以君召臣曰宣義或同此傷寒邪氣在上宜瓜蒂散頭痛葱根豉或湯傷寒煥懷宜梔子豉或湯精神昏憒宜梔子厚朴湯白瓜蒂以下皆湧劑也乃仲景不傳之妙今人皆作平劑用之未有發其祕者予因發之然則爲湧明矣故風痾中風腳中諸實疾飲寒結胸中熱蔚化上上而不下久則噦噦滿脹水腫之病生焉非宜劑莫能愈也

所謂通劑者流通之謂也前後不得溲便宜木通海金沙大黃琥珀八正散之屬裏急後重數至圊而不便宜通因通用雖通與瀉相類大率通爲輕而瀉爲重也凡痺麻蔚滯經脛不流非通劑莫能愈也

所謂補劑者補其不足也俚人皆知山藥丸鹿茸丸之補劑也然此乃衰老下脫之人方宜用之今往往於少年之人用之其弊甚矣古之甘平甘溫苦溫辛溫皆作補劑豈獨硫黃天雄然後爲補哉況五臟各有補法肝實瀉心肺虛補腎經曰東方實西方虛瀉南方補北方大率虛有六表虛裏虛上虛下虛陰虛陽虛故陽虛則以乾薑附子陰虛則補以大黃硝石世傳以熱爲補以寒爲瀉誤非一日豈知酸苦甘辛鹹各補其臟內經曰精不足者補之以味善用藥者使病者而進五穀者眞得補之道也若大邪未去方滿方悶心火方實腎水方亂乳而驟言鹿茸附子庸詎知所謂補劑者乎

所謂瀉劑者泄瀉之謂也諸痛爲實痛隨利減經曰實則瀉之實則散而瀉之中滿者瀉之於內大黃牽牛甘遂葶藶之屬皆瀉劑也惟巴豆不可不慎焉蓋巴豆其

性燥熱毒不去變生他疾縱不得已而用之必以他藥制其毒蓋百千證中或可一二用之非有暴急之疾大黃牽牛甘遂芒硝足矣今人往往以巴豆熱而不畏以大黃寒而反畏庸詎知所謂瀉劑者哉

所謂輕劑者風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜輕劑消風散升麻葛根之屬也故內經曰因其輕而揚之發揚之謂解表也疿瘍瘡疿宜解表汗以泄之毒以薰之皆輕劑也故桂枝麻黃防風之流亦然設傷寒冒風頭痛身熱三日內用雙解散及嗽藥解表出汗皆輕劑之云耳所謂重劑者鎮墜之謂也其藥則硃砂水銀沈香水石黃丹之倫以其體重故也久病咳嗽涎潮于上喘嗽不利形羸不可峻攻以此墜之故內經曰重者因而減之貴其漸也

所謂滑劑者周飛曰滑以養竅大便燥結小便淋澁皆宜滑劑燥結者其麻仁郁李之類乎淋澁者其葵子滑石之類乎前後不通者前後兩陰俱閉也此名曰三焦約也約猶束也先以滑劑潤養其燥然後攻之則無失矣

所謂澁劑者寢汗不禁澁以麻黃根防已滑泄不已澁以萱蔻柏皮蓼木賊烏魚骨罌粟殼凡酸味亦同乎澁者收斂之意也喘嗽上奔以薤汁烏梅煎甯肺者皆酸澁劑也然此數種當先齊其本以攻去其邪不可執一以澁便爲萬全也

所謂燥劑者積寒久冷食已不飢吐利腥穢屈伸不便上下所出水液澄徹清冷此爲大寒之故宜用乾薑附子胡椒輩以燥之非積寒之病不可用也若久服則變血溢血泄大枯大涸溲便癃閉輩譬痿弱之疾設有久服而此疾不作者慎勿執以爲是疾不作者或一二誤死者百千也若病濕者則白朮黃連黃藥梔子大黃其味皆苦若屬火皆能燥濕此內經之本旨也而世相違久矣嗚呼豈獨薑附之儔方爲燥劑乎

所謂溼劑者潤溼之謂也雖與滑相類其間少有不同內經曰辛以潤之蓋辛能走氣能化液故也若夫硝性雖峻本屬眞陰之水誠滌枯之上藥也人有枯悶羸損之病非獨金化爲然蓋有火以乘之非溼劑莫能愈也

指風痺痿厥近世差玄瓘二

風痺痿厥四論內經言之詳矣今余又爲之說不亦贅乎曰非贅也爲近世不讀內經者指其差玄也夫風痺痿厥四證本自不同而近世不能辨一概作風冷治之下虛補之此所以曠日彌年而不愈者也夫四末之疾動而或勁者爲風不仁或痛者爲痺弱而不用者爲痿逆而寒熱者爲厥此其狀未嘗同也故其本源又復大異風者必風熱相兼痺者必風溼寒相合痿者必火乘金厥者或寒或熱皆從下起今之治者不察其源見其手足揮曳便謂之風然左傳謂風淫末疾豈不知風暴燥溼火寒六氣皆能爲四末之疾也哉敢詳條于左有意於救物者試擇焉可也夫風之爲狀善行而數變內經曰諸風掉眩皆屬肝木掉搖眩運非風木之象乎紐曲勁直非風木之象乎手足瘈瘲發作無時角弓反張甚則吐沫或泣或笑喜怒失常頓僵暴仆昏不知人茲又非風木之象乎故善行而數變者皆是厥陰肝之用也夫肝木所以自其而至此者非獨風爲然蓋肺金爲心火所制不能勝木故也若久服通聖散辛涼之劑不數日而瘥故書此以詮之夫痺之爲狀麻木不仁以風溼寒三氣合而成之故內經曰風氣勝者爲行痺風則陽受之故其痺行旦劇而

月四月之交九月十月之交何以言之大寒中氣之後厥陰爲主氣巳亥之月亦屬厥陰用事之月皆風主之時也故三月四月之交多疾風暴雨振拉摧拔其化爲冰雹九月十月之交多落木發屋之變故風木警極甚者必待此三時而作凡風痺之人其脈狀如弓弦而有力豈敢以熱藥投之更增其勢哉今人論方者偶得一方問曾獲効試以爲能著灸施鍼豈由病者巧說病人使從已法不問品味剛柔君臣輕重何藏何輕何部何氣凡見風證偏枯口眼喎斜遲潮昏憒便服雷擊至寶清心續命等藥豈知清心之雜以蓽桂震寶之儔以石硫黃小續命湯藏以附子惟夫至寶其性尙溫經曰風淫於內治以辛涼如之何以金石大熱之藥以治風耶有以熱治熱者一之爲甚其可再乎故今之劉河間自制防風通聖散搜風丸之類程氏致祛風丸換骨丹用之者獲効者多矣而誘讓百出以証其實余嘗見內經氣交變論中言五鬱之法鬱極則爲病況風病之作金厥者或寒或熱皆從下起今之治者不察其源見其手足揮曳便謂之風然左傳謂風淫末疾豈不知風暴燥溼火寒六氣皆能爲四末之疾也哉敢詳條于左有意於救物者試擇焉可也夫風之爲狀善行而數變內經曰諸風掉眩皆屬肝木掉搖眩運非風木之象乎紐曲勁直非風木之象乎手足瘈瘲發作無時角弓反張甚則吐沫或泣或笑喜怒失常頓僵暴仆昏不知人茲又非風木之象乎故善行而數變者皆是厥陰肝之用也夫肝木所以自其而至此者非獨風爲然蓋肺金爲心火所制不能勝木故也若久服通聖散辛涼之劑不數日而瘥故書此以詮之夫痺之爲狀麻木不仁以風溼寒三氣合而成之故內經曰風氣勝者爲行痺風則陽受之故其痺行旦劇而

夜靜世俗莫知反呼爲走注疼痛虎咬之疾寒氣勝者爲痛痺寒則陰受之故其痺痛且靜而夜劇世俗不知反呼爲鬼忤淫氣勝者爲著痺淫勝則筋脉皮肉受之故其痺著而不去肌肉銷而著骨世俗不知反呼爲偏枯此疾之作多在四時陰雨之時及三月九月太陽寒水用事之月故草枯水寒爲甚或瀕水之地勞力之人辛苦失度觸冒風雨寢處濕痺從外入況五方七地寒暑殊氣剛柔異稟飲食起居莫不相戾故所受之邪各有淺深或痛或不痛或仁或不仁或筋屈而不能伸或引而不縮寒則蟲行熱則縮緩不相亂也皮痺不已而成肉痺肉痺不已而成筋痺筋痺不已而成骨痺久而不已內舍其合若臟腑俱病雖有智者不能善圖也凡病痺之人其脈沈澁今人論方者見諸痺證遽作腳氣治之豈知內經中本無腳氣之說或曰諸方亦有腳氣統論又有腳氣方藥若止取素問則諸方皆非即曰痺病以淫熱爲源風寒爲兼三氣合而爲痺奈何治此者不問經絡不分藏腑不辯表裏便作寒濕腳氣烏之附之乳之沒之種種燥熱攻之中脘灸之膞下燒之三里火之燕之熨之湯之炕之以至氣外侵雖遇扁華亦難措手若此者何哉胸膈間有寒痰之故也痺者本不死死者醫之誤也雖亦用蒸之法必先涌去其寒痰然後諸法皆効內經曰五臟有俞穴六腑有合穴循脈之本分各有所發之源以砭石補之則痺病瘳此其內經中明白具載如之何不讀也陳下酒監隗德新因赴冬選犯寒而行真氣元衰加之坐臥冷湿食飲失節以冬遇此遂作骨痺骨屬腎也腰之高骨壞而不用兩膀似折面黑如炭前後臁痛痿厥嗜臥稱問諸醫皆作腎虛治之余先以玲瓏寢熨蒸數日次以苦劑上湧乾薑痰三二升下虛上實明可見矣次以淡劑使白朮除脾淫令茯苓養腎水青官柱伐風木寒氣偏勝則加薑附否則不加又刺腎俞太谿二穴二日一刺前後一月平復如故僕嘗用治偏寒汗下吐三法若痿作寒治是不刃而殺之也大痿病不死死者用藥之誤也陳下一武升宋子玉因駐軍息城五六月間暴得痿病腰膀兩足皆不任用躄而不行求治于予察其

之病豈知內經中無腳氣之說王太僕亦云本無腳氣後世賢飾方論而立此名古之方謂厥者即今所謂腳氣者也然厥當分二種次分五臟所謂二種者有寒厥亦有熱厥陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥熱厥為手足熱也寒厥為手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣勝足下熱陰氣勝足下寒又曰陽主外而厥在內陰主內而厥在外若此者陰陽之氣逆而上行故也夫春夏則陽多陰少秋冬則陰壯陽衰人或恃賴壯勇縱情嗜慾於秋冬之時則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽氣既衰眞精又竭陽不榮養陰氣獨行故手足寒發為寒厥也人或醉飽入房氣聚於脾胃主行津液陰氣虛陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則四肢不榮酒氣與穀氣相薄則內熱而溺赤氣壯而慄悍腎氣既衰陽氣獨勝故手足熱發而為熱厥也厥亦有令人腹暴滿不知人者或一二日稍知人者或卒然悶亂無覺知者皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脈不至也腎氣微少精血奔逆使氣促迫上入胸膈宗氣反結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相助令身不仁又五絡皆會於耳中五絡俱絕則令人身脈皆動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥有挺如拽錫聲在喉咽中為痰厥手足搐搦者為風厥因醉而得之為酒厥暴怒而得之為氣厥骨痛爪枯為骨厥雨足指攣急屈伸不得爪甲枯結為臂厥身強直如梭者為肝厥喘而惋者狂走攀登為陽明厥皆氣逆之所為也今人見盡厥者皆謂之吸著掠著此是何等語也非徒其名之謬因其名之謬而乖其實又為先聖矣鼻中嗚掠著必歸之風此清心蠲實至實又為先生自製辛涼之劑以

藥身上熾火豈知厥之為病如前所說者耶頭西華季政之病寒厥其妻病熱厥前後十餘年其妻服逍遙二十餘根荳豉一撮同煎至五七沸去滓分作二服先以多半服之頃以釵股於喉中探引盡吐前藥餘劑終無寸効一日命余診之二人脈皆浮大而無力政之曰吾手足之寒時時漬以熱湯而不能止吾婦仍以酸醋辛辣漿粥投之可以立愈解利傷寒溼溫溼熱而脈之因其一涌腠理開發汗出周身復將餘藥溫熱而服之手足之熱終日以冷水沃而不能已者何也余曰寒熱之厥也此皆得之貪飲食縱嗜慾逆出內經厥論證之病治法有二天下少事之時人多靜逸樂而不勞諸靜屬陰難用溫劑解表發汗亦可獲愈及天下多故之時政之喜曰內經眞聖書也十餘年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以涼劑清心火陽內火又侵醫者不達時變猶用辛溫豈不近於人情也止可用劉河間辛涼之劑三日以裏之證十痊八九分處二藥令服之不輟不旬日政之諸門謝曰寒熱之厥予用此藥四十餘年解利傷寒溫熱中暑伏熱莫知其數非為行也將以證後人之誤用藥者也予嘗見世醫用升麻五積解利傷寒溫疫等病往往發狂譫語衄血泄血喘滿昏憒悶亂勢復此數證非傷寒便有此脈皆由辛溫之劑解之不愈而熱增劇以致然也凡解利傷寒時氣疫疾當先推天地寒暑之理以人參之南北之地多熱宜辛涼之劑解之朔方之地多寒宜辛溫之劑解之午未之月多暑宜辛涼解之子丑之月多凍宜辛溫解之老者氣衰之人宜辛涼解之少壯氣實之人宜辛溫解之病人因冒寒食冷而得者宜辛溫解之病人稟性和緩者可辛溫解之如是因役勞冒暑而得者宜辛涼解之病人稟性怒急者可辛涼解之病人稟性和緩者可辛溫解之如是秋不發而重感于寒則冬為傷寒故傷寒頭項痛腰脊強者而傷寒及溫熱但發必先發熱惡寒浮大者可辛涼解之兩手脈遲緩者可辛溫解之如是之病不可一概而用偏熱寒涼及與辛溫皆不知變通也亦有太陽證至了不傳者止可汗之如升麻湯解肌一日在太陽經故也內經中雖言一日太陽者傳受常者夫地有南北時有寒暑人有衰旺脈有浮沈劑有溫涼服有多少不可差互病人禁忌不可不知昔有人春月病瘟三日之內以鑑車載百餘里比及下車昏脊不

知人數日而殂又有人飲酒過傷內外感邪頭痛身熱狀如傷寒三四日間以馬馱還家六七十里到家百骨節皆痛昏憒而死此余親覩若此之類不容更述假如凡傷寒之氣有六禁初病瘟病傷寒熱病中暑冒風傷酒愼勿車載馬馱搖撼頓挫大忌夫動者火之化靜者水之化也靜為陰勿為陽陽為熱陰為寒病已內擾又復外擾是為至擾奈人之神詎能當之故遠行得疾者宜舟泛牀擾無使外擾故病不致增劇又若傷寒時氣瘟病嘗六七日之間不大便心下堅硬腹脇緊滿止可大小承氣湯下之其腸胃積熱愼勿用巴豆杏仁性熱大毒之藥雖用一二丸下之利五六行必反損陰氣涸枯津液燥熱轉增發狂譫語狂走斑毒血泄悶亂輕者為勞復重者或至死矣有愈者幸矣不可以為法故傷寒新愈之人愼勿食豬魚雞鳧酸酒澁麪及沐浴房室事如犯病必再發愛其身者不可不愼又如正二三月人氣在上瘟疫大作必先頭痛或骨節疼與傷寒時氣冒暑風溼及中酒之人其狀皆相類愼勿便用巴豆大毒之藥治之元光春京師翰林應泰李屏山得瘟疫證頭痛身熱口乾小便赤澁渠素嗜飲醫者便與酒瘕丸犯巴豆利十餘行次日頭痛諸病仍存醫者不識復以辛溫之劑解之加之卧於暖炕溫食愁醋湯劑獲一汗豈知種種名熱曼發併作目黃斑生潮熱血泄大喘大滿後雖有承氣下之者已無及矣至今議者紛紛終不知熱藥之過往往獨歸罪於承氣湯用承氣湯者不知其病已危猶復用藥經學不明故也良可罪也然議者不歸罪於酒殺丸者亦可責也夫瘟證在表不可下況巴豆之丸乎巴豆不已況復發以辛溫之劑乎必有仲尼方明公治長之非罪徹生高之非直終不肯以數年之功苦讀內經但隨衆好惡為之毀譽若此者也不眞知其理遽加毀譽君子之所不取以予論之凡傷寒之氣有六禁初病之時甚似中酒傷食者禁大下之一禁也當汗之時宜詳時之寒暑用金衣之厚薄禁沐浴之火坑重被熱粥婦鍼一禁也當汗之時宜詳脈之遲數用辛涼之劑禁妄用熱藥三禁也當下之時宜審詳證下之藥禁巴豆銀粉丸方四禁也述來之病人禁車載馬馱五禁也大汗之後禁雜食晴禁愛惡作勞六禁也故凡有此者宜清房涼榻使不受客熱之邪明窓虛室使易見斑出黃生之變病者喜食涼而發其涼喜食溫則促其溫清辰砂有毒之藥治之亦能取効緣治平之時其民勞苦不故舉以熱攻熱亦少後患至於瘧攻之而勿攻休之而勿勞可辛溫則辛溫解之可辛涼則辛涼解之所察甚微無拘彼此欲水之人愼勿禁水但可還用大毒大熱之藥若以熱攻熱熱甚則轉為吐血不禁者輕則危重則死不當禁而禁者亦然令之士大夫多為俗論先鋼其心雖有正論不得而入矣昔陸象山作候王官吏上下皆病輕者旬月甚者彌年夫富貴之人勞心役智不可躁用砒石大毒之藥止宜先以白虎湯加人參小柴胡湯五苓散之類頓服立解或不愈者可服神祐丸減用神芎等甚者可大小承氣湯下之五七行或十餘行峻泄夏月積熱暑毒之氣此藥雖泄而無損於臟腑乃所以安臟腑也大抵桂苓甘露散石膏知母湯大小柴胡湯人參柴胡飲子量虛實加減而用之此藥皆能治寒熱往來日晡發作與治傷寒其法頗同更不愈者余嘗用張長沙

汗下吐三法愈瘡極多大忌錯作脾寒用暴熱之藥治之緩有愈者後必發瘡疽下血之病不死亦危余自先世授以醫方至于今日五十餘年苟不識練豈敢如是決也又嘗觀刺瘡論五十九刺一刺則衰再刺則去三刺則已會陳下有病瘡二年不愈者止服溫熱之劑漸至衰羸命予藥之余見其羸亦不敢便投寒涼之劑乃取內經刺瘡論詳之曰諸瘡不已刺十指間出血正當發時余刺其十指出血血止而寒熱立止咸駭其神余非衒術竊見晚學之人不攷詰典謬說鬼疾妄求符籙祈禱辟匿法外旁尋以致病人遷延危殆瘡病除鼠瘺一二發必死其餘五臟六腑瘡皆不死如有死者皆方士誤殺之也或曰汝言瘡因於暑者春發之瘡亦傷暑乎余曰此瘡最深何哉暑伏於秋冬而不發至春始發此瘡之深者內經氣交變大論歲火太過炎暑流行金肺受邪啟玄子云火不以德邪害於肺金也故金肺先病以金氣不及故爲病又經曰歲火太過大熱先發故民病瘡少氣欬喘血溢血注下嗌燥耳聾中熱肩背熱上應熒惑星見則山澤燔燎雨乃不降爍石消金烟火流金焦草火星大而明見注曰火無德令縱熱害金水復制心故心火自病熒惑見則酷法大故瘡常與酷吏之政並行或酷政行于先而瘡氣應于後或瘡氣行於先而酷政應于後昔人有詩云大暑去酷吏此言雖不爲醫設亦於醫巫之言有以暗相符者也以前人論瘡者未言及于此故予發之及知聖人立瘡之名必有所謂云

小兒瘡疱丹熛瘧疹舊藏記五

兒之在母腹也胞養十月蘊畜濁惡熱毒之氣非一日及歲年而後發雖至貴與至賤莫不皆然輕者稍少重者稠密皆因胞胎時所感濁惡熱毒之氣有輕重非獨人有此疾凡胎生血氣之屬皆有蘊畜濁惡熱毒之氣有一二歲而發者有三五歲至七八歲而作者有年老而發丹熛瘧疹者亦有傷寒中溫毒而發瘡者亦有陽日疱疹出全可調胃涼膈下之同調理傷寒法或言瘡疹首尾俱不可下者此朱奉議公之言也適足使人戰慄藐藐而不敢用藥也錢仲陽之用百祥丸其間有大戰豈奉議公獨不見耶自奉議公斯言一出死者塞路矣子家之親屬故舊小兒有患瘡疱黑陷腹內喘者余以白虎湯加人參涼膈散加當歸桔梗連進數服上攻下泄晝夜不止又使睡卧於寒涼之處以新水漬其面目手足膿水盡去蓋四肢者諸陽之本也兒方爲瘡疱外燔沃以寒水使陰氣循經而入達於心肺如醉得醒從兩脇下有之出於脇肋次及身表漸及四肢故凡小兒瘡疱丹熛癮疹皆屬心火豈有寒乎故治瘡疱與治傷寒時氣同法初覺頭痛身熱惡寒此小兒初發瘡疱之候也其脈息皆浮大而有力亦與傷寒時氣冒風寒而微舟師疑其人也採而出之開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密不容隙兩目閉然飢而索食因以粥餵其舟師之妻怒曰自家兒女乏者瘡疱傳染奈何私料此兒泌蔡河來其流緩必不遠持見一鞋逆流而上循河之人皆曰無此兒行五二十里至一村落舟師高聲曰有兒年狀如許不知誰是瘡疱病死棄之河中今復活矣聞洧郡中飲者喧呼有人出曰我某村某人也兒四五歲死於瘡疱舟師出其鞋以示之其父泣曰真吾兒也奔走來視驚見兒活大痛及也故曰白虎湯加人參一日不可闕也瘡疱熛疹或流連拜謝舟師喜抱兒歸今二十餘歲矣此兒本死得出不均大小如豈黍相親見其不齊也相天之寒溫以

蟬殼燒灰抄半字或一字以淡酒調少許飲之大人以淡酒溫調之不半日則均齊如或用百祥丸紫草飲子皆可服之俗以酒醋熬之者適足增其昏瞀耳至六七日疱疹出全可調胃涼膈下之同調理傷寒法或言瘡疹首尾俱不可下者此朱奉議公之言也適足使人戰慄藐藐而不敢用藥也錢仲陽之用百祥丸其間有大戰豈奉議公獨不見耶自奉議公斯言一出死者塞路矣子家之親屬故舊小兒有患瘡疱黑陷腹內喘者余以白虎湯加人參涼膈散加當歸桔梗連進數服上攻下泄晝夜不止又使睡卧於寒涼之處以新水漬其面目手足膿水盡去蓋四肢者諸陽之本也兒方爲瘡疱外燔沃以寒水使陰氣循經而入達於心肺如醉得醒從兩脇下有之出於脇肋次及身表漸及四肢故凡小兒瘡疱丹熛癮疹皆屬心火豈有寒乎故治瘡疱與治傷寒時氣同法初覺頭痛身熱惡寒此小兒初發瘡疱之候也其脈息皆浮大而有力亦與傷寒時氣冒風寒而微舟師疑其人也採而出之開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密不容隙兩目閉然飢而索食因以粥餵其舟師之妻怒曰自家兒女乏者瘡疱傳染奈何私料此兒泌蔡河來其流緩必不遠持見一鞋逆流而上循河之人皆曰無此兒行五二十里至一村落舟師高聲曰有兒年狀如許不知誰是瘡疱病死棄之河中今復活矣聞洧郡中飲者喧呼有人出曰我某村某人也兒四五歲死於瘡疱舟師出其鞋以示之其父泣曰真吾兒也奔走來視驚見兒活大痛及也故曰白虎湯加人參一日不可闕也瘡疱熛疹或流連拜謝舟師喜抱兒歸今二十餘歲矣此兒本死得出不均大小如豈黍相親見其不齊也相天之寒溫以水面生伏說來者瘡疱之疾熱耶經曰諸痛癢瘡

瘡皆屬心火熾玄子注云心寂則病微心燥則病甚
端之起皆自心生瘡疱之疾豈有寒與余屢舉於先
人閱病多矣苟部後人罪將安逃誠如此法則原上之
瑯以瘡疱而死者皆誤殺人也故療小兒惟錢仲陽書
中可採者最多但其方爲閱考忠所亂有識者宜擇而
取之

論婦人帶下赤白鉛分寒熱解六

君子非好與昔人辨以要譽也蓋昔人有一誤流爲千
百世之禍者苟不證其非雖口誦心惟其如人命何如精
選聖惠方二十三卷論婦人赤白帶下云婦人帶下者
由勞神過度損動經血致令身虛受於風冷風冷入於
脬絡傳其血之所成也又有巢氏內篇四十四卷論任
脈爲經之海其任之爲病女子則爲帶下手太陽爲小
腸之經也手少陰爲心之經也心爲藏主於裏小腸爲
府主於表二經之血在於婦人上爲乳汁下爲月水衝
任之所統也衝任之脈既起於脬內陰陽過度則傷脬
絡故風邪乘虛而入於脬中損衝任之經傷太陽少陽
之血致令脬絡之間稽與血相兼帶而下冷則多白熱
則多赤二家之說皆非也夫治病當先識經絡靈樞十
二經中有是動之病有所生之病大經有十二經與八
八脈言十二經之外復有此八道經脈也十二經與八
道經脈通身往來經絡其二十道上下流走相貫周環
晝夜不息與天同度自手太陰肺經起行陽二十五度
行陰亦二十五度復會於手太陰肺經也然此二十道
經絡上下周流者止一十九道耳惟帶脈起少腹側季
脇之端乃章門穴是也環身一周無上下之源絡脬而
過如束帶之於身難經曰帶之爲病溶溶如坐水中衝
任者是經脈之海也循腹脇夾臍傍傳流於氣衝屬於
帶脈絡於督脈督脈者起於關元穴任脈者女子任養
胎孕之所督脈乃是督領婦人經脈之海也衝任督三
脈同起而異行一源而三歧皆絡帶脈衝任督三脈以帶
統於篡戶巡陰器行廷孔上端衝任之間熱者血也
脈束之因餘經上下往來遺熱於帶脈之間熱者血也
血積多日不流火則從金之化金曰從革而爲白乘少
腹間寃熱白物滑溢隨溲而下緜緜不絕多不痛也或
有痛者則壅礙因壅而成痛也內經曰少腹寃抑而成此疾也
白液寃者屈滯也病非本經爲他經寃抑而成此疾也
寃一作客猶寄也遊客熱于少腹久不去從金化而
爲白說若赤白痢赤者新積也從心火自者舊積也從
肺金故赤白痢不可曲分寒熱止可分新舊而治之假
如癥病始赤血次漬白膿又豈爲寒者哉而用暖藥
一失其復能生乎赤白痢與赤白帶下皆不死人內經
惟腸澼便血血溫身熱者死赤白帶下白液白物蠱病
則必煩渴頻渴則小溲不利小溲不利則足腫面浮漸
至不治內經曰思想無窮所願不得意淫于外入房大
甚發爲筋痿淫衍白物如精之狀男子四淫而下女子
閭變而爲霍亂寒氣客於脾則瀉寒氣客於胃則吐亦
由飲酒食肉膩膾生冷過度或因居處坐卧溼地當風
取涼風之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷水穀不消
而不散且赤白痢者是邪熱傳於大腸下脘腹出赤白
也帶下者傳於小腸入脬經下赤白也遊溢流走相貫周環
過如束帶之於身難經曰帶之爲病溶溶如坐水中衝
同治淫法治之先以導水禹功瀉訖次以淡劑滲泄之藥利
者也霍亂者脈必伏又云七月間食蜜令人暴下霍亂
取涼風之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷水穀不消
皆成霍亂其名有三一曰胃反胃氣虛逆反吐飲食二
曰霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三曰腸食變逆
者也霍亂者脈必伏又云七月間食蜜令人暴下霍亂

此皆巢氏霍亂之論也子以爲不然夫醫之治病猶書生之命題如秋傷於溼冬生欬嗽是獨以溼爲主此書生之獨腳題也風溼暍三氣合而成霍亂吐瀉轉筋此猶書生之鼎足題也風者風木也內應足厥陰肝木溼者雨化也內應於足太陰脾土暍者火熱也內應於手少陰心火此風溼暍三氣之所生也內經曰土氣之下木氣乘之是肝木乘脾土也又曰厥陰所至爲中滿泄少陽所至爲嘔涌注云食不下也太陰所至爲中滿霍亂吐下太陰所至爲濡化也注云溼化也也又曰太陰所至爲溼生終爲注雨故轉筋者風主肝肝主筋風急甚故轉筋也吐者暍也火主心心主炎上故嘔吐也泄注者土主溼溼主脾溼下注故泄注也此三者豈非風溼暍如書生鼎足題耶脾溼土氣爲風木所克土化不行矣亢無雨火盛過極土怒發焉柿則爲雷霆暴雨烈風蓋土氣在上木氣乘之故也是以大水橫流山崩岸落石迸沙飛豈非太陰溼土怒發之象耶故人病心腹滿脹腸鳴而爲數便甚則心痛脇痛嘔吐霍亂厥發則注下腫身重啟玄子云已上病證皆脾熱所生也乃知巢氏所論正與素問啟玄子相違故內經治法病急則治其標緩則治其本先可用淡劑流其溼辛涼以退其風鹹苦以解其暍冰水以救其內涸大忌食粟米粥飲者立死偉哉王冰之言脾熱一句可以爲方世俗止知取其頭巾而濯之以飲其水亦取黑豆皂礬頭垢寒涼然近似終不足以制其甚也又有以寒水沃其手足者大非也四肢已厥更以寒水沃之則益厥矣曷若以寒水沃其心之爲愈也泰和間余親見陳下廣濟禪院其主僧病霍亂一方士用附子一枚及兩者乾薑一兩炮水一椀同煎放冷服之服訖嘔血而死頃合流鎮李參軍中夜忽作吐瀉自取理中丸而服之醫者至以爲有食積以巴豆下之三五丸藥亦不動至明而死可不哀哉遂平李仲安攜一僕一個客至偃城夜宿邵輔之書齋中是夜僕逃仲安覺其時也騎馬與個客往臨潁急追之時七月天大熱炎風如箭埃塵漫天至辰時而還會不及三時往返百二十里既不獲其人復宿於邵氏齋忽夜間聞呻呼之聲但言救我不知其誰也執火尋之乃仲安之個客也上吐下泄目上視而不下胸脇痛不可動搖口欠而舐曰四肢厥冷此正風溼暍三者之有骍如日月之有雲霧也凡雲之興未有不因蒸騰而起者雖隆冬之時猶且然耳況於炎夏之時乎故曰太虛則枯瘁蔽密則風不疏通故多摧拉枯瘁則液不浸潤故無榮華又況人之有目如天之有日月也人目外候也肝主目在五行屬水然木之爲物太茂則蔽密太衰則枯瘁

病勢平爲期少白可黑落髮可生有此神驗不可輕傳

人年四十五十不問男女日暴赤腫隱澁難開者以三稜鍼刺前頂百會穴出血大妙至如年少髮早白落或白屑者此血熱而太過也世俗止知髮者血之餘也血衰故耳豈知血熱而寒髮反不茂所者木也火多水少木反不榮火至于頂炎上之甚也大熱病汗後勞病之後皆髮多脫落豈有寒耶故年衰火勝之人最宜出血但人情見出血皆不悅矣豈知出血者乃所以養血也凡兔雞豬狗酒醋澁麪動風生冷等物及憂忿勞力等事如犯之則不愈矣惟後頂強間腦戶風府四穴不可輕用鍼灸以避忌多故也若有誤不幸令人瘡固宜慎之其前五穴非徒治目疾至於頭痛腰脊強外腎皺燥瘡出血皆愈凡鍼此勿深深則傷骨唐甄權尤得出血之法世俗云熱湯沃眼十日明此言謬之久矣火方乘日更以熱湯沃之兩熱相搏是猶投賊以刃也豈知涼水沃之暫澁而久滑熱水沃之暫滑而久澁不然何以病目者忌沐浴或曰世俗皆言涼水沃眼血脈不行余聞太笑之眼藥中用黃連硼砂朴硝龍腦熊膽之屬皆大寒之物使人血脈不行耶何謬之甚也又若頭風之甚者久則目昏偏頭風者少陽相火也久則目束小大腸閉澁者目必昏何也久病滑泄者目皆明惟小兒利久反相眼昏蓋極則反與此稍異其餘皆宜出血而大下之余嘗病目赤或腫或翳作止無時偶至親息帥府間病目百餘日羞明隱澁腫痛不已忽眼科姜中安法百會速以鈹鍼刺四五十刺擲竹穴兼竹穴上兼相際二十刺反鼻兩孔內以草葦彈之出血三處出血如泉約二升許來日愈大半三日平復如故余自歎曰百日之苦一朝而解學醫半世尚罔此法不學可乎惟小兒瘡疱入眼者乃餘熱不散耳止宜降心火瀉肝風益腎水則愈矣若大人目暴病者宜汗下吐以其血在表故宜汗以其火在上故宜吐以其熱在中故宜下出血之與發汗名雖異而實同故錄銅人中五穴照用

過愛小兒反害小兒說九

小兒初生之時腸胃酥脆易飽易虛易實易寒易熱方書舊說天下皆知之矣然禮記曲禮所云玉符潛訣論云天下皆不知曲禮云童子不衣裘說云裘大溫消陰氣且人十五歲成童尚不許衣裘今之人養稚子當正夏時以酥裹裘服日不下懷人氣相蒸見天猶寒即封閉密室睡榻下幕煖炕紅爐使微寒不入大煖不泄雖耄老之人尚猶不可況純陽之小兒乎然君子當居密室亦不當如是之煖也玉符潛訣論云嬰兒之病傷於飽也今人養稚子不察腸胃所容幾何但聞一聲哭將謂饑號急以漉乳納之兒口豈復知量不吐不已及稍能食應口輒與夫小兒初生別無伎倆惟善號泣爲強良耳此二者乃百病之源也小兒除胎生病外有四種曰驚曰疳曰吐曰瀉其病之源止有二曰飽曰煖驚者火乘肝之風木也疳者熱乘脾之溼土也吐者火乘胃膈甚則上行也瀉者火乘肝與大腸閒澁者也夫乳者血從金化而大寒小兒食之肌肉充實然其體爲水故傷乳過多反從溼化溼熱相兼吐痢之病作矣醫者不明其本輒以紫霜進食北金丹餅之屬其中甘巴豆杏仁其巴豆大熱有大毒杏仁小熱有小毒小兒陽熱復以熱毒之藥留毒在內久必變生故劉河間先生以通聖涼膈神芎益元治之皆無妨之藥或曰此大人所服之藥非小兒所宜也余聞笑曰大人小兒雖幼壯不同其五臟六腑豈復殊耶大人服多小兒服少其實一也故不可下者宜解毒可下者宜調胃瀉心然有逐溼爲之方者故余嘗以牽牛大黃木通三味末之爲丸以治小兒諸病皆効蓋食乳小兒多溼熱相兼故也今之醫者多以此藥誚予彼既不明造化難與力辯故予書此方以俟來世知道者然善治小兒者當察其貧富貴賤治之蓋富貴之家衣食有餘生子常天貧賤之家衣食不足生子常堅貧家之子不得縱其慾雖不如意而不敢怒怒少則肝病少富家之子得縱其慾稍不如意則怒怒多則肝病多矣夫肝者木也甚則乘脾矣又況貧家無財少藥故死少富家有財多藥故死多故貧家之育子雖薄於富家其成全小兒反出於富家之右其暗合育子之理者有四焉薄衣淡食少慾寡怒一也無財少藥其病自痊不爲庸醫熱藥所攻二也在母腹中其母作勞氣血動用形得充實三也母既作勞多易生產四也此四者與富家相反也但聽曰兒哭即與乳兒歌不哭不復餵此言雖鄙切中其病世俗當知兒哭者乃小兒所以泄氣之熱也老子曰終日號而不嗄余嘗授人以養子之法兒未坐時臥以赤地及天寒時不與厚衣布而不縛及能坐時以鐵鈴木壺雜戲之物連以細繩置之水盆中使一浮一沈弄之有聲當淡暑之時令坐其傍掬水弄鈴以散諸熱內經曰四肢者諸陽之本也手得寒水陰氣達於心中乃不藥之藥也余嘗告於陳敬之若小兒病緩急無藥不如不用扁醫但恐陽熱復以熱毒之藥留毒在內久必變生故劉河間先生以通聖涼膈神芎益元治之皆無妨之藥或曰此大人所服之藥非小兒所宜也余聞笑曰大人小兒雖幼

羣兒皆病治法用藥者皆死蓋陽者不達濕熱之地以溫燥行之故皆死惟陳薇之不與藥用余之言將兒獨存嗚呼班固眞良史哉曰有病不治得中醫除暴得大疾病服藥者當謹熟陰陽無與綠謀若未病之前從予奉養之法亦復不生病縱有微疾雖不服藥可也

服藥一差轉成他病說十

語云子之所愼齊戰疾又曰丘未達不敢嘗此言服藥不可不畏愼也然世有百十年相襲之弊至今不除者敢略數一二使後車改轍不蹈前覆夫傷寒溫疫時氣中暑風濕風痓與中酒傷食者其初相類此最誤人或先一日頭痛曾傷酒便歸過于酒曾傷食便歸過于食初覺滿悶醫者不察其脉不言其始徑用備急丹纏積丹軟金丸酒癖丸此藥犯巴豆或出油不盡大熱大毒走泄五七行或十餘行其人必津液枯涸腸胃轉燥發黃瘀熱目赤口乾恍惚潮熱昏憒或狂諸熱交作如此誤死者不可勝舉若其人或本因酒食致過亦能頭痛身熱戰慄惡寒醫者不察其脉不究其原反作傷食發之桂枝麻黃升麻之屬以汗解之汗而不解轉轉疑惑反生他證如此誤死者可勝計哉又如久病咳嗽形體羸瘦食飲減少日輕夜劇醫者不察便與烏梅罌粟殼紫菀枯礬如此峻攻嗽疾未除溢滯之病作矣嗽加之溢飲食減減醫者不察更以熱劑養胃溫劑和脾致令頭面汗出燥熱潮發形容瘦瘁涎液上出法流如湧泉若此死者不可勝數又如婦人產餘之疾皆是敗血惡物發作寒熱腑腹撮痛乳癰枯涸食飲稍減醫者不察便謂產後出血數斗氣血俱虛便用溫熱之劑養血補虛止作寒治舉世皆然豈知婦人之孕如天地之孕物也墜墮打撲莫不同然蓋此痛得之於外非其先元虛元弱古人云痛隨利減宜峻瀉一二十行畢但忌熱酒可也

偏陽豈有孕乎此與禾黍瓜果之屬何異哉若水旱不時則華之與實俱瘁若矣此又與孕而不育者復何異哉七月立秋後十八日寸草不結者猶天實故也今婦人雖云終十月無難而生反謂之寒何不察其理之甚也窮劈之治飄者炎火在下以水沃其上蒸之遂成飄矣飄既出窗窗頓寒耶世俗竟傳黑神散之屬治產後一十八證非徒其不愈則經脉涸閉前後淋閉嘔吐噦痰凡百熱證生矣若此誤死者不可計之曷若四物湯與涼膈散停對大作湯劑而下之利以數行惡物俱盡後服淡甘之劑自愈矣又如小兒腹滿喘嗽痰涎不利食者不察便用白餅子巴豆大熱有大毒發兼用麻粉其後必生口瘡上壅咳嗽形體羸瘦食飲減少日輕夜劇醫者不察便與烏梅罌粟殼官桂石榴皮龍骨散子之屬乾薑赤石脂烏梅罌粟殼訶子之屬愛生小便癃閉甚者為腹又甚者水腫之疾生矣而有愈者病有微者也甚則必不愈矣又如人病停飲或因夏月傷冷過多脾為脾胃客氣有餘也宜逐而去之醫者不可以為脾衰而補之則癌者更癌滿者更滿復有巴豆丸下之者病雖少解必不嗜食上焦之病生矣又如人因閃肭膝骱肘腕大痛醫者不察便用雖鍼出血如未愈者再三刺血出血既多遂成跛躄內經曰足得血而能步故若全治閃肭則不經曰足得血而能步故若全治閃肭則不然以禹功散或通經二三錢下神祐丸或除濕丹百餘丸峻瀉一二十行則痛止當痊發痛屬夏痊屬秋宜則夏衰矣此五行勝復之理也故凡腰胯脇痛板癍落馬

金　考城張從政著

偶有所遇厭疾獲瘳記十一

余昔過夏邑西有婦人病腹脹如鼓飲食乍進乍退寒熱更作而時吐嘔且三年矣師覡符咒無所不至惟俟一死會十月農隙田夫聚獵一犬役死磔于大樹根盤遺腥在其上病婦偶至樹根頓覺昏憒眩晉不知人枕于根側口中垂出其狀如蛇口眼皆具以舌舐其遺腥其人驚見長垂兩袖裹其手按垂頭極力而出之且二尺許重幾斤剖而視之以示諸人其婦遂愈垂亦無名此正與華元化治法同蓋偶得吐法耳又有一書生瘧甚談以間日一作將秋試及試之日乃瘧之期書生憂甚因炙之慈蜜合食大吐涎數升瘧血宿食皆盡同室驚畏至來日入院瘧亦不發亦偶得吐法耳正隆間有聖者取江梁諸匠氏有木匠趙作頭鉄匠杜作頭行次失路迷至大宅乞宿主人不納曰家中有人重病不敢納客杜作頭紿曰此趙公乃汴梁太醫之家今蒙上司見召迷路至此蓋病者當愈而遇此公也主人歡而入良久復出將邀二人入室與之食已主人起請曰煩太醫看病何如趙見而笑曰一藥可愈二人竊議曰來時所携熟藥寄他車上此中實無崇何杜曰此甚易耳潛出門得牛糞一塊作三十粒下以溫水少頃病人覺腹中如重行一涌而出狀若小蛇蝘一二升以手探之又約一升頓覺病去明日主人出謝曰百歲老人未嘗見此神效之藥也禮後二人逢歸嗚呼此二子小人也欲苟一時之寢遂以微物治人亦偶得吐法耳又有一婦病風痛從五七作逢三十餘歲至四十歲日作或一日十餘作以至昏凝健忘求死而已會興定歲大饑遂採百草而食於水濱采一種草狀若慈姑泡蒸而食之食訖向五更覺心中不安吐涎如膠連日不止約一二斗汗出如洗初昏困後三日輕健非艱之比病去食進百脉皆和省其所食不知何物訪問諸人乃慈慈苗也慈慈苗者本草所謂藜蘆苗是也圖經云藜蘆苗吐風病此亦偶得吐法耳又有一婦年三十餘病滑泄經年皆云虛中有積久無憂散五七日一服至二十服不效又服糟積丹數金丸諸藥皆不效其人脈緩澁食飲日減人或謂曰此休息痢也宜灸中脘及至石穴臍下氣海及膀胱穴以三里引之每年當冬至日灸之前後至萬餘壯愈門外或者曰此病我厭識蓋大傷飲之故即目桃花正開候其落時以長鞭針刺之得數十升長流之者當大笑耳今之醫者宜熟察之可也人能一說頭之謹察其病中之誤精究其誤中之眞反覆求之無病不愈余之所以書此者庶後之君子知余之用心非一日也又有病目不覩者思食苦苣頓頓不闕醫者以爲有虫會不周歲兩目微痛如虫行大背漸明俄然大見又如北方貴人愛食乳酪牛酥羊生魚膾鹿脯猪腊海味飲至六七日少百餘後食日進神日生二子此人本不知桃花毒有取積之神效亦偶得藜蘆煑醬鹵汁皆能殺九虫此二者亦偶得服食法耳智者謂此當觸類而長之

攻裏發表寒熱殊塗第十二

有一言而可以該醫之旨者其惟發表攻裏乎雖千枝萬派不過在表在裏而已矣欲攻其裏者宜以寒爲主欲發其表者宜以熱爲主雖千萬世不可易也內經言急食甘以緩之牛肉大棗葵菜皆甘物也故能寬腸胃且腸中久空又遇甘滑之物此銅鐵所以下也亦偶得瀉法耳頓有老人年八十歲臟腑壅滯數日不便每寒時用藥者不可以寒藥司氣用熱時用藥者不可以熱藥司氣用寒藥不遠寒此寒熱二字謂六氣中司氣之寒熱也攻裏發表之藥發表不遠熱攻裏

熱藥此常理也惟攻裏發表則反之然而攻裏發表當分作兩塗若病在表者雖提日流金之時不避司氣之熱亦必以熱藥發其表若病在裏者雖堅冰積雪之時不避司氣之寒亦必以寒藥攻其裏所謂發表者出汗是也所謂攻裏者湯滌是也王太僕注云汗泄下痢皆以其不住於中也夫不住其中則其藥一去不留雖以寒藥犯司氣之寒熱藥犯司氣之熱亦無害也若其藥留而不出適足以司氣增邪是謂不發不攻寒熱內賊其病益甚無病者必生病有病者必甚若司氣用寒之時病在表而不在裏反以寒藥冰其裏不涌不泄堅腹滿痛急下痢之病生矣若司氣用熱之時病在裏而不在表反以熱藥燥其中又非發汗則身熱吐下狂亂瘛瘲疽瘡痒瘡注下瞤瘈腫脹嘔吐煩躁頭痛嘗簡攣肉痛血泄淋閟之病生矣以此知非熱不能解表非寒不能攻裏是解表常宜寒攻裏常宜熱若反此法是謂妄逆今之用藥者以荊芥薄桂藥攻表以黃芩大黃藥攻裏此與以水濟水以火濟火何異哉故非徒不效輕者危甚者死夫本草一書不過酸苦甘辛鹹淡六味而已聖人既以辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰又以淡味滲泄為陽鹹味下泄為陰然而悟欲復迴辛甘淡三味以解表酸苦鹹三味以攻裏發表與滲泄非解表而何涌泄非攻裏而何此二者聖人之法盡矣後世不知此理以辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰淡滲為陽鹹泄為陰表裏俱病者雖可攻其裏表裏俱病者雖可以熱解表亦可以寒攻裏此仲景之大小柴胡湯雖解表亦兼攻裏最為得體今之用藥者只知用熱藥解表不察裏之已病故前所言熱證皆作矣醫者不知乘由已作反謂傷寒變證以証病人非一日也故劉河間自製通聖散加益元散名為雙解干古之下得仲景之旨者猶宜寒而行之余恐來者不明內經發表攻裏之旨故併以孟堅五苦六辛之說附于卷末

汗下吐三法該盡治病詮十三

人身不過表裏氣血不過虛實表實者裏必虛裏實者表必虛經實者絡必虛絡實者經必虛病之常也良工之治病者先治其實後治其虛亦有不治其虛時粗工之診工之治病實實虛虛或治其實有時而幸中有時而不中也惟庸工治病純補其虛不敢治其實舉世皆曰平穩誤人而不見其迹常著故可得而罪也近者余之故人某官不欲斥言其名因病頭項強壯類傷寒服通聖散雖不得其法而無害也醫者見其因表虛經實者絡必虛絡實者經必虛病之常也良工之治病者先治其實後治其虛亦有不治其虛時粗工之治病或治其

邪去而元氣自復也況予所論之法識練日久至粗至
熟有得無失所以敢爲來者言也天之六氣風者火濕
燥寒地之六氣霧露雨雹冰泥人之六味酸苦甘辛鹹
淡故天邪發病多在乎上地邪發病多在乎下人邪發
病多在乎中此爲發病之三也處之者三出之者亦三
也諸風寒之邪結搏皮膚之間藏于經絡之內留而不
去或發疼痛走注麻痺不仁及四肢腫痒拘攣可汗而
出之風痰宿食在膈或上脫可湧而出之寒濕痼冷熱
客下焦在下之病可泄而出之內經散論諸病非一狀
也流言治法非一階也至眞要大論等數篇言氣所所
生諸病各斷以酸苦甘辛鹹淡以統括之其言補時見
一二然其補非今之所謂補也文具于補論條下如辛
補肝鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺若此之補乃所以
發腠理致津液通血氣至其統論諸藥則曰辛甘淡三
味爲陽酸苦鹹三味爲陰辛甘發散淡滲泄酸苦鹹湧
泄發散者歸于汗湧者歸于吐泄者歸于下滲爲解表
歸于汗泄爲利小溲歸于下殊不言補乃知聖人止有
三法無第四法也然則聖人不言補乎曰蓋汗下吐以
若草木治病者也補者以穀肉果菜養口體者也夫穀
肉果菜之屬猶君之德教也汗下吐之屬猶君之刑罰
也故曰德教興平之梁肉刑罰治亂之藥石若人無病
梁肉而已及其有病當先誅伐有過病之夫也梁肉補
之如世已治矣刑措而不用豈可以藥石爲補哉必欲
去大病大瘵非吐汗下末由也已然今之醫者不得蓋
汗下吐法各立門墻誰肯屈己之高而一問哉且予之
三法能兼衆法用藥之時有按有蹻有撚有導有減有
增有積有止今之醫者不得予之法皆仰面傲笑曰吐
者瓜蒂而已矣汗者麻黃升麻而已矣下者巴豆牽牛
朴硝大黃甘遂芫花而已矣既不得其術從而誣之予
固難與之苦辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如
引涎漉涎嚏氣追淚凡上行者皆吐法也灸蒸熏漱洗
熨烙針砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下
乳磨積逐水破經泄氣凡下行者皆下法也以余之法
所以該衆法也然予亦未嘗以此三法遂棄衆法各相
出之風痰宿食在膈或上脫可湧而出之寒濕痼冷熱
客下焦在下之病可泄而出之內經散論諸病非一狀
也流言治法非一階也至眞要大論等數篇言氣所所
生諸病各斷以酸苦甘辛鹹淡以統括之其言補時見
一二然其補非今之所謂補也文具于補論條下如辛
補肝鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺若此之補乃所以
發腠理致津液通血氣至其統論諸藥則曰辛甘淡三
味爲陽酸苦鹹三味爲陰辛甘發散淡滲泄酸苦鹹湧
泄發散者歸于汗湧者歸于吐泄者歸于下滲爲解表
歸于汗泄爲利小溲歸于下殊不言補乃知聖人止有
三法無第四法也然則聖人不言補乎曰蓋汗下吐以
若草木治病者也補者以穀肉果菜養口體者也夫穀
肉果菜之屬猶君之德教也汗下吐之屬猶君之刑罰
也故曰德教興平之梁肉刑罰治亂之藥石若人無病
梁肉而已及其有病當先誅伐有過病之夫也梁肉補
之如世已治矣刑措而不用豈可以藥石爲補哉必欲
去大病大瘵非吐汗下末由也已然今之醫者不得蓋
汗下吐法各立門墻誰肯屈己之高而一問哉且予之
三法能兼衆法用藥之時有按有蹻有撚有導有減有
增有積有止今之醫者不得予之法皆仰面傲笑曰吐
者瓜蒂而已矣汗者麻黃升麻而已矣下者巴豆牽牛
朴硝大黃甘遂芫花而已矣既不得其術從而誣之予
固難與之苦辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如
引涎漉涎嚏氣追淚凡上行者皆吐法也灸蒸熏漱洗
熨烙針砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下
乳磨積逐水破經泄氣凡下行者皆下法也以余之法
所以該衆法也然予亦未嘗以此三法遂棄衆法各相
出之風痰宿食在膈或上脫可湧而出之寒濕痼冷熱
客下焦在下之病可泄而出之內經散論諸病非一狀
也流言治法非一階也至眞要大論等數篇言氣所所
生諸病各斷以酸苦甘辛鹹淡以統括之其言補時見
一二然其補非今之所謂補也文具于補論條下如辛
補肝鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺若此之補乃所以
發腠理致津液通血氣至其統論諸藥則曰辛甘淡三
味爲陽酸苦鹹三味爲陰辛甘發散淡滲泄酸苦鹹湧
泄發散者歸于汗湧者歸于吐泄者歸于下滲爲解表
歸于汗泄爲利小溲歸于下殊不言補乃知聖人止有
三法無第四法也然則聖人不言補乎曰蓋汗下吐以
若草木治病者也補者以穀肉果菜養口體者也夫穀
肉果菜之屬猶君之德教也汗下吐之屬猶君之刑罰
也故曰德教興平之梁肉刑罰治亂之藥石若人無病
梁肉而已及其有病當先誅伐有過病之夫也梁肉補
之如世已治矣刑措而不用豈可以藥石爲補哉必欲
去大病大瘵非吐汗下末由也已然今之醫者不得蓋
汗下吐法各立門墻誰肯屈己之高而一問哉且予之
三法能兼衆法用藥之時有按有蹻有撚有導有減有
增有積有止今之醫者不得予之法皆仰面傲笑曰吐
者瓜蒂而已矣汗者麻黃升麻而已矣下者巴豆牽牛
朴硝大黃甘遂芫花而已矣既不得其術從而誣之予
固難與之苦辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如
引涎漉涎嚏氣追淚凡上行者皆吐法也灸蒸熏漱洗
熨烙針砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下
乳磨積逐水破經泄氣凡下行者皆下法也以余之法
所以該衆法也然予亦未嘗以此三法遂棄衆法各相
出之風痰宿食在膈或上脫可湧而出之寒濕痼冷熱
客下焦在下之病可泄而出之內經散論諸病非一狀
也流言治法非一階也至眞要大論等數篇言氣所所
生諸病各斷以酸苦甘辛鹹淡以統括之其言補時見
一二然其補非今之所謂補也文具于補論條下如辛
補肝鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺若此之補乃所以
發腠理致津液通血氣至其統論諸藥則曰辛甘淡三
味爲陽酸苦鹹三味爲陰辛甘發散淡滲泄酸苦鹹湧
泄發散者歸于汗湧者歸于吐泄者歸于下滲爲解表
歸于汗泄爲利小溲歸于下殊不言補乃知聖人止有
三法無第四法也然則聖人不言補乎曰蓋汗下吐以
若草木治病者也補者以穀肉果菜養口體者也夫穀
肉果菜之屬猶君之德教也汗下吐之屬猶君之刑罰
也故曰德教興平之梁肉刑罰治亂之藥石若人無病
梁肉而已及其有病當先誅伐有過病之夫也梁肉補
之如世已治矣刑措而不用豈可以藥石爲補哉必欲
去大病大瘵非吐汗下末由也已然今之醫者不得蓋
汗下吐法各立門墻誰肯屈己之高而一問哉且予之
三法能兼衆法用藥之時有按有蹻有撚有導有減有
增有積有止今之醫者不得予之法皆仰面傲笑曰吐
者瓜蒂而已矣汗者麻黃升麻而已矣下者巴豆牽牛
朴硝大黃甘遂芫花而已矣既不得其術從而誣之予
固難與之苦辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如
引涎漉涎嚏氣追淚凡上行者皆吐法也灸蒸熏漱洗
熨烙針砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下
乳磨積逐水破經泄氣凡下行者皆下法也以余之法
所以該衆法也然予亦未嘗以此三法遂棄衆法各相

夫吐者人之所畏且順而下之尙猶不樂況逆而上之
不悅者多矣突然自胃已上大滿大痞皆見殿也非吐病安能出仲景之
散皆見殿也非吐病安能出仲景之
蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜吐也涌吐
之及有涎唾下痢十餘行其脈沉遲寸口脈微滑者此
可吐之吐之則止仲景所謂胸上諸實按之及有涎唾
者皆邪氣在上也內經曰下痢脈遲而滑者內實也寸
口脈微滑者上實也皆可吐之王氷曰上盛不已吐而
奪之仲景曰宿食在上脘當吐之又如宿飲酒積在上
脘者亦當吐之在中脘者當下而去之仲景曰病人手
足厥冷兩手脈乍結以客氣在胸中心下滿而煩欲食
不能食者知病在胸中當吐之余嘗用吐方皆是仲景
方中瓜蒂散吐傷寒頭痛用葱根白豆豉湯以吐雜病
頭痛或單瓜蒂名獨聖加茶末少許以吐痰飲食加全
神守萬全方以鬱金散吐頭痛眩運頭風惡心沐浴風
近代普濟方以吐風散追風散吐口噤不開不省人事
以皂角散吐涎潮總錄方中以常山散吐瘧孫尙方以
固難與之苦辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如
三聖散吐發狂神驗方吐舌不正補亡論以遠志去心
春分前服之預吐瘟疫此皆前人所用之藥也皆有効
者何今之議予好涌者多也惟養生必用方言如吐其
涎今人破壁校正方已引風門中碧霄丹爲證予不須
辨也但內經明言高者越之然名醫錄中惟見太倉公
華元化徐文伯能明律用之自餘無聞乃知此法廢之
久矣今予驟用于千載寂寥之後宜其驚且駭也惜乎
黃帝岐伯之書伊摯仲景之論秉爲閣物縱有用者指
爲山野無識之人豈不謬哉予之用此吐法非偶然也
會見病之在上者諸醫盡其技而不效余反思之投以
痛劑少少用之頗獲微應既久乃廣訪多求漸臻精妙
過則能止少則能加一吐之中變態無窮屢用屢驗以
至不疑故凡可吐令條達者非徒木鬱然凡在上者皆
宜吐之且仲景之論胸上諸實鬱而痛不能愈使人按
之及有涎唾下痢十餘行其脈沉遲寸口脈微滑者此
可吐之吐之則止仲景所謂胸上諸實按之及有涎唾
者皆邪氣在上也內經曰下痢脈遲而滑者內實也寸
口脈微滑者上實也皆可吐之王氷曰上盛不已吐而
奪之仲景曰宿食在上脘當吐之又如宿飲酒積在上
脘者亦當吐之在中脘者當下而去之仲景曰病人手
足厥冷兩手脈乍結以客氣在胸中心下滿而煩欲食
不能食者知病在胸中當吐之余嘗用吐方皆是仲景
方中瓜蒂散吐傷寒頭痛用葱根白豆豉湯以吐雜病
頭痛或單瓜蒂名獨聖加茶末少許以吐痰飲食加全
事方中稀涎散吐膈實中滿痰厥失音牙關緊閉如妳

蝎稍以吐兩脇肋刺痛濯濯水聲者內經所謂濕在上以苦吐之者其是謂歟今人亦有竊予之法者然終非口授或中或否或涌而不能出或出而不涌之法名曰撩痰撩之一字自有擒縱卷舒頃有一工吐陳下一婦人半月不止延至數十命懸須臾倉皇失計求予解之予使煎麝香湯下咽立止或問麝香何能止吐予謂之曰瓜蒂聞麝香即死吐者瓜蒂也所以立解如藜蘆吐者不止以葱白湯解之以石藥吐者不止以甘草貫衆解之諸草木吐者可以麝香湯解之以甘草貫衆解之諸草木吐者可以麝香湯解之以草考之吐藥之苦寒者有豆豉瓜蒂茶末梔子黃連苦參大黃黃芩辛苦而寒者有鬱金常山藜蘆甘苦而寒者有地黃汁苦而溫者有木香遠志厚朴辛苦而溫者有薄荷芫花辛而溫者有穀精草葱根鬚辛而寒者有輕粉辛甘而溫者有烏頭附子尖酸而寒者有礬綠汁酸而平者有赤小豆酸而溫者有飯漿酸辛而寒者有膽礬酸而寒者有青鹽曰米飲辛鹹而溫者有皂角甚鹹而寒者有滄鹽甘而寒者有牙硝甘而微溫且寒者有參蘆頭甘辛而熱者有小毒藜蘆芫花輕粉烏附尖有大毒外二十六味皆吐藥之無毒者各對證擇而用之此法宜先小服不滿積漸加之余之撩痰者以斂肢雞羽探引不出以鑷投之投之不吐再投之且探無不出者吐至昏眩頃刻驚疑書曰若藥不瞑眩厥疾弗瘳如發頭眩可飲水亦立解如無氷水新汲水亦可強者可一吐而安弱者可作三次吐之而吐庶無損也吐之次日有宿食復吐者有轉甚者未平也候數日當再涌之如鼠渴者氷水瓜梨柿及冢物皆不禁惟禁飲食過飽硬物乾脯難化之物心火既降中脘沖和陰道必強大禁房勞大忌悲思病人既不自責衆議因而噪之謬罪于吐法起謗其由此也故性行剛暴好怒喜淫之人不可吐左右多喋雜之言不可吐病人頗讀醫書實非深解者不可吐主病者不能辨邪正之說不可吐病人無正性妄言妄從反覆不定者不可吐病勢巇危老弱氣衰者不可吐亡陽血虛者不可吐諸吐血嘔血咯血衄血崩血失血者皆不可吐吐則轉生他病侵成不救反起謗端雖懇切求慎勿強從恐有一失愈令後世不信此法以小不善累大善也必標本相得彼此相信眞知此理不聽浮言審明某經某絡某臟某腑某氣某血某病之所以發汗聖人之刺熱五十九刺爲無藥而設也有藥而設也桂枝湯小柴胡湯柴胡桂枝湯通聖散皆辛溫之藥也如大柴胡湯小承氣湯爲陰虛而設也四逆湯爲陽虛而設也表裏俱實者所謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛者所謂陰盛陽虛汗之則愈也所謂陽爲表而陰爲裏也如表虛出如傳粉百疾皆愈所謂薰漬而汗者如張苗治陳鳳丘燒地布桃葉蒸之大汗立愈又如許學士治許太后感風不能言作防風湯數劑置於床下氣如煙霧如其言遂愈能言此皆前人用之有驗者以木草梗之荊芥香白芷陳皮半夏細辛蒼朮其辛而溫者乎蜀椒胡椒葉黃大蒜其辛而大熱者乎生薑其辛而微溫者乎天麻蔥白其辛而平者乎已蔞花其辛而且苦者乎麻黃人參大棗其甘而溫者乎桔梗根赤芍茶其甘而寒者乎防風當歸其甘辛而溫者乎附子其甘辛而大熱者乎當歸桂枝其甘辛而大熱者乎厚朴其苦而溫者乎桂枝其甘辛而微溫者乎黃芩知母枳實地骨皮其苦而寒者乎前胡柴胡其苦而微寒者乎芫活其苦辛而微溫者乎升麻其苦甘且平者乎羚羊犀角其鹹而寒者乎浮萍其辛澁而寒者乎凡此四十味皆發散之屬也惟不善撰者當寒而反熱當熱而反寒此病之所以變也仲景曰大法春夏宜汗春夏陽氣在外人氣亦在外邪氣亦在外故宜發汗然冲氣舉其略耳設若秋冬得春夏之病當不發汗乎但春夏易汗而秋冬難耳凡發汗欲周身漐漐然不欲如水淋漓欲令手足俱周遍汗出一二時爲佳若汗纔出邪氣多不出則當重發汗則使人亡陽凡發汗中病則止不必盡劑要在剂當不欲過也此雖仲景調理傷寒之法至於雜病復何異哉且如傷寒麻黃之類爲表實而設也桂枝湯之類爲表虛而設也承氣湯爲陰虛而設也表裏俱實者所謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛者所謂陰盛陽虛汗之則愈也所謂陽爲表而陰爲裏也如表虛亡陽發汗則死發汗之法辯陰陽別表裏定虛實然後

汗之隨治隨應設若殘泄不止日夜無度完穀下出發汗可也內經曰春傷於風夏生飧泄此以風爲根風非汗不出昔有人病此者腹中雷鳴泄注米穀不分小便澁滯皆曰脾胃虛寒故耳豆蔻烏梅罌粟殼乾薑附子曾無一効中脘膀下炙已數十燥熱轉甚小溲澗渴瘦倒無力飲食減少命予視之余以謂應象論曰熱氣在下水穀不分化生飧泄寒氣在上則生脹腹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其兩手脈息俱浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯以薑棗煎大劑連進三服汗出終日至旦而愈次以胃風湯和平臟腑調養陰陽食進病愈又貧家一男子年二十餘病破傷風搐牙閉緊急角弓反張棄之空室無人問者時時呻呼余憐其苦以風藥投之口噤不能下乃從兩鼻竅中灌入咽喉約一中椀死中求生其藥皆大黃甘遂牽牛硝石之類良久上涌下泄吐且三四升下一二十行風搐立止肢體柔和旦已自能起口雖開尙未能言予又以桂枝麻黃湯三兩作一服使啜之汗出周匝如洗不三日而瘉又如小兒之病驚風搐搦涎潮熱變壞世皆用大鷄丸抱龍丸鎮心丸等藥間有不愈者余潛用瓜蒂赤小豆等分其爲細末以猪膽汁浸蒸餅爲丸衣以螺青或丹砂以發汗者世罕知之故予數水乳汁送之良久風涎涌出一兩杓三五日一涌涌三五次漸以通聖散稍熱服之汗粼粼然病已矣頃又治一狂人陰不勝其陽則脈流薄疾陽并乃狂難經曰重陽者狂重陰者癲陽爲腑陰爲臟非陽熱而陰寒并於陽則狂狂則生寒并於陰則癲癲則死內經所謂補也陳腐去而腸胃潔淨新生而榖氣來矣是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復下之爲補者盡庸工妄投下藥當寒反熱當熱反寒未見微功轉成大害使聰明之士亦復不信者此也所以謂寒藥下者調胃承氣湯泄熱之上藥也大小柴胡又其次也以涼藥下汗方平又治一酒病人頭痛身熱惡寒脈兩手俱洪大三兩日不圖余以防風通聖散約一兩用水一中椀生薑二十餘片葱鬚根二十莖豆豉一大撮同煎三五沸去滓稍熱分作二服先服一服多半須臾以叉柱指探引咽中吐出宿酒酒之香味尙然約一兩杓頭上汗出加洗次服少半立愈內經曰火鬱發之發之爲汗之令其疎散也又嘗治一稅官病風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿歷乾足膕膝皮膚少有跌露則冷風襲之流入經絡其痛轉劇走注上下往來無定其痛極處便摩急而熨起肉色不變膝理間如亟行每遇風冷病必轉增飲食轉減肢體羸乏須人扶掖猶能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔鍼着灸莫知其數前後三年不瘳一愈一日命予脈之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜瀉三十餘行痛減半遂漸服赤伏苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺風之爲劑雖錢數數然汗出余又作玲瓏丸法蒸血熱病必增劇諸汗法古方亦多有之惟以此發汗者世罕知之故予嘗曰吐法兼汗良以此夫

凡在下者皆可下式十六

下之攻病人亦所惡聞也然積聚陳腐于中留結寒熱於內留之則是耶遂之則是耶內經一書惟以氣血通流爲貴世俗庸工惟以閉塞爲貴又止知下之爲瀉又豈知內經之所謂下者乃所謂補也陳腐去而腸胃潔淨新生而穀氣來矣是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復下之爲補者盡庸工妄投下藥當寒反熱當熱反寒未見微功轉成大害使聰明之士亦復不信者此也所以謂寒藥下者調胃承氣湯泄熱之上藥也大小柴胡又其次也以涼藥下汗方平又治一酒病人頭痛身熱惡寒脈兩手俱洪大三兩日不圖余以防風通聖散約一兩用水一中椀生薑二十餘片葱鬚根二十莖豆豉一大撮同煎三五沸去滓稍熱分作二服先服一服多半須臾以叉柱指探引咽中吐出宿酒酒之香味尙然約一兩杓頭上汗出加洗次服少半立愈內經曰火鬱發之發之爲汗之令其疎散也又嘗治一稅官病風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿歷乾足膕膝皮膚少有跌露則冷風襲之流入經絡其痛轉劇走注上下往來無定其痛極處便摩急而熨起肉色不變膝理間如亟行每遇風冷病必轉增飲食轉減肢體羸乏須人扶掖猶能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔鍼着灸莫知其數前後三年不瘳一愈一日命予脈之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜瀉三十餘行痛減半遂漸服赤伏苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺風之爲劑雖錢數數然汗出余又作玲瓏丸法蒸血熱病暴病者耳故士鬱之爲奪雖大承氣之藥論大黃苦寒通九竅利大小便除五臟六腑積熱芒硝鹹寒破痰散熱滌腸胃枳實苦寒爲佐使散滯氣消痞滿除脹脈厚朴辛溫和脾胃寬中通氣此四味雖爲下藥有泄有補卓然有奇功劉河間又加甘草以爲三一承氣以甘和其中最得仲景之秘也余嘗以大承氣改作調中湯加以薑棗煎之俗見薑棗以爲補脾胃而喜服不知其中有瘧痢盡而榮衛昌不補之中有補者存焉然俗不信大承氣湯亦無害也試舉大承氣之藥論大黃苦寒通

內經之法抑屈而不伸者也此藥治中滿病氣不大便者下五七行殊不困乏次日必神清氣快腸空食進內經曰脾爲之使胃爲之市人之食飲酸鹹甘苦百種之味雜湊于此塵而不行蕩其舊而新之亦脾胃之所望也況中州之人食雜而不勞者乎中州土也兼載四象木金水火皆聚此中故脾胃之病奈何中州之醫不善掃除倉廩使陳腐積而不能去也猶曰我善補大罪也此藥有奇功皆謂服之便成傷敗乃好丹而非素者也或言男子不可久瀉婦人不可久吐何妄論之甚也可吐則吐可下則下豈問男女乎大人小兒一切所傷之物在胃脘如兩手脈遲而滑者內實也宜下之何以別乎蓋傷宿食者惡食傷風者惡風傷寒者惡寒傷酒者惡酒至易辨也故凡宿食在胃脘皆可下之則三部脈平若心下按之而硬滿者猶宜再下之如傷寒大汗之後重復勞發而爲病者蓋下之後熱氣不盡故也當再下之若雜病腹中滿痛不止者此爲內實也金匱要略曰痛而腹滿按之不痛爲虛病者爲實難經曰病傷寒皆宜實腹中滿痛裏壅爲實故可下之不計雜病傷寒大汗之後急下之宜大承氣湯或導水丸或泄水丸等藥過十餘行如痛不已亦可再服痛已則止至如傷寒大柴胡湯發熱脈沉實及寒熱往來時時有嘔噦者宜加當歸煎服之下三五行立愈產後慎不可作諸虛不足治之必變作骨蒸寒熱飲食不入肌膚瘦削經水不行經曰寒則衰飲食熱則消肌肉人病瘦削皆粗工以藥消爍之故也嗚呼人之死者豈爲命乎難經曰實實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳至如目黃九痼食勞皆屬脾土可下之宜茵陳蒿湯或用導水丸禹功散瀉十餘行次以五苓散桂苓甘露散白术丸等藥服之則愈矣或腰腳胯痛可用甘遂粉二三錢以豬豬子薄批七八片摻藥在內以濕紙包數重炙武火燒熱至臨卧細嚼以溫酒或飲米湯調下至平明見二三十行勿詰意欲止瀉則飲水或新水頓服之瀉立止次服通經和氣定痛烏金丸踏馬丹之類則愈矣內經有不因氣動而病生於外者太僕以爲痺氣賊魅重毒根苗之苦大戟甘遂之苦甘朴硝芒硝之苦辛下之溫之熱者有巴豆之辛下之辛涼者有猪羊血之鹹下之平者有郁李仁之酸桃花蔓之苦石三十味惟牽牛大戟芫花皂角之辛鹹下之而去之以本草攻之下之寒者有戎鹽之鹹犀角之酸鹹滄鹽澤瀉之甘鹹椒實之苦酸胭粉之辛澤漆之苦辛杏仁之苦甘下之微寒者有猪膽之苦下之大寒者有牙硝之甘大黃瓜蒂牽牛苦葫子藍汁牛膽羊蹄根苗之苦大戟甘遂之苦甘朴硝芒硝之苦辛下之溫之熱者有巴豆之辛下之辛涼者有猪羊血之鹹下之平者有郁李仁之酸桃花蔓之苦石三十味惟牽牛大戟芫花皂角之辛鹹下之發煩痛日夜號泣不止者予尋常談笑之間立獲大効可峻瀉三四十行痛止腫消乃以通經散下導水丸等藥如瀉水少則可再加湯劑瀉之後服和血消腫散毒之藥病去如掃此法得之睢陽高大明侯德和使外傷者不致癰瘍破璧之患余非敢掩人之善意在救人耳會有鄰人杖瘡發作腫痛煩及上下語言錯亂時嘔吐數日不食皆曰不救余以通經散三四錢下神佑丸百餘丸相併而下間有嘔出者大半已下腸矣良久大瀉數行穢不可近膿血涎沫瘀毒約一二斗其病人困睡不省一日一夜隣閒予予曰喘息勻停腫消痛減故得睡也來旦語清食進不數日痊救材年間二三百余追思舉世杖瘡死者皆任死也自後凡見宛人被責者急以導水丸禹功散大作劑料瀉之蓋貴城郭之人則非矣此藥用研石治瘧相類止可施之於貴食之人若偶急丸治傷寒溫病中酒昌風及小兒瘡疹痘後滿悶用之下腸不死則危及夫城郭之人富貴之家用此下藥亦不死則危矣奈何庸人畏大黃而不畏巴豆因而減之若人年老衰弱有虛中積聚者止可五日一

以大黃性寒而畏烟工以巴豆劑小而喜以大黃劑大而不喜皆不知理而至是也豈知諸毒中惟巴豆得其去油既之螟猶能下後使人津液涸竭留毒不去庶熱口燥他病轉生故下藥以巴豆爲禁余嘗用前十餘藥如身之使臂臂之使手然諸洞泄寒中者不可下俗謂休息痢也傷寒脈浮者不可下表裏俱虛者不宜下內經中五痞心證不宜下厥而唇青手足冷內熱深者宜下寒者不宜下以脈別之小兒內瘡轉生慢驚及雨目直視魚口出氣者亦不宜下若十二經敗甚亦不宜下若其餘大積止宜調養溫以和之如平則必誤人病耳大聚大病大秘大涸大堅下藥乃補藥也余嘗曰瀉法兼補法具以此夫

排原補法利害非輕說十七

原補一篇不當作由近論補者與內經相違不得不作耳夫養生當論食補治病當論藥攻然聽者皆逆耳以予言爲恠蓋讓者嘗知補之爲利而不知補之爲害也論補者蓋有六法平補峻補溫補寒補筋力之補房室之補以人參黃芪之類爲平補以附子硫黃之類爲峻補以豆蔻官桂之類爲溫補以天門冬五加皮之類爲寒補以巴戟菟絲蓉之類爲筋力之補以石燕海馬起石丹砂之類爲房室之補此六者近代之所謂補者也若施之治病非徒功効疎濶至其害不可勝言者難經言東方實西方虛瀉南方補北方此言肝木實而肺金虛瀉心火補腎水也以此論之前所謂六補者了不相涉試衆補之所以爲害者如癆本夏傷於暑議者以爲脾寒而補之溫補之則危竣補之則死傷寒熱病下之後若以溫辛之藥補之熱當復作甚則不救瀉血血止之後若溫補之則死傷寒熱病下之後若以溫辛之藥補之熱當復作甚則不救瀉血血止之後若溫補之則危竣

連解毒湯加當歸赤芍藥與地榆散同煎服之一月而愈若此數證余雖用補未嘗不以攻藥居其先何也蓋邪未去而不可言補補之則適足資寇故病鈎之後莫若以五穀養之五果助之五畜益之五菜充之相五臟所宜毋使偏傾可也凡藥有毒也非止大毒小毒謂之毒雖甘草苦參不可不謂之毒人服必有偏勝氣增而为天之由也是以君子貴流不貴滯貴平不貴強盧氏云強中生百病其知言哉人惟恃強房勞之病作矣何貴於補哉以太宗憲宗高明之資猶陷於流俗之蔽為方士燥藥所誤以韓昌黎元微之猶死於小溲不通水腫有服丹石數妾而死於豪脫有服草烏頭如聖丸而死於鬚瘡有服乳石硫黃小溲不通有習氣求嗣而死於精血有嗜酒而死於發狂見鬼有好茶而為癖乃知諸藥皆不可久服但可攻邪去則已近年運使張伯英病宿傷服硫黃豆附數月一日喪明監察陳威卿病嗽服鍾乳粉數年嘔血而殞嗚呼後之談補者尚監茲哉

證口眼喎斜是經非緩辯十八

口眼喎斜者俗工多與中風掉眩證一槩治之其藥則盡寶至寶續命湧心一字急風烏犀錢彈丸其方并不言治此病也然而不愈者何也蓋知竅而不知經知經而不知氣故也何謂知竅而不知經蓋人之首有七竅如日月五星七政之在天也故肝竅目目為肝之外候肺竅鼻鼻為肺之外候心竅舌舌無竅心與腎合而寄竅於耳故耳與舌俱為心之外候俗工止知目病歸之肝口病歸之脾耳病歸之腎舌病歸之心更無改張豈知口之病者口之所以辟也是則然矣七竅惟口目喎斜而耳鼻獨無此病者何也蓋動則風生靜則風息天地之常理也考之易象有足相符者異土動也艮土靜也艮而下連震動也是動靜皆屬土觀卦有視之理也觀者目之用也目之上網與假下網則不假故能為監視之職也目之下網足太陽及足陽明起於此鼻之左右足陽明手陽明俠乎此口之左右亦此兩經環乎此故七竅有病不可獨歸之五臟當歸之六陽經也故曰俗工知竅而不知氣蓋世之談方藥者不知經而不知氣氣者經之所行也經者氣之所循所環所交所合所過所注所起所會所屬所絡所繫所抵所連所係上所下所俠所貫所布所散所結所約所同所別千萬人中或見一二明白可謂難其人矣然而不過執此十二經便為病本將陽經為熱陰經為寒向本草中尋藥藥架上檢方而已矣病之不愈又嘗過東杷一夫亦患此診出下不得泄真氣為風邪所隔故宜灸內經曰隔下則灸之正謂此也所以立愈又嘗過東杷一夫亦患此診其脈兩手急數如弦之張甚力而實其人齒壯氣充真長吏不同蓋風火交勝余調承氣湯六兩以水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前後約瀉四五十行去一兩益次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬日而愈脈訣云熱則生風若此者不可純歸其病於腎陰之間而得亦風火表盛而然也蓋火勝則制金金衰則木茂木茂則風生若東杷之人止可流濕潤燥大下之後便使加養通鬱為治靈樞雖有馬脅桂酒雙塗之法此但治其外耳非治其內也今人不知其本欲以單服熱水強引而行之未見其愈者也向之用薑附烏桂趕石硫黃之劑者是耶非耶

痂本肝經宜通勿塞狀十九

痂有七前人論者甚多非靈樞素問銅人之論余皆不取非余好異也俱要窮其原耳七痂者何寒痂水痂筋痂血痂氣痂狐痂癇痂是謂七痂俗工不識因立諸名或曰勝胱或曰腎冷或曰小腸氣小兒曰偏氣立名既謬併丟其實何哉蓋醫者既斷為勝胱腎冷小腸氣又

封者蓋之理也蓋者口之用也口之下網與上網不啀故隨封上艮而下震口目常動故風生焉耳鼻常靜故風息焉當思月雖斜而口之輔車未嘗偏此經之受病非篾之受病明矣而況目有風輪唇有飛門者耶余嘗治此證求腎用世俗之藥非故與世參商方鑿圓枘自然齟齬者過領一長上所下所俠所貫所布所散所結所約所同所別千萬人中或見一二明白可謂難其人矣然而不過執此十二經便為病本將陽經為熱陰經為寒向本草中尋藥藥架上檢方而已矣病之不愈又嘗過東杷一夫亦患此診出下不得泄真氣為風邪所隔故宜灸內經曰隔下則灸之正謂此也所以立愈又嘗過東杷一夫亦患此診其脈兩手急數如弦之張甚力而實其人齒壯氣充真長吏不同蓋風火交勝余調承氣湯六兩以水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前後約瀉四五十行去一兩益次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬日而愈脈訣云熱則生風若此者不可純歸其病於腎陰之間而得亦風火表盛而然也蓋火勝則制金金衰則木茂木茂則風生若東杷之人止可流濕潤燥大下之後便使加養通鬱為治靈樞雖有馬脅桂酒雙塗之法此但治其外耳非治其內也今人不知其本欲以單服熱水強引而行之未見其愈者也向之用薑附烏桂趕石硫黃之劑者是耶非耶

痂本肝經宜通勿塞狀十九

痂有七前人論者甚多非靈樞素問銅人之論余皆不取非余好異也俱要窮其原耳七痂者何寒痂水痂筋痂血痂氣痂狐痂癇痂是謂七痂俗工不識因立諸名或曰勝胱或曰腎冷或曰小腸氣小兒曰偏氣立名既謬併丟其實何哉蓋醫者既斷為勝胱腎冷小腸氣又

曰虛寒所致其藥之用也不應耳巴戟則杜仲菟絲懷香則金鈴補骨脂胡
卢子烏頭則乾薑官桂不練實懷香則金鈴補骨脂胡
在葬師曾無殊効三二十年牢不可去間因微病稍似
開通執此徹芒浸成大錯標既不除本必歸根處處相
傳曾無覺者豈知諸痂皆歸肝經其奈庸流歸之小腸
膀胱夫膀胱水府專司滲泄小腸水道專主通流腎為
少陰統二水入之小腹自胃入小腸滲入膀胱膀胱
者膀胱也氣化則水出莖端此常道也及其為病乃屬
足厥陰肝經蓋厥陰器而上入小腹者足厥陰肝經也
夫肝腎皆屬于下與衝任督相附然寒極經言足厥陰
肝經病則有遺溺癃閉狐痂主腎與膀胱小腸三經則
不言痂是受痂之處乃肝之部分也且內經男子宗筋
為東骨之會也而肝主筋聚于陰器其病傷
厥陰環而引之與玉莖無由傳統女子則為氣戶其
內外為二其一曰貫漏此足厥陰與衝任
者之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚于陰器其病傷
於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行針清陰氣
故陽明與太陰厥陰之筋皆會于陰器惟厥陰主筋故
為痂者必本之厥陰靈樞又言足厥陰之別名曰蠹溝
去肉踝五寸別走少陽循脛上擧結於莖其病氣逆睾
腫卒痂實則挺長虛則暴痒取之所別矣豈非厥陰為
受病之處耶靈樞又言邪在小腸連繫係屬於腎貫肝
絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於脐故
取之肓原以散之刺太陰以平之取厥陰以下之取巨
虛下廉以去之按其所過之經以調之此其初耶言邪
在小腸全其治法必曰取厥陰以厥考之素問云厥陰滑為狐痂少陽
滑為肺風痂太陰滑為脾風痂陽明滑為心風痂太陽
大巨二穴言癇痂足少陰舍於肺脈氣之所發也氣衝二穴言
中皆言風痂者足厥陰肝經之氣也環振亦曰心脈微
癇痂莖中痛雨丸寒痛亦足陽明脈氣之所發也其腹
滑為心痂肝脈滑甚為癲癇腎脈滑甚為癲癇凡此三
部第四行府舍二穴言痂痛足六陰厥陰維之交會
也亦太陰部三陰陽明支別也衝門二穴言陰痂足太
陰厥陰之會也其在側腸者五樞二穴言寒痂陰邪上
入少腹帶脈下三寸也其在足六經者足厥陰穴十名
言痂者七謂大敦行間太衝中封蠡溝中都曲泉足少
陽穴十四名言痂者一謂丘墟穴也足太陰穴十一名
言痂者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言痂者一謂
陰市穴也足少陰穴十名言痂者五謂然谷大鍾照海
交信築賓也足太陽穴十八名言痂者二謂金門合陽
也由是言之惟厥陰言痂獨多為痂之主也其穴經穴
雖亦治痂終非受痂之地但與足厥陰相遇耳或在泉
寒勝木氣攣縮禁於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此
經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外閉閉尾
縮精竄於此經其病差別如此不知世間之藥多熱補
從誰而受其方也信其方則素問靈樞銅人皆非也信
素問靈樞銅人則伶方亦皆非也不知後之君子以執
為是嗚呼余立於醫四十餘歲使世俗之方人人可療
余亦莫知敢廢也識練日久因經議病然後不敢且夫
水水傳之肝經也又嘗痛閭劒人俞穴亦
上十三椎俞肝經言寒痂腹部中行惟陰
痂任脈之所發也關元一穴言暴痂小腸
任脈之會也中極一穴言痂瘕膀胱之募
脈之會也曲骨一穴言瘕痂任脈足厥陰
婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干膀胱小腸之事
乃足厥陰肝經之職也若俗方止言膀胱小腸殊不知

肝木一句導人甚矣且肝經乙木也木屬東方爲心火之母也凡痂者非肝木受邪則肝木自甚也不可便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺也昔審言爲蔡之參軍也因坐濕地痂痛不可堪諸藥莫救余急以導水丸兩功散瀉三十餘行腫立消痛止減又頃關一男子病至痂暴痛不任倒于街衢人莫能動呼予救之余引經證之邪氣客于足厥陰之絡令人卒痂故病陰丸痛也余急瀉大敦二穴大痛立已夫大敦穴者乃是厥陰之井穴也珍寇鎮一夫病癇癎發湯痛飲蜜漿劇傷木水鬱者莫知瀉去其濕反雜進葶附濕爲燥熱所塞三焦閉溢水道不行陰道不與陰囊腫墜大於升斗余先以導水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在近譽尾一夫病卒痂赤腫大痛數日不止諸藥如水投石余以導水一百五十丸令三次明之次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下蠱腑經積之物數行痛腫皆去不三日平復如故內經曰木鬱則達之達謂吐也令傳達肝之積本當吐者然觀其病之上下以順爲貴仲景所謂上宜吐下宜瀉者此也敢列七痂圖于左以示後之君子庶幾有所憑藉者焉

寒痂其狀囊冷結硬如石陰堅不舉或控睾丸而痛得寒則痂出入上下往來

見其人竊私料之此不可以常法治乃可大作劑而下之殊不動搖計竭智窮無如之何忽憶桃花蕎丸頓下七八十丸連瀉二百餘行與前藥相兼而下其人昏困數日方已蓋大疾之已去自然卧想不如此則病氣無由衰也徐以調和胃氣之藥餵粥日加自爾平復又嘗過鳴鹿邨中聞有人呻吟聲息瘦削痿然無力余視之乃五虛也余急以聖散子二服作一服此證非三錢二錢可塞也續以胃風湯五苓散等藥各作大劑使頓服注瀉方止而糜粥入胃不數日而其人起矣故五虛之受不加峻塞不可得而實也彼庸工治此二證草草補瀉如一杯水救一車之薪火也竟無成功反日虛者不可補實者不可瀉此何語也吁不虛者強補不實者強攻此自是庸工不識虛實之罪也豈有虛者不可瀉之理哉予他日又思之五實證汗下吐三法俱行更快五虛證一補足矣今人見五實證猶有塞之者見五虛者雖補之而非其藥本當生者反鈍滯遷延竟至於死耳夫聖散子有乾薑尋常瀉利勿用各有標本胃風五苓有桂所以温經散表而分水道聖散子之濕燥胃風五苓之能分肯辛熱辛温之劑也俗工往往聚訟以余好用寒涼然予豈不用温補但不遇可用之證也譊譊謔嗷咸欲夸已以標名從誰斷之悲夫

金 考城張從政著

嗌舌緩急砭藥不同解二十一

咽與嗌會厭與舌此四者同在一門而其用各異嗌以氣故嗌氣通於天咽以噎物故咽氣通於地會厭與嗌上下以司開闔食下則俯而掩氣上則呼而出是以舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交爲用闕一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之處故難經言七衝門而會厭之下爲吸門及其爲病也一言可了一言者何曰火內經曰一陰一陽結謂之嗌痺王太僕註云一陰者手少陰君火心主之脈氣也手少陽相火三焦之脈氣也二火皆主脈並絡於嗌氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚則痺痺甚而不通則死矣夫足少陰循嗌嚨俠舌本少陰上俠咽此二者誠是也至於足陽明下人迎循嗌嚨足太陰俠咽連舌本手太陽循咽下焦足厥陰循嗌嚨之後此數經皆言咽嗌獨少陽不言咽嗌而內經言一陰一陽謂之嗌痺何也蓋人讀十二經多不讀靈樞經中別十二篇具載十二經之正其文云足少陽之正統脾入毛際合於厥陰別者入季脇間循腑裏屬膽散之上肝貫心以上俠咽出頤頷散於面繫目系合少陽於外眥也又手心主之正別下淵腋三寸入胸中別屬三焦出循嗌嚨出耳後合少陽完骨之下是手少陽三焦之氣與手心主少陰之氣相合而行于嗌嚨也推十二經惟足太陽別項下其餘皆湊于嗌嚨然內經何爲獨言一陰一陽結爲嗌痺蓋君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也余謂一言可了者火是也故十二經中言嗌乾嗌痛咽腫頷腫舌本

強皆君火爲之也唯喉痺急速相火之所爲也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火龍火炎木其勢緩龍火炎木其勢速內經之言喉痺則咽與舌在其間耳以其狀強立八名曰病同是火故不分也後之醫者各詳其狀單乳蛾雙乳蛾單閉喉子舌脹木舌脹纏喉風走馬喉痺熱氣上行結薄於喉之兩傍近外腫作以其形似是謂乳蛾一爲單二爲雙也其比乳蛾差小者名閉喉熱結於舌中舌脹木其勢速內經之言喉痺則咽與舌在其間耳以其狀強立八名曰結於舌下復生一小舌子名曰子舌脹木者強而不柔和也熱結於咽項爲之腫名曰木舌脹木者強而不柔和也熱結於咽項腫連於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺此六種之名雖詳若不歸之火則相去遠矣其微者可以鍼熨之而大者以辛散之今之醫者皆有其藥也如薄荷烏頭蜈蚣白礬朴硝銅綠之類復有不明標本者藥不愈余以鈹鍼小而銳者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈斗又治一男子纏喉風腫表裏皆作藥不能下余以涼藥灌於鼻中下十餘行外以拔毒散傳之陽起石燒赤與伏龍肝各等分細末每日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治貴婦喉痺蓋龍火也雖用涼藥而不可使令服爲龍火宜以火逐之人火者烹飪之火是也乃使爆於烈日之中登於高堂之上令侍婢携火爐坐藥銚於上使藥常極熱不至大沸以熱行寒不爲熱病通口時時呷之百餘次龍火自散以解杆格故也大抵治喉痺用鍼出血最爲上策但人畏鍼委曲傍求瞬息喪命時呷之則創口易合銅人中亦有

炙法然痛微者可用病速者恐遲則殺人故治喉痺之火與救火同不容少待內經火鬱發之發謂發汗然咽喉中豈能發汗故出血者乃發汗之一端也後之君子毋執小方而曰吾藥不動臟腑又於出血若幸過小疾而獲功不法遇大病而死矣毋遺後悔可矣

五積六聚治同鬱證二十二

先賢說五積六聚甚明惟治法獨隱其言五積曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下久不已令人病煩心脾之積名曰痞大如臂上至心下久不已令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚俗呼爲食勞黃也肺之積名曰息賁在右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘嗽發肺癰腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣此五積之狀前賢言之豈不分明徧訪醫門人人能道及問治法不過三稜蓬莪丸之類復有不明標本者藥不愈余以火灸之則蓄甚以火灸之則殭斃況伏梁者火之鬱也以熱藥散之則愈甚況伏梁證有二名同而實異不可不詳焉其一伏梁在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰其一伏梁在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰其一伏梁在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰其一伏梁在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰其一伏梁在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰其一伏梁在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰其一伏梁在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆寒瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍上至心下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肘癰

導水禹功下二三十行末以五苓淡劑等藥調之又當治息賁用瓜蒂散不計四時置之燠室中更以火一爐以助其汗吐汗下二法齊行此病不可逗遛久則傷人又當治賁豚以導水通經三日一下之一月十下前後盲行宂用治血化氣磨積之藥調之此積雖不傷人亦與人借老若六聚之物在腑屬陽而無形亦無定法故此而行之何難之有或言余之治積太峻予曰不然積之在臟如陳莝之在河且積之在臟中間多着脂膜曲折之處匾曰之中陳莝之在河且積之在河江不在中流多在汀灣洄薄之地遇江河之溢一漂而去積之在臟理亦如之故予先以丸藥驅逐斬受之食使無梗塞其碎着之積已離而未下次以散藥滿胃而下橫江之筏一舉而盡設未盡者以藥調之惟堅積不可用此法宜以漸除內經曰少陽經日堅者消之今人言塊癖是也因述九積圖附于篇末以俟來哲知余用心獨苦久矣而世無知者

食積酸心腹滿大黃牽牛之類甚者礞石巴豆酒積目黃口乾葛根麥蘗之類甚者甘遂牽牛氣積噫氣脇塞木香檳榔之類甚者枳殼牽牛

涎積咽如拽鋸朱砂臙粉之類甚者瓜蒂甘遂痰積沸唾稠粘半夏南星之類甚者瓜蒂藜蘆

癖積兩脇刺痛三稜廣茂之類甚者甘遂蜘蛛水積足脛腹滿郁李商陸之類甚者甘遂芫花

血積打撲胸瘀產後不月桃仁地榆之類甚者蝱虻水蛭

蛔

肉積癥瘕癰核癜風粉白丁香砒礬出血甚者硇砂信石

九積皆以氣爲主各據所屬之狀而對治之今人總此諸藥併爲一方曰可治諸積大謬也吾無此病焉用此藥吾無彼病焉用彼藥十羊九牧何所適從非徒無益而又害之

斥十腸五噎派分支派疏二十三

病派之分自巢氏始也病失其本亦自巢氏始也何者老子曰少則得多則惑且俗謂噎食一證在內經苦無多語惟曰三陽結謂之腸三陽者謂大腸小腸膀胱也同大鬱太倉公見此皆下法廢以來千年不復今代劉河間治腸氣噎食用承氣三湯猶超近代今用藥者不明主使如病風狂噎嘻不及親其效猶昧本原既懶問咨妄興非毀今予不憚姑示後人用藥之時更詳輕重假如閉久愼勿陡攻緩得攻開必虛後患宜先潤養小着湯丸累累加之闕扃自通其效明噎上阻涎痰輕用苦酸微微涌出因而治下藥勢易行非三陽俱結於下廣腸枯涸所食之物爲咽所拒納入此腸陽與寒爲之也非獨專於寒也六節藏象又云人太倉還出咽噎此陽火不下推而上行也故經曰少陽所至爲喉痹涌溢食不下此理豈不曉然又氣厥論云肝移寒於心爲狂腸中陽氣與寒相薄故腸食自下莫將巴豆耗却天真液燥津枯留滯不去人盲此病曾下奪之從下奪來轉虛轉痞此爲巴豆非大黃牽牛之過箕城一酒官病嘔吐踰年不愈以胃寒治之設或不行窒鹽下導始終勾引兩藥相通結散鳴消欲

憤鬱而得之者有思慮而得之者有
病飲而得之者有熱時傷冷而得之者有
于此夫憤鬱而不得伸則肝氣乘脾脾氣不化故爲留
飲肝主慮久慮而不決則飲氣不行脾主思久思而不
已則脾結故亦爲留飲人因勞役遠來乘困飲水脾胃
力衰因而嗜卧不能布散於脉亦爲留飲人飲酒過多
腸胃已滿又復增之脬經不及滲泄久久如斯亦爲留飲
因隆暑津液焦涸喜飲寒水本欲止渴乘快過多遏而
不動亦爲留飲人若病飲者豈能出此五者之外乎夫
水者陰物也但積水則生濕停酒則生燥久則成疾在
左脇者同肥氣在右脇者同息賁上入肺則多嗽下入
大腸則爲瀉入腎則爲痛水濕灌如震漿上下無所之
故在太陽則爲支飲皆由氣逆而得之故濕在上者且
黃面浮在下者股膝腫厥在中者支滿皆膈疾逆在陽
不去者久則化氣在陰不去者久則成形今之用方者
例言飲爲寒積皆用溫熱之劑以補之燥之夫寒飲在
中反以熱藥從上投之爲寒所拒水濕未除反增心火
火既不降水反下注其上焦枯其下寒慄內經曰出入
廢則神機化滅升降息則氣立孤危渠不信夫況乎留
飲下無補法氣方隔塞補則轉增豈知內經所謂留者
攻之何後人不師古之甚也且以白朮參苓飲者服之
尙加悶塞況熾鍼艾火其痞可知前人處五飲丸三十
餘味其間有礬石巴豆附子烏頭雖是下攻終同燥熱
雖亦有爽藥相參力孤無援故今代劉河間依仲景十
棗湯製二花神祐丸而加大黃牽牛新得之疾下三五
十丸氣流飲去昔有病此者數十年不愈予診之左手
脉三部皆微而小右手脉三部皆滑而大微小爲寒滑
大爲燥余以瓜蒂散湧其寒痰數升汗出如沃次以導
水禹功去腸胃中燥垢亦數升其人半愈然後以淡劑
流其餘蘊以降火之劑開其胃口不踰月而痊夫黃連
黃柏可以清上燥濕黃芪茯苓可以補下滲濕二者可
以收後不可以先驅復未盡者可以苦孛歷杏仁桑白
皮椒目逐水之藥伏水皆去矣夫治病有先後不可亂
投邪未去時慎不可補也大邪新去恐反增其氣轉甚
於未治之時也昔河內有人病飲醫者斷爲脾濕以木
香牽牛二味散之下十餘行復變丸爲散又十餘行病
夜既覺腸胃寬洞惟思粥食少許日漸愈雖同斷爲濕
但補瀉不同其差至此內經曰歲土太過雨濕流行腎
水受邪甚則飲發中滿太陽司天濕氣變物水飲內育
中滿不食註云此年太陰在泉濕勝飲發於中以此考之土主濕化不主寒水不及心氣脫治上勝
氣註云邪謂寒氣經又曰邪氣以從其合也其寒飲食
入胃從脾脈上至于肺則肺寒貽內外合邪因而
客之則爲肺飲後人見是言斷咳爲寒更不參較他篇
豈知六氣皆能嗽人若謂飲爲寒邪何以歲火太過炎
暑流行金肺受邪民病咳嗽藏水不及心氣脫治上勝
肺金飲而飲從革之紀金不及也其病嗆飲堅成之紀
金太過也上徵與正商同其病飲少陽司天火氣下臨
肺金上從飲嗆鮒少陽司天火熾所勝飲唾血煩心少
陽寒水二化本自不同其病亦異夫濕土太過則飲發
陽司天主勝則胸滿飲少陽司天之氣熱鬱於上飲逆
嘔吐三之氣炎暑至民病飲嘔終之氣陽氣不藏而飲
于中今人以爲脾土不足則軒岐千古之書可從乎不
可從乎

嗽分六氣切以寒遮二十五

嗽與咳一證也後人或以嗽爲陽飲爲陰亦無考據且
內經飲論一篇純說嗽也其中無飲字由是言之咳即
嗽也嗽即咳也陰陽應象大論云秋傷於濕冬生咳嗽
又五藏生成篇云飲嗽上氣又診要經終云春刺秋分
痓爲飲嗽又示從容篇云飲嗽煩冤者腎氣之逆也素
問惟以四處連言飲嗽其餘篇中止言咳不言嗽乃知
咳嗽一證也或言嗽爲別一證如傷寒書中說飲逆即
咽中作梯磴之聲者是也此一說非內經止以嗽爲咳
生氣通天論云秋傷於濕上逆而飲與大象論支義同
而無嗽字乃知飲即是嗽明矣余所以苦論此者孔子
曰必也正名乎嗽之爲病自古歸之肺此言固不易也
素問言肺病喘飲逆又曰飲嗽上氣厥在胸中過在手
太陰陽明靈樞十二經惟太陰肺經云肺脹滿膨膨而
喘咳他經則不言素問飲論雖言五藏六腑皆有飲要
之止以肺爲主素問言皮毛者肺之合也皮毛先受邪
氣註云邪謂寒氣經又曰邪氣以從其合也其寒飲食
入胃從脾脈上至于肺則肺寒貽內外合邪因而
客之則爲肺飲後人見是言斷咳爲寒更不參較他篇
豈知六氣皆能嗽人若謂飲爲寒邪何以歲火太過炎
暑流行金肺受邪民病咳嗽藏水不及心氣脫治上勝
肺金飲而飲從革之紀金不及也其病嗆飲堅成之紀
金太過也上徵與正商同其病飲少陽司天火氣下臨
肺金上從飲嗆鮒少陽司天火熾所勝飲唾血煩心少
陽寒水二化本自不同其病亦異夫濕土太過則飲發
陽司天主勝則胸滿飲少陽司天之氣熱鬱於上飲逆
嘔吐三之氣炎暑至民病飲嘔終之氣陽氣不藏而飲
于中今人以爲脾土不足則軒岐千古之書可從乎不
可從乎

嗽分六氣切以寒遮二十五

嗽與咳一證也後人或以嗽爲陽飲爲陰亦無考據且
內經飲論一篇純說嗽也其中無飲字由是言之咳即
嗽也嗽即咳也陰陽應象大論云秋傷於濕冬生咳嗽
煉熱內作氣動於左上行於右飲皮膚痛則入肺飲而

風淵若此之類皆生於火與熱也豈可專於寒乎謂欬止於熱與火耶厥陰司天客勝則耳鳴掉眩甚則欬若此之類乃生於風豈可專於熱與火也謂欬專於風耶太陰司天濕淫所勝欬嘔則有血太陰之復濕變乃舉欲發于中欬喘有聲若此之類乃生於濕豈可專於風也謂咳止於濕耶金鬱之發民病欬逆心脇痛歲金太過燥氣流行肝木受邪民病欬喘逆逆甚而嘔血陽明司天金火合德民病欬嗌塞陽明司天燥揺所勝欬腹中鳴陽明司天清復內餒則欬卻嗌塞心膈中熱欬不止而目血出者死陽明之勝清發于中嗌塞而欬陽明之復清氣大舉欬嚏煩心若此之類皆生于燥豈可專於濕也謂欬止於燥耶太陽司天客氣勝則胸中不利出清涕感寒則欬若此之類乃生於寒豈可專於燥也又肺風之狀多汗惡風色皏然白時欬短氣晝日則差夜暮則甚亦風欬也勞風咳則黃涕其狀如膿大如雪丸亦風咳也有所亡失所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦亦熱欬也陽明厥逆喘欬身熱亦熱欬也一陽發病少氣善欬亦火欬也喘欬者水氣并於陽明亦濕欬也風水不能正偃則欬亦濕欬也腎氣厥大脛腫喘欬身重亦濕欬也脾痺者四肢解墮發咳嘔汗上爲大寒亦寒欬也欬之六氣固然可以辨其六者之狀

熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦多有之非暑欬之云乎

火乘肺者咳喘上塵悶睡出血甚者七竅血溢非火欬之云乎

熱乘肺者氣塞不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾枯細瘡燥痒大便秘澁悶睡稠粘非燥欬之云乎

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐卧濕地或圊冷風寒毫而反白埃此六氣之變也故天久寒則治之以暑天久涼則治之以暄天久晦則治之以明天久陰則治之以雨夫天地之氣常則妄變則病而況人稟天地之氣

之嗽治以通聖散加半夏大人參半夏丸甚者汗之

之嗽治以白虎湯洗心散涼膈散抑奪一匙爲即之火

之嗽治以黃連解毒湯洗心散三黃丸猪苓湯大下之濕之嗽治以五苓散桂苓甘露散及白朮丸猪苓湯

者以三花神祐丸下之燥之嗽治以木香檳榔丸

黃連阿膠丸甚者以鹹寒大下之寒之嗽治以寧肺散有寒痰在上者以瓜蒂散越之此法雖已幾於萬全然老幼强弱虛實肥瘦不同臨時審定權衡可也

喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣

怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕云怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也

言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也

五運迭侵於其外七情交戰於其中是以聖人潛氣如持至寶庸人役物而反傷大和此軒岐所以論諸痛皆因於氣百病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也

大下之濕之嗽治以五苓散桂苓甘露散及白朮丸猪苓湯

者以三花神祐丸下之燥之嗽治以木香檳榔丸

黃連阿膠丸甚者以鹹寒大下之寒之嗽治以寧肺散有寒痰在上者以瓜蒂散越之此法雖已幾於萬全然老幼强弱虛實肥瘦不同臨時審定權衡可也

喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣

王太僕云恐則傷精却上而不下流下焦陰氣亦廻環而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也新校正云不行當作下行寒則脈瑾開氣不行故氣收矣王太僕云身涼則衛氣沉故皮膚之理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂夜不寐肺衛通汗大出故氣泄矣王太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則腠開發榮衛大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣王太僕云疲勞役則氣弁速故喘息氣弁速則陽外發故汗出內外皆越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣王太僕云繫心不散故氣亦停留此

疾則略惟論唾血及飧泄余皆不言惟靈樞論思慮悲哀喜樂愁憂盛怒恐懼而言其病其言曰知者知養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而和剛柔如是則辟邪不至而長生久視是故怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止因悲哀動中者竭絕而失生喜樂者神蕩散而不藏愁慮者閉塞而不收怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破腘脫肉毛瘁色天死於冬怒者神迷惑而不治恐懼者神傷憚而不解則傷意意傷則悅亂四肢不舉毛瘁色天死於春肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不正當人陰而舉筋兩脇不舉毛瘁色天死于秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革爪牙不相任之理治之夫怒傷肝肝屬木怒則氣并於脾而腎水受之腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前腰脊不可俛仰屈伸毛瘁色天死于季夏恐懼不解則傷精精傷則骨痿厥精時自下是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛虛則無氣無氣則死矣靈樞論神意魂魄志精所主之病然無寒暑驚勞四證余以是推而廣之怒氣所至爲噫血爲飧泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲胸痛腹痛食則氣逆而不下爲喘渴煩心爲消癉爲肥氣爲目暴盲耳暴閉筋解發于外爲淫爲狂爲笑不休爲毛髮焦爲內病爲陽氣不收甚則爲狂忘氣所至爲陰縮爲筋攣爲肌痺爲脈痿男爲數溲血女爲血崩爲酸鼻辛頻爲目昏爲少氣不足以息爲泣則臂麻恐氣所至爲破腘脫肉爲骨酸痿厥爲水爲面熱膚急爲陰痿爲懼而脫頗驚氣所至爲潮涎爲目眩爲口吐爲癡癇爲喘促爲噦血爲體痛骨痿爲肺鳴爲高骨壞爲陰痿爲唾血爲真視爲耳閉男爲少精女爲不月衰甚則潰潰乎若壞都汨乎不可止思氣所至爲不眠爲嗜臥爲噫苦爲筋痿爲白淫爲得後與氣快然如喪爲不嗜食寒氣所至爲上下所出水液澄澈清冷下利清白吐利腥穢食已不化堅痞腹滿急痛癥瘕瘕癇痓痛痙攣注下痛癰腫筋攣肉縮環跳痛不可以俛仰股膝不可以屈伸筋急而拘不可以伸外踝痛腨痠痛足跟痛不可以履膕筋急拘攣脛酸不可以久立髀不可以舉毛瘁色天死於冬憂而不解則傷意意傷則悅亂四肢不舉毛瘁色天死於夏腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前腰脊不可俛仰屈伸毛瘁色天死于季夏恐懼不解則傷精精傷則骨痿厥精時自下是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛虛則無氣無氣則死矣靈樞論神意魂魄志精所主之病然無寒暑驚勞四證余以是推而廣之怒氣所至爲噫血爲飧泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲胸痛腹痛食則氣逆而不下爲喘渴煩心爲消癉爲肥氣爲目暴盲耳暴閉筋解發于外爲淫爲狂爲笑不休爲毛髮焦爲內病爲陽氣不收甚則爲狂忘氣所至爲陰縮爲筋攣爲肌痺爲脈痿男爲數溲血女爲血崩爲酸鼻辛頻爲目昏爲少氣不足以息爲泣則臂麻恐氣所至爲破腘脫肉爲骨酸痿厥爲水爲面熱膚急爲陰痿爲懼而脫頗驚氣所至爲潮涎爲目眩爲口吐爲癡癇爲喘促爲噦血爲體痛骨痿爲肺鳴爲高骨壞爲陰痿爲唾血爲真視爲耳閉男爲少

者以清房涼榻薄衣以清劑汗之冥在內者以寒飲寒劑平之惟適可以治勞經曰勞者溫之溫謂溫存而養之今之醫者以溫爲溫之藥差之久矣岐伯曰以平爲期亦謂休息之也惟習可以治驚經曰驚者平之平謂平常也夫驚以其忽然而遇之也使習見習聞則不驚矣此九者內經自有是理庸工廢而不行今代劉祠問治五志獨得言外之意謂五志所發皆從心是故凡見喜怒悲恐思之證皆以平心爲主動便屬陽驚者駭于心心便屬火爲主至於勞者傷於動屬火二者亦以平心爲主悶身熱妄言甚則昏瞀目昧不明耳鳴或聾跳擲狂越驚悸驚駭禁慄如畏神守氣逆衝上嘔膈脹腫痛痰上氣時喝喝然有音唾嘔無血余於肝而脾土受邪木太過則肝亦自病喜則氣并於心而肺金受邪火太過則肺亦病熱火過則陽亦自病凡此七者更相爲治故悲可以勝怒恐可以解喜以散之以苦劑解毒黃連湯加木香漢防己煎服時時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣不月餘而瘥余又嘗以巫躍跋抵以治人之悲結者余又嘗以鍼下之時便雜至管笛鼓應之以治人之憂而心痛者余嘗擊拍門牖使其聲不絕以治困驚而畏響魂氣飛揚者余又嘗治一婦人久思而不眠余假解而不問婦果呵怒是夜困睡又嘗以酸棗仁丸治人多憂以白虎湯不計四時潮理人之暑余又以無憂散寫人冬月得水中之寒邪久以麻黃湯數兩作一劑煎以棗薑熱服汗出而愈如未愈者以瓜蒂散涌之以火助其汗治寒厥亦然余嘗治大暑之病諸藥無效余從其頭數刺其痛出血立愈余治此類者如拔囊然惟勞而氣耗恐而氣奪者爲難治喜者少病自瘥舒和故也昔聞山東楊先生治府主洞泄不已楊初未對病人與眾人談日月星辰雨雷風雲雹虹霓五法也冥可以治寒寒在外者以燂鍼燔炙熱湯而愈汗之寒在內者以熱食溫劑平之寒可以治冥在外者以清房涼榻薄衣以清劑汗之冥在內者以寒飲寒劑平之惟適可以治勞經曰勞者溫之溫謂溫存而養之今之醫者以溫爲溫之藥差之久矣岐伯曰以平爲期亦謂休息之也惟習可以治驚經曰驚者平之平謂平常也夫驚以其忽然而遇之也使習見習聞則不驚矣此九者內經自有是理庸工廢而不行今代劉祠問治五志獨得言外之意謂五志所發皆從心是故凡見喜怒悲恐思之證皆以平心爲主動便屬陽驚者駭于心心便屬火爲主至於勞者傷於動屬火二者亦以平心爲主悶身熱妄言甚則昏瞀目昧不明耳鳴或聾跳擲狂越驚悸驚駭禁慄如畏神守氣逆衝上嘔膈脹腫痛痰上氣時喝喝然有音唾嘔無血余於肝而脾土受邪木太過則肝亦自病喜則氣并於心而肺金受邪火太過則肺亦病熱火過則陽亦自病凡此七者更相爲治故悲可以勝怒恐可以解喜以散之以苦劑解毒黃連湯加木香漢防己煎服時時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣不月餘而瘥余又嘗以巫躍跋扈以治人之悲結者余又嘗以鍼下之時便雜至管笛鼓應之以治人之憂而心痛者余嘗擊拍門牖使其聲不絕以治困驚而畏響魂氣飛揚者余又嘗治一婦人久思而不眠余假解而不問婦果呵怒是夜困睡又嘗以酸棗仁丸治人多憂以白虎湯不計四時潮理人之暑余又以無憂散寫人冬月得水中之寒邪久以麻黃湯數兩作一劑煎以棗薑熱服汗出而愈如未愈者以瓜蒂散涌之以火助其汗治寒厥亦然余嘗治大暑之病諸藥無效余從其頭數刺其痛出血立愈余治此類者如拔囊然惟勞而氣耗恐而氣奪者爲難治喜者少病自瘥舒和故也昔聞山東楊先生治府主洞泄不已楊初未對病人與眾人談日月星辰雨雷風雲雹虹霓五法也冥可以治寒寒在外者以燂鍼燔炙熱湯而愈汗之寒在內者以熱食溫劑平之寒可以治冥在外

世不已之人先問其所好之事好墓者與之笙笛勿輟又聞莊先生者治以喜樂之極而病者莊切其脈爲之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者悲泣辭其親友曰吾不久矣莊知其將愈慰之詰其故莊引素問曰憂勝喜此二人可謂得玄關者也然華元化以怒都守而幾見殺文摯以怒齊王而竟殺之于萬人中僅得一兩人而反招暴禍若乃醫本至精至微之術不能自保果賤技也哉悲夫

三消之說當從火斷二十七

八卦之中離能煖物五行之中惟火能消物故火之爲用燔木則消而爲炭燒土則消而爲伏龍肝煉金則消而爲汁煅石則消而爲灰煮水則消而爲湯煎海則消而爲鹽乾汞則消而爲粉熬錫則消而爲丹故澤中之涼涸於炎暑鼎中之水乾於壯火蓋五臟心爲君火正化腎爲君火對化三焦爲相火正化膀爲相火對化得其平則烹煉飲食精粕去焉不得其平則燔灼臟腑而津液竭焉故入水之物無物不長入火之物無物不消夫一身之心火甚於下爲胃液之消甚於中則爲腸胃之消甚於外爲肌肉之消上甚不已則消及於脾下甚而不已則消及於肝腎外甚而不已則消及於肺中甚而不已則消及於筋骨四藏皆消盡則心始自焚而死矣故曰有消癉消中消渴風消腸消肺消之說消之證不同歸之火則一也故消癉者眾消之總名消中者善飢之通稱消渴者善飲之同謂惟風消腸消肺消此三說不可不分風消者二陽之病二陽者陽明也陽明與大腸也心受之則血不流故女子不月脾受之則味不化

故男子少精皆不能成隱曲之事火伏於內久而不已爲風所鼓消渴腸胃其狀口乾雖飲水而欠繫此風熱格拒於賁門也口者病之上源故病消渴者結謂之消此消乃腸胃之消也其善食而瘦者名曰仝消此消乃肌肉之消也隔寒者心移熱於肺傳爲腸消王太僕云心肺兩間中有斜膈膜下際內連橫膈膜故心移熱于肺久久傳化內爲腸熱消渴多飲者此雖故口燥舌乾而渴腎熱病者苦渴數飲此皆燥熱之渴也故膏粱之人多肥甘之渴石藥之渴藜藿奔走之人水行凌火火氣鬱故然少陰之復渴而欲飲少陽之復渴而欲飲陽絡經橋渴引水漿色變黃赤又傷寒五日少陰受之斗亦不能也其渴也其狀多飲而數溲或不數溲變爲水歷者皆是也此消乃腸膜之消也肺肺主氣經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾之精氣上歸于肺通調水道下輸膀胱水經四布五經並行以爲常也靈樞亦曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆仝在中者消數善饑火在上中者善渴多飲而數溲火在中上者不渴而溲白液火鬱上中下者飲多而數溲此非也何哉以八味丸治渴水未能生而火反助也此等心爲陽火先受陽邪陽火內鬱火鬱內傷肺仝肺金受心火之邪然止是腸消未及于肺也故火在上者善渴本不知書妄引王太僕之注益水之源以消陰翳壯火之主以制陽光但益心之陽寒熱通行強腎之陰熱與寒邪皆來乘肺肺外爲寒所薄陽氣自潰于中故不可治此消乃消及於肺臟者也又若脾風傳之腎名曰蠱王太僕云消爍肌肉如重之狀日漸損削此消乃膏液之消也故後人論三焦指以爲腎消此猶可治久則變爲不救丸大人參散碧玉雞蘇散數法以調之故治消渴最爲必死此消乃消及於腎臟者也夫消者得體昔有消渴者日飲數升先生以生薑自然汁一盞入蜜半盞和勻與之以火可平今代劉河間自製神芎丸以黃芩味苦寒入心辜牛大黃驅火氣而下以滑石引入腎經此方以犀牛滑石爲君以大黃黃芩爲臣以芎連薄荷爲使將之以人參白朮渴消猪苓湯入坎眞得黃庭之秘旨也而又

瘡瘍膿血流漓而殘此眞俗言也故巴郡太守淒三蟲丸能治消渴余嘗以治數年不愈者減去朴硝加黃連一斤大作劑以長流千里水煎五七沸放冷日呷之數百次以桂苓甘露散白虎湯生藕節汁淡竹瀝生地黃汁相間服之大作劑料以伐飲水不日而痊故消渴一證調之而不下則小溲小濡固不能殺炎上之勢下之而不調欲旋飲旋消終不能沃腸膜之乾下之調之而不減滋味不戒嗜慾不節喜怒病已而復作就從此三者消渴亦不足憂矣況靈樞又說心脈滑為善渴經又曰滑者陽氣勝又言五臟脈心脈微小為消癉又言五臟脫為消癉又言消癉之人薄皮膚而肉堅則以深長衝直揚其心剛強者多怒怒則氣逆上胸中奮積血氣逆流膚皮充肌肉脈不行轉而為熱熱則消肌膚故為消癉又言五臟皆柔弱者善病消癉夫柔弱者必有剛強者多怒柔弱者易傷也余以是逆悟氣逆之人非徒病消渴若寒薄其外亦為癰癰少氣狂腸中肺消涌水者熱客其臟則亦為驚悶腸消柔瘕虛腸澼熱蓄其腑則為癰瘍血口糜虛痠為沈食休辛類貧耗目盡此二十一證皆在氣厥論中經曰諸逆衝上皆屬於火二言可了善讀書者以是求之

虰蠹之生濕熱為主說二十八

巢氏之衍九虰三蠹詳矣然虰之變不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰也曰伏蛇白肉肺胃弱赤蟘伏虰長四分羣虰之主也蛇虰長一尺亦有長五六寸其發動則腹中痛發種聚行往來上下痛有休息亦攻心痛口喜吐涎及吐清水貫傷心則死診其脈腹中痛其脈法當沉弱今脈反洪大是蛇虰也白虰長一寸相生子孫輒多長四五尺赤能殺人寸白虰色白頭偏小因飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生粟所成久云食生魚後即飲乳酪亦生其發動則指人痛氣腰脚疼此虰長一尺則令人死肉蟲狀如爛杏令人煩滿肺蟲狀如蠶令人咳嗽鬲蟲狀如瓜瓣又名吞虰令如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦弱虰狀如生肉動則腹鳴蟘虰至微形如茶虰居肚腸中多則為痔搖則為癰因以瘡處以生癰疽癬疥蟲之變此不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰三蠹詳矣然虰之變不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰也曰伏蛇白肉肺胃弱赤蟘伏虰長四分羣虰之主也蛇虰長一尺亦有長五六寸其發動則腹中痛發種聚行往來上下痛有休息亦攻心痛口喜吐涎及吐清水貫傷心則死診其脈腹中痛其脈法當沉弱今脈反洪大是蛇虰也白虰長一寸相生子孫輒多長四五尺赤能殺人寸白虰色白頭偏小因飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生粟所成久云食生魚後即飲乳酪亦生其發動則指人痛氣腰脚疼此虰長一尺則令人死肉蟲狀如爛杏令人煩滿肺蟲狀如蠶令人咳嗽鬲蟲狀如瓜瓣又名吞虰令如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦弱虰狀如生肉動則腹鳴蟘虰至微形如茶虰居肚腸中多則為痔搖則為癰因以瘡處以生癰疽癬疥蟲之變此不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰三蠹詳矣然虰之變不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰也曰伏蛇白肉肺胃弱赤蟘伏虰長四分羣虰之主也蛇虰長一尺亦有長五六寸其發動則腹中痛發種聚行往來上下痛有休息亦攻心痛口喜吐涎及吐清水貫傷心則死診其脈腹中痛其脈法當沉弱今脈反洪大是蛇虰也白虰長一寸相生子孫輒多長四五尺赤能殺人寸白虰色白頭偏小因飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生粟所成久云食生魚後即飲乳酪亦生其發動則指人痛氣腰脚疼此虰長一尺則令人死肉蟲狀如爛杏令人煩滿肺蟲狀如蠶令人咳嗽鬲蟲狀如瓜瓣又名吞虰令如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦弱虰狀如生肉動則腹鳴蟘虰至微形如茶虰居肚腸中多則為痔搖則為癰因以瘡處以生癰疽癬疥蟲之變此不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰三蠹詳矣然虰之變不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生其巢氏之衍九虰也曰伏蛇白肉肺胃弱赤蟘伏虰長四分羣虰之主也蛇虰長一尺亦有長五六寸其發動則腹中痛發種聚行往來上下痛有休息亦攻心痛口喜吐涎及吐清水貫傷心則死診其脈腹中痛其脈法當沉弱今脈反洪大是蛇虰也白虰長一寸相生子孫輒多長四五尺赤能殺人寸白虰色白頭偏小因飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生粟所成久云食生魚後即飲乳酪亦生其發動則指人痛氣腰脚疼此虰長一尺則令人死肉蟲狀如爛杏令人煩滿肺蟲狀如蠶令人咳嗽鬲蟲狀如瓜瓣又名吞虰令如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦弱虰狀如生肉動則腹鳴蟘虰至微形如茶虰居肚腸中多則為痔搖則為癰因以瘡處以生癰疽癬疥蟲之變此不可勝窮要之皆以濕熱為主不可純歸于氣虛與食生

行飛走故五氣五味根于中五色五類形于外而有一歲之中互有勝復故厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成居泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲耗羽蟲不育太陰司天倮蟲不育陽明司天介蟲靜毛蟲育介蟲耗毛蟲不育太陽司天羽蟲靜介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天介蟲靜羽蟲育倮蟲不成居泉介蟲育毛蟲耗倮蟲不育如風勝則于陸為濕土相剋水長則反增水鱗雖偶然見于陸則反嘗死故不同也執巢氏言脾胃虛而為水濕所乘者非也乃脾胃大甚熱為水濕多也以玄珠考之蟲得水之氣乃生得雨之氣乃化以知非厥陰風木之氣不生非太陰濕土之氣不成豈非風木主熱雨澤主濕所致耶故五行之中皆有蟲惟金之中其蟲算氷之中無蟲且諸木有蠹諸果有螟諸菜有蟲諸菽有蟘諸穀有螟腯蠹賊麥朽蛾穬粟破蟲出草腐而螢蚊糞稻而蝤蛴若此者皆木之蟲也烈火之中有鼠燔灰之中有蠅若此者皆火之蟲也土中盤蛇坯中走蜥穴蟻墻蝸田螺崖蠍若此者皆土之蟲也科蚪孕於古池蛭馬躍于荒湫魚滿江湖蛟龍藏海若此者皆水中之蟲也昔有治者碎一破釜將入火爐其鐵斷處竅曰中有一蟲如米中蟲其色正赤此釜烹飪不啻千萬不知何以生了不可曉亦金火之氣也惟水之中未嘗見蟲焉北方雖有氷鼠止是食氷非生于氷也乃知木火屬春夏濕土屬季夏水從土化故多蟲金從秋氣氷從冬氣故無蟲焉若以生物有被麴有麴蟲醬有醬蟲醋有醋蟲飲食俾

久皆有蟲若以爲動物不生蟲如戶樞不蠹之類然動勞之人亦有蟲豈有不動者耶且文籍衣服故不開不衣而不蠹然非經季夏陰生或暴乾不待冷納于笥中亦不生蟲蠹也或瓮傍地濕鼠婦來明墻下壞乾狗矢居中豈均生于濕耶蓋蛩雖不生于濕亦有生于冬蟄則蟲生寒則不生理胡然也夫蟲之所居必于脾胃深處藥之所過在于中流蟲聞藥氣而避之輩者安得取之予之法先令饑甚次以檳榔雷丸爲引子別下蟲藥大下十數行可以埽而空濕上張子政用此法下蟲數百相啣長丈餘若夫瘧久而蟲蛔者以木香檳榔散傳之神良別有墜蛔之藥皆具方中此不具陳也

補論二十九

予幼歲留心于醫而未嘗見其達者眞祐聞自沃來何之南至頓丘而從遊張君仲傑之縣舍得過太醫張子和先生譚仲傑以醫而及於治公君寶暨不肖猗歟大哉先生之學明妙道之淵源造化之根本講五運之抑揚發越六氣之勝復經摯定以所制之法配以所宜之方準繩既陳曲直自正規矩既設方圓自成先生之學其學者之準繩規矩歟雖爲人天師可也望而知之以盡其神聞而知之以盡其聖問而知之以盡其工切而知之以盡其巧何假飲上池之水而照見人五臟乎一目而無餘矣至約之法其治有三所用之藥其品六則汗下吐其治三則汗下吐其品六則辛甘酸苦鹹淡也雖不云補理實寓焉予恐人之哉于補而莫之解故續補說於先生汗下吐三論之後我輩所當觀而人之所當共知也予考諸經檢諸方試爲天下好補者言之夫人之好補則有無病而補者有有病而補者無病而補者誰與上而繒神之流次而豪富之子有金玉以粱其身務參以悅其口寒則衣裘暑則臺榭動則車馬止則裀褥味則五辛飲則長夜醉飽之餘無所用心而應致力于牀第以欲竭其精以耗散其眞故年半百而煩產得熱而血愈崩蓋如是而死者八九生者一二死者枉生者幸幸而一生憔悴之態人之所不堪也視其寒用熱以補之矣若言其補則前所補者此病何如予請爲言補之法大抵有餘者損之不足者補之是則補之義也陽有餘而陰不足則當損陽而補陰陰有餘而陽不足則當損陰而補陽熱則芒硝大黃損陽而補陰也寒則乾薑附子損陰而補陽也豈可以熱藥而云補乎哉而寒藥亦有補之義也經曰因其盛而減之因其衰而彰之此之謂也或曰形不足者温之以氣精不足者補之以味執此温補二字便爲温補之藥且温二字特爲形精不足而設豈爲病不病而設哉雖曰温之止言其氣雖曰補之止言其味曷嘗言其熱藥哉至於天之邪氣感則害人五臟實而不滿可下而已水穀之寒熱感則害人六腑滿而不實可吐而已然地之濕氣感則害人皮肉筋脈邪從外入可汗而已然發表不遠熱而無補之意人之所稟有強有弱而病病而愈愈而後病而愈愈而後必能復其舊矣弱而窺病之極傳而之六腑六腑之極傳而之五臟五臟之極傳而之三焦則百病交至萬疾俱生小不足言大則可慨不痊則中不中則暴痛而死矣以爲無病而補之者所得也且如有病而補之者誰歟上而仕宦豪富之家微而販商市肆之輩喘嗽而補欬而補勞而補產而補泄而補痢而補癉而補瘧而補痛而補瘡而補癰而補疽而補癬而補瘕而補癖而補癥而補瘤而補瘿而補瘰而補癭而補癘而補癩而補癎而補癇而補癲而補狂而補鬱而補痿而補厥而補痺而補腫而補脹而補滿而補喘而補嘔而補吐

問造化之理本草藥性之源一切委之於庸醫之手醫者曰寒涼之藥雖可去疾奈何腑臟不可使之久冷脾胃不可使之久寒保養則固可溫補之是宜斯言方脫諸口已深信於心矣如金石之不可變山嶽之不可移以致於殺身而心無少悔嗚呼醫者之罪固不容誅而用之者亦當分受其責也病者之不悔不足怪也而家若是何難見而難察耶人惟不學故耳亦有達者之論以素問爲規矩準繩以本草爲斤斧狀則矣其藥則寒涼其劑則兩其丸則百人之閱者如享美饌而見蜘蛛惟恐去之不亟也何暇而房見者丘垤及見泰山則必駭不至唾而遠則幸矣尚敢冀其言之能從乎茲正之所以難立而邪之所以易行也吾實憂之且天下之不知過不在天下而已在醫流尚不知何責於天下哉噫春秋之法賞賢不責愚所謂我輩者猶且棄道學之本源而拘言語之末節以文章自富以誇辨自強坐而昂昂立而行行濁其步翼其手自以爲高人而出塵表以天下聰明莫已若也一旦疾之臨身暗然無所知乾若持風之不可得迷若捕影之不可獲至於不得已則聽庸醫之裁判疾之危則以爲得人不危則以爲疾之既極無可奈何委之於命而甘於泉下矣嗚呼實與殺夫殆去不遠此吾所以言之嘆嘆也然而未敢必其輩之何如耳雖然吾之說非止欲我輩共知欲天下共知也我輩共知醫流共知天下共知愜吾之意滿吾所望矣

水解三十

余昔訪靈臺問太史見銅壺之漏水焉太史召司水者曰此水已三環週水滑則漏迅漏迅則刻差當易新水

余豁然而悟曰天下之水用之減火則同濡槁則同至於性從地變質與物遷未嘗固焉故蜀江濯錦則鮮潔源京楮則湍南陽之酒潮于菊其人多壽遼東之粳通于夜其人多髮晉之山產礬石泉可愈瘡戎之蓑伏硫黃場可浴瘧楊子宜莽淮柔宜醪滄鹵能鹽阿井能膠操垢以污茂田以苦癭消于藻帶之波痰破于半夏之渤水水咽而蓄氣息流水飲而癰閭通雪水洗目而赤退臧水濯肌而瘍乾菜之以爲蘆鍼之以爲漿麴之以爲醯之以爲醬不容盡至千井之水一也尚數名焉況其他者乎及酌而傾曰倒流出餐未放曰無根無時初出曰新汲將旦首汲曰井華夫一井之水而功用不同豈烹煮之問將行藥勢獨不擇天水哉昔有患小溲閉者眾工不能瘥予易以長川之急流取前藥而沸之一飲立瀉元曦聞之曰精乎哉論也近諸鑒稽經有半夏湯治不瞑以流水千里外者八升揚之萬遍取其清五升炊以葦末火正與此論合乃知予和之於醫觸一事一物皆成治法如張長史草書妙天下得之公孫劒器用心亦勞矣後之用水者當以予和之言爲制余于是乎作水解

儒門事親卷四

金　考城張從政著

風一

夫風者厥陰風木之主也諸風掉眩風熱燥風厥逆潮不利半身不遂失音不語留飲痰涎胸膈痞滿仆倒小兒驚悸狂妄胃脘當心而痛上支兩脇兩脇不通偏正頭痛百風抹風手足瘈急肝木爲病入氣在頭

防風通聖散　防風天麻湯　防風湯

祛風丸　排風湯　小續命湯

消風散

暑二

夫暑者爲少陰君火之主也諸痛痒瘡瘍瘧疽腫毒及胃煩熱嗌乾欬喘嘔血泄血腑臟前陰內痛心痛脇腹脹滿悶風溫病多發風傷于榮溫傷於衛血爲榮氣爲衛其脉兩手多沉自汗出身重多睡鼻鼾三日以裏且宜辛涼解之或辛溫解之如不已裏症未罷大不可下如下則胃中虛空四日之外表熱入裏則諸語口乾發疹潮熱直視失溲者十死八九喉金爲病人氣在胸及小兒痘疹丹熛腫發人氣在腹

白虎湯　桂苓甘露散　化癍玉壺丸

益元散　石膏散

濕三

夫濕者爲太陰濕土之主也諸濕腫滿霍亂泄注腑腫骨痛及腰膝頭項痛風痺痿厥嘔有血心懸如飢熱痛始作三陽受之一日太陽二日陽明三日少陽可汗而已如四日太陽五日少陰六日厥陰可下而已或七日不愈再傳至十三日大邪皆去六經悉和則愈矣腎水爲病

五苓散　茯苓澤瀉木香散

益元散　大橘皮湯

神助散

火四

夫火者少陽相火之主也諸暴外發熱惡寒痛病大作傳爲水腫面黃身瘦泄注膿血赤白爲利雍腫疽瘍瘡疹小兒疳瀉腹脹暴下如水心胸中熱甚則躁鬱煩悶口次用少半亦稍熱投之便用葱醋酸辣湯投之衣被蓋覆汗出則愈矣如過世亂內經曰歲火太過炎暑流行火氣太盛肺金受邪上應熒惑大而明現若用辛涼之劑解之則萬舉萬全也若過治世人方可用升麻葛根湯敗毒散辛溫之劑解之亦加葱根白豆豉上通而表汗內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗發揚寒熱之邪既吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復作也

凡甲青心火爲病

葛附湯　四逆湯

术附湯　大已寒丸

解利傷寒七

入目風時氣溫病傷寒三日以裏頭痛身熱惡寒可用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生蔥十餘莖豆豉一撮同煎三五沸去滓稍熱先以多半投之良久用釵子於咽嗌中探引吐了不宜撤口次用少半亦稍熱投之便用葱醋酸辣湯投之衣被蓋覆汗出則愈矣如過世亂內經曰歲火太過炎暑流行火氣太盛肺金受邪上應熒惑大而明現若用辛涼之劑解之則萬舉萬全也若過治世人方可用升麻葛根湯敗毒散辛溫之劑解之亦加葱根白豆豉上通而表汗內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗發揚寒熱之邪既吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復作也

又一法或於無藥之處可用酸鹽汁一大椀煎三五沸去菜葉猛服訖少間用釵子咽嗌中探引吐了如此三次後煎葱醋酸辣湯投之以衣被蓋覆汗出則解內經曰酸苦涌泄爲陰涌者吐也傷寒三日頭痛身熱是病在上也在上者固宜涌之然後以淡漿粥養之一二日則愈矣

又一法可用不卧散解之於兩鼻內嗜之連嗜三二十次以衣被蓋覆用此藥時當於暖室中嗜罷以酸辣漿粥投之汗出如洗嗜噴者同吐法也此法可與雙解散爲表裏也

又有導引一法可於一閑處用之先教病人盤腳而坐

儒門事親　二　二　二

次用兩手交十指鞭腦後風池風府二穴乃是風門也向前叩首幾至于地如此連數一百二十數愈以葱醋粥辛辣湯投之汗出立解

傷寒溫疫時氣胃風中暑俱四時不正之氣也人若初感之皆頭痛惡寒身熱及寒熱往來腰脊強是太陽經受之也內經曰可先治內而後治外先用生薑葱白豆豉煎雙解散上涌及汗出則解如不解者至五六日或不大便喘滿譫語實熱而手脉沉可用調胃大小承氣湯下之愼不可用銀粉巴豆霜杏仁芫花熱藥下之則必死此先治外而後治內也如大汗之後愼不可食葵蕎菜羊猪雞大魚兔等肉惟不先明必致重困後必難治也傷寒七八日發黃有斑潮熱腹滿者或痰實作止雖諸承氣湯下過者神景曰寸口脉浮滑者可用雜病寸口脉沉滑者可吐之然傷寒寸口脉浮滑者可用雜病寸口脉沉者可吐叔和云寸脉沉兮胸有痰歟亥子曰上盛不已吐而奪之是也

風八

夫中風失音閉亂喎斜口眼內經曰風之為病善行而數變故百病皆生於風也可用三聖散吐之如不省人事牙關緊閉藥不能下者煎三聖散鼻內灌之吐出涎口自開也次服通聖散涼膈散大人參半夏丸桂苓甘露散等大忌雞猪魚兔酒醋蕎麵動風引痰之物吐痰之法在方論中

痛十二

頭風眩運手足時復麻痺胃脘發痛心腹滿悶按之如水聲可用獨聖散吐之吐訖可服辛涼清上之藥仲景曰此寒痰結於胸中之致然也

夫大人小兒風寒濕三氣合而為痺及手足痛木不仁者可用鬱金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之泄訖以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳沒行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

痰十

夫男女年少面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎嗽不止或喘滿面浮此名曰肺痿可用獨聖散吐之吐訖次用人參柴胡飲子加當歸桂苓甘露散服之頗內經曰男女之病皆同也男子精不足者溫之以氣也女子血不流是氣不用也又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味是也

厥十一

夫厥之為病手足及膝下或寒或熱也雖世傳為腳氣寒濕之病豈知內經中本無腳氣陽氣衰于下則為寒厥陰氣衰于上則為熱厥為手足熱寒厥為手足寒也陽經起于足心之下陽氣厥則足下熱陰氣勝則足下寒熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以涼劑清心火則愈矣若尸厥痰厥風厥氣厥酒厥可以涌而醒之服降火益水和血通氣之藥使穀食調養無不痊者若其餘諸厥倣此行之愼勿當疑似之間便作風氣相去遠矣

痫十二

夫癇病不毛於目證如愚者用三聖散投之更用大益甘露散五苓散益元散或以長流水煎還放冷服則愈愼不可服用醫藥殼乾薑草蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

痫利十五

夫病痫利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀出可用導水丸禹功散瀉訖一二日可服胃風湯不愈則又可與桂枝麻黃湯發汗則愈矣內經曰久風入中為腸澼殊泄啟玄子云風在腸中上藥於胃所食不化而由又云殘泄者是暮食不化也又經云春傷於風夏必

夫富貴肴粱之人病瘧或間日或頻日或作熱或作寒者可用鬱金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之泄訖或多寒少熱或多熱少寒宜以大柴胡湯下之下過三日以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳沒行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

瘧十

夫男女年少面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎嗽不止或喘滿面浮此名曰肺瘧可用獨聖散吐之吐訖以長流水煎五苓散服之或服小柴胡湯數服亦可如不愈復以常山散吐之後服涼膈散白虎湯之類必愈矣大忌熱麵及羊肉雞猪魚兔等物如食之瘧疾復作以至不救

瘧十一

夫瘧之為病手足及膝下或寒或熱也雖世傳為腳氣寒濕之病豈知內經中本無腳氣陽氣衰于下則為寒厥陰氣衰于上則為熱厥為手足熱寒厥為手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣厥則足下熱陰氣勝則足下寒熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火則愈矣若尸厥痰厥風厥氣厥酒厥可以涌而醒之服降火益水和血通氣之藥使穀食調養無不痊者若其餘諸厥倣此行之愼勿當疑似之間便作風氣相去遠矣

瘧十二

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也注下者水利也火運太過之病火注暴逆之故也急宜用水調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎還放冷服則愈愼不可服用醫藥殼乾薑草蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

泄痢十四

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也注下者水利也火運太過之病火注暴逆之故也急宜用水調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎還放冷服則愈愼不可服用醫藥殼乾薑草蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

痢利十五

夫病痢利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀出可用導水丸禹功散瀉訖一二日可服胃風湯不愈則又可與桂枝麻黃湯發汗則愈矣內經曰久風入中為腸澼殊泄啟玄子云風在腸中上藥於胃所食不化而由又云殘泄者是暮食不化也又經云春傷於風夏必

施泄故可汗而愈內經曰風隨汗出痛隨利減若服豆蔻巢殼之類久而不輟則變爲水腫以成不救也

臟毒下血十六

夫臟毒下血可用調胃承氣湯加當歸瀉訖次用芍藥槐皮丸黃連解毒湯五苓散益元各停調下五七錢服之內經曰腸癖便血何如答曰澼者腸間積水也身熱則死寒則生熱爲血氣敗故死寒爲榮氣在則生七日而死老死於火之成數也

下利膿血十七

夫下利膿血腹痛不止可用調胃承氣湯加生薑棗煎更下藏用七八十丸量虛實加減瀉訖次用長流水調五苓散五七錢或加燈心煎調下亦得調益元散五七錢亦可大忌油膩一切熱物則愈矣

水泄不止十八

夫男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附峻熱之劑遂令三焦閉澁水道不行水滿皮膚身體否腫面黃腹大小便赤澁兩足按之陷而復起內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒涼宜於暖室不透風處用火一盆以藉火力出汗次以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法齊行既汗下吐訖腑臟空虛宜以淡漿粥養腸胃二三日次服五苓散益元同煎燈心湯調下如勢未盡更宜服神助散舊名葶藶散可以流濕潤燥分陰陽利小便不利小便非其法也既平之後宜大將息忌魚鹽酒肉果實房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

痔漏腫痛十九

夫痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脈橫解腸澼爲痔痛而不愈變而爲漏同治濕法而治之可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更加以葵羹菠菜豬羊血等通利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物勿食之致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸治之

霍亂吐瀉二十

夫霍亂吐瀉不止者可用五苓散益元散各停冰水調下五七錢如無冰水可用新汲水調下桂苓甘露散亦可露散清涼飲子調下五七錢或香薷湯調下五七盞亦可地漿者可於淨地掘一井子用新汲水一桶並於井子攪令渾候澄清運飲三五盞立愈大忌白术湯薑桂烏附種種燥熱之藥若服之則必死矣巢氏云靈者掘霍而成疾亂者陰陽亂也皆由陰陽清濁二氣相干故也

大便澁滯二十一

夫老人久病大便澁滯不通者可服神功丸麻仁丸四生丸則愈矣時復服葵菜菠菜豬羊血自然通利也內經云以滑養竅是也此病不愈令人失明也

五種淋瀝二十二

夫大人小兒病沙石淋及五種淋瀝閉癃并膀胱痛益元散主之以長流水調下八正散石葦散依方服用此三藥皆可加減服之

酒食不消散二十三

夫一切冷食不消宿酒不散亦同傷寒身熱惡寒戰慄頭項痛腰脊強及兩手脈沉不可用雙解止可用導飲散輕瀉三兩行後服柴胡飲子桂苓甘露散搜風九白术調中湯木香檳榔丸人參犀角散之類量虛實選而用之如略血吐血便血此乃亡血也並不宜吐吐之則神昏內經曰血者人之神也故亡血則不宜吐慎不可服峻熱薑附之藥若服之則飲食難進肌肉消削轉成危篤也五勞之病乃今人不明發表攻裏之過也大忌暑月於手腕足外踝上着灸手腕者陽池穴也此穴首推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒檳進食丸此藥皆犯巴豆有熱毒之故也

酒食所傷二十四

夫嗜欲之人起居開遂奉養過度酒食所傷以致中脘而不愈變而爲漏同治濕法而治之可先用導飲丸以治之夫物盡功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更加以葵羹菠菜豬羊血等通利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物勿食之之人飲食粗糲衣服藥薄勞役動作一切酒食所傷以致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸治之

沉積水氣二十五

夫一切沉積水氣兩脇刺痛中滿不能食頭目眩者可用茶調散輕涌訖冷澁一二升次服七宣丸則愈矣木香檳榔丸導飲丸亦妙不可用巴豆銀粉等藥

諸積不化二十六

夫諸積不化可服無憂散每月瀉三五次可用桂苓白术九散妙功九大忌生硬粘滑動風發熱等物

骨蒸熱勞二十七

夫男子婦人骨蒸熱勞皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼痛面赤唇乾煩燥睡卧不寧或時喘嗽飲食少味困弱無力虛汗黃瘦等疾內經曰男子因精不足而成女子因血不流而得也可先以茶調散輕痛訖次以導水禹功散輕瀉三兩行後服柴胡飲子桂苓甘露散搜風九白术調中湯木香檳榔丸人參犀角散之類量虛實選而用之如略血吐血便血此乃亡血也並不宜吐吐之則神昏內經曰血者人之神也故亡血則不宜吐慎不可服峻熱薑附之藥若服之則飲食難進肌肉消削轉成危篤也五勞之病乃今人不明發表攻裏之過也大忌暑月於手腕足外踝上着灸手腕者陽池穴也此穴首推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒檳進食丸治之灸三里等穴或有灸數十者及以燔針終無一効病人反

受苦可不思之勞疾多饑所思之物但可食者宜食蔗本草而與之菠菜葵羹冰水涼物慎不可禁以水穀入胃脉道乃行也若過忌慎則胃口閉胃口閉則形必瘦形瘦脉空乃死之候也諸勞皆可倣此

虛損二十八

夫病人多日虛損無力補之以無比山藥丸則愈矣

上喘中滿二十九

夫上喘中滿醋心腹脹時時作聲否氣上下不能宣暢叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之吐訖更以利腸丸瀉之使氣下行其喘滿自愈或取生藕汁頓服之亦愈

實用導水禹功輕瀉三五行不愈更以利腸丸瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五苓散益元散桂苓甘露散三和散分陰陽利水道之藥則愈

一切涎嗽三十

夫富貴之人一切涎嗽是飲食厚味熱痰之致然也先用獨聖散吐之吐訖可服人參散通聖散加半夏以此止嗽更服大人參半夏丸以之化痰也大忌酸鹹油膩生硬熱物也

咳嗽三十一

夫貧難之人咳嗽內外感風冷寒濕之致然也內經曰秋傷於濕冬生咳嗽可服寧神散寧肺散加白朮之類則愈矣忌法同前

欬逆三十二

夫男子婦人欬逆俗呼曰忆忒乃陰陽不和也乃傷寒亦有欬逆者並可用既濟散治之忌寒熱物宜食溫淡物以養胃氣耳

風痰三十三

夫風痰酒痰或熱在膈上頭目不清涕唾稠粘或欬嗽

上喘時發潮熱可用獨聖散吐之吐訖可服搜風丸凌腸散之類內經曰蒸濕鬱熇是也

咯血衄血嗽血三十四

夫男子婦人咯血衄血嗽血欬膿血可服三黃丸黃連解毒湯涼膈散加桔梗當歸大黃煎劑料時時呷之內經曰治心肺之病最近藥劑不厭頻而少時時呷之者是也

消渴三十五

夫三消渴內經曰三消渴者肺消膈消風消也右以綠豆煮麵湯澄清頓服之則愈或取生藕汁頓服之亦愈矣

雷頭三十六

夫雷頭懶子乃俗之謬名也此病是胸中有寒痰多沐之致然也可以茶調散吐之吐訖冷痰三二升次用神芎丸四物湯之類內經曰暴病皆屬火也又曰治病先治其本標者赤腫也本者火熱也以草蒸鼻中出血最妙

目腫三十九

夫目暴赤腫痛不能開者以隔金散鼻內嚏之鼻內出血更捷

病目經年四十

夫病赤目經年不愈者是頭風所加日令入頭痛可用獨聖散八正散之類赤目腫作是足厥陰肝經有熱利小便能去肝經風熱也

風衝泣下四十一

夫風衝泣下者俗呼風冷淚者是也內經曰太陽經不禁固也又曰熱則五液皆出肝熱故淚出風衝於外火發於內風火相搏由此而泣下也治之以貝母一枚白朮者胡椒七粒不犯銅鐵研細臨卧點之愈

風蛀牙疼四十二

夫風蛀牙疼久不愈者用針捅巴豆一枚於燈焰上燎煙未及枯存性於牙窩根盤上薰之則愈

口瘡四十三

夫大人小兒瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈貼鉛白霜散則愈

喉閉四十四

夫男子婦人喉閉腫痛不能言先刺兩手大拇指去爪甲如韭葉是少商穴少商是肺金之井穴也以排針刺血出立愈如不愈以溫白湯口中含漱是以熱導熱也

夫癭瘤腫悶積欝夜養生論云頭居險而癭水土之使然也可用人參化癭丹服之則消也又以海帶海藻昆布三味皆海中之物但得二味投之於水盆中常食亦可消矣

背疽四十六

夫背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臟腑一二十行以鈹針於腫痛處亂刺血出如此者三後以陽起石散傅之不可便服內托散內犯官桂更用酒煎男子以背爲陽更以熱投熱無乃太熱乎如瘡少愈或口瘡未合瘡痂未斂風痒時作可服內托散以辟風邪耳

癭癋四十七

夫人頭目有瘡腫癭癋及胸膈脇肋之間或有瘡痂腫核不消及有膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀煎放溫作三五次頓服訖候不多時於咽喉中探引吐涎二三升後服和血通經之藥如玉燭散四物湯之類是也內經曰酸味涌泄爲陰涌者吐也瀉者泄也銅人曰少陽起于目銳背行耳後下脇肋過期門瘿癋結核馬刀挾癭是少陽厥經多氣少血之病也

便癰四十八

夫便癰者乃男子之疝也俗呼爲便癰言於不便處害一癰故名便癰也便癰者謬名也難素所不載也然厥陰肝之經絡是氣血行流之道路也衝任督脈亦肝經之傍絡也難經曰男子有七疝是也治之以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之同瘕立不散而治大作劑料峻瀉一二十行次以玉燭散和氣血通經絡之類則是也世之多用大黃牡蠣而已閒有不愈者是不知和血通經之道也

惡瘡四十九

夫一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈

下疳五十

夫下疳久不愈者俗呼曰腺疳是也先以導水禹功先瀉肝經外以木香散傅之日上三兩度然後服換骨二日則止

儒門事親卷四

瘡癤腫五十一

夫大人瘡癤小兒赤癤腫發之時疼痛不止內經曰夫諸痛痒瘡瘍皆生於心火可用一呪法禁之法者是心呪曰

龍鬼流分諸毒腫　癰瘡膿血甚被痛
急心稱念大悲呪　三唾毒腫隨手消

右一氣念呪三遍辰日月燈火取氣一口吹在瘡腫丹瘡之上右手在瘡上虛收虛撮三次左手不動每一氣念三遍虛收虛撮三次百無禁忌如用之時心正爲是此法得於祖母韓氏相傳一百餘年用之救人百發百中若不食葷酒之人其法更靈病瘡腫者大忌雞猪魚覺發熱動風之物此法不得輕侮無藥處可用之

瘡腫丹毒五十二

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止又有一法面北端想北海雪浪滔天冰山無際大寒嚴冷之氣取此氣一口吹在瘡腫處立止用法之人大忌五辛之菜五厭之肉所病之人切忌雞猪魚覺酒醋濕麵等物無藥之處可用此法救之

凍瘡五十三

夫凍病者因寒月行於冰雪中而得之有經年不愈用陂野中淨土曝乾以大蒜搗如泥和土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小而貼之泥餅子上以火艾炙之不計艾壯多少以泥乾爲度去乾餅以換濕餅貼定炙之不問炙數多少有炙一二日者直至瘡痂內覺痒微痛是凍瘡活也然後不令藥水澄清用雞翎一二十莖

縛作橛子於瘡口上洗淨以此水洗之後肌膚損痛也用軟帛拭乾次用木香檳榔散傳之夏月發之大妙

金瘡五十四

夫一切刀箭所傷有刀箭藥用風化石灰一斤龍骨四兩二味為細末先於端四日採下剌蒯菜於端午日五更合杵日內搗和得所圓作餅子若酒麴中心穿眼繩於背陰處陰乾搗羅為細末於瘡口上摻貼亦治瘡外腫并諸瘡腫大効

又有呪法　呪曰

今日不祥　正被物傷　一禁不疼

二禁不痛　三禁不膿不作血

急急如律令奉勅攝

右每念一遍以右手收一遍收在左手中如此七遍則放手吹去却望太陽取氣一口吹在所傷處如此三次則問望北斗取氣亦得所傷之人大忌雞猪魚兔酒醋熱麵動風之物如食之則瘡必發

又一法　默想東方日出始取氣一口日出一半取氣一口日大圓滿取氣一口吹在所傷之處如此七遍則止用法之人並無所忌所傷之人禁忌同前可於無藥之處用之

誤吞銅鐵五十五

夫誤吞銅鐵以至羸瘦者宜用肥猪肉與葵菜羹同殖數頓則銅鐵自然下也神驗如不食葷腥者宜以調胃承氣湯大作其劑下之亦可也

魚刺麥芒五十六

夫魚刺麥芒一切竹木鐵刺咽喉及鬚髮惹伴在咽喘中不能下者內經曰不因氣動而病生於外可用道藏經一呪法治之

呪曰　吾請老君東流順　老君來物攝攝

攝法每水吾託大帝尊不到稱吾者各各現帝身急急如律令奉勅攝一氣念遍又以左手捏卯文作金鎗印左手三山印印上坐淨水一盞右手在下右手在上左手象地右手象天虛拽虛卓九次為定左足橫右足豎作丁字立如作法時望日月燈火取氣一口吹在盞內此法百無禁忌用法之時以正神氣是也如所傷物下不可便與米湯米飯喫恐米粒誤入瘡口中潰作膿也姑以拌麵麩養之數日可也

蛇虫所傷五十七

夫犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒氣不出也內經曰先治內而後治外可也當先用導水丸西功散或通經瀉十餘行即時痛減脈治然後用膏藥生肌散傅貼愈此是先治內而後治外之法也

杖瘡五十八

夫一切金瘡所傷及背瘡腫毒杖瘡瘀發或逕入裏者可服木香檳榔丸七八十丸至百丸或百五十丸至二百丸生薑湯下過五七行量虛實加減則可矣

禁蝎五十九

夫禁蝎有呪法　呪曰

王女傳仙攝　勅斬蚺蛸滅

右如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處內經曰蜂蠆之毒皆默念七遍怒着作法吹在蝎螫處內經曰蜂蠆之毒皆屬於火用可新水一盞浸之如浸不得處逕以手帛蘸水搭之則痛止也用法之人大忌五厭內

落馬墜井六十

夫一切男子婦人落馬墜井因而打撲便生心煩是瘀逕發於上也內經曰不因氣動而病生於外可用三聖散空心吐訖如本人虛弱瘀痒可用獨聖散吐之吐訖可服妥魂寧魄之藥定志丸陳橘仁茯神之類是也

婦人月事沉滯六十一

夫婦人月事沉滯數月不行脈內不減內經曰此名為瘕為沉也沉者月事沉滯不行也瘕宜桃仁承氣湯加當歸大作劑料服不過三服立愈後用四物湯補之更可用宣明方檳榔丸

血崩六十二

夫婦人年及四十以上或悲哀太甚內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺布葉舉而上焦不通熱氣在中故經血崩下心系者血山也如久不愈則面黃肌瘦不可與燥熱之藥治之豈不問血得熱而流散先以黃連解毒湯次以涼膈散四物湯等藥治之而愈四物者是涼血也乃婦人之仙藥也量虛實加減以意消息用之

腰胯疼痛六十三

夫婦人腰胯疼痛兩腳麻木惡寒喜暖者內經曰乃是風寒濕痺先可服除濕丹七八十九至百丸次以西功散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為驗後以長流水同生薑棗煎五苓散投之風濕散而血氣和也

頭風眩運六十四

夫婦人頭風眩運登車乘船亦眩運眼澁手麻髮退視惡喜怒皆胸中有宿痰之使然也可用瓜蒂散吐之吐訖可用長流水煎五苓散大人參半夏九兼常服愈風

併子則愈矣

經血暴下六十五

夫婦人年及五十以上經血暴下者婦人經血終于七七之數數外暴下內經曰火主暴速亦因於喜暴怒憂結驚恐之致然也慎不可作冷病治之如下峻熱之藥則死止可用黃連解毒湯以清於上更用遠志灰櫬毛以滲於下然後用四物湯加玄胡散涼血和經之藥也

赤白帶下六十六

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功散或單用無憂散最虛寒加減瀉訖次用桂苓丸五苓散亦可也室女亦可

月事不來六十七

夫婦人月事不來室女亦可內經曰月事不來者是胞脈閉也胞脈者屬火而絡於脣中令氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也可用苯調散吐之吐訖可用玉燭散當歸散或三和湯桂苓白朮散柴胡飲子量虛實選而用之降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥是也慎勿服峻熱之藥若服之則變成肺癰骨蒸潮熱咳嗽咯膿唾血而喘小便澀滯寢汗不已漸至形瘦脈大雖遇良醫亦成不救嗚呼人之死者豈爲命耶

婦人無子六十八

夫婦人年及二三十者雖無病而無子經血如常或經血不調乃陰不升陽不降之故也可獨聖散上吐訖治痰三二升後用導水丸禹功散瀉訖三五行及十餘行或用無憂散瀉十餘行次後與葱醋白粥三五日胃氣既通勝中得實可服玉燭散更助以桂苓白朮丸散二藥是降心火益腎水既濟之道不數月而必有孕也

婦人有癰閉遺溺嗌乾之諸證雖服藥針灸亦不能孕也蓋衝任督三脈之病故不治也表證見內證及熱論中

小產六十九

夫婦人半產俗呼曰小產也或三月或四五六月皆爲半產已成男女故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或因勞力打撲傷損及觸風寒或着暴熱不可用黑神散烏金散之類內犯乾豎之故止可用玉燭散和經散湯之類是也

大產七十

夫婦人大產十月滿足降誕者是也或臍腰痛乃敗血蓐物之致然也舉世便作虛寒以熱治之誤人多矣雖經曰諸痛爲實實者熱也可用導水丸禹功散瀉五七行慎不可便服黑神散烏金散燥之同小產治之則可矣

產後心風七十一

夫婦人產後心風者則用調胃承氣湯一二兩加當歸牛兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈如不愈三聖散吐之

乳汁不下七十二

夫婦人有本生無乳者不治或因啼哭悲怒閉塞以致乳脈不行用精猪肉清湯調和美食於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳周回百餘遍則乳汁自下也

又一法用猪蹄湯調和美味服之乳汁亦下合用熟猪蹄四枚食之亦效

又一法計肩夫二穴亦效

產後潮熱七十三

夫婦人產後一二日潮熱口乾可用新汲水調玉露散或冰水調服之亦可或服小柴胡湯加當歸及柴胡飲子亦可慎不可作虛寒治之

乳癰七十四

夫乳癰發痛者亦生於心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結滯於乳房之間血脈凝注久而不散潰腐爲膿也可用一法禁之

呪曰　謹請東方護司族吹妳是灰妳子

右用之時當先問病人曰甚病病人答曰吹妳取此氣一口但吹在兩手坎字文上用大拇指緊捏定面北立一氣念七遍吹在北方如此者三遍若作法時以左右三婦人面病人立於病乳上痛操一二百數如此亦三次則愈

雙身大小便不利七十五

夫婦人雙身大小便不利者可用八正散大作劑料除滑石加葵菜子煎服內經曰膀胱不利爲癃癃者是小便閉而不通也如入正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出焉後服五苓散三五服則愈矣

雙身病瘧七十六

夫雙身婦人病瘧可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡散微瀉過不可大吐瀉恐傷其孕也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

雙身傷寒七十七

夫雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散一

兩水半椀大煎劑料去滓分作二服先一服吐了後一服不吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱啜之汗出盡頭痛立止

身重痞癍七十八

夫婦人身重九月而痞癍不言者是脬生絡脈不相接也則不能言經曰無治也雖有此論可煎玉燭散二兩水一椀同煎至七分去滓放冷入蜜少許時時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

懷身入難七十九

夫婦人懷身入難月可用長流水調益元散曰三服欲其易產也產後自無一切虛熱血氣不和之疾如未入月則不宜服也以滑石滑胎故也

眉煉八十

夫小兒眉煉在面曰眉煉在耳曰耵耳在足曰疳瘡此三者皆謬名也內經曰諸痛瘍瘡皆屬心火乃心火熱盛之致然也可用雄針刺之而出血一刺不愈當再刺之二刺則必愈矣內經云血實者宜決之決者破其血也眉煉者不可用藥傳之其瘡多痒則必爬若藥入眼則眼必損矣

牙疳八十一

夫小兒牙疳牙齦者齒齦也齲者是牙斷腐爛也上下牙者是手足陽明二經也或積熱於內或服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而上至於齒齦齒齦牙縫爲嫩薄之分反爲害也可以麝香玉粟子治之乳母臨臥當服黃連解毒湯一服疳病則愈

夜啼八十二

夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花一枚服罷此藥於淨室中臥一兩日則止也

丹瘤八十三

夫小兒丹瘤浮赤走引或遍身者乃邪熱之毒在於皮膚以磁片撤出血則愈如不愈則以拔毒散掃三二十度必愈矣內經曰丹熛赤瘤火之色也相火之病是也

疳眼八十四

夫小兒疳澁眼數日不開者乃肝木風熱之致然也可清白時復撮痛乳瓣不化可用蓽撥丸三服則愈若治智慧之兒萬應丸如黍米大每服二三十丸米飲下日三服

久瀉不止八十七

夫小兒久瀉不止者至八九月間變爲秋深冷痢瀉泄女孩兒用雙日大忌風雨陰晦產婦孝子見之用法之時宜於日中前晴明好日色則可矣

大小便不利八十六

夫小兒大小便不利通者內經曰三焦約也約者不行也可用長流水煎八正散時時灌之候大小便利卽止也

通身浮腫八十八

夫小兒通身浮腫是木剋脾也水便不利者通小便則愈內經曰三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否腫是也萬全富家且宜消息

發驚潮搐八十九

夫小兒三五歲時或七八歲至十餘歲發驚潮搐涎如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此皆得於母胎中所受悸惕怕怖驚駭恐懼之氣故令小兒輕者爲驚弔重者爲癎病風搐爲腹中積熱爲膽風已上證候可用吐涎及吐之藥如吐訖宜用朱犀腦麝清涼藥之如小兒病在左臂上用法之人亦左手揉之在右臂以右手揉之亦吹在乳脾上令母揉之男孩兒用單日

驅毒勿搐

右用法之人每念一遍望口取氣一口吹在手心自揉

夫小兒拗哭不止或一二日或二四日乃那崇之氣逆于心拗哭不止也有藏經一法以綿絹帶縛手足令用三姓婦人淨壁櫃卧小兒於其中不令傍人知而覷之候移時則拗哭自止也

身熱吐下九十一

夫小兒身熱吐下腹滿不進乳者可急用牛黃通膈丸下過四五行則愈

風熱涎嗽九十二

夫小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少少服之不過三五日愈

水瀉不止九十三

夫小兒水瀉不止可服五苓與益元各停用新水調下二三錢不拘時服

瘡疥風癬九十四

夫小兒瘡疥風癬可用雄黃散加芒硝少許油調傅之如面上有瘡癬不宜擦藥恐因而入眼則損目矣

甜瘡九十五

夫小兒甜瘡久不愈者俗呼曰香瘡是也多於面部兩耳前有一法令母口中嚼白米成膏子臨卧塗之不過三五上則愈矣小兒并乳母皆忌雞猪魚葱發熱之物如治甜指亦可

白禿瘡九十六

夫小兒白禿瘡者俗呼爲雞糞禿者是也可用甜瓜蔓龍頭不以多少河水浸之一宿以沙鍋煮取極苦汁濾去瓜蔓以文武慢火熬成如稀飴狀盛於磁器中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡看河水洗淨却用熬下瓜蔓膏子一水盞加半夏末二錢生薑自然汁一兩匙狗膽

一枚同調不過三兩上立可大忌雞猪魚葱動風發熱之物

瘧疾不愈九十七

夫瘧疾連歲不愈者可用呪藥法治之果者謂桃杏棗梨栗是也 呪曰

吾從東南來 路逢一池水 水裏一條龍
九頭十八尾 問伊食甚的 只喫瘧病鬼

右念一遍吹在菓子上念七遍吹七遍在上令病人於五更雞犬不聞時面東而立食訖於淨室中安困忌食瓜果葷肉熱物此法十治八九無藥處可救人

腰痛氣刺九十八

夫一切男子婦人或因欬嗽一聲或因悲哭啼泣擾舁重物以致腰痛氣刺不能轉側及不能出氣者可用不卧散嚏之汗出痛止如不食可用通經散導水丸瀉十餘行瀉訖服烏金丸和血丹痛減則止矣

赤癜丹腫九十九

夫小兒有赤癜丹腫先用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石掃傅則丹毒自散如未散則可用鈚針砭刺出血而愈矣

瘡瘕癮疹一百

夫小兒瘡疱癮疹跌瘡丹熛諸疾如遇火運勝時不可便用升麻湯解之升麻湯者是辛温之劑發散後便可用涼之劑解之太平之時可用辛温之劑發散後便可用涼膈加當歸白虎湯化斑湯玉露散煎服之甚者解毒湯調胃承氣湯投之古人云瘡疹者百尾俱不可下此言誤人久矣豈不聞揚湯止沸釜底抽薪內經曰五實五

熛瘡疱癮疹之疾生矣又內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬於心火由是言之皆明心生不可用辛温之劑發散以王熱勢轉增漸成厥毒下血咬牙搐搦爲大熱之症明矣如白虎湯加人參涼膈加枯梗當歸不論秋冬但有瘡疱之症便可用之亦且瘡疱癮疹丹熛跌瘡者是天之一氣以傷人也且如瘡疱癮疹以少爲吉以稠爲凶者盛其一二散家親眷相知信服此藥獲効多矣

儒門事親卷六　　金　考城張從政撰

風形

因驚風搐一

新寨馬叟年五十九因秋欠秘官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張瞤唇舌嚙爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆來觀夜卧發熱衣被盡去遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能絕傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌痊則愈矣今已秋寒可三之如未更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三涌病去如澼病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

風搐反張二

呂君玉之妻年三十餘病風瘤目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以天南星雄黃天麻烏附用之殊無少効戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病先涌風痰二三升次以寒劑下十餘行又以鍼針刺百會穴出血二盃

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以爲脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反黃明之不忌口戴人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者米穀不化而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能尅戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脉皆浮數爲病在表也可汗之直醫曰風隨汗出以火二盆暗置牀之下不令病人見火恐增其勢紿之入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出周身如臥水中出如洗待一時許開戶減火一半須更汗止泄亦止

因風鼻塞四

常仲明常於炎暑時風快處披露肌膚以求爽爲風所賊三日鼻窒雖坐於暖處少通終不大解藏人使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣

風痰五

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一兩次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一兩盞方已比年發益頻目見黑花發作昏不知人三四日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一効偶過戴人于灤水之南鄉戴人以雙解散發汗次以苦劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全癒

癲六

朱葛解家病癲疾求治于戴人戴人辭之待五六月間可治之時也今春初尚寒未可服藥我已具行裝到宛丘待五六月製藥朱解家以爲託辭後戴人果以六月間到朱葛乃具大蒜浮萍等藥使人召解家曰藥已成矣可來就治解爲他藥所惑竟不至戴人曰向日我非託也以春寒未可發汗暑月易發汗內經論治癲疾自目眉毛再生針同發汗也但無藥者用針一汗可抵千針故爲供奉採萍歌曰不居山兮不在岸採我之時七月半選甚難風與癇風些小微風都不算豆淋酒內下三九鐵樸頭上也出汗噫文士相輕醫氏相疾文士不過自損醫氏至於害人其解家之謂與陽夏張主簿病癇十餘年眉鬚皆落皮膚皴澁如樹皮戴人斷之曰是有汗背可治之當大發汗其汗出當臭其涎當腥乃置煨室中偏塞風隙以三聖散吐之汗出周身如臥水中其汗果粘臭不可聞痰皆腥如魚涎兩足心微有汗次以舟車丸滑川散大下五七行如此數次乃瘳

胃脘痛八

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛也乃胃脘當心痛也內經曰歲木太過風氣流行民病胃脘當心而痛乃與神祐丸一百餘粒病不減或問曰此胃脘有寒宜溫補將軍素知戴人明了復求藥於戴人戴人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立愈矣

搐搦九

黃知村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被遮蔽人之舞陽道經黃如不及用藥針其兩手大指後中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦至氏所謂

風溼末疾者此也或刺後鍼手太陽穴也屈小指握紋盡處是穴也

面腫風十

南鄉陳君俞將赴秋試頭項偏腫連一目狀若半壺其脈洪大戴人出視內經面腫者風此風乘陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑葱根豆豉同煎一大盞服之微汗次日以草莖鼻中大出血立消

驚風十一

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也常捐時切戒把捉手足握持大急必半身不遂也氣血偏勝必痺其一臂漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹簟鋪之涼地使小兒臥其上待其搐風力行徧經絡茂極自止不至傷人

風溫十二

陽夏賀義夫病傷寒當三日以裏劑者下之而成結胸求戴人治之戴人曰本風溫證也不可下又下之太早故發黃結胸此已有瘀血在胸中欲再下之恐已虛證一涌可愈但出血勿驚以茶調瓜蒂散吐之血盡汗止即且噎逆乃以巾捲小鍼而使枕其刃不數日平復

風水十三

張小一初病疥爬搔變而成腫喘不能食戴人斷爲風水水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘勝理開發就煖室中用酸苦之劑加全蝎一枚吐之節次用藥末至三錢許出痰約數升汗隨涌出腫去八九分隔一日臨卧向一更來又下神祐丸七十餘粒三次嚥之至夜半動一行又續下水煮桃紅丸六十丸以麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車丸通經散及白术散以調之愈

又

曾興吏妻產後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫大小便如常其脈浮而大此風水腫也先以蠶水撩其痰以火助之發汗次以舟車丸瀉川散瀉數行後四五日方用苦劑通訖用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車瀉川復下之末後用水煮桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以爲倒布袋法耳病再來則必死世俗只見塵中貨藥者用銀粉巴豆蝎腫者暫去復來必死以爲驚俗豈知此法乃內經治鬱之玄

兼此藥皆小毒其毒之藥豈有反害者哉但愈後忌愼房室等事況風水不以爲勉源來治于戴人戴人曰此證不與壯年同壯年病水者或因留飲及房室此小兒纔七歲乃風水證也宜出汗乃愜煖室以屏帳遍遮之不令見火若內火若外火必昏憒也使大服胃風湯而浴之浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五分隔一二日乃依前治之汗出腫減七分乃二汗而全減尙未能食以檳榔丸調之兒已喜笑如常日矣

腎風十五

桑惠民病風面黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫落作癩腎三年一日戴人到索粥來求治于戴人戴人曰非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風吞痛不能正立其色始面痤然浮腫今公之病腎風也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色矣於是下針自額上下鍼針直至頤頂皆出血果如墨色徧腫處皆針之惟不針目鉞皆外兩旁蓋少陽經此少血多氣也隔日又針之血色乃紫二日外又刺其血色變赤初鍼時痒再刺則額覺痛三刺其痛不可任蓋邪退而然也待二十餘日又輕刺一遍方已每刺必以氷水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作戴人在東方無能治者

勞風十六

戴人見一男子目下腫如卧蠶狀戴人曰目之下陰也水亦陰也腎以爲水之主其腫至于目下故也此由房室交接之時勞汗遇風風入皮腠得寒則閉風不能出與水俱行故病如是不禁房則死

中風十七

高評事中風稍緩張令涌之後服鉄彈丸在薑湯加減方中或問張曰君常笑人中風服鉄彈丸今以用之何也張曰此收後之藥也令人用之於大勢方來之時正猶蚍蜉撼大樹不識次第故也

暑形

中暑十八

小鄭年十五田中中暑頭痛困卧不起戴人以雙解散汗之又以米醋湯投之未解薄晚又以三花神祐丸大下之遂愈

又

張叟年七十一暑月田中因饑困傷暑食飲不進時時嘔吐口中常流痰水腹脇作痛醫者槩用平胃散理中

丸導氣丸不効又加鍼灸皆云胃冷乃問戴人戴人曰痰屬胃門熱不收故流痰水以分年高不敢上涌乃使一筋探之不藥而吐之痰涎一升次用黃連清心散導欲丸玉露散以調之飲食如進惟大便秘以生蜜大棗煎調胃承氣湯一兩奪之遂愈

癥癰十九

故息城一男子病癥求治于戴人診兩手脈皆沉伏而有力內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣脇中作痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年所禳避匿無所不至終不能療戴人曰此癥癰也以三花神神丸五七十丸以冷水送過五六行次以冷水止之冷主收斂故也濕水既盡一二日煎白虎湯作頓啜之癰猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎水六七次若穢聲次以柴胡湯和之間用妙功丸磨之癥悉除

火形

馬刀二十

襄陵馬國卿病左乳下二脇間期門穴中發癰堅而不潰痛不可忍醫瘍者皆曰乳癰或曰紅系漏或曰馬刀戴人診其脈曰此馬刀也故名之曰馬刀堅而不潰乃邀之於食肆中使食水浸癰也足少陽膽經之病出髀樞十二經以示之其狀如馬刀故曰馬刀堅而不潰乃邀之於食肆中使食水浸湯餅國卿曰稍覺緩次日先以淦鹽上涌又以涼劑滌去熱勢約數十行腫已散矣

又朱高黃家妾左脇病馬刀癰增寒發痛已四五日矣戴人適避暑於寺中來乞藥戴人曰此足少陽膽經病也少血多氣堅而不潰不可急攻當以苦劑涌之以玉香連翹湯托之既而痛止然癰根未散有一庸醫過見之曰我有妙藥可潰而爲膿不如此何時而愈既服毒藥甚急不可妄用鍼藥

舌腫二十五

南隣朱老翁年六十餘感身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大二倍一外科以燔鍼刺其舌兩旁下藤泉穴病勢轉凶將至頸沛戴人曰血實者宜決之以鈹鍼磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火熱鍼艾火是何義也

腰胯痛二十六

戴人女侄冬間自遠來面赤如火至灘陽病腰胯大痛乃以酒調通經散一錢半夜先服之大過數十行約一二缶已平一二日腫消而愈夏君見大奇之

伐指痛二十二

麻先生妻病伐指痛不可忍酒調通經散一錢半夜吐出畢而痛減余因歎曰向見陳五官病此醫以爲小疽也自是方寧女僮自言此病每一歲須瀉五七次今年不曾瀉故如是也常仲明悟其言以身有濕病故一歲亦瀉十餘行病始已此可與智者言難與愚者論也

癘癰二十三

一婦人病癘癰延及胸膺皆成大瘡相連無好皮肉求戴人療之戴人曰火熱所勝治以鹹寒命以淦鹽吐之一吐而着痂次用涼膈散解毒湯等劑皮肉乃復如初

咽喉腫塞二十四

一婦人病咽喉腫塞粥粥不下數日腫不退藥飲難下鍼亦無功戴人以當歸荊芥甘草煎使熱嗽之以冷水拔其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽喉之病甚急不可妄用鍼藥

狂二十七

一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如絙絕斷之曰口爲飛門胃爲賁門曰者胃之上源也鼻者足

陽明經起於鼻交類之中旁納太陽下循鼻柱交人中環唇下交承漿故其病如是夫循役煩擾便屬火化火乘陽明經故發狂故經言陽明之病登高而歌棄衣而走罵言不避親疎又況肝主謀膽主決循役迫遽則財不能支則肝屬謀而膽屬不能決屈無所伸怒無所泄心火礮礴遂乘陽明金然胃本屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之良謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與痰血相雜而下數升取之乃康以遁聖散調其後矣

瘧厥二十八

一夫病瘧厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而已戴人見之問侍病者曰中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調瓜蒂末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中噀然下咽有聲後灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽僵然仰面似覺有痛斯須吐噦吐膠涎數升頗腥砒石尋常勿用以其病大非如此莫能勦然無瓜蒂亦不可便用宜消息之大凡中風涎塞往往止斷爲風專求風藥鹽豉至實誤人多矣劉河間治風捨風不論先論二火故令將此法實於火形中

滑泄乾嘔二十九

庶先生妻當七月間痛臟腑滑泄以去濕降火之藥治之少愈復腹脹及乳痛狀如吹乳頭蓋壯熱面如渥丹寒熱往來嘔乾嘔逆胸脇痛不能轉側耳鳴食不可下又復瀉余欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以温劑止利

又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人比及戴人至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛蒲荷末調二升置之枕石使作戴次服之夜半徧身出冷汗如洗元覺足冷如冰至此是大暖頭頓輕肌涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱偏虛他經縱有寒熱亦不至甚既熱而有痢不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脈戴人曰娘子病來心常欲痛哭爲快否婦曰欲如此余亦不知所謂戴人曰少陽相火淩爍肺金金受屈制無所投告肺主悲但欲痛哭而爲快也庶先生曰余家諸親無不敎服脈初洪數有力自服益元散後已半又閒戴人之言使以當歸芍藥以解毒湯中味數服之大瘥矣

笑不止三十

戴人路經古亳逢一婦病喜笑不止已半年矣衆醫治者皆無藥術矣求治于戴人戴人曰此易治也以滄鹽成塊者二兩令用火燒令通赤放冷研細以河水一大椀同煎至三五沸放温分三次啜之以叙搖其病目大發遂遇戴人出熱痰五升次服大劑夫黃連解毒湯是也不敢曰而以瓜蒂散涌之赤立消不敢曰又大發其病之來也先笑定矣內經曰神有餘者笑不休此所謂神者心火是也火得風而成焰故笑之象也五行之中惟火有笑矣

腑食中滿三十一

蓬平李官人妻病咽中如物塞食不下中滿他醫治之不効戴人診其脈曰此痰腑也內經曰三陽結爲腑王太僕云心煩則腑滿戴人曰格陽云腸盛之極故食格拒而不入先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食已下又以瓜蒂散再越之健啖如昔日矣

又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人比及戴人至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛蒲荷末調二升置之枕石使作戴次服之夜半徧身出冷汗如洗元覺足冷如冰至此是大暖頭頓輕肌涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱偏虛他經縱有寒熱亦不至甚既熱而有痢不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脈戴人曰娘子病來心常欲痛哭爲快否婦曰欲如此余亦不知所謂戴人曰少陽相火淩爍肺金金受屈制無所投告肺主悲但欲痛哭而爲快也庶先生曰余家諸親無不敎服脈初洪數有力自服益元散後已半又閒戴人之言使以當歸芍藥以解毒湯中味數服之大瘥矣

笑不止三十

戴人路經古亳逢一婦病喜笑不止已半年矣衆醫治者皆無藥術矣求治于戴人戴人曰此易治也以滄鹽成塊者二兩令用火燒令通赤放冷研細以河水一大椀同煎至三五沸放温分三次啜之以叙搖其病目大發遂遇戴人出熱痰五升次服大劑夫黃連解毒湯是也不敢曰而以瓜蒂散涌之赤立消不敢曰又大發其病之來也先笑定矣內經曰神有餘者笑不休此所謂神者心火是也火得風而成焰故笑之象也五行之中惟火有笑矣

腑食中滿三十一

蓬平李官人妻病咽中如物塞食不下中滿他醫治之不効戴人診其脈曰此痰腑也內經曰三陽結爲腑王太僕云心煩則腑滿戴人曰格陽云腸盛之極故食格拒而不入先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食已下又以瓜蒂散再越之健啖如昔日矣

目盲三十二

戴人女僮至西華目忽暴盲不見物戴人曰此相火也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與頂前五穴大出血目立明

大出血目立明

小兒悲哭不止三十三

夫小兒悲哭彌日不休兩手脈弦而緊戴人曰心火甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲玉太僕云心燥則痛甚故燥甚悲亦甚令浴以温湯漬形以爲汗也肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服涼膈散加當歸梔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉腑中之邪熱

小兒手足搐搦三十四

李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令揩淨地以水酒之乾令復酒之令極濕俛卧兒于地上良久渾身轉側泥涴皆滿仍以水洗之少頃而瘥矣

黍粘子以退譬方在別集中矣

熱形

沙石淋三十六

酒監房吾良之子年十三病沙石淋已九年矣初因瘧疹餘毒不出作便血或告之令服太白散稍止後又因積熱未退變成淋閟每發則見鬼神號則驚辟適戴人客鄆塘寺以此病請戴人曰諸醫作腎與小腸病者非也蓋樞言足厥陰肝之經病遺溺閉癃閉謂小溲不行癃爲淋瀝也此乙木之病非小腸與腎也木爲所抑次乘乘之故熱在脬中下焦爲之約結成沙石如湯瓶煎燥日久熬成湯齒今夫羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈有沙石而能漏者邪以此知前人所說服五石丸散而致者恐未盡然內經曰木鬱則達之先以瓜蒂散越之次以八正散加湯齒等分頓啜之其沙石自化而下

又屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之麥秋發則小腸大痛至握其陰跳躍旋轉號呼不已小溲數日不能下下則成沙石大便秘澁肛門脫出一二寸諸醫束能治閭戴人在朱葛寺避暑乃負其子而哀請戴人曰今日治今日劾時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末三錢汲河水煎之令作三五度熱之又服苦末丸如芥子許六十粒日加輔上涌下泄一時齊出有膿有血涌瀉既覺定令飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去九分止哭一次明日困卧如醉自晨至暮猛然起走索食與母歌笑自得頓釋所苦繼與太白散八正散等調一日大瘥恐對天失所養留五日而歸戴人曰此下焦約

也不吐不下則下焦何以開不令飲水則小溲何以利天抵源清則流清者是也

又柏亭劉十三之子年六歲病沙石淋戴人以苦劑三涌之以益腎散三下之立愈

膏淋三十七

鹿邑一閭閻家有子二十三歲病膏淋三年矣鄉中醫不能治往京師徧訪多作虛損補以溫燥灼以鍼艾無少減閭戴人僑居滙東見戴人曰聖醫之疾也亦曰自殆實由少腹寬熱非虛也可以涌以泄其人以時暑憚其法峻不快者三日浮層一個日子以有暑病近覺頭滿戴人曰亦可涌願與君同之毋畏也於是涌痰數行尋覺出戴人曰閒暫服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥者易治先以苦劑涌之次以舟車瀉川大下之更服重劑果瘳

一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨卧更服檳榔丸以進食

又東門高三郎病嗽一年半耳鳴三月矣嗽屢血面多黑點身表俱熱喉中不能發聲戴人曰嗽之源心火之勝也秋傷於濕冬生欬嗽冬水既旺水濕相接隔絕於心火火不下降反而炎上肺金被燥發而爲嗽金燬既久聲反不發醫者補肺腎皆非也戴人令先備西瓜冰雪等物其次用涌泄之法又服去濕之藥病日已矣

勞嗽咯血四十二

澶陽劉氏一男子年二十餘歲病勞嗽咯血吐唾粘臭不可問秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作肌如燔癡寢汗如水累服麻黃根欬蒲扇止汗汗自若也又同仲明之病咳不化也

小兒面上赤腫三十九

黃氏小兒面赤腫兩目不開戴人以鎒鈹刺輕砭之除兩目尖外亂刺數十鈹出血三次及愈此法人多不肯從必欲治病不可謹護

頭熱痛四十

丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其頭上置水於其中日易數次熱不能已諸醫莫識其證求昆戴人戴人曰此三陽畜熱故也乃僨炭火於爐室中出汗涌吐三五次併行七日方愈僧頓從者曰此神仙手也

勞嗽四十一

駝口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其脾欲出不出戴人曰閒暫服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥者易治先以苦劑涌之次以舟車瀉川大下之更服重劑果瘳

岳八郎常日嗜酒偶大飲醉吐血近一年身黃如橘昏憒發作數日不省漿粥不下强直如厥兩手脉皆沉細戴人視之曰脉沉細者病在裏也中有積聚用丹砂車丸百餘粒瀉川散五六錢大下十餘行脉如葵菜汁中燥糞氣穢異常忽開兩目伸挽問左右曰我緣何至此左右曰你吐血後數日不省得戴人治之乃醒自是五六日必以瀉凡四五次其血方止但時欬二聲潮熱求退以涼膈散加桔梗當歸各秤二兩水一大盂加老竹葉入蜜少許同煎去滓時時呷之間與人參白虎湯不一月復故

嘔血四十四

棠谿李民範初病欬血戴人以調胃湯一兩加當歸使服之不動再以丹車丸五六十粒過三四行又嘔血經散梳若庸工則必疑不再宿又與丹車丸百餘粒經三四錢大下之過十餘行已愈過半仍以黃連解毒湯加當歸煎服之次以草莖鼻中出血半升臨晚又用益腎散利數行乃愈

因藥燥熱四十五

高燥廻檢之子八歲病熱醫者皆爲傷冷治之以熱藥攻矣欲飲水水禁而不與內水涸竭煩燥轉生前後皆閉口鼻俱乾寒熱往來欬欬時作遍身無汗又欲灸之適遇戴人戴人責其母曰重裀厚被煖炕紅爐兒已不勝其熱矣尙可灸乎其母謝以不明戴人令先服人參柴胡飲子連進數服下燥魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪涼水連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與牛黃通膈丸復下十餘行兒方大痊前後約五十餘行略無所困冰雪水飲至一斛向灸之當何如哉

肺癰四十六

武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半年病愈甚以禮來聘戴人戴人往視之診其兩手脉尺寸皆潮於關關脉獨大戴人曰癰癥也問其乳媼皆有痛處否乳媼曰無戴人令兒去衣舉其兩手視其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身乃避之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰也非肺癰也若肺癰已吐膿矣此不可動止可以藥托其毒以待自破家人皆疑之不以爲然服藥三日右脇有三點赤色戴人連辭云此兒之病若早治者談笑可已今已失之遲然破之後方驗其死生矣若膿黃赤白者生也膿青黑者死也遂辭而去私告天祥之友李簡之曰敗月之後卽此兒必有一症也其症乃死矣肺死于巳至期而頭眩不舉不數日而死也其父曰群醫治之斷爲骨蒸證戴人獨言其肺有癰也心終疑之及其死家人輩以火焚其棺旣燃天祥以杖破其脇下果出青黑膿一桄天祥仰天哭曰諸醫誤殺吾兒矣

癆四十七

宛邱營軍校三人皆病癆積年不瘥腰已下腫痛不舉遍身瘡赤兩目昏暗脣乾舌燥求療于戴人戴人欲投瀉劑二人不從爲他醫溫補之藥所惑皆死其同病有宋子玉者餓省曰彼已熱死我其改之敬邀戴人戴人曰公之疾服熱藥久矣先去其藥邪然後及病邪可下三百行子玉曰敬從教先以舟車丸瀉川散大下一盆許明日減三分兩足舊不仁是日覺痛痒累至三百行

始安戴人曰諸癆獨取陽明陽明者胃與大腸也此言不止謂皺也鍼與藥同也

口癖四十八

一男子病口瘡數年上至口中至咽嗌下至胃院皆瘡不敢食熱物一洒一漱一泄一汗已去其九次服黃連解毒湯不十餘日皆釋

虛勞四十九

西華宋茂之病虛勞寢汗面有黃色自膝以下冷痛無汗腹中燥熱醫以葛附補之五晦朔不令飲水又禁

隣人已死僕發熱極投於井中撈出以汲水貯之極使坐其中適戴人遊他方家人偶記戴人治法曰傷寒三下不通不可再攻便當涌之試服瓜蒂散良久吐膠涎三椀許與宿食相雜在地狀如一掃頓快乃知世醫殺人多矣戴人之女僮亦嘗吐一東傷寒吐法使服太白散甘露散以調之

失笑五十二

戴人之次子自出婁之後日瘦語如衾中此病在中也常揀第三指失笑此心火也約半載日飲冰雪更服涼劑戴人曰惡雪則愈矣其母懼其大寒戴人曰汝親也吾用藥如鼓之應桴同惡涼藥宜乎世俗之謗我也至七月厭冰不飲病日解矣

赤日五十三

安喜趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人語曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不違人自違法也

目翳五十四

清州王之一子年十餘歲目赤多淚衆工無効戴人見之曰此兒病目翳當得之母腹中被驚其父曰娠時在睛滿微圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明李仲安見而驚曰奇哉此法救人其日又與頭上出血及眉上鼻中皆出血吐時又用通經散二錢舟車九七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車九三十粒投之下十八行病更不作矣

疮後嘔吐五十五

河門劉光濟之子幾二歲病疱後嘔吐發昏用丁香豆蔻之類不効適麻先生寄其家乃謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰劉河間常言涼膈散可治瘡疱張戴人用之如神況內經言少陽所至爲嘔涌少陽者相火也非寒也光濟欣而從之此日利二行適王德秀自外入問其利之也乃曰瘡疱首尾不可下麻自悔其多言業已服矣如待之比至食時下黃涎一合日午問之兒已索遊于街矣

熱厥頭痛五十六

彭城張叟年六十餘歲病熱厥頭痛以其用涌藥時已一月間矣加之以火其人先利厥腑年高身四出門見日而仆不知人家人驚惶欲採問之戴人曰大不可擾續與西瓜涼水蜜等少頃而蘇蓋病人年老涌泄自脈易亂身體內有炎火外有太陽是以自跌若是擾之使不救矣惟安定神思以涼水投之待之以淨淨便屬水自然無事若他醫必疑足以知戴人之語驗

產前喘五十七

武安胡產祥之妻臨難月病喘以涼膈散二兩朴硝一兩分作二服煎令冷服之一服病喘大平次又服之病痊効矣產之後第六日血迷又用涼膈散二兩四物湯三兩朴硝一兩都作一服大下紫黑水其人至今肥健戴人常曰孕婦有病當十月九月內朴硝無碍八月者當忌之七月却無妨謂陽月也十月者已成形矣

血崩五十八

孟官人母年五十餘歲血崩一載衾用澤蘭九黑神散保安九白薇散補之不効戴人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系爲之恐血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏之爲崩陰脈不足陽脈有餘則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以揀香附子二兩炒白芍二兩焙當歸一兩焙三味同爲細末水調下又服椶櫚九不拘日而安

婦人二陽病五十九

一婦月事不行寒熱往來口乾頰赤喜飲旦暮間發一二聲諸醫皆云經血不行宜蟲虫木蛭乾漆硇砂元清紅娘子沒藥血竭之類惟戴人不然曰古方中雖有此法素病人服之必磨腹發痛飲食不進乃命止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃進食乃通用淡一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自行渙然月事不爲水濕所膈自依期而至矣亦不用蚯虫水蛭之類有毒之藥如用之則月經縱來小渡反閉絕證生矣凡精血不足當補之以食大忌有毒之藥偏勝而成天閉

月閉寒熱六十

一婦年三十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇焦頰赤時欬三兩聲向者所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散鱉甲散建中湯寧肺散艾附千病轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先涌痰五六升午前涌畢午後食進餘證悉除後三日復輕涌之又去痰一二升食進益不數日又下通經散瀉訖一二升後數日去死

皮數重小者如錢片大者如葦膜不一月經水行神氣大康矣

惡寒實熱六十一

一婦身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以狐帽蒙其首猶覺寒泄注不止常服薑附硫黃燥熱之劑僅得平和稍用寒涼其病轉增三年不愈戴人診其兩手脉皆如絕繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱生多以涼布搭心次以新汲水淋其病處婦乃叫殺人不由病者令人持之復以冷水淋至三四十桶大戰汗出昏困一二日而向之所惡皆除此法華元化已曾用世無知者

遇寒手熱六十二

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢者諸陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神丸大下之熱遂去

嘔逆不食六十三

柏亭王論夫本因喪子憂抑不思飲食醫者不察以爲胃冷血燥之劑盡用之病變嘔逆而瘦求治于戴人一覩痛泄而愈愈後忘其禁忌病復作大小便俱秘脘痛嘔吐不食一日大小便不通十有三日復問戴人戴人曰令先食葵羹菠薐菜猪羊血以潤燥開結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意飲冰水數升推投風丸桂苓白朮散以調之食後服導飲丸三十餘粒不數日前後皆通藥止嘔定食進此人臨別又留潤腸丸以防復結又留滌腸散大閉則用之凡服大黃牽牛四十餘日方變論夫自歎曰向使又服向日熱藥已非一省操背耳常有痤癰愈而復生戴人曰太陽血有餘也先令涌泄之次於委中以鈚鍼出紫血病更不復作也

牙痛六十五

澤州李繼之忽病牙痛皺眉不語變景先見之曰何不藥也曰牙痛藥曰骨記張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢過數知交留飲強飲熱酒數杯藥爲熱酒所發盡吐之吐畢而痛止李大笑曰戴人神仙也乙三五日又痛再服前藥百餘粒大下數行乃愈

淋六十六

戴人過息城一男子病淋戴人令頓食鹹魚少頃大渴戴人令縱意飲水然後以藥治淋立通淋者無水故滿也

口臭六十七

趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金爲火火主焦臭故如是也久則成腐腐者腎也此極熱則反兼水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而去其七分夜用舟車丸落川散下五七行比旦而臭斷嗚呼人有病口臭而終其身者世謂以爲肺系偏而與胃相通故臭妄論也

溼形

痂六十八

汝南司候李審言因勞役王事飲水坐溼地乃溼氣下行流入脬囊大雁痛不可忍以金鈴川練子等藥不効求治于戴人一省操背耳常有痤癰愈而復生戴人曰可服泄水丸審言或之又數日痛不可堪從戴人先以舟車丸落川散下青綠沫十餘行痛止次服茵香丸五苓以調之三日而腫退至老更不作夫痂者乃肝經也下青沫者肝之色也

水痂六十九

律科王敏之病水痂其法在於寒形中

留飲七十

郭敬之病留飲四日浮腫不能食腳腫連腎囊痛先以苦劑涌之後以舟車丸落川散瀉之病去如拾遺又棠鎔張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本留飲諸醫皆以燥劑燥之中脘膈厭以大艾炷鍼刺之瘡未瘳合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三升談笑而愈

黃疸七十一

蔡寨成家一童子年十五歲病疸一年面黃如金遍身浮腫乏力惟食鹽與焦物戴人以茶調散吐之涌涎一盂臨晚又以舟車丸七八十粒通經散三錢下四五行下四五行鹽與焦物見待六七日又以舟車丸落川散下四五行鹽與焦物見而惡之面色變紅後再以茶調散涌之出痰二升方能愈矣

又一男子作贅倩病疸善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更適他乎婦翁本農者召壻意欲作策見其病甚每日導詬人教之餌膽礬丸三棱丸了不開涉鍼灸祈禳百無一濟戴人見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命以冰水一盂飲之立止次服平胃散等問服檳榔丸五七日黃退力生蓋脾疸之證溼熱與宿穀相搏故也俗謂之金勞黃

又朱肱周黃劉三家各有僕病黃疸戴人曰僕役之歲飲食寒熱風暑溼寒毒常觸冒也恐難調攝虛數治功其二家留僕於戴人所從其飲餌其一僕不離主人執役三人同服苦散以涌之又服三花神祐丸下之五日之間果二僕愈而一僕不愈如其言

黃病七十二

茶業一女病黃遍身浮腫面如金色困乏無力不思飲餌惟喜食生物泥煤之屬先以苦劑蒸餅爲丸涌痰一椀又舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨食散氣不數日肌肉如初

病發黃七十三

安喜趙君玉爲省掾日病發遍身黃往問醫者醫云君乃陽明證公等與麻知幾皆受訓於張戴人是商議喫大黃者難與論病君玉不悅歸自揣無別病乃取三花神祐丸八十粒服之不動君玉乃悟曰予之溼熱盛矣此藥尚不動以舟車丸潛川散作劑大下一斗數多結者一夕黃退君玉由此益信戴人之言

水腫七十四

南鄉張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉自入令上涌汗而下泄之去水三四斗初下藥時以草貯布囊高支兩足而卧其藥之行自腰以上水覺上行水行之狀如蛇走隧如線牽四肢森然涼寒會於臍下而出不旬日間病大減餘邪未盡戴人更欲用藥竟不能從其言

涌水七十五

李七老病涌水證面黃而喘兩足皆腫按之陷而復起行則濕濕有聲常欲飲水不能睡卧戴人令上涌去痰而汗之次以舟車丸潛川散下之以益腎散復下之以分陰陽利水道之劑復下之水盡皆瘥

停飲腫滿七十六

涿郡周敬之自京師歸鹿邑道中渴飲水過多漸成腫滿或用三花神祐丸懼其太峻或用五苓散分利水道又太緩淹延數多終無一効蓋粗工之技止於此耳後手足與腎皆腫大小便皆祕澁常仲明求治于戴人戴人令仲明付藥比及至已歿矣戴人曰病水之人其勢如長川泛溢欲以杯勺取之難矣必以神禹決水之法以舟車丸潛川散各一服去積水二十餘行至早辰服盡白粥一二頓與之馬已能翼鵬矣

又棠谿李十八郎病腰腳大不伸僂僂蹙蹙而行已數年矣服藥無効止藥邯鄲秋蓉涉水病復作醫氏使服個斤丸其效李仲安乃乞藥于戴人戴人曰近日服何藥仲安曰四斤丸公目昏亦未其效驚曰目正暴發人令仲明付藥比及至已歿矣戴人曰病水之人其勢如長川泛溢欲以杯勺取之難矣必以神禹決水之法以舟車丸潛川散各一服去積水二十餘行至早辰服盡白粥一二頓與之馬已能翼鵬矣

又棠谿李十八郎病腰腳大不伸僂僂蹙蹙而行已數年矣服藥無効止藥邯鄲秋蓉涉水病復作醫氏使服個斤丸其效李仲安乃乞藥于戴人戴人曰近日服何藥仲安曰四斤丸公目昏亦未其效驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明既來則策杖而行曰腫無所見戴人先令涌之藥忽下走去二十行兩目頓明策已藥矣比再涌泄能讓官歷日調至一月令服當歸丸健步而歸家矣

又息城邊枝白公以隆暑時飲酒覺極熱於涼水泡中漬足便其冷也爲濕所中股膝沉痛又因醉卧濕地其痛轉加竟欲以酒解痛遂以連朝而飲反成赤痛發間止且六十年往往斷其寒濕腳氣以辛熱治之不効或使服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作如前舉棄拜濕且腫硬臍下似有物難於行以此免軍役令人代之

來訪戴人戴人曰余亦斷爲寒濕但寒則陽火不行故爲痛淫則經隧有滯故腫先以苦劑涌之次以舟車丸以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉戴人曰夫風淫寒之氣合而成痺水痺得寒而浮畜於皮膚之間久而不去內舍六腑日通經散三四錢是用僅得四行又來日以神祐丸百二十九投之續見一二行又次日服神祐丸八十九粒約下七八行白公已覺膝骨輕也腫者亦退飲食加進又以涌之其病全瘳臨別又贈之以疎風丸併以其方與之此公以其不肯妄服辛熱用之至六十餘日目赤上熱大小便澁腰股之病如故

戴人診其兩手脈皆沉遲沉者爲在裏也在裏者泄之以舟車丸潛川散各一服去積水二十餘行至早辰服盡白粥一二頓與之馬已能翼鵬矣

又棠谿李十八郎病腰腳大不伸僂僂蹙蹙而行已數年矣服藥無効止藥邯鄲秋蓉涉水病復作醫氏使服個斤丸其效李仲安乃乞藥于戴人戴人曰近日服何藥仲安曰四斤丸公目昏亦未其效驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明既來則策杖而行曰腫無所見戴人先令涌之藥忽下走去二十行兩目頓明策已藥矣比再涌泄能讓官歷日調至一月令服當歸丸健步而歸家矣

又息城邊枝白公以隆暑時飲酒覺極熱於涼水泡中漬足便其冷也爲濕所中股膝沉痛又因醉卧濕地其痛轉加竟欲以酒解痛遂以連朝而飲反成赤痛發間止且六十年往往斷其寒濕腳氣以辛熱治之不効或使服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作如前舉棄拜濕且腫硬臍下似有物難於行以此免軍役令人代之

來訪戴人戴人曰余亦斷爲寒濕但寒則陽火不行故爲痛淫則經隧有滯故腫先以苦劑涌之次以舟車丸以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉戴人曰夫風淫寒之氣合而成痺水痺得寒而浮畜於皮膚之間久而不去內舍六腑日通經散三四錢是用僅得四行又來日以神祐丸百二十九投之續見一二行又次日服神祐丸八十九粒約下七八行白公已覺膝骨輕也腫者亦退飲食加進又以涌之其病全瘳臨別又贈之以疎風丸併以其方與之此公以其不肯妄服辛熱用之至六十餘日目赤上熱大小便澁腰股之病如故

嶺北李文卿病雨膝腹屈伸有聲軋軋然或以爲骨鳴戴人曰非也骨不戛焉能鳴此筋溼也溼則筋急有獨緩者緩者不鳴急者鳴也若用予之藥一涌一泄上下去其水水去則自無聲矣李文卿乃從其言既而果然矣

白帶七十九

息城李左衙之妻病白帶如水窈滿巾緜靡不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷起石硫黃蓽附之藥重重燥補污水轉多常以袍曰易數次或一藥以木炭十斤置藥在鉗鍋中鹽泥封固三日三夜炭火不絕燒令通赤名曰火龍丹服至數升污水弱甚炳艾燒鍼三年之問不可勝數戴人斷之曰此帶溼水本熱乘太陽經其寒水不可勝如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌疾水二三升次日下沃水十餘行三遍汗出周身至明旦病人云污已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一子內經曰少腹冤熱溲出白液帶之爲病溶溶然若坐水中故治帶下同治溼法溼病皆宜逐水利小溲勿以赤爲熱白爲寒今代劉河間書中言之詳矣

溼嗽八十

趙君玉妻病嗽時已十月矣戴人處方六味陳皮當歸甘草白朮枳殼桔梗君玉疑其不類嗽藥戴人笑曰君怪無烏梅罌粟囊乎夫冬嗽乃秋之溼也溼土逆而爲嗽此方皆散氣除溼解急和經三服帖然劾矣

瀉見八十一

一婦年三十四歲夜夢與鬼神交驚怕異常及見神堂陰府舟梅橋梁如此一十五年竟無娠孕乎新覡縛無所不至鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿足脹委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於上陰火盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟梅橋梁水之用兩手寸脈皆沈而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有孕戴人曰余活婦人使有娠此法不誣

溼癖八十二

一女子年十五兩股間溼癖長三四寸下至膝發痒時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流痛不可忍灸煽薰搽

色黧黑翠世治痢之藥皆用之無効適戴人治澧陽往問之戴人乃出示內經洞泄之說雖不甚疑然畏其攻劑夜焚香禱神曰某以病久不瘥欲求治于戴人戴人以調宜下之欲不從戴人名醫也欲從之形疲如此恐不任藥毋已老矣無人侍養來日不得已須服藥神其相之戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗嗜食後以檳榔丸磨化其滯待數日病已大減戴人以爲去之未盡當以再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數日更以苦劑趁之往問其家彼云已下村中收索去也忽一日入城面色極佳語言壯健但怪其跛足而立問何故如此德源曰足上患一瘡戴人曰此裏邪去而於外病痊之後凡病皆如是也

大便少而頻八十六

太康劉倉使病大便少而頻日七八十次常於兩股間懸半枚甎窩如此十餘年戴人見之而笑曰病既頻而少欲通而不得通也何不大下之此通因通用也此二服藥之力乃與藥大下三十餘行頓止

暑泄八十七

殷輔之父年六十餘暑月病泄瀉日五六十行自建雄鎮來請戴人于陳州其父喜飲二家人輩爭止之戴人曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勿之少飲比及用藥先令逃歸以葉豆雞卵十餘枚同煮卵熟取出令豆軟下陳粳米作稀粥攪令寒食雞卵以下之一二頓病減大半蓋粳米雞卵皆能斷痢然後製抑火流濕之藥調順而方愈

腹滿面腫八十八

萬令腹滿面足皆腫痰黃而喘急食減三年之間醫者

皆盡而不驗戴人以瓜蒂散涌之出寒痰三五升以舟車九瀉川散下之青黃涎沫缶平又以桂苓白朮散五苓散調之半月復舊矣

燥形

臂痲不便八十九

臨城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指痲斯須半臂痲又一臂痲斯須頭一半痲比及梳畢從腋至足皆痲大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治於戴人戴人曰左手三部脈皆伏比右手小三倍此枯澁痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其痲立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚痲戴人曰病根已去此餘烈也方可針谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用霹靂中雞足法向上卧鍼三進三引訖復卓針起向下卧鍼送入指間皆然手熱如火其痲全去昔劉河間作原病式常以痲與澁同歸燥門中眞知病機者也

大便燥結九十

戴人過曹南省親有姨表兄病大便燥澁無他證常不敢飽食飲極難結實如鐵石或三五日一如圊日前屋飛鼻中血出肛門連腸痛痛極則發每服藥則病轉劇烈巴豆芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則復燥如此數年遂畏藥性暴急不服但卧病待盡戴人過診其兩手脈息俱滑實有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥使食菠菱葵菜及猪羊血作羹百餘日充肥親知見駭之嗚呼粗工不知燥分四種燥於外則皮膚皺揭燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便溺結閉夫燥之爲病是陽明化也水液衰少故如此然可下之藥當擇之巴豆可以下寒

甘遂芫花可下濕大黃朴硝可以下燥內經曰辛以潤之鹹以軟之周禮曰以滑養竅

孕婦便結九十一

戴人過東杞一婦人病大便燥結小便淋澁半生不娠惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁疏導之藥大便依常爲難臨圊則力努爲之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月弦望前後澐溺結澁甘分胎隕乃訪戴人戴人診其兩手脈俱滑大脈雖滑大以其且娠不敢陡攻遂以食療之用花滅煮菠薐葵菜以車前子苗雜猪羊血作羹食之半載居然生子其婦燥病方愈戴人曰余慶見孕婦利腸血下迫極努損胎但同前法治之愈者莫知其數也爲醫拘常禁不能變通非醫也非學也識醫者鮮是難說也

偏頭痛九十二

一婦人年四十餘病額角上耳上痛嗚呼爲偏頭痛如此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤色眩運昏澁不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類連進數服其痛雖稍愈則大便稍秘兩目轉昏澁其頭上鍼灸數千百炙連年著灸其兩目且將失明由病而無子一日問戴人戴人診其兩手脈急數而有力風熱之甚也余識此四五十年矣遍察病日者不問男子婦人患偏正頭痛必大便澁滯結硬此無他頭痛或額角是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治以大承氣湯令河水煎三兩加芒硝一兩煎殘頓令溫合作三五服連服盡蕩滌腸中垢滯結燥猶熱下泄如湯二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之菠薐葵菜猪羊血爲羹以滑之後五七日十日但遇天道晴明用大承氣湯夜盡一劑是痛隨利減也三劑之外目瞤首輕燥澤結釋得三子而終

腰胯痛九十三

一男子六十餘病腰尻脊胯皆病數載不愈晝靜夜躁大痛往來屢求自盡天年且夕則痛作必令人以手槌擊至五更雖鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作神鬼陰譴白虎韜朝將暮祝覡巫僧道禁師至則病稍去者心寂也然則痛甚人見巫覡僧道禁師至則病稍去者心寂也然去後復來者終不去其本也古之稱痛隨利減不利則痛何由去病者既痊乃舞八十歲故凡燥證皆三陽病也

寒形

因寒腰強不能屈伸九十四

北人衛德新因之析津冬月飲寒則冷病腰常直不能屈伸兩足沉重難於行步途中以牀舁遞程問醫皆云腎虛以從葷芭戟附子鹿茸皆用之大便反秘溺熱有張載人糊於醫可以問其鬼禱白虎與病乎彼若術窮可以委命其家從之戴人診其兩手脈皆沉滯堅勁力如張絃謂之曰病難瘥難於食然腰尻脊胯痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言會令人刻取之僵下一兩塊如彈丸結硬不可言會令人刻取之僵下一周將經歲矣乃乞拯於戴人戴人既得病之虛實渾身燥痒皮膚皺揭枯澁　楚片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以薑棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者問疑則悅聞寒則懼設補則從說瀉則逆此弊非一日也而況一齊人而傳之眾楚人咻之乎及煎成使稍熱嚥之從少至多累至三日天旦曉臚腸下泄四五行約半盆以盥覩之皆燥糞塊及瘀血雜穢穢不可近須臾痛減九分昏瞶鼻息調如常人睡至明日將夕始覺饑而索粥溫涼與之又困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導飲九甘露散滑利便溺之藥四十餘日乃復鳴呼再傳三十六虎書三十六日覺鳴七日而起以能捉人戴人曰病有熱者勿藥蓋

則損人目也

寒痞亦名水痞九十五

律科王敏之病寒痞膈下結聚如黃瓜每發遶臍急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散下四五行煎藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒痞本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病痞發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩捩兩掣時一腫而冷戴人診兩手脈細而弱斷之曰秋脈也此因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣礧礧不能下榮於睪丸故其寒實非寒也木受金制傳之胃土胃爲陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之經曰木鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次果覺氣和睪丸痒而暖戴人曰氣已入睪中矣以茴香木茂之藥使常服之首尾一月而愈

感風寒九十六

戴人之常發也雪中冒寒入浴重感風寒遂病不起但使煎通聖散單服之一二日不食惟渴欲水亦不多飲時時使人提其股按其腹凡三四日不食日欲水一二十度至六日有譫語妄見以調胃承氣湯下之汗出而愈戴人常謂人曰傷寒勿妄用藥惟飲水最爲妙藥但不可使之傷常令揉散乃大佳耳至六七日見有下證方可下之豈有變異哉奈何醫者禁人飲水至有渴死者病人若不渴強與水飲亦不肯飲耳戴人初病時鼻聲重頭痛小便如灰淋汁及服調胃承氣一兩半覺欲嘔狀探而出之汗出藜藜然須臾下五六行大汗一銖壯艾病人惡之乃求於戴人戴人至適巫者在其傍乃學巫者雜以狂言以誑病者至是大笑不忍同而向日乃癒當日飲冰水時水下則痰出約一二椀痰即是病也痰去則病去也戴人時年六十一壁一二日心下結塊皆散戴人曰內經言鬲則氣結喜則百脈舒和又云喜勝悲內經自有此法治之不知何用鍼灸哉適足增其痛耳

病怒不食一百

項關令之妻病食不欲食常好叫呼怒罵欲殺左右惡言不輟眾醫皆處藥幾半載尙爾其夫命戴人視之戴人曰此難以藥治乃使二娼各拳丹粉作伶人狀其婦大笑次日又令作角觝又大笑其旁常以兩箇能食之婦誇其食美其婦亦索其食而爲一嘗之不數日怒減食增不藥而瘥後得一子夫醫貴有才若無才何足靡變無窮

不寐一百二

一富家婦人憂思慮過甚二年不寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脈俱緩此脾受之也脾主思故也乃與其夫以怒而激之多取其財飲酒數日不處一法而去其人大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是而食進脈得其平

驚一百三

衛德新之妻旅中宿於樓上夜値盜劫入燒舍驚墮牀下自後每聞有鬻則驚倒不知人家人輦歸足而行莫敢有觸有年歲餘不痊諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無効戴人見而歎之曰驚者爲陽從外入也恐者爲陰從內出驚者爲自不知故也恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚伯則膽傷矣乃命二侍

女執其兩手按高椅之上當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大驚戴人曰我以木擊几何以驚乎伺少定擊之驚也緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人盡背後之簾徐徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人整其門窗自夕達曙夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不喜戴人至是終身厭服如有人言戴人不知醫者執戈以逐之

兒瘂不瘖一百四

陳州長吏一小兒病瘂而不瘖一日諸醫作睡驚治之或欲以艾火灸之或以大驚先及水銀劑子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病乃問於戴人戴人診其兩手脈皆平和戴人曰若驚風之脈當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊問乳母數日前曾飲醉酒否遽然笑曰夫人以煮酒見餉酒味甚美三飲一罌而睡陳酒味甘而戀腸酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花縮砂仁買眾前汁使飲之立醒

孕婦下血一百五

劉先生妻有娠半年因傷損下血乞藥於戴人戴人以三和湯一名玉燭散承氣湯四物湯對停加樸硝煎之下數行痛如手拈下血亦止此法可與智識高明者言高梁之家愼勿舉似非徒駭之抑又謗之嗚呼正道難行正法難用古今皆然

收產傷胎一百六

一孕婦年三十餘臨產召穩婆三人其二婆極曳婦之臂其一婆頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力為之胎死於腹良久乃下兒亦如血乃穩婆之也豈知瓜熟自落何必如此乎其婦因茲經脈斷閉腹如刀剜大渴不止小溲閉絕主病者禁水不與飲口舌枯燥牙齒黧黑臭不可聞食飲不下昏憒欲死戴人先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次以桂苓甘露散六一散柴胡飲子等調之半月養安

又一婦人臨產召村媼數人侍焉先產一脬出寖不斷輕重曳之臂為之斷子死於腹其母面青身冷汗染染不絕時徵喘嗚呼病家甘於死訣有人曰張戴人有奇見試問之戴人曰命在須臾鍼藥無及急取秤鉤繫以壯繩以膏塗其鉤令其母分兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鉤其死胎命一壯力婦倒身曳出死胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以冰水灑之漸噀二口大醒食進次用四物湯調血數日方愈戴人常曰產後無他事因侍媼非其人轉為害耳

懷恐腸痛一百七

洛陽孫伯英因誣獄妻子被繫逃於故人是夜胃脘痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人適在焉當與公同往時戴人宿酒未醒強呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔牖望見伯英曰此公受大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青股色膽受怖也後會赦乃出方告戴人

背疽一百八

一富家女子十餘歲好食紫檳每食倒二三斤歲歲如此至十餘年一日潮熱如勞戴人診其兩手脈皆浮大而有力謂之曰他日必作瘡癰毒熱上攻目陽盛陰虛臂其一媳頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力為之胎

死於腹良久乃下兒亦如血乃穩媼殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎其婦因茲經脈斷閉腹如刀剜大渴不止小溲閉絕主病者禁水不與飲口舌枯燥牙齒黧黑臭不可聞食飲不下昏憒欲死戴人先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次以桂苓甘露散六一散柴胡飲子等調之半月養安

又一婦人臨產召村媼數人侍焉先產一脬出寖不斷輕重曳之臂為之斷子死於腹其母面青身冷汗染染不絕時徵喘嗚呼病家甘於死訣有人曰張戴人有奇見試問之戴人曰命在須臾鍼藥無及急取秤鉤繫以壯繩以膏塗其鉤令其母分兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鉤其死胎命一壯力婦倒身曳出死胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以冰水灑之漸噀二口大醒食進次用四物湯調血數日方愈戴人常曰產後無他事因侍媼非其人轉為害耳

懷恐腸痛一百七

洛陽孫伯英因誣獄妻子被繫逃於故人是夜胃脘痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人適在焉當與公同往時戴人宿酒未醒強呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔牖望見伯英曰此公受大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青股色膽受怖也後會赦乃出方告戴人

背疽一百八

一富家女子十餘歲好食紫檳每食倒二三斤歲歲如此至十餘年一日潮熱如勞戴人診其兩手脈皆浮大而有力謂之曰他日必作瘡癰毒熱上攻目陽盛陰虛臂其一媳頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力為之胎

脫之證其家大怒不肯服解毒之藥不一二年患一背疽如盤痛不可忍其女忽思戴人曾有是言再三悔謝請戴人戴人以鍼鍼繞疽暈刺數百鍼去血一斗如此三次漸漸痛減腫消徹出膿而愈將作痂時使服十補內托散乃痊終身忌口然目亦終身無子

肺癰一百九

舞水一富家有二子長者年十三歲幼者十一歲皆好頓食紫檳一二斤每歲須食半月後一二年幼者發肺癰長者發肺癰相繼而死戴人嘗歎曰人之死者命耶天耶古人有詩爽口味多終作疾眞格言也天生百果所以養人非欲害人然富貴之家失教縱欲遂至於是

咽中刺塞一百十

戴人過隰陽強家一小兒約五六歲同隊小兒以蜀黍稭相擊遊芒倒刺於咽中數日不下硏藥腫大發其家告戴人戴人命取水依道經中咒水法以左手屈中指及無名指作三山印坐水盞於其上右手指印炙是金鎖印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一口吹在靜水盞中咒曰吾取老君東流順老君奉勅攝去毒水吾托大帝尊所到稱吾者各各現帝身急急如律令攝念七遍吹在盞中虛攪卓三次為定其兒嚥水下咽曰我可也三五日腫散乃知法亦有不可不可侮者

誤吞物咽中一百十一

一小兒誤吞一錢在咽中不下諸醫皆不能取亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂劃其端作鬍鬚之狀又別取一箸蘸鉄鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之覺鈎入於錢緊然後以紙卷納之咽中與鈎失相抵豎

鈎尖入紙卷之端不礙肌肉提之而出

腸澼下血一百十二

棠谿樂彥剛病下血醫者以藥下之默默而死其子企見戴人而問之曰吾父之死竟無人知是何證戴人曰病剝其心也心主行血故被剝則血不禁若血温身盛者死火數七死必七日治不當下若下之不滿數企曰四日死何謂痛剝心戴人曰智不足而強謀力不足而強與心安得不剝也樂初與邢爭屋不勝遂得此病企由是大服拜而學醫

水腫舉九一百十三

霍秀才之子年十二歲舉九一旁腫脛戴人見之曰此因驚恐得之驚之爲病上行則爲喘血下則腎傷而爲水腫以琥珀通經散一瀉而消散

伏驚一百十四

上梁卜家一男子年二十八歲病身弱四肢無力面色蒼黃左脇下身側上下如臂狀每發則痛無時食不減大便如常小便微黃已二三載矣諸醫計窮求戴人治之觀其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經也張曰甲膽乙肝故青其黃者脾也診脈小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎緣水病人曰昔曾屯軍被火自是而疾戴人夜以舟車百五十九游川散四五錢加生薑自然汁平旦果下綠水四五行或問大加生薑何也答曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之比前藥減三之一又下綠水三四行痛止思食反有力戴人謂卜曰汝妻亦當病卜曰太醫未見吾妻何以知之曰面色此幾年矣卜省曰當被火時我正在草堂中熟寐人驚喚我睡中驚不能言火已聚門我父曳出我火中今五年

矣張曰汝膽從火驚甲乙乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食而穀穀熱雖能化穀其精氣不完汝必無子蓋毀經反損婦人汝妻必手足熱四肢無力經血約高二丈許上安之中等車輪其輞上壅一穴如作盆不時卜曰吾妻實如此亦已五年矣他日門人問觀內經言先瀉所不勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救於子己土能生庚金庚爲大腸咏辛者爲金故大加生薑使我木然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先通其閉塞之路是先瀉其所不勝後用豉汁調滑川散大下之次瀉其所勝也大抵陽干克陽干腑克腑臟克臟

外傷形

孕作病治一百十五

一婦人年四十餘得孕自以爲年衰多病故疾復作以告醫氏醫者不察加燔鍼於脛兩旁又以毒藥致病轉劇腹痛食減形羸已在牀枕來問戴人戴人診其脈曰六脈皆平惟右尺洪大有力此孕脈也兼擇食爲孕無疑左右皆笑之不數月生一女子兩目下各有燔鍼瘢幾喪其明凡治病婦當先問娠不可倉卒矣

杖瘡一百十六

戴人出遊道經故息城見一男子被杖瘡痛煩發毒氣入裏驚涎堵塞牙禁不開粥藥不下前後月餘百治無功甘分於死戴人先以三聖散吐青苔驚涎約半大缶次以利膈丸百餘粒下臭惡燥糞又一大缶復煎通聖散數錢熱服之更以酸辣葱醋湯發其汗斯須汗吐交出其人活矣此法可以救死

落馬發狂一百十七

一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而走

鷄言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼跳巫殊不知顧丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中廓然不遠二百里而求戴人一往戴人以車輪埋之地中約高二丈許上安之中等車輪其輞上壅一穴如作盆之狀縛狂病人於其上使之伏卧以軟稍觀之又令一人於下坐機一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斛許繞車輪數匝其病人曰我不能任可解我下從其言而解之索涼水與之冰水飲數升狂方罷

跳巫殊不知顧丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中廓然不遠二百里而求戴人一往戴人以車輪埋之地中約高二丈許上安之中等車輪其輞上壅一穴如作盆之狀縛狂病人於其上使之伏卧以軟稍觀之又令一人於下坐機一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斛許繞車輪數匝其病人曰我不能任可解我下從其言而解之索涼水與之冰水飲數升狂方罷

麻先生兄村行爲犬所囓牙至家腫如甕堅若鐵石

毒氣入裏暄不下食頭痛而重往問戴人女僊曰痛隨利減以檳榔丸下之見兩行不瘳適戴人自舞陽回謂麻曰腫如此足之二陰三陽可行平麻曰俱不可行如是何不大下之乃命夜臨卧服舟車丸百五十粒通經散三四錢比至夜半去十四行腫立消作胡桃紋反細於不傷之腫戴人曰慎勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一日戴人恐毒氣未盡又服舟車丸百餘粒瀉川散三四錢見六行病人曰十四行易當六行反難何也戴人曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥也六日其腫水盡戴人曰腫水行時不長風盡後長風也乃以愈風餅子日三服之又二日方與生肌散一傅之而成痂鴟呼用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則利藏之言非也以此知郤醫已難用醫尤難

足內腸痛一百十九

谷陽鎮兩監張仲温渴一廟觀匠者砌簷臺高四尺許因登之下臺或腸一足外踝腫起熱痛如火一醫欲以

排鍼刺腫出血戴人急止之曰脚已痛矣更加鍼二痛俱作何以忍也乃與神祐丸八九十丸下二十餘行禁食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常戴人曰吾之此法十治十愈不誣後人

膝脚皷行一百二十

葛壕馮家一小兒七八歲膝被脚皷行行則痛數日矣聞戴人不醫令人問之戴人曰小病耳教來是夜以丹車丸通經散溫酒調而下之夜半通泄膏行上吐一椀下泄半缶既上牀其小兒謂母曰膝膕痒不可往來且使服烏金丸壯其筋骨一月疾愈而走矣

枝瘡入水一百二十一

小梁袁三因强盜入家傷其兩脚外膝作瘡數年不已膿血常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延蔓瘡來求治於戴人曰爾中焦當有綠水二三升誕數掬袁曰何也戴人曰當被盜時感驚氣入腹膀胱則膀胱傷足少陽經也兼兩外膝皆少陽之部此膀之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦加喔既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經而旁入瘡中故飲水則瘡中水出乃上涌寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而瘡乾眞可怪也

內積形

傷冷酒一百二十二

戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野有以煮酒饋予者適村落無湯罷冷飲數升便覺左脇下悶漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得効戴人診其兩手脈俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二三升色如煮酒神氣不變後服和脾散去濕藥五七日百脈中和始知鍼灸無功增苦楚矣

心下沉積一百二十三

顯廢寺僧應公有沉積數年雖不卧牀枕每於四更後心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以爲常人莫知爲何病以藥請於戴人戴人令涌出膠涎一二升如黑漆水繼出黃綠水又下膿血數升自爾胸中如失巨山飲食無算安眠至曉

茶癖一百二十四

一編倡好茶成癖積在左脇戴人曰此與肥氣頗同然瘡瘡不作便非肥氣雖病十年不勞一日況兩手脈沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉可享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以木如意揣之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩

腹脹水氣一百二十五

楚丘張承應年幾五十腹如孕婦面黃貧瘦欲作水氣

金 考城張從政著

內積形

傷冷酒一百二十二

戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野有以煮酒饋予者適村落無湯罷冷飲數升便覺左脇下悶漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得効戴人診其兩手脈俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二三升色如煮酒神氣不變後服和脾散去濕藥五七日百脈中和始知鍼灸無功增苦楚矣

心下沉積一百二十三

顯廢寺僧應公有沉積數年雖不卧牀枕每於四更後心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以爲常人莫知爲何病以藥請於戴人戴人令涌出膠涎一二升如黑漆水繼出黃綠水又下膿血數升自爾胸中如失巨山飲食無算安眠至曉

茶癖一百二十四

一編倡好茶成癖積在左脇戴人曰此與肥氣頗同然瘡瘡不作便非肥氣雖病十年不勞一日況兩手脈沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉可享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以木如意揣之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩

腹脹水氣一百二十五

楚丘張承應年幾五十腹如孕婦面黃貧瘦欲作水氣或令服黃芪趕中湯及溫補之劑小溲涓閉從戴人療焉戴人曰趕中湯攻表之藥也古方用之攻裏已誤也今更以此取積兩重誤也先以涌劑吐之宜火於其旁大汗之次與猪腎散四錢以舟車丸引之下六缶殊不困續下兩次約三十餘行腹平軟健啖如昔常仲明曰向聞人言瀉五六缶人豈能任及聞張承應輩云誠然乃知養生與攻病本自不同今人以補劑療病宜乎不効

疰氣一百二十六

王事村一童子入門狀如鞠躬而行戴人曰疰氣也令解衣擣之二道如筯其家求療於戴人先刺其左如刺重紙剉然有聲而斷令按磨之立軟其右亦然觀者咸嗟異之或問曰石關穴也

胸膈不利一百二十七

沈丘王宰妻病胸膈不利曰流涎沫自言咽下胃中常雷聲心間作微痛又復發昏胸乳之間灸瘢如碁化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人療藥不損來求之一涌而出霉白亘一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者忽面斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐宮人髮瘕一同亟出立安

冷疾一百二十八

戴人過蔪都營中飲食鄰席有一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦爲室女心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如水聚來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿憂也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脈沉而遲尺脈洪大而有力非撫于之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐涎

一斗心下平軟次服白丸調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而瘕二子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不誣矣

積塊一百二十九

藥苗劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕諸法無措戴人令一月之內淋四次下六次所去疾約一二桶其中不化之物有如葵菜者爛魚腸之狀淋時以木如意搊之覺病積如刮漸漸而平及積之既盡塊痕反罹如日畧無少損至是而面有童色經水既行若當年少可以有子

肥氣積六一百三十

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐臥鍼灸罔矣徒勞力耳乃散遨戴人而問之既至斷之曰此肥氣也得之季夏戊己日在左脇下如覆杯久不愈令人發瘧瘧者寒熱也以瓜蒂散吐之魚腥甚疑約一二缶至夜纖用舟車丸通經散投之五更黃沫膿水相半五六行凡有積處皆覺痛後用白术散當歸散和血流經之藥如斯通泄凡三四次而方愈

伏瘕一百三十一

忻梁曹大使女年既笄病血瘕數年太醫宜企賢以破血等藥治之不愈企賢曰除得陳州張戴人方愈一日戴承詔至忻京曹大使乃邀戴人問焉戴人曰小腸遺熱於大腸爲伏瘕故結硬爲塊而黃不月乃用通泄之法有數年之疾不再旬而効女由是得聘企賢問誰治之曹大使曰張戴人企賢立使人邀之

停飲一百三十二

一婦從年少時因大哭罷痛飲冰水困卧水停心下漸發痛悶醫氏咸以爲冷積治之以温熱劑及禁食冷物一悶茶氣病轍內作如此數年燦鐵燒艾瘡孔數千十餘年後小便赤黃大便秘悶兩目如昏積水轉甚漸於兩脇世謂水癖或謂支飲硏簇茂攻磨之藥竟施之矣食日衰積日茂上至鳩尾旁至兩脇及臍下但發之時按之如水聲心膜結硬手不可近者月發五七次甚則欲死諸藥皆厭二十餘年求戴人發藥診其脈寸口獨沉而遲此胸中有痰先以瓜蒂散涌痰五七升不數日再越痰水及斗又數日上涌數升凡三涌三下汗如水者亦三其積皆去以流爇飲之藥調之月餘大瘥

積氣一百三十三

寄西華縣岸山東顏先生有積二十年目視物不眞細字不覩當心如頑石每發痛不可忍食減肉消黑黔痛面腹不能直固遇戴人令涌寒痰一大椀如片粉夜以舟車丸通經散下爛魚腸葵菜汁七八行病十去三四以熱糜粥投之復去痰一盆次日又以舟車丸通經散下前後百餘行略無少困不五六日面紅黔去食進目明心中空曠遂失頑石所在旬日外來謝

沉積疑胎一百三十四

修弓杜匠其子婦年三十有孕已歲半矣每發痛則召待媪待之以爲將產也一二日復故凡數次乃問戴人戴人診其脈滯而小斷之曰塊病也非孕也脈訣所謂滯脈如刀刮竹形主丈夫傷精女人敗血治之之法有病當瀉之先以舟車丸百餘粒後以調胃承氣湯加當歸桃仁用河水煎乘熱投之三兩日又以舟車丸桃仁

承氣湯瀉青黃膿血雜然而下每更衣以手向下推之採之則出後三二日又用舟車丸以猪腎散佐之一二日又以舟車丸通經如前數服病十去九俟晴明當未食時以鍼瀉三陰交穴不再旬塊已沒矣此與隔腹視五臟者復何異哉

是胎非積一百三十五

翫王之妻病臍下積塊嘔食面黃肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無効戴人見之曰孕也其人不信再三求治于戴人與之平藥以應其意終不肯下毒藥後月到果脫也人問何以別之戴人曰尺脈洪大也素問陰陽別論所謂陰搏陽別之脈

外積形

瘤一百三十六

戴人在西華衆人皆訹以爲吐瀉一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘤正當目之上網內眥色如灰李下垂覆目之睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立去此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾去此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非刀割別有一術焉其人從之乃引一小室中令俛卧一牀以繩束其肘刺乳中大出血先令以手揉其目瘤上亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎

膠瘤一百三十七

鄆城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類雞距一類角丸腕不能鉤向明望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背爲膠瘤在面者爲粉瘤此膠瘤也以鈹鍼十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法矣

癭一百三十八

新婦人年四十餘有癭三瓣戴人令以喊吐之三涌三汗三下癭已半消次服化癭之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

痔一百三十九

趙君玉當病痔鳳眼草刺蝟皮槐根鯉首之類皆用之或以乾薑作末塗猪肉炙食之大便燥結不利且痛後數日因病黃大涌瀉數次不言痔作麻先生偶記而書之君玉自識戴人之後痔更不發耳

雜記九門

誤中涌法　噦

張板村鹿子春一小兒七八歲夏月病噦藥食入欲涌之子春以爲兒幼弱懼其不勝少許之一日飲酒家人與之酒傷多乃大吐吐定而噦止蓋酒味苦苦屬酒劑子春乃大悟戴人之言也

疥

貨生藥焦百善云有羌夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言可治疥煎一椀服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

赤目

一小兒名德孫眼發赤其母買銅綠欲洗兒目煎成家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開

感風寒

焦百善偶感風寒肚熱頭痛其巷人點蜜茶一椀使啜之焦因熱服之訖偶思戴人語曰凡苦味皆能痛百善兼頭痛是病在上試以筋探之吐畢其痛立解

誤中寒涼　經閉

一婦人年二十餘歲病經閉不行寒熱往來亦嗽潮熱唐醫藥切無物可食一日當暑出門忽見賣涼粉者以冰水和飲大爲一食頓覺神清骨健數月經水自下

下血

一男子臟毒下血當六月間熱不可堪自甘於死忽思冰壺水猛捨性命飲一大盂痛止血住

痢

一男子病膿血惡痢痛不可忍忽見水浸甜瓜心酷嗜之連皮食數枚膿血皆已人言下痢無正形是何言也人止知痢是虛冷溫之補之澁之截之此外無術矣豈知風暑火濕燥寒六者皆爲痢此冰蜜甜瓜所以効也

臨變不惑涌法

戴人在西華夏公宅其僕鄭驢病法當吐命女僮下藥藥失不製又用之太多涌之不出反悶亂不醒乃告戴人戴人令以薪賈馬槽既平舁鄭驢卧其上倒垂其頭須臾大吐吐訖而快戴人曰先宜少進不涌旋加

西華一老夫病法當吐令門人繼景先下藥景先初學其人不吐反下走二行乃告戴人戴人令取溫鹽汁飲二碗再下涌藥一錢以雞翎探之乃吐既藥行方大吐吐訖又安戴人曰凡用吐藥先以鹽汁一碗橫截之藥既咽下待少頃其雞翎勿令離口酸苦鹹雖能吐人然不撥何由出也

李仲安宅四婦人病同日下涌劑煜燦室中火兩盆其一婦人發昏衆人皆驚戴人笑曰內火見外火故然舁之門外使飲冰雪水立醒時正雪晴戴人曰熱見寒則醒衆由是皆服非老手識練必不能鎮衆人之驚也

噦

楊壽之妻病噦十餘年法當吐之一日不止以鷹香湯止之夜半猶不定再止之明旦頗覺惡心更以人參湯止之二日稍寧自下藥凡三來問戴人不願謂戴景先曰病久噦藥已擒病自然遲解涌後調理數日乃止戴人常言涌後打噦快者有徐快者有反悶悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵三日後無不快者凡下不止者以冰水解之凡藥熱則行寒則止矣

當禁不禁　病愈後犯禁而死

孟太亨病腫既平當節食及鹽血房室等不慎病再適戴人歸家無救之者乃死

鄜城崔德剖病勞嗽戴人曰愈後當戒房事其病愈恃其安劇禁而死死後妻生一子正當病瘵之日也董初堅諱至是乃彰

一官家小兒病痢自鄜頭車載至朱葛寺入門而死戴人曰有病遠行不可車載馬馱病已擾矣又以車馬動搖之是爲重擾其卽死

陽夏韓氏爲犬所嚙大痛不可忍偏痺燥自庄頭載至家二十里一夕而死時人皆不知車之誤也戴人常言傷寒之後忌薑肉房事勞水腫之後禁房及油鹽滋味等三年滑泄之後忌油膩此三者決不可不禁也戴人常曰病久否閉忽得通泄氣血冲和心腎交媾陽事必舉尤切戒房室元氣新至犯之則病再作恐斃於涌泄

不忌反忌　不忌口得愈

一男子病泄十餘年昔蔻阿膠訶子龍骨烏梅枯礬皆用之矣中脘臍下三里歲歲灸之皮肉皺槁神昏足腫泄如牀水日夜無度戴人診其兩手脈沈且微曰生也病人忽曰羊肝生可食乎戴人應聲曰羊肝止泄尤宜服病人悅而食一小盞許可以漸粥送之病人飲粥數口幾半升續又食羊肝生一盞許次日泄幾七分如此月餘而安此皆忌口太過之罪也戴人常曰胃爲水穀之海不可虛怯虛怯則百邪皆入矣或思蕈菇雖與病相反亦令少食圖引漿粥此權變之道也若專以淡粥責之則病人不悅而食減久則病增損命世俗詼人矣

不可忌口

高按常孤

戴人常曰人言我不接衆工戴人曰余豈不欲接人但道不同不相爲謀醫之善惟素問一經爲祖有平生不識其面者有看其文不知其義者此等雖日相親欲何說止不過求一二藥方而已矣大凡藥方前人所以立法病有百變豈可執方設於富貴之家病者數工同治戴人必不能從衆工衆工亦不能從戴人以此常孤惟書生高士非者復來日不離門戴人又曰我之術止可以教書生不能授醫者忽授老書生曰我是書生豈不知書生書生固多許可以易慢戴人子治病故有是言若親見子治病數十人自反思矣凡謗我者皆望風取信於羣醫之口也孔子曰浸潤之譖不行焉可謂明也已矣

羣言難正　謗吐

或言人有病不可吐人身骨節皆有凝若吐出骨節間然則岐伯亦狂人乎大抵舉綱則簡詰目則繁

謗峻藥

或言戴人用藥皆峻激乃本草中下品藥也豈可服哉

戴人曰甚矣人之不讀書本草言上藥爲君中品爲臣下品爲佐使者所以辯其性剛柔也內經言所謂君臣佐使者非本草中三品之謂也主治之爲君次君之謂臣應臣之爲佐使假如大黃能治此病則大黃爲君甘遂能治此病則甘遂爲君矣若專以人參芪苓治人之邪氣此庸工所以常誤人命也李嗣榮言京中閉人云戴人醫殺二婦遂辭太醫之職而去又有人云背負醫之領袖無以養生及其歸也謗言滿市皆曰戴人醫殺倉使耿四而去時倉使以病卒與余未嘗通姓名耿四病嗽咯血會問戴人戴人曰公病消困不可峻攻宜以調養戴人已去後而卒矣麻先生乃知李嗣榮所言皆誣也凡余所治之病皆衆壞之證將危且死而治之死則當恐於戴人又戴人所論按經切理衆誤皆露以是嫉之又戴人治病多用峻激之藥將愈未愈之間戴人去羣醫毀之曰病爲戴人攻損急補之遂用相反之藥可暫用我方攻疾豈欲常服哉疾去則止藥若果欲養氣五穀五肉五菜非上藥耶亦安在枯草死木之根莢哉謗之謗之該哉

病人負德愈後吝財

南鄉刀鑷工衛氏病風半身無汗已再中矣戴人以三法療之尋愈恐其求報乃紿曰余夜夢一長鬚人鐵余

左耳故僉亟者武媼年四十病勞三年羸瘦不足觀請醫技絕適五六月間求治願奉白金五兩戴人治之五六日而安止答以白金三兩乃曰一道士投我一符焚而吞之乃痊如此等人不可勝計若病再作何以求治至有恥前言而不復求治療而殺其身者此所以世之庸工當正病時以犀珠龍腦丁沈木乳乘其急而巧取之然君子博愛賢愚亦不當効若輩也

同類始平　羣口誣戴人

有扶救之功如死我則有攻擊之罪明者不可不察也

儒門事親撮要圖卷十

難素撮要究治之圖

太初之氣始乎丙小腸包絡丁心心小腸
太易之氣見乎未甲膽三焦寅相火手少陽
太始之形始乎庚大腸胃己脾膵卯燥金手陽明
太素之質始乎壬膀胱腎肝膀胱癸腎脾也辰巽水手太陽
戊胃肺手太陰
乙肝大膽也巳風木足少陽
丑濕土足太陰
酉燥金足陽明
亥風木足厥陰
子君火足少陰
午君火手少陰
未濕土手太陰
申相火足少陽
戌寒水足太陽

識病用藥之圖

極

從是動則病者　其氣之所感也
違寒可吐之而已也
從地之濕氣感則病　違天之邪感則害人五臟肝心脾肺腎實而不滿虛而不可下之而已也
其氣害人皮肉筋脈肌膚從外而入可下之而已也
則所生病者血　則水穀之寒熱感則害人六腑膽胃三焦膀胱大腸小腸也

治法撮要究病之圖

太

和　人六腑膽胃三焦膀胱大腸小腸

則　水穀之寒熱感則害人五臟肝心脾肺腎實而不滿

氣　人五臟肝心脾肺腎實而不滿

其　天之邪感則害人

從　是動則病者

天地六元之圖

天此象左天　屬
地論　屬右二位人　屬
六元大虛天面　風雲萬物之路地面黃泉
位無　金火合德　火
藏此　為金主清君火主熱風木主溫相火主稼熟濕土主涼寒水主寒　水木火合德　火
象圖　兼二合德　水
之添肺上焦象天心包絡肝中焦象人脾下焦象地腎黃泉

圖之下絡大腸下絡小腸下絡膻中絡脾絡胃絡膀胱下絡腎系絡膀胱

外有風寒暑濕屬天之四令無形也
內有饑飽勞逸屬天之四令有形也
一者始因氣動而內有所成者謂積聚癥瘕痕瘤氣瘿起結核狂癲癇疏曰癥堅也積也痕氣血也
二者始因氣動而外有所成者謂癰腫瘡瘍疥癬疽痔掉瘈浮腫目赤瘭瘂腑腫痛痒之類是也
三者不因氣動而病生于內者謂留飲癖食饑飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也
四者不因氣動而病生于外者謂瘡氣賊魅虫蚘蟲毒伏尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射割刺之類是也

風木鬱之病
故民病胃脫當心而痛四肢兩脇咽膈不通飲食不下甚則耳鳴眩轉目不識人善僵仆筋骨強直而不用卒倒而無所知也

暑火鬱之病
故民病少氣瘡瘍癰腫脇肋胸背首面四肢膜胭脘胻瘍瘃嘔逆瘈瘲及有動泄注下溫瘧腹中暴痛血溢流注精液妄少目赤心痛甚則瞀悶懊惱善忘死也

濕土鬱之病
故民病心腹脹腹鳴而寫數後甚則心痛脇膜嘔逆霍亂飲發注下肘腫身重脾熱之生也

燥金鬱之病
故民病欬逆心腹滿引少腹善暴痛不可反側嗌乾面塵色惡金勝而木病也

寒水鬱之病
故民病寒客心痛腹椎痛大關節不利屈伸不便善厥

痞堅腹滿陰乘陽故也

初之氣

自大寒至立春春分厥陰風木之位陽用事而氣微故曰少陽得甲子元頭常准以大寒交初之氣分以六周甲子以應六氣下傚十月正月二月少陽三陰三陽亦同

二之氣

春分至小滿少陰君火之位陽氣清明之間又陽明之位

三之氣

小滿至大暑少陽相火之位陽氣發萬物俱成故亦云太陽旺其脈洪大而長天氣并萬物人脈盛成造物造化亦同

四之氣

大暑至秋分太陰濕土之位天氣所感夏後陰已用事故曰太陰旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異矣脈緩大而長燥金旺緊細短濇以萬物乾燥明可見矣

五之氣

秋分至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故云金氣旺其脈細而微

終之氣

小雪至大寒太陽寒分之位陰極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也

風木肝酸　達鍼

與膽爲表裏東方木也色青外應目主治血芍藥味酸微寒澤瀉鹹平烏梅酸熱

諸風掉眩皆屬於肝木主動治法曰達者吐也其高者因而越之可刺大敦灸亦同

君火心苦　發汗

與小腸爲表裏南方火色外應舌主血運諸經大黃苦寒木香苦溫黃連苦涼沒藥苦熱

諸瘧痒瘡瘍皆屬於心火治法曰熱者汗之合其疎散也可刺少衝灸之亦同

濕土脾甘　奪鍼

與胃爲表裏中央土也色黃應唇主肌肉應四時蜜甘涼甘草甘平

諸濕腫滿皆屬于脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白灸亦同

燥金肺辛　清鍼

與大腸爲表裏西方金也色白外應皮毛鼻亦行氣乾薑辛熱生薑辛溫薄荷辛涼

諸氣憤鬱皆屬于肺金治法曰清者清腦利小便解表可刺少商灸亦同

寒水腎鹹　折鍼

與膀胱爲表裏北方水也色黑外應耳主骨髓牡蠣鹹寒

寒水蛭鹹寒

諸寒收引皆屬于腎水治法曰折之謂抑之制其衝逆可刺涌泉灸亦同

大寒子上初之氣

初之氣爲病多發欬嗽風痰風厥痙痛痺塞口鳴半身不遂失音風癲風中婦人胸中留飲兩脇腹微痛嘔逆惡心旋運鬱悸狂陽心風搐搦顫掉初之氣病宜以瓜蒂散吐之在下泄之

春分卯上二之氣

二之氣爲病多發風溫風熱經曰風傷於陽濕傷於陰微頭痛身熱發作風溫之候風傷於衛氣也濕傷於脾氣也是以風溫爲病陰陽俱自淨汗出身重多眠鼻息語言難出此已上二證不宜下若與巴豆大毒丸藥熱證併生重者必死二之氣病宜以桂枝麻黃湯發汗而已

小滿巳上三之氣

三之氣爲病多發熱皆傅足經者多矣太陽陽明少陽太陰少陰厥陰陽者發熱惡寒頭項痛腰脊強陽明身熱目疼鼻乾不得卧少陽者胸脇痛耳聾口苦寒熱往來而嘔此三陽屬熱太陰者腹滿咽乾手足自温自利不渴或腹滿時痛少陰者故口燥舌乾而渴厥陰者腹滿囊縮喘熱閉氣四肢厥冷爪甲青色三之氣病宜以清涼上温下養不宜用巴豆丸下之

大暑未上四之氣

四之氣爲病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉下痢及赤白相雜水穀不分消腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾腹滿氣痞手足無力小兒亦如此四之氣病宜瀉泄五穀之類

秋分酉上五之氣

五之氣爲病多發喘息嘔逆欬嗽及婦人寒熱往來瘧瘕痔消渴中滿小兒班瘡瘡疱五之氣病宜以大小柴胡湯宜解治表裏之類

小雪亥上終之氣

終之氣爲病多發風痰風寒濕痺四肢多收引冬水復旺水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則收則痿厥弱無

以運用水液澄清冷大寒之疾積滯痰塊寒痼血瘕凡氣之疾熱之氣病宜破積發汗之類

肝經之足厥陰風乙木

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癪疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是肝所生病者頭遺溺閉癃爲此諸病

膽之經足少陽風甲木

是動則病口苦善大息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛額痛目內眥痛缺盆中腫痛液下腫馬刀俠癭汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病

心之經手少陰暑丁火

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛爲此諸病

小腸經手太陽暑丙火

是動則病嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛爲此諸病

脾之經足太陰濕己土

是動則病舌本强食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸不能臥强立股膝內腫厥足大指不用爲此諸病

胃之經足陽明濕戊土

是動則病濯濯振寒善呻數欠顏黑歪則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是爲骭厥是主血所生病者狂瘧温淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臗腫痛循脛乳氣衝股伏兎骭外廉足跗上皆病中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善饑䐜色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿爲此諸病

心包絡手厥陰爲母血

是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病

三焦經手少陽爲父氣

是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳眥痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用爲此諸病

大腸經手陽明燥庚金

是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復爲此諸病

肺之經手太陰燥辛金

是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀此爲臂厥是主肺所生病者欬上氣喘渴煩心胸滿臜臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變爲此諸病

腎之經足少陰寒癸水

是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝坐而欲起目眩眩如無所見心如懸若饑狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛爲此諸病

膀胱經足太陽寒壬水

是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結踹如裂是爲踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭顙項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕踹脚賁痛小指不用爲此諸病

風治法風淫于內治以辛涼佐以甘苦以甘緩之以辛散之

防風通聖散　天麻散　防風湯　祛風湯

小續命湯　消風散　排風湯

暑治法熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

白虎湯　桂苓湯　玉壺丸　碧玉散

玉露散　石膏湯

濕治法濕淫于內治以苦熱佐以鹹淡以苦燥之以淡泄之

白术木香散　桂苓白术丸

葶藶木香散　益元散

火治法火淫于內治以鹹寒佐以甘辛以酸收之以苦發之

凉膈散　解毒丸　五苓散

八正散　調胃散　神助散

燥治法燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦下之

神功丸　麻仁丸　神功丸

脾約丸　大小承氣湯

潤體丸　潤腸丸　四生丸
夢感散
寒治法寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之
薑附湯　四逆湯　二薑湯
朮附湯　大戊己丸　附子理中湯
六門病證藥方
風門獨治於內者
防風通聖散　防風天麻丸　防風湯
小續命湯　消風散　祛風丸
承氣湯　陷胸湯　神芎丸
大黃丸　備急丹
暑門獨治於外者
白虎湯　桂苓甘露散　化痰玉壺丸
益元散　玉露散　石膏散
拔萃散　水澄膏　魚膽丸
金絲膏　生肌散
濕門兼治於內者
五苓散　藿感木香散　白朮木香散
益元散　大橘皮湯　桂苓白朮丸
神助散　大柴胡湯　小柴胡湯
柴胡飲子　防風通聖散　防風當歸飲子
火門兼治於外者
凉膈散　黃連解毒湯　瀉心湯
神芎丸　八正散　調胃散
調胃承氣湯　桂苓湯　麻黃湯
小建中湯　升麻湯　五積散

燥門先治於內後治於外者
神芎丸　脾約丸　麻仁丸
潤體丸　四生丸
謂寒藥攻其裏大黃兼牽牛之類
謂熱藥攻其表桂枝麻黃升麻之類
薑附湯　四逆湯　二薑湯
寒門先治於外後治於內者
大已寒丸　理中丸
謂熱藥攻其表　謂寒藥攻其裏
內經濕變五泄　六氣屬天無形風暑濕火燥寒
五形濕屬戊己濕入肺經爲實
六味屬地有質酸苦甘辛鹹淡
五藏濕屬脾胃濕入大腸爲虛
胃泄風濕
夫門泄者飲食不化完穀出色黃風乘胃也宜化劑之類
脾泄暑濕
夫脾泄者腹脹滿注寶則生噫逆三證宜和劑淡劑甘劑分劑之大劾
劑清劑之類
大腸泄燥濕
夫大腸泄者腸鳴切痛先宜寒劑奪之次甘劑分其陰陽也
小腸泄熱濕
夫小腸泄者溲而便膿血少腹痛宜寒劑奪之淡劑甘劑分劑之類
大痕泄寒濕
夫裏急後重數至圊而不能便先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之或壅中痛亦同
金櫃十全之法
殮泄春傷於風夏必殮泄暮食不化亦成殮泄風而殮泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類
洞泄春傷於風邪氣留連乃爲洞泄瀉下褐色治法同上又宜次分水穴濕氣在下又宜以苦劑越之
洞泄寒中　洞泄寒中俗呼曰休息痢洞泄屬甲乙風木可次氣海水分三里慎勿服峻熱之藥小便澀則生
霍亂　吐瀉水穀不化陰陽錯亂可服淡劑調以冰水令頓服之則愈
注下　火氣太過宜凉劑又宜淡劑調水水令頓服之則愈此爲暴下不止也
腫蠱　三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體否腫宜越
劑發劑奪劑
臌脹　濁氣在上不散可服木香檳榔丸青皮陳皮厚大腸爲濁氣逆肺金爲清氣化則愈矣
腸鳴　燥濕相搏爲腸鳴中有濕亦爲腸鳴火濕相攻亦爲腸鳴治法同上治之大劾
支滿鬲痛　上滿而後泄下泄而後復上滿治法同上
久則反寒治法同寒中如鶩溏而腸寒者亦斯義風濕亦有支滿者
腸澼　大小便膿血治法同上又宜不二丸地榆散駐車丸及車前子等藥次宜淡劑甘劑分劑之類
臟毒　下血治法同上又宜苦劑奪劑以苦燥之如酒毒下血同
大小便血　大小便治法同上血溫身熱者死火之成

數七日而死如屍臭者不治

脫肛　大腸熱甚也用酸漿水煎三五沸稍熱洗三五度次以苦劑堅之則愈

廣腸痛　治法同上又大黃䗪牛丸散奪之法燥濇亦同痔漏廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法

乳痔腸風必肛門左右有核內經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔屬大腸經可服枳殼之屬大痔生腸風乳痔相連

金櫃十全五泄法後論

天之氣一也一之用爲風火燥濕寒暑故濕之氣一也相乘而爲五變其化在天爲雨在地爲泥在人爲脾甚則爲泄故風而濕其泄也脾燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也大寒若胃不已變而爲飧泄飧泄不已變而爲洞泄洞泄不已變而爲腸澼腸澼不已變而爲腸鳴腸鳴不已變而爲支滿支滿泄此燥乘濕之變也若小腸泄不已變而爲腸澼不已變而爲厥毒厥毒不已變而爲前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已變而爲脫肛脫肛不已變而爲乳痔腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾況脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脈微且小者生浮大者死水腫則反是浮大者生沉細者死夫病在裏脈沉在表脈浮裏當下之表當汗之下痢而脈浮滑水腫者脈沉細表裏俱受病故不治也凡臟

血便血兩手脈俱弦者死脈俱滑大者生血去而外透也死王太僕則曰若下血而身熱血溫是血去而外透也血屬火故也七日而死者火之成數也夫飧泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽木受邪暴下綠水蓋謂戊已見伐於甲木也嬰兒泄綠水素問有嬰兒風理亦如之洞泄者殘泄之甚但殘泄近於洞泄洞泄久則寒中溫之可也治法曰和之則可也汗之則不可蓋在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而勿爭水腫之作者未遽而然也由濕遍於大腸小溲自清水濕既滿膪滿日倍面黃腹大胕體如泥濕氣遍身是專一法越其高而奪其下發其表而滲其中被收而幸其餘如是散淡滲而苦堅用攻劑以救其甚緩劑以平其餘則孤精得氣獨魄反陽亦可保形陳壺丟而淨府潔矣彼豆蔻烏梅罌粟囊勿噤用也設病形一變必致大悞或通而塞或寒而通塞塞通通豈限一法世俗止知寒劑之能塞而不知通劑之能塞者掩於方也凡治濕皆以利小溲爲主諸泄不已宜灸水分穴謂水道行之候也

凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌而下泄表汗而裏攻半在表半在裏則宜和解之表裏俱見醍醐證滲泄此雖以治傷寒其於治濕也同仍察脈以視深淺問年壯以視虛實所投必如其意矣頃商水縣白堤酒監單昭信病殘泄逾年不愈此邑劉繼先命予藥之爲桂枝麻黃湯數兩一劑而愈因作五泄圖摭難素本意書錄于上刊而行之誠有望于後之君子戴人張子和述已上之圖校改爲篇法

儒門事親卷十一

金 考城張從政著

風論

論曰人之生也負陰而抱陽人居一氣道在其中矣外有八邪之相盪內有喜怒之交侵眞氣內奪風邪襲之風之傷人或爲寒熱或爲疼痛或爲偏枯或爲拘攣其候不一風者善行而數變此乃風者百病之始萬病之長也蓋內不得通外不得泄此諸之病生於變亂也或失音而昏冒或口目而喎斜可用二聖散吐之或不知人事者或牙關緊急者粥不能下不能嚥者煎三聖散吐之或不知鼻內灌之吐出涎沫口自開也次服無憂散通解九通聖涼膈人參半夏九桂苓甘露散消風散除濕潤筋養液之藥排而用之切忌雞猪魚兎油膩酒醋麪動風之物及引痰之食

大凡頭風眩暈手足麻痺胃脘發痛心酸滿悶按之有聲皆因風寒濕三氣雜至合而爲痺也在上謂之信飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛涼之藥通聖散加半夏之辛仲景云此痰結胸中而致也

大凡風癇病發瞑強直視不省人事此乃肝經有熱也或有咬牙者先用葶藶苦酒湯吐之吐後可服瀉青丸下之次服加減通聖散現咬牙證用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬礞石代赭石發過來飲調之經云重劑以鎮之

大凡人病雷頭懶子俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得之卽爲首風此因邪風在於胸中熱甚化而爲痰風之所致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤脈結核或面熱無汗經云火鬱發之開導之決之可用鉄銚出血則愈盛極經云奪血者無汗奪汗者無血血汗俱竭豈不妙哉衰老者可用涼膈解毒消風散熱爲治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛氣血宣通便無壅滯而愈

凡人患目腫經年不瘥俗言頭風所注更加頭痛者豈非頭風者歟此乃足厥陰肝之經手少陰心之極兼五臟俱有大熱也可先用通解九通利大小便大黃越桃飲子治肝熱者差活決明散服之大有神效驗矣

凡目有淚出俗言作冷淚者非也內經曰肝液不禁此人事者或牙關緊急者粥不能下不能嚥者煎三聖散吐之或不知鼻內灌之吐出涎沫口自開也次服無憂散通解九通可以愈也治外以具母一法若無藥之處可用酸蘘汁一大椀煎三五沸去菜葉飲訖候少時用釵子咽喉中探吐如此三次再煎葱醋湯投之衣被蓋覆汗出而瘥內經曰酸苦涌泄爲陰傷寒三日頭痛身熱病在上宜涌之涌後以淡粥養之

又一法用風凰散嗑於鼻內連嚏二三十次嗑藥時坐于煖室中嚏罷以糜粥投之衣被蓋之汗出而愈嚏者去風散熱之劑可用當歸飲子服之

凡人病痰發者其證不一蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰涕痰諸痰皆因風寒濕三氣雜至合而爲痺也在上謂之信飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛涼之藥通聖散加減通聖散現咬牙證用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬礞石代赭石發過來飲調之經云重劑以鎮之

凡人病雷頭懶子俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得之卽爲首風此因邪風在於胸中熱甚化而爲痰風之所致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤脈結核或面熱無汗經云火鬱發之開導之決之可用鉄銚出血則愈盛極經云奪血者無汗奪汗者無血血汗俱竭豈不妙哉衰老者可用涼膈解毒消風散熱爲治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛氣血宣通便無壅滯而愈

凡人患目腫經年不瘥俗言頭風所注更加頭痛者豈非頭風者歟此乃足厥陰肝之經手少陰心之極兼五臟俱有大熱也可先用通解九通利大小便大黃越桃飲子治肝熱者差活決明散服之大有神效驗矣

凡目有淚出俗言作冷淚者非也內經曰肝液不禁此人事者或牙關緊急者粥不能下不能嚥者煎三聖散吐之或不知鼻內灌之吐出涎沫口自開也次服無憂散通解九通可以愈也治外以具母一法若無藥之處可用酸蘘汁一大椀煎三五沸去菜葉飲訖候少時用釵子咽喉中探吐如此三次再煎葱醋湯投之衣被蓋覆汗出而瘥內經曰酸苦涌泄爲陰傷寒三日頭痛身熱病在上宜涌之涌後以淡粥養之

又一法用風凰散嗑於鼻內連嚏二三十次嗑藥時坐于煖室中嚏罷以糜粥投之衣被蓋之汗出而愈嚏者去風散熱之劑可用當歸飲子服之

凡男子婦人小兒手足麻痺肌肉不仁者風寒濕三氣相雜至合爲痺先用黃芩芍藥湯吐之吐訖次用通解九通經而瀉之瀉訖更用辛甘之劑汗之汗瀉之後可用當歸清涼飲子兼烏荊九除濕丹和血行經之藥則愈矣

凡人病痰證發者比前論更多有三證頻證共成五也一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰諸痰在日上焦毒熏於頭者諸陽之會首也故令病人頭重目澁涕唾稠粘或咳嗽喘滿時發寒熱可用亦小豆

湯吐之吐後各隨其證而治之可服消風去熱導濕化痰者可服通聖加半夏導氣之劑豈不妙哉如新感風痰者形寒飲冷熱痰者火盛制金溫痰者停飲不散可服加減連翹飲子除濕丹無憂散亦有酒痰者解毒三聖丸主之五者食痰可用漢防巳丸丹砂選而用之若仿法服之決有神效

論火熱二門

凡傷寒中風溫疫時氣冒暑感四時不正之氣人或感之始于巨陽受之二日陽明受之三日少陽受之前三日在於表陽也後三日在於裏陰也內經熱論通謂之傷寒熱病者言一身之熱氣也傷寒者外感于寒邪也夫傷寒之寒熱者惡寒為表熱裏和故惡寒脈浮大也發熱為裏熱裏和故發熱脈滑實也可以吐法而解之用拔雪湯主之生薑葱白豆豉同煎蓼蕘苦酒湯上面越之若病人脈沉實者或不大便喘滿譫語不必拘日數急攻于裏可用通解丸胃中渴燥者大承氣湯下之慎不可用銀粉巴豆粉霜杏仁芫花熱性之藥用之必致危殆仲景云調理傷寒者皆在汗下之理當明表裏無不愈矣差之毫釐失之千里深可慎之汗下之後切宜慎口可服淡粥而養之不然其病復作又論傷寒七八日潮熱腹滿發黃有斑者何嘗使然內經云于太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經此四經受病也仲景云兩寸口脈俱浮滑胸中有痰攻上者可用瓜蒂散吐之吐後隨證調治處藥發黃之證皆因陽明中風太陽中濕瘀血與宿飲相搏令人發黃煎梔子齒薤湯調加減五苓散服之後利小便快者如皂角色汁此為效矣發斑者心經受熱故有此證詳斑輕重用藥之理輕者斑紅可用越桃飲子重者斑紫毒氣胃中盛也大青四物湯玄參升麻湯主之漸熱腹滿者謂邪熱在胃中也可以蕩滌邪熱流濕潤燥宜急治之雜病寸口脈沉實者亦在胸中有痰玄子注云上盛不愈者吐而奪之此病乃瘧矣斑無者危而難治也黃病血病問其小便利與不利也更又有頭痛數日不止者此乃六陽受病也手之三陽從手走至於頭足之三陽從下走至於上蓋六陽之聚會也久痛不愈者令人喪目以胸膈亦有宿痰故也先以羌活散涌之以川芎石膏散白虎湯選而服之則愈矣

凡男子有病面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧狀更加涎嗽不止或喘滿面目浮腫宿食留飲三里爭燔炙千百灶經云病名傷寒夾勞之證也治之柰何病在上者其高者因而越之可用防巳散吐之次服人參黃耆散當歸飲子加減小柴胡湯擇而用之內經謂男女之證皆同類用其治法也依此調治無不取效矣

凡人病心胸痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大小便不利有一工治之說下元虛冷便投煖藥十數服其病不愈又一醫所論與前亦同又投煖藥五七日其證轉加困弱請余治之診脈而說曰審問日數飲食大小便何似小便赤色大便黑色便言傷寒瘀血之證初用大黃芍藥湯二劑次服犀角地黃湯二服後用通經丸一服換過大便黃色以為效驗此藥服十餘服方可病癒矣

凡男子婦人所顯證候皮膚發熱肌肉消瘦四肢倦怠兼有頭痛煩赤心忪唇乾舌燥日晡潮熱夜有盜汗鼻衄咽燥膈脇不利或時喘嗽五心煩熱睡臥不安飲食減少多思水漿經脈不通病名曰何病奇病論曰女子不月血滯之病也男子腎虛精不足也凡治此證降心火益腎水此之謂也可先用通解丸滾二三行次服當歸飲子又用加減五苓散木香三稜丸人參黃芪湯輩若咯膿咯血大小便血俱散之類詳其虛實選而用之若咯血之證不可發汗不可溫補脾胃之藥若服之雖進飲食不生肌肉此病轉加危篤乃成虛勞之病也

凡醫人不明發表攻裏亂投湯劑有悞性命更大忌夏月炎中晚膳下關元氣海青俞三里爭燔炙千百灶者全無一效使病者反受其殃豈不痛哉虛勞之症私啗肉食麵辛酸之物不可食之但可食者謹按神農食療而與之菠稜菜菜氷水清涼之物不可禁也且固密經曰穀入于胃脈涼滑利腸胃使氣血並無壅礙經曰穀入于胃脈道乃行水入於經其血乃成若不忌慎致令病人胃口閉澁則形體漸瘦此乃死之由也諸勞皆做此但諸人咯膿血劇血大小便血者可服三黃丸黃連解毒丸涼膈散加桔梗當歸大黃芍藥犀角地黃湯大作劑料時時呷之丙經曰所謂邪熱傷於肝心之病依此調治萬舉萬全矣

凡人年四十以上日久多言以致虛損面色黧黑飲食

無味心胸痞悶四肢倦怠肌體煩熱大小便不利治之奈何內經曰不可熱補之夫男子腎虛水不足也凡補虛之劑多用烏附天雄之類豈知腎惡燥也女子陰虛血不足也凡補虛多以陽劑是以知陽勝而陰病也不可用性熱之藥補之空心可服加減八物丸當歸飲子減桂五苓散煩渴加益元名曰淡滲散更服通解丸亦可服之大有神效

仁先亦可服之大有神效

凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝因而大飽筋脈橫解腸辟爲痔故膿血者血隨熱行參差人于胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則爲難治身涼者可治也可先調中消血蕩除積血瀉之三二行瀉後服芍藥葛皮丸黃連解毒湯五苓散益元散各停新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半蓋服之則愈矣

凡下利膿血腹痛不止者何也諸痛痒皆屬於心火也可用通解丸加減瀉之量其虛實用之次用消濕散加生薑大棗芍藥服之瀉訖又用新水調五苓散服之又一法煎燈心湯調下益元散五七錢此病大忌油膩腥羶熱物

濕熱門

凡吐嘔而瀉病名曰何也內經熱論云此乃轉筋霍亂之證也何氣便然此乃邪氣在于中焦使陰陽二氣不能升降其證心痛而吐吐則先腹痛而瀉心腹俱痛則吐瀉並作使致揮霍之間自然撩亂此證喜寒涼之物可用冰水調五苓益元則愈矣大忌熱物轉筋之病治之泰何經曰勞者溫之溫者溫存之意也

又一法生薑湯益元散白朮散禹攻散加冰浸冷細細呷之渴未止者頻頻飲之卻無冰亦得用之大

忌白粥米湯桂附種種之燥藥不可服之服之必死如無藥處可服地漿地漿者掘地作坑注新水于其中攪渾候澄清者飲之病出火注暴渾旋又取澄清者飲三五盞立愈

凡大人小兒暴注水瀉不止內經曰此名暴速注瀉久而不愈者爲痛泄注下此乃火運太過之病也火注暴速故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散益元散白朮煎此藥放冷服之病即癒矣不可用鄉米或用青花水煎此藥放冷服之病即癒矣不可用鄉米

凡風衝泣下俗呼爲冷淚者證也內經曰太陽不能禁固因風衝于外火炭于內風熱相搏由此淚下內經曰熱則五液皆出熱甚則淚出治之以貝母一枚白膩者佳胡椒七枚不犯銅鐵研細點之臨卧治法曰風宜辛散寒宜甘散氣遇寒則凝血得熱則散

凡諸瘧在於腦上使頭目不能清利涕唾稠粘或欬嗽嗌滿時發潮熱可用獨聖散吐之次服搜風丸之類內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡目風時氣溫病傷寒三日以裹頭痛身熱惡寒可用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑十餘片連鬚蔥白十餘莖豆豉一撮同煎三五沸去滓先服多半良久以鈹子探於咽中吐了不得嗽口次用少半投之更用酸辛葱醋湯投之衣被蓋覆汗出則解夫攙攘之世常與內經歲火太過同法歲火太過炎暑流行火氣大劇金肺受邪上應焚灼大而明顯若用辛涼之劑解之萬舉萬全人民安靜則便同水化可用升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之雖有潮熱亦無加害亦可加豆豉葱白上涌而表汗自出內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗所以發寒熱之邪也吐汗之後必大怒息旬日之後其邪不復作也

凡大人小兒風邪寒三氣合而爲痺及手足麻痺不仁

中風門

凡頭風眩遲手足麻痺胃脘發痛心腹滿悶按如水聲可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥仲景曰此寒痰結在胸中而致然也

凡痫病至于呆證者用三聖散吐之於煖室中勿令風可以汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈矣

凡大人小兒風邪寒三氣合而爲痺及手足麻痺不仁

內經曰榮虛衛實皮膚不仁痺而不知痒痛可用蔚金散吐之次服導水丸輕寒之藥泄之泄訖次以辛溫之劑發散汗出後當服當歸芍藥烏附行經和血之藥則愈矣

凡風蛀牙疼久不愈者用鐵綫巴豆一枚以燈燎之煙盡存性於牙根盛上燻之則愈

凡泄瀉米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀可用導水丸再切散泄之或病人老弱氣虛可用無憂散泄之再觀病勢強弱候一切可服胃風湯以治其風如不愈者更服桂枝麻黃湯汗之則愈內經曰夫風之中人也傳入五臟而合病也中腸則飧泄中肺則喘逆中肝則悲中心則善怒中脾則腸風飧泄啓玄子云風入胃中上薰於胃故食不化而下泄又云暮食不化為飧泄又經云春傷於風夏為飧泄故風宜出汗腸中鳴者風以動之動而有聲潰不可用器粟豆蓋乾薑太燥之藥病濕者燥之去其濕則愈病甚者攻之不動反能為害經曰其減則漸其加則甚可用五苓散去豬苓加人參散服之

凡富貴膏粱之家病瘧或間日或頻日發或熱多寒少或寒多熱少宜大柴胡湯下過三五行次服白虎湯或玉露散桂苓甘露散之類如不愈者是積熱太甚以神芎三花神祐丸調胃承氣湯等作大劑料下之下後以長流水煎五苓散服之或服小柴胡亦可或先以常山散吐之後服涼膈白虎之類必愈矣大忌發熱之物豬雞魚兔五辛之物犯之則再發也

凡田野貧寒之家瘧病為飲食麤糲衣服寒薄勞力動作不[illegible]蒸同法臨發日可用野夫多效方中温脚散治之如不愈服辰砂丹治之必愈矣如哭罷此藥以長流水煎白虎湯服之不服食熱物為瘧疾是傷暑伏熱

故也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

凡男子婦人骨蒸熱發皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼痛面赤唇焦盜汗煩燥睡卧不安或時喘嗽飲食無味困弱無力虛汗黃瘦等證內經曰男子因精不足女子因血不流而得此證可以茶調散輕通乾次以導水丸禹功散輕瀉三五行後服柴胡飲子桂苓甘露散犀角散之類大搜風丸白术丸調中湯木香檳榔丸人參散其虛實選而用之或咯血便血諸亡血者並不宜吐不可不知慎勿服峻熱薑附之藥若服之飲食難進肌肉消減轉加危篤五勞之病令人不明發表攻裏誤至此大忌暑月於手腕足踝上著灸以其手足者諸陽之表起于五指之外內經曰諸陽發四肢此穴皆是淺薄之處灸瘡最難痊也及胸穴中脘膺俞等穴或有灸數百壯者加以煽鍼令無寸效病人反受苦楚可不思之哉灸疾多饒所思之物但可食者宜照食療本草而與菠菜葵菜冰水涼物慎不可禁且因水穀入腹脈道乃行也若遇葷則胃口閉而形體瘦瘠而脈大乃死之候也諸勞皆倣此

凡病人虛勞多日無力別無熱證者宜補之可用無比山藥丸則愈矣

凡痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脈橫解腸澼為痔面不愈變為漏痔與漏其治同法至眞要大論云太陽之勝凝藥且至非時水氷痔瘡取法注云水氣太勝陽火不行此言陽火與水鬱而為痔又少陰之復痿痙瘡瘍癰瘍瘧疹注云火氣內蒸金氣外拒陽熱內鬱故為痿痿瘡瘍甚亦為瘡也熱少則外生痈疹熱多則內結癰瘍小腸有熱則中外為痔其熱復之變告病於身後

及外側也又靈樞云太陽經虛則為痔瘧痿疾盡水盛則火所乘故也可先用導水丸再功散瀉訖次服枳朮丸木香檳榔丸更以葵羹菠菜通利腸胃大忌房室雞魚酒醋辛熱之物

凡富貴之人痰嗽多是厚味所致內經云所謂味厚則發熱可服通聖散加半夏以止嗽更服人參半夏丸以化痰堅涎止嗽定喘貧乏之人多感風冷寒濕內經曰秋傷於濕冬生欬嗽可服寧神散寧肺散加白术之類若欬極面赤煩冤半晌者此火化乘肺也宜詳辨之

凡大人小兒病沙石淋及五種淋澁癃閉并臍腹痛益元散主之以長流水調下蓋因熱在膀胱燥其津液故俗謂冷淋者天下之通弊也五苓散減桂加益元散名曰淡滲散凡南目暴赤痛者腫不止晴腹努肉結成腎癰宜用稗草左右鼻竅內彈之出血立愈病甚人顏上百會穴攢竹眉間皆可出血則愈矣口噙水緊扣衣領不可便噴水候血盡便吐了水蓋暴赤腫痛腫為能火之疾蓄成之熱也難經曰目得血而能視不得已而用之血化淚痛而所出經曰本病相傳先以治其氣急則治其標緩則治其本

又一法兩目赤腫發痛不止用長流水煎鹽湯吐之次服神芎丸四物湯之類經曰暴病暴死皆屬於火也又曰治病有緩急急則治其標緩則治其本者火熱也腫脹寒所以制火兩目赤腫痛不能開者以青金散鼻內嚏之嚏之真氣上涌邪氣自出矣

凡大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨卧貼赴筵散如不愈貼鉛白霜散必愈矣

凡婦人男子喉閉腫痛不能言者刺兩手大拇指爪甲

如韭葉少商井穴也以鈹鍼淺刺去血立愈以溫清湯
口中含漱是以熱導熱之法也
凡頭腫痛瘰癧及胸膺胠腋之間或有瘡痂腫核不消
及膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀
煎之放温作三五次頓服乾艮久於嗽喉中以叙股探
引吐之去冷痰三二升次服和血通經之藥內經曰鹹
味涌泄爲陰銅人記少陽起於目銳眥行耳後下脇肋
過期門瘰癧結核馬刀挾癭足少陽膽經多氣少血之
病也
凡癰發脹悶養生論云雨山挾水其人多癰疾土厚水
深其人多癰地勢使然也此可服人參化癰丹白消癰
藥多用海藻海帶味鹹軟寒
凡背瘡初發便可用蔥附丸王燭散大作劑料下臟腑
一二十行次用鈹針於腫瘍處循紅暈周匝內密刺三
層出血盡以温軟帛拭去血甚者百會委中皆出後用
陽起散傳之不可便服十味內托散其中犯官桂東用
酒煎男子以背爲陽更以熱投熱無乃太熱乎
凡便癰者謬名也乃男子血疝也難素所不載然而是
厥陰肝之經絡是血流行之道路也衝脈任脈督脈亦
屬肝經之旁絡也難經曰男子七疝血疝者乃七疝之
一也治以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之同疾血
法聚而不散可以大作劑料大瀉一二十行次以王燭
散和血通經之類是也世人多用大黃牡礪間有不愈
者是不知和血通經之道也
凡下疳久不愈者俗呼曰臊疳可以導水丸禹功散先
瀉肝經訖以木香散傳之日上三兩度後服淡粥一二
日止

凡一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈矣
凡男子婦人欬逆俗呼曰吃咸乃陰陽不和之故火欲
上行爲寒所抑寒不勝火故作凝滯之聲傷寒亦有此
證並宜既濟散治之

寒濕門

婦人門

凡婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功散
或單用無憂散益虛實加減泄訖服桂苓散五苓散葶
藶木香散同治濕法或用獨聖散上涌亦是室女白帶
下可用茶調散吐之吐訖可服導水丸禹功散瀉之次
服葶藶木香散四物湯白朮散之類則愈矣治白帶者
同瀉濕法則是也婦人有濁汚水不止亦同此法也
凡婦人腰膀痛兩脚麻木惡寒喜煖內經曰風寒濕合
而爲痺先用服除濕丹七八十九量虛實以意加減次
以禹攻散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫爲驗後
用長流水煎生薑棗同五苓散服之風濕散而氣血自
和也
凡婦人乳癰發痛者亦生于心也俗呼吹奶是也吹者
風也風熱結于九房之間血脈凝注久而不散潰腐爲
膿宜用益元散生薑湯調下冷服或新汲水時時呷之
勿輟晝夜可三五十次自解矣或煎解毒湯頓服之
凡婦人年二三十無病而無子經血如常或經血不調
者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙不
能爲用故也可用獨聖散通訖寒痰二三升後用導水
丸禹攻散泄三五行或十餘行單用無憂散泄十餘行
見症寒熱虛實用之次服薏白粥三五日胃氣宣通腸
中得實可服玉燭散更助白朮散茯苓之類降火益水
既濟之道當不數月而有孕內經曰婦人有癥痔遺溺
益乳諸證雖服妙藥鍼灸亦不能孕蓋衝脈督脈任脈

有此病不能孕故也

凡婦人月事沉滯數月不行肌肉漸減內經曰小腸熱已滿移熱於大腸則伏瘕爲沉沉者月事沉滯不行故云伏瘕急宜桃仁承氣湯加當歸大作劑料煎服不過三服立愈後用四物湯補之更宜服宣明中檳榔丸

凡婦人血崩或及年四十已上或悲哀太甚明然內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺舉而上焦不通熱氣在中故經云血崩下心系者血出也如久不愈則面黃肌熱瘦弱懶不可以熱治之蓋血得熱而散故禁之宜以當歸散等藥治之

凡婦人年五十以上經脈暴下婦人經血終于七七之數數外暴下者此乃內經所謂火主暴速亦因暴喜暴怒憂愁驚恐致然慎勿作冷病治之如下峻熱藥治之必死止宜黃連解毒湯以清上更用蓮殼棕毛灰以滲其下然後用四物湯玄胡索散涼血和經之藥以調理之

凡婦人月事不來室女亦同內經曰謂月事不來皆是胞脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中令氣上通於肺心下不通故月事不來也可用茶調散吐之次用玉燭散芎藭湯三和湯桂苓白木散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥皆是也慎勿服峻熱有毒之藥若服之變成腑痿骨蒸潮熱欬嗽咯膿嘔血喘滿大小不便寢汗不止漸至形瘦脈大雖遇良醫亦成不救

嗚呼人之死者豈命使之然也

凡懷孕婦人病癒可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡湯下微利過不可大吐瀉恐傷其孕也經曰夏傷於暑秋必痎瘧

凡雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散二兩水半椀大作劑料去滓分作二服先一服吐了後一服勿吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱服之汗盡其痛立止

凡婦人雙身大小便不利可用八正散大作劑料去滓石加葵菜子煎服經曰膀胱不利爲癃癃者小便閉而不通也如八正散加木香取效更擂經曰膀胱氣化則能出焉然後服五苓散三五服則愈矣

凡婦人身重九月而痛癎不言者是胞之絡脈不曰續也故不能言經曰無治也然有是言不若煎玉燭散二兩水半椀同煎至七分去滓入蜜放溫時時呷之令大下降肺金自清故鼻復出也肺主聲音也

凡婦人難產者皆因燥澁緊斂故產戶不得開通宜先投粥飲潤之其產自易

凡婦人大 後或臍腹腰痛乃敗血惡物之致然也醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤已久矣難經曰諸痛爲實實者熱也可用導水丸禹 散瀉三五行然後以玉燭散和血 經降火益水之藥治之獨不可便作風治之宜調胃承氣湯

凡婦人產後心風者不可便作風治之宜調胃承氣湯二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈矣如未愈以三聖散吐之蓋風狂屬陽

凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉燭散或水調甘露散亦妙勿作虛寒治之

凡婦人半產俗呼曰小產或三四月或五六箇月皆爲半產以男女成形故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或因勞力撲打損傷及觸冒暑熱慎勿用黑神散以其犯熱藥恐轉生他疾止宜用玉燭散和經湯之類

凡婦人天生無乳者不治或因啼泣暴怒鬱結氣血閉塞以致乳脹不通用精猪肉清湯調和美味於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳房週週則乳汁自下也

又一法猪蹄調下益元散連服之

又一法針肩井二穴長驗

小兒風門

凡小兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此者得之在母胎胞之所受悸傷驚駭恐懼之氣故令小兒極者爲驚風天吊重者爲癇病風搐胎中積熱者爲膀風已上諸風證可用吐涎散吐之吐訖宜珠犀龍麝清涼墜痰之藥其食乳于母皆宜服之安魂定魄之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲憂驚怖縱得子必有前疾小兒風熱涎嗽者可以通聖加半夏同煎溫服

凡小兒初生眼數日不開皆風熱所致可服涼膈散瀉焟散和血 經降火益水之藥治之獨不可便作風治之宜調胃承氣湯散燥熱之藥當同半產治之

凡婦人產後心風者不可便作風治之宜調胃承氣湯二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈矣如未愈以三聖散吐之蓋風狂屬陽

凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉燭散或水調甘露散亦妙勿作虛寒治之

或水調甘露散亦妙勿作虛寒治之

小兒火門

凡小兒瘡疱癮疹斑瘡丹熛等疾如遇火運勝時熒惑亂行之者不可便用升麻散解用升麻湯味辛性溫內經曰春溫而成熱是重火故止可以辛涼之劑解之如遇平時可以辛溫蓋平時無事便同水化然而更宜審察病機甚者亦不可以辛溫但發散之後便以涼膈散加當歸及白虎湯玉露散煎服之更甚者解毒湯調胃散下之古人云瘡疹瘡瘡疱首尾俱不可下皆誤矣豈不聞揚湯止沸不如抽薪內經曰五寅五申之歲多發此病者蓋明相火之所為也又曰少陽客氣勝丹疹外發又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火王太陽又謂百端之起皆自心生豈可便用辛溫發散乎致熱勢增劇漸成臟毒下血咬牙發搐大熱明矣如白虎加人參涼膈散加當歸梔梗勿問秋冬但見瘡疹用之神良

凡小兒瘡疱癮疹斑瘡毒下血內經曰少陽客氣勝則丹熛瘡疹於外也蓋餘熱不解故臟毒下血治以黃連解毒湯白虎湯涼膈散臨證選而用之所謂白虎舊說秋冬勿用皆誤也但有此證便用之蓋其證屬相火故也大人亦同

凡小兒丹瘤浮腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒者可用磁片刮出紫血其病立愈如不愈者後用涼膈散大黃芒硝利三五行為妙次用拔毒散掃三五度愈矣

案經曰丹熛赤瘤火之色也相火主之

凡小兒有赤瘤暴腫可先用牛黃通腸先瀉之後用勝起石散傅之則腫毒自消如不消可用鍼針砭刺血出而愈矣

凡小兒甜瘡久不愈者俗呼為香瘡是也多在面部兩耳前一法令母口中嚼白米成膏子卧塗之不過三上

則愈矣小兒并母皆忌雞猪魚兔酒醋動風發熱之物如治甜瘡亦同此法

凡小兒面上瘡謂眉瘰疬耳上瘡謂靴癬此三者一究其本皆謬名也經曰諸痛瘡瘍皆屬心火乃血熱劇而致然也或謂內經曰大熱不可使熱以為治然此不明造化之道也慎勿妄信可用鍼針刺之出血一刺不愈當復刺之再刺不愈則三次必愈矣內經曰血實者決之肩痛不可用桑儁之以其瘡多痒痒則服矣藥入喉則自愈矣

凡小兒牙疳齒齦潰爛起斷宿肉也下牙屬于陽明大腸之經燥金為主上牙屬足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱蓄內或因服銀粉巴豆大寒之藥入于腸胃乳食不能勝其毒氣薰蒸經而至于齒齦牙縫蝕導之分反內害也可以射香玉線子治之乳母臨臥常服黃連解毒湯一服牙疳病周愈矣

凡小兒身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黃通腸先下過四五行則自愈矣蓋乳食便屬木其證屬相火故也大人亦同

凡小兒水泄不止可用五苓散與益元散各停用新水調下三二錢頻服不拘時候若暴迫注下甚者屬大寒一腸通聖等散治之用者勿輕非深於造化者未易此論

凡小兒大人小便不通內經謂三焦約約者不行也可用長流水煎八正散時時嗽之大小便利則止若不已熱藥所攻而致此者易治或因多服熱藥而燥劇至此者非惟難治不幸天耳亦可用塞水調益元散送通腸丸

凡小兒久瀉不止至入九月同變為秋溪冷痢泄瀉者

吐劑

三聖散

防風三兩　瓜蒂三兩搗淨碾破以帛袋定連紙封將
去蘆瓜蒂細去紙用瓷羅子羅過另放末將
洋炒微黃次入末一處同炒黃用藜蘆去苗及心加減用之或
一兩或半兩或一分

右各爲麤末每服約半兩以鹽汁三茶盞先用二盞
煎三五沸去鹽汁次入一盞煎至三沸却將原二
同一處熬二沸去滓澄清放溫徐徐服之不必盡劑
以吐爲度

瓜蒂散

瓜蒂七十五箇　赤小豆七十五箇　人參半兩去蘆　甘草半兩或二錢

右爲細末每服一錢或半錢或一錢量虛實加減用
之空心鹽汁調下服之

稀涎散

猪牙皂角不蛀者去皮弦子炙黃一梃重一錢　綠礬半兩

右爲細末每服半錢或一二錢斡開牙關漿水調下
灌之

蔚金散

蔚金　滑石　川芎各半兩

右爲細末每服二錢鹽汁調下空心用之

獨聖散

瓜蒂不以多少

右爲細末每服二錢鹽汁調下空心用之喉痛加
石爲細末每服一二錢量虛實加減以鹽汁調下服之如中風用
心服之

茶調散亦一名二仙散

瓜蒂不以多少好茶中停

右爲細末每服二錢鹽汁調下空心用之

獨聖散

瓜蒂不以多少

右爲細末每服二錢鹽汁調下空心用之喉痛加
全蝎頑痛加蔚金

碧雲散　治小兒驚風有涎

膽礬半兩　銅青一分　粉霜一錢　輕粉一分

右研爲細末每服一字薄荷湯調下用之如中風用
藥水調服

常山散

常山二兩　甘草二兩半

右爲麤末水煎空心服之

青黛散

猪牙皂角二箇　玄胡索一箇　青黛少許

右爲細末每服一錢生薑棗一同煎湯服下
石爲細末鼻內灌之其涎自出

汗劑

防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃各一兩　黃芩二兩　滑石四兩　墨牽牛四兩炒取頭末　麻黃去根節不去節　連翹去蒂　桔梗各二兩　滑石三錢　甘草二兩　荊芥　白朮　山梔子各一兩

右爲麤末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七
分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

雙解散

通聖散與益元散相合中停水一鍾生薑豆豉煎
白同煎

浮萍散　治癲風

浮萍一兩　荊芥　川芎　甘草　麻黃去根各一兩

右爲細末每服二錢水九梧桐子大每服五十丸或加至百
丸臨卧溫水下

禹功散

黑牽牛頭末四兩　茴香炒一兩　或加木香一兩

右爲麤末每服一兩二盞煎至七分去滓溫服汗
出則愈

升麻湯

升麻去土　葛根　芍藥　甘草炒各一兩

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服
不拘時候

麻黃湯

麻黃一兩去根　官桂七錢　甘草三錢炙

杏仁二十三箇去皮尖麩炒黃色用

右爲麤末每服三錢水一鍾煎至七分去滓溫服汗
自解

桂枝湯

桂枝一兩　茯苓半兩　芍藥一兩　甘草七錢

右爲麤末每服三錢水一盞生薑棗一同煎溫服下
汗劑

導水丸

大黃二兩　黃芩二兩　滑石四兩　墨牽牛四兩炒取頭末

右爲細末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七
分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

加減用

白芥子一兩去麤身走注疼痛
朴硝一兩退熱散麤毒止痛久毒宜加
郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣

通血脉

樗柳根一兩去腰腿沉重

右爲細末滴水丸梧桐子大每服五十丸或加至百
丸臨卧溫水下

禹功散

黑牽牛頭末四兩　茴香炒一兩　或加木香一兩

右爲細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

通經散

陳皮去白 當歸各一兩 甘遂以麵包不令透水冷水浸過去麵焙乾

右爲細末每服三錢溫湯調下臨臥服

神祐丸

甘遂依前製用 大戟焙浸煮酒乾用 芫花醋浸煮各半兩

黑牽牛一兩 大黃乙兩

右爲細末滴水丸小豆大每服五七十丸臨臥溫水下

琥珀丸

石如前神祐丸加琥珀一兩是也

蓋胃散

甘遂依前製過用

右爲細末每服三錢以猪腰子細批破以鹽椒等物淹透煽切摻藥在內以荷葉裹燒熟溫淡酒調服

大承氣湯

大黃半兩 厚朴乙兩 枳實乙枚麩炒 芒硝半兩

右爲粗末每服五七錢水一盞煎至七分去滓服以意加減

小承氣湯

大黃 厚朴各一兩 枳實乙枚

右爲粗末同前煎服

調胃承氣湯

大黃 甘草炙 朴硝各半兩

右爲粗末每服五七錢水一盞煎三五沸去滓溫服食後

杏仁承氣湯

桃仁乙十二箇去尖皮 官桂 甘草 芒硝各半兩

右剉如麻豆大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓溫服

玉井散

瓜蔞根二兩 甘遂乙兩製用

右爲細末以麝香湯調下三錢臨臥服

水煮桃紅丸

黑牽牛頭末半兩 瓜蒂末三錢 雄黃乙錢水飛乾胭脂少許

右以黃水調麵爲丸以水煮之浮熟取出冷水拔過

無憂散

黃蕎末通 桑白皮 陳皮各一兩 胡椒 白朮 木香各半兩 檳榔乙兩 牽牛頭末四兩

右爲細末每服三五錢以生薑自然汁調下食後

黑牽牛末 大黃各二兩 白朮乙兩

右爲細末水煮棗肉爲丸如小豆大每服五七十丸食前生薑湯下

牛黃通腸丸

黑牽牛 大黃 木通各半兩另取

右爲細末水丸如黍粒大量兒大小三五十丸或百丸水下

四生丸一名潤腸丸

黑牽牛 大黃 朴硝 皂角去皮弦各等分

右爲細末水丸如梧桐子大每服七八十丸食後溫水下

內托散

大黃 牡蠣各半兩 甘草三錢 瓜蔞二個

右爲末水一大盞煎三五沸去滓露冷服

藏用丸

大黃 黃芩各一兩 滑石 甘草半各四兩

右爲末水丸桐子大每服五七十丸食後溫水下

神芎丸

藏用丸一料內加黃連薄荷川芎各半兩水丸桐子大水下

進食丸

牽牛乙兩 巴豆三箇去油心膜

右爲末水丸每服二三十丸食後隨所傷物送下

牛黃白朮丸 治腰腳濕

黑牽牛末 大黃各二兩 白朮乙兩

右爲末滴水丸桐子大每服三十丸食前生薑湯下

要利加至百丸

玉燭散

以四物湯承氣湯朴硝各等分水煎去滓食前服之

三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

丁香化癖散 治小兒脾

白丁香 蜜陀僧 船上硫黃各一錢 銅砂半錢 輕粉少許

右研細末每兒一歲服半錢男病女乳漏女病男乳

調後用通腸泄

抵當湯

水蛭十個 蝱虫十個去翅足熬 大黃乙兩 桃仁七枚去皮尖醲

右剉如麻豆作一服水二盞煎至七分去滓溫服

抵當丸

蝱虫五個 桃仁六枚 大黃三分 水蛭五個

右爲細末只作一丸水一大盞煮一丸至七分頓服之

十棗湯

芫花醋炒 大戟 甘遂 各等分

右爲末每服半錢水一盞棗十枚同煎取半盞服之

除濕丹

橫榔 甘遂 威靈仙 赤芍藥 澤瀉 各半兩 葶藶各二兩 乳香另研 沒藥另研各一兩 黑牽牛末半兩 大戟三兩炒 陳皮四兩去白

右爲細末麵糊和丸如桐子大每服三五十丸水送下

利膈丸

牽牛生 四兩 槐角子乙兩炒 木香乙兩 青皮乙兩 甘草乙兩 厚朴去皮 枳實各五兩 芒硝乙兩入 甘遂末一字 大黃乙兩半 桃仁七枚去皮尖醲

右爲水水一盞煮大黃至八分去滓入硝一沸下甘遂末一字溫服

蓬朮溫服

小陷胸湯

半夏湯洗乙錢五分 黃連乙分 瓜蔞實一枚用四分之一

右剉麻豆大水二盞先煮瓜蔞至一盞半下諸藥取八分去滓溫服朮利再服

握宣丸

檳榔 肉桂 乾薑 附子 甘遂 甘草炒 韭子 巴豆各等分 入硫黃乙錢

右爲細末煮米和丸桐子大早晨先椒湯洗手放溫指乾用生油少許泥手心男左女右磨令熱握一丸

宣一二行

風門

防風通聖散方在汗門中附

防風天麻散

防風 天麻 川芎 羌活 白芷 草烏頭 各半兩 荊芥 當歸婦製 甘草 炙 白附子 各半兩 白殭蠶炒 蟬蛻炒 厚朴去粗皮炙 各乙兩

右爲細末熱酒化蜜少許調藥半錢加至一錢少時覺藥行微麻爲度如作丸煉蜜和彈子大熱酒化下一丸或半丸

防風湯

防風 麻黃去節 當歸婦製 甘草炙 荊芥 川芎 羌活去蘆 白芷 草烏頭 各半兩 白附子 各半兩 白殭蠶炒 蟬蛻炒 厚朴去粗皮炙 各乙兩

右爲粗末入半夏片子令攪勻每服四錢水二中盞生薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入麝香少許帶熱食後服

三一承氣湯

大黃 芒硝 厚朴去皮 枳實各五兩 甘草乙兩

右剉如麻豆大每服半兩水一大盞生薑三片煎至六分入硝去滓熱服

六分入硝去滓熱服

大陷胸湯

祛風丸

川烏炮去皮臍 草烏炮去皮臍 天南星 半夏薑製 蒼朮 羌活 獨活 麻黃去節 防風去蘆 川芎 各半兩 蒸豆粉 甘草 川芎 烟鼠 壁香 各半兩 地龍去土 蟬蛻炒 各一兩

右爲細末藥末一兩用蒸豆粉一兩以白麵二兩滴水和丸如桐子大陰乾細嚼茶清下三五丸至五七丸食後初服三丸以漸加之

排風湯

當歸去蘆 杏仁去皮尖麩炒 防風去蘆 白蘚皮 白朮 芍藥 官桂去粗皮 川芎 甘草炒 麻黃去節 茯苓去皮各三兩

右爲粗末每用三錢水一盞半入生薑四片同煎至八分去滓溫服不拘時候

小續命湯

麻黃去節 人參去蘆 白茯苓去皮 陳皮去白 甘草炙 杏仁湯泡去皮尖炒 防己 官桂去皮 防風去蘆 各一兩 附子半兩去皮臍 川芎 芍藥 川烏炮去皮臍 天南星 半夏薑製 蒼朮 羌活去蘆 人參去蘆 白茯苓去皮 陳皮去白 甘草炙 杏仁湯泡去皮尖炒 防己 官桂去皮 各半兩 白蘚皮 白朮 各半兩 川芎 甘草乙兩炙

右除附子杏仁外合搗爲粗末後入二味搜勻每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓少熱服食後

消風散

川芎 羌活去蘆 人參去蘆 白茯苓去皮 陳皮去白 白殭蠶炒 蟬蛻炒 厚朴去粗皮炙 各乙兩

右爲細末每服二錢茶清調下

川芎散

川芎 荊芥 甘菊 薄荷 蟬蛻 夏菁子 各兩 甘草乙兩炙

右為細末茶酒任下三二錢食後服

搜風丸 一名人參 半夏丸

人參 茯苓 南星各半兩 半夏 乾生薑 白礬生 凝水石各一兩 蛤粉二兩 薄荷 寧香各半兩

右為細末與藏用丸末各中停水丸如豌豆大每服三十丸生薑湯送下

當歸川芎散

當歸 川芎各半兩 甘草二兩 黃芩四兩 薄荷乙兩 縮砂仁一分

右為細末溫水調下一二錢

愈風餅子

川烏半兩炮製 川芎 甘菊 白芷 防風 細辛 天麻 羌活 荊芥 薄荷 甘草炙各一兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅子細嚼茶酒送下不計時候

蘇風丸

通聖散一料加天麻羌活獨活細辛甘菊首烏各半兩

右為細末煉蜜和丸彈子大朱砂為衣每服一丸細嚼茶酒下

通頂散

石膏 川芎 瓜蒂各等分 藜蘆少許

右為細末臭內嗢之

胃風湯

人參去蘆 茯苓去皮 川芎 官桂 當歸 芍藥 白朮 甘草各等分

右各等分為末每服三錢水一盞入陳粟米煎空心服之

香芎散

香附子炒 藁芎 石膏水飛 白芷 甘草各一兩 川烏半兩炒去皮臍 薄荷各一兩

右為細末每服二錢溫酒茶清調下無時

鐵彈丸

地龍去土 防風 白膠香 沒藥 木鱉去皮 草烏頭水浸炮 白芷 五靈脂 當歸各一兩 細墨三兩 麝香另研 乳香另研 升麻各二錢 雷門雄附

右為末糯粥丸彈子大每服一丸生薑湯下

白虎湯

知母乙兩半去皮 甘草乙兩 糯米乙合

右為末滴水丸每服半錢作十丸臨臥無根水下

過用之

桂苓甘露散

官桂 人參 藿香各半兩 茯苓 白朮 甘草 葛根 澤瀉 石膏 寒水石各一兩 滑石二兩

右為細末每服三錢白湯點下新水或生薑湯亦用

化痰玉壺丸

南星 半夏薑生用 天麻 白朮各半兩 白麵三兩

右為細末滴水丸如梧子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮候浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不拘時服

益元散

滑石六兩 甘草乙兩

右為細末每服三錢蜜調新水送下

王露散 治暑

寒水石 滑石 石膏 瓜蔞根各四兩 甘草一兩

右為細末每服五錢新水調下

玉膏散

石膏一兩 人參去蘆 甘草炙各半兩

右為細末新水蜜水調三錢生薑湯亦可

辰砂丹 治癎

信乙錢 雄黑豆六十箇或二兩重

右為細末朱砂為衣端午日合不令雞犬婦人見每服一丸無根水下

溫脾丸

信乙錢 甘草二錢 紫河車三錢 豆粉四兩

右為末滴水丸每服半錢作十丸臨臥無根水下

溫脾散

紫河車 蕪豆各一兩 甘草半兩 砒乙錢另研

右為細末後入砒研勻每服半錢新水盞調下如是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌罩酒魚冤等

五苓散

官桂 澤瀉 豬苓去黑皮 茯苓去皮 白朮各半兩

右為細末每服二錢煎湯或新水調下

導赤木香散
苦葶藶 茯苓去皮各一分 猪苓去皮各一分 木香半錢
澤瀉 木通 甘草各半兩 官桂一分 滑石二錢
右爲細末每服三錢生薑湯調下食後服
白术木香散
白术 猪苓 澤瀉 赤茯苓各半兩 木香半錢
檳榔各三錢 陳皮一兩去白 官桂一錢 滑石三兩
右爲細末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分
温服食後
大橘皮湯
橘皮一兩半 木香一分 滑石六兩 檳榔三錢
茯苓一兩 猪苓去黑皮 官桂各半兩
甘草二錢
右爲末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓
温服食後
神助散
苦葶藶二兩炒 黑牽牛三兩半微炒取頭末用之 澤瀉二兩
猪苓二兩去皮 椒目半兩
右爲細末每服葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒
半盞調藥三錢絕早面東服之
桂苓白术丸
官桂 茯苓 半夏各一兩 黃柏二兩 白术
乾生薑一分 橘皮去白 澤瀉 黃連各半兩
右爲末麵糊爲丸如小豆大每服三五十丸薑湯食
後服之
桂苓白术散
官桂 茯苓 白术各半兩 滑石一兩 甘草

澤瀉 石膏 寒水石各一兩
右爲細末熱湯調三錢新水生薑湯亦可食後服
白术調中湯
白术 茯苓 橘皮去白 澤瀉各半兩 甘草一兩
乾薑炒 官桂 縮砂仁 藿香各一分
右爲末白湯化蜜少許調下二錢無時煉蜜每兩作
十九名曰白术調中丸
溫脾散 治噦
御米殼二兩蜜炙 人參 苦葶藶各一兩
右爲末入烏梅同煎三五沸去滓稍熱服食後
溫肺散
御米殼去蔕蜜炙 甘草 乾薑 當歸 白蘞各一兩
右爲末每服三五錢水一盞入蜜竹葉煎三五沸去
滓温服無時
黃連解毒湯
黃連 黃柏 黃芩 大梔子各等分
右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓温
服之
瀉心湯
大黃 甘草炙 當歸 芍藥 麻黃 荊芥各半兩 白术二錢
右爲細末每服二錢水一盞生薑薄荷少許同煎至
七分去滓温服
八正散
大黃 瞿麥 木通 萹蓄 車前子 甘草
山梔子各一兩 滑石二兩 加木香一兩尤佳
右爲粗末每服三五錢水一盞入燈心煎至七分去
滓温服
調胃散 治傷寒吐逆四肢厥冷

水銀 胎上硫黃各半兩
右二味先研硫黃極細次入水銀同研至深黑每服一錢病重者二錢溫米飲調服不拘時

三黃丸
大黃 黃芩 黃柏各等分
右爲末水丸每服三十丸水下食前

又方去黃芩用黃連

芍藥龍皮丸
芍藥白者 黃柏去皮各一兩 當歸 黃連各半兩
右爲末水丸桐子大每服三十丸水下食前

大金花丸
黃連 黃蘗 黃芩 大黃各等分
右爲末水丸新水下三十丸加梔子減大黃名梔子金花丸

清涼飲子
大黃蒸 赤芍藥 當歸 甘草炒各等分
右爲末每服一二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後以意加減

黃連清心湯
涼膈散加黃連半兩是也

犀角散
黃連 大黃 芍藥 犀角 甘草各等分
右爲粗末每服五錢水一盞煎至七分去滓無時溫服之

黃連木通丸 治心經毒熱夏至則甚
黃連二兩 木通半兩
右爲末生薑汁打麵糊和丸每服三十丸食後煙心湯下日三服

燥門

神功丸
大黃蒸 桐子皮 麻子仁別研 人參去蓋各一兩
右爲細末入麻子仁搗研勻煉蜜丸如桐子大每服二十丸溫水下或酒米飲下食後臨臥如大便不通加服

脾約丸
麻仁一兩二 枳實麩炒 厚朴去粗皮 芍藥各一兩
右爲末水丸桐子大每服三十丸臨臥溫水送下

麻仁丸
郁李仁去皮別搗 火麻子仁別搗 大黃蒸 杏仁去皮尖炒黃各一兩二錢
右爲細末煉蜜爲丸桐子大每服二十丸溫水下食後牽牛滑石潤燥丸

郁李仁 大黃 桂心 黑牽牛 當歸
黃蘗並生用各半兩 輕粉少許
右爲細末滴水丸如桐子大每服三十丸至四十丸溫水或生薑湯下

寒門

薑附湯
乾薑三兩別爲粗末 附子乙兩生用去皮臍細切
右二味攪勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

四逆湯
甘草二兩 乾薑半兩 附子半兩生用去皮臍切作片子
右爲粗末每服三五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服無時

二薑湯
良薑 乾薑炮各二兩
右爲細末酒煮糊爲丸桐子大每服三十丸空心米飲下

木附湯
黑附子重乙兩 白朮乙兩半 甘草七錢半炙
右爲細末每服三五錢水一盞半生薑五片棗二枚劈破同煎至一盞去滓溫服食後

大已寒丸
附子炮去皮臍 川烏頭炮去皮臍作豆大再炒黃 乾薑炮裂 良薑炒 官桂去粗皮 吳茱萸各一兩
右爲細末酷糊爲丸桐子大每服五七十丸米飲下食前

理中丸
人參去蘆 白朮 乾薑 甘草炙 附子炮去皮臍各一兩
右爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸以水一盞化破煎至七分稍熱空心服之

平胃散
厚朴薑製 陳皮各三兩 蒼朮五兩米泔浸 甘草三兩炒
右爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓食前溫服

心腹加草龍膽防已名一醉散治目暴發加蒲黃治
娠婦漏血

當歸散　治血崩

當歸乙兩　龍骨二兩炒赤　香附子三錢炒　樓毛灰五錢

右爲末米飲調三四錢空心服

又一方當歸白芍藥香附炒各等分爲末米飲湯調下食前服

又當歸散　行經

當歸　杜蘅等分

右爲末米飲湯調服食前

葛根散　解酒毒

甘草　乾葛花　葛根　縮砂仁　真東各等分

右爲粗末水煎三五錢去滓服之

定志丸

桔子仁　人參　茯苓　遠志去心　茯神　酸棗仁

右爲末酒糊丸小豆大每服五七十丸生薑湯下

積柿丸

檳榔乙錢半　陳皮乙兩　木香二錢半　牽牛生取末一兩半

右爲末醋糊丸桐子大每服三十丸生薑湯下

小檳榔丸

枳殼　陳皮　牽牛各等分

右爲細末水丸食後生薑湯下三四十丸

催夢散　治酒積

甘遂半兩煨　催夢　葛根　麥葉各一兩

右爲末每服二錢酒調服

治氣積方　香附子爲末生薑湯調下三二錢

獨治於小者

青金散

芒硝半錢　青黛半錢　乳香　沒藥各少許

右爲細末鼻內嗑之

拔毒散

寒水石不拘多少燒令赤

右研爲末以新水調雞翎掃痛處

水澄膏

雄黃水飛三錢　黃連半兩　蔚金二錢　黃柏半兩　大黃半兩水飛

右爲細末量所腫處用藥多少新汲水半盡炒藥在內須臾藥沉慢去其澄者水盡然後用楡柳枝攪藥敷百餘轉却麵糊相似勻以小紙花子攞藥塗腫處更以雞翎掠涼水不住掃之

魚鱗丸

草龍膽　青鹽　腦子各半兩　麝香二錢　黃連乙兩去鬚　硇砂　南硼砂　鯉魚膽各二兩

右除草龍膽鯉魚膽外同爲細末先將草龍膽鯉魚膽外同爲細末先將研破以河水三升浸春秋二宿夏一宿冬三宿將浸者細採極爛用絹袋濾去滓於石器內慢火熬成膏子點於水內不散用指頭捏開有絲乃膏子成然後入魚膽拌勻將膏和上藥件末作劑丸如栗徐徐點可視之

金絲膏

黃丹　代赭石　玄精石各半兩　白丁香一錢　飛過甘遂乙兩　腦子半錢　黃連　縻仁各去皮油三錢　南硼砂一錢

石除硼砂腦子外同爲細末以河水一升白砂蜜三兩同熬三五沸然後入藥末再熬至半茶盞以上用綿子濾過去滓次入硼砂腦末攪勻定磁器內放徐徐點眼大有神效

生肌散

黃連三錢　蜜陀僧半兩　乾胭脂二錢　雄黃乙錢　粟豆粉二錢　輕粉乙錢

右爲細末以温漿水洗過用無垢軟帛揾淨藥貼之大有效矣

赴筵散

五倍子　蜜陀僧各等分

右爲細末先入漿水漱過乾貼

麝香玉線子

豆粉半兩　信乙錢　枯白礬乙錢半

右同研入麝香半錢再研爲細末滴水和於手背上撚作線如用時先以漿水嗽了口用毛鉤洗縫中淨臨卧乾貼或爲線子住於縫中

化毒丹　治贅

海帶　海藻　海蛤　昆布已上焙　淨瀉炒　連翹各等分　猪靨　羊靨各十枚

右爲細末蜜丸如雞頭大臨卧嚼化一二丸

通氣丸　同上所治

海藻　海帶　昆布　木通　甘草各一兩　柯子　薄荷各半兩　杏仁少許煮浸去皮尖用之

右爲細末煉蜜和丸每夜噙化一丸忌油膩物

又方

海藻　海帶　昆布　瀉瀉　木通　猪靨

羊靨各五枚　海蛤　連翹

右爲細末研靨爲九如雞頭大每服一丸臨卧嚼化下效

消毒散　治喉腫

當歸　荆芥　甘草各等分

右爲末水煎三五錢去滓熱嗽之

煮肝散　治雀目

青蛤粉　夜明砂　穀精草各等分

右爲細末每服五七錢猪肝內煮熟細嚼茶清下

枯瘤方

硇砂　粉霜　雄黃各二錢　輕粉　沒藥　乳香各一錢　麝香少許

右爲末量瘡大小乾貼之上以小黃膏貼之

小黃膏

黃栢　黃芩　大黃各等分

右爲細末以津調塗瘤頂外邊畎一韭葉先花紙貼

八九上不取直候可取

剪刀藥

石衣一斤陳者　龍骨四兩　刺蒺一小來

右爲末杵作泥爲餅子或爲散貼端午日合

木香檳榔散

木香　檳榔　黃連　乳香　輕粉　麝香少許　蜜陀僧各等分

右爲細末乾摻之先以口嚼漿水洗之

又方加　黃栢　麝香

陽起石散

陽起石燒　石研末新水調塗腫處

鉛白霜散

鉛白霜　乾胭脂　寒水石各等分　腦子　輕粉各少許

右爲末摻之

雄黃散

雄黃　乳香　沒藥　麝香少許

右爲末量瘡大小乾貼

化班湯

紫草　升麻　甘草各半兩

右剉麻豆大水一盞糯米二十粒煎至一盞去滓溫服

妙功丸

京三稜乙兩炮　川烏四錢生去皮　大黃乙兩

已上同爲細末好醋半升熬膏不破積水丸

神麴　麥蘗各一兩　乾薑二錢炒　牽牛三兩棟淨

巴豆兩箇去皮油心　半夏半兩　茴香乙兩炒　官桂三兩

右爲細末用膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸溫涼水亦可以意加減以利爲度

人參散

石膏　甘草各一兩　滑石四兩　寒水石二兩

人參半兩

右爲細末每服二錢溫水調下食後

無比山藥丸

乾山藥二兩　肉蓯蓉酒浸焙　五味子六兩擇淨

菟絲子三兩酒浸　杜仲三兩去粗皮炒　牛膝乙兩酒浸

澤瀉乙兩　熟地黃乾乙兩　山茱萸乙兩　茯苓去皮乙兩

巴戟乙兩去心　赤石脂乙兩

右爲細末煉蜜和丸桐子大每服二三十丸食前溫酒下米飲亦可

當歸丸

當歸　香附子炒　杜蘅蒙　芍藥各等分

右爲末酒糊爲丸如小豆大每服三五十丸米飲送下

香薷湯

香薷五錢去土　厚朴五錢薑製　白扁豆二錢半生炒

右爲末每服三錢水一盞入酒煎去滓溫服

石蓽散

石蓽去毛　木通各二兩　王不留行　當歸　甘草各一兩　滑石　白木　瞿麥　葶子　芍藥各三兩

右爲細末每服二錢煎小麥湯調下

京三稜乙兩炮　川烏四錢生去皮　大黃乙兩

已上同爲細末好醋半升熬膏不破積水丸

神麴　麥蘗各一兩　乾薑二錢炒　牽牛三兩棟淨

巴豆兩箇去皮油心　半夏半兩　茴香乙兩炒　官桂三兩

右爲細末用膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸溫涼水亦可以意加減以利爲度

人參散

石膏　甘草各一兩　滑石四兩　寒水石二兩

人參半兩

右爲細末每服二錢溫水調下食後

茴香丸

茴香入兩炒　川楝子炒　川烏炮去皮　威靈仙洗去土　防風去蘆　陳皮各兩　烏藥五兩　地龍乙兩去土　微炒赤小豆八兩

右爲末酒糊爲丸桐子大每服三五丸茶酒下

七宣丸

大黃濕紙裹煨　沉實麵炒各五兩　桃仁六兩炒去皮尖　木香　柴胡去蘆　柯子皮　甘草四兩炒

石爲末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸酒下

人參調中湯

沉香二兩　木香　白豆蔻乙兩用仁　甘草乙分

腦子乙錢 射香半錢 人參半兩

石爲細末每服半錢用沸湯點服或入生薑鹽少許食後服

烏金散

當歸乙兩 自然銅金色者煅爲末醋熬一兩 烏金石鉄炭是也三兩 大黃乙兩童子小便浸用

石爲末每服二錢紅花酒半盞童子小便半盞同調下食前日二服

沉香降氣湯

沉香 木香 硇砂仁 白豆蔻仁 青皮去白 陳皮去白 廣茂煨 枳實麸炒各一兩 蘿白子另末乙兩 黑牽牛末二兩 大黃二兩炒

石爲末生薑汁浸蒸餅爲丸如桐子每服三十九橘皮湯下

枳朮丸 治氣不下降胸膈滿悶

枳實麸炒 白朮各半兩

石爲細末燒飯爲丸如桐子大每服五十九諸飲送下

金 考城張從政著 因在閒日書未傳於世恐爲沉沒故刊而行之

劉河間先生三消論

易言天地自太虛至黃泉有六位內經言人之身自頭至足亦有六位今余又言人胸腹之間自肺至腎又有六位人與天地造化五行同一爐鑄知彼則知此矣故立天之氣曰金與火立地之氣曰土與水立人之氣曰土與水合則濕而寒風火合則熱而燥人胸腹之間亦猶是也肺最在上爲金主燥清心次爲君火主熱肝又次之爲風木主溫膽又次之爲相火主極熱脾又次之爲濕土主涼腎又次之爲寒水主寒故心肺象天脾腎象地肝膽象人不知此者不可與論人之病矣夫土爲萬物之本水爲萬物之元水土合德以陰居陰同處乎下以立地爲氣萬物根於地是故水土濕寒若燥熱陽實則地之氣不立萬物之根索澤而枝葉枯矣五常政大論曰根於中者命曰神機是爲動物根本在於中也根本者脾胃腎也倉入胃則脾爲布化氣味榮養五藏百脈故酸入肝而養筋膜苦入心而養血脈甘入脾而養肌肉辛入肺而養皮毛鹹入腎而養骨髓五氣亦然故淸養肺熱養心溫養肝濕養脾寒養腎也凡此五味五氣太過則病不及亦病惟平則常安矣故六節藏象論曰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生是其理也又太陰陽明論云脾病而四肢不用者何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾胃乃稟也今脾病不能爲胃行其津液不得稟水穀氣脾日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉帝

曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中央常以四時長四藏各十八日寄治不得獨主於時也脾藏者常著土之精也土者生萬物而法天地故上下至頭足不得獨主於時也帝曰脾與胃以膜相連爾而能行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脈貫胃屬脾絡嗌故太陰爲之行氣於三陰足陽明者表也五藏六腑之海也亦爲之行氣於三陽藏腑各因其經而受氣以益陽明故爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉不用者謂不能爲之運用也由是觀之則五藏六腑四肢百骸皆稟受於脾胃行其津液相與濡潤滋養矣後之醫者欲以燥熱之劑以養脾胃滋土之氣不亦外乎況消渴之病者本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚更服燥熱之藥則脾胃之氣竭矣叔世不分五運六氣之虛實而一槩言熱爲實而虛爲寒彼但知心火陽熱一氣之虛實而非臟腑六氣之虛實也蓋肺本淸虛則溫心本熱虛則寒肝本溫虛則淸脾本濕虛則燥腎本寒虛則熱假若胃冷爲虛者乃胃中陰水寒氣實甚而陽火熱氣虛也非胃土濕氣之本衰故當溫補胃中陽火之衰退其陰水寒氣之甚又如胃熱爲實者乃胃中陽火實而陰水虛也故當以寒藥瀉胃中之實火而養其虛水熱此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪非胃爲濕者之本腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生是其理也又太陰陽明論云脾病而四肢不用者何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾胃乃稟也今脾病不能爲胃行其津液不得稟水穀氣脾日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉帝

謂和平交互克伐是謂衰興變亂失常患害由行故水少火多爲陽實陰虛而病熱也水多火少爲陰實陽虛而病寒也其爲治者瀉實補虛以平爲期而已矣故治消渴者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣況消渴者本因飲食服餌失宜腸胃乾澗而氣液不得宜平或耗亂精神過違其度或因大病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱變甚之所成也故濟衆云三消渴者皆由久嗜鹹物恣食炙煿飲酒過度亦有年少服金石九散積久石熱燥甚於胃故渴而于胸中下焦虛熱血氣不能制石熱燥甚雖引飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚饑小便數而漸瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消如此三消者其燥熱一也但有微甚耳余閱世之方多一方而通治三消渴者以其善消水穀而喜渴也然叔世論消渴者多不知本其言消渴者上實熱而下虛冷上熱故煩渴多飲下寒故小便多出本因下部腎水虛而不能制其上焦心火故上實熱而下虛冷又曰水數一爲物之本五行之先故腎水者人之本命之元不可使之衰弱根本不堅則枝葉不茂元氣不固則形體不榮消渴病者下部腎水極冷若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火元甚而難治也但以服藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦火則自然渴止小便如常而病愈也若此之言正與仲景相反所以巧言似是於理實蓮者也非徒今日之誤誤已久哉又如蔣氏藥證病原中論消渴消中消腎病曰三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷如氷又曰膀胱腎臟冷如泉冷似氷又曰膀胱腎虛冷日增重又曰膀胱冷似氷復言五臟本始言三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷且腎臟水冷言爲虛其餘熱者又皆言其虛夫陰陽興衰安有此理且其言自不相副其失猶小至於寒熱差殊用藥相反過莫大焉或又謂腎與膀胱屬木虛則不能制火虛既不能制火故小便多者愈失之遠矣彼謂水氣實者必能制火虛則不能制火故陽虛不能制水小便利而常多豈知消渴小便多者非謂此也何哉蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理佛鬱結滯澁密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外榮養百骸故腸胃之外燥熱太甚雖復多飲于中終不能浸潤於外故渴不止小便多出者如其多飲不能滲泄於腸胃之外故數溲也故金盡言者謂泄氣之門戶也一名鬼門者謂幽冥之門也一名玄府者謂玄微之府也一名氣門者謂氣液之隧道紋理也一名氣穴者謂氣液之所注也心熱入肺久而傳化內爲膈熱消渴多飲數小便如原病式曰皮膚之汗孔者謂泄汗之孔竅也一名氣門者謂泄氣之門戶也一名鬼門者謂幽冥之門也一名玄府者謂玄微之府也一名氣穴者謂氣液之隧道紋理也一名氣門者謂氣液之所注也心熱入肺久而傳化內爲膈熱消渴多飲數小便如故經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長化收藏是知出入升降無器不有故知人之眼耳鼻舌身意神識能爲用者皆由升降出入之通利也有所閉塞則不能用也若目無所見耳無所聞鼻不聞香舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣佛鬱玄府閉塞而致津液血脈榮衛清氣不能升降出入故也各隨鬱結微甚而有病之大小焉病在表則怫鬱腠理閉密陽氣不能散越故燥而無汗而液不能出矣叔世不知其然故見消渴數溲妄言爲下部寒尒豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也予之所以舉此世爲消渴之證乃腸胃之外燥熱否閉其滲泄之道路水雖入腸胃之內不能滲泄於外故小便數出而復有言脾痺而渴者有言肺痺而渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言腎熱而渴者有言脾痺而渴者有言心肺氣厥而渴者有言腎熱而渴者有言肺痺而渴者有言脾熱而渴者有因病癉而渴者有因醉飽入房而渴者有因肥甘石藥而渴者有因傷胃乾而渴者有因勞倦過大熱而渴者有因腎熱而渴者有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所遊各異其歸燥熱一也

所謂心肺氣厥而渴者刺熱論曰心移熱於肺傳爲膈消注曰心熱入肺久而傳化內爲膈熱消渴多飲也

肝痺而渴者痺論曰肝痺者夜臥則驚多飲數小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿

所謂腎熱而渴者刺熱論曰腎熱病者先腰痛脊酸苦渴數飲身熱熱論曰少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故曰燥舌乾而渴叔世惟言腎虛不能制心火爲上實熱而下虛冷以熱藥溫補腎水欲令勝退心火者未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則爲熱心火屬陽而本熱虛則爲寒若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱明矣故氣厥論曰腎氣衰陽氣獨勝宣明五氣論曰腎惡燥由燥腎枯水涸藏氣發時論曰腎苦燥急食辛以潤之夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎水既不勝心火則上下俱

熱奈何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不緣被又如胃與大腸熱結而渴者陰陽別論二陽結爲之消注曰陽結胃及大腸俱熱結也腸胃藏熱善消水穀又氣厥論曰大腸移熱於胃善食而瘦脉要精微論曰癉成爲消中善食而瘦如腸癉而渴者數飲而不得中氣喘而爭時發飧泄夫數飲而不得中其大便必不停留然則消渴數飲而小便多者止是三焦燥熱佛鬱而氣衰也明矣豈可以燥熱毒藥助其强陽以伐衰陰乎此眞實實虛虛之罪也夫消渴者多發聖肯癉癉痤痈之類皆腸胃燥熱佛鬱水液不能浸潤於周身故也或熱甚胸膈佛鬱不能滲泄水液矣行而面上腥也如小腸癉熱而渴者畢痛論曰熱氣留于小腸腸中痛癉熱甚而便堅不得出矣注曰熱滲津液而小便堅矣如言病癉甚而渴者癉論曰陽實則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲冷也然陽實陰虛而爲病熱法當用寒藥養陰瀉陽是謂瀉實補衰之道也如因肥甘石藥而泄者奇病論曰有口甘者病名爲何岐曰曰此五氣之所溢也病名脾癉癉爲熱也脾熱則四藏不裏故五氣上溢也先由脾熱故曰脾癉又經曰五味入口藏於胃脾爲之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉而爲消渴通乎虛實論曰消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴之人齊粱之疾也或言人惟胃氣爲本脾胃合爲表裏脾胃中州當受溫補以調飲食今消渴者脾胃極虛差宜溫補若服寒藥耗損脾胃本氣虛乏而難治也此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道故矣言而無畏也豈知腹中論云帝曰夫子數言熱中消中不可服芳草石藥發癲芳草發狂注言多飲數溲謂之消中多飲數溲謂之熱中多飲數溲喜曰癲多怒曰狂芳美味也石謂英乳乃發熱之藥也經又曰熱中消中皆富貴人也今禁膏粱是不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰芳草者味美石藥之味悍二者之氣急疾堅勁故非緩心和人不可服此二者帝曰何以然岐伯曰夫熱氣慓悍藥氣亦然所謂飲一溲二者當脚氣從水而出也其水殺之海竭矣凡見消渴便用熱藥誤入多矣故內經應言渴者皆燥熱甚而勝如是豈不昭晰歟然而猶有惑者諸氣過極反勝也者是以人多誤也如陽極反似陰者是也若不明標本認似爲是始終乖矣故凡見下部覺冷雨滕如冰此皆心火不降狀類寒水宜加寒藥下之三五次則火降水升寒化自退然而舉世皆同執迷至如易素二書乘如朽壞良可悲夫故處其方必明病之標本達藥之所能通氣之所宜而無加害者可以制其方也已所謂標本者病而爲本後病而爲標此爲病之本末也標本相傳先當救其急也又云六氣爲本三陰三陽爲標蓋爲病病最急也又云六氣爲胃之本假若胃熱者胃爲熱爲本也虛其方者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以甚者爲邪衰者爲正法當瀉甚補衰以平爲期養正除邪乃天之道也爲政之理補救之義也大凡治病明知標本按法治之何必謀於衆陰陽別論曰謹熟陰陽無與衆謀標本病傳論知標知本萬舉萬當不知標本是謂妄行至眞要大論曰知標知本用之不殆明知逆順正行無間不知是者不足以言診適足以亂經故大要曰粗工嘻嘻以爲可知言熱未已寒病復起同

氣異形迷診亂經此之謂也夫標本之道要而博小而大可以言一而知百言標與本易而弗損察本與標氣可令調明知勝復爲萬民式天之道畢矣夫元紀大論曰至數極而道不惑可謂明矣所謂藥之巧能者溫涼不同寒熱相反燥濕本異云云前已言之矣斯言氣也至於味之巧能如酸能收甘能緩辛能散苦能堅鹹能軟酸屬木也燥金主於散落而木反之土濕主於緩而水勝之故能然也若能燥濕而堅火者苦也易曰燥萬物者莫熯乎火凡物燥則堅也甘能緩苦急而散結甘者土也燥能急緩故緩則急散也辛能散抑散結潤燥辛者金也金主散落金生水故也況抑結散則氣液宣行而津液生也藏氣法時論曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也鹹能軟堅鹹者水也水潤而柔故勝火之堅矣此五藏之味也其爲五味之本也淡也淡胃土之味也胃土者地也地爲萬物之本胃爲一身之本天元紀大論曰在地爲化化生五味故五味之本淡也以配胃土淡能滲泄利竅夫燥能急結而甘能緩之淡爲剛土極能制燥緩其急結令氣通行而致津液滲泄也故消渴之人其藥與食皆宜淡劑至寶哉六論曰辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽六者或散或收或緩或急或燥或潤或堅或軟所以利而行之調其氣也本草云藥有三品上品爲君主養命小毒以應天中品爲臣主養性常毒以應人下品爲佐使主治病大毒以應地不在三品者氣毒之物也凡此君臣佐使者所以明藥之善惡也處方之道主治病者爲君佐君者爲臣應臣之用者爲佐使若其病之所根有君臣佐使奇偶小大之制明其歲政君臣

脉位而有逆順反正主療之方隨病所宜以施用其治
法多端能備所用者良工也寒者熱之熱者寒之温者
清之清者温之結者散之散者收之微者逆而制之甚
者從而去之燥者潤之濕者燥之堅者軟之軟者堅之
急者緩之客者除之留者却之勞者温之逸者行之薄
者平之衰者補之甚者瀉之吐者下之摩之畜之薄之
劫之開之發之衰之制之適足爲用各安其氣必精必
淨而病氣衰去藏腑和平歸其所宗此治之大體也陰
陽應象論曰治不法天之紀不明地之理則災害至矣
又六節藏象論曰不知年之所加氣之所衰不可以爲
功也今集諸經驗方附于篇末

神白散　治眞陰素被損虛多服金石等藥或嗜炙煿
鍼物遂成消渴

桂府滑石六兩　甘草乙兩生用

右爲細末每服三錢温水調下或大渴欲飲冷者新
汲水尤妙

豬肚丸　治消渴消中

豬肚乙枚　黃連五兩　栝蔞四兩　麥門冬四兩去心　知母四兩

右四味爲末納猪肚中線縫安置甑中蒸極爛熟就
熱於木臼中搗可丸如梧子大每服三十丸漸加至四五十丸渴則服之如無木臼以沙盆中用木杵研亦可以爛爲妙矣

葛根丸　治消渴消腎

葛根三兩　栝蔞三兩　鉛丹二兩　附子乙兩去皮臍用

右四味搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十
丸日進三服治日飲石水者春夏去附子

小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖然所不載以內經考之但燥熱之微甚者也此藥兼療

胡粉散　治大渴百方療不瘥者亦治消腎

鉛丹　胡粉各半兩　栝蔞乙兩半　甘草二兩半炙

澤瀉　石膏　赤石脂　白石脂各半兩

右八味爲細末水服方寸匕日三服七日二服壯者一匕半一
年病一日愈二年病二日愈渴甚者二服腹痛者減
之如九服亦妙每服十九多則腹痛也

三黃丸　主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉嬾
人帶下手足發寒熱者

春三月　黃芩　四兩　黃連四兩　大黃二兩

夏三月　黃芩　六兩　黃連二兩　大黃一兩

秋三月　黃芩　六兩　黃連三兩　大黃二兩

冬三月　黃芩　三兩　黃連三兩　大黃五兩

右三味隨時加減搗爲細末煉蜜和丸如大豆大每
服五九日三服不去者加七九服一月病愈嘗試有
驗矣

人參白朮散

治胃脘癰熱煩滿不欲食或痤成爲消中善食而瘦
或燥鬱甚面消渴多飲而數小便或熱病或飲酒色
誤服熱藥者致脾胃眞陰血液損虛肝心相搏風熱
燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身
不得潤濕故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液
終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多
也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又
如周身風熱燥鬱或爲目瘡瘡痕瘡癤瘡上爲喘嗽下
爲瘡癰或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹
脹也凡多飲數溲爲渴多食數溲爲消中肌肉消瘦
小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖然所不載以內經考之但燥熱之微甚者也此藥兼療

胡粉散　治大渴百方療不瘥者亦治消腎

鉛丹　胡粉各半兩　栝蔞乙兩半　甘草二兩半炙

澤瀉　石膏　赤石脂　白石脂各半兩

右八味爲細末水服方寸匕日三服七日二服壯者一匕半一
年病一日愈二年病二日愈渴甚者二服腹痛者減
之如九服亦妙每服十九多則腹痛也

三黃丸　主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉嬾
人帶下手足發寒熱者

春三月　黃芩　四兩　黃連四兩　大黃二兩

夏三月　黃芩　六兩　黃連二兩　大黃一兩

秋三月　黃芩　六兩　黃連三兩　大黃二兩

冬三月　黃芩　三兩　黃連三兩　大黃五兩

右三味隨時加減搗爲細末煉蜜和丸如大豆大每
服五九日三服不去者加七九服一月病愈嘗試有
驗矣

人參白朮散

治胃脘癰熱煩滿不欲食或痤成爲消中善食而瘦
或燥鬱甚面消渴多飲而數小便或熱病或飲酒色
誤服熱藥者致脾胃眞陰血液損虛肝心相搏風熱
燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身
不得潤濕故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液
終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多
也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又
如周身風熱燥鬱或爲目瘡瘡痕瘡癤瘡上爲喘嗽下
爲瘡癰或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹
脹也凡多飲數溲爲渴多食數溲爲消中肌肉消瘦
小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖然所不載以內經考之但燥熱之微甚者也此藥兼療

胡粉散　治大渴百方療不瘥者亦治消腎

鉛丹　胡粉各半兩　栝蔞乙兩半　甘草二兩半炙

澤瀉　石膏　赤石脂　白石脂各半兩

右八味爲細末水服方寸匕日三服七日二服壯者一匕半一
年病一日愈二年病二日愈渴甚者二服腹痛者減
之如九服亦妙每服十九多則腹痛也

三黃丸　主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉嬾
人帶下手足發寒熱者

春三月　黃芩　四兩　黃連四兩　大黃二兩

夏三月　黃芩　六兩　黃連二兩　大黃一兩

秋三月　黃芩　六兩　黃連三兩　大黃二兩

冬三月　黃芩　三兩　黃連三兩　大黃五兩

右三味隨時加減搗爲細末煉蜜和丸如大豆大每
服五九日三服不去者加七九服一月病愈嘗試有
驗矣

人參白朮散

治胃脘癰熱煩滿不欲食或痤成爲消中善食而瘦
或燥鬱甚面消渴多飲而數小便或熱病或飲酒色
誤服熱藥者致脾胃眞陰血液損虛肝心相搏風熱
燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身
不得潤濕故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液
終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多
也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又
如周身風熱燥鬱或爲目瘡瘡痕瘡癤瘡上爲喘嗽下
爲瘡癰或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹
脹也凡多飲數溲爲渴多食數溲爲消中肌肉消瘦
小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖然所不載以內經考之但燥熱之微甚者也此藥兼療

胡粉散　治大渴百方療不瘥者亦治消腎

鉛丹　胡粉各半兩　栝蔞乙兩半　甘草二兩半炙

澤瀉　石膏　赤石脂　白石脂各半兩

右八味爲細末水服方寸匕日三服七日二服壯者一匕半一
年病一日愈二年病二日愈渴甚者二服腹痛者減
之如九服亦妙每服十九多則腹痛也

三黃丸　主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉嬾
人帶下手足發寒熱者

春三月　黃芩　四兩　黃連四兩　大黃二兩

夏三月　黃芩　六兩　黃連二兩　大黃一兩

秋三月　黃芩　六兩　黃連三兩　大黃二兩

冬三月　黃芩　三兩　黃連三兩　大黃五兩

右三味隨時加減搗爲細末煉蜜和丸如大豆大每
服五九日三服不去者加七九服一月病愈嘗試有
驗矣

人參白朮散

治胃脘癰熱煩滿不欲食或痤成爲消中善食而瘦
或燥鬱甚面消渴多飲而數小便或熱病或飲酒色
誤服熱藥者致脾胃眞陰血液損虛肝心相搏風熱
燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身
不得潤濕故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液
終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多
也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又
如周身風熱燥鬱或爲目瘡瘡痕瘡癤瘡上爲喘嗽下

所不載以內經考之但燥熱之微甚者也此藥兼療
一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過
積毒一切腸胃滯濁壅塞瘡癬瘙痒痿痺并傷寒雜病煩
渴氣液不得宣通并宜服之

人參　白朮　當歸　芍藥　大黃　山梔子
澤瀉各半兩　連翹　瓜蔞根　乾葛　枳殼各一兩
官桂　木香　藿香各一分　寒水石二兩　甘草二兩
石膏四兩　滑石　盆硝各半兩

右爲細末每服五錢水一盞生薑三片同煎至半盞
絞汁入密少許温服漸加十餘錢無時日三服或得
臟腑疏利亦不妨取効更妙後却常服之或兼服消
痞丸似覺腸胃結滯或濕熱內甚自利者去大黃芒
硝

人參散

治身熱頭痛或積熱黃瘦或發熱惡寒畜熱寒戰或
腸痰嘔吐煩熱煩渴或燥濕瀉病或目疾口瘡或咽
喉腫痛或風昏眩或蒸熱虛汗肺痿勞嗽一切邪熱
變化眞陰損虛並宜服之

石膏乙兩　寒水石二兩　滑石四兩

甘草二兩　人參半兩

右爲細末每服二錢温水調下或冷水亦得

三消之論劉河間之所作也因麻徵君寓汴梁戲日訪
先生後齋或舉教醫學者聞其人矣徵君親論其家來
先生平昔所著通詩乃出三消論氣宜病機三書未傳
于世者又多不全止取三消論於卷首增寫六位藏象
二圖其餘未遑謄色即付友人穆子昭乃河間門
人穆大黃之後也時重官于京師方且告因徵君欲因

是而惠之由是余從子昭授得一本後值兵火遂失其傳偶於鄉人崔司承君祥處復見其文然傳寫甚誤但依倣而錄之以付後之學者詳爲刊正云時申辰年冬至日錦溪野老書續方栢亭東久亭寺

備悟大師傳經驗方

治飲水百盃尙猶未足小便如油或如杏色服此藥三五日小便大出壽躋于下十日永除根本

水銀四錢　錫二錢用水銀研成砂子　牡礪乙兩　密陀僧乙兩　知母乙兩　紫花苦參乙兩　貝母乙兩　黃丹半兩　瓜蔞根半斤

右爲細末男子用不生兒猪肚一箇內藥婦人用猪肚一箇麻線縫之新瓦一合繩繫一兩道米一升更用瓜蔞根末半斤却於新水煮熟取出放冷用砂盆內研爛就和爲丸如猪肚丸法用之

儒門事親卷十四

金　考城張從政著

扁鵲華陀察聲色定死生訣要

病人五臟已奪神明不安聲嘶者死

病人循衣縫語語者不可治

病人陰陽俱絕擧衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者至期而死重出在下文

病人面黃目赤不死赤如衂血者死

病人面黃目白者不死白如枯骨者死

病人面黃目黑者不死黑如苔死

病人面黑目青者不死

病人面青唇黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目不閉直視者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目睛脫恍惚者死

病人陰陽竭絕目睛陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人卧遺尿不覺者死

病人尸臭者不可治

肝病皮黑脇之日庚辛死

心病目黑臂之日壬癸死

脾病唇青肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死

病人耳目鼻口有黑色起于入口者必死

病人目無精光若土色不受飲食者四日死

病人目精光及牙齒黑色者不治

病人耳目及顴頰赤者死在五日中

病人黑色出于額上髮際直鼻眷兩額上者亦死在五日中矣

病人黑色出天中下至上顴上者死

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中矣

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者必死矣

病人面黑直視惡風者死

病人面黑唇青者死

病人面青唇黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經膽氣妄泄目則爲青雖天救亦不可生

病人面赤目白者十日死憂恚思心氣內索面色反好急棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脈空索

病人面黑目白八日死腎氣內傷病因留積

病人面青目白五日死

病人着牀心痛短氣脾氣內竭後百日復愈能起彷徨因坐於地其上倚牀能治此者也

腎病面腫唇黃脾之日戊巳死
青欲如蒼璧之澤不欲如藍
赤欲如帛裹朱不欲如赭
白欲如豬脂不欲如枯骨
黑欲如黑漆不欲如炭
黃欲如雞冀雄黃不欲如土
目赤色者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃色不可名者病在胸中
診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病也從外入內者少陽病也
診寒熱瘧瘧目中有赤脉從上下至瞳子見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死三脉三歲死
診牙齒痛按其陽明之脉來太過者獨熱在右右熱熱在左左熱熱在上上熱熱在下下熱
診血者脉多赤多熱多青多痛多黑多黃多痺多黑多青皆見者寒熱身痛面色微黑齒垢黃爪甲上黃寫也安卧少黃赤脉小而滿者不嗜食
診百病死生訣第七
診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死傷寒已得汗脉沉小者生浮大者死
溫病三四日已下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治
溫病穠穠大熱其脉細小者死千金穠穠作特行
溫病下痢腹中痛甚者死不治
溫病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅強急者生
虛羸者死

溫病二三日身體熱腹滿頭痛熱如故脉直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而杜脉來細強十二日死八九日頭不疼身不痛目不變色不變而反利脉來喋喋按之不彈手時時心下堅十七日死
熱病七八日脉不軟一作喘不散一作數者當有瘡瘕後三日溫汗不出者死
熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦乾黑者死
熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥
熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治
熱病已得汗大熱不去者亦死
熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治
熱病發熱熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利
診人被風不仁痿躄其脉虛者生堅急者死
診癲病虛則可治實則死
診癲病脉實堅者生脉沉細者死
又癲疾脉得大滑者久而自已其脉沉小急實不可療也
小堅急者亦不可療也
診頭痛目痛久視無所見者死
診人心腹積聚其脉堅強急者生虛弱者死又實強者生沉者死其脉大腹大腹四肢逆冷其人脉形長者死
腹脹滿便血脉大時絕極下血小疾者死
腸澼便血身熱則死寒則生
腸澼下白沫脉沉則生浮則死
腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生
腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者生懸滑者死以臟期之
腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大有熱者死
腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死
胴腄食不化不得留下膿血脉微小連者生緊急者死
洩注脉緩時小結者生浮大數者死
蟲蝕陰注其脉虛小者生緊急者死
軟嗽脉沉緊者死浮直者浮軟者生小沉伏匿者死
軟嗽羸瘦脉形堅大者死
軟嗽脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者必死
軟而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絕者死
吐血衄血脉滑小弱者生實大者死
吐血而軟上氣其脉數有熱不得臥者死
上氣脉數者死謂損形故也
吐血脉緊強者死滑者生
吐血而軟上氣其脉數有熱不得臥者死
上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者必死
上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死
上氣往液其脉虛窅伏匿者生堅強者死
寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆者死太素云寒氣在上脉前實
何如曰實而滑則生實而逆則死弥其形盡滿何如曰脉形盡滿者脉急大堅尺滿而不應則死何謂順則生逆則死所謂順者手足温也逆者手足寒也
病癉脉實大病久可治脉弦小堅急病久不可治
消渴脉數大者生細小浮短者死
消渴脉沉小者生實堅大者死
水病脉洪大者可治微細不可治

水病脹閉其脉浮大軟者生沉細虛小者死
水病腹如鼓脉實者生虛則死
卒中惡咯血數升脉沉數細者死浮大疾快者生
卒中强腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死緊細而微亦生
瘡腰脊强急痙癎皆不可治
寒熱痙癎其脉代絕者死
金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死
金瘡出血脉沉小者生浮大者死
斫瘡出血一二升脉來大二十日死
斫刺俱有病多少血出不自止者其脉來大者七日死
骨細者生
從頭頓仆內有血腹脹滿其脉堅强者生小弱者死人爲百藥所中傷脉澁而疾者生微細者死洪大而遲者生千金遲作連
人病甚而脉不調者難治脉洪大者易癒
人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死脉實滿手足寒頭熱春秋生冬夏必死矣
老人脉微陽氣陰强者生脉大而加疾者死陰弱陽强脉至而代期月而死
尺脉滿而堅爲血實氣虛也其發腰腹痛逆滿氣上行此爲婦人胞中絕傷有瘀血久成結瘕得病以冬時乘當赤而死
尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是殺氣不充病得節輒動衰集生而死此病秋時得之左手寸口脉偏動在大在小不齊從寸至關至尺三部之位其

脉動各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落而死
右手寸口脉偏沉伏在小在大朝浮大而暮沉伏浮大即太過上出魚際沉伏即下不止關中往來無常時復來者椅葦枯而死
右手尺部脉三十動一止有須臾還二十動止乍動乍疎連連相因因不與息數相應其人雖食穀猶不久繫草生而死
右手尺部脉四十動而一止止而復來來遲如循張弓弦絕絕然如兩人共一索主立冬死

病機

標本運氣歌

諸風掉眩皆屬於肝甲乙木也木鬱達之
諸熱瞀瘈皆屬於心丙丁火也火鬱發之
諸濕腫滿皆屬於脾戊己土也土鬱奪之
諸痛痒瘡皆屬於心丙丁火也火鬱發之
諸氣膹鬱皆屬於肺庚辛金也金鬱折之
諸寒收引皆屬於腎壬癸水也水鬱泄之
諸病水液澄澈清冷皆屬於寒上下所出及吐出涌出諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱
諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱反戾筋轉也水液小便也
故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疏其血氣令其調達而致和平此之謂也五勝謂五行更勝也

標本運氣歌

少陽從本爲相火太陰從本爲上坐厥陰從中火是家
陽明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相包裹
風從火斷汗之宜燥與濕蒸下之可萬病能將火濕分
徹開軒岐無繼鎖

辯十二經水火分治法

膽與三焦尊火治肝和包絡都無異脾胃常將濕處求
胃與大腸同濕治惡寒表熱小膀濕四經有熱有寒時
十二經最端的四經屬火四經濕攻裏解表細消息濕同寒火同熱寒熱分來半分寒寒熱中停貧浪舌休治風休治燥治得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏如或兩可攻後先內外分多少敢謝軒岐萬世恩爭奈醫難笑天小

治病

諸逆衝上皆屬於火炎上之性用也
諸脹腹大皆屬於熱熱鬱於內肺脹於上不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法識病得法工中之甲

六陳

藥有六味陳久爲良猥茅半橘枳實麻黃

十八反

本草名言十八反半夏貝蔹及攻烏藻戟遂芫俱戟草
諸參辛芍叛藜蘆

運氣歌

病如不是當年氣看與何年運氣同只向某年求治法
方知都在至真中

五不及

坎一丁三土五中兌七癸九是炎宮勝復都來十一位
誰知臟腑與宮同

陰病人生死

靈樞經云人有兩死而無兩生陽氣前絕陰氣後竭其
人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭其人死身色必赤
故陰竭則身青而冷陽竭則身赤而溫

四因

夫病生之類其有四焉一者始因氣動而內有所成二
者始因氣動而外有所成三者不因氣動而病生於內
四者不因氣動而病生於外
因氣動而內成者謂積聚癥瘕瘤氣癭起結核類痼之
類是也
不因氣動而病生於內者謂飲澁食餵勞損宿食
霍亂悲恐喜怒相慕憂結之類
不因氣動而病生於外者謂蠆氣賊蠚蟲蛇蟲毒蠆食
鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕所射刺割撻朴之類也如此
四類有獨治內而愈者有兼治內而愈者有獨治外而
愈者有兼治外而愈者有先治內後治外而愈者有先
治外後治內而愈者有須解毒而攻擊者有須無毒而
調引者凡此之類方法所施或重或輕或緩或急或收

或散或澀或燥或軟或堅方士之用見解不同各擅已
心好丹非素故復問之

五苦六辛

五苦六辛從來無解蓋史家闕其疑也一日麻徵君以
此質疑于張先生先生亦無所應行十五里忽然有所
悟欣然迴告于麻徵君以爲五苦者五臟爲表屬陰宜
用苦劑謂苦涌泄爲陰六辛者六腑爲表屬陽宜用辛
劑謂辛甘發散爲陽此其義也徵君大服其識鑒深遠
整昔人不傳之妙故曰知其要者一言而終不知其要
者流散無窮

治壞蛄瘡

瘡瘍癰腫第一

艮豆 白茂 漏青各等分
右爲細末嚙芝蘇水同熬爲膏入冷水共定用緋絹
攤火炭斗作膏藥貼瘡上

又方千年石灰 茜根燒灰
右爲細末用水調雞翎塗上

水沉金絲膏 貼一切惡瘡

漏青 白膠 巳上各一兩 春秋宜用油
夏宜油蠟二錢半 冬宜用油 四錢
右件銼開油蠟下漏青白膠用槐枝攪勻綿子濾過
入冷水中扯一千餘遍如瘡透了與數丸作劑於瘡
口塡者亦妙攤紙上貼勿令火炙炙
乳香散 治下疳

乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龍骨 烏魚骨
黃連 黃柏 銅綠各等分 麝香少許
右爲細末先以溫漿水洗過貼疳瘡上

治蛇傷方

右用蒲公英科根作塗貼于傷處用白麵膏藥貼之
大效

紫金丹 治疔瘡

白礬四兩 黃丹二兩
右用鍮石器內鎔著作汁下丹使銀釵子攪之令紫
色成也用炙甘草火無令太過不及如有瘡先以週圍
挑破上藥然後津塗上數度着無令落乾其瘡潰動

取疔出血漸漸癰頭色紅赤爲效如藥未成就再杵碎
炒令紫色
治疔瘡
生薑一寸許年遠一處砭成膏
右先將瘡週圍用竹鍼刺破然後用瘡藥於瘡上攤之用絹蓋覆如人行二十里覺疔出然後以熱
湯洗之
千金托裏散 治一切發背瘡
連翹乙兩 黃芪乙兩 厚朴二兩 川芎乙兩
防風一兩 桔梗一兩 白芷一兩 芍藥一兩 官桂一兩
木香三錢 乳香三錢半 當歸半兩 沒藥三錢 甘草一兩 人參半兩
右爲細末每服三錢用酒一碗盛煎三沸和滓溫服
膏子貼之
保生錠子
巴豆四十九箇另研 金脚信二錢 雄黃三錢
輕粉半兩 硇砂二錢 麝香二錢
右件爲末用黃蠟一兩半化開藥將和成錠子冷水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭撮破每用貼一餅子次用神聖膏藥封貼然後服托裏散若瘡氣透裏危者服破棺散用神聖膏貼之
神聖膏藥 貼治一切惡瘡
當歸半兩 沒藥三錢 白芷二錢半 乳香二錢

葉本半兩 琥珀二錢半 黃丹四兩 木鱉子五箇去皮
膽礬一錢 粉霜一錢 黃蠟二兩 巴豆二十箇去皮用
五倍子一百二十條去皮 槐柳枝一把各長一尺 清油一斤
右件一處先將槐柳枝下油內煮焦取出次後下其餘藥物煮得極焦赤撈出却將油澄清再熬成膏子用絹上攤貼之
破棺丹
大黃一兩半 甘草二兩 荊三稜一兩半 山梔子二兩 巴豆二十箇去皮用
犛牛末二兩
右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服半丸食後酒半盞研化服之忌冷水
三聖散 治臁瘡疔瘡搭手背瘡等瘡
葱白一斤 馬糞一斤 石灰一斤
右三味溫爲度陰乾細末貼瘡如有死肉者宜先用潰死肉藥
潰死肉藥方
炊飯尖半兩各三等 一等半兩入巴豆二箇 一等半兩入巴豆五箇 各捻作白錠子
一等
治附骨癰及一切惡瘡
當歸半兩 甘草一兩 山梔子十二箇 木鱉子一箇
右爲細末每服三五錢冷酒調服之
治諸惡瘡
白殭蠶直者 大黃各等分
右爲細末生薑自然汁與蜜同和爲丸如彈子大每用五巴豆者更用丹砂炒紅色摻瘡口追出清水其惡肉未盡至追出赤水是惡肉盡更用三聖散貼之
用膏藥傅之
服一丸細嚼
治臁瘡久不愈者
用川烏頭黃蘗各等分爲末用唾津調塗紙上貼之
治一切惡瘡方
以天茄葉貼之或爲細末貼之亦妙
又方 用臘月人中白燒灰油調塗瘡疥上

又方 以瓦松不拘多少陰乾爲末先用槐枝葱白湯洗過摻之立效灸瘡久不斂者更妙
又方 以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺
蕃鍼九 治一切惡瘡
川烏二錢 草烏二錢 五靈脂二錢 輕粉一分 粉霜一分
又方 加斑猫二十箇去足翅用 巴豆二十箇去皮用
右將三件爲末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班猫巴豆以水調栁爲錠子如作散是調封頭骸
懸蹙散 治發背惡瘡
懸蹙一箇 大黃一兩 皂角刺一兩 金銀花一兩 當歸半兩
右剉碎用酒一碗煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子
治附骨癰及一切惡瘡
當歸半兩 甘草一兩 山梔子十二箇 木鱉子一箇
右爲細末每服三五錢冷酒調服之
治諸惡瘡
白殭蠶直者 大黃各等分
右爲細末生薑自然汁與蜜同和爲丸如彈子大每用三聖散貼之
服一丸細嚼
治惡瘡死肉鍼子
巴豆一錢去皮心 五靈脂半兩 黃丹二錢 枯礬一錢
右爲細末以糊和丸鍼子入瘡內用之
當歸活血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人產前後腹痛
當歸二錢 沒藥一錢半 乳香半錢 白芍藥三錢

瘡瘍者加人參木香婦人加赤芍藥
右爲細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服
日二服婦人酒煎病既癒不須用

蕭惡瘡藥

紫花地丁一名米布袋根

右取根鼈乾用四箇牛頭塼墨成煙子燒着地丁用
絡垤塼一枚盖了使令塼眼內煙出蕭惡瘡出黃水

自愈

治蛇瘡

用蒲公英科根作塗貼于傷處用白膏藥封之

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣一箇 金色自然銅半兩燒紅醋碎研爲細末 乳香二錢爲細末用之 銅錢重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細用之 金絲水蛭乙錢半每箇作三截瓦上炒去氣道爲度 沒藥三錢研細

右爲細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得出
膿先用粗藥末少許小麻油半匙同打勻再入少半
匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打
成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破
便效如打折骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加
馬兜鈴末半錢同好酒一大盞煎調連滓溫服如骨
折損立接定不疼如不折了喫了藥立住疼痛
此方屢經効驗不可具述服藥覷可以食前服食後

服又外用接骨藥

陳爛麻根燒灰羊耳 亂絲一握多者更妙 菜乙對

右取肥松節舂碎約量多少先放三兩根於新瓦上
都於上外三味在上燒着存性研爲末如生再燒研
爲度後入五靈脂或半兩如疼入好乳香少許和藥

如茶褐色爲度用布條子約纏一遍先攤小黃米粥
勻上敷上藥末勻纏定折處上又用軟帛三五重上
又竹箚子纏勒得緊慢得中初三日換上一次再後
五日換一次又七日再換上一次無有不接者

赤龍散 消散一切腫毒

用野葡萄根紅者去粗皮爲末新水調塗腫上頻搽
新水

便癰方本名血瘤

牡礪 大黃 甘草各等分

右爲極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一枚
乳香一粒無灰酒一小盞在下食前如不折其藥反
出服罷其痛不可當勿疑待一日如骨未接再服如
前老者十餘日少者不過五七日
萬聖神應丹出簡頭

真若科一名天仙子取着中一科根本枝葉花實全者佳

右於端午日前一日持不語蓐兒真若科言道先生
懷却在這裏那道罷用柴灰自東南爲頭圍了用木
桿子撅取了根週遭土次日端午日未出時依前持
不語用鐵一口挖取出土用淨水洗子不令雜犬婦
人見於淨室中以石臼搗爲泥丸如彈子大黃丹爲
衣以紙袋封了懸於高處陰乾如有人着箇不能出
者用綿裹肚繫了先用象牙末於瘡口上貼之後用箭藥如瘡口生合用刀子剺開貼之

銅錢半兩醋浸焠焦燒研爲末 木香一錢 自然銅一錢 麝香少許

右爲極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一枚
乳香一粒無灰酒一小盞在下食前如不折其藥反
出服罷其痛不可當勿疑待一日如骨未接再服如
前老者十餘日少者不過五七日

治凍瘡

臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡口上

又方 以正黃蠟爲細末用乳汁調塗瘡口上

又方 以山藥少許生於新瓦上磨爲泥塗瘡口上

治手足裂

白芨不以多少爲末水調塗裂處

治面上瘡

用鐵子底黑煤於小油中以匙打成膏子攤在紙上

貼瘡神效

治金瘡血不止

用白蔌末貼之立止

善應膏藥

黃丹二斤 南乳香另研 沒藥另研 當歸 木鱉子生用 白蘞生用 官桂三寸 杏仁生 白芷各一兩 新柳枝各長一斤

右除黃丹乳沒等外八件用芝蘇油五斤浸一宿用鐵鍋內煎令黃色藥不用炙入黃丹鍋內柳條攪令黃色方可撥下用柳枝攪出大煙入乳沒勻令冷傾在磁盆內候藥硬用刀子切作塊油紙裹

接骨丹

五靈脂一兩 茴香一錢

右二味爲細末另研乳香爲細末於極痛處揉上再用扇子異小黃米粥塗了後用二味藥末撮於上了用木片子糝了少壯人二日効老者五六日見効

矣

治癬如聖丸

黃蘗 黃芩 黃連 防風各半兩 輕粉半錢

白殭蠶一兩 全蝎三分

右爲細末羊蹄根汁浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服二三十丸嚼羊蹄根汁送下隨病人上下分食前後

又羊蹄汁塗癬

治小兒癬雜瘡

白膠香 黃蘗 輕粉

右爲細末羊骨髓調塗癬上

治瘰癧方

聖靈丹 治打撲閃損痛不可忍者

乳香三錢 去核細切 烏梅五箇 去核細切 斑猫去頭翅足 赤小豆 白殭蠶 黃丹研 苦丁香 白丁香 磨刀泥 白萬陀子二兩 凡二十七箇

右各等分爲細末十歲已上服一錢二十已上服二錢五更用新汲水一盞調下比至辰時見効女人小便見赤色白色三兩次男子於大便中見赤色白色爲効當日服白粘粥不得與別物大忌油膩葷腥者只一服七八年者再一服

玉餅子 治瘰癧一切惡瘡軟節

右用白膠一兩滋器內銚開去滓再於銚開後以草藥子六十四箇作泥入膠內攪勻入小油半匙柱頭鐵器內煮以撚起攪成膏子於腦上點自出或先以草莖刺破點以新水

又方 桑柴灰石灰淋汁熬成膏草莖刺破點以新水

沃之忌油膩等物

燒湯火方

多年廁上物與走獸爲末小油調塗燒處勿令犯水

又方 生地黃汁入小油蠟同熬成膏磁器內盛用雞翎掃燒處

又方 墻上青苔燒灰小油調塗燒處

治燒燙方

生地黃旋取新者爛搗取自然汁入小油黃蠟少許

銀石器中熬成膏子用雞翎掃瘡上

又方 血餘用臘猪脂調塗

治眉瘊頭瘡

小麥不以多少燒令黑色存性爲末以小油調塗之

又方 寒水石燒過爲細末水調塗

枯瘡方

砒礵砂 黃丹 雄黃 粉霜 輕粉各一錢 斑猫二十箇 生用 朱砂一錢 乳香三錢

沒藥一錢

同研爲末粥糊爲丸捏作碁子樣焙乾先炙破瘤頂三壯爲則上以瘡藥餅盖上用黃蘗末以水調貼之數日自然乾枯落下

又方　銅綠爲末草刺破瘤摻在上以膏藥塗之
治頭面生瘤子用蚱絲勒瘤子根三二日自然退落
乳香散　貼杖瘡腫痛
大黃　黃連　黃蘗　黃芩各三錢　腦子少許
乳香另研　沒藥另研各一錢
右四味爲末後入三味拎水調勻攤於絹上貼杖瘡上
治疳瘡
馬明退燒灰三錢　輕粉少許　乳香少許
右研爲細末先以温漿水洗淨乾摻之
治疳瘡久不愈者
海浮石燒紅醋淬數次　金銀花
右海石二停金銀花一停同爲細末每服二錢半如
薏苡一般日用二服瘡在上食後在下食前服如病
一年服藥半年則愈
瀉肺湯　治肺癰喘急坐卧不安
桑白皮剉炒　甜葶藶隔紙炒各一兩
右二味粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓空心
温服以利爲度
桔梗湯　治肺癰吐膿
桔梗剉炒一兩半　甘草炙剉半兩
右爲細末每服六七錢水二盞煎至半盞去滓食後
服須臾吐膿立愈
黃蘗散　治鵝嗌徹腫等瘡
黃蘗　白芨　白斂各等分　黃丹少許
右爲細末凉水調塗

口齒咽喉第二

地龍散　治牙痛
地龍去土　玄胡索　華撥各等分
右爲細末每用一分用綿子裹隨左右痛於耳內塞
之大効
牙皇藥
華撥　胡椒　良薑　乳香另研　麝香　細辛各等分
右爲細末先以温漿水刷淨後用藥末於痛處擦追
出頑涎休吐了嗽數十次痛止忌油膩一二日
仙人散　刷牙
地骨皮二兩酒炙二兩　青鹽一兩　黍粘子一兩半炒　細辛酒漬
右爲細末每用一字臨卧擦牙茶酒嗽
治走馬咽痺
良久吐出
又方　石膏　細辛　柳桂各等分
右爲末擦之
又方　枯白礬熱
又方治牙疼
華細辛去苗　白茯苓去皮　川升麻　華撥　青鹽
明石膏　川芎　不蛀皂角各等分去皮酥炙黃色
右爲細末早晚刷牙温水嗽之牙痛處更上少許
又方
以巴豆去皮用針刺於燈焰上炙令煙出薰牙痛處
薰三五次
又方　高良薑一塊　全蝎一隻
右爲細末先用酸漿水嗽牙次用藥末擦之流下涎
水即愈
又方
用生白礬研細塗於綿針上按於喉中立破綿針以
如左右俱有者用二枚
又方
右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透
治牙痛
米二停　鹽一停　盆硇　麝香少許　白礬
右相合水拌勻紙包裹燒黑爲末貼疼上立愈
治喉痺
大黃　朴硝　白礬　白礬一兩炙全半兩　黃丹一兩炒紅色放下再炒紫色爲度
右爲末每用少許搽痛處
又方　好紅豆二錢　花椒少許
右爲末隨牙痛處左右鼻內嗆之
又方
韶粉二錢　好朱砂一錢
右爲細末凉水調塗
口瘡方
白礬　枯礬各等分　黃丹少許

右二味爲細末摻瘡口上立愈

目疾證第三

治倒睫拳毛

將穿山甲以竹篦子刮去肉用羊腰窩脂去皮膜仍將穿山甲於炭上炙令黃色用脂擦穿山甲上如此數遍令酥爲末隨左右眼噙水鼻內嗑一字一月餘見効

又方

木鱉子三箇乾炒 木賊一百二十節 地龍二錢去土 赤龍瓜一兩二十箇則勾刺針也

右爲細末摘去倒睫每日以紙撚蘸藥嗑之一日三五次

又方

穿山甲炮 地龍去土 蟬殼 五倍子各等分

右爲細末如用藥時先將拳毛摘盡後用藥一字嗑左右鼻內嗑之次日目下如綿樣微腫是驗也

貼赤眼

取青泥中蛆淘淨曬乾爲末赤眼上乾貼之甚妙

貼赤睛

蘆甘石二兩 密陀僧一兩 黃連 朴硝

右方先將黃連用水煮成汁入童子小便再同煮後下硝又煮少時用火煆爐甘石紅黃連汁內淬七次與密陀僧末同爲末臨臥貼之

貼赤眼

銅綠 輕粉 牙硝 腦子少許 麝香

右爲細末乾貼之

截赤眼方

黃連 綠礬 杏子 甘草 銅綠 各等分

右爲粗末水煎洗甚効

碧霞丹 治赤眼暴發并治赤瞎

銅綠 白土 芒硝

右件各分爲末先如皂子大每用白湯研化一丸洗之立効

汾州郭助教家神聖眼藥

雞仁一兩 金精石二兩 銀精石二兩 爐甘石四兩燒 赤石脂一兩 滑石二兩 密陀僧二兩 高良薑三兩 秦皮一兩 黃丹一兩飛過 銅綠三錢 硇砂三錢 硼砂三錢 川烏三箇炮 乳香三錢半 麝香少許用 青鹽 腦子 射香 沒藥少許

已上并少用之

右用東流水三升先入雞仁次下餘味等白沙蜜一斤蒸至二升以綠絹細濾過澄清入前藥攪之勻點眼大眥頭待藥化淚出爲效

治冷淚目昏

密蒙花 甘菊花 杜蒺藜 石決明 木賊去節 白芍藥 甘草各等分

右爲細末茶清調下一錢服半月後加至二錢

又方 乾薑肥者爲末每用一字浸湯點洗

又方 貝母一枚風白者胡椒七粒爲末點之

單治目昏

荊芥穗 地骨皮 楮實各等分

右爲細末煉蜜爲丸桐子大每服二十丸米湯下

治一切目昏

川椒一斤微炒揀取 甘菊花四兩 生地黃一斤

取新者杵作泥極爛

右將地黃泥與前藥末同和作餅子透風處陰乾再爲末以蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸食後茶清

送下

洗眼黃連散

當歸 赤芍藥 黃連 黃栢 各等分

右爲劑以雪水或甜水濃煎汁熱洗用治一切風毒赤目

諸物入眼中

好墨清水研傾入眼中良久卽出

點攀睛瘀肉

黃丹一兩二錢水飛過乾 白礬一兩銀器內化成汁

右將白礬於銀器內化成汁入黃丹末在內以銀匙兒攪勻更入乳香沒藥各一錢慢火不住手攪令枯乾爲粉候冷研極細熟絹羅過後入麝條一錢半血竭二分射香少許輕粉三分粉霜二分共研極勻如粉再以熟絹羅過細末點之大有神效

青金散

玄硝一兩 螺青 沒藥 乳香各等分

右爲細末每用少許鼻內嗑之

治雀目

眞正蛤粉炒黃色爲細末

右油蝙蝠熟和爲丸如皂子納於猪腰子中麻纏蒸熟食之可配米粥

頭面風疾第四

治黔鼾風刺方

苦參一斤 紅芍藥 冬瓜各四兩

玄參一兩

右爲末每用一字用手洗面上

猪蹄膏洗面上黔藥

右用猪蹄一副刮去黑皮切作細片用慢火熬如膏粘用羅子濾過再入鍋內用蜜半盞又用

白芷 黑豆去皮 瓜蔞一箇 白芨 白斂 苓香

香 藿香各一兩 鵝梨二箇細切

右將七味藥爲末同梨入藥一處再熬滴水不散方成以綿濾過臨卧塗面次日用藥水洗面

治面風

益母草灰煎湯和燒七遍洗面用之

治面黔黑斑黔方

白附子一兩 白芨 白斂 密陀僧 胡粉 白茯苓各等分

右爲細末洗淨時前二味糊稀稠得所於乾爲粉候冷研極細熟絹羅過後入麝條一錢半血竭二分射香少許輕粉三分粉霜二分共研極勻如粉再以熟絹羅過細末點之大有神效

治頭風

丁香 川芎 藜蘆各等分

右爲細末大作劑料水煮去滓服之以利爲度

治頭目眩運

大黃 荊芥穗 貫芎 防風各等分

右爲細末每用少許鼻內嗑之

治耳底方

以枯白礬爲末塡於耳中立効

治鼻中肉蝕齆

赤龍爪 苦丁香各三錢 密陀僧一錢

麝香少許

右爲末用紙搓子點藥末用之

臰臭方

烏魚骨三錢 枯白礬三錢 密陀僧一錢

右爲末先用熟水洗臭處後用藥末擦之

又方密陀僧不以多少研細先以熟水洗臭處乾擦

烏頭藥

細針沙炒 蕎麵炒各一盞 大麥亦同

釀醋半升與前二味打糊

凡用先使皂角水熱洗淨時前二味糊稀稠得所於髭鬚上塗之均勻先用荷葉包次用皮帽裹之三五時辰用溫藥水洗了卽收取元針沙其髭鬚淨後用黑藥塗之黑藥方

沒食子 石榴皮 乾荷葉另搗各一兩

五倍子 柯子皮 百藥煎 金絲礬 綠礬研各一兩

右將七味爲細末炒熟麵五六匙入好醋打麵糊和藥末再塗髭鬚又用荷葉封裹後用皮帽裹之三五時間洗淨甚黑若更要黑光用猪膽漿水澤洗如鴉翎方

又方 酸石榴 五倍子 芝蔴葉

右同杵碎用絹袋盛之於鉄器內水浸掠鬚自黑

治大頭病兼治喉痺方歌曰

人間治疫有仙方　一兩殭蠶二大黃
薑汁爲丸如彈大　井花調蜜便病涼

又法　以砭針刺腫處出血立効

治時氣

馬牙硝　寒水石　黍粘子　鬼臼　川大黃
鬼箭草各等分　腦子少許

右六味爲細末用新井花水一盞藥末一二錢入腦子喫外一半留用新水得稍雞餅蓋在腫處有風涼處坐

解利傷寒第五

雙解丸

巴豆六箇去皮油　天麻二錢半　胭脂少許

右將巴豆天麻爲末滴水丸如秫米大胭脂爲衣一日一丸二日二丸三日三丸已外不解先喫冷水一口後用熱水下如人行十里以熱湯投之

又一法無藥處可用兩手指相交緊扣腦後風府穴向前禮百餘拜汗出自解

又一法適於無藥處初覺傷寒傷食傷酒傷風便服太和湯百沸湯是避風處先飲半椀或以薑汁亦妙以手探肚覺恍惚更服半椀又用手探至恍惚更服以至厥飲心無所容探吐汗出則已

不卧散

川芎一兩半　石膏七錢半　藜蘆半兩去土　甘草二錢半生

右爲細末口嚼水噀內各嗑之少時喫白湯半椀汗出解之

川芎湯　解利一切傷寒

川芎　藁本　蒼术

右爲細末沸湯點三錢須臾覺嘔道便解如不解再服之

諸腰腳疼痛第六

皂角膏

右用醇酒二大椀皂角一斤去皮弦搗碎蒸至一半沸去滓再用前汁入銀石器熬爲膏子隨痛處貼之

治腰腳疼痛方

天麻　細辛　半夏各二兩

右用絹袋二箇各盛藥三兩煮熟交牙慰痛處汗出則愈

牛黃白术丸　治腰腳濕

黑牽牛　大黃各一兩　白术一兩

右爲細末空心米飲調下三四錢息新瓦離豬魚兎下如要快利加至百丸

婦人病證第七

如聖丹　治婦人赤白帶下月經不來

枯白礬　蛇床子各等分

右爲末醋打麵糊丸如彈子大以胭脂爲衣綿子裹納於陰戶如熱極再換

詵詵丸　療婦人無子

當歸　熟地黃各二兩　玄胡索　澤蘭各一兩半
赤芍藥　白薇　人參　石斛　牡丹皮
川芎各一兩

右爲末醋糊爲丸每服五十丸桐子大空心酒下

當歸散　治月經欲來前後腹中痛

當歸以米醋炒　玄胡索生用　沒藥別研　紅花生用

右爲末温酒調下二錢服之

治產婦橫生　草麻子三十箇

研爛婦人頂上剃去髮少許以上藥塗之須臾覺腹中提正便刮去藥却分脚心塗之自然順生也

治血崩　鹽沙不以多少

右爲末每服三五錢熱酒調下服

又方　貫仲去須剉碎

或用酒醋煎三錢煎至七分去滓温服一服立止

當歸散　治血崩

當歸一兩　龍骨一兩燒赤　香附子三錢炒　棱毛灰半兩

右爲細末空心米飲調下三四錢息新瓦離豬魚兎

蓮殼散

乾蓮蓬燒灰存性　棱櫚皮及毛燒灰半兩　香附子一錢炒

右爲細末每服三錢空心米飲調下服之

治婦人血枯　川大黃

右爲末醋熬成膏攙成雞子大作餅子酒磨化之

三分散　治產後虛勞不進飲食或大崩後

白术　茯苓　黃耆　川芎　芍藥　當歸　熟乾地黃各一兩　柴胡　人參各一兩六錢　半夏洗切

右爲粗末每服一兩水一大盞煎至半盞去滓温服

治產後惡物上潮痞結大小便不通

芒硝　薄黃　細墨各等分

右爲末用童子小便半盞水半盞調下服之

治婦人產後虛弱和血通經

當歸一兩 芍藥二兩 香附子二兩炒

右爲細末每服一二錢米飲調下服之無時

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝竈灰焦土研細

用酒調三五錢瀉出惡物立止

治娠婦下痢膿血及咳嗽

白朮 黃芩 當歸各等分

右爲末每服三五錢水煎去滓食前加桑皮止嗽

百花散 治婦人產中欬嗽

桑白皮用密塗慢火炙黃色爲度 黃蘗各等分

右爲細末每服一二錢水一盞入糯米二十粒同煎至六分以款冬花燒灰六錢攪在藥內同調溫服之

治婦人吹奶

以樺皮燒灰存性熱酒調下三錢食後服之

又方

馬明退燒灰五錢 輕粉三錢 麝香少許

右爲細末每服二錢熱酒調下服之

又方 以皂角燒灰蛤粉和熱酒將來調數字下得羨

嘘笑呵呵

又方 以淘米木杓上砂子七箇酒下以吹鼻枝透乳

孔甚妙

欬嗽痰涎第八

九仙散

九尖草麻子葉三錢 飛過白礬二錢

右用猪肉四兩薄批基盤利開摻藥二味荷葉裹文武火最熱細嚼白湯送下後用乾食壓之

止嗽散

半夏一兩洗七次 枯白礬四兩

右二味爲末生薑打麵糊和丸桐子大每服三二十丸空心溫酒送下

八仙散

款冬花 佛耳草 甘草 鍾乳 鵝管石 白礬各等分

右爲細末每服三錢漿水一盞同煎至七分去滓作二服食後

治年高上氣喘促睡卧難禁

右蘿蔔子搗羅爲末白湯浸調五七錢食後服之或炒或用糖蜜作劑爲丸服之

麻黃湯 治因風寒衣服單薄致嗽

麻黃不去節 甘草生用 杏仁生用

右爲粗末每服三二錢水煎食後溫服

心氣疼痛第九

失笑散 治急心痛并男子小腸氣

五靈脂半兩 蒲黃半兩炒

右爲末每服三錢醋半盞煎二沸再入水半盞再煎二沸空心食前和滓溫服之

又方 醋一盞加生白礬一小塊如皂子大同煎至七分溫服立愈

又方 高良薑半兩 山梔子半兩 蔚金半兩

又方 以新鮮槐枝一握切去兩頭水二盞煎至一盞去滓分作二服熱服之

又方 沒藥 乳香 薑黃 玄胡索各等分

右爲細末好糯酒拌勻加砂糖用蒸餅劑蒸熟去皮杵臼搗四五十杵便丸如乾入酒三點丸如小豆大每服三五十丸生薑湯下

半夏湯 治嘔欲死者

半夏一兩洗 生薑三兩

右二味細切水二盞煎至八分去滓作二服食後

治肺痿喘嗽 漢防已

右爲細末每服三錢漿水一盞同煎至七分和滓溫服之

三才丸 治嗽

人參 天門冬去心 熟乾地黃各等分

右爲細末煉蜜爲丸如櫻桃大含化服之

三分茶

茶二錢 蜜二兩 蕎麥麵四兩

右以新水一大椀約打千餘數連飲之飲畢良久下氣不可停人喘自止

石膏湯 治熱嗽

石膏細文者一兩 人參半兩去蘆 甘草半兩炙

右爲末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可

化痰延壽丹

天麻半兩 枸杞子二兩 白礬一兩半生半熟 半夏一兩半湯洗七次用 乾生薑一兩半 人參一兩

右爲細末好糯酒拌勻加砂糖用蒸餅劑蒸熟去皮杵臼搗四五十杵便丸如乾入酒三點丸如小豆大每服三五十丸生薑湯下

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝竈灰焦土研細

用酒調三五錢瀉出惡物立止

治娠婦下痢膿血及咳嗽

白朮 黃芩 當歸各等分

右爲末每服三五錢水煎去滓食前加桑皮止嗽

百花散 治婦人產中欬嗽

桑白皮用密塗慢火炙黃色爲度 黃蘗各等分

右爲細末每服一二錢水一盞入糯米二十粒同煎至六分以款冬花燒灰六錢攪在藥內同調溫服之

治婦人吹奶

以樺皮燒灰存性熱酒調下三錢食後服之

又方

馬明退燒灰五錢 輕粉三錢 麝香少許

右爲細末每服二錢熱酒調下服之

又方 以皂角燒灰蛤粉和熱酒將來調數字下得羨

嘘笑呵呵

又方 以淘米木杓上砂子七箇酒下以吹鼻枝透乳

孔甚妙

欬嗽痰涎第八

九仙散

九尖草麻子葉三錢 飛過白礬二錢

右用猪肉四兩薄批基盤利開摻藥二味荷葉裹文武火最熱細嚼白湯送下後用乾食壓之

止嗽散

半夏一兩洗七次 枯白礬四兩

右二味爲末生薑打麵糊和丸桐子大每服三二十丸空心溫酒送下

八仙散

款冬花 佛耳草 甘草 鍾乳 鵝管石 白礬各等分

右爲細末每服三錢漿水一盞同煎至七分和滓溫服之

治年高上氣喘促睡卧難禁

右蘿蔔子搗羅爲末白湯浸調五七錢食後服之或炒或用糖蜜作劑爲丸服之

麻黃湯 治因風寒衣服單薄致嗽

麻黃不去節 甘草生用 杏仁生用

右爲粗末每服三二錢水煎食後溫服

心氣疼痛第九

失笑散 治急心痛并男子小腸氣

五靈脂半兩 蒲黃半兩炒

右爲末每服三錢醋半盞煎二沸再入水半盞再煎二沸空心食前和滓溫服之

又方 醋一盞加生白礬一小塊如皂子大同煎至七分溫服立愈

又方 高良薑半兩 山梔子半兩 蔚金半兩

又方 以新鮮槐枝一握切去兩頭水二盞煎至一盞去滓分作二服熱服之

又方 沒藥 乳香 薑黃 玄胡索各等分

右爲細末每服三錢水煎食後服之

小腸疝氣第十

抽刀散

川楝子一兩破四分巴豆三箇同炒黃色去巴豆用之 茴香一兩炒黃色去

用之

右爲細末每服三錢溫白酒調下空心服之

治陰痛不可忍

吳茱萸二兩泡七遍焙乾炒　楝椰一兩　茴香一兩

右爲細末醋糊爲丸熱酒送下十丸食前服之

治偏墜　茴香　甘遂

右二味各等分爲末酒調二錢食前服之

又方　巴豉去心　川練炒　茴香炒

各等分爲末溫酒調二錢服之

治小兒疝氣墜硬

地龍不去土　爲末唾津調塗病處

治小腸氣痛

全蝎一兩　茴香一兩炒黃

右爲細末醋糊和丸如梧桐子大如發時每服五七十丸溫酒送下食前服之

治小便渾濁如精之狀

沒藥　木香　當歸各等分

右爲末以刺棘心自然汁爲丸如梧桐子大每服五七丸食前鹽湯下

治小便頻滑數不禁

知母　黃檗各等分

右剉碎酒浸透炒微黃爲末水丸梧桐子大如服藥前一日休與夜飯來日空心立服米飲湯下一百丸只用一服効後與淡白粥一頓

蕩疝丹

川練子炒　茴香炒　破故紙炒各半兩　黑牽牛二錢

右八味爲細末用好酒打麵糊爲丸如梧桐子大空心食前溫酒下三十丸

灸疝法　放疝邊竪紋左右灸弦灸七壯

腸風下血第十一

神應散　治腸風痔漏

牛頭角腮中者一隻酌或圓取或四方取或一字取之　猪牙皂角七定　穿山甲四十九片　蝟皮一兩炙

右五味鎚碎盛在小口磁器內鹽泥固定日中曝乾瓶口微露出烟用文武火燒紅赤烟微少取出放冷爲細末如服藥日先一日臨卧細嚼胡桃仁半箇如糊用溫醇糯酒一盞送下不語便睡至次日交五更服藥驗病年月遠近或秤三錢五七錢用水半大碗醇糯酒半大盞相合熱和藥服之至辰時再服

又一服再依前服藥不須用胡桃仁久病不過七服忌油膩魚鱉雞兎猪犬等物大有神効

治腸毒下血

椿根白皮凡引者去粗皮酒浸晒乾服

右爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服三五十丸淡酒送或酒糊丸

治脫肛痔瘻

胡荽子一升　乳香少許　粟糠半升或一升

右先泥成爐子止留一小眼可抵肛門大小不令透烟火薰之

治脫肛

蔓陀羅花子　蓮殼一對　楝椀十箇

右搗碎木煎三五沸入朴硝熱洗其肛自上

治痔漏下血不止

白牽牛頭末四兩　沒藥一錢

右同爲細末如欲服藥先一日不食晚飯明日空心將猪精肉四兩燒令香熟薄批摻藥末在內裹之次日空心用之

又方　黑白牽牛一合炒黃一味猪肉四兩切碎炒熟與藥末攪勻只作一服裹新白米三二匙飯壓之取下白亟爲効

又坐藥黑鯉魚鱗二三甲以薄綿包裹如棗杵樣納之痛卽止

淨固丸　治痔漏下血痒痛

槐花炒　枳殼去瓤各一兩

右爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服二十丸米飲湯下空心食前十服見効

黃連貫衆散　治腸風下血

黃連　雞冠花　貫衆　大黃　烏梅各一兩　甘草三錢炙　枳殼炮去瓤　荊芥各一兩

右爲細末每服二三錢溫米飲調服食前

槐耳丸　治痔漏

荊芥槐花等分爲末水煎一大椀服丸亦可爲之

又方　豆豉炒　槐子炒　各等分

右爲末每服一兩水煎空心下

驚洪藥　鳳眼草　赤皮葱　椒

三味搗粗同漿水滾過坐盆令熱氣熏痔但通手探之如此不過三次愈矣

小兒病證第十二

治小兒脾疳　蘆薈　史君子各等分

右爲細末米飲調下一二錢服之

玉筯散　治小兒馬脾風

甘草一寸煎水　甘遂末一字

右同油蜜生蘆銀鈆兒攪之下後用冷水半盞調奪命散

奪命散　治小兒胸膈喘滿

檳榔　大黃　黑牽牛　白牽牛　各等分皆當各半生熟用之

右爲細末蜜水調服之

治小兒斑瘡入眼

麵炒淡豉炙甘草　羌活防風等分搗

每服二錢漿水下　撮雲兒日直到老

治疳疹黑陷

鐵腳威靈仙一錢炒末　腦子一分

右爲細末溫水調下服之取下瘡痂爲効

治小兒黃瘦腹脹　乾雞糞一兩　丁香末一錢

右爲末蒸餅爲丸如小豆大每服二十丸米湯下

黃連散　治小兒頭瘡

川黃連　黃蘗去粗皮用　草決明　輕粉各等分

右爲細末用生小油調藥於瘡上塗之立愈

治斑瘡創歷方

胡桃一箇燒存性　乾臙脂三錢

右爲末用胡荽煎酒調下一錢服之

又方　人牙燒灰存性研入麝香少許每服三錢溫酒調下少許服之不拘時

又方　小猪兒尾尖取血三五點研入腦子少許新水調下食後與服之

又方　人中白臘月者最佳通風處以火煆成煤水調三五錢陷者自出

消毒散　治瘡疹已未出咽喉腫痛

牛蒡子三兩炒　甘草半兩剉炒　荊芥一分

右爲粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時

治小兒斑瘡入眼

猪蹏蹄二兩乾鍋內煅存性　蟬殼二兩去土取末一兩

羚羊角鎊爲細末

右二味爲末研入羚羊角細末一分拌勻每用一字百日外兒服半錢三歲已上服三錢新水或溫水調下日三四服夜一二服一年已外則難治之

愈風丹

芍藥　川芎　白殭蠶炒　桔梗　細辛去葉

羌活各半兩　麻黃去節　防風去蘆

天麻　全蝎炙各一兩　甘草三錢　南星半兩生薑製用

硃砂半兩爲衣

爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒吞下

香芎散　治偏正頭風

貫芎　香附子炒　石膏亂紋者良水飛　白芷　甘菊

再同慈每日喫三兩個仍飲煎乾柿湯

右四味爲末用米泔半椀蒸成去滓入乾柿十餘個

又方　治小兒斑瘡入眼

硃砂　腦子　水銀　麝香各等分

右四味研爲細末用水銀調滴入耳中

發斑藥　珠子七箇研碎用新水調勻服之

破傷風邪第十三　陰毒傷寒亦附於此

辰砂奪命丹

鳳凰臺　川烏頭生用各一錢　麝香少許　硃砂少許

右爲細末棗肉和爲丸如彈子大硃砂爲衣蠶酒送下量病人年甲虛實加減用之小兒半丸以吐爲度不止以葱白湯解之

治破傷風

病人耳塞并爪甲上刮末唾津調塗瘡口上立効無瘡口者難用

治破傷風

烏稍尾一箇　兩頭尖四箇　全蝎四箇

右三味爲細末月用石灰五升柴灰五升沸湯五升淋灰水澄清下藥煮之鉄鍋器內攪成膏子如稠用唾津調先用溫漿水洗淨瘡口後塗藥即時藥行吐黃水一日以新水漱口即愈

不利小兒驚風服之立効

石爲細末每服二錢溫酒或茶清調下服之
妙功十一丸　治癇
丁香　木香　沉香　乳香　麝香　荆三稜炮　廣茂炮　黑牽牛微炒　黄連　雷丸炒　鶴虱炒　陳皮　青皮　雄黄　胡黄連　黄芩　大黄焙　陳倉米炒　熊膽　甘草炙各二　赤小豆三百六十粒煮　白丁香直尖者三百六十箇　輕粉四錢　巴豆七粒
右二十三味爲細末赤小豆爛煮研泥同蕎麵打糊和作十一丸硃砂爲衣陰乾服時水送一宿化一丸大便出隨病各有形狀取出爲驗或作化一番不可再服曾經火炙者不治遠年愈効
硃砂滾涎散　治五癇
硃砂水飛　白礬生用　赤石脂　消石各等分
右同爲細末研蒜膏如丸黍豆大每服三十丸食後荆芥湯下
又方　硃砂不以多少水飛研爲細末
右用猪心血浸蒸餅爲丸如黍豆大每服二十丸空心金銀湯下之
治諸風疥癬及癩
浮萍丙　荆芥　川芎　甘草　麻黄各半兩　或加芍藥　當歸
右爲粗末每服一兩水一椀入蔥白根豆豉同煎至一半無時服汗出爲度
治癩塗眉法
半夏生用　羊糞燒各等分
右爲末生薑自然汁調塗
五九散　治癩
地龍去土　蟬蛻　白殭蠶　淡豉　白礬生　青各九個
右同爲末只作一服熱酒調下浴室中汗出粘臭氣爲効
苦參散　治癩風
苦參取頭末秤二兩　猪肚一個
右以苦參末摻猪肚內用線縫定冷水煮去元藥先不喫飯五頓至第二日先飲新水一盞後將猪肚食之如吐了再食之食罷守一二時用肉湯調無憂散五七錢取出小便一二萬爲効後用皂角一斤不蛀者去皮弦及子搥碎用水四椀煮至一椀用生絹濾去滓再入苦參末攪熟稀麵糊膏子相似取出放冷後入餘藥相和藥附後
何首烏二兩　防風一兩半　芍藥五錢　人參三錢　當歸一兩
右爲細末入皂角膏子爲丸如桐子大每服三十五十丸食後先搗酒或茶清送下不拘時候日進三服後用苦參末之煎湯送下食前
治盡氣
取瑿腸草不以多少曝乾水煎和小便爲度
治黃疸面目遍身如金色
瓜蒂一十四箇　丹丁香一箇　黍米四十九粒
右先搗瓜蒂爲末次入二味同爲細末每用半字夜臥令病人先嚼水一口兩鼻內各半字吐了水仝病人便睡至夜或明日取下黃水旋用熟帛揩了直候取水定便服黃連散病輕者五日重半月
黃連散　治黃疸大小便秘澁赤赤
黃連三兩　川大黃一兩剉碎酒炒過用之　黃芩　甘草炙各一兩
右爲細末每服二錢食後溫水調下一日三服
治水腫不利小便非其法也故曰經云濕氣在上以苦瀉之吐瀉後長服益元散加海金沙煎以長流水服之則愈矣大忌脚膝上針刺出水取一時之効後必死矣尤忌房室濕麵酒酪鹽豉犯之必死
木通散　治水腫
海金沙　船上荷香　巴戟　大戟　甘遂　芫花　木通　滑石　通草各等分
右爲細末入皂角膏子爲丸如桐子大每服三十五十丸食後先搗酒或茶清送下不拘時候日進三服後用苦參末之煎湯送下食前
大烟嘴生薑湯送下
下痢泄瀉第十六
治癩
紫苑　桔梗　秦艽　葉　白朮各等分
右爲細末每服三五錢細切羊肝拌之作麵角兒燻服之後用白湯送下食前
治癩
杜蘅藜炒碾爲末酒調下三兩服
香豉丸　治痢
蒜爲泥　豉爲末
右二味相和作丸如梧桐子大米飲湯下五七十丸

食前服之

治大人小兒吐瀉腹脹胸膈痞悶

五靈脂　青皮　陳皮　硫黃　芒硝各等分

右將硝黃於銚子內以文武火熬開用匙刮聚自然結成砂子取出研碎與前三藥同末麵糊爲丸如梁豆大小兒麻子黃米大每服二十丸量虛實加減米飲湯送下無時

又方治瀉

車前子不以多少

右爲細末每服二錢米飲湯調下服之水穀分吐瀉止

諸雜方第十七

治消渴　揀黃連二兩八九錢者良

右剉如吹咀以水一椀煎至半椀去滓頓服立止

百日遠丹

佛茄子　樟柳根各等分

爲末拘杞汁和丸如雞頭大每服十丸新水送下

酒癥丸

巴豆十六箇　合蚫十五箇　雄黃一塊　白礬五兩

右爲末滴水丸如豌豆大每一丸如痛飲者二丸

立應丸　治臟腑泄利膿血不止腹中疼痛

乾薑一兩炮　百草霜一兩　巴豆連皮一兩同巴豆和皮炒黑色杵爲泥後入霜研用　杏仁一兩同巴豆和皮炒黑色杵爲泥後入霜研用

右用黃蠟四兩鎔開蠟次入前四味用鉄器攪勻旋丸桐子大每服三五丸甘草湯下白痢用乾姜湯下

食前若水瀉煖水下

反胃　黃蠟末熱酒調三五錢食後服之

治小便多　消數不禁

金剛骨爲末以好酒調下三錢服之

又方　白茯苓去黑皮　乾山藥去皮白蠟水內浸過慢火焙乾用之

右二味各等分爲細末稀米飲調下服之

治卒淋痛

芫花散三錢　茴香二錢微炒黃色

右爲細末水煎服之

治斫方

以水調白麵稀稠得所糊斫上以紙封之明日便乾如不曾破者剉去麵餌行

治大便秘

生麻子不以多少研爛水調服之

坐劑治大便久秘攻之不透者用之

又用蜜不計多少慢火熬冷作劑稀則粘手硬則脆稀稠得所堪作劑搓作劑樣如棗核大粗如筯長一寸許蘸小油內于肛門中坐良久自透有加鹽少許

以素問鹹以軟之

交加飲子　治久瘧不已山嵐瘴氣

肉豆蔻十一箇麵裹燒一箇　草荳蔻二箇同生用一半熟用上法用　厚朴二寸半生薑汁製過用　甘草二寸半一半生一半炙用　生薑二塊如棗紙裹煨過半生半熟

右爲末每服分一半水一椀銀石器內煎至一大盞去滓溫服發日空心未愈則再服

天眞丸　補虛損

佛犀裝男用女女用男以新水四擣洗盡血水以酒煮爛爲泥

牛膝一兩酒浸　木香半兩　白朮一兩　白茯苓一兩

右爲細末與君主同搗羅爲細末酒浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸三進日服

取雕青

水蛭取陰乾爲末先以白馬汗擦青處後用白馬汗調塗之

調塗之

治蛔蛭入耳中

右用猫尿灌耳中立出取猫尿用盆盛猫以生薑擦牙大妙

又方　黑犘乳灌耳中亦出

又方　以溫生面研爛塗於耳邊自出

辟穀絕食第十八

辟穀方

大豆五升去皮淨蒸三遍　大麻子五升湯浸一宿漉出蒸三遍令口開去皮爲細末用　糯米五升一處蒸熟爲用　白茯苓五兩去皮同上糯米一處蒸熟爲用

右將麻仁末一處搗爛如泥漸入豆黃末同和勻便圓如拳大再入甑蒸從初更著火至半後夜住火至寅時出舖平攤乾搗爲末服之以飽爲度不得吃一切物用麻子汁下第一頓一月不饑第二頓四十日不饑第三頓一千日不饑第四頓永不饑顏係日增氣力加倍如渴飲麻仁汁轉更不渴滋潤五臟若待喫食時分用爽菜子三合爲末煎湯放冷服之取其藥如後初間喫三五日白米稀粥湯少少喫之三日後諸般食飲無避忌此藥大忌慾事

又方　茯苓餅子

白茯苓四兩爲末　頭白麵一二兩

右同調水煎餅麵稍調以黃蠟代油煠成煎餅蠟可用三兩飽食一頓便絕食至三日覺難受三日後氣力漸生熟菜芝蘇湯米飲涼水微用些小潤腸胃無令凋竭開食時用葵菜湯并米飲稀粥少少服之

又方　保命丹

人參五兩　麻子仁二兩炒去皮　乾地黃　瓜蔞子　炒兔絲子酒浸各二兩　生地黃　乾大棗各三兩　大豆黃卷一升煮熟　黑附子一兩生用一兩炮去皮用之　白茯苓　茯神　地骨皮去粗皮　蔓精子用煮熟　杏仁去皮炒麥門冬炒去心用　地膚子蒸七遍　黍米作粉　粳米作粉　白糯米作粉　天門冬去心　車前子蒸側栢葉蒸三遍各二兩五錢

右同爲細末各揀選精粹者臘月內合者妙他時不可合日月交蝕不可合如合時須揀好日淨室焚香志心修合勿令雞犬婦人見又將藥末用蜆一斤半濾去滓白蜜一斤共二斤半一處溶開和勻入臼杵二千下微入酥油九如梧桐子大每服十九服至五日如來日服藥隔宿先喫糯米一頓粳米白麵皆可次日空心用糯米粥飲送下如路行人服如遇好食喫不妨要止便止如喫些小蒸餅爛嚼嗑或乾果子以助藥力不喫更妙忌鹽醋日後遲下藥來於長流水中洗淨再服可百年不饑

儒門事親卷十五終



傷寒

傷寒論雙解散

守眞制雙解散通聖益元各七八分入生薑蔥白煎解傷寒三二日間以其初覺亦傷寒疑似之間解表恐傷於內然攻裏恐傷於表故制雙解以其表裏齊見俱解甚爲得法然間有不解猶未盡善也子和增作法亦用前藥煎一椀令飲其半探引出風痰次服一半仍用酸辣湯投之使近火衣被覆蓋汗出則解八九分矣此法子和得之規繩之入世所未知也

論發汗

世人只知桂枝麻黃發汗獨不知涼藥能汗大有盡善者惟愿亦能發汗承氣用輩兼煎以辛甘發散之意守眞雙解者熱藥汗不出者反益病涼藥發之百無一損素問云辛甘發散爲陽白粥記蔥食之便能發汗益元加薄荷子和演爲吐法豈非涼藥亦能發汗也

論攻裏

攻裏之藥當用寒涼世人畏之是不知藥隨病而俱出何曾留於中乎桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡此語越人久矣鮮有解者因有知幾節理偶於守眞醫書註中稍見其意此陽實陰實發散陰實宣泄不同實謂不受病也陰實本不受病何用承氣宣泄反之則有斃亡之失也此二句蓋謂傷寒之設也

論攻裏發表

素問云攻裏不違寒發表不違熱啟玄子云世人直疑攻裏合用寒藥發表合用熱藥似是而非也蓋攻裏不違寒是不違司氣之寒雖嚴凝盛寒之際若合攻裏不可畏天寒而不用寒藥發表不違熱者是不違司氣之熱雖流金爍石炎蒸盛暑合用發表之藥不可畏暑而不用熱藥此不違寒熱之理也

搏衣撮空何臟所主

搏衣撮空許學士說作肝熱風注末疾故手爲搏衣撮空此論雖當莫若斷之爲肺熱以爲愈矣其人必讖語妄言經曰肺熱必爲讖語兼上焦有病肺必主之手經者上焦也二者皆當其理果何如哉天地爲體用肺爲體肝爲用也肝主諸血者陰物也此靜體何以自動蓋肺主氣氣所鼓舞故靜得動一說肝之用者一說肺之用者此天地至爲體用二者俱爲當也是知用臟血自寅至申行陽二十五度諸陽用事氣爲肝所使肺主氣自申至辰行陰二十五度諸陰用事肺爲所用

傷寒口傳足經不傳手經論

傷寒只傳足六經仲景本論無說古今亦無言者惟愿安常謂主生故太陽水傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木爲賊邪盡孽盜穿鑿胡不觀內經陰陽雜合論云太陽根於至陰名陰中之陽少陽根起於窮陰名陰中之少陽太陰根起於隱白名曰陰中之太陰少陰根起於湧泉名陰中之少陰厥陰根起於大敦名曰陰中之厥陰其次序正與此合大抵傷寒始因中風得之於陰是以正傳足經者陰中之陽陽中之陰也又以六氣考之厥陰爲初之氣少陰爲二之氣太陰爲三之氣少陽爲四之氣陽明爲五之氣太陽爲終之氣此順也逆而言之正與此合緣傷寒爲病逆而非順也

亢則害承乃制

假令水爲母木爲子當春旺之時冬令猶在卽水亢也水既亢極則木令不至矣木者繼冬而承水也水既亢則害其所承矣所以木無權則無所制土土既旺則水受制噫夫人必自侮然後人侮之旨哉木長春之令也

傷寒心鏡別集終



丹溪先生心法序

醫之先。謂出于神農、黃帝。儒者多不以爲然。予嘗考醫之與卜。並見于周禮。曰醫師掌冢宰。策人掌宗伯。並稱于孔子曰。人而無恆。不可以作巫醫。巫咸、古之神巫。故卜之道存。神農、黃帝亦必有所從來。大約羲、文、周、孔則醫之先謂出于神農、黃帝。亦必有所從來。大約羲、文、周、孔則醫之先謂出于羲、文、周、孔。故醫之道卑。然其書雖亡而緒餘之出于先秦者。殆亦有之。若今本草、素問、難經、脈經。此四書者。其察草木鳥獸金石之性。論陰陽風寒暑濕之宜。標其穴以施鍼焫。診其脈以究表裏。測諸秋毫之末。而活之危亡之餘。類非神人異士。不足以啓其機緘。而發其肯綮。則此四書者。誠有至理。不可謂非出于聖筆而遂少之也。然則醫之與卜。皆聖人之一事。必儒者乃能知之。其不以爲然者。不能通其說者也。醫之方書。皆祖漢張仲景之言。實與前四書相出入。亦百世不能易者。自漢而後。代不乏賢。中古以來。予所取五人。曰孫思邈氏。其言皆見錄于程子。曰張元素氏。曰劉守眞氏。曰李杲氏。皆見稱于魯齋許文正公。曰朱震亨氏。實白雲許文懿公高第弟子。斯五人者。皆儒者也。而朱氏實淵源于張、劉、李三君子。尤號集其大成。朱氏每病世之醫者。專讀宋之局方。執一定之法。以應無窮之疾。譬之儒者專誦時文。以倖一第。而於聖經賢傳。反不究心。乃作局方發揮。格致餘論等書。深有補于醫道。而方書所傳。則有丹溪心法若干卷。推厥以求病。因病而治藥。皆已設之方也。朱氏沒而其傳泯焉。近世儒者始知好之。稍稍行世。然業醫者樂檢方之易。而悼讀書之

夫翊邪扶正。保命全眞。拯天閼於長年。濟疲癃於仁壽者。非資于醫。則不能致之矣。醫之道肇自軒、岐。論難于素、難。諸書蓋皆不能以句。而於五人者之著述。則亦視爲迂闊之論。其茫然不知所用力。無足怪者。其以藥試人之疾。聞一獲效。則亦如村氓牧豎。望正鵠而射之。偶爾中焉。或從其旁問之射法。瞪目相視。不知所對。彼老成者。日從事乎內志外體之間。雖戚小有所失。而矢之所向。終無大遠。此觀射之法也。審醫之能。何以異此。予宗人用光。世業醫而好醫。其讀素、難之書甚稔。最喜朱氏之說。嘗以丹溪心法有川陝二本。妄爲世醫所增附。深懼上有累于朱氏。乃爲之彙分脈列。盡其誤而去其複。以還其舊。凡朱氏之方有別見者。則以類入之。書成。將刻梓以傳。請予序。予故以多病好醫而未能也。輒以醫卜並言于編首。使業醫者知其道本出于聖人。其書本足以比易。而非可以自卑。則日勉焉以致力乎本草、素、難、脈經之書。以及五君子之說。而尤以朱氏爲入道之門。則庶幾乎上可以輔聖主拯世之心。下可以見醫者仁民之效。而醫不失職矣。用光名光。休寧汊口人。與予同出梁將軍忠壯公後。

成化十八年歲次壬寅春二月既望。賜進士及第奉訓大夫左春坊左諭德同修國史經筵官纂修太子講讀官休寧程敏政序。

論。使玉石不分。王因之附添諸方。多失本旨。充、江左一愚。夙志予此。每閱是書。實切病焉。輒不自揆。妄意竊取平治會萃經驗等方。及玉機微義、衛生寶鑑、濟生拔萃、東垣、河間諸書校之。究其會通。因證求方。稽日既久。復得今中書烏傷王允達先生以丹溪曾孫朱賢家藏的本寄示。合而參考。其或文理乖訛。意不相貫者。詳求原論。以正其誤。篇目錯綜。前後重疊者。芟去繁冗。以存其要。此有遺而彼有載者。采之以廣其法。論既詳而方未備者。增之以便檢閱。一言去取。無敢妄有損益。庶幾丹溪之書。猶涇渭合流。清濁自別。烏覩同棲皂白攸分。學者免惑於他岐。疾疢得歸於正治。未知其然否乎。倘知音鑒。無所逃罪。同志之士。倘於其忽。正其訛舛而賜教之。則充之至願也。於是乎書。

成化十七年歲次辛丑仲冬休寧後學復春居士程充謹識。

丹溪先生心法目錄

十二經見證
不治已病治未病
亢則害承乘制
審察病機無失氣宜
能合色脈可以萬全
治病必求於本

卷一

中風一
肥人中風口噤方
瘦左方
二陳湯
通頂散
烏藥順氣散
小省風湯
小續命湯
如神救苦散
三化湯
四白丹
瀉青丸
蘇香正氣散
活絡丹
子和搜風丸

中寒二，附傷寒傷風
理中湯
四逆湯
辟瘟散
消風百解散

中暑三　附暑風注夏
暑渴方
黃連丸
香薷飲
大順散
清暑益氣湯
五苓散
桂苓甘露飲
冷香飲子

中濕四
羌活勝濕湯
三花神佑丸
瘟疫五　附大頭天行病
入方
又時病
作人中黃法
小省風湯
家寶丹
大秦艽湯
愈風湯
二丹丸
天麻丸
他仙丹
不臥散
潤腸丸

桂枝湯
三建湯
姜附湯

生脈湯
御米散
黃連香薷飲
十味香薷飲
天水散
人蔘白虎湯
縮皮飲
黃連解毒湯

防己黃芪湯
舟車丸

又方
治大頭方
漏蘆湯

消毒丸
火六
左金丸
升陽散火湯
卷二
斑疹七
調中湯
通聖散
化斑湯
斑八
入方
截斑常山飲
又治感寒熱頭痛方
截斑青葛方
又斑疾後方
七裂湯
山甲湯
秘方清脾丸
草果飲子
叅蘇飲
小柴胡湯
小柴胡加桂湯
大柴胡湯
痢九
入方
治白痢
又五方
胃風湯
藏人木香檳榔丸
大承氣湯

潔古雄黃丸
東垣瀉陰火升陽湯
地骨皮散
消毒犀角飲子
元參升麻湯
大趾中湯
又方
又治瘧母方
又治痰渴方
截瘧
清脾湯
腦麝飲
六和湯
紅丸子
人參養胃湯
柴胡桂姜湯
白虎加桂枝湯
桂枝加黃芪知母石膏湯
白芷石膏三物湯
又二方
治赤痢
治痢十法
禁口痢
調胃承氣湯
小承氣湯

防風芍藥湯
蒼朮防風湯
神芎導水丸
聖餅子
宣明玄青膏
葶水散
雄黃丸
錢氏白朮湯
濕瀉十
老人脾泄方
止瀉姜黃丸
滑六丸
大巳寒丸
香連丸
戊己丸
朮附湯
酒蒸黃連丸
椒附丸
結燥十一
入方
潤燥湯
半硫丸
脾約丸
霍亂十二
加味二陳湯
六和湯
木瓜湯
痿十三
青礞石丸
中和丸
神朮散
敗毒散
和中丸
蘇感丸
保命集四物湯
升陽益胃湯
機要白朮芍藥湯
黃連阿膠丸
治痛泄
又方
又方
八味湯
升陽除濕湯
胃苓湯
感應丸
五味子散
二神丸
導滯通幽湯
活血潤燥丸
麻仁丸
又方
通脈四逆湯
又三方
又方

導痰湯
潤下丸
小胃丹
治鬱痰
茯苓丸
久吐痰喘
白玉丸
又二方
清腸伯痰丸
墜痰丸
祛風痰行濁氣
痰氣方
清痰丸
哮喘十四
入方
紫金丹
喘十五
痰喘二方
分氣紫蘇飲
四磨湯
小青龍湯
九寶湯
咳嗽十六　附肺痿肺癰
入方
又四方
治風熱痰嗽方
又方
定嗽趙藥
青金丸
清化丸
又方
千緡湯
治酒痰
導痰丸
又二方
黃連化痰丸
黃瓜蔞丸
抑痰丸
搜風化痰丸
治濕痰二方
上焦風痰
利腦化痰丸
治哮喘積方
劫喘藥
神秘湯
三拗湯
華蓋散
活人書五味子湯
清化丸
治婦人方
治勞嗽吐紅
嗽烟筒
又方
清金丸
又二方

茜沙丸
海藏紫苑散
桔梗湯
勞瘵十七
入方
樂令建中湯
清骨散
十灰散
獨參湯
保眞湯
消化丸
二黃補血湯
四生丸
犀角地黃湯
荊芥散
入方
茯苓補心湯
嘔血二十
嘔血二方
咯血二十一　附痰涎血
痰中血四方
天門冬丸
衄血二十二
河間生地黃散
茜根散
止衄散
又法
瀉血二十三
人參滑肺散
知母茯苓湯
圍參飲子
遠心散
黃芪鱉甲散
葛可久治勞法
又方
保和湯
太平丸
潤肺膏
又二方
大阿膠丸
桃仁承氣湯
小建中湯
黃芪散
保命生地黃散
治咯血四方
又方
黃芩芍藥湯
芎附飲

小薊飲子
當歸承氣湯
鹿茸丸
瑞竹堂蒲黃散
下血二十四
入方
槐花散
烏梅丸
黑神散
腸風臟毒二十五
七方
又方
芎歸湯
小烏沉湯
痔瘡二十六
入方
治諸痔瘡
清涼飲
蝟皮丸
芎歸丸
槐皮湯
地黃丸
翻花痔
漏瘡二十七
黃連散
乳香丸
蛇蛻散
洗漏瘡方
漏瘡

許令公方
膠艾湯
辰砂妙香散
又二方
又六方
黃連丸
誤連丸
不換金正氣散
枳殼散
熏洗方
清心丸
槐角丸
猪甲散
乾葛湯
熏洗方四方
熏痔三方
猪腎丸
生地黃容
熏漏瘡方
久痿方
又方

脫肛二十八
香荊散
嘔吐二十九
理中加丁香湯
濟生竹茹湯
吐酸而嘔方
惡心三十
大半夏湯
痰逆三十一
橘皮乾姜湯
陰證厥逆
羌活附子湯
小半夏茯苓湯
翻胃三十二
四方
滾肉半胃散
吞酸三十三　附暖氣
入方
加味平胃散
痞三十四
入方
枳實消痞丸
枳朮丸
噤雜三十五
傷食三十六
治氣抑痰倦不思食
治噎麵傷
加味二陳湯
疸三十七
小溫中丸
又二方
活人生姜橘皮
加味二陳湯
小半夏茯苓湯
生姜半夏湯
人參白朮湯
橘皮竹茹湯
木香調氣散
燒針丸
麵朮丸
治陰氣方
玉液丸
橘皮枳朮丸
治心脹膨
補脾丸
紅丸子
大溫中丸

茵陳蒿湯
硝石礬石散
茵陳五苓散
濟生殺疳丸
三因當歸白虎湯
濟生葛根湯
水腫三十八
加味五皮散
大橘皮湯
又方
禹功散
鼓脹三十九
中滿分消丸
紫蘇子湯
禹餘糧丸
細珠木香檳榔丸
小便不通四十
草蔻湯
又七方
小便不禁四十一
秘元丹
三因家韭子丸
關格四十二
淋四十三
入方
又方
五淋散
又方
沙石淋方
又四方

地髓湯
二神散
車前子散
茯苓調血湯
木香湯
博濟方
梔子大黃湯
瓜蒂散
濟生茵陳湯
三因白虎湯
濟生五苓散
濟生黃芪散
疎鑿飲子
十棗丸
嚴氏宣脾散
加味枳朮湯
廣茂溝壑湯
人參雪歸湯
抵當丸
蒲黃湯
緩腎丸

通秘散
凝灰散
又方
八正散
又三方
灸法
定志丸
蓮醴分清飲
瑞蓮丸
珍珠粉丸
感喜丸
茯菟丸
加味錢氏白朮
加減八味丸
川黃連丸
三黃丸
治手心發熱
治大病後虛熱
退勞熱食積痰
神芎丸
升麻附子湯
大補黃芪湯

調衛湯
又方
涼膈散
益汗五十
當歸六黃湯
又方
麥煎散
補損五十一
大補丸
補腎丸
虎潛丸
湯藥
三補丸五方
瑞陽丸
又方
濟陰丸
茯神湯
三才封髓丹
八味丸
還少丹
巴戟丸
海藏大五補丸
小兎絲子丸
人參養榮湯
延壽丹
滋血百補丸
巨勝子丸
沉香百補丸
明目益腎丸
地芝丸
溫粉
黃芪建中湯
黃芪六一湯
正氣湯
又方
龍虎丸
補天丸
補虛丸
補陰丸七方
五補丸
補心丸
大補丸
十全大補丸
金匱腎氣丸
八物湯
無比山藥丸
補益腎肝丸
八味定志丸
補腎丸
十四味建中湯
價寶丹
添精補髓丹
固精丸
如意丸
滋腎百補丸
固真丸
黃連茯苓丸

卷四
痿五十六
健步丸
柏子仁丸
延齡丹
益壽地仙丹
趙鞠方
枳朮丸
三聖膏
又三方
和保丸三方
佐脾丸
枳實丸
烏梅丸
治吐虫積方
散聚湯
又方
又方
腳軟筋痛
又二方
當歸拈痛湯
東垣開結導飲
五積散
東垣羌活導滯湯
清燥湯

厥五十七　附手足十指麻木
調氣散
四七湯
痙五十八
葛根湯
痫五十九
結命湯
本事人參散
東垣安神丸
顛狂六十
二方
驚悸怔忡六十一
入方
寧志丸
加味四七湯
健忘六十二
歸脾湯
痛風六十三　附肢節痛
入方
胃痛方
趁痛散
四妙散
治骨節痛方
治食積肩腿痛
龍虎丹
痛風六十四　附身上瘡痒
醉仙散
黃精丸
治麻風厥大而虛
凌霄花散

平胃散
桂枝加葛根湯
古方三痛丸
寧神丹
發心湯
朱雀丸
朱砂安神丸
定志丸
白濁痛風方
二妙散
八珍丸
又方
又方
控延丹
乳香丸
再造散
又方
治麻風二方
東坡四神丹

浮萍散
身上瘡痒方
續喉風喉痹六十五　附咽痛咽癌
雄黃解毒丸
又方
頭風六十六
入方四方
頭痒風脾髮黃方
治頭風
消風散
三五七散
頭眩六十七
頭暈方
白附子丸
芎朮除眩散
正元散
頭痛六十八
清空膏
徹清膏
不臥散
治頭痛
治頭痛如破
肩瞤痛六十九
入方二方
生熟地黃丸
四神散
心脾痛七十
入方八方
死血痛方
草豆蔻丸
局方升麻湯
又方
開喉散
瘦人搖藥
一粒金搖鼻方
頭風鼻塞方
茶調散
香橘飲
人參前胡湯
茯苓桂枝白朮甘草湯
黑錫丹
安神湯
順氣和中湯
半夏白朮天麻湯
治頭痛連眼痛
運奇方
芎辛湯
臟澼心脾常痛方
瘕飲痛方
丁香止痛散

失笑散
扶陽助胃湯
脇痛七十一
小龍膏丸
抑青丸
枳芎散
腹痛七十二　附腹中牽狹
入方四方
腰痛七十三　附腎著
入方四方
青娥丸
治腰痛方
滲濕湯
痛痛七十四　附木腎　腎著
入方
又二方
又二方
積痛方
痛痛塊痛方
治小腸氣又木腎偏墜
耳聾七十五
入方三方
桂星散
益智散
耳鳴方
聾劑子散
盯耳方
桃花散
鼻病七十六
入方二方
二姜丸
烏梅丸
清鎮龍膏丸
推氣散
十棗湯
小建中湯
摩腰膏
獨活寄生湯
腎著湯
守效丸
橘核散
腎氣方
又三方
治木腎二方
腎氣濕痛三方
和劑流氣飲
地黃丸
芎芷散
耳鳴暴聾方
又二方
耳爛方
膿瘍丸
治鼻淵
又三方
輕粉散
眼目七十七
神效七寶膏
生熟地黃丸
瀉黃連湯
東垣熟乾地黃丸
口齒七十八
入方
黑參丸
增損如聖湯
治牙痛六方
刷牙藥
破滯氣七十九　附氣剌痛　附諸氣
和劑七氣湯
指迷七氣湯
流氣飲子
大七氣湯
蘇子降氣湯
蠲憊散
分氣紫蘇飲
聚香飲子
烏藥平氣散
手拈散
鹽煎散
分氣紫蘇飲
大玄胡湯
東垣木香順氣散
順氣木香散
治鼻中瘜肉
白龍丸
鉛紅散
爛瞎眼方
病眼方
上清散
治滿口白爛
柳花散
青桔散
固齒方
三因七氣湯
加減七氣湯
和劑流氣飲
分心氣飲三方
三和散
治氣六合湯
木香化滯散
沉香降氣湯
復元通氣散
枳殼煮散
東垣升陽順氣
鷄舌香散
化氣散
匀氣散
快氣散

異香散
降氣湯
脾胃八十　附胃風
調中益氣湯
六君子湯
參苓白朮散
丁沉透膈湯
枳縮二陳湯
凝神散
瘓氣八十一　附結核
入方
跌撲損傷八十二
撮撲二方
又方
破傷風八十三
入方
元戎破傷風方
諸瘡瘍八十四　附天泡瘡　凍瘡
入方四方
郭氏升麻牛蒡子散
常飲飲子
凍瘡方

卷五

癰疽八十五
乳癰七方
環跳穴瘡方
圍藥二方
騎馬癰方二方
肛門生瘡方
便毒三方
內托復煎散
疔瘡八十六
入方
神聖膏
破棺丹
蛇蛻散
金瘡痛腫諸瘡八十七
金瘡四方
膿瘡五方
癬瘡四方
沫霜散
下疳瘡洗藥
婦人八十八
入方三方
經事過期方
當歸散
通經丸
崩漏八十九
小薊湯
又方
涼血地黃湯
帶下九十
入方六方
固腸丸
鼓人玉燭散
產前九十一
固胎方
逢生散
安胎方
子腫方
化氣湯
木香化滯湯
四君子湯
胃苓湯
治中湯
五膈寬中散
八珍湯
結核三方
接骨散
天麻丸
一上散
升麻和氣飲
天疱瘡方
附骨癰方
鉄圈散
腦皮取膿法
敗疽瘡方
取朽骨方
消毒飲
內托復煎散
疔瘡八十六
入方
神聖膏
破棺丹
蛇蛻散
金瘡痛腫諸瘡八十七
金瘡四方
膿瘡五方
癬瘡四方
沫霜散
下疳瘡洗藥
婦人八十八
入方三方
經事過期方
當歸散
通經丸
崩漏八十九
小薊湯
又方
涼血地黃湯
帶下九十
入方六方
固腸丸
鼓人玉燭散
產前九十一
固胎方
逢生散
安胎方
子腫方
內疎黃連湯
保生挺子
千金托裏散
太乙膏
東垣升陽調經
火燒三方
杖瘡三方
下疳瘡二方
聖粉方
四物湯
交加地黃丸
琥珀散
紅花當歸散
荊芥散
如聖散
結痰白帶方
又三方
東垣丸
又方
惡阻方
三因鯉魚湯

產死訣
膠艾湯
催生方
催生如聖散
胞衣不下方
產後九十二
產後補虛方
又三方
參朮膏
黑神散
子嗣九十三　附斷子法
小兒九十四
黑龍丸
牛黃奪命散
五積丸
黃龍丸
貪積方二方
大蒜膏丸
子鯁方
白附丸
腹痛方
吐瀉黃疸方
斑疹方
龜胸方
鉤藤散
入方三方
咯血方
吃泥方
解顱方
發氏白朮散
胎動方
難產方
天麻丸
又四方
產後消血塊方
猫行丸
消魂散
驚癇方
胡黃連丸
鳥犀丸
肥兒丸
棗聖丸
褐丸子
風痰方
紫金泥
腹脹方二方
痢疾方二方
口糜方四方
夜哺方二方
脫肛脫腸方二方
木舌方
尿血方
又方
吐蚘方
口噤方
產死訣
如聖飲子
麻黃黃芩湯
甘草散
木香理中湯
又方
論倒倉法九十六
論吐法九十七
救急諸方九十八
拾遺雜論九十九
秘方一百
附錄
故丹溪先生朱公石表辭
丹溪翁傳
右楊楚玉類集心法。中間水腫、盅腫、痛風、肢節痛、麻木、婦人小便不通等證。文多重出。又取別論附

於其間。雖能補其缺略。不免混淆難別。致丹溪主病之旨不明。王季默因正論及附論中方未備載。又作附錄。如夢遺椿樹根丸、淋證六味地黃丸、婦人三補丸等。不錄丹溪原方。却於他書取方名相同增入。藥味與病懸隔。尤恐用者不察。反致有誤。今以丹溪原論考訂。遺誤錄於症首。次附載元戴辨症次錄正方。以見正法不雜。其附論不去。題曰附錄。用存編者之意也。復虛載附論中方。題曰附方。恐人妄去取也。庶幾明白。又增入外科倒倉等法。以襲其未備。觀者詳焉。

丹溪先生心法

十二經見證

足太陽膀胱經見證

頭苦痛。目似脫。頭兩邊痛。淚出。腰反出。下腫。便膿血。肌肉瘈。項似拔。小腹腫痛。按之欲小便不得。

足陽明胃經見證

惡與火聞木聲則驚。狂。上登面歌。棄衣而走。顏黑。不能言。脣腫。喘。呵欠。消穀善飢。頸腫。膺乳凊股伏兔腫外廉足跗皆痛。胸膀過乳痛。口喝。腹大水腫。奔豚腹脹。跗內廉脛痛。脾不可轉。腦似結。腦似裂。膝脛腫痛。遺溺失氣。善伸數欠。顏疾。濕淫心欲動。則閉戶獨處。溲。身前熱。身後寒慄。

足少陽膽經見證

口苦。馬刀挾瘿。胸中脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前諸節痛。足外熱。寒慄惡風。體無容澤。善太息。

手太陽小腸經見證

面白。耳前熱。苦寒。頰頷腫不可轉。腰似折。肩膊肘臂。外後廉腫痛。臑臂內前廉痛。

手陽明大腸經見證

手大指次指難用。耳聾。煇煇焞焞。耳鳴嘈嘈。耳後肩臑肘臂外背痛。氣滿。皮痺殼殼然。堅而不痛。

足太陰脾經見證

五泄注下五色。大小便不通。面黃。舌本強痛。口瘡。食卽吐。食不下咽。息惰嗜臥。捻心。善飢善味。不嗜食。不化食。尻陰股膝臑脛足背痛。煩悶。心下急痛。有動痛。按之若牢。痛當臍。心下若痞。腹脹腸鳴。飧泄不化。足不收行。善瘈。腳下痛。九竅不通。溏泄水下後出餘氣。則快然。飲發中滿。食減。善噫。形瘁。皮膚潤而短氣。肉痛。身體不能動搖。足溏腫。若水。

足少陰腎經見證

面如漆。眇中清。面黑如炭。嗳噦多血。渴。臍左。脇下背肩髀間痛。

足厥陰肝經見證

頭痛。脫色善潰。耳無聞。頰腫。肝逆。頰腫。面青。目赤腫痛。兩脇下痛引小腹。胸痛。背下則兩脇腫痛。婦人小腹腫。熱。嘔逆。血。腫睾痛。暴痒。足逆寒。脛善瘈。節時腫。遺溺淋漫。便難。癵痛。洞泄。大陰縮兩筋孿。善恐。胸中喘鳴喜。血在脇下喘。

手太陰肺經見證

善嚏。缺盆中痛。臍上。肩痛。肩背痛。臍右。小腹脹引腹痛。小便數。溏泄。皮膚及麻木。喘少氣。頰上氣見。

交兩手而脊。悲慼欲哭。 酒漸塞熱。

手少陰心經見證

消渴。兩臂內痛。 後廉。腰背痛。 沒涇善笑。 善恐善忘。 上咳吐下氣泄。 脇作。 身熱面

煩痛。 悲。

手厥陰別厥經見證心主

笑不休。 手心熱。 心中大熱。 面黃目赤。 心中動。

手足陰陽經合生見證

頭項痛。足太陽、手少陰。 黃疸。足太陰、少陰。

面赤。手少陰、厥陰、手足陽明。

目黃。手陽明、少陰、太陽、厥陰、足太陽。

耳聾。手太陽、陽明、少陽、太陰、足少陽。

喉痹。手足陽明、手少陽。

鼻鼽衄。手足陽明、太陽。

目瞤瞤無所見。足少陰、厥陰。

目睆人痛。足厥陰。 面塵。足厥陰、少陰。

咽腫。足少陰、厥陰。

嘔乾。手太陰、足少陰、厥陰、手少陰、太陽。

嗽。手少陽、足太陰。

膈咽不通。不食。足陽明、太陰。

胸滿。手太陰、足厥陰、手厥陰。

胸支滿。手厥陰、少陰。 腋腫。手厥陰、足少陽。

脇痛。手少陰、足少陽。 胸中痛。手少陰、足少陽。

善嘔苦叶。足少陽、足陽明逆。

少氣。咳嗽。喘渴。手太陰、足少陰。

喘。手陽明。足少陰、手太陰。

臂外痛。手太陽、少陽。

掌中熱。手太陽、陽明、厥陰。

肘攣急。手厥陰、太陰。 腸滿脹。足陽明、太陰。

心痛。手少陰、厥陰、足少陰。

痔。足太陽、手足太陰。熱。

不治已病治未病

與其救療於有疾之後。不若攝養於無疾之先。蓋疾成而後藥者。徒勞而已。是故已病而不治。所以爲醫家之法。未病而先治。所以明攝生之理。夫如是則思患而預防之者。何患之有哉。此聖人不治已病治未病之意也。皆謂備土以防水也。苟不以閉塞其涓涓之流。則滔天之勢不能遏。備水以防火也。若不以撲滅其熒熒之光。則燎原之焰不能止。其水火既盛。尙不能止。況病之已成。豈能治愈。故宜夜臥早起於發陳之春。早起夜臥于蕃秀之夏。以之緩形無怠。而遂其志。以之食涼食寒而養其陽。聖人寒夏治未病者如此。與鷄俱興于容平之秋。必待日光於閉藏之冬。以之斂神匿志而私其意。以之食溫食熱而養其陰。聖人秋冬治未病者如此。或曰。見肝之病。先實其脾。蔵之虛。則木邪不能傳。見右頰之赤。先瀉其肺經之熱。則金邪不能盛。此乃治未病之法。今以順四時。調養神志。而爲治未病者。是何意耶。蓋保身長全者。所以爲聖人之道。治病十全者。所以爲上工術。不治已病治未病之說。著於四氣調神大論。厥有旨哉。昔黃帝與天師雜疑答問之書。未嘗不以攝養爲先。始論乎天眞。次論乎調神。既以法於陰陽而繼之以調於四氣。既曰食飮有節。而又繼之以起居有常。諄諄然以養生爲急務者。意欲治未然之病。無使至於已病難圖也。厥後秦緩逢乎此。見晉侯病在膏肓。語之曰不可爲也。扁鵲明乎此。視齊侯病在腠。斷之曰不可救也。噫。惜齊晉之侯不知治未

亢則害承迺制

氣之來也。既以極而成災。則氣之乘也。必以復而得乎。物極則反。理之自然也。大抵寒暑燥濕風火之氣。木火土金水之形。亢極則所以害其物。承乘則所以制其極。然則極而成災。復而得平。氣運之妙。灼然而明矣。此亢則害承迺制之意。原夫天地陰陽之機。寒極生熱。熱極生寒。鬼神不測。有以斡旋宰制於其間也。故木極而似金。火極而似水。水極而似土。蓋氣之亢極。所以承之者反勝於已也。夫惟承其亢而制其害者。造化之功可得而成者也。今夫相火之下。水氣承而火無其凝。水位之下。土氣承而水氣無其戕。土位之下。木承而土順。風位之下。金乘而風平。火熱承其燥。金自然金家之疾。陰精承其君火。自然火家之侯。所謂亢而爲害承而迺制者。如斯而已。且嘗考之六元正紀大論云。少陽所至。爲火生。終爲蒸溽。火化以生。則火生也。陽在上。故終爲蒸溽。是水化以承相火之意。太陽所至。爲寒雪冰雹白埃。是土化以承寒水之意也。蓋雪冰雹水也。白埃

下承土也。以至太陰所至。爲雷霆驟注烈風。雷霆驟注土也。烈風下承之木氣也。厥陰所至。爲風生。終爲散。風化以生則風生也。風靜也。申明所至。爲散落溫。散落金也。溫者乘之火氣也。少陰所至。爲熱生。中爲寒。熱化以生則熱生也。陰精承上故中爲火也。豈非元爲害則承迭制者歟。昔者黃帝與岐伯。上窮天紀。下極地理。遠取諸物。近取諸身。更相問難。以作內經。至於六微旨大論。有極於六氣相承之言。以爲制則生化。外別盛衰。害則敗亂。生化大病。諸以所勝之氣來於下者。皆折其標盛也。陰陽散而爲五行。而人之所稟皆備焉。夫五脈者。天之眞。行血氣。通陰陽。以榮於身。五色者。氣之華。應五行。合四時。以彰於面。惟其察色按脈。而不偏廢。然後察病之機。斷之以寒熱。歸之五行。而療之。而獲全濟之效者。本於能合色脈而已。假令肝色如翠羽之青。其脈微弦而急。所以爲生。若浮滿而短。色見如草滋者。豈能生乎。心色如鷄冠之赤。其脈當浮大而散。所以爲順。若沉濇而滑。色見如衂血者。豈能順乎。脾色如蟹腹之黃。其脈當中緩而大。所以爲從。若微弦而急。色見如枯骨者。豈能從乎。肺色如豕膏之白。其脈當浮滿而短。所以爲吉。若浮大而散。色見如烏羽之黑。其脈沉濇而滑。所以爲生。或脈來緩而大

其本而治之。欲去深感之患。不可得也。今夫厥陰爲標。風木爲本。其風邪傷於人也。掉搖而眩轉。動而痰挾。卒暴強直之病生矣。少陰爲標。君火爲本。其熱邪傷於人也。指瘛而瘈掉。暴注而下迫。水液混混之病生矣。少陽爲標。相火爲本。其熱邪傷於人也。爲熱而譫擾。躁越如喪神守之病生矣。善爲治者。風淫所勝。平以辛涼。熱淫所勝。平以鹹寒。火淫所勝。平以鹹冷。以其病本於陽。必求於陽而療之。病之不愈者。未之有也。太陰爲標。濕土爲本。其濕邪傷於人也。脹滿而身腫。按之而沒指。諸痙強直之病生矣。陽明爲標。燥金爲本。其燥邪傷於人也。氣澁而膚皺。皮膚以緻揭。諸濇枯涸之病生矣。太陽爲標。寒水爲本。其寒邪傷於人也。吐利而腥穢水液以澄冷。諸寒收引之病生矣。善爲治者。溫淫所勝。平以辛熱。以其病本於陰。必求其陰而治之。病之不愈者。未之有也。豈非將以療疾之法。當以窮其受病之源者哉。抑嘗論之。邪氣爲病。各有其候。治之之法。各有其要。亦豈止於一二而已。其在皮者。汗而發之。其入裏者。下而奪之。其在高者。因而越之。謂可吐也。慄悍者。按而收之。謂按摩也。藏寒腸鳴者。治以灸熨。脈病擊痛者。治以砭刺。血實盛結腫熱者。治以砭石。氣滯痿厥寒熱者。治以導引。經絡不通。病生于不仁者。治以醪醴。血氣凝泣。病生於筋脈者。治以熨藥。始焉求其受病之本。終焉爲竭其爲病之邪者。無出於此也。噫。昔黃帝處於法宮之中。坐於明堂之上。受業於岐伯。傳道於雷公。曰。陰陽者。天地之道也。綱紀萬物。變化生殺之妙。蓋有不測之神。斡旋宰制於其間也。人感受邪生病。不離於陰陽。病既本於此。爲工者豈可他求哉。必求於陰陽可也。至眞要大論曰。有者求之。無者求之。此求其病機之說。與夫求於本。其理一也。

中風一

中風大率主血虛有痰。治痰爲先。次養血行血。或屬虛。挾火一作挾與溫。又須分氣虛血虛。半身不遂。大率多痰。在左屬死血痰一作少。血在右屬痰有熱。併氣虛。左以四物湯加桃仁、紅花、竹瀝、姜汁。右以二陳湯四君子等湯加竹瀝、姜汁。痰藥盛者。口眼喎斜者。不能言者。皆當用吐法。一吐不已。再吐。輕者用瓜蒂一錢。或稀涎散。或蝦汁。以蝦半斤。入蔥、姜等料物。水煮。先喫蝦。次飲汁。後以鵝翎探引。吐痰用蝦者。蓋引其風出耳。重者用藜蘆半錢。或三分。加麝香少許。藿汁調。吐。若口噤昏迷者。灌入鼻內吐之。虛者不可吐。氣虛卒倒者。用參耆補之。有痰。漉煎參湯加竹瀝、姜汁。血虛用四物湯。俱用姜汁炒。恐泥痰故也。有痰再加竹瀝、姜汁入內服。能食者。去竹瀝加荊瀝。肥白人多濕。少用烏頭、附子行經。凡用烏附。必用童便煮過。以殺其毒。初昏倒。急掐人中至醒。然後用痰藥。以二陳湯、四君子湯、四物湯、加減用之。

○瘦人陰虛火熱。用四物湯加牛膝、竹瀝、黃芩、黃柏。有痰者加痰藥。治痰氣實而能食。用荊瀝。氣虛少食。用竹瀝。此二味開經絡行血氣故也。入四物湯。必用姜汁助之。遺尿屬氣。以參耆補之。筋枯者。舉

丹溪先生心法卷一

明　新安吳中珩　校

動則痛是無血不能滋養其筋不治也脈訣內言諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如拽睡肉脫筋痿扳直搖頭上竄面赤如裝或頭面青黑汗綴如珠皆不可治

○案內經已下皆前外中風邪然地有南北之殊不可一途而論惟劉守眞作將息失宜水不能制火極是山今言之西北二方亦有眞為風所中者但極少爾東南之人多是濕土生痰痰生熱熱生風也邪之所襲其氣必虛風之傷人在肺藏為多　許學士謂氣中者亦有此七情所傷脈微而數或澀而緊緩而遲必也脈遲浮可治大數而極者死若果外中者則東垣所謂中血脈中府中藏之理其於四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同治大謬發揮其詳予和用三法如的係邪氣卒中痰壅胃熱者可用香則不可

【入方】

肥人中風口喎手足麻木左右俱作痰治

貝母　瓜蔞　南星　荊芥
防風　羌活　黃柏　黃芩
黃連　白朮　陳皮　半夏
薄桂　甘草　威靈仙　天花粉

多食濕麵加附子、竹瀝、姜汁、酒一匙、行經。

一、痿手足左癖口不能語健啖。

防風　荊芥
浚藥　乳香
厚朴　桔梗
全蝎　羌活　南星
木通　茯苓
麻黃　甘草

右為末溏酒調下不效時春脈伏漸以淡鹽湯鹽汁每早一椀吐五日仍以白朮、陳皮、茯苓、甘草、厚朴、青浦、山二貼後以川芎、山梔、豆豉、瓜蒂、藜豆粉、鹽汁、鹽湯吐之吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸、酒芩、紅花、木通、粘子、荊芥、麥南星、牛膝、茯苓為末酒糊丸服十日後夜間微汗手足動而能言

一、人癱左。

酒連　酒芩
羌活　川芎
荊芥　人參一兩
附子三片

右丸如彈子大酒化服

一、人體肥中風先吐後以藥。

蒼朮　南星　酒芩
木通　茯苓　牛膝
升麻　厚朴　甘草

〔附錄〕風者百病之始善行而數變行者動也風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥養血是也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮治其在經雖有汗下之戒而有中藏中府之分中府者宜汗之中藏者宜下之此雖合汗下亦不可太過汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損其氣亡陰則損其形初調表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經其中府者面顯五色有表證面脈浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後身之前身之側皆曰中府也其治多易中藏者唇吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞀大小便秘結或眼合直視搖頭口開手撒遺溺痰如拽鋸鼻鼾皆曰中藏也中藏者多不治也六府不和留結為難五藏不和九竅不通無此乃在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安藏府而和營衛少有不愈者也風中府者先以加減續命湯隨證發其表如兼中藏則大便多秘澁宜以三化湯通其滯初證已定別無他變以大藥和治之大抵中府者多著四肢中藏者多滯九竅中府者多兼中藏之證至於舌強失音久服大藥能自愈也又因氣中其證與中風相似但風中多痰涎氣中口中無涎治之之法調氣為先經言治風者以理氣為先氣順則痰消徐理其風庶可收效又有中已言不變志不亂病在分淺之間者只宜溫肝散解汗為可復也　凡中風脈多沉伏大法浮遲者吉沉實者凶　先用麻油調蘇合香丸或用姜汁或用白湯調如口噤挾開灌之稍醒則服八味順氣散若痰盛者只以省風導痰湯服之若中則昏沉不省人事口噤急以生半夏末吹入鼻中或用細辛皂角為末吹之噴嚏則甦無嚏者不治　肥人中者以其氣虛理氣氣順則痰消徐理其風庶出入之道肥者氣必急急氣急必肺邪盛肺金克木膽為肝之府故痰涎盛盛所以治之必先理氣為急中後氣未順痰未除調理之劑惟當以藿香正氣散和星香散煎服此藥非特可治中風之證治中氣中惡尤宜蓋常止嘔多痰者亦可用之　若前證多怒宜小續命湯加減加秦艽半錢恍惚錯語加茯神遠志各半錢不得睡加酸棗仁半錢不能言加竹瀝一蜆殼許人虛無力者去麻黃加人參如其數　若人自甦能言能食惟身體不遂急則擊蹉緩則攣曳經年不愈以加減地仙丹常服　若欲食坐臥如常但失音不語只以小續命去附子加菖蒲一錢　治風之法初得之即當順氣及日久即當活血此萬古不易之至理惟可以四物湯吞活絡丹愈者正是此義若先不順氣化痰遽用烏附又不活血徒用防風天麻羌活蓋吾未見能治也又見風中於肉勝輒用腦麝治之者是引風入骨髓也尤為難治深可戒哉　如口喎斜未正者以蓖麻去殼爛搗右喎塗左左喎塗右咸歸魚血入麝香少許塗之即正　暗啞初卒倒僵仆不知人事急以皂角末咸不臥散於鼻內吹之就提頭頂髮立甦若有嘔者可治無嘔者不治　經曰風從汗泄似可微汗正如解表表實無汗者散之劫之表虛自汗者溫之解之若氣滯者難治宜吐之餘症見前　可下者此因內有便溺之阻隔

故裏實若三五日不大便者可與機要三化湯或子和搜風丸老人只以潤腸丸理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜爲藥順氣八味順氣之類理血者無裹裹之急血弱舉發不時者用大秦艽湯或羌活愈風湯兼用化痰丸子灸可灸風池百會曲池合谷風市絕骨環跳肩髃三里等穴皆灸之以鑒寂疎風

【附方】

二陳湯

半夏泡　陳皮二兩半　白茯苓兩半　甘草炙七錢半

右㕮咀每服四錢水一盞生姜七片烏梅一箇煎

四君子湯　見脾胃類

四物湯　見婦人類

稀涎散　治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮搐搦

猪牙皂角四挺去黑皮　白礬一兩

右爲末每服三字溫水灌下但吐出涎便醒虛人不可大吐

通頂散　治中風中氣昏憒不知人事急用吹鼻即甦

藜蘆　生甘草　川芎

右爲末吹入鼻中一字就提頭頂中髮立甦有嚏者可治

八味順氣散

白朮　白茯苓　青皮

人參各一錢

陳皮去白　白烏藥　人參各一兩

每服五錢水一鍾半煎七分溫服仍以酒化蘇合香丸間服

烏藥順氣散

麻黃　陳皮　白烏各二兩

川芎　枳殼炒　甘草炙各一兩

桔梗各一兩　乾姜炮半兩

右爲末每服三錢水二盞生姜三片棗一枚煎服

星香湯

南星八錢　木香一錢

分二服水一鍾姜十片煎服

省風湯

南星生八兩　防風四兩　獨活

全蝎炒　甘草生各二兩

每服四錢水一鍾半生姜十片煎服

小省風湯　與導痰湯相合煎服導痰湯見痰類

防風　南星生各四兩　半夏米泔浸

甘草生各二兩

每服四錢姜十片

小紋命湯

麻黃去節　人參　黃芩　芍藥

川芎　甘草炙　杏仁炒去皮尖　防己

桂各一兩　防風一兩半　附子炮去皮臍半兩

每服五錢水一盞半姜五片棗一枚煎溫服取微汗隨人虛實與所中輕重加減于後若熱者去附子入白附子亦可筋急拘攣語遲脈弦加豉仁若筋急加人參去黃芩芍藥以避中寒服後稍輕再加當歸煩燥不大便去附桂倍加芍藥竹瀝如大便三五日不去胸中不快加只殼大黃如言語蹇澁手足顫掉加菖蒲竹瀝若發渴加麥冬葛根瓜蔞根身體痛加羌活搖者亦加之

煩燥多驚者加犀角羚羊角　汗多者去麻黃

家寶丹　治一切風疾癱瘓痿痹不仁口眼喎僻者邪入骨髓可服

川烏　輕粉各一兩　五靈脂醋汁製另研　草烏各六兩

南星　全蝎　沒藥　辰砂各二兩

白附子　乳香　殭蠶炒三兩　片腦五錢

羌活　麝香　地龍四兩　雄黃

天麻三兩

右爲末作散調三分不醒半錢或蜜丸如彈子大含化茶調皆可

如神救苦散　治癱瘓風濕痹痿走注疼痛不止此却劑也非痛不可服痛止則已

米殼一兩去頂蓋蜜炒　陳皮五錢　虎骨炙

乳香研　沒藥研　甘草各二錢半

右爲末每服三錢水一盞煎連渣服病在上食後在下食前煎時須順攪之

大秦艽湯　治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌强不能言語宜養血而筋自榮

秦艽　石膏各二兩　甘草　川芎

當歸　白芍
黃芩　白芷
熟芊　茯苓

春夏加知母一兩。

右㕮咀。每服一兩。水煎服。無時。如遇天陰。加生姜七片。心下痞。加枳實一錢。

三化湯　外有六經之形證。先以加減續命湯治之。若內有便溺之阻隔。以此湯主之。

厚朴　大黃　枳實　羌活等分

每服三兩。水煎服。以利爲度。

〔附錄〕法曰。四肢不收。衆俗曰癱瘓。故經所謂太過則令人四肢不舉。又曰。上太過則敎阜。阜高也。敎。厚也。俚尊而又高。則令除去。此眞所謂膏粱之疾。非胃肝經虛。何以明之。經所謂三陽三陰發病。偏枯痿易。四肢不舉。三陰不足。則發偏枯。三陽有餘。則爲痿易。易爲變易。常用而痿弱無力也。其治則瀉。令氣弱。陽衰。土平而愈。故以三化湯下之。若脾虛則不用也。經所謂土不及則卑陷。卑下也。陷。坑也。故脾病四肢不用。四肢皆稟氣於胃。而不能至經。必因脾方可得稟受也。令脾不能與胃行其津液。四肢不得稟水穀氣。日以衰。脈道不利。筋骨肌肉皆無氣以生。故不用焉。其治可大補十全散。加減四物湯去邪歸正。

愈風湯　中風症。內邪已除。外邪已盡。當服此藥。以行導諸經。久服大風悉去。縱有微邪。只從此藥加減治之。然治病之法。不可失於通塞。或一氣之微汗。或一旬之通利。如此乃常治之法也。久則清濁自分。營衛自和。如初覺風動。服此不至倒仆。

羌活　甘草炙　防風　防己
黃耆　蔓荊子　川芎　獨活
細辛　枳殼　麻黃去根　地骨皮
人參　知母　甘菊　薄荷去梗
白芷　桐杞子　當歸　杜仲炒
秦艽　柴胡　半夏　厚朴姜製
前胡　熟芊各二兩　白茯苓　黃芩三兩
生芊　蒼朮　石膏　芍藥各四兩

桂一兩

右剉。每服一兩。水二鍾。生姜三片。煎空心一服。臨臥煎查。空心一服。吞下二丹丸。爲之重劑。臨臥一服。吞下四白丹。爲之輕劑。立其法。是動以安神。靜以清肺。假令一氣之微汗。用愈風湯三兩。加麻黃一兩。勻作四服。加生姜空心服。以粥投之。得微汗則佳。　如一旬之通利。用愈風湯三兩。加大黃一兩。勻作四服。如前服。臨臥服。得利爲度。此藥常服之。不可失四時之補。　如望春大寒之後。本方中加羌活、防風、白芷、生芊、黃芩、知母、各二兩。謂迎而奪少陽之氣也。　如望夏穀雨之後。本方中加防己、白朮、茯苓、各二兩。謂迎而奪陽明之氣也。　季夏之月。本方中加防己、白朮、茯苓、各二兩。謂勝脾土之濕也。　初伏大暑之後。本方中加厚朴一兩。藿香一兩。桂一兩。謂迎而奪太陰之氣也。　望冬霜降之後。本方中加前胡、官桂、各一兩。當歸二兩。謂勝少陰之氣也。　如得春氣候。減冬所加。四時類此。此雖立四時加減。更宜臨病之際。審察虛實。寒熱。土地之宜。邪氣多少。此藥具七情六欲四氣。無使五藏偏勝。及不動於榮衛。如風稍服之。永不結燥。此藥與天麻丸相爲表裏。治未病之聖藥也。若已病者。更宜常服。無間男女老幼。益調痞郁。急受慈風四時傷寒等病。服之神效。

四白丹　能清肺氣。養魄。謂中風者多昏冒氣不清利也。

白朮　砂仁　白茯苓
防風　川芎　甘草
白芷一兩　羌活　獨活
藿香　白檀香各一錢半　知母
甜竹葉二兩　麝香一錢。另研　龍腦另研

右爲末。煉蜜丸。每兩作十丸。臨臥嚼一丸。分五七次細嚼之。煎愈風湯送下。

二丹丸　治健忘。養神。定志。和血。內以安神。外華勝理。

丹參　天門冬　熟芊各一兩半
麥門冬　白茯苓各一兩　人參
朱砂各半兩。研爲末　菖蒲

右爲末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服五十丸。至百丸。空心食前煎愈風湯送下。

清涼丸　治中風。自汗昏冒。發熱不惡寒。不風安臥。此是風熱煩燥之故也。

當歸　川芎　梔子
大黃　防風　龍膽草等分

右末。蜜丸彈子大。每藥一丸。竹葉湯化下。

天麻丸　治風因熱而生。熱勝則動。宜以靜勝其燥。是養血也。

天麻　牛膝二味用酒伺沒三日。焙乾
元參各六兩　杜仲炒。去絲。七兩　附子炮一兩
川歸十兩　生芊一斤

一方有獨活五兩。去腎間風。

右爲末。蜜丸如梧桐子大。每服五七十丸。空心溫酒白湯皆可下。

香附　草藏
人參各半兩　羌活十四兩
薄荷各二錢半
細辛各二錢
牛黃各半錢。另研

藿香正氣散

大腹皮　茯苓　白芷　紫蘇各一兩
陳皮　苦梗　白朮　厚朴
半夏曲　甘草各二兩　藿香三兩

右爲末。每服二錢。姜三片。棗一枚。煎服。

地仙丹

牛膝　菟絲子　附子　川椒各四兩
地龍　木鼈子各二兩　破故紙　白附子
菟絲子　赤豆　南星　骨碎補
羌活　何首烏　狗脊　蓮蘗
防風　烏藥各二兩　白朮　甘草
白茯苓　川烏各一兩　人參　黃耆各一兩半

右爲末。酒糊丸。梧子大。每服二十丸。空心酒下。荊芥茶亦得。

活絡丹

南星炮　川烏　草烏並炮去皮尖
乳香研　沒藥研各二兩　地龍去土各六兩

右爲末。酒糊丸。梧子大。每服二十丸。空心酒下。荊芥茶亦得。不臥散　子和方。

川芎兩半　石膏七錢半　蠶蛻五條

右爲細末。口噙水搐之。

子和搜風丸

人參　茯苓　薄荷各半兩
乾姜　寒水石　生白礬　蛤粉
黃芩　大黃各一兩　滑石　粟半各四兩
檳香一分　半夏一兩

右爲末。水丸如小豆大。生姜湯下。日三。

潤腸丸

麻子仁另研　大黃酒煨各一兩半　歸尾　桃仁泥
枳實麩炒　白芍　人參　升麻半兩
生甘草　陳皮各三錢　檳榔各二錢

右除麻仁、桃仁外。爲末。却入二仁泥。蜜丸梧子大。每服七八十丸。溫水食前下。

中寒二　附傷寒傷風

主乎溫散　有卒中天地之寒氣者。有口得寒物者。

○從補中益氣湯加發散藥。屬內傷者十居八九。其法。邪之所湊。其氣必虛。只用前湯中。從所見之證。出入加減。必先用參蒼托住正氣。氣虛甚者。少加附子以行之。倉卒感受大寒。氣大虛。必當溫散。理中湯相宜。甚者加附子。倉卒感受大寒。其氣之氣。其病即發。非若傷寒之邪。循經以漸而深也。已上治法。宜用於南不宜北。

戴云。此傷寒。謂身受殺之氣。口傷生冷物之類。因胃氣大虛。腠腠疎豁。病者脈必沉細。手足厥冷。惡寒。與熱證若相似而實不同。凡脈數者。或發身倦。雖身熱亦不渴。倦首動者是也。宜急溫之。遲則不救。飲水者。煩燥動搖者。皆熱病。寒熱二證。若水火然。不可得而同治。誤即殺人。

【附錄】凡症與傷寒相類者極多。皆雜證也。其詳出內經。熱論。自長沙以下。諸家推明甚至。千世之下。能得其粹者。東垣也。其曰內傷極多。外傷間而有之。此發前人之所未發。後人狗俗。不能貫切。詰同指爲外傷。極謬。其或可者。蓋亦因其不敢放肆。而多用和解及有咸胃等輕證。不可便認作傷寒妄治。西北二方。極寒甚殺傷極少。雖病亦有六經所見之證。故世俗混而難別。正治溫散。宜桂枝湯四逆湯輩。甚者三建湯。薛氏散。從治妙經曰。從而逆之。此之謂也。反攻用煎烏頭之類。

○傷能屬肺者多。宜辛溫或辛涼之劑散之。

戴云。新咳嗽鼻塞聲重者是也。

【附方】

補中益氣湯　見內傷類。

理中湯

人參　甘草　乾姜　白朮等分。

右剉。每服五錢。水煎溫服。

桂枝湯

桂枝　赤芍各一兩半　甘草一兩　生姜一兩半。

大棗

右剉。每服五錢。水煎溫服。

四逆湯

甘草炙二兩　乾姜一兩半　附子半兩

右剉。每服五錢。水煎溫服。

三建湯

大川烏　附子

右剉。每四錢。水二盞。姜十五片煎服。

解毒散

附子一枚及半兩者。炮熟取出。用冷灰培之。細研。入真腦茶一大錢同和。分二服。每服水一盞。煎六分。臨熟入蜜半匙。放溫服之。

姜附湯　治中寒身體強直。口噤不語。遍冷。

乾姜一兩　附子生去皮臍一斤

右剉。每服三錢。水煎服。　挾氣攻刺。加木香半錢。牽急加木瓜。　肢節痛加桂二錢。

消風百解散

荊芥　白芷

蒼朮　甘草等分

右剉。用姜三片。葱白三根。水煎服。

神朮散　治傷風頭痛。鼻窒聲重。　方見痢類。

中暑三　附暑風注夏

暑證。用黃連香薷飲。　挾痰。加半夏、南星。　虛。加人參、黃耆。　暑病內傷者。用清暑益氣湯。著暑氣是痰，用吐。　注夏屬陰虛元氣不足。夏初暑來。頭疼腳軟。食少體熱者。是宜補中益氣湯去柴胡、升麻、加炒柏、白芍藥。挾痰者加南星、半夏、陳皮。煎服。又或用生脈湯。　著氣挾濕挾火實者。可用吐法。

暑乃夏月炎毒也。盛熱之氣著火也。有胃有中三者有輕重之分。虛實之辨。或煎或茹。冰瀉者。胃與大腸受之。惡心者。胃口有痰欲吐也。此二者。固暑也。可用黃連香薷飲。清暑益氣湯。蓋黃連退暑熱。香薷消蓄水。或身熱頭疼。燥亂不寧者。或身如針刺者。此爲熱傷在分內也。當以解毒湯。白虎湯。加柴胡。氣如虛者。加人參。或咳嗽發寒熱。盜汗出不止。脈數者。熱在肺經。用清肺湯。柴胡天水散之類。急治則可。遲則不救。成火乘金也。此爲中暑。凡治病。須要明白辨別。愼勿混治。春秋間亦或有之。切莫執一。隨病處方爲妙。

戴云。暑風者。夏月卒倒。不省人事者是也。有四火者。有四痰者。火、君相二火也。暑、天地二火也。內外合而炎燥。所以卒倒也。痰者。人身之痰飲也。因暑氣入而鼓激痰飲。塞心之竅道。則手足不知動蹈而卒倒也。此二者。皆可吐。內經曰。火鬱則發之。吐卽發散也。當其虛實而吐之。吐醒後。可用清劑調治之。

【入方】

黃連香薷飲

香薷一斤　川朴製半斤　黃連

右咬咀。每二三錢。水煎服。

大順散

甘草瞿寸長三兩　乾姜　杏仁

右將甘草用白沙炒黃。次入乾姜同炒。令姜裂。次入杏仁同炒。不作聲爲度。篩去沙。入桂爲末。每服二三錢。水煎溫服。如煩燥。井花水調服。以沸湯點服亦得。

十味香薷飲

桂四兩

滑石

生姜各一斤

生苧　麥冬　牛膝

知母　葛根　甘草

右剉。水煎服。

〔附錄〕中暑是陽證。中暑是陰證。脈沉弱者。切不可用寒涼藥。熱悶恍惚。長砂五苓散。　脈弦實。黃連香茹湯。　熱甚自汗而渴。便澁者。五苓分利之。或桂苓甘露飲。　吐瀉。脈沉微甚者。可用附子大順散。　伏熱傷冷。縮脾飲、冷香飲子、皆可。浸冷服之。　或刺蒜肉入鼻中。或研蒜水解灌之。蓋蒜氣臭烈。能通諸竅故也。

【附方】

生脈湯

人參　麥冬　五味子

右剉。水煎服。

黃龍丸　治一切暑毒。

赤芝雄黃五錢　硫黃　硝石各一兩

開參各半兩　好麵四兩

右爲末。丸梧子大。每服五七十丸。白湯下。

卻暑散　治冒暑伏熱頭目眩暈。嘔吐。泄瀉。煩渴。背寒面垢。

赤茯苓　生草各四兩　寒食麵

右爲末。每服二錢。白湯調下。

香薷飲　治傷暑。藏府不和。霍亂吐利。煩渴引飲。

白扁豆炒　川朴姜製八兩　香茹一斤

右水煎。入酒少許。沉冷服。

香薷一兩　人參　陳皮
茯苓　黃芩　木瓜
扁豆　甘草炙各半兩

右爲末。每二錢。熱湯或冷水調服。咬咀煎亦得。

消暑益氣湯　治長夏濕熱蒸人。人感之。四肢困倦。精神少懶於動作。胸滿氣促。支節疼痛。或氣高而喘。身熱而煩。心下膨閉。小便黃而數。大便泄而頻。或痢或渴。不思飲食。自汗體虛。

黃耆　蒼朮制　人參
白朮　神曲　甘草炙
酒柏　麥冬　當歸各三分
五味子九箇　澤瀉五分　青皮二分半

右咬咀。作一服。水二大盞。煎至一盞。去滓。大溫服。食遠。

補中益氣湯　見內傷類。

天水散

滑石六兩　甘草炙一兩

右爲極細末。水調服。

五苓散

白朮　豬苓　茯苓各一兩半
澤瀉二兩半　加辰砂。名辰砂五苓散。

人參白虎湯　治暑熱發渴。脈虛。

人參一錢半　知母二錢　石膏半兩　甘草一錢

右咬咀。入粳米一合。水煎服。

桂苓甘露飲　宣明方。

茯苓　澤瀉各一兩　石膏
活石四兩　白朮　桂

右爲末。每服三錢。白湯調下。

縮脾飲　解伏熱。除煩渴。消暑毒。止吐瀉霍亂。

砂仁　草果　烏梅肉
扁豆炒　葛根各一兩

右咬咀。每服四錢。水煎冷服。

冷香飲子　治傷暑渴甚。亂飲。腹痛。煩躁。脈沉微。或伏。

白朮
川朴薑炒

草果仁三兩　附子　陳皮各一兩

右咬咀。每服一兩。入姜煎。水旋冷服。

黃連解毒湯

黃連　黃柏　黃芩

右咬咀。水煎。

中濕四

本草云。蒼朮治濕。上下都皆可用。二陳湯中加酒芩、羌活、蒼朮。散風行濕。脾胃受濕。沉困無力。怠惰好臥。去痰須用白朮。上部濕。蒼朮功烈。下部濕。宜升麻提之。外濕宜表散。內濕宜淡滲。若操濕。以羌活勝濕湯、平胃散之類。若風濕相搏。一身盡痛。以黃耆防己湯。若濕勝氣實者。以神佑丸、舟車丸服之。氣虛者。桑皮、茯苓、人參、葶藶、木香之類。凡肥人沉困怠惰。是濕熱。宜蒼朮、茯苓、滑石。凡肥白之人。沉困怠惰。是氣虛。宜二朮、人參、半夏、草果、厚朴、芍藥。凡黑瘦而沉困怠惰者。是熱。宜白朮、黃芩。凡飲食不節。脾胃受傷。不能遲送。宜枳朮丸。去上焦濕及熱。須用黃芩、瀉肺火。故也。又如肺有濕。亦宜黃芩。如肺有虛熱。宜天門冬、麥門冬、知母。用黃芩多則損脾。去中焦濕與痛熱。用黃連。瀉心火。故也。如中焦有實熱。亦宜黃連。若脾胃虛弱。不能運轉而悶。宜黃芩。白朮乾葛。若中焦濕熱。積久而痛。乃熱勢甚盛。宜黃連。用姜汁炒。去下焦濕腫及痛。併膀胱有火邪者。必須酒洗防己、黃柏、知母、草龍膽。又云。凡下焦有濕。草龍膽、防己爲君。甘草、黃柏爲佐。如下焦腫及痛者。是濕熱。宜酒防己、草龍膽、黃芩、蒼朮。若肥人氣虛之人。腿痛。宜二朮、南星、滑石、茯苓。黑瘦之人。下焦腫痛。宜當歸、桃仁、紅花、牛膝、檳榔、黃柏。

【附方】

二陳湯　見中風類。

羌活勝濕湯

羌活　獨活各一錢　藁本
甘草炙　川芎各五分　蔓荊子三分

右咬咀。作一服。水二盞。煎至一盞。去滓。大溫服。空心。

如身重腰沉沉然。加酒洗防己五分。輕者附子五分。重者川烏五分。

平胃散　見厥類。

防己黃耆湯　治風溫脈浮身重汗出惡風或痛。

防己一兩　甘草炙半兩　白朮七錢半　黃耆一兩一錢

右㕮咀。每服一兩入姜棗煎。喘者加麻黃。胃氣不利加芍藥。氣上衝加桂枝。下有痰加細辛。

三花神佑丸　治一切水濕腫病。大腹實脹。喘滿。

輕粉一錢　大黃一兩爲末　牽牛二兩　芫花醋拌炒

甘遂　大戟各半兩

右爲末。滴水丸。小豆大。初服五丸。每服加五丸。溫水下。無時。日三。

舟車丸

大黃二兩　甘遂　大戟

青皮　陳皮各一兩　牽牛頭末四兩　芫花

右爲末。水丸如梧子大。每服六七十丸。白湯下。隨證加減。

枳朮丸　見內傷類。

木香半兩

升陽除溫湯　見泄瀉類。

瘟疫五　附大頭天行病

瘟疫、衆人一般病者是。又謂之天行時疫。治有三法。宜補、宜散、宜降。

【入方】

大黃　黃連　黃芩

桔梗　防風　柴朮

香附　人中黃

右爲末。神曲糊丸。每服六七十丸。分氣血與痰。作湯使。氣虛者。四君子湯。血虛者。四物湯。痰多者。二陳湯送下。熱甚者。童便下。

又方。溫病亦治食積、痰熱、降陰火。

人中黃

飯爲丸。菉豆大。下十五丸。

又時病

半夏　川芎　茯苓

山查　白朮　陳皮

加頭痛加酒芩。口渴加乾葛。身痛加羌活、薄桂、防風芎藭。

大頭天行病。此爲濕氣。在高顛之上。切勿用降藥。

東垣有方

羌活　酒黃芩　酒蒸大黃

附方治大頭病。兼治喉痹咳。

人間治疫有仙方。一兩煙蚕二大黃。

麥汁爲丸如彈子。井花調蜜便清涼。

冬溫爲病。非其時而有其氣也。冬時嚴寒。當君子閉藏。而反發泄於外。專用補藥而帶表藥。如補中益氣之類。

作人中黃法

以竹筒兩頭留節。中作一竅。內甘草於中。仍以竹木釘閉竅。於大糞缸中浸一月。取出晒乾。大治疫毒。

左手脈大於右手。浮緩而盛。按之無力。

大病虛脫本是陰虛。用艾灸丹田者。所以補陽。陽生陰長故也。不可用附子。止可多服人參。

【附方】

漏蘆湯　治藏府積熱。發爲腫毒。時疫疙瘩。頭面洪腫。咽喉塡塞。水藥不下。一切危惡疫癘。

漏蘆　升麻　大黃

藍葉　元參等分。

右㕮咀。每服二錢。水煎服。腫熱甚加芒硝二錢。

消毒丸　治時疫疙瘩惡證。

大黃　牡蠣　殭蠶炒等分

右爲末。煉蜜丸如彈子大。新水化一丸。內加桔梗、大力子尤妙。

漏古雄黃丸　辟時疾。可與病人同床。傅著衣服。亦不相染。

雄黃一兩研　赤小豆炒　丹參

右爲細末。蜜丸。每服五丸。空心溫水下。

火六

火陰虛火動難治。火醫當發。看何經。輕者可降。重者則從其性而升之。

虛火可補。小便降火極速。凡氣有餘。便是火。不足者是氣虛。火急甚緩。參朮亦可。人壯氣實火盛頭狂者。可用正治。或硝黃冰水之類。

之若投冰水正治。立死。有補陰即火自降。炒黃柏生地黃之類。凡火盛者。不可驟用涼藥。必兼溫散。

可發有二。風寒外來者可發。醫者可發。氣從左邊起者。乃肝火也。氣從脚起入腹如火者。乃虛之極也。直火起於九泉之下。多死。一法用附子末。津調。塞湧泉穴。以四物湯加降火藥服之妙。陰虛證本難治。用四物湯加炒黃柏。降火補陰。龜板補陰。乃陰中之至陰也。四物加白馬胫骨降陰中火。可代黃連黃芩。黃連、黃芩、梔子、大黃、黃柏、降火。非陰中之火不可用。生甘草

級火邪。木通下行。瀉小腸火。人中白瀉肝火。須風露中二三年者佳。中氣不足者。咏用甘寒。山梔子仁。大能降火。從小便泄去。其性能屈曲下降。人所不知。亦治痞塊。中火邪。

【入方】

左金丸　治肝火。一名回令丸。

黃連六兩。一本作苓。吳茱萸一兩或半兩。

右爲末。水丸或蒸餅丸。白湯五十丸。

〔附錄〕諸熱瞀瘈。暴瘖冒昧。躁擾狂越。罵詈驚駭。腑臟痞滿。氣逆衝上。禁慄如喪神守。嘔嘔痛鴟。喉瘖。耳鳴及聾。嘔涌溢食不下。目昧不明。暴注瞤瘈。暴瘖暴死。五志七情過極。皆屬火也。　火者有曰君火、人火也。曰相火、天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動。皆屬火。以名而言。形質相生。配於五行。故萬事出。有知之後。五者之性。爲物所感。不能不動。謂之動者。即內經五火也。相火易起。五性厥陽之火相扇。則妄動矣。火起於妄。變化莫測。無時不有。煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火者也。故曰相火元氣之賊。周子又曰。聖人定之以中正仁義。而主靜。朱子亦曰。必使道心常爲一身之主。而人心聽命焉。此善處乎火者。人心聽命於道心。而又能主之以靜。彼五火將寂然不作。而相火者。惟有俾補造化。而爲生生不息之運用爾。何賊之有。

【附方】

東垣瀉陰火升陽湯　治肌熱煩熱。面赤食少。喘咳痰盛。

羌活　甘草炙　黃者　升麻八錢　柴胡兩半　人參　黃連酒炒半兩　石膏半兩。秋深不用。

右咬咀。每服一兩或半兩。水煎。此藥發脾胃火邪。又心腎肝肺勝胜藥也。瀉陰火。升發陽氣。榮養氣血者也。

升陽散火湯　治男子婦人四肢發熱。肌熱。筋痹熱。骨髓中熱。發困。熱如燎。捫之烙手。此病多因血虛而得之。或胃虛過食冷物。抑遏陽氣於脾土。火鬱則發之。

升麻　葛根　獨活　羌活各半兩。　防風二錢半　柴胡八錢　人參　甘草炙。三錢。　白芍各半兩　甘草生。二錢。

右咬咀。每服半兩或一兩。水煎。稍熱服。

地骨皮散　治卒身壯熱。脈長而滑。陽毒火熾。發渴。

地骨皮　茯苓各半兩。　柴胡　生甘　知母各一兩。　石膏二兩。　痲黃各七錢半。有汗臭去之。

右咬咀。每服一兩。入姜煎。

黃連解毒湯　見暑類。

丹溪先生心法卷二

斑疹七

斑屬風熱挾痰而作。自裏而發於外。通聖散中消息。當以微汗散之。一切不可下。　內傷斑者。胃氣極虛。一身火遊行於外所致。宜補以降。於陰證略例中求之。發斑假傷寒者。痰熱之病發於外。微汗以散之。若下之非理。　疹屬熱與痰。在肺。清肺火降痰。或解散出汗。亦有可下者。　疹即瘡疹。汗之即愈。通聖散中消息之。　瘡疹多屬脾。隱隱然在皮膚之間。故言瘡疹也。發則多痒。或不仁者。是兼風寒溫之殊。色紅者。兼火化也。　黃瓜水調伏龍肝。去紅點斑。

戴云。斑有色點而無頭粒者是也。疹浮小有頭粒者。隨出即收。收則又出是也。非若斑之無頭粒者。當明辨之。

〔附錄〕斑疹之病。其爲證各異。瘡發煩熱於外者。屬少陽三焦相火也。謂之斑。小紅慊行皮膚之中不出者。屬少陰君火也。謂之疹。　又傷寒陽證發斑有四。惟溫毒發斑至重。紅赤者爲胃熱也。紫黑者爲胃爛也。一則下早。一則下之晚。乃外感熱病發斑也。以玄參、升麻、白虎等藥服之。　陰證發斑。亦出胸。又出手足。亦稀少而微紅。若作熱證投之涼藥大誤矣。此無根失守之火。聚於胸中。上獨薰肺。傳於皮膚而爲斑點。但如蚊、蚋、虱、蚤咬形狀。而非錦紋也。只宜調中溫胃。加以茴香、芍藥。或以大建中之類。

黃芩　羌活

其火自下斑自消退可謂治本而不治標也。

【入方】

調中湯　治內傷外感面發陰斑。

蒼朮一錢半	陳皮一錢	砂仁	藿香
芍藥炒	甘草炙	桔梗	半夏
白芷	羌活	枳殼各一錢	川芎半錢
麻黃	柱枝各半錢		

右咬咀。姜三片。水煎服。

消毒犀角飲子　治斑及瘢疹。

牛蒡子六錢	荊芥	防風各三錢	甘草一錢

右咬咀。水煎。

通聖散　出丹溪經驗方。

川芎	當歸	麻黃	薄荷
連翹	白芍	黃芩	石膏
桔梗一兩	滑石三兩	荊芥	梔子
白芷二錢半	甘草		

右對。水煎服。如身疼。加蒼朮、羌活。痰嗽。加半夏。每服細末三錢。生姜三片。搗細溫起。煎沸服之。

玄參升麻湯　瘥在身。治汗下、吐後。毒不散。表虛裏實。發於外甚。則煩燥譫妄。

玄參	升麻	甘草等分。	

右咬咀。水煎。

化斑湯　治傷寒汗吐下後。斑發。脈虛。

白虎湯加人參。守其再加白朮。

右咬咀。時時煎服。

大建中湯

黃芪	當歸	桂心	芍藥各二錢。
人參	甘草各一錢。	半夏	黑附炮去皮各二錢半。

右咬咀。每服五錢。水二盞。姜三片。棗二枚。煎。食前服。

瘡八

瘡疾有風。暑。食。痰。老瘡。瘡母。六法。風暑當發汗。夏月多在風涼處歇。遂閉其汗而不泄故也。惡飲食者。必自飲食上得之。無汗者。要有汗正氣爲主。帶散邪爲主。帶補。有汗者。要無汗。

一日一發者。受病一月。間日一發者。受病半年。三日一發者。受病一年。二日連發住一日者。氣血俱病。瘧病虛者。須以人參白朮一二貼托住其氣。不使下陷。後使他藥。內傷挾外邪同發。內必主痰。外以汗解散二陳湯加柴胡、黃芩、常山、草果、煎服。久瘧不得汗者。二陳湯加楮榔、倍蒼朮、白朮、一方加柴胡、葛根、川芎。一補一發。不可直截。老瘧病。此係風暑於陰分。用血藥引出陽分則散。入方宜

川芎	撫芎	紅花	當歸
砂仁	白朮	蒼朮	甘草
白芷			

右剉。水煎。露一宿。次早服。

○治瘧一日間一日發者。補藥帶表。藥後以截瘧丹截之。若在陰分者。用柴葛起陽分。方可截。即前藥之屬。

充柴瘧在陰分須徹起陽分者。即格致論中云。巔傳出玉腑亂而失期也。又當因其汗之多寡。而爲補養升發之術。下陷。謂陽氣下陷入陰。血中無汗。要有汗。多用川芎、蒼朮、乾葛、升麻、柴胡之屬。此丹溪治瘧之徹旨。學者所當知也。

截瘧常山飲

穿山甲炮。	草果	知母	常山
烏梅	甘草炙。	常山	檳榔

右咬咀。水酒一大碗。煎半碗。露一宿。臨發日早服。得吐爲順。一云加半夏、柴胡。去穿山甲。如吐、加厚朴。又或加青皮、陳皮。

又方

柴胡	草果	常山	檳榔
貝母	檳榔	知母	知母

右用酒水同煎。露一宿。臨發前二時服。

又治瘧母。此藥消導。

青皮	桃仁	紅花	神麯
麥芽	鼈甲醋炙爲末	三稜	莪朮
海粉	香附童用醋煮		

右爲末。丸如梧子大。每服五七十丸。白湯下。

又治瘧寒熱頭痛如破。渴飲冰水。外多汗出。

人參	白朮	黃芪	黃芩
黃連	山梔	川芎	蒼朮

半夏　天花粉
右㕮咀。水二鍾。姜三片。煎服。
又治瘧病發渴。
生苄　麥門冬
知母　葛根
右㕮咀。水煎。
救瘧青蒿丸
青蒿半斤　冬瓜葉
右焙乾爲末。水丸胡椒大。每一兩分四服。於當發之前一時服盡。　又云。高蒿一兩。冬青落二兩。馬鞭草二兩。桂二兩。未知孰是。姑兩存之。以俟知者。
截瘧
檳榔　陳皮
茯苓　烏梅
右㕮咀。作二服。水酒各一鍾。煎至一鍾。當發前。一日一服。臨發日早一服。服後少睡片時。
又瘧疾後
白朮　半夏一兩。
陳皮半兩。
右爲末。粥丸梧子大。每服六十丸。姜湯下。
〔附錄〕世用砒霜等毒。不可輕用。俗謂脾寒。此因名而迷其實也。苟因飲食所傷而得。亦未必全是寒。況其他乎。在其陽分者易治。陰分者難治。瘧母必用毒藥消之。行氣消堅爲主。東垣謂寒瘧屬太陽。熱瘧屬陽明。風瘧屬少陽。在三陰經則不分。總曰溫瘧。此言是。但三陰經說不明。作於子午卯酉日者少。作於寅申巳亥日者。太陰瘧也。
陰瘧也。寅申巳亥日者。厥陰瘧也。辰戌丑未日者。太陰瘧也。
○瘧脈多弦。但熱則弦而帶數。寒則弦而帶遲。亦有病久而脈極虛微而無力。似乎不弦。然而必於虛微之中見弦。但不摸手耳。細察可見也。
○瘧又名痎瘧。其證不一。素問又有五臟瘧。六腑瘧。詳矣。初得病勢正熾。一二發間。未宜遽截。不問寒熱多少。且用清脾飲。或草果飲。或二陳湯加草果半錢。或平胃加草果半錢。柴胡半錢。又或養胃湯加川芎、草果各半錢。熱少者。進取微汗。寒多者宜快脾湯。服後寒仍多者。養胃湯加附子、桂枝各半錢。石膏三物湯。以盡其邪。

天花粉　牛膝
炒柏　生甘草
瘧寒甚熱微
馬鞭草　宮桂
右㕮咀。水煎。發之前一時服。
截瘧神效
常山三錢。
厚朴各一錢半。
右㕮咀。水二鍾。姜七片。棗七枚。煎七分。當發日早溫服。
驅瘧飲
前胡　柴胡各四兩。　桂心
厚朴　半夏各三兩。　黃芪
甘草炙。各二兩。
右剉。水二鍾。生姜三片。棗四箇。煎。
山甲湯
川山甲　木鼈子等分。
右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。
人參　白朮
陳皮　草果
烏梅　茯苓
生姜等分。
右剉同姜棗。以鹽少許。淹食頃。厚皮紙裹以水潤濕。慢火煨。令香熟。焙乾。每服半兩。水煎。
數服。
○有汗要無汗。正氣爲主。小柴胡加桂。或白虎加桂。○無汗要有汗。散邪爲主。帶補。桂枝加黃芪。
知母石膏湯。或人參柴胡飲子。熱多寒少。目痛多汗。脈大。以大柴胡湯。微利爲度。餘邪未盡。以白芷
石膏三物湯。以盡其邪。
六和湯
人參　知母　草果
烏梅　白芷　檳榔　貝母
常山二錢。　柴胡各一錢。用酒炸。
右剉。水煎。姜三片。棗一箇。

半夏　天花粉
右㕮咀。水二鍾。姜三片。煎服。
又治瘧病發渴。
生苄　麥門冬
知母　葛根
右㕮咀。水煎。
救瘧青蒿丸
青蒿半斤　冬瓜葉
右焙乾爲末。水丸胡椒大。每一兩分四服。於當發之前一時服盡。　又云。高蒿一兩。冬青落二兩。馬鞭草二兩。桂二兩。未知孰是。姑兩存之。以俟知者。
截瘧
檳榔　陳皮
茯苓　烏梅
右㕮咀。作二服。水酒各一鍾。煎至一鍾。當發前。一日一服。臨發日早一服。服後少睡片時。
又瘧疾後
白朮　半夏一兩。
陳皮半兩。
右爲末。粥丸梧子大。每服六十丸。姜湯下。
〔附錄〕世用砒霜等毒。不可輕用。俗謂脾寒。此因名而迷其實也。苟因飲食所傷而得。亦未必全是寒。況其他乎。在其陽分者易治。陰分者難治。瘧母必用毒藥消之。行氣消堅爲主。東垣謂寒瘧屬太陽。熱瘧屬陽明。風瘧屬少陽。在三陰經則不分。總曰溫瘧。此言是。但三陰經說不明。作於子午卯酉日者少。作於寅申巳亥日者。太陰瘧也。
陰瘧也。寅申巳亥日者。厥陰瘧也。辰戌丑未日者。太陰瘧也。
○瘧脈多弦。但熱則弦而帶數。寒則弦而帶遲。亦有病久而脈極虛微而無力。似乎不弦。然而必於虛微之中見弦。但不摸手耳。細察可見也。
○瘧又名痎瘧。其證不一。素問又有五臟瘧。六腑瘧。詳矣。初得病勢正熾。一二發間。未宜遽截。不問寒熱多少。且用清脾飲。或草果飲。或二陳湯加草果半錢。或平胃加草果半錢。柴胡半錢。又或養胃湯加川芎、草果各半錢。熱少者。進取微汗。寒多者宜快脾湯。服後寒仍多者。養胃湯加附子、桂枝各半錢。石膏三物湯。以盡其邪。
六和湯
人參　知母　草果
烏梅　白芷　檳榔　貝母
常山二錢。　柴胡各一錢。用酒炸。
右剉。水煎。姜三片。棗一箇。

秘方清脾丸　治瘧三日一發或十日一發。

姜黃三錢　白朮一兩半　人參　檳榔
草果　厚朴各半兩　黃芩
半夏　甘草三錢　甘草炙二兩
右爲末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服。

紅丸子　消食痰。

胡椒一兩　我朮　三稜醋煮一伏時各二兩
青皮炒三兩　阿魏一錢醋化
右爲末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸梧子大炒土硃爲衣每服七十丸姜湯下。

二陳湯　見中風類。

草果飲子

草果　川芎　紫蘇葉　白芷
良姜　炙甘草　青皮去白炒　陳皮去白
右等分爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去查溫服留查兩服併一服當發日進三服不以時。

人參養胃湯

平胃散加人參茯苓半夏草果藿香生姜烏梅。

參蘇飲

陳皮去白　枳殼麩炒　桔梗　甘草炙
木香各半兩　半夏　乾葛　蘇葉
前胡　人參　茯苓各七錢半一方不用木香
右剉每服五錢水盞半生姜七片棗一箇煎微熱服。

五苓散　見中暑類。

柴胡桂姜湯

柴胡八兩　桂枝　括蔞根四兩
黃芩各三兩　甘草炙　牡蠣二兩　甘草炙二兩
乾薑二兩
右剉水煎日三服煩汗出愈。

小柴胡湯

柴胡八兩　黃芩
半夏三兩　人參　甘草炙各三兩
右剉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服不拘時。

白虎加桂枝湯　治溫瘧。

知母六兩　甘草炙二兩　石膏四兩碎
粳米六合
右剉水煎日三汗出愈。

小柴胡加桂湯

本方去人參加桂一兩。

桂枝加黃芪知母石膏湯

本方加黃芪知母石膏各四錢半。

大柴胡湯

柴胡八兩　黃芩　赤芍各三兩
半夏二兩半　枳實半兩麩炒
右剉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服無時。

白芷石膏三物湯

白芷一兩　知母一兩七錢　石膏四兩
右爲粗末每半兩水一盞半煎一盞溫服。

痢九

痢赤屬血　白屬氣　有身熱　後重　腹痛　下血　身熱按外應小柴胡湯去人參　後重積與氣壓下之故　氣升兼消宜木香檳榔丸之類不愈者用蒼艽皂角子煨大黃當歸桃仁黃連枳殼若大腸風盛可作丸服　保和丸亦治因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛故也　後重窘迫者當和氣木香檳榔　腹痛者肺金之氣欝在大腸之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦梗開之然後用治痢藥氣實者調胃承氣大小承氣三乙承氣下之有熱先退熱然後看其氣病血藥用氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥益桂之屬　下血四物爲主　下血多主氣虛者可用胃虛者亦用之　血痢久不愈者屬陰虛四物湯爲主涼血和血當歸桃仁之屬　下痢久不止發熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥併熱藥下痢大孔痛者因熱流於下也以木香檳榔黃連黃芩炒乾薑　噤口痢者胃口熱甚故也大虛大熱用香連丸連肉各一半共分末米湯調下又方人參二分薑炒黃連一分爲末漫煎終日糊細呷之如吐則再服但一呷下肥便開人不知此多用溫熱藥甘味此以火濟火以滯益滯　封臍引熱下行用田螺肉搗碎入麝香少許貼臍內　下痢不治之證下如魚腦者半死半生下如塵腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治　赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆濕熱爲本赤白雜濁同法　下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主木故也

桂枝一兩

大黃二兩

有濕傷血。宜行濕清熱。內經所謂身熱則死。寒則生。此是大概言。必兼證詳之方可。今豈無身熱而生。寒而死者。服沉小留連或微者易治。洪大數者難治也。脈宜滑大。不宜弦急。仲敷治痢可溫者五法。可下者十治。或解表。或利小便。或待其自已。還分易治難治不治之證。至爲詳密。但與瀉同立論。不分學者當辨之。大孔痛一曰溫之。一曰清之。按久病身冷。脈沉小者宜溫。暴病身壯。脈浮洪者宜清。宜補。有可吐者。亦有可汗可下者。初得之時。元氣未虛。必推蕩之。此通因通用之法。稍久氣虛。則不可下。壯實初病宜下。虛弱衰老久病。宜升之。先水瀉後膿血。此脾傳腎。賊邪難愈。先膿血。勝水瀉。此腎傳脾。微邪易愈。下痢如豆汁者濕也。蓋脾腎爲水穀之海。無物不受。常兼四藏。故五色之相雜。常先通利。此迎而奪之之義。如虛者。亦宜審之。因熱而作。不可用巴豆。如傷冷物者。或可用。宜謹。　又有時疫作痢。一方一家之內。上下傳染相似。却宜明逆氣之勝復以治之。

戴云。痢雖有赤白二色。終無寒熱之分。通作濕熱治。但分新舊。更量元氣用藥。與赤白帶同。

【入方】

黃連　生芍　滑石　白芍
蒼朮　當歸　青皮
條芩

右剉。水煎。裹急後重。炒連、滑石、加桃仁、梔、檳。甚者大黃。噤者用薑汁、半夏。

又方

乾薑一錢　當歸二錢半　烏梅三箇　黃柏一錢半
黃連一錢

右剉作一服。水煎。食前。若水瀉。可等分用。或加枳殼。

又方　治熱與血。

大黃　黃連　黃芩　黃柏
枳殼　當歸　芍藥　滑石
桃仁　甘草　白朮等分

右爲末。或湯調。或作丸。用麵糊或神麯糊丸服。

一本云。誤服熱藥。藥毒犯胃者。當明審以祛其毒。

治白痢

蒼朮　白朮　茯苓
地榆　甘草　神麯

右剉。水煎。

治赤痢

地黃　芍藥　黃柏　地榆
白朮

右剉。水煎。腹痛加枳殼、厚朴。後重加滑石、木香、檳榔。有熱加黃芩、山梔。

又治痢方

滑石一兩　蒼朮半兩　川芎三錢　桃仁活法用。
芍藥半兩炒　甘草一錢

右爲末。蜜一片。擂細煎湯服。

又方　孫郎中因飲水過多。腹脹瀉痢。帶白。

蒼朮　白朮　厚朴　茯苓
滑石

右咬咀。水煎。下保和丸。　又云。加炒麯、甘草。

又方　痢後腳弱漸細者。

蒼朮　酒芩　白芍各二兩半　酒柏炒半兩

右爲末。粥丸。以四物湯加陳皮、甘草、水煎送下。

又方　痢後腰痛兩腳無力。

陳皮　半夏　白芍各一錢
蒼朮　當歸　酒芩各半錢
甘草各二錢

右咬咀。作一服。薑煎。食前。

又方　治小兒八歲下痢純血。作食積治。

蒼朮　白朮　黃芩　滑石
白芍　茯苓　甘草　陳皮
神麯炒

右咬咀。水煎。下保和丸。

治痢十法

其或寒熱發熱。身首俱痛。此爲表證。宜微汗和解。用蒼朮、川芎、陳皮、芍藥、甘草、生薑三片、煎。　其或腹痛後重。小水短下積。此爲裏證。宜和中疏氣。用炒枳殼、製厚朴、芍藥、陳皮、滑石、甘草、煎。　其或下墜異常。積中有紫黑血而又痛甚。此爲死血證。法當用擂細桃仁、滑石行之。或口渴及大便口燥棘。是名挾熱。即加黃芩。或口不渴身不熱。喜熱手熨。是名挾寒。即加乾薑。　其或下墜在血活之後。此氣滯證。宜於前藥加檳榔一枚。　其或在下則墜住。在上則嘔食。此爲毒積未化。胃氣未平證。當認其寒則溫之。熱則清之。

45
132
9B

虛則用參朮補。毒解積下。食自進。其或力倦自怯。氣少惡食。此爲挾虛證。宜加白朮、當歸身。虛甚者加人參。又十分重者。止用此一條。加陳皮補之。虛回而利自止。其或氣行血和積少。俱虛坐努責。此爲無血證。倍用當歸身尾、却以生芍藥生芐。生桃仁佐之。復以陳皮和之。血生自安。其或糟隧退減十之七八。穢積已盡。糟粕未實。當炒芍藥、炒白朮、炙甘草、陳皮茯苓煎湯。下固腸丸三十粒。然固腸丸性燥。恐尙有滯氣未盡行者。但當單飲此湯。固腸丸未宜進用。蓋固腸丸有去濕實腸之功。其或利後。糟粕未實。或食粥稍多。或飢甚方食。腹中作痛。切不可慌恐。當以白朮、陳皮各半煎湯和之。自安。其或久痢後。體虛氣弱。滑下不止。又當以藥澁之。可用訶子肉、豆蔻、白礬、半夏。甚者添牡蠣。可擇用之。然須用陳皮爲佐。恐大澁亦能作痛。又甚者。灸天樞氣海。右前方用厚朴專瀉滯凝之氣。然厚朴性大溫而散氣。久服大能虛人。滯氣稍行。卽去之。餘滯未盡。則用炒枳殼、陳皮。然枳殼亦能耗氣。比之朴稍緩。比陳皮稍重。滯氣稍退。當去之。只用陳皮以和衆藥。然陳皮去白有補瀉之功。若爲參朮之佐。亦純作補藥用。凡痢疾腹痛。必以白芍藥、甘草爲君。當歸、白朮爲佐。惡寒痛者加桂。惡熱痛者加黃柏。達者更能參以歲氣時令用藥。則萬舉萬全。豈在乎執方而已哉。

〔附錄〕痢有氣虛兼寒熱。有食積。有風邪。有熱有濕。有陽氣下陷。而感受不一。當分治。瀉痢痢重。諸有積以肚熱痛推之。諸有氣以肚如鼓脹驗之。究其受病之源。決之對病之劑。大要以散風邪。行滯氣。開胃脘爲先。不可遽用肉豆蔻、訶子、白朮澁以補住寒邪。不可投米殼、龍骨輩以閉澁腸胃。邪得補而愈盛。故證變作。所以日夕淹延而未已也。若升散者。以胃風湯、防風芍藥湯、神朮散。蒼朮防風湯。敗毒散。皆可汗之。攻裏若有濕者。用導水丸。兼醫承氣湯和中丸。若積滯用聖餅子。脾積丸。冷積川烏丸。方蘇感丸。若濕熱甚者。宜宣明玄青餅。若後重窘迫。用木香檳榔丸。色白者屬氣。赤白者屬氣血受病。赤黑相兼。屬濕熱。青綠雜色。是風與火濕。下血者。當涼血。當歸、生芐。赤者屬血。保命集四物湯和槐花、黃連、米殼醋炒。下利。脈沉弱而腹痛。用藍附湯。加對五苓理中。又機要疑水散。若青色者。寒兼風。若陽氣下陷者。以升陽益胃湯。加桔梗醋炒南星。用梅葉外貼眉攢極效。起泡便止。下痢若濕盛。膀濕者。以平胃散對五苓散最可。或麵芍丸。老人奉養大過。飲食傷脾。爲脾泄。機要白朮芍藥湯。濕勝仙朮炒用。若陰陽不分。當滲泄以五苓之類。或單用茱萸實炒爲末。米飲調二錢。若氣血俱虛。神弱者。以人參、白朮、當歸、芍藥、炒茯苓、少加黃連服之。或錢氏白朮散。又或十補湯佳。若暑痢而脈虛者。香薷飲。或清暑益氣。又或六和湯。藿香正氣。各加木香煞加散。若白痢下如凍膠。或鼻涕。此屬冷痢。宜除濕湯。加木香一錢。虛弱者亦與十補湯。赤痢發熱者。以敗毒散。加陳倉米一撮煎。下痢小便不通者。黃連阿膠丸爲最。

【附方】

胃風湯　治風冷入於腸胃。泄下鮮血。或腸胃濕毒。下如豆汁或瘀血。

人參　茯苓　川芎　當歸

桂　白朮　白芍等分。

右剉。水煎。入粟米百餘粒同煎。腹痛加木香。

噤口痢

石蓮肉日乾。

右爲末。服二錢。陳倉米湯調下。便覺思食。便以日照東方壁土炒眞橘皮爲末。並煎略煎佐之。

戴人木香檳榔丸

木香　檳榔　青皮

廣朮　枳殼　黃連

大黃各半兩。　丑末　香附各二兩。

右爲末。木丸梧子大。每五六十丸。煎水下。虛實與之。○紐珠多三稜、黃芩當歸。分兩不同。

調胃承氣陽

芒硝半斤。　甘草炙二兩。　大黃四兩。去皮湯洗。

右剉。每服臨期掛酌多少。先煮二味熟。去查。下硝。上火煮二三沸頓服之。

大承氣湯

大黃四兩。如欲子大。酒洗。　厚朴八兩。薑制。　枳實大者五枚炒。

芒硝二合。

每服看證掛酌多少。先煮二物至七分。去查。內大黃煮八分。去查。內芒硝。煎一二沸。溫服。

小承氣湯

大黃四兩。　厚朴二兩。薑炒。　枳實大者三枚炒。

右剉。看證掛酌多少用之。

防風芍藥湯

防風　芍藥　黃芩各二兩。

右㕮咀。每服半兩。水煎服。清。

神朮散

蒼朮一斤。　藁本　川芎各六兩。

粉草　細辛一兩六錢。

右爲粗末。每服三錢。薑三片。煎。要出汗。加葱白。

蒼朮防風湯

蒼朮二兩　防風一兩。

薑七片。煎。

敗毒散
　羌活　獨活
　柴胡　前胡
　川芎　桔梗等分
右剉。每服四錢。水一盞。薑三片。薄荷五葉。煎。熱服。寒多則熱服。熱多則溫服。傷濕加白朮。腳痛加天麻。

神芎導水丸
　大黃　黃芩二兩。
右爲末。滴水丸。每四五十丸。溫水下。食遠。

和中丸
　白朮二兩四錢　厚朴二兩。
　檳榔五錢　枳實五錢
右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸。每三十丸。溫水下。食遠。

聖餅子
　黃丹二錢　定粉三錢
　輕粉少許
右爲細末。入白麵四錢。滴水和爲指尖大。捻作餅子。陰乾。食前。漿水磨化服之。大便黑色爲妙。

蘇感丸
以蘇合香丸與感應丸二藥和勻。如菉米大。每五丸。滾薑湯空心下。

宣明玄青餅
　黃連　黃柏
　芫花醋拌炒　大戟各半兩。
　青黛一兩。
右爲末。水丸小豆大。初服十丸。每服加十丸。日三。以快利爲度。

保命集四物湯
　本方內加槐花、黃連、御米殼等分。

蜜附湯
理中湯　並見中寒類。
五苓散　見中暑類。
漿水散
　半夏一兩湯洗　附子半兩。炮。

乾薑一作乾生薑。　桂
　丑末　滑石四兩。
　大黃　黃芩二兩。
右爲末。滴水丸。每四五十丸。溫水下。食遠。

和中丸
　白朮二兩四錢　厚朴二兩。
　檳榔五錢　枳實五錢
右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸。每三十丸。溫水下。食遠。

聖餅子
　黃丹二錢　定粉三錢
　輕粉少許
右爲細末。入白麵四錢。滴水和爲指尖大。捻作餅子。陰乾。食前。漿水磨化服之。大便黑色爲妙。

蘇感丸
以蘇合香丸與感應丸二藥和勻。如菉米大。每五丸。滾薑湯空心下。

宣明玄青餅
　黃連　黃柏
　芫花醋拌炒　大戟各半兩。
　青黛一兩。
右爲末。水丸小豆大。初服十丸。每服加十丸。日三。以快利爲度。

保命集四物湯
　本方內加槐花、黃連、御米殼等分。

蜜附湯
理中湯　並見中寒類。
五苓散　見中暑類。
漿水散
　半夏一兩湯洗　附子半兩。炮。

敗毒散
　羌活　獨活
　柴胡　前胡
　川芎　桔梗等分
右剉。每服四錢。水一盞。薑三片。薄荷五葉。煎。熱服。寒多則熱服。熱多則溫服。傷濕加白朮。腳痛加天麻。

神芎導水丸
　大黃　黃芩二兩。
右爲末。滴水丸。每四五十丸。溫水下。食遠。

和中丸
　白朮二兩四錢　厚朴二兩。
　檳榔五錢　枳實五錢
右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸。每三十丸。溫水下。食遠。

聖餅子
　黃丹二錢　定粉三錢
　輕粉少許
右爲細末。入白麵四錢。滴水和爲指尖大。捻作餅子。陰乾。食前。漿水磨化服之。大便黑色爲妙。

蘇感丸
以蘇合香丸與感應丸二藥和勻。如菉米大。每五丸。滾薑湯空心下。

宣明玄青餅
　黃連　黃柏
　芫花醋拌炒　大戟各半兩。
　青黛一兩。
右爲末。水丸小豆大。初服十丸。每服加十丸。日三。以快利爲度。

保命集四物湯
　本方內加槐花、黃連、御米殼等分。

蜜附湯
理中湯　並見中寒類。
五苓散　見中暑類。
漿水散
　半夏一兩湯洗　附子半兩。炮。

乾薑一作乾生薑。　桂
　丑末　滑石四兩。
　大黃　黃芩二兩。
右爲末。滴水丸。每四五十丸。溫水下。食遠。

和中丸
　白朮二兩四錢　厚朴二兩。
　檳榔五錢　枳實五錢
右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸。每三十丸。溫水下。食遠。

聖餅子
　黃丹二錢　定粉三錢
　輕粉少許
右爲細末。入白麵四錢。滴水和爲指尖大。捻作餅子。陰乾。食前。漿水磨化服之。大便黑色爲妙。

蘇感丸
以蘇合香丸與感應丸二藥和勻。如菉米大。每五丸。滾薑湯空心下。

宣明玄青餅
　黃連　黃柏
　芫花醋拌炒　大戟各半兩。
　青黛一兩。
右爲末。水丸小豆大。初服十丸。每服加十丸。日三。以快利爲度。

保命集四物湯
　本方內加槐花、黃連、御米殼等分。

蜜附湯
理中湯　並見中寒類。
五苓散　見中暑類。
漿水散
　半夏一兩湯洗　附子半兩。炮。

四苓散加木通、黃芩、伐火利小水。　腹積宜豁之。用海粉、青黛、黃芩、神麴、糊丸服之。　在上者用吐提。在下陷者宜升提之。用升麻、防風、　氣虛用人參、白朮、炒芍藥、升麻、　食積二陳湯和滓瀉、蒼朮、白朮、山查、神麴、川芎、或香保和丸。　瀉水多者仍用五苓散。久病大腸氣泄用熟地黃半兩炒白芍、知母各三錢、升麻、乾薑各二錢、炙甘草一錢爲末粥丸服之仍用艾炷如麥粒於百會穴灸三壯。　脾瀉當補脾氣健運復常用炒白朮四兩炒神麴三兩炒芍藥三兩半冬月及寒初用肉蔻代之或散或湯作餅子尤佳。食積作瀉宜再下之神麴、大黃作丸子服。　脾泄已久大腸不禁此脾已脫宜急澀之以赤石脂、肉豆蔻、乾薑之類。

戴云凡瀉水腹不痛者是濕。飲食入胃不住或完穀不化者是氣虛。腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣是火。或瀉時或不瀉或多或少是痰。腹痛甚而瀉瀉後痛減者是食積。

【入方】

一老人舉養太過飲食傷脾。常常泄瀉。亦是脾泄。

黃芩炒半兩　　白朮炒二兩

神麴炒　　山查炒各一兩半

右爲末。荷葉包飯燒熟研丸如梧子大。食前白湯下。

一老人年七十面白。脈弦數。獨胃脈沉滑。因飲白酒作痢。下血。淡膿水。腹痛。小便不利。裏急後重。參、朮爲君。甘草、滑石、檳榔、木香、蒼朮爲佐。下保和丸二十五丸。第二日前證俱減。獨小便不利。以益元散與之。安。

治痛泄

炒白朮三兩　　炒芍藥二兩

久瀉加升麻六錢。

右剉。分八貼。水煎或丸服。

止瀉方薑麵丸

隔年陳麥麵作麵二兩。炒。又一兩。

右爲末。或丸。每服五七錢。白湯下。

又方

肉豆蔻五兩　　滑石夏二兩半秋二兩。冬一兩二錢半。

右爲末。飯丸。或水調服。

清六丸　去三焦濕熱。治泄瀉。多與清化丸同用。並不單用。兼治產後腹痛。或自利者。能補脾補血。亦治血痢。

六一散一料　　紅曲炒半兩。活血。又云二兩半。

右爲末。飯丸梧子大。每五七十丸。白湯下。

又方　治泄瀉。或嘔吐。

右以六一散生薑汁入湯調服。

〔附錄〕寒泄。寒氣在腹。攻刺作痛。洞下清水。腹內雷鳴。米飲不化者。理中湯。或香丸。良食者。八味湯。　熱瀉。糞色赤黃。肛門焦痛。糞出穀道猶如湯澆。頻渴。小便不利。宜五苓散。香連丸。　濕瀉。山坐臥濕處。以致濕氣傷脾。土不克水。梅雨久陰。多有此病。宜除濕湯。吞戊己丸。佐以胃苓湯。重者朮附湯。　傷食瀉。因飲食過多。有傷脾氣。遂成泄瀉。其人必噫氣。如敗卵臭。宜治中湯。加砂仁半錢。或吞或應丸尤當。　有脾氣久虛。不受飲食者。食舉即腸鳴腹急。瀉下所食物。綫方寬快。不食即無事。俗名錄食瀉。經年不愈。宜快脾丸三五粒。　因傷於酒。每晨起必瀉者。宜理中湯。加乾葛。或吞酒煮黃連丸。　因傷麵而瀉者。養胃湯加雞爪子。炒研破一錢。痛者。更加木香半錢。瀉甚者。去藿香。加炮薑半錢。　有每日五更初洞瀉。服止瀉藥並無效。米飲下五味丸。或專以五味子煎飲。亦治脾腎瀉。雖省即飲食忌口。但得日間上半夜無事。近五更其瀉復作。此病在腎。俗呼爲脾腎瀉。分水飲下二神丸。及椒朴丸。或平胃散。下小茴香丸。病久而重。其人虛甚。宜椒附湯。吞五苓散。加車前子末少許甚效。　世俗類用澀藥治痢。與瀉。若積久而虛者。或可行之。初得之者。必變他疾。爲禍不小。殊不知多因於濕。惟分利小水。最爲上策。

【附方】

四苓散即五苓散內去桂。

五苓散　益元散　並見中暑類。

理中湯　見中寒類。

大已寒丸

芒硝　　肉桂各四兩　　乾薑炮

右爲末。水煮麵糊丸梧子大。每三十丸。空心米飲吞下。

八味湯

吳茱萸湯洗七次　乾薑炮各二兩　陳皮

肉桂　　丁香　　人參

右剉。每四錢。水一盞。煎七分。溫服。

香連丸

黃連去鬚。十兩。用吳茱萸五兩同炒。焦色。去茱萸不用。

右爲末。醋糊丸梧子大。每二十丸。空心米飲下。

升陽除濕湯

高良薑各六兩。

木香

當歸洗焙。各一兩。

木香二兩四錢不見火。

升麻　柴胡　防風
澤瀉　猪苓各半兩
甘草炙　大麥蘗麵各三錢
右作一服。水煎。飯後熱服。○胃塞腸鳴。加益智仁、半夏各半錢。鹽薑煎。非腸鳴不用。

戊己丸　治胃經受熱。泄痢不止。
黃連　吳茱萸去梗炒　白芍各五兩
右爲末。麵糊丸。梧子大。每三十丸。米飲下。

胃苓湯　夏秋之間。脾胃傷冷。水穀不分。泄瀉不止。
五苓散　平胃散
右合和。薑棗煎。空心服。

尤附湯　和劑。
甘草二兩炙　白朮四兩　附子炮一兩半
右剉。每服三錢。薑五片。棗一枚。煎。空心服。

治中湯　見脾胃類。

咸應丸　出資生。
木香　肉豆蔻　丁香各一兩半　乾薑炮一兩
巴豆七十箇去皮心膜研出油　杏仁百四箇湯浸去皮尖研
右前四味爲末。外入百草霜二兩研。與巴豆、杏仁七味同和勻。用好蠟六兩。溶化成汁。以重絹濾去渣。更以好酒一升。於銀石器內煮蠟數沸。傾出。待酒冷。其蠟自浮於上。取蠟稱用。春夏修合。用清油一兩。銚內煎令沸。次下酒煮蠟四兩。同化成汁。就銚內乘熱拌和前項藥末。秋六修合。用清油一兩半。同煎煮熟。成汁和勻。藥末成劑。分作小錠子。油紙裹旋丸。服之。每三十丸。空心薑湯下。

保和丸　見積聚類。

酒蒸黃連丸
黃連半斤。淨酒二升。浸以瓦器。置甑上蒸至爛。取出晒乾。
右爲末。滴水丸。每五十丸。食前溫水下。

發胃湯　見瘧類。

五味子散　治腎泄。
五味子二兩　吳茱萸半兩。細□綠色者。
右二味炒香熟爲度。細末。每服二錢。陳米飲下。有一親證。每五更初曉時。必瀉泄一次。此名腎瀉。服此愈。

椒附丸　治氣。
椒紅炒　桑螵蛸炙　龍骨
附子炮　鹿茸酒蒸炒
右爲末。酒糊丸。每六十丸。空心。

二神丸
破故紙炒四兩　肉豆蔻二兩生
右爲末。以大肥棗四十九箇。生薑四兩。切同煮。棗爛去薑。取棗肉。研膏入藥。和丸。每五十丸。鹽湯下。
燥結十一
○燥結血少。不能潤澤。理宜養陰。

【入方】　治大腸虛秘而熱。
白芍一兩半　陳皮　生牛
條芩　甘草二錢
右爲末。粥丸。白湯下七八十丸。

〔附錄〕凡人五味之秀者。養臟腑。諸陽之濁者。歸大腸。大腸所以司出而不納也。今停蓄蘊結。獨不得疎導何哉。抑有由矣。邪入裏。則胃有燥糞。三焦伏熱。則津液中乾。此大腸枯。老人臟寒而氣道澁。此大腸之挾冷然也。亦有腸胃受風。涸燥秘澁。此證以風氣蓄而得之。若夫氣不下降而穀道難。噫。逆泛漏。必有其證矣。
東垣諸論。原附於此。今節不錄。觀者宜於東垣書中求之。

【附方】　理宜節去。姑存以便閱者。
導滯通幽湯　治大便難。幽門不通。上衝。吸門不開。噎塞不便。燥祕。氣不得下。治在幽門。以辛潤之。
歸身　升麻　桃仁泥各一錢　生牛
熟牛各半錢　甘草炙　紅花各三分
右作一服。水煎。食前調檳榔末半錢。或加麻仁泥一錢。○加大黃。名當歸潤燥湯。

潤燥湯
升麻　生牛各二錢　歸梢
大黃煨　熟牛　桃仁泥
紅花半錢
右除桃仁、麻仁另研。作一服。水煎。次下桃仁、麻仁煎。空心熱服。

活血潤燥丸　治大便風秘血秘。常常燥結。
歸梢一錢　防風三錢　大黃酒蒸煨
生甘草　光活各一兩
麻仁各一錢

桃仁二兩研如泥　麻仁二兩五錢研　皂角仁燒存性一兩五錢研　真杵得滷潮發濕搗則燥

右除二仁另研外，餘爲末後和勻，蜜丸，梧子大。空心服五十丸，白湯送下。三兩服後，以蘇子半升子淘，每日早晚食之，大便不致結燥，以磁器盛之，紙封無令見風。

半硫丸　治治秘，風秘結，老人秘。

透明硫黃研　半夏洗七次等分

右爲末，生薑糊丸，梧子大，服二十丸，薑湯下，或用一葱白一條，薑三片，煎，入阿膠二片，溶開，食前空心送下。

麻仁丸　治大便秘，風秘，脾約。

郁李仁　麻子仁各六兩，另研　大黃二兩半，以一半炒

山藥　防風　杏仁　木香各五錢半

右爲末，蜜丸，梧子大，服七十丸，白湯下。

脾約丸

麻仁一兩一錢半研　根實　厚朴　枳殼炒七錢半　檳榔五錢

大黃四兩蒸　杏仁去皮尖炒一兩二錢研

右爲末，煉蜜丸，梧子大，服三五十丸，溫水下。

○凡諸秘，服藥不通，或兼他證，又或老弱虛極不可用藥者，用蜜煎導入皂角末少許作□以導之，治秘生薑□亦佳。

霍亂十二　　可藥各二兩

○內有所積，外有所感，致成吐瀉，仍用二陳湯加減作吐，以提其氣，此非鬼神，皆屬飲食，前人確論，乃陽不升，陰不降，垂隔而成，切莫與穀食，雖米飲一呷，入口即死，必待吐瀉過二三時，直至饑甚，方可與稀粥食之，脈多伏欲絕，見成吐瀉不徹，還用吐提，其氣起不透，或用樟木煎湯吐之亦可，大法生薑理中湯最好，不渴者可用，如渴者用五花散，有吐者以二陳湯探吐，亦有可下者，轉筋不住，男子以手挽其陰，女子以手蜜乳近兩邊，此千金妙法也，轉筋皆屬乎血熱，四物湯加酒芩、紅花、苦丁、南星煎服，乾霍亂者，最難治，死在須臾，升降不通，當以吐提其氣，極是良法，世多用鹽湯，此係內有物所傷，外有邪氣所遏，有用吐者，則兼發散之義，有用溫藥解散者，不可用涼藥，宜二陳湯加解散藥。

二陳湯加　川芎　蒼朮　厚朴　陳皮

右剉，薑五片，煎服。

治霍亂方　　白芷又云白朮

砂仁　半夏　香仁

甘草炙各一兩　赤茯苓　藿香

木瓜各二兩

右剉，每服五錢，水二鍾，生薑三片，棗一箇，煎，溫服，一本有香薷、厚朴、各四兩。

二陳湯　見中風。

五苓散　見中暑。

理中湯　見中寒。

藿香正氣散　見中風。

通脈四逆湯　治霍亂多寒，身冷，脈絕。

吳茱萸二兩炒　附子炮一兩　桂心

細辛　白芍　甘草炙各半兩

右剉，每四錢，水酒各半，加生薑煎。

木瓜湯　治霍亂吐下，舉體轉筋，入腹則悶絕。

乾木瓜一兩　吳茱萸半兩　茴香

右咀，每服四大錢，薑三片，蘇十葉，煎。

葛根各一錢半　甘草炙

○服浮當吐。久得服濫辛難開也。必發調理。大凡治痰用利藥過多。致脾氣虛。則痰易生而多。濕痰用蒼朮、白朮。熱痰用青黛、黃連、芩。食積痰用神麯、麥芽、山查。風痰用南星。老痰用海石、半夏。瓜蔞、香附、五倍子、丸服。痰在腦上。必用吐法。瀉亦不能去。風痰多見奇證。濕痰多見倦怠軟弱。氣實痰熱結在上者。吐難得出。痰清者屬寒。二陳湯之類。膠固稠濁者。必用吐。熱痰挾風。外證多。熱者宜之。食積者。必用攻之。兼氣虛者。用補氣藥送。痰因火盛逆上者。以致火爲先。白朮、貢芩、軟石膏之類。內傷挾痰。必用參、芪、白朮之屬多用薑汁傳送。或加半夏。虛甚加竹瀝。中氣不足。加參、朮。痰之爲物。隨氣升降。無處不到。脾虛者。宜清中氣以運痰。降下二陳湯加白朮之類。兼用升麻提起。中焦有痰。則食積胃氣亦賴所養。卒不便虛。若攻之盡。則虛矣。痰成塊。或吐咯不出。兼氣鬱者。難治。氣濕痰熱者難治。痰在腸胃間者。可下而愈。在經絡中。非吐不可。吐法中。就有發散之義焉。假如瘧病困盛而得瘧。則神出舍。舍空則痰生也。血氣入在舍而拒其神。不能歸焉。血傷必用薑汁傳送。查。熱加青黛。

中和丸　治濕痰氣熱。

蒼朮	黃芩　半夏

右爲末。粥丸梧子大。每服五七十丸。薑湯下。

又方　治痰嗽。

黃芩酒洗一兩半	貝母　南星各一兩
白芥子去殼各半兩	風化硝二錢半。取其輕浮速降。

右爲末。湯泡蒸餅丸服。

導痰湯

法製硝同柔麵水煮化。去麵絲。濾令結入風月半。胆內風化。秤五錢。或只風化硝亦可。又云一兩。礞石二兩。煅碎。硝硝二兩。同入小砂鍋內。瓦片蓋之。鐵線縛定。鹽泥固濟。曬乾。火煅紅。候冷取出。

右爲末。神麯糊丸梧子大。每服三五十丸。白湯下。○一方加蒼朮半兩。滑石一兩。看病冷熱虛實作湯使。

一本礞石南星各一兩。無枳實。

又方

半夏二兩	白朮一兩　茯苓七錢半。
礞石一兩	風化硝二錢。

右爲末。同前。

潤下丸　降痰甚妙。

南星一兩	半夏二兩。各依橘紅製。

黃芩	香附　半夏薑制。

已上治濕痰。加瓜蔞仁、青黛、作丸子。治熱痰。

又方　燥濕痰。亦治白濁因痰者。

南星	半夏各一兩　蛤粉二兩。

右爲末。神麯糊丸如梧子大。青黛爲衣。每服五十丸。薑湯下。○濕痰加蒼朮。食積痰加神麯、麥芽、山查。熱加青黛。

貝母	香附等分。
滑石	

黃連各一兩　　橘紅半斤，以水化鹽五錢，拌令得所，焙乾爲末。
甘草炙一兩
右爲末，蒸餅或神曲糊丸如菉豆大，每服五七十丸，白湯下。○一方單用陳皮半斤，鹽半兩，水拌煮陳皮，候乾焙燥爲末，入甘草末一兩，炊餅同上丸，亦好。去胸膈有痰，兼嗽，上熬加香貨，有濕加蒼朮，或加蒼莫。

又方　治食積痰火，并瀉胃火。
枯石骨，不拘多少，研細。
右川醋糊丸如菉豆大，每服二十丸，白湯下。

又方　治陰虛內多食積痰。
川芎七錢　　黃連　　瓜蔞仁
神麴　　麥芽各一兩　　青黛半兩
人中白三錢
右爲末，薑汁蒸餅丸服。

久吐痰喘
杏仁去皮尖生用
右等分爲末，粥丸麻子大，每服十五丸，白湯下。

黃連化痰丸
半夏一兩半　　黃連一兩　　吳茱萸湯洗，一兩半。
右爲末，麵糊丸菉豆大，每服一百丸，薑湯送下。

白玉丸
巴豆三十個，去油　　南星　　半夏
輕粉各三錢
右爲末，皂角仁浸澄汁丸，梧子大，每服五七丸，薑湯下。

黃瓜蔞丸　治食積痰壅滯喘急
瓜蔞仁　　半夏　　山查
右爲末，瓜蔞水丸，薑湯竹瀝送下，二三十丸。

又方
瓜蔞仁　　半夏一兩　　蒼朮二兩
黃芩　　黃連半兩

瓜蔞仁　　訶子
貝母　　五倍子
右爲末，糊糊梧子大，每服五十丸，白湯下。

導痰丸
吳茱萸三錢，制　　茯苓一兩
蒼朮甘遂一兩
右爲末，糊丸梧子大，每服八九十丸，薑湯下。
茯苓丸出千金方，百一選方同。

風化硝半兩

白朮

來復丹炒

滑石

神麴炒，各等分

香附二兩半

抑痰丸

瓜蔞仁一兩　半夏二錢
右爲末蒸餅丸如麻子大服一百丸薑湯下

清腸化痰丸

黃連　黃芩一兩
香附一兩半　蒼朮二兩
右爲末蒸餅丸白湯下

投鼠化痰丸

人參　槐角子
陳皮去白　天麻
辰砂半兩另研
右爲末薑汁浸蒸餅爲丸辰砂爲衣服四十丸薑湯下

墜痰丸　治痰飲

黑豆風乾末二兩　枳實炒一兩半
枳殼一兩半炒　猪牙皂角二錢酒炒
右爲末用蘿蔔汁丸每服五十丸雞鳴時服初則有糞次則有痰

治濕痰

蒼朮三錢　白朮六錢
香附一錢半
右爲末蒸餅丸服

治肥人濕痰

蒼朮　半夏各錢半
白朮二錢半　陳皮一錢
右咀作一服薑三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬二兩　防風二兩
僵蠶各一兩　蜈蚣二條用赤脚黃牌各一條
右爲末蒸餅丸梧子大每服三十丸食前茶湯下春以芭蕉湯探吐痰

上焦風痰

瓜蔞　黃連
薑汁浸炊餅丸

痰氣方

貝母三錢
瓜蔞仁一兩半　半夏二錢
右爲末蒸餅丸如麻子大服一百丸薑湯下

清腸化痰丸

黃連　黃芩一兩
香附一兩半　蒼朮二兩
右爲末蒸餅丸白湯下

投鼠化痰丸

人參　槐角子
陳皮去白　天麻
辰砂半兩另研
右爲末薑汁浸蒸餅爲丸辰砂爲衣服四十丸薑湯下

墜痰丸　治痰飲

黑豆風乾末二兩　枳實炒一兩半
枳殼一兩半炒　猪牙皂角二錢酒炒
右爲末用蘿蔔汁丸每服五十丸雞鳴時服初則有糞次則有痰

治濕痰

蒼朮三錢　白朮六錢
香附一錢半
右爲末蒸餅丸服

治肥人濕痰

蒼朮　半夏各錢半
白朮二錢半　陳皮一錢
右咀作一服薑三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬二兩　防風二兩
僵蠶各一兩　蜈蚣二條用赤脚黃牌各一條
右爲末蒸餅丸梧子大每服三十丸食前茶湯下春以芭蕉湯探吐痰

上焦風痰

瓜蔞　黃連
薑汁浸炊餅丸

痰氣方

貝母炒　半夏半兩
片芩炒　白朮
茯苓　陳皮三錢
右爲末蒸餅泡薑汁丸服

利腦化痰丸

南星　蛤粉研細一兩　半夏
貝母去心拍胸膈痰氣最妙　香附半兩童便浸
右爲末用猪牙皂角十四挺酸碎水一碗半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥汁和再入薑汁泡蒸餅丸如綠豆大青黛爲衣每服五十丸薑湯下

清痰丸　專清中管熱痰積

烏梅　枯礬　黃芩
陳皮　滑石炒　青皮
南星　半夏　神麯炒
乾生薑　香附各一兩
右爲末湯浸蒸餅丸服

〔附錄〕凡痰之爲患爲喘爲欬爲吸爲利爲眩爲僵心嘈雜怔忡發狂爲寒熱痞腫爲痞隔爲壅塞或胸脇間幽幽有聲或背心一片常爲冰冷或四肢麻痹不仁皆痰飲所致醫治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣又嚴氏云人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰飲之患古方治痰飲用汗吐下溫之法愚見不若以順氣爲先分導次之又王隱君論云痰清白者爲寒黃而濁者爲熱殊不知始則清白久則黃濁清白稀□漬於上黃濁稠粘凝於下嗽而易出者清而白也欬而不能出則黃濁結滯也若咯唾日久濕熱所鬱上下凝結皆無清白者也甚至帶血血敗則黑痰爲關格異病人所不識又清白者氣味淡日久者漸成惡味酸辣腥臊焦苦不一百病中多有兼痰者世所不知也凡人身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也治痰法暫脾土燥脾濕是治其本也

【附方】

二陳湯　見中風　瓜蔞散　見疸
三補丸　見虛損　參萸丸　見秘方
青金丸　蒼莎丸　並見嗽喘

充按丹溪治病以痰爲重諸病多因痰而生故前諸方間有別出者亦其平日常用故不另開於附錄觀者詳焉

哮喘十四

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可

吐者。一法用二陳湯加香豉、黃芩作湯下小胃丹。習虛實用。

【入方】治寒包熱加喘。

半夏　枳殼炒
紫蘇　麻黃
右水煎服。〇天寒加桂枝。

治哮治積方

用雞子一箇。略破。殼損膜不損。浸尿缸內三四日。夜取出。煮熟喫之。效。蓋雞子能去風痰。

紫金丹　治哮。須三年後可用。

用精猪肉二十兩。一作三十兩。切作骰子塊。用信一兩。明者研極細末。拌在肉上。令勻。分作六分。用紙筋黃泥包之。用火烘令泥乾。却用白炭火。於無人處煅。青烟出盡。爲度。取放地上一宿。出火毒。研細。以湯浸。蒸餅丸如菉豆大。食前茶湯下。大人二十丸。小人七八丸。量大小虛實與之。

喘十五

〇喘病。氣虛。陰虛。有痰。凡久喘之證。未發宜扶正氣爲主。已發用攻邪爲主。氣虛短氣而喘。甚不可用苦寒之藥。火氣盛故也。宜導痰湯加千緡湯。有痰亦短氣而喘。陰虛白小腹下火起衝於上喘者。宜降心火補陰。有火炎者。宜降心火清肺金。有痰者。用降痰下氣爲主。上氣喘而躁者爲肺脹。欲作風水證。宜發汗則愈。有喘急風痰上逆者。大金方千緡湯。佳。或導痰湯加千緡湯。有陰虛挾痰喘者。四物湯加枳殼半夏。補陰降火。諸喘不止者。用劫藥一二服。則止劫之後。因痰治痰。因火治火。劫藥以椒目研極細末一二錢。生薑湯調下。止之。氣虛不用。又法。羅蔔子蒸熟爲君。皂角燒灰等分爲末。生薑汁煉蜜丸。如小豆子大。服五七十丸。喘化止之。氣虛者。用人參蜜炙。黃柏、麥門冬、地骨之類。氣實人肉服。黃芪過多而喘者。用三拗湯以瀉氣。

味子補之。若新病氣實而發喘者。宜桑白皮、苦葶藶瀉之。

戴云。有痰喘。有氣急喘。有胃虛喘。有火炎上喘。痰喘者。凡喘便有痰聲。氣急喘者。呼吸急促而無痰聲。有胃氣虛喘者。攩肩擡項。喘而不休。火炎上喘者。乍逆乍退。得食則減。食已則喘。大概胃中有實火。腸上有稠痰。得食入咽。壓下稠痰。喘即止。稍久。食已入胃。反助其火。痰再升上。喘反大作。俗不知此。作胃虛治。以燥熱之藥者。以火濟火也。葉都督患此。諸醫作胃虛治之。不愈。後以導水丸利五六次而安。

【入方】

痰喘方

南星　半夏
香附　陳皮去白
右爲末。神麯糊丸。每服六七十丸。薑湯下。

南星一兩。

杏仁　瓜蔞子
皂角炙　萊菔子

又方

萊菔子酒半兩。　皂角半兩。　海粉一兩。
白礬一錢半。盆汁浸晒乾。
右用瓜蔞仁薑蜜丸。噙化。

劫喘藥

好銅青研細。　靛丹少許。炒轉色。
右爲末。每服半錢。醋調。空心服。

〔附錄〕肺以清陽上升之氣。居五臟之上。通榮衛。合陰陽。升降往來。無過不及。六淫七情之所感傷。飲食動作。臟氣不和。呼吸之息。不得宣暢。而爲喘急。亦有脾腎俱虛。體弱之人。皆能發喘。又或調攝失宜。爲風寒暑濕邪氣相干。則肺氣脹滿。發而爲喘。又因痰氣宿。能令人發喘。治療之法。當究其源。如感邪氣。則驅散之。氣鬱即調順之。脾腎虛者。溫理之。又當於各類而求。凡此證。脈滑而手足溫者生。脈澁而四肢逆者死。風傷寒者。必上氣急。不得臥。喉中有聲。或聲不出。以三拗湯、華蓋散、九寶湯、神秘湯、皆可選用。若痰喘。以四磨湯。或蘇子降氣湯。若虛喘。脈微。色青黑。四肢厥。小便多。以活人參五味子湯。或四磨湯。治嗽與喘。用五味子爲多。但五味有南北。若生津止渴。潤肺益腎。治勞嗽。宜用北五味。若風邪在肺。宜用南五味。

【附方】

分氣紫蘇飲　治脾胃不和。氣逆喘促。

五味　桑白皮　茯苓
草果　腹皮　陳皮
紫蘇減半。

右每服五錢。水二鐘。薑三片。入鹽少許。煎。空心服。

神秘湯　治上氣喘急。不得臥。

陳皮　桔梗　紫蘇
人參等分。

每服四錢。用水煎。食後服。

四磨湯　治七情鬱結。上氣喘急。

人參　檳榔　沉香
右四味。各濃磨。水取七分。盞煎三五沸。溫服。

三拗湯　治感冒風邪。鼻塞聲重。語音不出。咳嗽喘急。

生甘草　麻黃不去節。　杏仁不去皮尖。等分。

甘草炙
桔梗各等分。

五味

白鳥

右服五錢。水一鍾半。薑五片。煎服。

小青龍湯　治水氣。發喘尤捷。

麻黃　芍藥
細辛　乾薑炮各三兩。
右咀。每三錢。煎七分。食後服。

導痰湯　一千緡湯　並見痰類。

華蓋散　治感寒而嗽。胸滿壅重。

蘇子　陳皮
麻黃各一兩。　甘草五錢。　或加杏仁。
右爲末。每服二錢。水煎。食後服。

丸智湯　治欬而身熱發喘。惡寒。

麻黃　薄荷
紫蘇　杏仁
腹皮各等分。
右咀。薑蔥煎服。

蘇子降氣湯　見氣類。

活人書五味子湯

五味半兩。　人參
陳皮　生薑各二錢半。
右咀。水煎。

導水丸　見痛類。

嗽嗽十六　附肺痿肺癰

○咳嗽有風寒。痰飲。火。勞嗽。肺脹。春作是春升之氣。用清涼藥。二陳加薄荷之類。夏是火氣炎上。最重用苓連。秋是濕熱傷肺。冬是風寒外來。以藥發散之後。用半夏逐痰。必不再來。風寒行痰。閉膈痞悶。用二陳湯。加麻黃桔梗杏仁。逐痰飲。降痰。隨證加藥。火主清金。化痰降火。勞嗽。宜四物湯加竹瀝薑汁補陰爲主。乾咳嗽難治。此係火證。乃痰證其火邪在中。用苦梗開之。下川補陰降火之劑。四物加炒柏竹瀝之類。不已則成勞。此不得志者有之。倒倉法好。　肺虛嗽甚。此好色腎虛者有之。用參苓。以陳皮生薑佐之。大概有痰加痰藥。上半月多嗽者。此屬胃中有火。用貝母、石膏、降胃火。午後嗽多者。屬陰虛。必用四物湯加炒柏、知母、降火。　黃昏嗽者。是火氣浮於肺。不宜用涼藥。宜五味子、五倍子、斂而降之。　五更嗽多者。此胃中有食積。至此時。火氣流入肺。以知母、地骨皮、降肺火。　肺脹而嗽。或左或右。不得眠。此痰挾瘀血。礙氣而病。宜養血以流動乎氣。降火疎肝以清痰。四物湯加桃仁、訶子、青皮、竹瀝、薑汁之類。　嗽而脇下痛。宜疎肝氣。以青皮挾痰藥。實者白芥子之類。在後。以二陳湯加南星、香附、青黛、青皮、薑汁。　血礙氣作嗽者。桃仁去皮尖、大黃酒炒、薑汁丸服。　治嗽多用生薑。以其辛散故也。　痰因火動逆上作嗽者。先治火。次治痰。以知母止嗽清肺滋陰降火。夜嗽用降陰分藥。不必疑。但要先去病根。此乃收後藥也。治痢亦同。　勞嗽即火鬱嗽。用訶子。能治肺氣。因火傷極。遂成鬱證。服藥不得眠。一邊取其味酸苦。有收斂降火之功。佐以海石、童便、炙香附、瓜蔞、青黛、杏仁、半夏類之類。薑蜜調。嚥化。必以補陰爲主。　治嗽灸天突穴。肺腧穴。大瀉肺氣。肺腧穴在三推骨下兩椀各一寸五分。

○師云。陰分嗽者。多屬陰虛治之。　有嗽而肺服藥過不得眠者。難治。　肺痿。專主養肺氣。養血清金。嗽而肺氣有餘者。宜瀉之。桑白皮爲主。半夏、茯苓佐之。瀉其有餘。補其不足。肺燥者。潤之。屬熱者。桔梗、大力、知母、雖涼。　聲啞者。屬寒。宜細辛、半夏、生薑。辛以散之。肺虛者。人參、阿膠爲主。陰不足者。六味地黃丸爲要藥。或知母、茯苓湯爲妙。陰虛氣嗽。四物湯加陳皮、甘草些小。以降其氣。補其陰。白芍藥須用酒浸晒乾。　濕痰帶風嗽者。不可一味苦寒折之。如千緡湯、壓痰丸更以皂角、萊菔子、杏仁、白藥、煎瀆汁丸嚥化。　濕痰帶風。以千緡湯。壓痰丸。固捷。　痰積嗽。非青黛、瓜蔞不除。有食積人。面青白黃色不常。面上有如煙爪路一黃一白者是。　欬逆嗽。非蛤粉、青黛、瓜蔞、貝母不除。　口燥咽乾有痰者。不用半夏、南星。用瓜蔞、貝母。飲水者。不用瓜蔞。恐泥膈不爽快。　知母止嗽清肺。滋陰降火。　杏仁。瀉肺氣。氣虛久嗽者。一二服劫止。　治酒嗽。青黛、瓜蔞、蜜丸。嚥救肺。　食積痰作嗽。發熱者。半夏、南星爲君。瓜蔞、萊菔子爲臣。青黛、石膏爲使。

戴云。風寒者。鼻塞聲重。惡寒者是也。火者。有聲、痰少、面赤者是也。勞者。動則喘滿。氣急息重。痰者。嗽動便有痰聲。痰出嗽止。五者大概耳。亦當明其是否也。

【入方】　治痰嗽。

杏仁去皮尖　　蘿蔔子各半兩
右爲末。粥丸服。

清化丸　治肺鬱痰喘嗽。睡不安寧。

貝母　杏仁　青黛
右爲末。沙糖入薑汁泡。蒸餅丸如彈大。噙化。

治久嗽風入肺。

鵝管石　雄黃　礬金
右爲末。和艾中。以生薑一片安舌上。灸之。以烟入喉中爲度。

○飲酒傷肺。痰嗽。以竹瀝煎紫蘇入蜜汁。就吞瓜蔞杏連丸。

而嗽。痰因火動逆上作嗽者。先治火。次治痰。以知母止嗽清肺滋陰降火。夜嗽用降陰分藥。不必疑。但要先去病根。此乃收後藥也。治痢亦同。　勞嗽即火鬱嗽。用訶子。能治肺氣。因火傷極。遂成鬱證。服藥不得眠。一邊取其味酸苦。有收斂降火之功。佐以海石、童便、炙香附、瓜蔞、青黛、杏仁、半夏類之類。薑蜜調。嚥化。必以補陰爲主。　治嗽灸天突穴。肺腧穴。大瀉肺氣。肺腧穴在三推骨下兩椀各一寸五分。

○師云。陰分嗽者。多屬陰虛治之。　有嗽而肺服藥過不得眠者。難治。　肺痿。專主養肺氣。養血清金。嗽而肺氣有餘者。宜瀉之。桑白皮爲主。半夏、茯苓佐之。瀉其有餘。補其不足。肺燥者。潤之。屬熱者。桔梗、大力、知母、雖涼。　聲啞者。屬寒。宜細辛、半夏、生薑。辛以散之。肺虛者。人參、阿膠爲主。陰不足者。六味地黃丸爲要藥。或知母、茯苓湯爲妙。陰虛氣嗽。四物湯加陳皮、甘草些小。以降其氣。補其陰。白芍藥須用酒浸晒乾。　濕痰帶風嗽者。不可一味苦寒折之。如千緡湯、壓痰丸更以皂角、萊菔子、杏仁、白藥、煎瀆汁丸嚥化。　濕痰帶風。以千緡湯。壓痰丸。固捷。　痰積嗽。非青黛、瓜蔞不除。有食積人。面青白黃色不常。面上有如煙爪路一黃一白者是。　欬逆嗽。非蛤粉、青黛、瓜蔞、貝母不除。　口燥咽乾有痰者。不用半夏、南星。用瓜蔞、貝母。飲水者。不用瓜蔞。恐泥膈不爽快。　知母止嗽清肺。滋陰降火。　杏仁。瀉肺氣。氣虛久嗽者。一二服劫止。　治酒嗽。青黛、瓜蔞、蜜丸。嚥救肺。　食積痰作嗽。發熱者。半夏、南星爲君。瓜蔞、萊菔子爲臣。青黛、石膏爲使。

戴云。風寒者。鼻塞聲重。惡寒者是也。火者。有聲、痰少、面赤者是也。勞者。動則喘滿。氣急息重。痰者。嗽動便有痰聲。痰出嗽止。五者大概耳。亦當明其是否也。

治款嗽劫藥。

五味子五錢　甘草二錢半

右爲末。蜜丸。噙化。又云乾嚥。

治款嗽聲啞者此血虛火多。

青黛　蛤粉

右爲末。蜜調。噙化。

治嗽喘。去濕痰。

白芥　半夏

香附各一兩

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

右爲末。鋪芝上。捲起。燒烟吸入口內。細茶湯送下。定嗽殺藥。

訶子　百藥煎　荊芥穗

右爲末。蜜丸。噙化。又云乾嚥。

治款嗽聲啞者此血虛火多。

青黛　蛤粉

右爲末。蜜調。噙化。

治嗽喘。去濕痰。

白芥　半夏

香附各一兩　杏仁去皮尖炒。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

五倍子　風化硝各四錢。

右爲末。鋪芝上。捲起。燒烟吸入口內。細茶湯送下。定嗽殺藥。

訶子　百藥煎　荊芥穗

右爲末。蜜丸。噙化。又云乾嚥。

治款嗽聲啞者此血虛火多。

青黛　蛤粉

右爲末。蜜調。噙化。

治嗽喘。去濕痰。

白芥　半夏

香附各一兩　杏仁去皮尖炒。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞子

皂角炭　防風各三錢。

右爲末。神麯糊丸服。

治勞嗽吐紅。

人參　白芥

紅花　細辛

阿膠　黃芪

甘草　白芍

右剉。水煎。〇若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、

又方　治嗽血。

紅花　杏仁去皮尖

鹿茸炙　木通

右爲末。煉蜜丸。噙化。

嗽烟筒　治痰嗽久遠者。

佛耳草　款花二錢。

茯苓　百合

五味　官桂

半夏　杏仁

天門冬

右爲末。蜜丸。彈子大。含化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁

右爲末。蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。

黃連　瓜蔞

右水煎生薑三片。
六味地黃丸　見諸虛。
千緡湯　墜痰丸　見痰類。
○肺痿治法在乎養血、養肺、養氣、清金。曾治一婦人二十餘歲，胸膈間一竅，口中所咳膿血，與竅相應而出，以人參、黃芪、當歸、補氣血之劑，加退熱排膿等藥而愈。
〔附錄〕金匱方論曰：熱在上焦者，因欬而肺痿，得之或從汗出，或從嘔吐，或消渴小便利數，或從便難，又被快藥下利，重亡津液，故寸口脈數，其人欬，口中有濁唾涎沫者，爲肺痿之病，其人脈數虛者是。

【附方】

海藏紫菀散　治欬中有血，虛勞肺痿。

人參一錢	紫菀半錢	如母一錢半	貝母錢半
桔梗一錢	甘草半錢	五味十五箇	茯苓一錢
阿膠炒半錢			

右㕮咀，水煎。

知母茯苓湯　治欬嗽不已，往來寒熱，自汗肺痿。

甘草	茯苓各一兩		
人參	薄荷	半夏	柴胡
白朮	款花	桔梗	麥門冬
黃芩各半兩	川芎二錢	阿膠三錢	

右水煎生薑三片。
○肺癰已破入風者不治。○用醫壘元戎搜風湯吐之，或用太乙膏成丸，食後服，收斂瘡口，止有合歡樹皮白斂煎飲之合欬，卽槐樹皮也，又名夜合。
〔附錄〕肺癰爲何，口中辟辟燥，欬卽胸中隱隱痛，脈反滑數，或數實者，此爲肺癰也。

【附方】

葶藶心散煎，萬不一失。

人參	白茯苓	遠志二兩	
甘草	白扁豆炒	薏苡炒	
乾葛炒	黃芪各一兩炒	當歸各半兩	
半夏麴	百合	乾薑炮	
五味	木香	丁香	
白芷	神麴炒各一錢		

右剉，每服五錢，生薑三片，棗同煎，空心溫服。

藥令建中湯　治臟腑虛損，身體消瘦，潮熱自汗，將成勞瘵，此藥退虛熱，生血氣。

前胡一兩	細辛	黃芪	
橘皮	麥門冬	桂心	
白芍	茯苓	甘草炙一兩	

右剉，每服四錢，薑三片，棗一枚，水煎服。

細辛　款花　經霜桑葉
天門冬去心　半夏　五味各一兩
右每服四錢，水煎，生薑五片。
○氣嗽加木香、唾血而熱加生地黃。唾血而寒加鍾乳粉。疲極咳嗽，加黃芪，損肺款血，加沒藥。
臍節，嘔逆腹滿不食，加白朮。款而小便多者，加益智。款而面浮氣逆，加沉香、橘皮。

勞瘵十七

○勞瘵主乎陰虛潮熱，與血病。虛勞漸瘦，屬火，陰火銷鑠，卽是積熱，做成始健，可用子和法，後若羸瘦，四物湯加減送消積丸，不做陽虛。蒸蒸發熱，積病最多，勞病四物湯加炒栢、竹瀝、人尿、薑汁，大補爲上，肉脫熱甚者難治。

【入方】

青蒿一斗，五升，盡便三斗，文武火熬，約盡便減至二斗，去蒿再熬，至一斗，入猪膽汁七枚再熬，數沸，甘草末收之，每用一匙，白湯調服。
〔附錄〕勞瘵之證，非止一端，其始也，未有不因氣體虛弱，勞傷心腎而得之，以心主血，腎主精，精竭血燥，則勞生焉，故傳變不同，骨蒸殗殜，復連尸疰，夫疰者，注也，自上至下，相傳骨肉，乃至滅門者有之，其證以中有虫嚙心肺間，名曰瘵疰，難以醫治。傳屍勞瘵，寒熱交攻，久嗽咯血，日見羸瘦，先以三拗湯

杏仁炒
甘草半兩

與遂心散煎，萬不一失。

【附方】

遂心散　治虛勞或大病後，心虛脾弱，盜汗遺精。

人參	白茯苓	遠肉各二兩	
甘草	白扁豆炒	薏苡炒	
乾葛炒	黃芪各一兩炒	當歸各半兩	
半夏麴	百合	乾薑炮	
五味	木香	丁香	
白芷	神麴炒各一錢		

右剉，每服五錢，生薑三片，棗同煎，空心溫服。

藥令建中湯　治臟腑虛損，身體消瘦，潮熱自汗，將成勞瘵，此藥退虛熱，生血氣。

前胡一兩	細辛	黃芪	
橘皮	麥門冬	桂心	
白芍	茯苓	甘草炙一兩	

右剉，每服四錢，薑三片，棗一枚，水煎服。

人參	紫菀	白朮	
貝母	桑白皮炙	桔梗炒	
枳殼炒	防己一兩	桑皮	
甘草節生	薏苡仁炒	山藥炒	
杏仁炒	百合炙各半兩	杏仁炒	
右㕮咀，每服五錢，生薑五片，水煎，大便秘，加大黃，小便秘，加木通。	黃芪兩半		
圓參飲子　治七情及饑飽失宜，致傷脾肺，欬嗽膿血，漸成勞瘵。			
人參	紫菀	百合	
阿膠蛤粉炒			
右剉，每服四錢，薑三片，棗一枚，水煎服。			

黃芪鱉甲散　治虛勞骨蒸肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗食多渴欬嗽有血。

生苄三兩。　桑白　天門冬五兩。
鱉甲醋煮五兩。　柴苑二兩半。　知母
秦艽三兩三錢。　人參　肉桂
赤芍　地骨皮　柴胡三兩三錢。
黃芪各三兩半。
桔梗二兩六錢半。　白茯苓
甘草二兩半。

右剉。每服三錢。水煎服。

清骨散　治男子婦人五心煩熱。欲成勞瘵。

北柴胡　生苄各二兩。
鱉甲　秦艽各一兩。
薄荷七錢半。

右每服四錢。水煎溫服。

三拗湯　見喘類。

〔附錄〕葛可久先生勞瘵十藥神書內摘書七方。

守根本則萬病不生。四體康健。若曰不養真元。不固根本。疾病由是生焉。且真元根本。則氣血精液也。夫人之生也。稟天地氤氳之氣。在乎保養真元。固保養性命。酒色是貪。日夜耽嗜。無有休息。以致耗散真元。虛敗精液。則咽乾吐痰。以致骨蒸體熱。腎虛精竭。面白頰紅。口乾咽燥。白濁遺精。盜汗飲食艱難。氣力全無。謂之火盛金衰。重則半年而斃。輕則一載而亡。況病者不究其源。不窮其本。或投之以大寒之劑。或療之以大熱之藥。妄爲施治。病不取效。殊不知大寒則愈虛其中。大熱則愈竭其內。所以世之醫勞者。萬無一人焉。先師用藥治勞。如舉之射。無不中的。今開用藥次第于後。用藥之法。如嘔吐咯嗽血者。先以十灰散退住。如甚者。須以花蕊石散止之。大抵血熱則行。血冷則凝。見黑必止。理之必然。止血之後。其人必倦其體。次用獨參湯一補。令其熟睡一覺。不要驚動。睡起病去五六分。後服諸藥。

保和湯止嗽寧肺。　保眞湯補虛除熱。
太平丸潤肺除痰。　消化丸下痰消氣。

保和湯內分血盛、痰盛、喘盛、熱盛、風盛、寒盛、六事加減。
盜汗六事加味用之。餘無加用。服藥之法。每日仍澆下次。晚一丸。緩緩溶化。至上床時。亦如此用之。使則肺竅開。藥必流入竅中。此訣要緊。如痰經即先用飴糖拌消化丸一百丸吞下。次又依前晚嚼太平丸。令其仰面臥而睡。服前七藥後。若肺有嗽。可煮潤肺丸食之。如常七藥之前有餘暇。煮此服之。亦可續煮白鳳膏食之。固其根源。完其根本。病可之後。方

可合十珍丸服之。此爲收功遍身之妙用也。

十灰散　治勞瘵、嗽血、咯血、嘔血、先用此遏之。

大薊　小薊　柏葉
茅根　茜根　大黃
牡丹皮　棕櫚灰

右等分。燒灰存性。研細。用紙包。極蓋地上一夕。出火毒。用時先以白藕搗碎絞汁。或蘿蔔搗絞汁亦可。磨眞京墨半碗。調灰五錢。食後服。病輕用此立止。病重血出升斗者。如神之效。

又方

花蕊石煅過存性。研如粉。

右用童子小便一盞。煎。醋調末三錢。極甚者五錢。食後服。如男子病。則和酒一半。婦人病。則和醋一半。一盞調藥立止。其痰血化爲黃水。服此藥後。其人必疎解。其病體。却用後藥而補。

獨參湯　治勞症後以此補之。

人參一兩去蘆。

右㕮咀。水二鍾。棗五箇。煎。不拘時。細細服之。

保和湯　治勞嗽肺燥咸痰者。服之決效。

知母　貝母　天門冬
款花各三錢。　天花粉　薏苡
五味　粉草炙　兜鈴
百合　桔梗各一錢。　阿膠炒
生苄　紫蘇　薄荷各半錢。

○一方無地黃。有百部。

右以水煎。生薑三片。入飴糖一匙。入藥內服之。每日三服。食後。進加減于後。

○血盛加蒲黃、酒大黃、茅花。
痰盛加南星、半夏、橘紅、茯苓、枳殼、枳實、括蔞實炒。喘盛加桑皮、陳皮、大腹皮、羅蔔子、葶藶、蘇子。
熱盛加山梔子炒黃、連、黃芩、黃柏、連翹。
風盛加防風、荊芥、金沸草、甘菊、細辛、香附。
寒盛加人參、肉桂、五味、薑片。

保眞湯　治勞症體虛骨蒸。服之決補。

當歸　生苄　熟苄
人參　白朮　赤苓

天門　麥門
黃柏炙　五味
地骨　甘草

右以水煎。生薑三片。棗一枚。食後服。

○慈怪加茯神、遠志、柏子仁、酸棗仁。淋濁加萹蓄、石鳥藥、猪苓、澤瀉。便澁加木通、石葦、瞿麥。精加龍骨、牡蠣、蓮鬚、蓮子。燥熱加滑石、石膏、青黛、鱉甲。盜汗加浮麥子、炒牡蠣、黃芪、麻黃根。

太平丸　治勞症。欬嗽日久。肺痿肺癰。考宜喻服。

天門　麥門
欵花　杏仁各二錢
貢蓮　阿膠炮各兩半
桔梗　薄荷各一兩

右將蜜煉和丸。如彈子大。食後濃煎薄荷湯。先漉嗽喉中細嚼一丸。津唾送下。上床時再服一丸。如痰盛。先用飴糖拌消化丸一百丸送下。後即嚼嚥此丸。仰面睡。從北流入肺腑。

消化丸

白茯二兩　枳實一兩半

青黛石膏黃金色二兩

白礬枯　橘紅二兩
南星二兩　枳殼一兩半

右爲末。以神麯打糊丸。如梧桐子大。每服一百丸。上床時。飴糖拌吞。次嚼嚥太平丸二藥相攻。痰嗽頓迹除根。

牙皂二兩。火炙　半夏二兩
薄荷葉一兩

右先將羊肺洗淨。次將五味入水攪粘。灌入肺中。白煮熟。如常服食。與前七藥相間服之。亦佳。

潤肺膏

羊肺一具　杏仁一兩。淨研
蛤粉各一兩　白蜜二兩

右先將羊肺洗淨。次將五味入水攪粘。灌入肺中。白煮熟。如常服食。與前七藥相間服之。亦佳。

吐血十八

○吐血。陽盛陰虛。故血不得下行。因火炎上之勢而上出。脈必大而乳。大者發熱。乳者血滯與失血也。大法。補陰抑火。使復其位。用交益桂五錢爲末。冷水調服。　山梔子最治胃脘之血。　吐血覺胸中氣塞。上吐紫血者。桃仁承氣湯下之。　先吐紫。後見痰。痰不下降。四物湯爲主。加痰藥、火藥。　先痰嗽。後見紅。多是痰積熱。降痰火爲急。　痰嗽延帶血出。此是胃口清血。熱蒸而出。重者梔子輕者。

藍實。　或暴吐紫血一碗者。無事。吐出爲好。此熱傷血。死於中。用四物湯、解毒湯之類。　吐血挾痰。積吐一二碗者。亦只補陰降火。四物加火劑之類。　挾痰若用血藥。則泥而不行。只治火則止。吐血火病也。

陳皮一錢　甘草　青皮三分
神麯三分

右㕮咀。水煎服。　如胃不和。加縮香。　如渴者。加葛根半錢。　若痰結塊者。加貝母一錢。黃芩半錢去白。陳皮半錢。　若小便赤色。加炒黃柏半錢。　若大便結燥。加當歸七分。心煩。加黃連酒拌曬乾半錢。若小便滑。加煅牡蠣。　如見血多。去半夏。恐燥。加生芐一錢。牡丹半錢。桃仁三分。　若胃中不足。飲食少進。加炒山梔子仁八分。　若血溢入渴道。留聚隔間。滿則吐血。錢。　上膈甚熱吐血者。以四湯仁加荊芥、阿膠、各半錢。更不止。於本方中加大黃、滑石、各半錢。　胃傷吐血。宜理中湯加川芎、乾葛、各半錢。此是飲酒傷胃也。吐血不止。用生薑根爲末二錢。水煎。放冷。食後服良。　白茯末調治。治吐血。

已上諸方。雖非丹溪所出。以其藥同。故錄於前。

【附錄】凡血證上行。或唾或嘔或吐。皆逆也。若變而下行爲惡痢者。順也。上行爲逆。其治難。下行爲順。其治易。故仲景云。衄血證。下血者。當自愈也。與此意同。若無病人忽然下痢。其病進也。今病血證上行。而復下行惡痢者。其邪欲去是知吉也。　諸見血。身熱脈大者難治。是火邪勝也。　身涼脈靜者易治。是正氣復也。故脈訣云。鼻衄吐血沈細宜。忽然浮大即便危。

【附方】

柴胡五分
川芎七分半

右以水煎服。

芎藥

半夏麴五分

川芎五分

大吐紅不止。以乾薑炮末。童便調從治。　嗽膿痰血。用荊芥散。　舌上無故出血。如線不止。以槐花炒末。乾摻之。　若吐血一方。童便一分、酒半分、搗柏葉溫飲。非酒不行。　嘔吐血出於胃也。實者。是角地黃湯主之。虛者。小建中湯加黃連主之。

【入方】

二黃補血湯　治初見血。及見血多。宜服。

熟芐一錢　生芐五分　當歸七分半
丹麻　白芍二錢　牡丹皮五分
黃芪五分

右以水煎服。　血不止。可加桃仁半錢。酒大黃酌量虛實用之。內却去柴胡、升麻。

又方　治見血後。脾胃弱。精神少。血不止者。

人參一錢　黃芪三錢　五味十三箇
甘草五分　當歸五分　麥門冬五分

右㕮咀。水煎服。　加玉金研入亦可。

又方

人參一錢　白朮一錢　茯苓一錢

146

四生丸　治吐血、衄血、陽乘於陰、血熱妄行、服之良。

生荷葉　生艾葉　生柏葉　生地黃等分、

右爲研如鷄子大、服一丸、水三盞、煎一盞、去滓服。

大阿膠丸　治肺虛、客熱、欬嗽、咽乾、多唾涎沫、或有鮮血、勞傷肺胃、吐血、嘔血、並可服。

麥門冬去心　茯神　栢子仁　百部根

杜仲炒　丹參　貝母炒　防風各半兩、

山藥　五味　熟干　阿膠炒各一兩、

遠志　人參各二錢半、茯苓一兩、

右爲末、煉蜜丸、如彈子大、每服一丸、水煎六分、和柧服。

犀角地黃丸　治傷寒汗下不解、鬱干經絡、隨氣湧泄、爲衄血、或清通閉塞、流入胃腹、吐出清血、如鼻衄、吐血不盡、餘血停留、致面色痣黃、大便黑者、更宜服之。

犀角鎊　生苧　白芍　牡丹皮等分、

右㕮咀、每服五錢、水煎、溫服、實者可服。

桃仁承氣湯　芒硝三錢、甘草二錢半、大黃一兩、桂三錢、

右㕮咀、水煎、熟服。

桃仁半兩、去皮尖、

右㕮咀、每兩入薑同煎。

解毒湯　見中暑。

荊芥散　荊不穗半兩、炙草一兩、

右㕮咀、薑煎、食後服。

小建中湯　桂枝　甘草炙三錢、

生薑二錢、阿膠炒一舍、

右㕮咀、水煎。

蘇子降氣湯　見氣類。

理中湯　見中寒。

咳血十九

○衄血、火升、痰盛、身熱多退血虛、四物湯加減用、或云欬血者、嗽出痰內有血者是、嘔血者、嘔全血者是、血者是、腎血者、毋欬出者是血疾、潛衄血者、鼻中出血也、溺血、小便出血也、下血者、大便出血也、衄有各

名色分六、俱是熱證、但有虛實新舊之不同、或妄言爲寒者、誤也。

【入方】

青黛　瓜蔞仁　訶子　山梔

右爲末、以蜜同薑汁丸、嚥化、欬甚者加杏仁去皮尖、後以八物湯加減調理。

【附方】

黃芩散　治欬血成勞、

甘草四錢、黃芩　麥門冬　桔梗　白芍各半兩、

右㕮咀、每服半兩、水煎服。

茯苓補心湯　治心氣虛耗、不能藏血、以致面色痣黃、五心煩熱、咳嗽唾血、

茯苓　半夏　前胡　人參　枳殼炒　葛根各半分、　當歸二兩、　桔梗　川芎七錢半、白芍各二兩、　熟干

紫蘇　甘草　陳皮　海粉

右㕮咀、水薑棗煎。

嘔血二十

○嘔血火載血上、錯經妄行、脈大發熱、喉中痛者、是氣虛、用參、芪、蜜炙黃芪、黃柏、荊芥、當歸、生地黃、川芎之、嘔血用韭汁、童便、薑汁、磨鬱金、同飲之、其血自清、火載血上、錯經妄行、用四物湯加炒山梔、童便、薑汁、服、又方、山茶花、童便、薑汁、酒服、又鬱金末、治吐血、入薑汁、童便良、又方、用韭汁、童便二物、合用鬱金、如細研和服、又方、治吐血、或衄血上行、用鬱金、無用山茶花代、薑汁、童便、合好酒調服、即止、後以犀角地黃湯加鬱金、怒氣逆甚、則嘔血、暴痛內逆、肝肺相搏、血溢鼻口、但怒抑怒以全陰者是也、否則五志之火動甚、火載血上、錯經妄行也、用柴胡、黃連、黃芩、黃芪、地骨、生熟芍、白芍、以水煎服、虛者以保命生地黃散、再加天門冬、枸杞、甘草、等分、水煎服。

【附方】

治嘔血

黃柏蜜炙

右爲末、煎麥門冬湯、調二錢匕、立瘥。

聖惠方　治嘔血。

側柏葉

右爲末。不計時。以粥飲調下二錢匕。

保命生地黃散

生牛地黃　熟牛地黃
天門冬　黃芪
黃芩　甘草
枸杞　白芍

右咬咀。水煎。食前。

咯血二十一　附痰涎血

○咯血。痰帶血絲出者。用薑汁、青黛、童便、竹瀝、入藥中用。如四物湯加地黃骨、牛膝骨之類。咯唾。血出於腎。以天門冬、麥門冬、貝母、知母、桔梗、百部、黃芩、黃連、芎藥、當歸、甘草、沉香之類主之。

【入方】　治痰中血。

白芷一錢半　當歸一錢
桃仁一錢研　山梔炒黑八分
黃芩五分　甘草三分

右以水煎服。

又方　治痰中血。

白芷一錢半　牡丹皮一錢半
桑白一錢　山梔炒黑一錢一分

又方　治痰中血。

芎藥一錢　牡丹皮一錢半
桔梗七分　貝母一錢
青皮五分

右以水煎服。

又方

桔紅二錢　半夏五分
白芷一錢　枳殼一錢
桑白一錢　黃芩一錢

右以水一鍾。生薑三片。煎服。或加青黛半錢。

又方

桔紅一錢半　半夏一錢
牡丹一錢　貝母一錢
大青五分

右以水煎。生薑三片。

【附方】　治咯血。

荷葉不以多少焙乾。

右爲末。米湯調二錢匕。

保命生地黃散

生牛地黃　熟牛地黃
天門冬　黃芪
黃芩　甘草
枸杞　地骨皮
白芍　甘草

右咬咀。水煎。食前。

咯血二十一　附痰涎血

○咯血。痰帶血絲出者。用薑汁、青黛、童便、竹瀝、入藥中用。如四物湯加地黃骨、牛膝骨之類。咯唾。血出於腎。以天門冬、麥門冬、貝母、知母、桔梗、百部、黃芩、黃芪、黃連、芎藥、當歸、甘草、沉香之類主之。

【入方】　治痰中血。

白芷一錢半　當歸一錢
桃仁一錢研　山梔炒黑八分
黃芩五分　甘草三分

右以水煎服。

又方　治痰中血。

白芷一錢半　牡丹皮一錢半
桑白一錢　山梔炒黑一錢一分

又方　治痰中血。

芎藥一錢　牡丹皮一錢半
桔梗七分　貝母一錢
青皮五分

右以水煎服。

又方

桔紅二錢　半夏五分
白芷一錢　枳殼一錢
桑白一錢　黃芩一錢

右以水一鍾。生薑三片。煎服。或加青黛半錢。

又方

桔紅一錢半　半夏一錢
牡丹一錢　貝母一錢
大青五分

右以水煎。生薑三片。

【附方】　治咯血。

荷葉不以多少焙乾。

右爲末。米湯調二錢匕。

初漢世方　治咯血幷肺痿多痰。

防己　犀角末二錢半
甘草　桑白皮各五分

右爲末。粳米飲調下一錢。

又方　治咯血及衄血。

白芍一兩　犀角末二錢半

右爲末。新汲水服一錢匕。血止爲限。

天門冬丸　治咯血幷吐血。又能潤肺止嗽。

阿膠炮　天門冬一兩
貝母　甘草
白茯苓各半兩

右爲末。蜜丸如彈大。服一丸。嚥化。

又方　治咯血。

桑皮一錢半　半夏一錢炒
茯苓一錢　阿膠炒半錢
甘草五分　杏仁五分炒

又方　治咯血。

知母一錢　貝母一錢
桔梗七分　陳皮一錢
生牛地黃一錢　山梔七分炒

杏仁炒

柳桂二分。即桂之最小枝條也。立入上痛。

右以水煎。生薑三片。

衄血二十二

○衄血。涼血行血爲主。大抵與吐血同。用山茶花爲末。童便、薑汁、酒、調下。用如黃芩、升麻、犀角、能解毒。又以韲金末。童便、薑汁、幷酒調服。經血逆行。或血腥。或吐血。或唾血。用韭汁服之立效。治血汁血衄。以人中白。新瓦上火逼乾。入麝香少許。研細。酒調下。經驗。人中白。即溺盆白堊秋石也。衄血出於肺。以犀角、升麻、梔子、黃芩、芎藥、生地黃、紫苑、丹參、阿膠之類主之。原病式曰。衄者。陽熱怫鬱。于於足陽明。而上熱則血妄行。故鼻衄也。

【附方】

柳桂二分。即桂之最小枝條也。立入上痛。

右以水煎。生薑三片。

衄血二十二

○衄血。涼血行血爲主。大抵與吐血同。用山茶花爲末。童便、薑汁、酒、調下。用如黃芩、升麻、犀角、能解毒。又以韲金末。童便、薑汁、幷酒調服。經血逆行。或血腥。或吐血。或唾血。用韭汁服之立效。治血汁血衄。以人中白。新瓦上火逼乾。入麝香少許。研細。酒調下。經驗。人中白。即溺盆白堊秋石也。衄血出於肺。以犀角、升麻、梔子、黃芩、芎藥、生地黃、紫苑、丹參、阿膠之類主之。原病式曰。衄者。陽熱怫鬱。于於足陽明。而上熱則血妄行。故鼻衄也。

【附方】

柳桂二分。即桂之最小枝條也。立入上痛。

右以水煎。生薑三片。

衄血二十二

○衄血。涼血行血爲主。大抵與吐血同。用山茶花爲末。童便、薑汁、酒、調下。用如黃芩、升麻、犀角、能解毒。又以韲金末。童便、薑汁、幷酒調服。經血逆行。或血腥。或吐血。或唾血。用韭汁服之立效。治血汁血衄。以人中白。新瓦上火逼乾。入麝香少許。研細。酒調下。經驗。人中白。即溺盆白堊秋石也。衄血出於肺。以犀角、升麻、梔子、黃芩、芎藥、生地黃、紫苑、丹參、阿膠之類主之。原病式曰。衄者。陽熱怫鬱。于於足陽明。而上熱則血妄行。故鼻衄也。

【附方】

柳桂二分。即桂之最小枝條也。立入上痛。

右以水煎。生薑三片。

衄血二十二

○衄血。涼血行血爲主。大抵與吐血同。用山茶花爲末。童便、薑汁、酒、調下。用如黃芩、升麻、犀角、能解毒。又以韲金末。童便、薑汁、幷酒調服。經血逆行。或血腥。或吐血。或唾血。用韭汁服之立效。治血汁血衄。以人中白。新瓦上火逼乾。入麝香少許。研細。酒調下。經驗。人中白。即溺盆白堊秋石也。衄血出於肺。以犀角、升麻、梔子、黃芩、芎藥、生地黃、紫苑、丹參、阿膠之類主之。原病式曰。衄者。陽熱怫鬱。于於足陽明。而上熱則血妄行。故鼻衄也。

【附方】

伏龍肝半升

右以新汲水一大碗，淘取汁，和蜜頓服。

茜根散　治鼻不止。

茜根　阿膠炮炒　側柏葉　生艾

右以水一鍾，薑三片，煎服。

黃芩芍藥湯　治鼻衄不止。

黃芩　芍藥

右以水煎服。或屋角地黃湯，如無屋角，以井龍代之。○鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出。凡鼻衄，並以茅花調止衄散時進漸二錢，仍令其以麻油滴入鼻，或以薤菊汁滴入亦可。又茅花、白芍藥對半尤穩。外迎法，以井花水濕紙頂上，貼之左鼻，以線札左手中指右出，札右手，俱出，兩手俱札。或炒黑蒲黃吹鼻中，又龍骨末吹亦可。

止衄血

黃芪六錢　赤茯苓　生艾　阿膠各三錢

右爲末，每服二錢，食後，黃芪湯調服。

葛附飲

川芎二兩　香附四兩

右爲末，每服二錢，茶湯調下。

又法　治心熱吐血及衄血不止。

百葉榴花不以多少

右乾爲末，吹出鼻中立瘥。

溺血二十三

○溺血屬熱，用炒山梔子，水煎服，或用小薊、琥珀。有血虛，四物加牛膝等。實者，用當歸承氣湯下之，後以四物加山梔。

【入方】

小薊飲子　治下焦結熱，血淋。

生艾　小薊　生苄　滑石　滇竹葉　蒲黃炒　通草　梔子炒　當歸酒洗　甘草炙各半兩

梅苓各一兩　甘草炙半兩

甘草各等分

黃芩　芍藥

右以水煎服。或屋角地黃湯，如無屋角，以井龍代之。○鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出。凡鼻衄，並以茅花調止衄散時進漸二錢，仍令其以麻油滴入鼻，或以薤菊汁滴入亦可。又茅花、白芍藥對半尤穩。外迎法，以井花水濕紙頂上，貼之左鼻，以線札左手中指右出，札右手，俱出，兩手俱札。或炒黑蒲黃吹鼻中，又龍骨末吹亦可。

止衄血

黃芪六錢　赤茯苓　生艾　阿膠各三錢

白芍　當歸

生料五苓散　見中暑。

膠艾湯

阿膠　川芎　艾葉炒各二兩　熟艾

右㕮咀，每三錢，水酒煎，空心熱服。

鹿茸丸

鹿茸一兩，蜜炙　沉香　當歸　故紙炒

右爲末，酒糊丸，每七十丸，空心鹽酒下。

沉砂妙香散

射香一錢，另研　山藥蒸，曬　人參半兩　茯苓　茯神　黃芪各一兩　甘草炙半兩　遠志炒一兩　辰砂三錢

右爲末，每二錢，溫酒下。

六味地黃丸　見諸虛。

瑞竹堂蒲黃散

故紙炒　　蒲黃炒

右等分爲細末。每三錢。空心熱酒調下。

下血二十四

○下血。其法不可純用寒涼藥。必於寒涼藥中加辛味爲佐。久不愈者。後用溫劑。必須升舉。藥中加酒炒涼藥。和酒煮黃連丸之類。寒因熱用故也。有熱。四物加炒山梔子、升麻、蒸艾、阿膠珠。去大腸濕熱。屬虛者。當溫散。四物加炮乾薑、升麻。凡用血藥。不可單行罷止也。

【入方】

白芷　　五倍子

右爲末。粥丸梧子大。服五十丸。米湯下。

〔附錄〕下血當別其色。色鮮紅爲熱。以連蒲散。又若內蘊熱毒。毒氣入腸胃。或因飲酒過多。及漬糟歲炙。媾幷血入大腸。故下血鮮紅。宜黃連丸。或一味黃連煎。餘者大下不至者。宜四物湯加黃連、槐花。仍取血見愁草中。加入側柏葉。與生薑同搗汁。尤好。毒著入腸胃下。血者。亦宜加味黃連、槐花、入煎服。血色瘀者。爲寒。血逐氣走。冷寒入客腸胃。故上瘀血。宜理中湯溫散。若風入腸胃。純下清血。或濕毒並宜胃風散加枳殼、荊芥、槐花。擁撲損壞。血入腸胃。下血濁如瘀血者。宜黑神散加老黃茄爲末。酒調下。內經云。下血爲內傷絡脈所致。用枳殼一味服。又方。用黃連二兩。枳殼二兩。槐花八兩。炒上一味去槐花不用。止以二味煎服。立效。以解絡脈之結也。

【附方】

血餘灰　　鞋底灰

右爲末。酒調三錢匕。

又方　治下血腸劇。

百藥煎一兩。取一半燒爲灰。

右爲末。糊丸如梧子大。服六十丸。空心米湯下。

槐花散　治腸胃不調。腹痛下血。

青木香　　厚朴

枳殼各一兩。　　槐花二兩。

右以水煎。空心服。

又方　治下鮮血。

栀子仁燒灰。

右一味。水和一錢匕。服。

又方　治發前有血面色黃。

猪牙皂角灰等分。

右爲末。酷糊丸梧子大。空心服七十丸。米湯下。

酒煮黃連丸　見泄瀉類。

黃連丸

黃連二兩。　　赤茯苓一兩。　　阿膠二兩。

右用黃連、茯苓爲末。調阿膠漿手丸。每三十丸。食後飲下。

黃連香薷飲　見中暑。

理中湯　見中寒。

胃風湯　見下痢。

黑神散

百草霜研細。

右用酒調下。

腸風臟毒二十五

○腸風獨在胃與大腸出。若兼風者。荊芥、蒸艾、芍藥、香附。

【入方】

黃芩　　蒸艾　　槐角

青黛

治腸風下血

滑石　當歸
甘草　苦芐各分

右以水煎服。或以苦芐、生苄不犯鐵器爲末丸服。

又方

茄蒂燒存性　梔子炒

右爲末。搗飯丸如梧子大。每服空心一百丸。米湯下。

又方　便血久遠。傷血致虛。拜麻風癬見面者。

龜板二兩酥炙　升麻

側柏葉　椿根皮七錢五分

右爲末。粥丸。以四物湯加白芐、黃連、甘草、陳皮作末。湯調送下丸藥。

又方　脈緩大。口渴。月經紫色。勞傷挾濕。

白芐五錢　黃柏炒
地榆二錢　黃芩二錢

右爲末。蒸餅丸服。

又方　治積熱便血。

苦芐　陳皮一兩五錢
條芩各七錢五分　連翹五錢

右爲末。生苄膏六兩。丸如梧子大。每服五七十丸。白湯下。

又方

腸風脫露。以車荷鳴五七箇。焙乾。燒灰。酷調搽。仍忌濕麵酒辛熱物。

〔附錄〕腸胃不虛。邪氣無從而入。人惟坐臥風濕。醉飽房勞。生冷停寒。酒麵積熱。以致榮血失道。滲入大腸。此腸風藏毒之所由作也。挾熱下血。清而色鮮。腹中有痛。挾冷下血。濁以色黯。腹中略痛。清則爲腸風。濁則爲臟毒。有先便而後血者。其來也遠。有先血而後便者。其來也近。世俗裘前裘後之說。非也。治法。大要先當解散腸胃風邪。熱則用敗毒散。冷者與不換金正氣散。加川芎、當歸。後隨其冷熱而治之。苡薏湯一劑。又調血之上品。熱者加茯苓、槐花。冷者加茯苓、木香。此則自根自本之論也。雖然精氣血氣生於穀氣。靖爲大腸下血。大抵以胃藥收功。以四君子湯、參苓、白朮散、枳殼散、小烏沉湯和之。胃氣一回。血自循於經絡矣。○腸風者。邪氣并入腸風臟毒。辨之甚詳。前二證皆以四物湯加刺蒺藜。

右爲末。蒸餅丸服。

又方　治積熱便血。

苦芐　陳皮一兩五錢
條芩各七錢五分　連翹五錢

右爲末。生苄膏六兩。丸如梧子大。每服五七十丸。白湯下。

又方

腸風脫露。以車荷鳴五七箇。焙乾。燒灰。酷調搽。仍忌濕麵酒辛熱物。

〔附錄〕腸胃不虛。邪氣無從而入。人惟坐臥風濕。醉飽房勞。生冷停寒。酒麵積熱。以致榮血失道。滲入大腸。此腸風藏毒之所由作也。挾熱下血。清而色鮮。腹中有痛。挾冷下血。濁以色黯。腹中略痛。清則爲腸風。濁則爲臟毒。有先便而後血者。其來也遠。有先血而後便者。其來也近。世俗裘前裘後之說。非也。治法。大要先當解散腸胃風邪。熱則用敗毒散。冷者與不換金正氣散。加川芎、當歸。後隨其冷熱而治之。苡薏湯一劑。又調血之上品。熱者加茯苓、槐花。冷者加茯苓、木香。此則自根自本之論也。雖然精氣血氣生於穀氣。靖爲大腸下血。大抵以胃藥收功。以四君子湯、參苓、白朮散、枳殼散、小烏沉湯和之。胃氣一回。血自循於經絡矣。○腸風者。邪氣并入腸風臟毒。辨之甚詳。前二證皆以四物湯加刺蒺藜。

【附方】

蒜連丸一名金屑萬應膏

獨頭蒜十個　黃連不以多少

右先用獨蒜煨香熟。和藥杵勻。丸如梧子大。空心米湯下四十丸。

又方　治腸風。

香附一兩炒　枳殼七錢五分炒　當歸五錢
槐花炒　甘草炙各二錢五分

右爲粗末。每服三錢。水煎。生薑三片。棗一箇。

敗毒散　見瘟疫。

不換金正氣散

厚朴薑制　藿香　甘草炙
蒼朮米泔浸　陳皮去白

右等分。薑三片。棗二箇。煎。食前熱服。

苓連湯

川芎　當歸

右等分。水煎。

參苓白朮散　見脾胃類。

枳殼散

枳殼麩炒去穰　槐子微炒黃　荊芥穗各五錢

右爲末。每服三錢。薄粟米粥調下。如人行一二里。再用粥壓下。日進三服。

小烏沉湯

香附二十兩　烏藥十兩　甘草炙一兩

右爲末。湯調下。

痔瘡二十六

○痔瘡專以涼血爲主。

【入方】

人參　黃芪　生苄
當歸和血　升麻　條芩
槐角涼血生血　黃連
一方無黃連。

川芎
枳殼寬腸

半夏

川芎五錢

熏洗

五倍子　朴硝　桑寄生

煎湯先熏後洗。又多瓜藤亦好。　又大腸熱脫者。用木鼈子、伍倍子、研細末。調傅。痔頭向上。是大腸熱甚收縮而上。用四物湯解毒。加枳殼、白朮、槐角、秦艽。

〔附錄〕痔者。皆因醫藥本虛。外傷風濕。內蘊熱毒。醉飽交接。多慾自戕。以故氣血下陷。結聚肛門。宿滯不散。而衝突爲痔也。其肛邊發瘡肉珠。狀如鼠乳。時時滴濁膿血。曰牡痔。肛邊生瘡腫痛。突出一枚。數日膿潰即散。曰牝痔。腸口大顆發癰。且痛且痒。出血淋瀝。曰脈痔。腸內結核有血。寒熱往來。登溷脫肛。曰腸痔。若血痔。則每遇大便。清血隨而不止。若酒痔。則每遇伏酒。發動瘀腫。痛而流血。若氣痔。則憂恐驚怒。適臨乎前。立見腫痛。大便艱難。強力則肛出而不收矣。此諸痔之外證也。治法總要。大抵以解熱調血順氣先之。蓋熱則血傷。血傷則經滯。經滯則氣不運行。氣與血俱滯。乘虛而墜入大腸。此其所以爲痔也。諸痔久不愈。必至穿穴爲漏矣。

【附方】

治諸痔瘡。

槐花四兩　槐角剌一兩搥碎　胡椒十粒

右用猪肚一箇。入藥在內。扎定口。煮熟。去藥。空心食猪肚。

清心丸　素問云。諸痛痒瘡。皆屬於心。心主血熱。此藥主之。

黃連一兩　茯神　赤苓

右爲末。煉蜜丸如梧子大。每一百丸。食前米湯下。

清涼飲　治諸痔熱甚。大便秘結。

當歸　赤芍　甘草炙

右等分爲末。每服二錢。新水調下。

槐角丸　治諸痔及腸風下血脫肛。

槐角一兩　防風　地榆

枳殼　黃芩各半兩。

右爲末。糊丸如梧子大。空心米湯下二十丸。

蜕皮丸　治諸痔出裏急疼痛。

槐花炒。　艾葉炒。

當歸　川芎

白蘞柏。　頭髮燒灰。三錢。

豬後蹄重甲十枚。炙黃。去皮。

連房艾　細辛

右爲末。煉蜜丸梧子大。服五十丸。食前米湯下。

猪甲散　治諸痔。

猪懸蹄甲不以多少。

右爲末。陳米湯調二錢。空心服。

萬靈丸　治痔下血不止。

川芎　當歸　黃芪

地榆　槐花炒。各半兩。　阿膠炒。

木賊　頭髮燒灰。各一錢半。

右爲末。煉蜜丸梧子大。服五十丸。食前米湯下。

乾葛湯　治酒痔。

乾葛　枳殼炒。　半夏

生下　杏仁各半兩。　黃芩二錢半。

右剉。每服三錢。黑豆一百粒。薑三片。白梅一箇。煎服。

橘皮湯　治氣痔。

橘皮　枳殼炒。　川芎

檳榔　木香　桃仁炒。去皮。

香附　甘草炙。各二分半。

右剉。每服八錢。薑棗煎服。

熏洗方

槐花　荊芥　枳殼

又方

土瓜末二錢。　木鱉子七個。取仁研

右以水煎。薰洗三兩次。如肛門腫熱。以朴硝末水調。淋之良。

又方　治腸痔。每大便常有血。

右以蒲黃末方寸匕。米飲調下。日三頓。瘥。

又方

搗桃葉一斛。蒸之。內小口器中。以下部橫上坐。虫自出。

地黃丸　治五痔。澁陰必用之。

地黃酒蒸熟。一兩六錢。　槐角炒。

杜仲炒。　白芷各一兩。　山藥

獨活各八錢　澤瀉
黃芩一兩半　白附子二錢
右煉蜜丸如梧子大。空心服五十丸。米湯下。

熏痔方
用無花果葉煮水熏。少時再洗。　又好醋沃燒新磚如法坐熏良。

又方
大黃三錢煨　牡礪一兩煨
右爲末。作十服。空心服。

又方
大棕一片。頭垢捻成餅子。先安頂垢餅於痔上。外安蒜艾灸之。

翻花痔
荊芥、防風、朴硝、煎湯洗之。次用木鱉子、輕金、研末。入龍腦些少。水調付。　又方。熊膽、片腦、和勻。貼之。

漏瘡二十七

○漏瘡先須服補藥生氣血。用參、朮、芪、膏、歸爲主。大劑服之。外以附子末。津唾和作餅子。如錢厚。以艾灸。漏大灶大。漏小灶小。但灸令微熱。不可使痛。乾則易之。則再研如末作餅再灸。如固則止。來日再灸。直至肉平爲效。亦有用附片灸。仍用前補劑作膏貼之。尤妙。　痔漏。涼大腸。宜大腸。　用枳殼去穰。入巴豆。鐵線縛煮透。去巴豆。入藥用。丸子則爛搗用煎藥。乾用宜腸。　澁竅用赤石脂、白石脂、枯礬、黃丹、膠子。漏竅外塞用童子小便。煅過廿石、牡礪粉。

【入方】
黃連散　元有痔漏。又於肛門邊生一塊。皮厚、腫、痛。作膿。就在痔孔出。作食積注下治。

黃連　阿魏
桃仁　神麯　山查
連翹　槐角　犀角各等分。

右爲末。以少許置掌心。時時舐之。津液咽下。如消三分之二。止後服。

〔附錄〕漏者。諸瘻之潰漏也。猿瘻、鼠瘻、螻瘻、蛄瘻、蜂瘻、蚍蜉瘻、蜻蜓瘻、轉筋瘻。古所謂九瘻是爾。析而言之。三十六種。其名目又不同焉。大抵外傷四氣。內窘七情。與夫飲食乖常。染觸邪毒。未有不變爲瘻瘡。穿孔一深。膿汁不盡。得冷而風邪併之。於是消而成漏矣。然有近年漏者。有久年漏者。近則帶淡紅。或微腫。或小核。久則上面橘白。內面黑爛。淫虫惡臭生焉。

【附方】
猪腎丸　通行漏瘡中。惡水自大腸中出。
黑梁牛膝細末二錢半。入猪腎中。以線扎。青竹葉包。慢火煨熟。空心溫酒嚼下。

牡丹　茯苓各六錢
乳香一錢
紫斷五錢
乳香一錢
苦練根等分。

川芎半兩　細辛　白芷稍一錢半。
右爲末。每日作湯服之。病在下。食前服。在上。食後服。若瘡大小。討中。至入不去則止。瘡外套藥貼之。

丹溪先生心法卷三

脫肛二十八

○脫肛屬氣熱氣虛血虛血熱氣虛者補氣參芪芎歸升麻血虛四物湯血熱者涼血四物湯加炒柏氣熱者條芩六兩升麻一兩糯糊丸外用五倍子爲末托而上之一次未收至五七次待收乃止又東北方壁土泡湯先熏後洗

〔附錄〕肺與大腸爲表裏故肺藏蘊熱則肛門閉結肺藏虛寒則肛門脫出又有婦人產育用力小兒久痢皆致此治之必須溫肺藏補陽胃久則自然收矣

【附方】

香蒯散　治肛門脫出大人小兒皆主之

香附子　荊芥等分　砂仁

右爲末每服三錢水一椀煎熟淋洗每服三錢煎服亦可

又方

五倍子爲末每用三錢煎洗

又方木賊不以多少燒灰爲末摻肛門上按入卽愈

嘔吐二十九

○凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦胃中有熱腦上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生薑有久病噦者胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白朮香附之類嘔吐朱奉議以半夏橘皮生薑爲主劉河間謂噦者火氣炎上此特一端耳有痰腦中膠食不得下者有胃中有火與痰而噦者有食滯心肺之分而新食不得下而反出者有胃中有火與痰而噦者嘔吐藥忌瓜蔞杏仁桃仁雞子山梔皆要作吐丸藥稍香藥行散不妨注船大吐渴飲水者卽死童便飲之最妙

【附方】

理中加丁香湯　治中脘停寒喜辛物入口卽吐

人參　白朮　甘草炙

丁香十粒

右㕮咀生薑十片水煎服或加枳實半錢亦可不效或以二陳湯加丁香十粒相入煎不吐出又或活人生薑橘皮湯

活人生薑橘皮湯

橘皮四兩　生薑半斤

右㕮咀水七盞煮至三盞去滓逐旋溫服

濟生竹茹湯　小柴胡加竹茹湯見瘧類

右並用生薑多煎服

葛根三兩　半夏炮七次二兩　甘草炙一兩

右㕮咀每四錢水一盞入竹茹一小塊薑五片加味二陳湯　治停痰結氣而嘔

半夏　橘皮各五兩　白茯苓三兩

砂仁一兩　丁香五錢　生薑三兩

右水煎服

吐盡而嘔方

黑鉛炒成灰楮柳末米飲調下

惡心三十

○惡心有痰有熱有虛皆用生薑隨症佐藥戴云惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也

〔附錄〕惡心欲吐不吐心中兀兀如人畏舟船宜大半夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯加半夏亦可

乾薑炮各一錢

甘草炙一兩半

又胃中有熱惡心者。以二陳加生薑汁。炒黃連。黃芩各一錢。最妙。

【附方】

大半夏湯

半夏　陳皮　茯苓各二錢半。

右咬咀。水二盞。薑二錢半。煎八分。食後服。

小半夏茯苓湯

半夏五兩。　茯苓三兩。

右咬咀。每服八錢。用水一盞半。煎至一盞。入生薑自然汁投藥中。更煎一兩沸。熱服。無時。　或用生薑半斤同煎。

理中湯　見中寒。

嗌逆三十一

○欬逆有痰。氣虛。陰火。視其有餘不足治之。其詳在格致餘論。　不足者。人參白朮湯下大補丸。有餘并有痰者吐之。人參蘆之類。　痰礙氣而吃逆。用鹽水吐。此乃燥痰不出。　痰者。陳皮、半夏。　氣虛。人參、白朮。　陰火。黃連、黃柏、滑石。　嗌逆自痢者。褐石、甘草、炒黃柏、白芍、人參、白朮、陳皮、加竹瀝薑服。

【附錄】嗌逆爲病。古謂之噦。近謂之呃。乃胃寒所生。寒氣自逆而呃上。此證最危。亦有熱呃。已見傷寒證。其有他病發呃者。宜用半夏一兩。生薑半兩。水煎熱服。或理中湯加枳殼、茯苓各半錢。半夏一錢。不效。更加丁香十粒。　吐利後。胃虛寒嗌逆者。以羌活附子湯。或丁香十粒。柿蒂十箇。切碎。水煎服。吐利後。胃熱嗌逆者。以竹皮竹茹湯。　亦無別病。偶然致呃。此絳氣逆而生。宜小半夏茯苓湯加枳實、半夏。又或煎湯泡蘿蔔子。研取汁。調木香調氣散。熱服之。逆氣用之最佳。

【附方】

橘皮乾薑湯　治嗌逆不止。

橘皮　通草　乾薑

甘草炙。各二兩。　人參一兩。

右用五錢。水煎服。

生薑半夏湯　通治嗌逆欲死。

半夏一兩。　生薑二兩。

右以水煎溫。作三服。

陰證嗌逆

川烏　乾薑炮。　附子炮。

莒蔔　甘草炙。　半夏

陳皮　大黃等分。

右爲末。每服一錢。生薑五片。煎服。

人參白朮湯

人參　黃芩　柴胡

梔子仁　甘草炙。各半兩。　白朮

半夏泡。七次。　五味

右咬咀。每服四錢。薑三片。煎。

羌活附子湯　治吃逆。

木香　附子炮。　羌活

乾薑一兩。

右爲末。每服二錢。水一盞半。鹽一捻。煎二十沸。和柤熱服。一服止。

橘皮竹茹湯

橘皮一升。　竹茹一升半。　甘草炙。二兩。

棗子三十箇。　生薑半兩。

三因加丁香。

荷香炒。各半兩。

人參半兩。

木香各二兩。

乾葛　一五四

防風　吳茱萸

散。或蔗汁、牛羊乳。或入酸醋尿。又有積血停於內而致。當消息逐之。大便濇者難治。當令食兔肉。則便利。翻胃卽腦噎。膈噎乃翻胃之漸。發揮備言年高者不治。糞如羊屎者。斷不可治。大腸無血故也。

或云。翻胃。血虛者。脈必數而無力。氣虛者。脈必緩而無力。氣血俱虛者。則口中多出沫。俱見沫大出者必死。有熱者。脈數而有力。有痰者。脈滑數。二者可治。血虛者。四物爲主。氣虛者。四君子爲主。然以解毒爲主。痰以二陳爲主。

又方

用馬溺兒燒灰存性一錢。好粟肉平胃散二錢。

右和勻。溫酒調服。食卽可下。然後隨病源調理。

又方

葉黃　黃連　貝母

牛膝草

治翻胃

韭菜汁二兩　牛乳一盞

右用生薑汁半兩。和勻溫服。效。

治翻胃積飲通用

益元散。生薑自然汁。澄白腳丸小丸子。時時服。

【附方】

燒針丸　此藥清鎮。專主吐逆。

黃丹不以多少

右研細。用去皮小粟肉。丸如雞頭大。每用。針簽於燈上。燒灰爲末。乳汁下一丸。

粟肉平胃散

厚朴薑制　陳皮去白。各三斤二兩。甘草炙。

生薑各二斤。　蒼朮泔浸一宿。炒。五斤。

右剉。拌勻。以水煎過面上半寸許。煮乾。焙燥爲末。每服二錢。鹽湯空心點服。

參苓白朮散　見脾胃類。

保和丸　見積聚類。

呑酸三十三　附噯氣

○呑酸者。濕熱鬱積於肝而出。伏於肺胃之間。必用纏食蔬菜自養。宜用炒吳茱萸。順其性而折之。此反佐之法也。必以炒黃連爲君。二陳湯加茱萸、黃連。各炒。隨時令送其位。使蒼朮、茯苓爲輔佐。冬月倍加味平胃散　治呑酸或宿食不化。

生料平胃散。加神麴、麥芽炒各半錢。　朮朴不制。

右生薑三片。水煎五錢服。

○噯氣　胃中有火有痰。

【入方】

南星　半夏　縮砂仁　香附

一本有炒梔子

右作丸。或作湯服之。蓋胃中有鬱火。腦上有稠痰故也。

○軟石膏丸亦不可服。本方痰條下云。噫氣呑酸。此係食鬱有熱。火氣衝上。黃芩爲君。南星、半夏、陳皮、爲佐。熱多加青黛。

痞三十四

○痞者有食積痰濕。東垣有法有方。　心下痞。須用枳實、炒黃連。　如菜受充實。面苔骨濇。氣質之人而心下痞者。宜枳實、黃連、青皮、陳皮、枳殼。　如菜受素弱。轉運不調。飲食不化。而心下痞者。宜白朮、山查、麴孽、陳皮。　如肥人心下痞者。乃是實痰。宜苓朮、半夏、砂仁、茯苓、澤瀉。　如瘦人心下痞者。乃是鬱熱在中焦。宜枳實、黃連、葛根、升麻。　如食後感寒。飲食不化。心下痞。宜藿香、草豆蔻、吳茱萸、砂仁。　痞挾血成

瓜蔞

【附方】

蠲痞丸　治中脘宿食留飲。酸苦心痞。或口吐清水。

神麴炒三兩　蒼朮泔浸炒。一兩半。　陳皮一兩。

右爲末。生薑汁煮神麴糊爲丸。每七十丸。薑湯下。

竊蜜、川桃仁、紅花、香附、大黃之類。

【入方】

吳茱萸三兩，湯浸煮少時，

軟石膏不以多少，炙令大熱紅出火毒，

粥糊爲丸。每服五七十丸，白朮陳皮湯下。

玉液丸

右爲末，酷糊丸，如豌豆大。服之專能瀉胃火，併治食積痰火。

〔附錄〕痞者，與否同，不通泰也，由陰伏陽蓄，氣與血不運而成，處心下位中央，滿滿痞塞者，留土之病也。與服滿有輕重之分，痞則內堅痞悶，而分無服急之形者，是痞也。有中氣虛弱，不能運化糟粕爲痞者。有濕熱太甚爲痞者。古方治痞用黃連、黃芩、枳實之苦以泄之，厚朴、生薑、半夏之辛以散之，人參、白朮之甘苦以補之，茯苓、澤瀉之淡以滲之，既痞，同濕治，惟宜上下分消其氣，如果有內實之證，庶可略與疎導，世人苦於痞塞，喜行利藥，以求其速效，暫時快通，痞若再作，益以滋蔓。

【附方】

加味補中益氣湯　治內傷，心下痞，右見內傷。

脈緩有痰而痞，加半夏、黃連，脈弦，四肢滿悶，便難而心下痞，加柴胡、黃連、甘草，大便祕，加黃連、桃仁，少加大黃，餘身，心下痞，昏悶者，加白芍藥、黃連，心下痞，中塞者，加附子、黃連，心下痞，腹脹，加五味子、白芍、砂仁，天寒少加乾薑，或中桂，心下痞，嘔逆者，加黃連、生薑、陳皮，如多月，加黃連，少入丁香、藿香，心下痞，如阻中氣上逆者，是衝脈逆也，加黃柏三分，黃連一分半以泄之，如食已，心下痞，別服橘皮枳朮丸。

枳實消痞丸　治右關脈浮弦，心下虛痞，惡食，懶倦，開胃進食，

枳實　黃連各五錢，　厚朴四錢，　人參三錢，　茯苓　甘草炙，二錢，　乾生薑二錢，　半夏麴三錢，　白朮三錢，

一人因喫麵內傷，肚熱頭痛，

白朮一錢半，　白芍　陳皮　茯苓　黃連　人參

右爲末，水浸蒸餅丸如梧桐子大，服三五十丸，溫水下。

橘皮枳朮丸

橘皮　枳實

右爲末，荷葉裹燒飯爲丸，每服五十丸，白湯下。

枳朮丸　助胃消食，氣中去痞滿。

白朮　枳實各二兩，

白朮半斤，　蒼朮　茯苓

粥爲丸。

陳皮各三兩，

濟六丸　見泄瀉。

〔附錄〕傷食之證。右手氣口必緊盛。胸膈痞塞。噫氣如敗卵臭。亦有頭痛發熱。似身不痛爲異耳。用治中湯加砂仁一錢。或用紅圓子。

【附方】

加味二陳湯　治中脘間食氣則嘔。

本方加砂仁一錢。青皮半錢。

紅丸子　治傷食。

京三稜　蓬朮煨　青皮　乾薑炮　胡椒三兩。

右爲末。用醋糊丸如梧子大。鬱紅爲衣。服三十丸。食後薑湯下。

治中湯　見脾胃。

痘三十七

○痘不用分其五。同是溫熱。如食傷相似。輕者、小溫中丸。重者、大溫中丸。熱多加芩、連。濕多者、茵陳五苓散。加食積藥。溫熱因倒胃氣。服下藥大便下利者。參、芪、加山梔、茵陳、甘草。藏云。五痘者。周身皮膚并眼如梔子水染。因食積黃者。攝其虛實。下其食積。其餘但利小便爲先。小便利白。其黃則自退矣。

【大方】

小溫中丸　治痘。又能去食積。

蒼朮　川芎　香附　針砂醋炒紅。

春加芎。夏加苦參。或黃連。冬加吳茱萸。或乾薑。

大溫中丸　治食積與黃胆。又可借爲制肝燥脾之用。脾虛者。以參、朮、芎、藥、陳皮、甘草作湯使。

陳皮　三稜　蒼朮　厚朴　蓬朮　青皮五兩。　甘草一兩。　香附一斤。　針砂二兩醋炒紅。

右爲末。醋糊丸。空心鹽湯下。午後飯食。可酒下。忌犬肉菓菜。

〔附錄〕黃痘。乃脾胃經有熱所致。當究其所因。分利爲先。解毒次之。諸痘。口淡、怔忡、耳鳴、脚軟、微寒、發熱、小便白濁。此爲虛證。治宜四君子湯。吞八味丸。不可過用涼劑。溫通小便。恐腎水枯竭。久而面黑黃色及有渴者不治。不渴者可治。黃痘通身面目悉黃。宜生料五苓散。加茵陳。又宜小柴胡加茵陳、茯苓、枳實。少加朴硝。濟生茵陳湯。千金方。東引桃根。細者。煎空心服。殺痘。食已頭眩。心中怫鬱不安。飽所致。胃氣蒸衝而黃。宜小柴胡加殼芽、枳實、厚朴、山梔、大黃。濟生、殺痘丸。足脛滿。尿黃而黃面赤斑。酒過胃熱。酵臥。當風水濕得之。小柴胡加茵陳、豆豉、大黃、黃連、葛粉。脈微數。面目青黑。或大便黑。三因方。白朮散。脈弦澁。三因、當歸白朮散。濟生方。五苓加葛根湯。女勞痘。四肢房事後。當水濕所搏。故額黑身黃。小腹滿。溲小便不利。以大麥一撮。同活石石膏末各一錢煎服。黃汗者。因脾胃有熱汗出入水澡浴所致。故汗出黃染衣而不渴。濟生方。黃芪散。茵陳湯。又以苦丁香如豆大。深吹鼻中出黃水差。發黃脈沉細澀。四肢逆冷。身冷。自汗不止。宜茵陳四逆湯。

【附方】

茵陳蒿湯　治濕熱發黃。身熱。鼻乾。汗出。小便赤而不利。

茵陳六兩。　梔子十四箇。　大黃三兩。

右三味。每服一兩半。水煎服。

梔子大黃湯　治酒痘。

梔子十五箇。　大黃一兩。　枳實五枚。

水煎。溫服。

硝石礬石散　治女勞痘。身黃額黑。

硝石　礬石各燒等分。

右爲末。以大麥粥汁和服二錢。日三。重衣被取汗。

瓜蒂散

瓜蒂二錢。　母丁香一錢。　黍米四十九粒。

右爲末。每皮於鼻內嗑之。取下黃水。凡用先令病人含水一口。

茵陳五苓散

右用五苓散五分。茵陳蒿末十分。和勻。先食飲。服方寸匕。日三服。

八味丸　見補損。

生料五苓散　見中暑。

小柴胡湯　見瘧。

濟生茵陳湯

茵陳二兩。　大黃一兩。　梔子仁三錢。

右咀。每服四錢。水一盞。煎八分。溫服。不拘時。

濟生穀痘丸

苦參三兩。　牛膽一箇。　龍膽草一兩。

右爲末。用牛膽汁入少煉蜜丸。如梧子大。每五十丸。空心熱水或生薑甘草湯送下。

三因白朮湯
桂心　白朮各一兩
杏仁　甘草各半兩
右㕮咀。每服四錢。水一盞。煎七分。食前服。

三因當歸白朮湯
白朮　茯苓各二兩
茵陳各兩　甘草炙
杏仁湯浸去皮尖。麩炒各二兩
右咀。每服四錢。食後溫服。

濟生五苓散
猪苓　澤瀉
赤苓各等分
右咀。每四錢。水煎。溫服。無時。

濟生葛根湯
葛根二兩　枳實麩炒

甘草炙半兩
右咀。水煎服。無時。

濟生黃芪散
黃芪　赤芍
麥門去心　豆豉各一兩
右咀。薑五片。水煎服。無時。

茵陳四逆湯
方見中寒類加茵陳。

水腫三十八

○水腫。因脾虛不能制水。水濕妄行。當以參朮補脾。使脾氣得實。則自能運。自能升降運動其樞機。則水自行。非五苓神佑之行水也。宜補中、行濕、利小便。切不可下。用二陳湯。加白朮、人參、蒼朮、爲主。佐以黃芩、麥門冬、炒梔子、制肝木。若嘔。加木香、木通。氣若陷下。加升麻、柴胡提之。隨病加減。必須補中行濕。二陳治濕。加升提之藥。能使大便潤而小便長。產後必須大補血氣爲主。少佐蒼朮、茯苓。使大便利而小便長。有熱。當清肺金。麥門冬、黃芩之屬。

右作一服。水煎。又方。去陳皮、桑白。用五加、地骨皮。

疎鑿飲子　治水氣遍身浮腫。喘呼氣急。煩渴。大小便不利。服熱藥不得者。
澤瀉　赤小豆炒　商陸　羌活
大腹皮　椒目　木通　秦艽

木香一錢半。白朮二錢。咬咀。取急流順水煎服。　水腫用大戟、香薷。濃煎汁。成膏丸。去客。利小水。　大戟爲末。棗肉丸十丸。泄小水。劫快實者。

戟云。水腫者。通身皮膚光腫如泡者是也。以健脾滲水利小便。進飲食。元氣實者可下。

【附錄】腰以下腫。宜利小便。腰以上腫。宜發汗。此仲景之要法也。　諸家只知治濕。當利小便之說。執此一途。用諸去水之藥。往往多死。又用道水丸、舟車丸、神佑丸之類。大下之。此速死之兆。蓋脾極虛而敗。愈下愈虛。雖劫效目前。而陰損正氣。然病亦不旋腫而至。　大法宜大補中宮爲主。若所挾加減。不爾則死。當以嚴氏實脾散加減用。　陽病水兼陽證者。脈必沉遲。水之爲病不一。實洛陽以病腫不治。必爲鋼疾。雖有扁鵲。亦莫能爲。則知腫之危惡。非他病比也。夫人之所以得全其性命者。水與穀而已。水則腎主之。土穀則脾主之。惟腎虛不能行水。惟脾虛不能制水。胃與脾合氣。胃爲水穀之海。又因虛而不能傳化焉。故腎水泛溢。反得以浸漬脾土。於是三焦停滯。經絡壅塞。水滲於皮膚。注於肌肉。而發腫矣。其狀。目胞上下微起。肢體重著。麪嗡惡忡。股間清冷。小便澁黃。皮薄而光。手按成窟。舉手卽滿。是也。治法。身有熱者。水氣在裏。可下。其間通利小便。順氣和脾。俱不可緩。耳。證雖可下。又當權其重輕。不可過用芫花、大戟、甘遂猛烈之劑。一發不收。吾恐峻決者易。固閉者難。水氣復來而無以治之也。　風腫者。皮寬。麻木不仁。　走注疼痛。　氣腫者。皮厚。四肢瘦削。復脇脹膨。　其皮間有紅縷赤痕者。此血腫也。　婦人懷胎。亦有氣遏水道而虛腫者。此但順氣安脾。飲食無囫。旣產而腫自消。　大凡水腫。先起於腹。而後散四肢者。可治。　先起於四肢。而後歸於腹者。不治。　大便滑泄。與夫唇黑。缺盆平。臍突。足平。背平。或肉硬。或手掌平。又或男從脚下腫而上。女從身上腫而下。並皆不治。　若遍身腫。煩渴。小便赤澁。大便閉。此爲陽水。先以五皮散、或四磨飲。添麝生枳殼。重則疎鑿飲。　若遍身腫。不煩渴。大便溏。小便少。不澁赤。此爲陰水。宜實脾飲。或木香流氣飲。　陽水腫。敗荷葉燒灰存性。爲末。米飲調下。　若病可下者。以三聖散。大小虛實。與服。氣實者。三花神佑丸、舟車丸、禹功散、選用。　忌食羊頭蹄肉。其性極補水。食之百不一愈。

【附方】

加味五皮散　治四肢腫滿。不分陽水陰水皆可服
陳皮　桑白皮　赤茯苓皮　生薑皮
大腹皮各一錢　加薑黃一錢　木瓜一錢
右作一服。水煎。又方。去陳皮、桑白。用五加、地骨皮。

檳榔　茯苓皮等分。

右咬咀。水煎。薑五片。

大橘皮湯　消濕熱內攻。腹脹。水腫。小便不利。大便滑泄。

陳皮一兩。　木香二錢半。　滑石六兩。　檳榔三個。

茯苓一兩。　豬苓　　白朮　　澤瀉

肉桂各半兩。　甘草二錢。

生薑五片。水煎服。

十棗丸　治水氣。四肢浮腫。上氣喘急。大小便不利。

甘遂　大戟　芫花各等分。

右爲末。煮棗肉爲丸。桐子大。清晨熱湯下三十丸。以利爲度。次早再服。虛人不可多服。

又方　治虛腫。

大香附。不以多少。以童便浸一日夜。取出。另換童便。又浸一日夜。再取出。又換童便浸一日夜。擦去皮。曬乾。

右爲末。醋糊丸如梧子大。服七十丸。煎二十四味流氣飲送下。

嚴氏實脾散

厚朴制　白朮

附子　木香

乾薑炮各一兩。　甘草炙半兩。

右咬咀。薑五片。棗一枚。煎服無時。

木香流氣飲　見氣類。

四磨飲　見喘類。

三花神祐丸　舟車丸　並見中濕類。

禹功散

黑牽牛頭末四兩。　茴香炒一兩。

右爲末。生薑自然汁調一二錢。臨睡服。或加白朮一兩。

加味枳朮湯　治氣爲痰飲閉隔。心下堅脹。名曰氣分。

枳殼　白朮

陳皮　檳榔

五靈脂炒各二分　半夏

右以水煎。薑三片。

○胎水證。凡婦人宿有風寒冷濕。妊娠喜脚腫。亦有通身腫滿。心腹急脹。名曰胎水。

二十四味流氣飲　見氣類。

鼓脹三十九

○鼓脹又名單鼓。宜大補中氣行濕。此乃脾虛之甚。必須遠香藥。斷厚味。大劑人參、白朮佐以陳皮、茯苓、苡朮之類。有血虛者。用四物湯行血藥。有脈實堅人壯盛者。或可攻之。便可收拾。用參、朮爲主。凡補氣。必兼厚朴寬滿。厚朴治腹脹。因味辛以氣聚於下。焦故也。須用薑汁制之。如肥胖之人腹脹者。宜平胃、五苓共服之。如白人腹脹者。是氣虛。宜參、朮、厚朴、陳皮。如瘦人腹脹者。是熱。宜黃連、厚朴、香附、白芍。加因有故畜血而腹脹者。宜抵當丸。下死血。如因有食積而腹脹者。有寒。用木香、厚朴、丁香、砂仁、神麯、香附。如因外寒鬱內熱而腹脹者。用藿香、麻黃、升麻、乾葛、桂枝。因大怒而腹脹者。宜青皮、陳皮、香附、木香、梔子仁、蘆薈。實者。按之不痛。治須實者下之。消之。次補之。虛者溫之。升之。補爲要。朝宽暮急。血虛。暮寬朝急。氣虛。終日急。氣血皆虛。腹脹不覺滿者。食肉多。以黃連一兩。阿魏半兩。醋浸。蒜餅爲丸。同溫中丸、白朮湯下。　食肉多腹脹。三補丸料內加香附、半夏麴、蒸餅丸服。

〔附錄〕心肺陽也。居上。腎肝陰也。居下。脾居中。亦陰也。屬土。經曰。飲食入胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。是脾具坤靜之德。而有乾健之運。故能使心肺之陽降。腎肝之陰升。而成天地交之泰。是爲無病。今也七情內傷。六淫外侵。飲食不節。房勞致虛。脾土之陰受傷。轉運之官失職。胃雖受穀。不能運化。故陽自生。陰自降。而成天地不交之否。清濁相混。隧道壅塞。變而爲熱。熱留爲濕。濕熱相生。遂成脹滿。經曰。鼓脹是也。以其外雖堅滿。中空無物。有似於鼓。其病膠固難以治療。又名曰蠱。若蟲侵蝕之義。理宜補脾。又須養脾金以制木。木以制火。使肺得清化。却厚味。斷妄想。遠音樂。無有不安。醫又不察虛實。急於行利藥。以求通快。不知覺得一日半日。其腹愈甚。病邪甚矣。真氣傷矣。古方惟禹餘糧丸。又名紫金丸。制肝補脾。殊爲切當。

【附方】

中滿分消丸　治中滿鼓脹。水氣脹。大熱脹。並皆治之。

黃芩　枳實炒　半夏

姜黃　白朮　人參

豬苓各一錢。　厚朴製一兩。　茯苓

澤瀉　陳皮各三錢。　知母四錢。

右爲末。水浸蒸餅丸。如梧子大。每服百丸。焙熱。白湯下。食後。塞因熱用。故焙服之。

廣茂潰堅湯　中滿腹脹。內有積塊。堅硬如石。令人坐臥不安。大小便澀滯。上氣喘促。遍身虛腫。

黃連炒各五錢。

甘草

砂仁各二錢。

乾生薑二錢。

右爲末。水煎。空心服。

厚朴　黃芩
當歸各五錢　黃連六錢
升麻　見脾胃
柴胡　見中暑

挫當丸

水蛭七個　　瘧虫八個　　桃仁七個

右爲末、分作四丸、水一盞、煎一丸、取七分、溫服、當下血、未下再服、

紺珠木香槟榔丸

木香　　槟榔　　當歸　　黃連
枳殼　　青皮　　黃柏各一兩　　黃芩
陳皮　　三稜　　香附　　牛末各二兩
莪朮　　大黃各四兩

右爲末、麵糊丸、梧子大、每服五七十丸、臨臥薑湯下、尋常消導開胃、只服三四十丸、溫中丸　見積類、三補丸　見補損、

小便不通四十

○小便不通有氣虛　血虛　有痰　風閉　實熱氣虛、用參芪、升麻等、先服後吐、或參芪藥中探吐之、血虛四物湯、先服後吐、或芎歸湯中探吐亦可、痰多二陳湯、先服後吐、已上皆用探吐、若痰氣閉塞、二陳湯加木通、一作木香、香附探吐之、以提其氣、氣升則水自降下、蓋氣承載其水也、有實熱者當利之、砂糖湯調牽牛末二三分、或山梔之類、有熱有濕有氣結於下、宜清宜燥宜升、有孕之婦多患小便不通、胞被胎壓下故也、轉胞論用四物湯加參芪、半夏、陳皮、甘草、薑棗煎湯、空心服、一婦人脾瘕後、患大小便不通、此是痰隔中焦、氣滯於下焦、以二陳湯加木通、初喫後、煎枳吐之、

〔附錄〕腎主水、膀胱爲之府、水瀦於膀胱、而泄於小腸、實相通也、然小腸獨聽於心者、何哉、蓋陰不可以無陽、水不可以無火、水火既濟、上下相交、此榮衛所以流行、而水竇開闔所以不失其司耳、惟夫心腎不交、陰陽不調、故內外關格而水道澁、傳送失度而水道滑、熱則不通、冷則不禁、其熱盛者、小便閉而絕無、其熱微者、小便難而僅有、腎與膀胱俱虛、客熱乘之、故不能制水、水挾熱而行澁、爲是以數起而溺有餘瀝、腎與膀胱俱冷、內氣不充、故胞中自滑、所出多而色白、爲是以過夜陰盛愈多矣、小便澁滑、又當調適其氣歟、

【附方】

草蜜湯　治心腎有熱、小便不通、

生車前草、搗取自然汁半盞、入蜜一匙、調下、

蒲黃湯　治心腎有熱、小便不通、

益智　草豆寇
半夏七錢　廣茂
吳茱萸各二錢　甘草生、
神麯炒、　青皮

陳皮各三錢　　渴者加葛根四錢

右每服七錢、生薑三片、煎服、

紫蘇子湯　治憂思過度、致傷脾胃、心腹脹滿、喘促煩悶、腸鳴氣走、漉漉有聲、大小便不利、脈虛緊而澁、

蘇子一兩　　大腹皮　　半夏　　草果
厚朴　　木香　　陳皮　　木通
白朮　　枳實　　人參　　甘草各半兩、

右水煎、生薑三片、棗一枚、

人參葛歸湯　治血脹煩燥、水不嗽、迷忘、小便多、大便異、或虛厥逆、婦人多有此證、

當歸　　半夏七錢半、　　川芎一兩、　　蓬朮
木香　　砂仁　　白芍　　甘草炙各半兩、
大參　　桂心　　五靈脂炒各二錢半、

右水煎、生薑三片、棗一枚、紫蘇四葉、

禹餘糧丸　治中滿氣脹、喘滿及水氣脹、

蛇含石大者三兩、以鐵銚盛、入炭火中煅、令通赤、鉗出銚子、傾醋於淨磚地上、候冷、研極細、

眞針砂五兩、先以水淘淨、焙乾、更以鐵銚子炒乾、入禹餘糧一處、用水醋二升、就銚內炙、令醋乾爲度、

二陳湯加木通、一作木香、香附探吐之、以提其氣、氣升則水自降下、蓋氣承載其水也、有實熱者當利之、

砂糖湯調牽牛末二三分、或山梔之類、有熱有濕有氣結於下、宜清宜燥宜升、有孕之婦多患小便不

通、胞被胎壓下故也、轉胞論用四物湯加參芪、半夏、陳皮、甘草、薑棗煎湯、空心服、一婦人脾瘕後、患大

小便不通、此是痰隔中焦、氣滯於下焦、以二陳湯加木通、初喫後、煎枳吐之、

〔附錄〕腎主水、膀胱爲之府、水瀦於膀胱、而泄於小腸、實相通也、然小腸獨聽於心者、何哉、蓋陰不可

以無陽、水不可以無火、水火既濟、上下相交、此榮衛所以流行、而水竇開闔所以不失其司耳、惟夫心

腎不交、陰陽不調、故內外關格而水道澁、傳送失度而水道滑、熱則不通、冷則不禁、其熱盛者、小便閉

而絕無、其熱微者、小便難而僅有、腎與膀胱俱虛、客熱乘之、故不能制水、水挾熱而行澁、爲是以數起

而溺有餘瀝、腎與膀胱俱冷、內氣不充、故胞中自滑、所出多而色白、爲是以過夜陰盛愈多矣、小便澁

滑、又當調適其氣歟、

【附方】

草蜜湯　治心腎有熱、小便不通、

生車前草、搗取自然汁半盞、入蜜一匙、調下、

蒲黃湯　治心腎有熱、小便不通、

半胃散　見脾胃、
五苓散　見中暑、

挫當丸

水蛭七個　　瘧虫八個　　桃仁七個

右爲末、分作四丸、水一盞、煎一丸、取七分、溫服、當下血、未下再服、

紺珠木香槟榔丸

木香　　槟榔　　當歸　　黃連
枳殼　　青皮　　黃柏各一兩　　黃芩
陳皮　　三稜　　香附　　牛末各二兩
莪朮　　大黃各四兩

右爲末、麵糊丸、梧子大、每服五七十丸、臨臥薑湯下、尋常消導開胃、只服三四十丸、

溫中丸　見積類、
三補丸　見補損、

小便不通四十

○小便不通有氣虛　血虛　有痰　風閉　實熱氣虛、用參芪、升麻等、先服後吐、或參芪藥中探吐之、血虛四物湯、先服後吐、或芎歸湯中探吐亦可、痰多二陳湯、先服後吐、已上皆用探吐、若痰氣閉塞、二陳湯加木通、一作木香、香附探吐之、以提其氣、氣升則水自降下、蓋氣承載其水也、有實熱者當利之、砂糖湯調牽牛末二三分、或山梔之類、有熱有濕有氣結於下、宜清宜燥宜升、有孕之婦多患小便不通、胞被胎壓下故也、轉胞論用四物湯加參芪、半夏、陳皮、甘草、薑棗煎湯、空心服、一婦人脾瘕後、患大小便不通、此是痰隔中焦、氣滯於下焦、以二陳湯加木通、初喫後、煎枳吐之、

〔附錄〕腎主水、膀胱爲之府、水瀦於膀胱、而泄於小腸、實相通也、然小腸獨聽於心者、何哉、蓋陰不可以無陽、水不可以無火、水火既濟、上下相交、此榮衛所以流行、而水竇開闔所以不失其司耳、惟夫心腎不交、陰陽不調、故內外關格而水道澁、傳送失度而水道滑、熱則不通、冷則不禁、其熱盛者、小便閉而絕無、其熱微者、小便難而僅有、腎與膀胱俱虛、客熱乘之、故不能制水、水挾熱而行澁、爲是以數起而溺有餘瀝、腎與膀胱俱冷、內氣不充、故胞中自滑、所出多而色白、爲是以過夜陰盛愈多矣、小便澁滑、又當調適其氣歟、

【附方】

草蜜湯　治心腎有熱、小便不通、

生車前草、搗取自然汁半盞、入蜜一匙、調下、

蒲黃湯　治心腎有熱、小便不通、

赤茯苓　木通　車前子
制苄　燈芯　赤芍
生滑黃　滑石等分

右爲末每服二錢。葱頭一根。紫蘇五葉。煎湯調服。

又方　治膀胱不利爲癃。癃者、小便閉而不通。八正散加木香以取效。或云滑石亦可。

又方　治小便不通。臍下兩陷。

海金沙一兩　臘茶半兩

右爲末每服三錢。生甘草湯調下。

又方　治小便不通。

雞子中黃一枚。服之不過三。

又方

炒鹽熨臍。小腹冷復易之。

又方　治忽小便久致胞轉。

自取爪甲燒飲服之。

又方　以滑黃裹患人腎。令頭至地。三度卽通。

又方　取陳久笨頭一枚。燒爲灰。和水服之。

萯歸湯　見腸風類。

二陳湯　見中風。

八正散　見淋。

小便不禁四十一

○小便不禁者。屬熱屬虛。熱者。五苓散加解毒。虛者。五苓加四物。

蔵云。小便不禁。出而不覺。赤者有熱。白者氣虛也。

〔附錄〕小便不禁。有虛熱虛寒之分。內虛寒自汗時出。小便不禁。陽衰足冷。眞氣不足。或八味丸加杜仲、骨脂五味　老人宜八味丸減澤瀉爲效。

【附方】

秘元方　助陽消陰。正氣溫中。內虛裏寒。冷氣攻心。腹痛泄瀉。自汗時出。小便不禁。陽衰足冷。眞氣不足。一切虛冷。

白龍骨三兩燒　訶子十箇炮去核　砂仁一兩　鹽砂二兩

右四味爲末。煮糯米粥丸如麻子大。空心溫酒送下二丸。臨臥冷水送下三丸。忌葱茶葵菜物。

腰腎丸　治腎虛多溺。或小便不禁而濁。

胡盧巴炒　故紙炒　川練肉杜仲炒去粗鱗熟下

益智　鹿茸酒炙　山茱萸

赤石脂各七錢半　龍骨　海螵蛸

丁香　沉香　乳香各五錢

右爲末。糯米粥丸如梧子大。服五十丸。煎菖蒲湯空心送下。

三因家韭子丸　治下元虛冷。小便不禁。或成白濁。

韭子六兩炒　鹿茸四兩酥炙　菟絲酒浸

熟苄　當歸各二兩　巴戟去心

杜仲　石斛　桂心

右爲末。酒糊丸如梧子大。每服一百丸。空心湯酒任下。

六味地黃丸　見補損。

八味丸　見補損。

關格四十二

○關格。必用吐。提其氣之橫格。不必在出瘕也。　有痰宜吐者。二陳湯吐之。吐中便有降。

蔵云。關格者。謂腸中覺有所礙。欲升不升。欲降不降。欲食不食。此謂氣之橫格也。

淋四十三

○淋有五。皆屬乎熱。解熱利小便。山梔子之類。山梔子去皮一合。白湯送下。

蔵云。淋者、小便淋瀝。欲去不去。又來。皆屬於熱也。

【入方】　治老人氣虛而淋者。

人參　白朮　木通

地髓湯　治死血作淋。痛不可忍。此證亦能損胃不食。

杜牛膝一兩

右以水五鍾煎。耗其四而留其一。去滓。入麝香少許。空心服之。又只單以酒煎亦可。又名苦杖散。老人虛寒者。八味丸或六味地黃丸爲要藥。

又方　治氣虛而淋者。

八物湯加黃芪、虎杖、甘草煎湯服。諸藥中可加牛膝。

〔附錄〕諸淋所發。皆腎虛而膀胱生熱也。水火不交。心腎氣鬱。遂使陰陽乖舛。清濁相干。蓄在下焦。故膀胱裏急。溺血砂石。從小便道出焉。於是有欲出不出、淋瀝不斷之狀。甚者窒塞其間。則令人悶絕矣。

代赭燒醋淬七次另研

熟艾醋拌炙焦

禹餘糧煅醋淬七遍牛

牛膝

菟絲子酒浸各一兩半

乾薑炮各一兩

大凡小腸有氣則小便脹。小腸有血則小便痛。痛者爲血淋。不痛者爲尿血。敗精結者爲沙。精結散者爲膏。金石結者爲石。小便澁常有餘瀝者爲氣。揣本探原。各從其類也。執劑之法。並用流行滯氣。疎利小便。清解邪熱。其於調平心火。又三者之綱領焉。心清則小便自利。心平則血不妄行。故不可用補氣之藥。氣得補而愈脹。血得補而愈澁。熱得補而愈甚。水資不行。加之谷道閉塞。未見其有能生者也。雖然。腎氣虛弱。藏中受寒。亦有挾冷而小便淋澁。其狀。先寒戰而後溲便。蓋冷氣與正氣交爭。冷氣盛則寒戰。解而得便溺也。又有胞系轉戾之不通者。是不可不辨。胞轉證辭下急痛。小便不通。凡强忍小便。或尿急疾走。或飽食忍尿。飽食走馬忍尿入房。使水氣上逆。氣迫於胞。故胞戾而不得舒張也。胞落則殂。

○淋閉古方爲癃。癃者。罷也。不通爲癃。不約爲遺。小便滴瀝澁痛者謂之淋。小便急痛不通者謂之閉。宜五苓散、燈心湯調服。若臍下脹滿。更加琥珀末一錢。甚效。

有淋病下諸通利藥不能通者。或用木香流氣飲。或別用通氣香劑緩愈者。此乃氣淋。出於冷熱淋之外。血淋一證。須看血色分冷熱。色鮮者。心小腸實熱。色淡者。腎肺虛冷。若的是冷淋及下元虛冷。血色瘀者。並宜漢椒根剉碎。不以多少。白水煎。後冷服。若熱極成淋。服藥不效者。宜減桂五苓散。加木通、滑石、燈心、甘草、各少許。蜜水調下。

【附方】

二神散　治諸淋急痛。

海金砂七錢半　滑石半兩

右爲末。每服二錢半。多用燈心、木通、麥門冬煎。入蜜少許。調下。

五淋散　治諸淋。

赤茯苓　　赤芍　　山梔仁　　生甘草七錢半。

當歸　　加黃芩五錢

每服五錢。水煎。空心服。

車前子散　治諸淋。小便痛不可忍。

車前子不拘半兩　　淡竹葉　　剉芩穗各五錢。　　赤茯苓

燈心各二錢半。

右作二服。水煎。

又方　治小腸有熱。血淋急痛。

生車前草洗淨。臼內搗細。每服准一盞許。井水調。搾清汁。食前服。　若沙淋。則以煅寒水石爲末。水調服。

茯苓調血湯　治酒麴過度。房勞後。小便下血。

赤茯苓一兩。　　赤芍　　川芎

前胡　　柴胡　　青皮

北梗　　桑皮　　白茅根

甘草炙。各二錢半。

每服三錢。薑三片。蜜一匙。水煎服。

沙石淋方

黑豆一百二十粒　　生粉草一寸

右以水煎。乘熱入滑石末一錢。空心服。

木香湯　治冷氣凝滯。小便淋澁作痛。身體冷。

木香　　木通　　檳榔

當歸　　赤芍　　青皮

橘皮　　甘草

右每服三錢。薑三片。入桂少許。煎服。

又方　治小便淋痛。下沙石。或赤澁。

萱草根

右用一握。搗取汁服。　或嫩苗煮食之。亦可。

又方　治卒淋痛。

益元散二錢。茴香一錢。微炒黃。

右爲末。水煎服。

又方　治淋塞中痛。其肝經氣滯有熱。

甘草梢子一咪。

右用水煎。空心服。

又方　治苦病淋。而塞中痛不可忍者。

六君子湯、或四君子湯加黃柏、知母、滑石、石葦、琥珀、煎服。　方見脾胃類。

博濟方　治五淋。

赤芍藥一兩　　檳榔一箇。細銼。煨

右爲末。每服一錢。水煎。空心服。

又方　治熱淋血淋效。

赤小豆不以多少。炒熱

右爲末。每服二錢。煨葱一根。溫酒調服。

通秘散　治血淋痛不可忍。

陳皮　香附　赤芍等分。

右剉散。每服二錢。水煎。空心服。

白薇散　治血淋、熱淋。

白薇　赤芍等分。

右爲末。每服二錢。溫酒調下。立效。或加檳榔。

凝灰散　治血淋。若單小便出血。爲莖劇。皆主之。

亂髮不以多少。燒灰。入麝香少許。每服用米醋泡湯調下。治淋。以葵子末等分。用米飲空心調下。最治婦人胞轉不尿。

沉香散　治氣淋。多因五內鬱結。氣不舒行。陰滯於陽。而致壅滯。小腹脹滿。便溺不通。大便分泄。小便方利。

沉香　石葦去毛。滑石　當歸各半兩　葵子　芍藥七錢半。

陳皮二錢半。

右爲末。每服二錢半。煎大麥湯調下。

又方　治淋。

人參一錢。　白朮一錢半。　澤瀉七分。

赤茯苓七分。　甘草半錢。　滑石半錢。

燈心二十莖。

右剉。作一服。水煎。　又方。海金沙七錢半。滑石五錢。煎木通麥門冬車前草湯服二錢。

生附湯　治冷淋。小便祕澁。數起不通。窠中苦痛。增寒潮熱。心虛志耗。皆有此證。

附子去皮臍　滑石各半兩。　陽炙　木通七錢半。

半夏

右剉散。每服三錢。水一鍾。生薑三片。燈心二十莖。煎空心服。

八正散　治大人小兒心經蘊熱。腑府祕結。小便赤澁。癰閉不通。熱淋血淋並宜。

車前　瞿麥　黃芩　滑石

甘草　山梔　木通　大黃麵裹煨各等分。

燈心二十莖。

右每服五錢。水煎。空心服。

滑心逐子飲　治上盛下虛。心火炎上。口苦咽乾。煩渴微熱。小便赤澁。或欲成淋。

黃芪　石斛肉　白茯苓　人參各七錢半。

黃芩　甘草炙　地骨皮　麥門冬

車前子各五錢。

右每服五錢。水煎。發熱加柴胡、薄荷。

又方　治諸淋。

五苓散二錢。　益元散一錢。　燈心三十莖。

右水煎。空心服。或云益元散只加車前末一錢。又或去前二件。只加阿膠末一錢。

又方　治熱淋、血淋。

麻根十箇。

右以水四碗。煎去三。留一。空心服。甚效。

又方　治淋疾。

石燕子十箇。搗如黍米大。　新桑白皮三兩。剉。同作一劑。

右將二物分作七貼。每用水一鍾。煎七分。去粗。空心午前至夜各一服。

參茯琥珀湯　治淋莖中痛不可忍。相引臍下痛。

人參五分。　茯苓四分。　琥珀三分。

生甘草一錢。　玄胡索七分。　澤瀉

當歸梢三分。

右作一服。長流水煎。空心服。

灸法　治小便淋澁不通。用食鹽不以多少。炒熱。放溫。填臍中。却以艾灸七壯。卽通。

八味丸　見諸補損。

六味地黃丸　八物湯　並見補損。

五苓散　見中暑。

木香流氣飲　見氣類。

赤白濁四十四

○濁主濕熱。有痰。有虛。赤屬血。白屬氣。赤白相雜同治。寒則堅凝。熱則流通。大率皆是濕痰流注。宜燥中宮之濕。用二陳加蒼朮、白朮、燥去其濕。赤者。乃是濕傷血也。加白芍藥。仍用珍珠粉丸加臭椿根白皮、滑石、青黛作丸藥。虛勞用補陰藥。大概不宜熱一作涼藥。肥白人必多痰。以二陳湯去其濕熱。胃弱者。兼用人參。以柴胡、升麻。升其胃中之氣。丸藥用黃柏炒褐色、乾薑炒微黑、滑石、蛤粉、青黛、糊丸服。胃中濁氣下流。爲赤白濁。用二陳加柴胡、升麻、蒼朮、白朮。丸藥用樗皮末、蛤粉、炒乾薑、炒黃

柏。胃中濁氣下流。滲入膀胱。青黛、蛤粉。肝脈弦者。用青黛以瀉肝。又方。炒黃柏一兩。生柏一兩。滑石三兩。神麯半兩。爲末。滴水丸。青黛爲衣。有熱者。青黛、活石、黃柏之類。水丸。張子元氣血兩虛。有痰。痛風時作。陰火間起。小便白濁方。在痛風類。一人便濁經年。或時夢遺。形瘦。作心虛主治。用珍珠粉丸。和定志丸服。一婦人年近六十。形肥。奉養膏粱。飲食肥美。中焦不消。濁氣流入膀胱。下注白濁。白濁、即濕痰也。用二陳去痰。加升麻、柴胡、升胃中清氣。加蒼朮、去濕。白朮、補胃。全在活法。服四貼後。濁減大半。却覺胸滿。因柴胡、升麻、升動胃氣。痰阻痞悶。又用本湯加炒麯、白朮香。附案無痰者。雖升動不滿也。

【入方】

青黛　蛤粉　椿末　滑石

乾薑炒　黃柏炒。褐色。

右爲末。神麯糊丸。仍用前燥濕痰丸子。亦治帶下病。

法云。黃柏治濕熱。青黛解鬱熱。蛤粉鹹寒入腎。滑石利竅。乾薑味苦。斂肺氣下降。使陰血生。乾薑監制。

又方

黃柏炒黑。一兩　生柏二兩。一云生半。　蛤粉三兩。　神麯半兩。

右爲末。水丸服。

【附錄】人之五藏六府。俱各有精。然腎爲藏精之府。而聽命於心。貴乎水火升降。精氣內持。若關攝失宜。思慮不節。嗜欲過度。水火不交。精元失守。由是而爲赤白濁之患。赤濁是心虛有熱。因思慮得之。白濁腎虛有寒。過於淫慾而得之。其狀漩白如油。光彩不定。漩脚澄下。凝如膏糊。治法。赤者當清心調氣。白者溫補下元。又須清上。使水火既濟。陰陽叶和。精氣自固矣。

【附方】

定志丸方　人參　白茯苓各三兩。

遠志去心　石菖蒲各二兩。

右爲末。蜜丸梧子大。朱砂爲衣。每服七丸。加至二十丸。空心米湯送下。

半夏丸　治白濁神效。

半夏煙潤　豬苓分水。　肝脈弦。加青黛。

右爲末。別研乾山藥末六兩。將所浸酒餘者。添酒煮糊。搜和。搗數千杵。丸如梧子大。每服五十丸。米飲空心下。

附子八味丸　見補損。

夢遺四十五　附精滑

○專主乎熱。帶下與脫精同治法。青黛、海石、黃柏。內傷。氣血虛。不能固守。常服八物湯加減。吞椿樹根丸。思想成病。其病在心。安神丸帶補藥。熱則流通。知母、黃柏、蛤粉、青黛、爲丸。精滑。專主濕熱。黃柏、

益志　川萆薢　烏藥等分。

右銼。每服五錢。水煎。入鹽一捻。食前服。一方加茯苓、甘草。

茯菟丸　治思慮太過。心腎虛損。眞陽不固。便溺餘瀝。小便白濁。夢寐頻泄。

菟絲子五兩。　白茯苓三兩。　石蓮肉二兩。

右爲末。酒糊丸如梧子大。每三十丸。空心鹽湯下。

瑞蓮丸　治思慮傷心。小便赤濁。

白茯苓　蓮肉　龍骨

麥門冬　遠志去心。　柏子仁另研。

菖蒲酒浸。　酸棗仁炒。　龍齒各一兩。

右爲末。蜜丸梧子大。朱砂爲衣。服七十丸。空心溫酒棗湯任下。

又方　治小便白濁出髓條。

酸棗仁炒。　白朮　人參

茯神炒。　益智　大茴香

右爲末。青鹽酒爲丸。梧子大。每三十丸。溫酒下。

又方　心經伏暑。小便赤濁。

人參　白朮　赤茯苓

澤瀉　豬苓　蓮肉去心。

右剉。水煎服。

珍珠粉丸　治白濁夢泄遺精。及滑出而不收。

眞蛤粉一斤。　黃柏一斤。新瓦上炒赤。

右爲末。滴水丸。梧子大。每服一百丸。空心溫酒送下。　法曰。陽盛陰虛。故精泄也。黃柏降心火。蛤粉鹹而補腎陰。

玄菟丹　五味子酒浸。研末。七兩。白茯苓

菟絲子酒浸。研婚取末。十兩。

蓮肉各三兩。

右爲末。別研乾山藥末六兩。將所浸酒餘者。添酒煮糊。搜和。搗數千杵。丸如梧子大。每服五十丸。米飲空心下。

附子八味丸　見補損。

夢遺四十五　附精滑

○專主乎熱。帶下與脫精同治法。青黛、海石、黃柏。內傷。氣血虛。不能固守。常服八物湯加減。吞椿樹根丸。思想成病。其病在心。安神丸帶補藥。熱則流通。知母、黃柏、蛤粉、青黛、爲丸。精滑。專主濕熱。黃柏、

天門冬　白茯苓

紫石英火煅七次。另研　左顧牡蠣煅。各等分。

乳香半兩。研。

白茯苓　香附

天門冬去心等分。　麥門冬去心等分。

知母、降火、牡礪粉、蛤粉、燥濕。

錢云因夢交而出精者，謂之夢遺。不因夢而自泄精者，謂之精滑。皆相火所動。久則有虛而無寒也。

【入方】

良姜三錢　　黃柏二錢

右爲末，糊丸，每服三十丸。

【附錄】遺精得之有四。有用心過度，心不攝腎，以致失精者。有因思色慾不遂，強乃失位，輸精而出者。有慾太過，滑泄不禁者。有年高氣盛，久無色慾，精氣滿溢者。然其狀不一。或小便後出多不可禁者。或不小便而自出。或莖中出而痒痛，常如欲小便者。並宜先服辰砂妙香散，或盛喜丸，或分清飲。別以綿裹龍骨、牡蠣粉、白茯苓、五味子各半錢，煎服。

夢遺俗謂之夜夢鬼交。宜溫膽湯去竹茹，加人參、遠志、連肉、酸棗仁、炒茯神各半錢。

【附方】

妙香散　見濁血類。

盛喜丸

黃蠟四兩，作塊，用麝香一分，同於磁器內煮二十沸，取出日乾，不用猪苓

白茯苓去皮，四兩

右以茯苓爲末，溶蠟，搜丸如彈子大，每服一丸，空心細嚼，津液嚥下，小便清爲度，忌米醋。

八物湯　見補損。

分清飲　見濁類。

檀樹根丸　即固腸丸。見婦人。

安神丸　即癎。

溫膽湯

半夏　　枳殼各一兩。

陳皮一兩半。

右㕮咀，每服四錢，水盞半，薑七片，棗一枚，竹茹一塊，煎七分，去粗，食前熱服。

消渴四十六

○消渴，養肺、降火、生血爲主。分上中下治。三消皆禁用半夏。血虛亦忌用。口乾、咽痛、腸燥、大便難者，亦不宜用。汗多者不可用。不已，必用鹽監制。消渴若泄瀉，先用白朮、白芍藥炒，爲末，調服，後却服前藥。

右爲末，用山藥六兩爲末，作糊和丸梧子大，每服五十丸，米湯下。

麥門冬飲子　治腦消，胸滿煩心，津液乾少，短氣而渴。

知母　　甘草炙

人參　　葛根　　瓜蔞

麥門冬去心，各等分。

右㕮咀，水煎，入竹葉十四片。

加味饒氏白朮散　治消渴不能食。

人參　　白朮　　白茯苓

枳殼炒，各半錢　　藿香一錢

五味　　柴胡三分。

石蓮肉三兩

五味子

茯神

甘草炙

木香

右作一服。水煎服。

地黃飲子　治消渴。咽乾。面赤。煩燥。

甘草炙　人參　生卡　熟卡
黃芪　天門冬　麥門冬去心　澤瀉
石斛　枇杷葉炒

右每服五錢。水煎服。

加減八味丸　治腎虛消渴引飲。

本方內減附子、加五味子。要略。治男子消渴。小便反多者。仍用本方。方見補損。

清心蓮子飲　治渴而小便反濇。

黃芩　麥門冬　地骨皮　車前子
甘草各三錢。　蓮子　茯苓　黃芪
柴胡

右㕮咀。水煎服。

人參各三錢半。

川黃連丸　治渴。

川黃連五兩。　天花粉　麥門冬去心各二兩半。

右爲末。生地黃汁拌牛乳夾和。搗丸梧子大。服三十丸。粳米湯送下。

玉泉丸　治煩渴口乾。

麥門冬去心　人參　茯苓
烏梅燒　甘草各一兩。　瓜蔞根

右爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。溫湯嚥下。

白虎加人參湯　見中暑。

調胃承氣湯　見痢類。

三黃丸

黃連去鬚　黃芩　大黃煨各等分。

右爲末。煉蜜丸梧子大。每服四十丸。熟水下。

六味地黃丸　見補損。

發熱四十七　附胸中煩熱　虛勞　虛煩不眠

○陰虛發熱證難治。戴云。凡服數而無力者。便是陰虛也。四物湯加炒黃柏、黃芩、龜板。兼氣虛。加人參、黃芪、黃芩、白朮。四物湯加炒黃柏。是降火補陰之妙劑。若有痰者。必加龜板。喫酒人發熱。難治。不飲酒人因酒發熱。用青黛、瓜蔞仁。入薑汁。每日數匙入口中。三日自愈。陽虛發熱。補中益氣湯。手足心熱。屬熱。俱用火鬱湯。傷寒表熱。當川芎散。發熱惡風。人壯氣實者。宜先解表。發熱惡寒。亦宜解表。若朮虛人用若朮。恐燥。發熱惡風。人壯氣實者。宜先解表。發熱惡寒。亦宜解表。

【入方】

若朮半兩　片芩三錢　甘草一錢半。

右爲末。湯浸。炊餅丸服。

治手心發熱。

山梔　香附　或加若朮
半夏生用。　川芎

右爲末。神麴糊丸服。

治煩不得眠。

六一散加牛黃。

治大病後陰虛。氣鬱夜熱。

酒芩藥一兩二錢半。　香附一兩。　若朮半兩。
甘草一錢半。

右爲末。炊餅丸服。

炒片芩三錢。

炒黃連半兩。　香附二兩半。

右爲末。用瓜蔞穰丸。

溫瘧夜發熱。

以三補丸加白芍藥爲末。見補損。

退勞熱食積痰。

上甲　下甲　側柏
半夏　黃連　黃芩

右爲末。炊餅爲丸。

胸中煩熱。須用梔子仁。有實熱面煩燥者。亦用梔子仁。有虛熱面煩燥者。宜參、芪、麥門冬、白茯苓、竹茹、白芍藥。若脈實數有實熱者。神芎丸。

○虛熱用黃芪。止虛汗亦然。又云。肌熱及去痰者。須用黃芩。肌熱亦用黃芪、黃芩、白朮。四物湯加炒柏。如肥白之人發熱。宜人參、芪、芩、藥、浮小麥炒。止虛汗同。補中益氣湯。治虛中有熱。或肌表之熱。

【附方】

火鬱湯

升麻　葛根
防風　甘草各五錢
右㕮咀。每五錢。入連鬚葱白三寸。煎稍熱。不拘時。

補中益氣湯　見內傷

神芎丸

大黃　黃芩
右爲末。滴水爲丸。

滑石　柴胡

惡寒四十八　附面熱面寒

○陽虛則惡寒。用參芪之類。甚者加附子少許。以行參芪之氣。一婦人惡寒。用苦參、赤小豆、各一錢爲末。溲水調服。探吐之後。用川芎、南星、蒼朮、酒炒黃芩爲末。麵糊丸。服五六十九。白湯下。冬月芩減半。加薑汁調麵煮糊丸。虛勞。冬月惡寒之甚。氣實者可利。亦宜解表。柴胡、乾葛。惡寒久病。亦用解表。戴云。凡背惡寒甚者。脈浮大而無力者。是陽虛也。

○面熱火起。寒慄熱。面寒退胃熱。

〔附錄〕內經云。面熱者、手陽明病。陽經氣盛有餘。則身已前皆熱。此經多血多氣。本實則風熱上行。諸陽皆會於頭。故面熱也。先以承氣湯加黃連、犀角、徹其本熱。次以升麻加黃連湯主之。

【附方】

升麻加黃連湯

升麻　葛根各一錢
白芍五分。　黃連酒炒。
薄荷一分。　生犀三分。

右作一服。水煎。升麻湯加黃連。治面熱。加附子。治面寒。

升麻附子湯　治陽明經本虛氣不足。則身已前皆寒。故面寒。

升麻　葛根一錢。
甘草炙。　草豆寇
益智三分。

右作一服。連鬚葱白同煎服。

白芷七分。　甘草炙。
川芎三分。　荊芥

承氣湯　見痢類。

自汗四十九

○自汗屬氣虛。血虛。濕。陽虛。痰。東垣有法有方。人參、黃耆、少佐桂枝。陽虛。附子亦可少用。須小便煮。火氣上蒸胃中之濕。亦能汗。涼膈散主之。痰症亦有汗。自汗大忌生薑。以其開腠理故也。

又方

何首烏末。津調封臍妙。

玉屏風散　治自汗。

防風　黃芪各一兩　白朮二兩。

右每服三錢。水一鍾半。薑三片。煎服。

大補黃芪湯　治自汗。虛弱之人可服。

黃芪蜜炙。　防風　川芎
當歸　白朮炒。　肉桂

五味　人參各一兩。　白茯苓一兩半。
肉從容

右每服五錢。薑三片。棗一枚。水煎服。

調衛湯　治濕勝自汗。補衛氣。虛弱。表虛不任風寒。

麻黃根　黃芪各一錢。　芜活七分。
歸梢　生黃芩　半夏各五分。
生芍各三分。　猪苓二分。　蘇木
五味七箇。

右使一服。水煎。熱服。

溫粉

牡礪　麥皮　麻黃根
糯米　防風　白芷

右爲末。周身撲之。

又方

何首烏末。津調封臍妙。

山茱萸肉
甘草炙。

生甘草
麥門冬
紅花各二分。

熟芍二兩。

薑本

黃芪建中湯

黃芪　肉桂各三錢　甘草二兩　白芍藥六兩
每服五錢。棗三片。姜一箇。入飴少許。水煎服。

涼腦散

連翹一兩　山梔　大黃　黃芩
薄荷葉各半兩　甘草一兩半　朴硝一分
右以水煎服。

盜汗五十

○盜汗屬血虛。陰虛。小兒不須治。忌用生薑。東垣有方。用當歸六黃湯。甚效。但藥性寒。人虛者只用黃芪六一湯。盜汗發熱。因陰虛。用四物加黃柏。兼氣虛加人參、黃芪、白朮。戴云。盜汗者。謂睡而汗出也。不睡則不能汗出。方其睡熟也。湊湊然出焉。覺則止而不復出矣。非若自汗而自出也。雜病盜汗。責其陽虛。與傷寒盜汗非比之。亦是心虛所致。宜飲心氣。益腎水。使陰陽調和。水火升降。其汗自止。

【附方】

當歸六黃湯　治盜汗之神劑。

當歸　生苄。　熟苄　黃連
黃芩　黃柏　黃芪加倍。
右用五錢。水煎服。　或加甘草、麻黃根、炒梔子。去歸。

黃芪六一湯

黃芪六兩。　甘草一兩。
右各用蜜炙十數次。出火毒。每服一兩。水煎。

又方

白朮四兩。分作四分。　一分用黃芪同炒。　一分用石斛同炒。　一分用牡蠣同炒。　一分用麥皮同炒。
右各微炒黃色。去餘藥。只用白朮研細。每服三錢。粟米湯調下。壺四兩妙。

正氣湯　治盜汗。

黃柏炒。　知母炒各一錢半。　甘草炙。五分。
右作一服。水煎。食前熱服。

麥煎散　治榮衛不調。夜多盜汗。四肢煩疼。肌肉消瘦。

知母　石膏　甘草炙。　滑石

地骨皮　赤芍　草薢
人參　白茯苓　麻黃根
右爲末。每服一錢。煎浮麥湯調下。

又方　治別處無汗。獨心孔一片有汗。思慮多則汗亦多。病在用心。宜養心血。以艾煎湯。調茯苓末一錢服之。名曰心汗。又青桑第二葉。焙乾爲末。空心米飲調服。最止盜汗。

補損五十一

大補丸　去腎經火。燥下焦濕。治筋骨軟。氣虛以補氣藥下。血虛以補血藥下。並不單用。
川黃柏炒褐色
右以水丸服。

龍虎丸　補下焦。

白芍　陳皮各二兩　預陽
虎骨酒浸酥炙。各一兩。知母酒炒。　熟苄各三兩。
龜板四兩。酒浸酥炙。
右爲末。酒煮羊肉揭汁。丸服。冬月加乾薑半兩。

補腎丸　治痿厥之重者。湯使與大補丸同。此冬令之正藥。春夏去乾薑。

常歸各一兩半。
黃柏半斤。鹽炒。

乾薑二錢。　黃柏炒。　龜板一兩半。酒炙。
陳皮半兩。

右爲末。薑汁和丸。或酒糊丸。每服七十丸。白湯下。

補天丸　治氣血俱虛甚者。以此補之。多與補腎丸並行。若治虛勞發熱者。又當以骨蒸藥佐之。

紫荷車洗淨。用布絞乾。同前補腎丸搗細。焙乾。末。酒米糊丸。夏加五味子半兩。

虎潛丸　治痿與補腎丸同。

黃柏半斤。酒炒。　龜板四兩。酒炙。　知母二兩。酒炒。
陳皮　白芍各二兩。　預陽一兩半。
乾薑半兩。

右爲末。酒糊丸或粥丸。一方加金箔一片。一方用生地黃。搗言語者加山藥。龜板各等分。乾薑三分之一。酒糊丸。名補血丸。一方無乾薑。冬月方加有當歸一兩半。熟苄比前多一兩。餘同。

補虛丸

人參　白朮　山藥
預陽　滑石　枸杞

右爲末麵糊丸服。

湯藥　補心肝脾腎。

蓮肉去心　　枸杞
山藥炒　　預陽各等分。

右爲細末沸湯調服。若加酥油些少尤妙。

補陰丸

側柏　　黃柏
苦參三兩。　　黃連半兩　多加乾薑。

右爲末地黃膏丸梧子。

又方

黃柏半斤鹽酒炒　　知母酒浸炒
白芍炒　　陳皮
當歸各一兩半　　虎骨一兩酒浸炙
右爲末酒煮羊肉和丸。每服五十丸鹽湯下。多加乾薑半兩。

又方

下甲二兩　　黃柏炒

香附　　白芍各一兩。

右爲末酒糊丸。

又方

下甲二兩　　黃柏一兩。

右細切地黃酒蒸熟搗細丸。

又方

龜板二兩酒炙　　黃柏七錢半。
牛膝一兩。

右爲末酒糊丸。

又方

龜板二兩酒炙　　黃柏半兩。

右爲末酒糊丸。

又方　治抑結不散。

下甲五兩　　側柏一兩半。

右爲末豬汁浸地黃膏爲丸空心服。

三補丸　治上焦積熱泄五臟火。

黃芩　　黃柏　　黃連各等分。

右爲末蒸餅丸。

又方　治酒色過傷少陰。

黃柏炒一兩半　　黃連炒一兩　　條芩炒半兩。

多加乾薑炒黑色三錢　又加砂仁三錢五味五錢。

右用蒸餅丸。每三十丸。食前白湯下。

又方　治陰虛

人參一錢　　白朮三錢　　麥門冬半兩。

右作一服。水煎。吞補陰丸。

又方　治體弱肌肥。壯血虛脈大。

龜板二兩　　側柏七錢半酒浸　　生芐一兩半。
烏藥葉酒蒸七錢半。

右除生芐細切蒸晒。餘皆作末。同搗爲丸。以白朮四錢。香附一錢半。煎湯下。

又方　益少陰經血。解五臟結氣。

山梔子炒令十分有二分焦黑
右爲末以薑汁入湯煎飲之。此方甚驗於他方也。

五補丸

枸杞　　預陽各半兩　　續斷
兩頭尖二錢半。

右爲末糊丸。每服三十丸。淡鹽湯下。

預陽丸

龜板炙　　知母酒炒　　黃柏酒炒各一兩。
牛膝酒浸　　杜仲鹽炒　　預陽酒浸五錢。
續斷酒浸各二錢半　當歸　　地黃各三錢。

右爲末酒糊丸梧子大。服五十丸。

○諸補命門藥。須入血藥。則能補精。陽生陰長故也。陽藥若多。則散火。

補心丸

硃砂二錢五分。　　瓜蔞五錢。　　黃連三錢。

右爲末豬心血爲丸。

又方　寧心益智。

人參　茯苓
酸棗仁　遠志
右爲末。棗肉丸。

大補丸　降陰火。補腎水。

黃柏炒褐色　知母酒浸炒。各四兩。熟苄酒蒸。
右爲末。猪脊髓蜜丸。服七十丸。空心鹽白湯下。

濟陰丸

黃柏二兩七錢。鹽酒拌炒。　龜板炙。一兩三錢半
當歸一兩。酒洗。　知母一兩。酒炒。　虎骨七錢。酥炙。
牛膝一兩三錢半　山藥　　頭陽一兩。
杜仲炒。　白芍
故紙三錢半。炒。　兔絲子酒浸。兩三錢半。　砂仁
右爲末。以苄蓉加丸。每服七十丸。　枸杞五錢。

【附方】

龜板酥炙。各六兩。
熟苄酒蒸。

充按丹溪嘗並無補損專條。諸補陰藥。彙見于各症之下。楊氏類集于此。又取燥熱與陽諸方。混於其間。殊不知丹溪之補。乃滋陰益血之藥。與燥烈壯陽之劑。其意天壤懸隔。欲併去之。而用者既久。今明白疏出。俾觀者知其旨而自采擇焉。

十全大補湯　治男子婦人。諸虛不足。五勞七傷。

人參　肉桂　川芎
茯苓　白朮　甘草
當歸　白芍藥炒　地黃
黃芪

右剉。水煎。棗三片。服一鎮。

茯神湯　治脈虛極。或咳則心痛。喉中介介。或腫。

茯神　人參　遠志
麥門　黃芪　桔梗　甘草等分。

右剉。水煎。入棗三片。

金匱腎氣丸　即六味地黃丸。加桂附車前牛膝是金匱腎氣丸。此方名曰老六味丸。

治形體瘦弱。無力多困。腎氣久虛。久新憔悴。寢汗發熱。五臟齊損。瘦弱下血。

乾山藥　山茱萸肉各四兩　澤瀉　牡丹皮

白茯苓各三兩。　熟苄八兩。

右爲末。蜜丸梧子大。服五六十丸。空心溫水下。

三才封髓丹　降心火。益腎水。

天門冬　熟苄　人參各五錢。
砂仁一兩半。　甘草七錢半。一方無。

右爲末。水糊丸梧子大。服五十丸。用薤葱半兩。切作片子。酒一盞。浸一宿。次日煎三四沸。去滓。空心送丸子。

八物湯　治心肺俱損。皮毛落。血脈虛損。婦人月水愆期。宜益氣和血。

四君子合四物湯。

右以水煎。溫服。

八味丸　治腎氣虛之下元冷憊。臍腹疼痛。夜多旋溺。脚膝緩弱。肢體倦怠。面皮痿黃。或發黑。及虛勞不足。渴欲飲水。腰重疼痛。少腹急痛。小便不利。

黃柏炒。三兩。
熟苄八兩。　澤瀉　牡丹皮
山茱萸肉　山藥各四兩。　附子炮。一兩。
右爲末。蜜丸梧子大。每五十丸。溫酒送下。或鹽湯下。婦人淡醋湯下。

無比山藥丸　治諸虛百損。五勞七傷。肌體消瘦。肩燥脈弱。

白茯苓各三兩。
桂心一兩。
赤石脂　茯苓各一兩。　山藥三兩。
巴戟去心　牛膝酒浸。　澤瀉一兩。
五味二兩。　杜仲炒去絲。　兔絲子
右爲末。煉蜜丸梧子大。每服五十丸。空心溫酒下。

還少丹　大補眞氣虛損。肌體瘦弱。

蓯蓉四兩酒浸。
肉蓯蓉　遠志去心　茴香
山藥　枸杞　熟苄
山茱萸肉　牛膝　杜仲炒。
五味　白茯苓各等分。
右爲末。煉蜜圓桐子大。每服三五十丸。溫酒或鹽湯送下。日三服。此藥平補。力衰體倦。小便渾濁。最宜服之。有熱。加山梔子一兩。心氣不寧。加麥門冬一兩。少精神。倍加五味一兩。陽弱。加菟絲一兩。

補益腎肝丸　治目中焰火。視物昏花。耳聾耳鳴。困倦乏力。寢汗憎風。行步不正。兩足欹側。臥而多驚。脚膝無力。腰下清痠。

巴戟
石菖蒲
楮實

柴胡　羌活
防己炒各半兩　附子炮
右爲末熟水丸如鷄頭子大服四十丸溫水下
巴戟丸　治腎肝俱虛收斂精氣補破眞陽充肌肉蓮食止汗
五味　巴戟去心
菟絲　熟芣
益智炒　骨碎補去毛
牡礪煅二錢
右爲末蜜丸梧子大服五十丸空心鹽湯下
八味定志丸　補益心神安定魂魄治痰去胸中邪熱理肺腎
人參一兩半　遠志去心
茯苓各一兩　白朮
硃砂一錢
右爲末蜜丸梧子大米飲下三十丸無時
○若氣竭不足加生芣當歸若肺氣不足加天門冬麥門冬五味　若心氣不足加上藥人參茯神舊
價資丹　治五勞七傷四肢無力腿脚沉困下元虛憊失精陽萎
川練子二兩　牛膝酒浸一兩　楡酥一兩
川山甲一大片炙　遠心子　菟絲酒浸
巴戟去心　五味各一兩　乳香三錢另研
沉香　白檀各五錢　鹿茸酥炙
仙靈脾三錢　故紙炒五錢　風眼草三錢
人參　澤瀉　白芍
熟芣　麥門冬各一兩
右爲末蜜丸梧子大空心服七十丸白湯下
延壽丹
天門冬去心　遠志去心　山藥
赤石脂　車前子　菖蒲
澤瀉　川椒去目炒　熟芣
枸杞　茯苓　覆盆子一兩
杜仲炒　菟絲子酒浸　菟絲酒浸八兩
地骨　人參　五味各一兩
右爲末蜜丸梧子大服七十丸
添精補髓丹　赤石脂二錢　茯苓一兩　山藥二兩七錢半打糊
右爲末山藥打糊丸如梧子大服五十丸空心鹽湯下脚無力木瓜湯下

十四味建中湯　治榮衛失調血氣不足積勞虛損形體羸瘦短氣喘臥欲成勞瘵
當歸　白芍　白朮
甘草炙　肉蓯蓉　人參
肉桂　附子炮　黃芪
熟芣　茯苓各等分
右剉以水煎薑三片棗一箇空心服
人蔘養榮湯　治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色汲汲短氣飲食無味
白芍三兩　當歸　陳皮
桂心　人參　白朮
熟芣　五味　茯苓各七錢半
右以水煎生薑三片棗一箇　遠精加龍骨咳嗽加阿膠
價資丹　治五勞七傷四肢無力腿脚沉困下元虛憊失精陽萎
川練子二兩　牛膝酒浸一兩　楡酥一兩
川山甲一大片炙　遠心子　菟絲酒浸
巴戟去心　五味各一兩　乳香三錢另研
大茴香各一兩
胡蘆巴炒五錢
山藥
蛇牀一兩
茯神
菟絲子一兩
巴戟各二兩
柏子仁
生芣
牛膝酒浸
當歸酒洗
蓯蓉四兩

巴戟一兩去心　杜仲三兩
澤瀉一兩　兔絲三兩
晚蠶蛾二兩如無以蠶砂代
柏子仁一兩　枸杞
厚朴一兩　人參二兩
右爲末蜜丸　如腰痛加小茴香

滋血百補丸

羊牛斤酒燕　兔絲牛斤酒浸
知母酒炒　黃柏酒炒各二兩
右爲末酒糊丸

固精丸　治心神不安腎虛自泄精

知母炒　牡礪三錢煅
芡實　蓮蕊
一方加山茱萸肉三錢
右爲末煮山藥糊丸梧子大硃砂爲衣服五十丸

巨勝子丸

熟羊四兩　生羊
天門去心　枸杞
巨勝子　茯苓
酸棗仁　破故紙炒
覆盆子　山藥
菟子　鵝頭實
胡蘆巴各五錢　木香二錢半
右爲末蜜丸服

如意丸

生羊　熟羊各二兩
川椒去目炒　胡蘆巴酒炒
杜仲炒去絲　白茯苓
川練肉　地龍酒浸去土
遠志去心已上各一兩青鹽半兩炒

牛膝一兩酒浸　五味一兩
熟羊　山茱肉各一兩
山甲七錢酒炙　地龍一兩去土
故紙各二兩　川椒一兩去目
白朮二兩　枸杞
厚朴一兩　人參二兩
右爲末蜜丸　如腰痛加小茴香

滋腎百補丸

當歸酒浸　杜仲酒炒各四兩
沉香一兩　黃柏酒炒各二兩
右爲末酒糊丸

固精丸　治心神不安腎虛自泄精

龍骨三錢　貫柏酒炒各一兩
茯苓　遠志去心各三錢

甘菊花三錢半
右爲末用香棗煮去皮核肉二兩核桃肉煮去皮二兩各研如泥餘再煉蜜和丸梧子大每服七八十丸白湯溫酒任下

沉香百補丸

熟羊六兩　兔絲子四兩
黃柏二兩酒炒　人參二兩
菟絲各三兩　沉香一兩
右爲末酒糊丸

滋腎百補丸

當歸四兩酒浸　知母二兩酒浸
山藥　菊花
兔絲四兩酒浸　杜仲二兩炒
右爲末酒糊丸或煉蜜丸服

明目益腎丸

枸杞一兩　當歸酒浸　生羊酒浸一兩

知母七錢酒炒　黃柏七錢酒炒　山藥半兩
巴戟去心五錢　兔絲子一兩酒浸　人參五錢
天門冬五錢

右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十丸

固眞丸　治腎經虛損眞元不足

鹿角霜一斤　白茯苓五兩　鹿角膠二兩

右爲末將膠水搜丸梧子大空心米湯或酒服一百丸

地芝丸　和顏色利血氣調百節黑髮堅齒逐風散氣

生羊八兩　天門冬八兩　菊花四兩

右爲末酒蜜麵糊丸梧子大空心服三十丸酒下

黃連茯苓丸　壯水原降火

黃連五兩　白茯苓五兩　故紙炒五錢

右爲末酒糊丸梧子大服六十丸空心溫酒下

延生護寶丹　補元氣壯筋骨固精健腸

兔絲子酒浸二兩　肉蓯蓉酒浸二兩二味浸潤多者要熟青子

蔻、將蓋子再用酒浸一宿、焙乾、用二兩、
木香五錢、　蛇牀子二兩、用第三兩同煮熟、去梢、用一兩、
　　晚蠶蛾全者二兩、酥炒、　白龍骨一兩、用茅香一兩同
煮一日、去茅香、用絹盛入井中、浸一宿、取出用、　鹿茸一兩、酥炙黃、
蓮實一兩、炒、　桑螵蛸一兩、炒、　乾遠志二兩、
丁香五錢、　乳香五錢、　射香一錢、另研、　胡蘆巴二兩、
右一十五味、除乳射鬼絲子末外、十二味同爲末、將前鬼絲子末三兩、用浸藥酒二升、文武火熬至一
半、入蒸麵兩匙、用酒調勻、下香子、攪勻、次下乳香、射香、不住手攪、輕沸熬如稠糊、放冷、此膏子都要用
盡、恐硬、再入酒少許成劑、搗千餘下、丸如桐子、服五十丸、空心溫酒下、
柏子仁丸　補益元氣、充實肌膚、
山茱肉四兩、　柏子仁半兩、微炒、　遠志半兩、去心、　覆盆子一兩、
山藥一兩、取末、
右爲末、將山藥、白麵、同酒煮、和丸梧子大、服三十丸、溫酒下、
八物腎氣丸　平補腎氣、堅齒駐顏、
熟芋半斤、　山藥　　澤瀉三兩、　牡丹皮
右爲末、蜜丸服、
延齡丹　脾腎不足、眞氣傷憊、肢節困倦、舉動乏力、怠惰嗜臥、面無潤澤、不思飲食、氣不宣通、少腹內急、
膀下冷痛、及弈豚小腸氣、攻冲膀胱、其功不可具述、
牛膝酒浸、　蓯蓉酒浸、　山茱萸肉各四兩、　桂二兩、
川尚香巳上各七錢半、鹿茸去毛、酥炙、　白茯苓各三兩、　五味二兩、
晚蠶蛾炒、　沒藥研、
川山甲各五錢、酥炙、　沉香
丁香　　青鹽
香附炒、　益智仁　　檳香
巴戟去心、　甘草炙、各一兩、　蓽撥
青皮各三錢、　肉蓯蓉四兩酒浸、
右爲末、酒糊丸梧子大、空心服四十丸、溫酒下、茴香湯亦可、
海石　　香附　　南星薑製、
肉蓯蓉丸　壯元氣、養精神、
山茱萸一兩、　蓯蓉二兩、酒浸、　枸杞
地骨子　　狗脊去毛、　覆盆子
兔絲子　　山藥　　遠志去心、
右爲末、酒糊丸、梧子大、空心服四十丸、溫酒下、
益智仁　　砂仁半兩、　熟艽
澤瀉三兩、　牡丹皮

【入方】
氣鬱
香附童便浸、　蒼朮米泔浸、　撫芎
濕鬱
白芷　　蒼朮　　川芎
痰鬱
海石　　香附　　南星薑製、
　　朮川芎、桅子、
熱鬱
山梔炒、　青黛　　香附
　　撫芎　　敗紙炒、　遠志去心、
右爲末、酒糊丸、梧子大、空心服六七十丸、空心溫酒下、
益智仁丸　治腎水眞陰本虛、心火狂陽過甚、心有所欲、遠於感動、應之於腎、疾於施泄、此藥秘固眞元、降
心火、益腎水、
蓮蕊一兩、　白茯苓　　砂仁半兩、
黃柏二兩酒炒、　甘草炙、二兩、　半夏泡、一兩、
右爲末、水浸蒸餅丸梧子大、服五十丸、空心酒下、
六鬱五十二
○氣血沖和、萬病不生、一有怫鬱、諸病生焉、故人身諸病、多生於鬱、若
能升、凡鬱皆在中焦、以芎朮撫芎開提其氣、以升之、假如食在氣上、提其氣則食自降矣、餘皆倣此、
經云、鬱者、結聚而不得發越也、當升者不得升、當降者不得降、當變化者不得變化者、此爲傳化失常、
六鬱之病見矣、氣鬱者、胸膈痞、脈沉澁、濕鬱者、周身走痛、或關節痛、過陰寒則發、脈沉細、痰鬱者、動則
喘、寸口脈沉滑、熱鬱者、昏悶、小便赤、脈沉數、血鬱者、四肢無力、能食、便紅、脈沉、食變者、噯酸、腹飽、不能
食、人迎脈平和、氣口脈緊盛者是也、
蒼朮　　撫芎　　茯苓
瓜蔞一本撫南星、瓜蔞有毒
蒼朮

血虛　桃仁去皮　紅花　香附

食虛　苦朮　香附

針砂醋炒七次研極細

春加葛　夏加苦參　秋冬加吳茱萸　越鞠丸　解諸鬱　又名芎朮丸

蒼朮　香附

梔子各等分

右爲末水丸如綠豆大

內傷五十三

○東垣內外傷辨甚詳。世之病此者爲多。但有挾痰者。有挾外邪者。有熱鬱於內而發者。皆以補元氣爲主。看所挾而兼用藥。如挾痰者。則以補中益氣湯加半夏、竹瀝。仍少入薑汁傳送。凡內傷發斑。因胃氣虛甚。是火遊行於外。亦挾熱所致。火則補而降之。痰熱則微汗以散之。切不可下。恐生危證。內傷病退後。燥渴不解者。有餘熱在肺家。可用參、苓、甘草少許。薑汁冷服。或茶匙挑薑汁與之。虛者可用人參。

〔附錄〕內傷者。其源皆由喜怒過度。飲食失節。寒溫不適。勞役所傷而然。元氣者。乃生發諸陽上升之氣。飲食入胃。有傷。則中氣不足。中氣不足。則六府陽皆絕於外。是六府之元氣病也。氣傷蔵乃病。蔵病形乃應。是五蔵六府眞氣皆不足也。惟陰火獨旺。上乘陽分。故榮衛失守。諸病生焉。始受飲食勞倦所傷之病。必氣高而喘。身熱而煩。及短氣上逆。鼻息不調。怠惰嗜臥。四肢困倦不收。無氣以動。亦無氣以言。皆爲熱傷元氣。以甘溫之劑以補元氣。卽是瀉火之藥。凡所受病。捫摸之肌膚間必大熱。必燥熱悶亂。心煩不安。或渴。久病必不渴。或表虛惡風。寒慎不可以寒涼藥與之。經言勞者溫之。損者溫之。惟以補中益氣湯溫藥。以補元氣而瀉火邪。內經云。溫能除大熱。正謂此也。

【附方】

補中益氣湯

黃蓍勞役病甚。可用一錢半。輕者減去一錢。人參一錢。有嗽去之。甘草炙一錢。

以上三味。除燥熱肌熱之聖藥。

當歸身酒洗焙乾。半錢。以和血脈。

陳皮半錢。以導滯氣。又能同諸甘藥益元氣。蜀用酒煎。　白朮半錢。

升麻三分。引胃氣上騰。而復其本位。

柴胡半錢。引清氣。行少陽之氣上升。

藁根半錢。如濕用之。不濕不用。

○一方有白芍半錢。秋冬不用。　紅花三分。　少加黃柏三分。以救腎水。瀉伏火。

右作一服。水煎午前稍熱服。　若病日久者。以權立加減法。　若頭痛。加蔓荊子三分。痛甚。加川芎五分。頭疼腦痛者。加藁本五分。細辛三分。諸頭痛併用此藥四味。頭痛有痰。沉重懶倦者。乃太陰厥陰頭疼。加半夏半錢。或一錢。生薑三片。　若耳鳴目黃。頰頷腫。腹脇肘臂外後廉痛。面赤。脈洪大者。加芎活一錢。防風七分。甘草三分。藁本五分。通其經。血加黃芩黃連各三分。消其腫。　噫痛。頷腫。脈洪大。面赤。加黃芩三分。桔梗七分。甘草三分。　口乾噫乾。或渴者。加葛根五分。升胃氣上行以潤之。　心下痞。脅悶者。加芍藥、黃連各一錢。如痞腹脹。加枳實三分。厚朴七分。木香、砂仁各三分。如天寒。加乾薑。　腹中痛。加白芍藥炒半錢。炙甘草三分。如惡寒覺冷痛。加中桂。卽桂心半錢。夏月腹中痛。不惡寒不惡熱者。加黃芩五分。芍藥一錢。甘草五分。以治時熱。　臍下痛者。加眞熟地黃半錢。　如胸中滯氣。加蓮花青皮一分。或二分。鹽湯可用。氣促少氣者去之。　如身體重疼。乃風濕相搏。加羌活半錢。防風半錢。升麻一錢。柴胡半錢。藁本根半錢。蒼朮一錢。如病去。勿再服。　若大便祕澁。加當歸梢一錢。　若久病痰嗽者。去人參。冬月加不去節麻黃。秋涼亦加不去根節麻黃。春月天溫。只加佛耳草三分。款花一分。勿加麻黃。　若初病之人。雖痰嗽。不去人參。以防痰嗽增益耳。　若病久者。去人參。

加柴胡、甘草、人參。　多睡。或唾白沫。胃口上停寒也。加益智仁。若胃脘常心痛。加草豆仁三分。　疲甚之人。參芪朮有用至二兩二兩者。

枳朮丸　治痞。消食強胃。　又云。食過傷損元氣。以此主之。

枳實炒。一兩。　白朮二兩。

右用荷葉裹燒飯丸。白朮者。本意不取其食速化。但久令人胃氣強實。不復傷也。

積聚痞塊五十四

○痞塊在中爲痰飲。　在右爲食。一云氣。　積在左爲血塊。　氣不能作塊成聚。塊乃有形之物也。痰與食、積死血而成也。用醋煮海石、醋煮三稜、蓬朮、桃仁、紅花、五靈脂、香附之類爲丸。石醯白朮湯吞下。　亙壺子能消血塊。次消痰。　石醯一物。有痰積有塊可用。洗滌垢膩。又能消食積。卽痰也。　行死血塊。塊去須大補。　凡積病不可用下藥。徒損眞氣。病亦不去。當用消積藥使之融化。則根除矣。　凡婦人有塊。多是血塊。

戴云。積聚癥瘕。有積聚成塊。不能移動者是癥。或有或無。或上或下。或左或右者是瘕。

○積聚癥瘕。朱先生醫台州潭浦陳家。用蜀葵根煎湯。去粗。再入人參、白朮、青皮、陳皮、甘草稍、牛膝、煎成湯。入細研桃仁、玄明粉、各少許。熱飲之。二服當見塊下。如病重者。須補接之後加減再行。

【入方】

消塊丸　卽千金方硝石大黃丸。止可磨塊。不令人困。須量度虛實。

硝石六兩　人參三兩　甘草三兩　大黃八兩

右爲末。以三年苦酒三升。又云三斗。盛瓷器中。以竹片作準。每入一升。作一刻。柱豎器中。先納大黃。不住手攪。使微沸。盡一刻。乃下餘藥。又盡一刻。微火熬。使可丸。則取丸如鷄子中黃大。每一丸。米飲下。如不能大丸。作小丸如桐子大。每三十丸。服後當下。如鷄肝、如米泔、赤黑等色。下後。避風冷。啖軟粥將息之。

三聖膏

未化石灰半斤爲末。瓦器中炒。令淡紅色。提出火。候熱稍減。次下大黃末一兩。就塌外炒。候熱減。下桂心末半兩。略炒。入米醋煮。攪成黑膏。厚紙攤貼患處。

○痞塊在皮裏膜外。須用補氣藥。香附開之。兼二陳湯加補氣藥。先須斷厚味。

又方　琥珀膏

大黃　朴硝各一兩

右爲末。大蒜搗膏和貼。

又方　治茶癖

石膏　黃芩　升麻　片芩　白芍

右爲末。沙糖水調服。

又方　一人愛吃茶。

白朮　軟石膏

牛膝屋　薄荷回藥大者。

右爲末。沙糖調作膏。食後津液化下。

又方　治脇下有塊。

龍會丸二錢半　姜黃五錢。

右爲末。蜜丸服。又方。龍會丸和鵓鴿糞。能大消食積。或入保和丸治塊。看在何部分。

治血塊丸　兎壚子能消血塊。

海粉醋煮　三稜　桃仁五錢。

五靈脂　香附

右爲丸。白朮湯吞下。

又方　治婦人血塊如盤。有孕難服峻利。

香附醋煮四兩　桃仁去皮。

右爲末。神麴糊丸。

右爲末。沙糖水調服。

又方　一人愛吃茶。

白朮　軟石膏

牛膝屋　薄荷回藥大者。

右爲末。沙糖調作膏。食後津液化下。

又方　治脇下有塊。

龍會丸二錢半　姜黃五錢。

右爲末。蜜丸服。又方。龍會丸和鵓鴿糞。能大消食積。或入保和丸治塊。看在何部分。

治血塊丸　兎壚子能消血塊。

海粉醋煮　三稜　桃仁五錢。

五靈脂　香附

右爲丸。白朮湯吞下。

又方　治婦人血塊如盤。有孕難服峻利。

香附醋煮四兩　桃仁去皮。

右爲末。神麴糊丸。

又方　治婦人食塊。死血痰積成塊。在兩脇動作。腹鳴嘈雜。眩暈身熱。時作時止。男子亦可服。

黃連一兩半　一半用吳茱萸炒。去茱萸。一半用盬智炒。去盬智。

川芎　三稜　莪朮醋煮。

桃仁去皮各半兩　香附童便浸一兩　蘿蔔子炒一兩半　山楂炒。

右爲末。蒸餅丸服。又方。有青皮半兩。白芥子一兩半炒。

保和丸　治一切食積。

山查六兩　神麴二兩　半夏

陳皮　連翹　蘿蔔子各一兩

右爲末。炊餅丸如梧子大。每服七八十丸。食遠。白湯下。

又方

山查四兩　白朮四兩　神麴二兩

右爲末。蒸餅丸如梧子大。服七十丸。白湯下。

又方

山查三兩　白朮二兩　陳皮

半夏各一兩　連翹　黃芩

羅蔔子各半兩。

右爲末。蒸餅丸。梧子大。每服五十丸。食後薑湯下。

阿魏丸　治肉積。諸阿魏丸。脾虛者。須以補脾藥佐之。切不可獨用。虛虛之禍。疾如反掌。

連翹一兩　山查二兩　黃連一兩三錢　阿魏二兩。醋煮作糊。

右爲末。醋煮阿魏作糊丸。服三十丸。白湯下。

小阿魏丸

山查三兩　石醭三錢　半夏一兩。皂角水浸透晒乾。　茯苓

神麴　麥芽

右爲末。粥糊丸。每服三十丸。白湯下。

右爲末。炊餅丸。　香附各二兩　阿魏一兩。醋浸軟另研。

又方　治飽食停滯。胃壯者宜此。脾虛勿服。

山查　蘿蔔子　神麴炒。

陳皮　青皮

右爲末。炊餅丸。

又阿魏丸　去諸積聚。

山查　南星皂角水浸　半夏皂角水浸　麥芽炒。

神麴炒。　黃連各一兩。　連翹　阿魏醋浸。

瓜蔞　貝母各半兩
羅蔔子蒸　胡黃連二錢半加無以宜連代
右爲末薑汁浸蒸餅丸　一方加香附、蛤粉治嗽
佐脾丸　風化硝　石膽
山查三兩　半夏　茯苓各一兩
陳皮　羅蔔子各半兩
右爲末粥丸服
小溫中丸　連翹
青皮一兩　香附四兩便浸
白朮半兩　陳皮一兩
針砂二兩醋炒
右爲末麵糊爲丸
又方　半夏二兩
針砂醋煮三次　香附童便浸四兩
黃連薑汁炒一兩半　山梔炒
半夏一兩　台芎半兩
一方加人參炒白朮一兩半有苦參用白朮用苦參不用黃連
枳實丸　白朮二兩　枳實
麥芽各一兩　益黃
山查一兩
右爲末荷葉蒸飯爲丸梧子大每服一百丸食後薑湯下
大溫中丸　又名大消痞丸
黃連炒　黃芩六錢
人參　陳皮
砂仁　乾生薑
半夏四錢　川朴三錢
右爲末炊餅丸
〔附錄〕五藏之積曰五積六府之積曰六聚積有定形聚無定處不問何經並宜服十味大七氣湯吞下脅食紅丸子　凡木香、檳榔、去氣積神麴、麥芽去酒積虻蟲、水蛭去血積礞石、巴豆去食積牽牛、甘遂去水積雄黃、膩粉、杏脯去痰積

香附一兩半　甘草炙七錢半
右剉水煎服
散聚湯　半夏　楝榔　當歸各七錢半
杏仁炒　桂心各二兩　茯苓
附子炮　川芎　枳殼炒
吳茱萸各一兩
右剉水煎薑三片大便不利加大黃
香稜丸　治五積六聚氣塊　青皮　陳皮
三稜六兩醋炒　枳殼炒　羅蔔子炒
枳殼炒　神麴炒　麥芽炒
黃連　桃仁炒　礞砂
乾漆炒煙盡　木香　甘草炙各一兩
歸梢
山查四兩

遂去水積雄黃、膩粉去涎積礞砂、水銀去肉積各從其類也　肝積曰脾積曰痞氣腎積曰奔豚其如積聚之脈實強者生沉小者死
【附方】
烏梅丸　治酒毒消食化痰
烏梅一斤　半夏八兩　白礬八兩
右件石臼搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜爲度次入神麴、麥芽、陳皮、青皮、莪朮、枳殼、丁皮、大腹子各四兩用酒糊爲丸每服四五十丸鹽湯下
備急丸　大治心腹厥痛食積胸膈下咽氣便速行
大黃一錢　巴豆去油膜心　乾薑半錢
右用蜜丸白湯下
治吐蟲有積
右以黑錫灰、楝榔末、米飲調下
大七氣湯　生薑一斤
三稜　莪朮各一兩半　青皮七錢半
藿香　桔梗　肉桂各七錢半
陳皮一兩半
益智一兩半

右爲末醋糊丸每服三五十丸白湯下。

龍會丸　見脅痛類。

紅丸子　見痰類。

脚氣五十五　附足跟痛

○脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣血用藥。有脚氣衝心者宜四物湯加炒黃柏再宜衝泉穴用附子末津唾調付上以艾炙泄引熱下。

【入方】防己飲

白朮　木通
川芎　甘草梢
黃柏酒炒　生苄酒炒

大便實加桃仁小便澁加杜牛膝有熱加黃芩、黃連大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝薑汁如常服者專主乎濕熱先生別有方。

又方　治濕熱食積痰流注。

蒼朮　黃柏
川芎　白芷

防己　南星
犀角　檳榔

右煎湯熥洗。

血虛加牛膝龜板。

右爲末酒糊丸服肥人加痰藥。

健步丸

生苄半兩　歸尾
蒼朮各一兩　吳茱萸
桂枝二錢　大腹子三箇

右爲末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮木通湯下。

又方　一婦人足脛腫。

紅花　牛膝俱酒洗
蒼朮　南星

有筋動於足大指上至大腿近腰結了乃因奉養厚過風寒宜四物湯加酒芩、紅花、蒼朮、南星、生苄煎服。

濕痰脚氣大便滑泄。

蒼朮二兩　防風一兩
川芎六錢　條芩四錢

苡仁　陳皮
條芩各半兩　牛膝一兩

黃柏酒炒一兩

【附錄】脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕。勝濕以仙朮、白朮、防己、川芎爲主或六物附子湯或當歸拈痛湯。脚氣鬱甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲丸。脚氣解表用麻黃左經湯等藥隨經選用有痰氣寒濕者五積散加木瓜。若雙解以大黃左經湯東垣羌活導滯湯若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃柏南星或健步丸。若疎風養血用獨活寄生湯最效。

【附方】

六物附子湯

附子　桂　防己各四錢
白朮　茯苓各三錢

右㕮咀每服半兩入薑棗煎。

當歸拈痛湯

羌活半兩　人參
葛根　蒼朮各二錢
茵陳酒炒各半兩　防風
澤瀉　豬苓

檳榔六錢　香附八錢
活石一兩二錢　甘草三錢

甘草炙二錢

升麻　蒼朮酒制
黃芩酒制　葛根
知母酒炒　白朮一錢半

右咬咀。每服一兩。水煎。空心服。臨睡再服。

舟車丸　見水氣類。

除濕丹

檳榔　甘遂　芫花　醋炒。各二兩。

澤瀉　牽牛半兩。　大戟炒。三兩。

右爲末。糊丸如梧子大。每服五十丸至七十丸。溫水下。

東垣開結導飲丸

白朮　陳皮　神麯炒。　麥蘗麵　巴豆霜各一錢半。　青皮

右爲末。湯浸。蒸餅丸如梧子大。每四五十丸。或七

麻黃左經湯

麻黃　乾葛　防己　甘草　防風

右咬咀。每半兩。入薑棗煎服。

五積散

白芷一兩半。　陳皮三兩。　桔梗去蘆。　枳殼三兩。　川芎　茯苓各一兩半。

桂　芍藥　甘草炙。

麻黃三兩。去節。　乾薑三兩。　厚朴薑制。二兩。

右咬咀。每服四錢。水一盞。薑三片。葱白三莖。煎至

產人艾醋。

大黃左經湯

細辛　茯苓　芒硝　赤芍

甘草炙。　前胡　枳實炒。二錢。　沒藥各一兩。

黃芩　杏仁等分。

右咬咀。每服半兩。入薑棗煎。

東垣羌活導滯湯

羌活　大黃煨。煙熄一兩。　枳實炒。二錢。　防己

右咬咀。每服五錢。或七錢。水煎服。

八味丸　見諸虛類。

獨活寄生湯　見腰痛類。

○足跟痛。有痰。有血熱。　血熱。四物加黃柏、知母、牛膝之類。

當歸各二錢。

羌活　獨活各半兩。　防己

大黃煨。煙熄一兩。　枳實炒二錢。

右咬咀。每服五錢。或七錢。水煎服。

丹溪先生心法卷四

痿五十六

○痿證斷不可作風治。而用風藥。有濕熱。濕痰。氣虛。血虛。瘀血。濕熱。東垣健步丸。加燥濕、降陰火、蒼朮、黃芩、黃柏、牛膝之類。濕痰二陳湯加蒼朮、白朮、黃芩、黃柏、竹瀝、姜汁。氣虛。四君子湯加黃芩、黃柏、蒼朮之類。血虛。四物湯加黃柏、蒼朮煎。送補陰丸。亦有食積死血妨礙不得下降者。大率屬熱。用參朮四物湯。黃柏之類。

〔附錄〕謹按五痿等證。特立綱目。所論至詳。後代諸方。獨於此證蓋多缺略。致其由皆因混入中風條內故也。丹溪先生痛千古之弊。憫世之罹此疾者。多誤于庸醫之手。有志之士。必當究其心焉。夫陳無澤謂痿因內藏不足所致。誠得之矣。然痿之所不足。乃陰血也。而方悉是補陽補氣之劑。寧免實實虛虛之患乎。且無擇以三因立方。可謂話方之冠。其餘此證尤且未明。況求於他者乎。

【附方】　健步丸　東垣方

防己酒洗。一兩。　羌活　柴胡

甘草炙。　瓜蔞根酒洗。以上各半兩。

防風各三錢。　苦參酒洗。　川烏各一錢。

滑石煅。

澤瀉

肉桂五分。

右爲末酒糊爲丸梧桐子大每服七十丸葱白煎愈風湯下見中風類

補陰丸　見諸虛類

清燥湯　治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痛軟癱瘓不能動

黃芪一錢五分　蒼朮一錢　白朮　橘皮
澤瀉各半錢　人參　白茯苓　升麻各三分
麥門冬　歸身　生芍　曲末
猪苓各二分　酒柏　柴胡　黃連各一分
五味子九箇　甘草炙二分

右每服半兩水煎空心服

厥五十七　附手足十指麻木

○厥逆也手足因氣血逆而冷也　因氣虛爲主有因血虛　氣虛脈細　血虛脈大　熱厥脈數外感脈沉實　有痰脈弦　因痰者用白朮竹瀝　氣虛四君子　血虛四物　熱厥用承氣　外感用雙解散加姜汁酒　有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰於下則寒

○手足麻者屬氣虛　手足木者有濕痰死血　十指麻木是胃中有濕痰死血

〔附錄〕厥者蹶也短也逆也手足逆冷也其證不一散之方書者甚多今姑撮大概且如寒熱厥逆者則爲陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也不可作陰證而用熱藥治之精魂絕而死矣急宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷脈沉四肢逆足蹉臥唇口青或自利不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之類仍速灸關元百壯　又尸厥飛尸卒厥此卽中惡之候因胃犯不正之氣忽然手足逆冷肌肉聚起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏不知人頭旋欲倒此是卒厥客忤飛尸鬼魅吊死問喪入廟登塚多有此病以蘇合丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣平胃散　痰厥者乃寒痰迷悶四肢逆冷宜委附湯以生附湯以生附代熟附　蚘厥者乃胃寒所生經曰蚘者長蟲也胃中冷卽吐蚘蟲宜理中湯加炒川椒五粒椶櫚半錢香烏梅丸效蚘見椒則頭伏故也　氣厥者與中風相似何以別之風中身溫氣中身冷以八味順氣散或調氣散如有痰以四七湯導痰湯服之

【附方】　八味順氣散　見中風類

調氣散

白豆蔻　丁香　檀香　木香各二錢
藿香　甘草炙各八錢　砂仁四錢

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

蒼朮泔浸五斤　厚朴姜製炙　陳皮各三斤

右爲末每服五錢姜三片棗一箇煎服入鹽一捻沸湯點服亦得

四七湯

厚朴二兩　茯苓四兩　半夏五兩

右每服四錢水一鍾姜七片棗一箇煎服

承氣湯　見痢類

四逆湯　理中湯　姜附湯　並見中寒類

烏梅丸　見心痛類

導痰湯　見痰類

痙五十八

○痙切不可作風治兼用風藥　大率與痓病相似比痓爲逆爲虛宜帶補　多是氣虛有火兼痰宜用人參竹瀝之類

〔附錄〕古方風痙曰痙也經云諸痙項強皆屬於濕土是太陽傷濕也又云諸暴強直皆屬於風是陽明內傷而陰行於外又曰陽痙曰剛無汗陰痙曰柔有汗亢則害承乃制故濕過極反兼風化制之然兼化者虛象實非風也

【附方】

葛根湯　治痙病無汗而小便少反惡寒者名剛痙

葛根四錢　麻黃三錢　桂枝二錢
甘草三錢炙

右㕮咀水二鍾生姜三片棗一枚煎服覆取微汗

桂枝加葛根湯　治痙病有汗不惡寒者服之此名柔痙

葛根四錢　生姜三錢　桂枝
甘草各二錢

右作一服水二鍾棗一箇煎服　二痙皆可用小續命湯加減服若胸滿口噤咬齒脚攣臥不着中者以大承氣湯下之無疑矣

小續命湯　見中風類

大承氣湯　見痢類

痓五十九

○驚與痰宜吐　大率行痰爲主用黃連南星瓜蔞半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者　分痰與

熱。有熱者。以涼藥清其心。有痰者。必用吐藥。吐後用東垣安神丸。大法宜吐。吐後用平肝之劑。青黛、柴胡、川芎之類。龍會丸正宜服之。且如癇因驚而得。驚則神不守舍。舍空而痰聚也。

葢云癇者。俗曰猪癲風者是也。

〔附錄〕癇症有五。馬、牛、雞、猪、羊。且如馬癇。張口搖頭。馬鳴牛癇。目正直視。腹脹。雞癇。搖頭反折。喜驚。羊癇。喜揚目吐舌。猪癇。喜吐沫。以其病狀偶類之耳。非無痰涎壅塞。迷悶孔竅。發則頭旋顛倒。手足搖搐。口眼相引。胸背強直。叫吼吐沫。食頃乃甦。宜星香散加全蝎三箇。

【附方】

續命湯　主癇發。頭悶無知。口吐沫出。四牙緊急。口噤不得言。

竹瀝一升二合。　生苧汁一升。　龍齒末。　生姜

防風　麻黃去節各四兩。　防己　附子炮各二兩。

石膏　桂二兩。

右十味。水一斗。煮取三升。分三服。有氣加紫蘇、陳皮、各半兩。

○但小兒癇。千金有風、食、驚三種。本事方又有陰陽癇、慢脾風、三證。慢脾即食癇。宜醒脾丸。人參散。

右方三癇丸　治小兒百二十種驚癇。

荊芥穗二兩。　白礬一兩。半生半炒。

右爲末。麵糊爲丸。黍米大。朱砂爲衣。姜湯下二十丸。如慢慥。用來復丹。急驚。三癇丸。食癇。醒脾丸可也。

本事人參散　治慢脾風。神昏痰盛。

人參半兩。　皁白大南星一兩。切片。以生姜汁并糠水各半碗煮乾。帶性晒。

右爲末。每服一錢。水一盞。姜三片。冬瓜仁擂細少許。同煎。取半盞。作兩三次澆下。

導神丹　清熱養氣血不時潮作者可服。

天麻　人參　陳皮　白朮

歸身　茯神　荊芥　殭蠶炒。

獨活　遠志去心。　皁角　麥門冬去心。

酸棗仁炒。　辰砂各半兩。另研。　南星

石膏各一兩。　甘草炙。　半夏

鬱金　白附子　川芎

黃連各半兩。　珍珠三錢。　生苧

金箔三十片。

右爲末。酒糊丸。空心服五十丸。白湯下。

東垣安神丸　大法宜吐。吐後用平肝之劑。青

黃連一錢五分。酒洗。　朱砂一錢。水飛。　酒生苧　酒歸身

炙甘草各五分。

右除朱砂水飛外。四味搗爲末。和勻。湯泛。蒸餅丸如黍米大。每服十五丸。食後津嚥下。

星香散　見中風類。

顛狂六十

○顛屬陰。狂屬陽。顛多善而狂多怒。脫虛者可治。實則死。大率多因痰結於心胸間。治當鎮心神。開痰結。亦有中邪而成此痰者。則以治邪法治之。原病式所論尤精。蓋爲世所謂重陰者顛。重陽者狂是也。大概是熱。顛者。神不守舍。狂言如有所見。經年不愈。心經有損。是爲眞病。如心經蓄熱。當清心除熱。如痰迷心竅。當下痰寧志。若顛哭呻吟。爲邪所憑。非狂也。燒盆紙。酒水下。方寸匕。即止。風顛引膈痛發則耳鳴。用天門冬去心。日乾作末。酒服方寸匕。顛證。悉治之。入夏自安。宜助心氣之藥。陽虛陰實則顛。陰虛陽實則狂。狂病宜大吐下則除之。

【入方】　治顛風。

麻仁四升

右以水六升。猛火煮至二升。去滓。煎取七合。旦空心服。或發或不發。或多言語。勿怪之。但人扶手足須臾定。兄進三劑愈。

又方　治狂邪發無時。披頭大叫。欲殺人。不避水火。

苦壘不以多少

右爲末。蜜丸如梧子大。每服十五丸。煎薄荷湯下。

驚悸怔忡六十一

○驚悸者。血虛驚怯。有時。以朱砂安神丸。痰迷心腦者。痰藥皆可。定志丸加琥珀、鬱金。　怔忡者。血虛怔忡。無時。血少者多。有思慮便動。屬虛。　時作時止者。痰因火動。瘦人多因是血少。肥人屬痰。尊常者多是痰。　眞覺心跳者。是血少。四物朱砂安神之類。　假如病因驚而得。驚則神出其舍。舍空則痰生也。

戴云。怔忡者。心中不安。惕惕然如人將捕者是也。

〔附錄〕驚悸。人之所主者心。心之所發者血。心血一虛。神氣不守。此驚悸之所肇端也。曰驚曰悸。其可無辨乎。驚者。恐怖之謂。悸者。怔忡之謂。心虛而驚痰。則耳聞大聲。目擊異物。遇險臨危。觸事喪志。心爲之忤。使人有惕惕之狀。是則爲驚。心虛而停水。則胸中滲漉。虛氣流動。水既上乘。心火愚之。心不自安。使人有怏怏之狀。是則爲悸。驚者、與之豁痰定驚之劑。悸者、與之逐水消飲之劑。所謂扶虛、不過調養心血、和平心氣而已。

【入方】　治勞役、心跳、大虛證。

朱砂　歸身　白芍

川芎　陳皮　甘草各二錢　黃連炒一錢半

右爲末猪心血丸服。

【附方】

養心湯　治心虛血少驚悸不寧。

黃耆炙　白茯苓　遠志去心姜汁炒　川芎各半兩　當歸　酸棗仁炒　五味　人參二錢半　甘草炙四錢

右每服三錢。水煎。姜三片。棗一箇。食前服。治停水怔忡。加楡柳、赤茯苓。

寧志丸　治心虛血虛多驚。若有痰驚宜吐之。

人參　白茯苓　茯神　柏子仁　琥珀　當歸　酸棗仁溫酒浸半日去殼隔紙炒　遠志各半兩炒　乳香　朱砂

右爲末。煉蜜丸如梧子大。服三十丸。食後煎棗湯吞下。

朱雀丸　治心病恒忡不止。

白茯神二兩　沉香五錢

右爲末。煉蜜丸小豆大。服三十丸。人參湯下。

加味四七湯　治心氣鬱滯。豁痰散驚。

半夏二兩半　白茯苓　厚朴各一兩半　茯神　紫蘇各一兩　遠志炒　甘草炙半兩

右每服四錢。生姜五片。石菖蒲一寸。棗一箇。水煎服。

朱砂安神丸

朱砂五錢。水飛過。另研　黃連酒洗六錢　甘草炙二錢半

生苄一錢半　當歸二錢半

右四味爲末。蒸餅丸如黍米大。朱砂爲衣。服二十丸或五十丸。津下。

定志丸　見健忘類。

健忘六十二

○健忘。精神短少者多。亦有痰者。

戴云。健忘者。爲事有始無終。言談不知首尾。此以爲病之名。非比生成之恐。須不知人事者。

〔附錄〕健忘者。此證皆由憂思過度。損其心胞。以致神舍不清。遇事多忘。乃思慮過度。病在心脾。又云。

思傷脾。亦令朝暗遺忘。治之以歸脾湯。須兼理心脾。神氣意定。其證自除也。

【附方】

歸脾湯　治思慮過度。勞傷心脾。健忘怔忡。

白朮　茯神　黃耆　酸棗仁炒各一兩　人參　木香各半兩　甘草炙二錢半

右每服四錢。姜三片。棗一枚。水煎服。

定志丸　治心氣不定。恍惚多忘。

遠志二兩　人參一兩　菖蒲一兩

右爲末。煉蜜丸如梧子大。朱砂爲衣。服二十丸。米湯下。

痛風六十三　附肢節痛

○四肢百節走痛是也。他方謂之白虎歷節風證。大率有痰。風熱。風濕。血虛。因於風者。小續命湯。因於濕者。蒼朮白朮之類。佐以竹瀝。因於痰者。二陳湯加酒炒黃芩、羌活、蒼朮。因於血虛者。川芎歸之類。佐以紅花、桃仁。大法之方。蒼朮、川芎、白芷、南星、當歸、酒黃芩。在上者加羌活、威靈仙、桂枝。在下者加牛膝、防己、木通、黃柏。血虛格致餘論詳言。多用川芎、當歸。佐以桃仁、紅花、薄桂、威靈仙。治痛風。取薄桂味淡者。獨此能橫行手臂。餉南星、蒼朮等藥至痛處。

又方　治上中下疼痛。

南星姜制　蒼朮泔浸　黃柏酒炒各二兩　白芷半兩　神麯炒一兩　桃仁半兩

羌活三錢。走骨節　防己半兩。下行　桂枝三錢。行臂　草龍膽半錢。下行

右爲末。麵糊丸梧子大。每服一百丸。空心白湯下。

張子元。血氣虛有痰。白濁。陰火痛風。

人參一兩　白朮　熟苄　山藥　海石　南星各一兩　乾姜燒灰。半兩。取其不走　敗龜板酒炙二兩

右爲末。粥丸。一云酒糊丸。

臂痛方

蒼朮一錢半　半夏　南星　酒芩炒　香附各一錢　陳皮　威靈仙三錢　甘草少許。別本加羌活一錢。

右㕮咀。作一服。入生姜三片。

二妙散　治筋骨疼痛因濕熱者。有氣加氣藥。血虛者加補藥。痛甚者加生姜汁。熱辣服之。

黃柏炒　　蒼朮米泔浸炒

右二味爲末。沸湯入姜汁調服二錢。若有雄壯之氣。表實氣實者。加酒少許佐之。　若痰帶熱者。先以舟車丸。或導水丸。神芎丸。下伐後。以趁痛散服之。

趁痛散

乳香　沒藥　桃仁　紅花

當歸　地龍酒炒　牛膝酒浸　羌活

甘草　五靈脂酒淘　香附童便浸

或加酒芩。炒酒柏。

右爲末。酒調二錢服。

八珍丸　治痛風走注。脚疾。

乳香　沒藥　代赭石　穿山甲生用各三錢

羌活　全蝎二十一箇炒　草烏生用各五錢　川烏生用一兩不去皮尖

右爲末。醋糊丸如梧子大。每二十一丸。溫酒送下。

四妙散　痛風走注。

威靈仙酒浸五錢　羊角灰三錢　白芥子一錢　蒼耳一錢半　一云防風

右爲末。每服一錢。生姜一大片。擂汁入湯調服。　又二妙散同調服。

又方　治酒濕、痰、痛風。

黃柏酒炒　威靈仙酒浸炒各五錢　蒼朮　羌活

甘草三錢　陳皮一錢　芎藥一錢

右爲末。每服一錢或二錢。沸湯入姜汁調下。

治氣實表實骨節痛方。

活石六錢　甘草一錢　香附　片芩各三錢

右爲末。姜汁糊丸。如梧子大。每服五七十丸。白湯吞下。

又方

糯米一撮　黃蘗蹋根一撮　黑豆半合

右用酒水各一椀煎。徐徐服之。大吐大瀉。一服便能行動。

治食積肩臆痛。

鱉板酒浸一兩　酒柏葉　香附半兩

凌霄花

右爲末。酒糊丸如梧子大。煎四物湯加陳皮、甘草湯下。

【附方】

控延丹　治一身及兩脇走痛。痰挾死血者。

甘遂麵裹煨　大戟制　蓽臼芥菜子炒各等分

右爲末。加桃仁泥糊丸。如梧子大。每服五七丸。漸加至十丸。臨臥姜湯下。

龍虎丹　治走注疼痛。或臂木不遂。或半身痛。

草烏　蒼朮　白芷各一兩麵粗末拌炒酵熟過入後藥

乳香　沒藥各二錢另研　當歸　牛膝各五錢

右爲末。酒糊丸。如彈大。每服一丸。溫酒化下。

〔附錄〕遍身骨節疼痛。悉靜夜劇。如虎嚙之狀。名曰白虎脈節風。並宜加減地仙丹、或青龍丸、乳香丸等服之。

又有痛風。而痛有常處。其痛處赤腫灼熱。或渾身壯熱。此欲成風毒。宜敗毒散。　凡治臂痛。以二陳湯加酒炒黃芩、蒼朮、羌活。

○如肢節痛。須用羌活去風濕亦宜用之。　如肥人肢節痛。多是風濕。與痰飲流注經絡而痛。宜南星、半夏。　如瘦人肢節痛。是血虛。宜四物湯加黃芩、酒炒黃柏。　如肢節腫痛、脈滑者。當用燥濕。宜蒼朮、南星。兼行氣藥木香、枳殼、檳榔。在下者加漢防己。　若肢節腫痛、脈澁數者。此是瘀血。宜桃仁、紅花、當歸、川芎、及大黃微利之。　如倦怠無力而肢節痛。此是氣虛。兼有痰飲流注。宜參、朮、星、半。　丹溪無肢節痛條。此文又純似丹溪語。姑書以俟知者。

小續命湯　地仙丹　並見中風類。

舟車丸　見中濕類。　導水丸　見痢類。

神芎丸　見發熱類。　敗毒散　見瘟疫類。

乳香丸

白附子炮　南星　白芷　沒藥

赤小豆　荊芥　薑香去土　骨碎補去毛。

乳香另研各一兩　五靈脂　川烏炮去皮臍尖　糯米炒各二兩。

草烏頭炮去皮尖　京墨煅各五兩　松脂半兩研。

右爲末。酒糊丸。梧子大。每服十丸至十五丸。冷酒吞下。茶亦得。不拘時。忌熱物。

熇風六十四　附身上虛痒。

○大風病。是受得天地間殺物之風。古人謂之癘風者。以其酷烈暴悍可畏耳。人得之者。須分在上在下。

夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳蟲於從道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意若其痰塞與瘀若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治若已全然脫體若不能絕味絕色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其質甚貞潔無物可喫也餘四人三兩年後皆再發再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安穩

醉仙散

胡麻仁　牛旁子　蔓荊子　防風　瓜蔞根　白蒺藜

右爲末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空心日午臨臥各一服茶湯調下喫後五七日間先於牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急者須先以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙煿及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜幷烏梢菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

錦紋大黃一兩　皁角刺一兩半燭生經年眼大黃　鬱金半兩生

白茶牛頭末六錢半生半炒　一本無此二味

右爲細末每服二錢一云五錢臨臥冷酒調服一云日未赤面東服以淨桶伺候泄出蟲如蟲黑色乃是多年赤色是爲方近三四日又進一服眞候無蟲則絕根矣後用通五散調理可用三稜針刺委中出血終身不得食牛馬驢騾等肉大忌房事犯者必不救

黃精丸

莽耳葉　紫背浮萍　大力子各等分

黃精倍前三味生搗汁和四味研細焙乾

右爲末神麯糊丸如梧子大每服五七十丸溫酒下一方加炒柏、生苄、甘草節

局方升麻湯

蒼耳葉　浮萍　烏蛇肉等分

右用豆淋酒炒等分爲末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脈大而虛者

苦參七錢半　蒼耳　牛旁子

黃精　浮萍各一兩

右爲末川烏蛇肉酒煮如無蛇以烏鰍魚亦可糊丸服之候服質上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治若已全然脫體若不能絕味絕色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其質甚貞潔無物可喫也餘四人三兩年後皆再發再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安穩

醉仙散

胡麻仁　牛旁子　蔓荊子　防風　瓜蔞根　白蒺藜

右爲末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空心日午臨臥各一服茶湯調下喫後五七日間先於牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急者須先以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙煿及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜幷烏梢菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

錦紋大黃一兩　皁角刺一兩半燭生經年眼大黃　鬱金半兩生

白茶牛頭末六錢半生半炒　一本無此二味

右爲細末每服二錢一云五錢臨臥冷酒調服一云日未赤面東服以淨桶伺候泄出蟲如蟲黑色乃是多年赤色是爲方近三四日又進一服眞候無蟲則絕根矣後用通五散調理可用三稜針刺委中出血終身不得食牛馬驢騾等肉大忌房事犯者必不救

黃精丸

莽耳葉　紫背浮萍　大力子各等分

黃精倍前三味生搗汁和四味研細焙乾

右爲末神麯糊丸如梧子大每服五七十丸溫酒下一方加炒柏、生苄、甘草節

局方升麻湯

蒼耳葉　浮萍　烏蛇肉等分

右用豆淋酒炒等分爲末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脈大而虛者

苦參七錢半　蒼耳　牛旁子

又方

大黃　黃芩　雄黃三兩

右爲末用漆樹葉濃煎湯入藥蒸洗

〔附錄〕此疾非止肺臟有之以其病發於鼻從俗呼爲肺風也鼻氣旺不旋則血爲之聚血既聚則使肉爛而生蟲也生蟲者厥陰之主之以藥緩攻之煎局方升麻湯下瀉青丸餘病各隨經治之

【附方】

凌霄花散　治癮風

蟬殼　地龍炒　殭蠶炒　凌霄花半兩

右爲末每服二錢酒調下於浴室內常在湯中住一時許服藥效

東坡四神丹　治大風

羌活　玄參　當歸

右等分煉蜜丸梧子大每服七十九

浮萍散　治癮及風癬

浮萍一兩　荊芥　川芎

麻黃去根節　已上各半兩或加當歸芍藥

右爲末每服一兩水二盞煎入葱白豆豉亦可汗出則愈

通聖散　見斑疹類

局方升麻湯

熟半夏　茯苓　白芷

蒼朮　乾葛　桔梗

熟枳殼　乾姜各半錢　大黃蒸半兩

陳皮　甘草各一兩半

右㕮咀每服四錢生姜煙心同煎食前服

瀉青丸　見中風類

184

○身上虛痒。血不榮於腠理。所以痒也。
右用四物湯加黃芩煎調浮萍末服之。

又方

凌霄花末一錢。酒調下。

臑喉風喉痹六十五　附咽痛咽癌

○喉痹大概多是痰熱。重者用桐油探吐。一方。用李實根研水嗽項上一週。遶用綿探咽中者。臑臑喉風。屬痰熱。藏云。謂其咽喉裏外皆腫者是也。用桐油以鵝翎探吐。又法用燈油腳探吐。又用遠志去心爲末。水調傅項上一遶。立効。亦可吐。咽喉生瘡痛。是虛熱血虛。多屬虛火游行。無制客於咽喉也。用人參荆芥、蜜炙黃柏。虛火用人參、竹瀝。血虛。四物加竹瀝。實熱者。黃連、荆芥、薄荷、硝、蜜、姜汁調。噙化。治咽喉。用倒滴刺根淨洗。入些少好酒同研。滴入喉中。痛立止。喉痹風熱痰。先以千緡湯。後以四物加黃芩、知母。養陰則火降。又方。猪牙皁角爲末。和霜梅噙。又方。木鱉子用鹽、水浸。噙一丸。又方。茜草一兩。一服。降血中之火。又方。焰硝半錢。枯礬半錢。硼砂一錢。爲末。杜仲、牛膝搗汁調。喉閉。或有中垂一絲。結成小血珠。垂在咽喉中。用杜牛膝根。即鼓槌草。正面獨條者。搗碎。用好米醋些小和研。取汁三五滴。滴在鼻中。即破。喉痛。必用荆芥。陰虛火炎上。必用玄參。又喉痹。陳年白梅入蚰蜒。佘化。噙梅於口中。

【又方】

雄黃解毒丸　治纏喉急喉風。雙蛾腫痛。湯藥不下。

雄黃一兩　巴豆去油。十四箇

右爲末。醋糊丸如綠豆大。熱茶清下七丸。吐出頑涎即甦。大効。如口噤。以物斡開灌之下咽。無有不活者。

【又方】

雄黃一錢　鬱金一錢

右爲末。每服三錢。生姜一大片。同搗勻。茶湯盪起服之。

又方

牙皂一錢　細辛二錢

右爲末。每服三錢。生姜一大片。同搗勻。茶湯盪起服之。如有痰。即以二陳湯送下。

【又方】

酒片芩一兩　蒼朮　羌活　細辛二錢半　蒼耳三錢

右爲末。每服三錢。生姜一大片。同搗勻。茶湯盪起服之。

又方

酒片芩一兩　蒼朮　羌活　川芎　生甘草　酒黃連各一錢半

右爲末。服法同前。

又方

酒片芩一兩　蒼朮　羌活　蒼耳　細辛各三錢

右爲末。服法同前。

又方　濕痰頭風。

片芩酒炒。三錢　蒼朮酒炒。一兩　川芎　甘草一錢

右爲末。服法同前。

瘦人搐藥

軟石膏　朴硝各五錢　腦子

檀香皮　薄荷各一錢　白芷

右爲末。搐鼻內。

頭痒風屑變黃。

用大黃酒浸炒爲末。茶調服。

一粒金搐鼻方　治偏頭風。

華撥不以多少。研細。川膠。搭硼汁拌勻。再入瞻內懸陰乾。

玄胡索　白芷　川芎各一兩

右爲末。入製華撥末一兩半。用無根水丸。每用一粒。長流水化開。噴鼻。以銅錢二三文口咬定。出涎。治頭風

烏頭尖七箇　荆芥　防風　甘草

蔓荊子　台芎　桔梗
右爲末。茶調。
一人頭風鼻塞。
南星　蒼朮　酒芩
川芎
右爲末。茶調。
〔附錄〕頭風用熱藥多。間有挾熱而不勝熱劑者。宜消風散。茶調散服之。頭風發動。頂後兩項筋緊吊起痛者。看其人挾寒挾虛。宜三五七散。頭風九月。取菊花作枕。最良。素問論頭風者。本於風寒入於腦髓耶。本事方論婦人患頭風者。十居其半。或者婦人無巾以禦風寒爲耳。男子間有患者。若經年不愈者。宜灸顖會、百會、前頂、上星等穴差。

【附方】

消風散
荊芥穗　甘草炙　川芎
人參　茯苓　防風
藿香　蟬退去土炒、各二兩　厚朴姜製、半兩
右爲末。每服二錢。荊芥湯或茶清調下。

茶調散
薄荷去梗不見火、八兩
甘草　白芷各二兩　細辛去葉一兩　川芎四兩
荊芥去梗、四兩
右爲細末。每服二錢。食後。茶清調下。常服。清頭目。

三五七散
細辛一斤半　乾姜炮、二斤　防風四斤
茯苓各三斤　附子三十五箇、炮去皮臍
右爲細末。每服二錢。溫酒食前調下。

頭眩六十七
○頭眩。痰挾氣虛、併火。治痰爲主。挾補氣藥及降火藥。無痰則不作眩。痰因火動。又有濕痰者。有火痰者。濕痰者多宜二陳湯。火者加酒芩。挾氣虛者。相火也。治痰爲先。挾氣藥降火。如東垣半夏白朮天麻湯之類。眩暈不可常者。以大黃酒炒爲末。茶湯調下。火動其痰。用二陳加黃芩、荊朮、羌活。散風行濕。左手脈數熱多。脈滑有死血。右手脈實有痰積。脈大是久病。久一作虛。久病之人。氣血俱虛而

服大痰湯不降也。予有一老婦。思赤白帶一年半。頭眩。坐立不得。睡安。

〔附錄〕眩者、言其黑暈轉旋。其狀目閉眼瞎。身轉耳聾。如立舟船之上。起則欲倒。蓋虛極乘寒得之。亦不可一途而取執也。又風則有汗。寒則製痛。暑則熱悶。濕則重滯。此四氣乘虛而眩牽也。又或七情鬱面生痰。動火。隨氣上厥。此七情致虛而眩運也。淫慾過度。腎家不能納氣歸元。使諸氣逆奔而上。此氣虛眩運也。吐利崩漏。肝家不能收攝榮氣。使諸血失道妄行。此血虛眩運也。要卓救病之因。隨機應變。其間以升降鎮墜行汗爲最。不可妄施汗下。誰者將有採薪之憂。有早起眩運。須臾自定。日以爲害者。正元欲下黑錫丹。傷濕頭運。腎著湯加川芎。名除濕湯。有痰。青州白丸子。

【附方】

頭運方　利痰、清熱、降火。或滾痰丸亦可。
南星五分製　半夏一錢　桔梗七分
陳皮一錢　甘草五分　茯苓一錢
右作一服。生姜七片。水煎。食後服。

香橘飲　治氣虛眩暈。
木香　白朮　半夏麴
茯苓　砂仁各半兩　丁香
右剉散。水二盞。生姜五片。煎服。加當歸、川芎、官桂治血虛眩暈。

白附子丸　治風痰上厥。眩暈頭疼。
全蝎半兩炒　白附子炮　南星炮
旋覆花　甘菊　天麻
橘紅　殭蠶炒　乾姜生、各二兩
右爲末。生姜半斤取汁。打糊丸。梧子大。煎荊芥湯下五十丸。

人參前胡湯　治風痰、頭暈目眩。
半夏麴　木香　枳殼炒
赤茯苓　南星炮　甘草炙、各五錢
前胡五錢　橘紅五錢
右剉散。每服五錢。生姜五片。水煎服。

芎朮除眩散　治感濕感寒。頭重眩暈。
附子生　白朮　川芎各半兩
官桂

甘草炙各二錢半

右剉。每服三錢。姜七片。水煎服。

茯苓桂枝白朮甘草湯　治氣上沖胸臆搖眩痛。

茯苓一兩　桂枝七錢半　白朮　甘草炙各半兩

右剉。每服四錢。水煎服。風症加川芎、細辛。濕症加川芎蒼朮。寒證加乾姜、良姜。

半夏白朮天麻湯　見頭痛類。

正元散

紅豆炒三錢　人參二兩　肉桂半兩　附子炮去皮臍　故紙

川芎　山藥姜汁炒　烏藥　陽起石研細水飛

川烏炮去皮臍半兩　乾姜炮三錢　白朮　甘草炙各半兩　硫黃

茯苓各二兩　陳皮二錢　黃耆炙一兩半　黑錫去淨各二兩

右㕮咀。每服三錢。水一盞。姜三片。棗一箇。入鹽少許煎服。

黑錫丹

肉桂半兩　沉香　附子炮去皮臍　故紙

胡蘆巴酒浸炒　茴香炒　肉豆蔻煨熟　陽起石研細水飛

金鈴子湯去皮核　木香各一兩　硫黃　黑錫去淨各二兩

右用黑盞或新磁銚內如常法。結黑錫、硫黃、砂子地上。出火毒。研令極細。徐徐藥並榨糊為末。一處和勻。自朝至暮。以研至黑光色為度。酒糊丸如桐子大。陰乾入布袋內。擦令光瑩。每服四十粒。空心鹽姜湯或棗湯下。女人艾葉湯下。

腎著湯　見腰痛類。

川芎茶調散　見頭痛類。

頭痛六十八

○頭痛多主於痰。痛甚者火多。有可吐者。可下者。清空膏治諸頭痛。除血虛頭痛不可治。出東垣試效方　血虛頭痛自魚尾上攻頭痛。用芎歸湯。古方有追涎藥。

〔附錄〕頭痛須用川芎。如不愈。各加引經藥。

太陽川芎　陽明白芷　少陽柴胡。

太陰蒼朮　少陰細辛　厥陰吳茱萸。

如肥人頭痛。是濕痰。宜半夏、蒼朮。如瘦人。是熱。宜酒製黃芩、防風。　如感冒頭痛。宜防風、羌活、藁本、白芷。　如氣鬱頭痛。宜黃芪酒洗、生地黃、南星、秘霞安神湯。　如風熱在上。頭痛。宜天麻、荊子、白芎、藁本、防風、羌活、獨活、麻黃之頭為主。　少陽頭痛。脈弦細。往來寒熱。柴胡為主。　陽明頭痛。自汗。發熱惡寒。脈浮緩長實。升麻、葛根、石膏、白芷為主。　太陰頭痛。必有痰。體重。或腹痛。脈沉緩。以蒼朮、半夏、南星為主。　少陰頭痛。足寒氣逆。為寒厥。其脈沉細。麻黃、附子、細辛為主。　厥陰頭痛。或吐痰沫。厥冷。其脈浮緩。以吳茱萸湯主之。　血虛頭痛。當歸、川芎為主。　氣虛頭痛。人參、黃芪為主。　氣血俱虛頭痛。調中益氣湯內。加川芎三分。蔓荊子三分。細辛二分。其效如神。　又有痰厥頭痛。所感不一。是知方者。驗也。法者。用也。徒知。體

宜藥本。防風、柴胡、東垣云。頂頭痛須用藥本。去川芎。且如太陽頭痛。黃之頭為主。　少陽頭痛。脈弦細。往來寒熱。柴胡為主。　陽明頭痛。自汗。發熱惡寒。脈浮緩長實。升麻、葛根、石膏、白芷為主。　太陰頭痛。必有痰。體重。或腹痛。脈沉緩。以蒼朮、半夏、南星為主。　少陰頭痛。足寒氣逆。為寒厥。其脈沉細。麻黃、附子、細辛為主。　厥陰頭痛。或吐痰沫。厥冷。其脈浮緩。以吳茱萸湯主之。　血虛頭痛。當歸、川芎為主。　氣虛頭痛。人參、黃芪為主。　氣血俱虛頭痛。調中益氣湯內。加川芎三分。蔓荊子三分。細辛二分。其效如神。　又有痰厥頭痛。所感不一。是知方者。驗也。法者。用也。徒知。體而不知用者。譬體用不失。可謂上工矣。

【附方】清空膏　治偏正頭痛。年深不愈者。又治風濕熱。頭上痙。及腦痛。除血虛頭痛不治。

川芎五錢　柴胡七錢　黃連酒炒　防風

羌活各一兩　炙甘草一兩五錢　細辛黃芩三兩去皮。一半酒洗一半炒

右為末。每服二錢。熱湯內入茶少許。湯調如膏。抹在口內。臨臥少用白湯送下。如苦頭痛。每服加細辛二分。痰厥頭痛。脈緩。減羌活、防風、川芎、甘草。加半夏一兩五錢。　如偏正頭痛。服之不愈。減羌活、防風、川芎一半。加柴胡一倍。　如發熱惡熱而渴。此陽明頭痛。只與白虎湯。加好吳白芷。

安神湯　治頭痛、頭旋、眼黑。

生甘草　炙甘草各二錢　防風二錢五分　白芷　柴胡

升麻　酒生柏　酒知母各五錢　酒柏

羌活各一兩　黃芪二兩

右剉。每服五錢。水煎。加藁荊子五分。川芎三分。再煎。臨臥熱服。

微清膏

藁荊子　細辛各一分　薄荷葉　川芎各三分。

生甘草　炙甘草各五分　藥本一錢。

右為末。茶清調下二錢。

順氣和中湯　治氣虛頭痛。此藥升陽補氣。頭痛自愈。

黃芪一錢半　人參一錢　甘草炙七分。

陳皮　當歸　芎藭各五分。

柴胡各三分。　細辛　藁荊子

右作一服。水煎。食後服。

不臥散　治頭痛。

豬牙皁角一錢　玄胡　青黛些少。

右爲末。吹鼻中取涎。

半夏白朮天麻湯　治脾胃證。已經服疎風丸。下二三次。元證不變。增以吐逆。痰唾稠粘。眼黑頭旋。目不敢開。頭苦痛如裂。四肢厥冷。不得安臥。

黃柏二分酒洗	乾姜三分	澤瀉	白茯苓
天麻	黃芪	人參	蒼朮各一錢
炒神曲	白朮各一錢半	麥芽	半夏湯洗
陳皮各一錢半			

右每服五錢。水煎。熱服。

芎歸湯　見腸風類。

調中益氣湯　見脾胃類。

治頭痛

片芩酒浸透。晒乾爲末。茶清調。治諸般頭痛。亦治血虛頭痛。

治頭痛連眼痛　此風痰上攻。須用白芷開之。

雨前茶	川芎	白芷	防風
藁本	細辛	當歸	

治頭痛如破

酒炒大黃半兩　一半茶煎。

眉眶痛六十九

○眉眶痛、屬風熱與痰。作風痰治。類痛風。

【入方】

黃芩酒浸炒	白芷一本作白朮	草烏二味爲君。宜便浸炒去毒	
羌活	黃芩	甘草等分爲佐	細辛

右爲末。茶清調二錢。

又方

右爲細末。茶清調服。一本加南星。

〔附錄〕痛有二證。眼屬肝。有肝虛而痛。纔見光明。則眶骨痛遊。宜生熟地黃丸。又有眉稜骨痛。眼不可開。宜靜夜劇。宜導痰湯。或芎辛湯入牙茶。或二陳湯。吞青州白丸子良。

【附方】

選奇方。治眉骨痛不可忍。大有効。

羌活	防風各二錢	甘草二錢夏月生冬炒	

酒黃芩一錢。冬月不用。有熱者用。

右每服三錢。水煎。食後溫服。

生熟地黃丸

生半	熟半各一兩	玄參	

右爲末。蜜丸。

導痰湯　見痰類。

芎辛湯

附子生去皮臍	烏頭生	天南星	
甘草炙	川芎	細辛等分	

右剉。每服四錢。姜五片。茅茶少許。煎服。

青州白丸子　見和劑及瑞竹堂方。

四神散　治婦人血風。眩暈頭痛。

菊花	當歸	旋覆花	
荊芥穗			

右等分爲細末。每服二錢。葱白三寸。茶末二錢。水一盞半。煎至八分。去滓。食後溫服。

心脾痛七子

○心痛即胃脘痛。雖日數多。不喫食。不死。若痛方止便喫物。還痛。必須三五服藥後。方喫物。痛甚者。脈必伏。用溫藥附子之類。不可用參、朮。諸痛不可補氣。大凡心腑之痛。須分新久。若明知身受寒氣。口噤寒物而得病者。於初得之時。當與溫散或溫利之藥。若曰病得之稍久則成鬱。久鬱則蒸熱。熱久必生火。原病式中備言之矣。若欲行溫散溫利。寧無助火添病耶。古方中多以山梔子爲熱藥之向導。則邪易伏。病易退。正易復。而病安然病安之後。若縱恣口味。不改前非。病復作時。反咎醫之失。良可嘆哉。一方用山梔子炒、去皮。每服十五枚。濃煎湯一呷。入生姜汁令辣。再煎。小沸。又入川芎一錢。尤妙。山梔子大者。或七枚。或九枚。須炒黑。大概胃口有熱而作痛者。非山梔子不可。須佐以姜汁。多用白芎開之。病發者。或用二陳湯加川芎、蒼朮。倍加炒梔子。痛甚者。加炒乾姜從之。反治之法也。輕者。川芎一兩。蒼朮一兩。山梔子炒去皮二兩。姜汁。蒸餅糊丸。梧桐子大。服七八十丸。熱辣姜湯下。一重者。桂枝、麻黃、石膏各等分。姜汁和。蒸餅丸。桐子大。服五十丸。熱辣姜湯下。一本輕者散之。麻黃、桂枝之類。重者加石膏、川芎、蒼朮、炒山梔子去皮二兩。姜汁。蒸餅糊丸。梧桐子大。服七八十丸。熱辣姜湯下。必痛。有因平日喜食熱物。以致死血留於胃口作痛。用桃仁承氣湯下之。切記。輕者用韭汁、桔梗。能開提其氣。血藥中兼用之。以物柱按痛處則止者。挾虛。以二陳湯加炒乾姜和之。有虫痛者。面上白斑。唇紅。能食。屬虫。治以苦練根、錫灰之類。痛定便能食。時作時止者。是虫。上半月虫頭向上。易治。下半月虫頭向下。難治。先以肉汁及糖蜜食下。

則引虫頭向上。然後用藥打出。練樹根皮、楝柳、狗虱。又取汁飲。冬濃煎湯下萬應丸最好。服堅實不大便者下之。心痛用山梔并劫藥止之。若又復發。前藥必不効。可用玄明粉一服。立止。左手脈數無多。脈沈有死血。右手脈緊實痰積。弦大必是久病。胃脘有濕而痛者。宜小胃丹下之。

【入方】

黃連炒　山梔炒　吳茱萸湯洗各五錢　茯枝核燒存性三錢

右爲末。姜湯調粥丸。亦得。冷痛者。加草豆蔻仁炒末。姜汁炊餅丸服。

又方

山梔子仁炒黃色

右爲末。姜汁和丸。

又方

白朮五錢　白芍　炒　山梔炒　吳茱萸湯洗各五錢　茯枝核燒存性三錢

右爲末。姜汁炊餅丸服。

治痰飲積胃脘痛

蜣蜋殼燒上年久者佳

滑石炒　南星各二兩　半夏　生　各二兩

右爲末。生姜汁浸。蒸餅爲丸。綠豆大。每服三四十丸。姜湯下。春加芎、夏加黃連。冬加吳茱萸半兩。有痰者。用明礬溶開。就丸如雞頭大。熱姜湯吞下一丸。青黛亦治心痛。藍葉搥碎取汁。姜汁和服。亦治痰飲積胃脘痛。

蜣蜋殼燒上年久者佳

山梔　香附　蒼朮　炒　青皮　木香　南星各二兩　半夏　生　各二兩

右爲末。生姜汁浸。蒸餅爲丸。綠豆大。每服三四十丸。姜湯下。春加芎、夏加黃連。冬加吳茱萸半兩。有痰者。用明礬溶開。就丸如雞頭大。熱姜湯吞下一丸。青黛亦治心痛。藍葉搥碎取汁。姜汁和服。亦治痰飲積胃脘痛。

又方

白朮三錢半　白芍炒　人參　黃連炒一錢半　陳皮　吳茱萸半錢　歸尾各二錢半

右爲末。蒸餅丸。

又方　治氣鬱心痛者。

山梔子炒焦六錢　香附一錢　吳茱萸一錢

右爲末。蒸餅丸。如花椒大。以生地黃酒洗淨。同生姜湯煎。送下二十丸。

又方

胡椒　鞭撥各半兩

右爲末。以醋調麵作團子吞之。

又方　治心痛。亦治哮喘　又見痰類。

半夏切碎。香油炒

右爲末。姜汁炊餅丸。姜湯下二三十丸。

又方

草豆蔻一錢四分。麵裹煨。去皮　人參　茯甘草三分　神麯炒　姜黃各四分　桃仁七個。去皮尖。另研　益智　黃芪各八分　歸身　澤瀉一錢。小便數者減半　麥芽炒。一錢五分　柴胡四分。詳脇下加減用　橘皮　吳茱萸湯洗去苦。八分　青皮各六分

【附方】

草豆蔻丸　治客寒犯胃痛者。宜此丸。熱亦可服。止可一二服。

半夏洗一錢

右除桃仁另研餘爲末蒸餅丸如桐子大服三十丸白湯下食遠旋斟酌多少用之

丁香止痛散　治心氣痛不可忍

良姜五兩　茴香炒　甘草各一兩半　丁香半兩

右爲末每服二錢沸湯點服

失笑散　治心氣痛不可忍小腸氣痛

蒲黃炒　五靈脂酒研淘去砂土各等分

右先以醋調二錢煎成膏入水一盞煎食前熱服

二姜丸　治心脾疼溫養脾胃冷食所傷

乾姜炮　良姜

扶陽助胃湯　治寒氣客於滅胃胃脘當心而痛得熱則已

乾姜炮一錢半　揀參　草豆蔻

官桂　白芍各一錢　陳皮

吳茱萸各五分　附子炮二錢　益智五分

右剉作一服水煎生姜三片棗二枚　有積聚備急丹良

烏梅丸　治胃冷蛔虫攻心痛嘔吐四肢冷

烏梅三百箇　黃柏炙　細辛

附子炮各六兩　黃連十六兩　人參六兩

當歸各四兩　乾姜炮一兩

右爲末取烏梅肉和蜜丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

桃仁承氣湯　見吐血類

小胃丹　見痰類

五苓散　見中暑類

脇痛七十一

○脇痛肝火盛　本氣實　有死血　有痰流注　肝急　木氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類　痛甚者肝火盛以當歸龍會丸姜汁下是瀉火之要藥　死血用桃仁紅花川芎　痰流注以二陳湯加南星蒼朮川芎　肝苦急急食辛以散之用撫芎川芎蒼朮血病入血藥中行血　治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁　脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類　有火盛者當伐肝木　左金丸治肝火　有氣鬱而胸脇痛者看其脈沉澁當作鬱治　痛而不得伸舒者蜜丸龍會丸最快　脇下有食積一條扛起用吳茶萸炒黃連　控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服

右脇痛用推氣散出嚴氏方　右脇痛川芎藥爲君加柴胡或小柴胡

【入方】

小龍會丸

當歸　草龍膽酒洗　山梔炒

川芎各半兩　大黃煨半兩　蘆薈三錢

一方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香一方有甘草柴胡青皮無

右爲末入麝香少許粥糊丸如菜豆大每服五十丸姜湯下仍以號珀膏貼痛處　龍會丸亦治有積

因飲食大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸　治內有濕熱兩脇痛先以號珀膏貼痛處却以生姜汁吞此丸　痛甚者須炒令熱服

草龍膽　當歸　大梔子

黃芩各一兩　大黃　蘆會半兩

黃柏一兩　麝香半錢

右十味爲末麵糊丸　一方加柴胡川芎各半兩又方加青黛半兩

抑青丸　瀉肝火

黃連半斤

右爲末蒸餅糊丸服

〔附錄〕脇下痛發寒熱小柴胡湯　肥白人因氣虛而發寒熱脇下痛者補虛用參芪退熱用柴胡黃芩調氣止痛川青木香青皮　瘦人脇下痛發寒熱多怒者必有瘀血宜桃仁當歸紅花柴胡青皮大黃梔子草龍膽

【附方】

推氣散　治右脇疼痛服滿不食

枳殼　桂心　片子姜黃各半兩

甘草炙一錢半

右爲末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散　治左脇痛則不可忍者

枳實炒　川芎各半兩　粉草炙一錢半

右爲末每服二錢姜棗湯下酒亦可

十棗湯　治脇痛甚效病人氣實可用虛人不可用

甘遂　芫花醋炒黃色　大戟各等分

右爲末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一錢虛皆加減

控涎丹　見痛風類。
小柴胡湯　見瘧類。
琥珀湯　見積聚類。

腹痛七十二　附腹中窄狹　絞腸沙

○腹痛有寒、積熱、死血、食積、濕痰、脈弦、食脈滑、痰、一作濁清痰多作腹痛。台芎、蒼朮、香附、白芷爲末以姜汁入湯調服。大法之方若此。腹痛者氣用氣藥如木香、檳榔、香附、枳殼之類。血用血藥如當歸、川芎、桃仁、紅花之類。初得時元氣未虛必推蕩之此通因通用之法。久必難壯實與初病宜下。虛弱衰與久病宜升之消之。腹中水鳴乃火炮動其水也。用二陳湯加黃芩、黃連、梔子亦有臟寒而鳴者。凡心腹痛者必用溫散此是鬱結不行阻氣不通故痛。在上者多屬食。食能作痛宜溫散之如乾姜、炒蒼朮、川芎、白芷、香附、姜汁之類。不可用峻利藥攻下之蓋食得寒則凝熱則化。更兼行氣快氣藥助之無不可者。一老人腹痛年高不禁下者。用川芎、蒼朮、香附、白芷、乾姜、茯苓、滑石之類。

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是。時痛時止者是熱也。死血痛者每痛有處不行移者是也。食積者甚欲大便、利後痛減者是。濕痰者凡痛必小便不利。

【入方】　治酒積腹痛者寬氣緊要。

檳榔　三稜　莪朮　香附
官桂　蒼朮　厚朴　陳皮
甘草　茯苓　木香

右爲末。神麯糊丸。每服五十丸。白湯下。

【附錄】　或曰。痰豈能痛曰。痰因氣滯而聚。既聚則礙其路道不得運。故作痛也。諸痛不可用參、芪、朮。蓋補其氣。氣旺不通而痛愈甚。白芍藥只治血虛腹痛。諸痛證不可用。以酸收斂。膈下忽大痛。人中黑色者多死。

○絞腸沙作痛。以樟木煎湯大吐。或白礬調湯吐之。鹽湯亦可探吐。宜刺委中出血。腹痛須用芍藥。惡寒而痛。加桂。惡熱而腹痛者亦加黃柏。凡腹痛以手重按者屬虛。宜參、朮、姜、桂之屬。凡腹痛以手不可按者屬實。宜大黃、芒硝下之。凡肥人腹痛者屬氣虛象濕痰。宜參、二朮、半夏。如感寒而腹痛。宜姜、桂、吳茱萸、丁香。如傷暑而腹痛。宜玉龍丸。如飲食過傷而痛者。宜木香檳榔丸下之。如菜果傷飲食過傷而腹痛者。當補脾胃而消導。宜參、朮、山查、麵蘗、枳實、木香。如顦顇損傷而腹痛者。乃是瘀血。宜桃仁承氣湯加當歸、蘇木、紅花。入酒、童子便煎服下之。有全不思食。其人本體素弱而腹冷痛者。以養胃湯仍加桂、茱萸各半錢。木香三分。又或理中湯、建中湯、皆可用。內加吳茱萸良。

【附方】

玉龍丸　又名黃龍丸　見中暑。

木香檳榔丸　見痢類。
桃仁承氣湯　見吐血類。
養胃湯　見瘧類。
理中湯　見中寒類。
小建中湯

芍藥三兩。　甘草一兩。　生姜一兩半。
桂枝去皮一兩半。　膠飴半斤。　餘有微邪或嘔者去膠。

右剉。每服五錢。水盞半。姜三片。大棗一箇。煎八分。去滓。下飴膠兩匙許。再煎化。溫服。

○腹中窄狹。須用蒼朮。若肥人自覺腹中窄狹。乃是濕痰流滯腸胃。不升降。燥飲用蒼朮。行氣用香附。如瘦人自覺腹中窄狹。乃是熱氣薰蒸藏府。宜黃連、芒朮。

腰痛七十三　附腎著

○腰痛主濕熱。腎虛。瘀血。挫閃。有痰積。脈大者腎虛。杜仲、龜板、黃柏、知母、枸杞、五味之類爲末。豬脊髓丸服。脈澁者瘀血。用補陰丸加桃仁、紅花。脈緩者濕熱。蒼朮、杜仲、黃柏、川芎之類。痰積作痛者二陳加南星、半夏。腰曲不能伸者。針人中。凡諸痛皆屬火。寒涼藥不可缺用。必用溫散之藥。諸痛不可用蓬朮、白朮。

戴云。濕熱腰疼者。遇天陰或久坐而發者是也。腎虛者、疼之不已者是也。瘀血者、日輕夜重者是也。

【入方】　治濕痰腰痛。大便泄。

龜板一兩。炙　蒼朮　椿皮
白芍酒炒　香附各四錢

右爲末。糊丸。如內傷。白朮山查湯下。

又方　治腰腿濕痛。

龜板酒炙　黃柏酒炙　蒼朮
威靈仙酒浸各一兩　扁柏半兩

右爲末。酒糊丸。每用黑豆汁煎四物湯加陳皮、甘草、生姜煎湯下。腳痛亦可。

又方

龜板酒炙一兩半　炒柏　白芍一兩
威靈仙　知母　蒼朮

右爲末。調服。

龜板酒炙半兩　酒炒柏四錢　青皮三錢　生甘草一錢半

右爲末。姜一大片。同前藥末一錢研勻。以荠耳汁盪起煎。令沸服之。

摩腰膏　治老人虛人腰痛并婦人白帶

附子尖　烏頭尖　南星各二錢半　雄黃一錢

檳榔　丁香　乾姜　吳茱萸各一錢半

朱砂一錢　麝香五粒大者

右爲末。蜜丸如龍眼大。每用一丸。姜汁化開如粥厚。火上頓熱。置臍中。摩腰上。候藥盡粘腰上。烘綿衣包縛定。隨即覺熱如火。日易一次。

〔附錄〕腰者、腎之外候。一身所恃以轉移開闔者也。蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊。腎氣一虛。凡衝寒、受濕、傷冷、蓄熱、血澁、氣滯、水積、墮傷、與失志、作勞、種種腰疼、壞見而沓出矣。脈若弦而沉者爲虛。沉者爲滯。澁者瘀血。緩者爲濕。滑與伏者是痰。

○氣痛。一身腔子盡痛。皆用少許木香於藥內行氣。若寒濕腰痛。見熱則減。見寒則增。宜五積散加吳茱萸半錢。杜仲一錢。若濕腰痛。如坐水中。或爲風濕雨露所著。濕流入腎經。以致腰痛。宜滲濕湯。不効。宜腎著湯。腎虛腰痛。轉側不能。以大建中湯。加川椒十粒。仍以大茴香鹽炒爲末。破開猪腰子。作薄片。勿令斷。層層散藥末。水紙裹煨熟。細嚼酒喫下。

牛頭末一錢。或桃仁七枚。

【附方】

青娥丸　治腎虛腰痛。益精助陽。

破故紙四兩炒　杜仲四兩炒去絲　生姜二兩半炒乾

右爲末。用胡桃肉三十箇研膏入蜜。丸桐子大。每服五十丸。鹽酒下。

獨活寄生湯　治腎氣虛弱。爲風濕所乘。流注腰膝。或攣拳腫痛。不得屈伸。或緩弱冷痺。行步無力。

獨活一兩　桑寄生如無以續斷代之　細辛

牛膝　蔦艽　白芍

桂心　防風　人參

熟艽　杜仲炒　甘草炙各二兩

右剉。每服三錢。水煎。空心服。下利者去地黃。血滯於下。委中穴刺出血。炒仍灸腎俞、崑崙、尤佳。

治腰疼

黑丑四兩半生半炒

右研細。取頭末水丸桐子大。硫黃爲衣。每服三十丸。空心鹽酒送下。四服卽止。

補陰丸　見諸虛類。

五積散　見脚氣類。

大建中湯　見蛔蟲類。

復元通氣散　見氣類。

○腎著爲病。其體重。腰冷如冰。飲食如故。腹重如物在腰。治宜流濕。兼腎著湯　治腎虛傷濕。身重腰冷。如坐水中。不渴。小便自利。

乾姜炮　茯苓各四兩　甘草炙

右㕮咀。每服五錢。水煎。空心服。

滲濕湯　治寒濕所傷。身體重著。如坐水中。

蒼朮　白朮　甘草炙各一兩

乾姜炮各一兩　橘紅　丁香各二錢半

右每服五錢。水一鍾。生姜三片。棗一枚。煎服。

疝痛七十四　附木腎　腎經濕痛

○疝痛。濕熱痰積流下作病。大概因寒鬱而作。卽是痰飲食積并死血。不宜下。痛甚者不宜參、朮。癇濕多。疝氣宜灸大敦穴。在足大指甲後。一韭葉聚毛間。是穴。食積與死血成痛者。梔子、桃仁、山查、枳子、一作枳實。吳茱萸、並炒。以生姜汁順流水煎湯調服。一方加茴香、附子。却有水氣而腫痛者。又有挾虛者。當用參、朮爲君。佐以疎導之藥。其脈沉緊豁大者是。按之不定者屬虛。必用桂枝、山梔炒、烏頭細切炒。右爲末。姜汁糊丸。每服三四十丸。姜湯下。大能劫痛。戴云。疝本屬厥陰肝之一經。余常見俗說小腸膀胱下部氣者。皆妄言也。

【入方】　治諸疝。定痛速効。

枳實十五片一作橘核　山梔炒　吳茱萸炒各等分　濕勝加荔枝核炮

右爲末。酒糊丸服。或爲末。生姜水煎服。或是流水調下一二錢。空守効丸　治癇之要藥。不痛者。

蒼朮　南星　白芷散水

川芎　枳核又云枳實炒　半夏

秋冬加吳茱萸衣鉢有山梔。

右爲末。神麯糊丸服。又云有熱加山梔一兩。堅硬加朴硝半兩。

又方　治諸疝發時服。

海石　香附

右爲末。生姜汁調下。亦治心痛。

又或加青皮、荔枝核。

又方　治陽明受濕熱傳入太陽。惡寒發熱。小腹連毛際間間痛不可忍。

山梔炒　桃仁炒　枳子炒　山查

右爲末。作湯服後。一痛過。更不再作矣。

又方　治類痛

橘核散

橘核　桃仁　梔子　川烏細切炒

吳茱萸

右研。煎服。橘核散。罩止痛。此蓋濕熱因寒鬱而發。用梔子仁以除濕熱。用烏頭以散寒鬱。泥二藥皆下焦之藥。而烏頭又爲梔子所引。其性急速。不容胃中留也。

又方　治痛劫藥。

用烏頭細切炒、梔子仁炒等分爲末。咸加咸減。白湯丸。

又方　治痛。

枇杷葉　野紫蘇葉　椒葉

水晶葡萄葉

右以水煎熏洗。

腎氣方

茴香　破故紙

木香二錢半

右爲末。韮菹揭汁丸。鹽湯下。

積痛方

山查炒、一兩　茴香炒、

右爲末。酒糊丸如桐子大。服五六十丸。鹽湯下。

○痛病黃病久者。皆好倒倉。

又方　治痛痛。

山查炒、四兩　枳實炒、

柴胡　牡丹皮

吳茱萸炒、半兩、

右爲末。酒糊丸。桐子大。服五十丸。空心鹽湯下。

又方　治痛作痛。

蒼朮鹽炒。　香附鹽炒。

玄胡索　益智

附子鹽炒　甘草爲使。

右爲末。作湯服後。一痛過。更不再作矣。

又方　治類痛

南星　山查

半夏　枳核

昆布半兩、　玄明粉

右爲末。酒糊丸。　茱萸二錢、

一人痛痛作。腹內塊痛止。痛痛止。塊痛作。

三稜　莪朮醋煮、　炒黍

南星各一兩、　山查二兩、　木香

香附各三錢、　黃連用茱萸炒。去茱萸用五錢淨、

桃仁　山梔　枳核炒、各半兩、

右爲末。姜汁捻。蒸餅爲丸。

○予嘗治一人。病後飲水。患左丸痛甚。灸大敦穴。適有摩腰膏內用烏、蟷火溫鉗熨之。痛即止。一宿腫亦消。　予舊有柑橘粒。後因山行饑甚。遇橘芋。食之。橘助舊積。芋復滯氣。即時右丸腫。大寒熱。先服調胃劑一二貼。次早注神思。氣至下焦。嘔逆。慢積動吐。復吐後。和胃氣、疎通經絡而愈。

〔附錄〕木腎者。心火下降。則腎水不患其不溫。眞陽下行。則腎氣不患其不和。溫溫其和。安有所謂木強者哉。夫惟嗜慾內戕。腎家虛憊。故陰陽不相交。水火不相濟。而沉寒痼冷。凝滯其間。脹大作痛。頑痹結硬。勢所必至矣。不可純用燥熱。當溫散溫利。以逐其邪。邪氣內消。榮衛流轉。益如寒谷回春。蓋有不疾而速。不行而至者矣。

【入方】　治木腎。

楮樹葉（又云楊樹雄者）晒乾爲末。酒糊丸。桐子大。空心鹽湯下。五十丸。

又方　治木腎不痛。

枸杞子　南星　半夏

蒼朮鹽炒　山查　白芷

滑石炒　昆布　吳茱萸

右爲末。酒糊丸。桐子大。空心鹽湯下。七十丸。

治小腸氣又木腎偏墜。

黑牽牛一斤。用猪尿胞裝滿。以線縛定口子。好酒米醋各一椀。於砂鍋內煮乾爲度。取出黑牽牛。用

白芷　姜黃

海藻　沉香

蘿蔔子

黃柏酒炒、爲君。

神麯炒。

青紅娘子各十九箇。於鐵鍋內炒燥。去青紅娘子。將牽牛碾取頭末四兩。另入猪苓、澤瀉、細末各二兩。醋糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心鹽酒送下。不可多服。多服令人頭眩。如頭眩。可服黑錫丹。

腎虛濕痛

蜜陀僧　乾姜　滑石

右爲末。摻上。

又方　先用臭茶莫煎湯洗。

臭茶莫半兩　寒水石三錢　黃柏二錢

蛇牀子半兩　輕粉十盌　白礬三錢

檳榔三錢　白芷三錢

右爲末。麻油調摻。

又方　治腎上風濕痛及兩腿。

全蝎一錢　檳榔一錢　蛇牀子一錢　硫黃一錢

右四味。研如細末。用麻油調入手心摻熱。吸三口。用手抱盞一頓。次摻藥兩腿上。

耳聾七十五

○耳聾皆屬於熱。少陽厥陰熱多。當用開痰、散風熱、通聖散。滾痰丸之類。大病後耳聾。須用四物湯降火、陰虛火動耳聾者。亦用四物湯。

○因驚而聾者。以通聖散內大黃酒煨。再用酒炒二次後。入諸藥。通用酒炒。耳鳴因酒退者。大劑通聖散加枳殼、柴胡、大黃、甘草、南星、桔梗、青皮、荊芥。不愈。用四物湯妙。耳鳴必用龍會丸。食後服。氣實人。檳榔丸或神芎丸下之。聾病必用龍會丸、四物湯養陰。濕痰者。神芎丸、檳榔丸。耳濕腫痛。涼腦散加酒炒大黃、黃芩、酒浸防風、荊芥、羌活服。腦多膿少濕。加枯礬吹。耳內閃閃然。亦是陰虛。

戴云。亦有氣閉者。蓋亦是熱氣閉者。耳不鳴也。

【入方】

萆麻子四十九粒　乘肉十箇

右入人乳汁。搗成膏。石上略晒乾。便丸如指大。綿裹塞於耳中。

又方

鼠膽汁滴入耳中。光妙。

又方

將龜放漆桌上。尿出用綿漬之。搽入青葱管中。滴入耳中。

〔附錄〕耳屬足少陰之經。腎家之竅於耳也。腎通乎耳。所主者精。精氣調和。腎氣充足。則耳聞而聰。若勞傷氣血。風邪襲虛。使精脫腎憊。則耳鞕而聾。又有氣厥而聾者。有挾風而聾者。有勞損而聾者。蓋

十二經脈上絡於耳。其陰陽諸經適有交并。則臟氣逆而爲厥。厥氣拂入於耳。是謂厥聾。必有眩暈之證。耳者、宗脈之所附。脈虛而風邪乘之。風入於耳之脈。使經氣痞而不宣。是謂風聾。必有頭痛之證。

勞役傷於血氣。徑慾耗其精元。瘦悴力疲。昏昏瞀瞀。是爲勞聾。有能將息得所。血氣和平。則其聾可輕。又有耳鳴風邪與氣相搏。其聲嘈嘈。眼見光爲之虛聾。熱氣乘虛隨脈入耳。聚熱不散。濕汁出。爲之膿耳。人耳間有津液。輕則不能爲害。若風熱搏之。津液結聚成核。塞耳。亦令暴聾。爲之耵耳。前是數者。腎脈可推。風則浮而盛。熱則洪而實。虛則濇而濡。風爲之疏散。熱爲之清利。虛爲之調養。邪氣退。然後以通耳調氣安腎之劑主之。於此得耳中三昧。

【附方】

和劑流氣飲　治厥聾。

方見氣類內。加萵苣、生姜、葱、同煎服。　治聾皆當調氣。

桂星散　治風虛耳聾。

辣桂　川芎　當歸

石菖蒲　木通　白殭蠶炒。

麻黃去節　甘草炙各二錢半。　南星煨。

紫蘇一錢。

右剉。每服二錢。水煎。葱二莖。食後服。

地黃丸　治勞損耳聾。

熟芐　當歸　川芎

兔絲子　川椒炒。　故紙炒。

胡蘆巴炒。　杜仲炒。　白芷

磁石大燒醋淬七次。研水飛一錢二分半。

右爲末。煉蜜丸如桐子大。服五十丸。葱白溫酒下。

益智散　治腎虛耳聾。

磁石制如前。　巴戟去心。　川椒各一兩炒。

石菖蒲各半兩。

右爲末。每服二錢。用猪腎一枚細切。和以葱白少鹽。并藥濕紙十重裹煨令熟。空心嚼。以酒送下。

芎芷散　治風入耳虛鳴。

白芷　石菖蒲炒。　蒼朮

細辛　厚朴　半夏

木通　紫蘇葉等。　甘草炙各二錢半。

木香　陳皮

白芷梢各四錢。　桂

辣桂　川芎五錢。

白殭蠶炒。

石菖蒲各一錢半。

細辛　沉香

右剉散。每服三錢。姜三片。葱二枝。水煎。食後臨臥服。

耳鳴方

草烏頭　石菖蒲

右等分爲末。用綿裹塞耳。一日三度。

耳鳴暴聾方

川椒　石菖蒲

右爲末。溶蠟丸如梨核大。塞入耳。

聾劑子散　治內熱耳出濕汁。

甘草炙　川升麻

桑白皮炒　麥門冬去心

甘菊　赤茯苓

右等分。每服三錢。姜三片。棗一枚。煎食後溫服。

又方　治耳內出膿。

真龍骨　枯白礬

烏賊骨　臘脂一錢一分。

右爲末。摻耳。

又方　治耳內膿出或黃汁。

石膏新瓦上煨　明礬枯。

龍骨各等分。　麝香少許。

右爲末。綿纏竹簽拭耳。換綿醮藥入耳。

耵耳方　治風熱搏之。津液結靳成核塞耳。

生猪脂　地龍

右件細研。以葱汁和揑如梨核。綿裹入耳。令潤。釜下煖等分。

耳爛　貝母爲末。乾糝。

右水煎。食後服。

桃花散　治耳中出膿。

枯礬　乾臘脂各一錢。

右爲末。綿杖子醮藥搽之。

通聖散　見斑疹類。

滾痰丸

大黃半斤。　黃芩半斤。

青礞石一兩。　沉香五錢。

麝香一字。

右爲末。水丸。梧子大。

薄荷丸　見腦痛類。

檳榔丸　見痫類。

神芎丸　見痛風類。

涼膈散　見自汗類。

鼻病七十六

松脂各二錢半。　山豆肉半錢。

○酒渣鼻是血熱入肺。治法用四物湯加陳皮。又云柏皮、紅花、酒炒黃芩煎。入好酒數酒。就調炒五靈脂末。臥服。格致論中於上藥有茯苓、生姜。氣弱者加黃芪。

【入方】

用桐油入黃連末。以天吊藤燒灰。熱傳之。一云用桐油入天吊藤燒。油熬調黃連末拌傳之。

又方

用山梔爲末。蜜蠟丸。彈子大。空心嚼一丸。白湯送下。

治鼻中瘜肉　胃中有食積。熱痰流注。治本當消食積。

蝴蝶蠶二錢。　細辛一錢。　白芷五錢

右爲末。內鼻中。

治鼻淵

南星　半夏　蒼朮

神麯　酒芩　辛夷

右水煎。食後服。

【附錄】酒渣者。此皆壅熱所致。夫肺氣通於鼻。清氣出入之道路。或因飲酒。氣血壅滯。上焦生熱。邪熱之氣留伏不散。則爲之鼻瘡矣。又有肺風不能飲而自生者。非盡因酒癢耳。宜一味浙二泔。食後用冷飲。外用硫黃入大棗頭內。煨碾塗之。若鼻尖微赤及鼻中生瘡者。辛夷僞末。入腦射少許。綿裹納之。或以枇杷葉拭去毛。劉煎湯候冷。調消風散。食後服。一方。以白鹽常擦妙。又以牛馬耳垢傅。妙。

【附方】

白龍丸　末。逐日洗面。如澡豆法。更卷少時。方以湯洗法。食後常服龍虎丹一貼。方見和劑風門。

白芷　藁本　細辛

川芎

甘草各等分。

右爲細末。每四兩入煆石膏末一斤。水丸。

又方　黃柏、苦參、檳榔等爲末。付以猪脂調。尤妙。

白芷

荊芥

又方　以青黛、槐花、杏仁研、付之。

又方　以杏仁研乳汁付之。

鉛紅散　治風熱上攻面鼻紫赤痤瘡、俗呼肺風。

胡上硫黃　白礬各半兩。

右爲末、黃丹少許、染與病人面色同、每上半錢、津液塗之、臨臥再塗、粟服升麻湯下瀉青丸服之、除其根本也　一方見腸風類。

輕黃散　治鼻中瘡皮。

輕粉一錢　雄黃半兩　杏仁一錢、湯浸去皮尖雙仁、

麝香少許。

右於乳鉢內先研杏仁如泥、餘藥同研細勻、磁合盛定、每有患者、不問深淺、臥臥用筯點糊米許、紙鼻中、腦花一次、半月効。

消風散　見中寒類。

眼目七十七

○眼黑睛有翳、皆用黃柏、知母。　眼睛痛、知母、黃柏瀉腎火、當歸養陰水。　眼中風淚出、食後吞龍荇丸數粒日三次。　冬月眼暴發痛、亦當解散、不宜用涼藥。

【入方】

神効七寶膏　治暴發眼熱遮有翳膜者。

蔥仁去油心膚　白鵬砂　朱砂

蜜調成膏、點眼。

爛眶眼

薄荷　荊芥　細辛

右爲粗末、如燒香狀燒之、以青碗盛蜜少許於內、覆香煙上取煙、盡之後以小青礪收煙藏之、凡眼有風熱多淚者、皆可點、此是陽明經有風熱所致。

生熟地黃丸　治血虛眼。

方見眉眶痛類。

龍脅丸　見脇痛類。

一人病眼、至春夏便當作瘺治。

黃芩酒浸、　南星姜製、　香附童便浸、各二兩、

川芎童便浸兩半、　山梔炒一兩、　草龍膽酒浸、

連翹　蘿蔔子蒸、　青黛各半兩、

右爲末、神麴糊丸。

【附方】

瀉熱黃連湯　治眼暴發赤腫疼痛。

黃連酒炒、　黃芩酒炒、　草龍膽

升麻半兩、　柴胡一兩、

右㕮咀、每服四錢、水煎、日午前飯後熱服。

上清散　治上熱鼻塞、頭目不清利。

川芎　薄荷　荊芥穗各半兩、

石膏　桔梗各一兩、

右爲末、每服一字、口噙水、鼻內搐之、神効、加龍腦三分、尤妙。

東垣熟乾地黃丸

人參二錢、　炙甘草　天門冬去心、

五味子　枳殼炒、　黃連各三錢、

黃芩各半兩、　生苄洗酒七錢半、　柴胡八錢、

右爲末、煉蜜丸、桐子大、每服百丸、茶清下、食後、日二服。

口瘡七十八

○口瘡服涼藥不愈者、因中焦土虛、且不能食、相火衝上無制、用理中湯、人參、白朮、甘草、補土之虛、乾姜散火之標、甚則加附子、或陰官桂亦妙。　一方、生白礬爲末、貼之極効、或噙良久、以水嗽之、再噙。　一方、治口瘡甚者、用要瓜瓤水、徐徐飲之、冬月無此、用西瓜皮燒灰傅之。　又方、黃連、好酒煮之、呷下立愈。　又方、遠志、醋研、鵝毛掃患處、出涎。

【入方】

細辛　黃柏炒、一云黃連、等分、

右爲末、貼之、或摻舌上、吐涎水再傅、須旋合之。

治滿口白爛

鞋撥一兩、爲末、　厚柏一兩、

右用柏、火炙爲末、米醋煎數沸後、調上藥、敷涎再用白湯漱口、即愈、重者三次。

舌上生瘡、用白荷花瓣貼之。

【附錄】口舌生瘡、皆上焦熱壅所致、宜如聖湯、或柑桔湯加黃芩一錢、仍用柳花散摻之。

【附方】

黑參丸　治口舌生瘡、久不愈。

墨參　天門冬　麥門冬去心各炒一兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裹噙化嚥津

柳花散　治口舌生瘡

玄胡索一兩　黃柏　黃連各半兩

青黛二錢

右爲末傅貼口內有津卽吐

增損如聖湯

桔梗二兩　甘草炙一兩半　防風半兩

右爲末每服三錢水煎食後服

甘桔湯

桔梗二兩　甘草一兩

右水煎食後溫服

理中湯　見中寒類

○牙痛梧桐淚爲末少加麝香擦之　牙大痛必用胡椒、華撥爲末擦其中浮熱間以升麻、寒水石佐以辛涼荊芥、薄荷、細辛之類　又方用清涼藥使使痛不開必須從治芩撥、川芎、薄荷、荊芥、細辛、樟腦、青鹽

治牙痛甚者

防風　羌活　青鹽入肉　細辛

華撥　川椒

右爲末擦齦

又方

南星爲末霜梅五箇取其引涎以荊芥、薄荷、散風熱青鹽入腎入骨擦齦

又方

蒲公英燒灰　香附末　白芷

右爲末擦齦

治陰虛牙出鮮血氣鬱

用四物湯加牛膝、香附、生甘草、側柏

蛀牙

蓖麻、白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛

大黃、香附各燒灰存性爲末入青鹽少許不時擦牙上

固齒

用羊腰骨燒灰存性二錢當歸、白芷、猪牙皁角、青鹽各一錢爲末擦牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩升麻一兩、黃連半錢擦用

破滯氣七十九　附氣刺痛　附諸氣

○破滯氣須用枳殼爲者用之夫枳殼者損胸中至高之氣二三服而已又云滯氣用青皮勿多用多則瀉眞氣　如實熱在內相火上沖有如氣滯宜知母、黃柏、黃連、黃芩　如陰虛氣滯者宜四物加玄參、黃柏以補血

○氣刺痛用枳殼若何部分以引經藥導使之行則可　若虛受寒壯而氣刺痛宜枳殼、烏藥　若肥白氣虛之人氣刺痛者宜參、朮加木香　若因事氣鬱不舒暢而氣刺痛當用木香

〔附錄〕充按丹溪無治氣條後人增入姑存以便閱者

○人以氣爲主一息不運則機緘窮一室不穀則穹壤判陰陽之所以升降者氣也血脈之所以流行者亦氣也榮衛之所以運轉者此氣也五臟六腑之所以相養相生者亦此氣也氣平運則病氣也者獨非人身之根本乎人有七情病生七氣七氣者寒、熱、怒、恚、喜、憂、愁或以爲喜、怒、憂思、悲、驚、恐皆通也然則均調是氣將何先焉曰氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏爲主而官桂佐之蓋良法也況夫冷則生氣調氣須用豁痰亦不可無溫中之劑其間用桂又所以溫其中也不然七情相干痰涎凝結如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之間咯不去嚥不下或中艱食或上氣喘急曰氣隔曰氣滯曰氣秘曰氣中以至五積六聚痞癖癥瘕無往而不至矣　怒則氣上喜則氣緩悲則氣亂恐則氣下勞則氣耗悲則氣消思則氣結此七者皆能致疾　寒氣鬱於中作痛者以七氣湯鹽煎散東垣升陽順氣湯　逆者抑之以木香流氣飲、降氣湯有熱者須加涼劑抑之所謂從陰引陽也

【附方】

和劑七氣湯　七氣所傷痰涎結聚心腹刺痛不能飲食

半夏五兩　人參　桂各一兩

右每服三錢水煎姜五片棗一枚

三因七氣湯　治如前

半夏五兩　茯苓四兩　厚朴三兩

右剉以水煎姜七片棗二箇

指迷七氣湯　治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮　陳皮　桔梗　甘草炙半兩

紫蘇二兩

桂　藿香　益智各一兩。
甘草炙七錢半。　半夏七錢半。
右剉。每服三錢。水煎。姜三片。棗一箇。
加減七氣湯
莪朮炮。　三稜炮。　青皮　益智
香附　藿香　陳皮　甘草炙。
梗桔　官桂　檳榔　木香
枳殼炒。　白果　蘿蔔子炒。　紫蘇
右以水煎。姜三片。
流氣飲子　治男婦五臟不和。三焦氣塞。心胸悶痞。咽塞不通。腹脇膨脹。脚氣腫痛。肩背走注疼痛。嘔吐不食。氣喘。咳嗽痰盛。面目浮腫。及四肢大便秘澁。小便不通。
木香二錢半。　檳榔　青皮
茯苓　枳殼　桔梗
芎藭　防風　川芎
枳實　黃芪　烏藥
甘草炙。　陳皮七錢半。
右剉。每服五錢。水煎。姜三片。棗一枚。
和劑流氣飲　調榮衛。利三焦。行痞滯。消腫脹。
陳皮　青皮　紫蘇
香附炒。　甘草炙各四兩。　木通二兩。
丁皮　檳榔　桂
草果　莪朮　藿香各一兩半。
人參　白朮　木瓜
石菖蒲　白芷　半夏
右每服三錢。水煎。姜四片。棗二枚。一方有大黃無藿香。
大七氣湯　治積聚。隨氣上下。發作有時。心腹疼痛。大小便不利。
三稜炮。　莪朮炮。　青皮炒。
藿香　桔梗　肉桂
甘草炙七錢半。　香附炒一兩半。
右剉。以水煎。姜五片。

分心氣飲　治男婦一切氣不和。心胸痞悶。脇肋脹滿。噎塞不通。噫氣吞酸。嘔噦惡心。頭目昏眩。四肢倦怠。面色痿黃。口苦舌乾。飲食減少。日漸羸瘦。大腸虛秘。並皆服之。
紫蘇莖葉俱用四兩。　羌活　半夏
青皮　陳皮　腹皮
木通　芍藥　甘草炙。
右剉。每服三錢。水煎。生姜三片。棗一枚。燈心十莖。若氣秘。加枳殼、蘿蔔子、皂角子各半錢。咳嗽不利。加人參一錢。五味子七粒。桔梗一錢。　氣滯腰疼。加木瓜二片、枳殼一錢。　水氣、面目浮腫。加車前、麥門冬、萆薢子、澤瀉、豬苓。
分心氣飲　治一切氣留滯於胸膈之間。不能流暢。以致痞悶。噎塞不通。大便虛秘。
木香　丁皮各二錢。　人參　麥門冬去心。
腹皮　檳榔　桑白皮　草果
桔梗　厚朴　白朮各半兩。　香附
藿香　陳皮　紫蘇各一兩半。　甘草炙一兩半。
右剉。每服三錢。水煎。入姜三片。棗二枚。燈心十莖。
分心氣飲寬方　治疑思鬱怒。諸氣痞滿停滯。通利大小便。
紫蘇莖葉三兩。　半夏　枳殼各一兩半。　青皮
橘紅　腹皮　桑白皮炒。　木通
赤茯苓　木香　檳榔　木瓜
麥門冬去心。　桔梗　桂　甘草炙一兩。
藿香各一兩。　甘草炙一兩三錢。　香附
右剉。每服三錢。水煎。入姜三片。棗二枚。燈心十莖。
蘇子降氣湯　治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。頭目腰痛。大便風秘。冷熱氣瀉。肢體浮腫。
紫蘇子　半夏五兩。　當歸　甘草炙。
前胡　厚朴各二兩。　官桂　陳皮三兩。
右剉。姜三片。棗一枚。水煎服。
三和散　和暢三焦。治痞脹浮腫。腸胃澁秘。
腹皮炒。　紫蘇莖葉　沉香　木瓜
羌活各二兩。　白朮　川芎　木香
甘草炒。　陳皮　檳榔濃紙煨各七錢半。
右每服三錢。水煎服。　加茯苓。利水。

綜急散　治男婦脾胃虛冷。氣滯不行。攻刺心腹。痛連胸脇。肠胱小腸腎氣。及婦人血氣刺痛。

玄胡索　肉桂　乾姜炮各一兩　蒼朮
甘草炙各八兩　砂仁　丁皮　檳榔各四兩
蓬朮　三稜　茯苓　青皮各六兩

右每服二錢。水煎。入連蔥白一莖。空心溫服。

治氣六合湯

當歸　芎藭　川芎　地黃
木香　檳榔　右以水煎服。

分氣紫蘇飲　治脾胃不和。胸膈噎塞。腹脇疼痛。氣促喘急。心下脹悶。

枳殼　茯苓　陳皮
甘草　蘇子　白朮
當歸　紫蘇　半夏　桑皮
五味子

右剉。姜三片。水煎。

木香化滯散

木香　白朮　陳皮
腹皮　茯苓　人參
青皮　藿香　姜黃
白果

聚香飲子　治七情所傷。遂成七疝。心脇引痛。不可俛仰。

檳香　木香　丁香　桔梗
沉香　藿香各一兩　玄胡索　砂仁
桔梗炒　甘草炙　桂心　檳榔

右姜三片。棗一枚。煎服。

沉香降氣湯　治三焦痞滿。滯氣不宣。心腹痛滿。噯吐痰沫。五噎五膈。

沉香　木香　丁香　藿香
人參　甘草　白朮各一兩　乳香
桂花　檳榔　陳皮　川烏炮
川姜炮　枳實炒　白檀各二兩　片子姜黃各十兩

青皮　白豆蔻
右每服三錢。水煎。入鹽少許。

烏藥平氣散　治脚氣上攻。頭目昏眩。脚膝痠疼。行步艱苦。諸氣不和。喘滿迫促。

人參　白朮　茯苓　甘草
天台烏藥　當歸　白芷　川芎
麻黃　木瓜　五味子

右姜三片。水煎服。

復元通氣散　治氣不宣流。或成瘡癤。并因挫腰痛。諸氣滯閉。耳聾耳疼。

茴香　穿山甲蛤粉炒各二兩
玄胡索　甘草炒　陳皮各一兩

右為末。每服一錢。熱酒調服。

手拈散　治心脾氣痛。

草果　沒藥　玄胡
右為末。酒調二錢。

枳殼煮散　治悲哀傷肝氣。痛引兩脇。

防風　川芎　枳殼
桔梗　甘草　葛根

右用水煎服。

鹽煎散　治男子婦人。一切冷氣。攻衝胸脇。刺痛不已。及脾胃虛冷。嘔吐泄瀉。腸胱小腸氣。婦人血氣痛。

羌活　砂仁　甘草炙
草果　肉豆蔻煨　川芎
草澄茄　麥芽炒　檳榔
枳殼炒　厚朴　陳皮

右用水煎。加鹽少許。

東垣升陽順氣湯

升麻　柴胡　陳皮各一錢
人參各三錢　黃芪四錢　甘草
當歸一錢　草豆蔻一錢　神麯炒一錢半

右㕮咀。每半兩。入姜煎。

分氣紫蘇飲　治脾胃不和。氣逆喘促。心下脹滿。嘔逆不食。

半夏
柏皮各五分

五味子　桑白皮
草果　腹皮
紫蘇十五兩。
右剉。每服四錢。水煎。姜三片。入鹽少許。
雞舌香散　治臟腑虛弱。陰陽不和。中脘氣滯。停積痰飲。胸膈脹悶。心脾引痛。
白烏　香附　良姜　芍藥
甘草　肉桂
右以水煎服。
大玄胡湯
莪朮　三稜　當歸　芍藥
官桂　檳榔　厚朴　木香
玄胡　大黃　桔梗　川楝子
川芎　甘草炙。　茜苓
右以水煎服。
化氣散　治諸食積。幷宿食不消。此劑至爲穩當。

三稜　莪朮　青皮　陳皮
厚朴　神麯　麥芽　生姜
白烏　香附　甘草　甘草
右以水煎服。
東垣木香順氣散　治濁氣在上。則生膜脹。
木香三分。　厚朴四分。
益智　茯苓
吳茱萸　半夏各二分。
柴胡一分。　草豆蔻三分。煨。
右作一服。水煎。溫服。
匀氣散　治氣滯不匀。胸膈虛痞。宿食不消。心腹刺痛。脹滿噯腐。嘔吐惡心。調脾胃。進飲食。
生姜　沉香　丁香　檀香
木香各一兩。　藿香四兩。
白果仁二兩。　甘草炙四兩。　砂仁二兩。
右爲末。每服二錢。沸湯調下。或水煎服。

順氣木香散　治氣不升降。胸膈痞悶。時感引痛。及酒食過傷。噫氣吞酸。心脾刺痛。女人一切血氣刺痛。
砂仁　官桂　甘草炙。　陳皮
厚朴　丁皮　茴香　桔梗
青皮　木香　乾姜　良姜
右以水煎服。
快氣散　治一切氣。心膜腹痛。胸膈噎塞。噫氣吞酸。胃中痰逆嘔吐。及宿酒不解。
砂仁　甘草炙。　香附　生姜
右爲末。鹽湯調下。
異香散　治腎氣不和。腹脇脹滿。飲食難化。噎氣吞酸。一切冷氣。結聚腹中刺痛。
石蓮肉一兩。　莪朮炮。　益智　甘草炙。
三稜各六兩。　青皮　陳皮各三兩。
右剉。每服三錢。水煎。姜三片。棗一枚。入鹽一撮。同煎服。
化氣湯　治一切氣逆。胸膈噎塞。心脾卒痛。嘔吐酸水。丈夫小腸氣。婦人血氣。
沉香　胡椒各一兩。　桂心
木香各二兩。　陳皮炒。　莪朮炮。
青皮去穰。炒。　茴香炒。　甘草
右爲末。每服二錢。姜蘇鹽湯調下。婦人淡醋湯下。
降氣湯　治中脘不快。心腹脹滿。氣不升降。噯寒噦促。乾嘔咳嗽。嘈臥減食。停積不消。專治脚氣上沖。肢體浮腫。有妨飲食。
紫蘇　厚朴　官桂
當歸　前胡　芫荽
姜　半夏
右以水煎服。
木香化滯湯　治因憂氣。食濕鹽麵結於中脘。腹皮庭微痛。心下痞滿不食。
草豆蔻　甘草五錢。炙。　半夏一兩。
枳實炒各二錢。　紅花半兩。
右每用五錢。水煎。姜三片。棗一箇。熱服。
附脾胃八十　陰胃風。
【附方】
調中益氣湯

升麻二分　黃芪一錢
木香二分　人參五分
加黃柏二分　水煎服

四君子湯　治脾胃不調不進飲食。

人參　白朮
右以水煎服。

六君子湯　治脾胃不和、不進飲食。上燥下寒。服熱藥不得者。

人參　白朮　茯苓　甘草五分。　蒼朮五分。
砂仁　陳皮　柴胡五分。　陳皮二分。
右以水煎。姜三片。棗一枚。

胃苓湯

甘草　茯苓　茯苓　甘草炙
白朮　官桂　澤瀉　豬苓　猪苓
厚朴

右剉。每服五錢。水煎。姜五片。棗二枚。

參苓白朮散　治脾胃虛弱。飲食不進。或致嘔吐泄瀉。及大病後調肋脾胃。

白扁豆一斤。炒　白茯苓　山藥　人參
白朮各二斤　蓮子　砂仁一斤　甘草炙二斤。
薏苡　桔梗各一斤。炒黃色。

右爲末。每服二錢。煎棗湯調下。

治中湯　治脾胃不和、嘔逆、霍亂、中滿、虛痞、或泄瀉。

人參　甘草炙　乾姜炮　白朮
青皮　陳皮等分。

右每服五錢。水煎。如嘔。加半夏等分。○加丁香。減半夏。名丁香溫中湯。

丁沉透膈湯　治脾胃不和。痰逆惡心。或時嘔吐。飲食不進。十膈五噎。

白朮二兩　香附炒　砂仁　人參各一兩。
丁香　麥芽　肉豆蔻
白豆蔻　青皮各半兩　木香　厚朴
藿香　陳皮各七錢半　沉香　半夏
神麯炒。　草果各二錢半。　甘草炙一兩。

右到。每服四錢。水煎。姜三片。棗一個。不拘時候。溫服。忌生冷瓜果。

五膈寬中散　治七情四氣。胸膈痞滿。停痰氣逆。遂成五膈。

青皮　陳皮　丁皮
甘草炙　白朮　香附
木香

右以水煎。生姜三片。入鹽少許。

枳縮二陳湯　理脾胃。順氣寬腦。消痰飲。

砂仁　枳實　茯苓
陳皮　甘草炙

水煎。生姜五片。

八珍湯　和血氣。理脾胃。

當歸　赤芍　川芎
人參　白茯苓　甘草

右以水煎。姜三片。棗二枚。

凝神散　收斂胃氣。清涼肌表。

人參　白朮　茯苓
粳米　扁豆炒　知母
甘草炙。半兩　淡竹葉　地骨

右水煎。姜三片。棗一枚。

○胃風　此因初飲食訖。乘風涼而致。其證腹滿。食飲不下。形瘦腹大。惡風。頭多汗。腸寒不通。胃風湯正治。然此亦看挾證加減。脈右關弦而緩帶浮。

胃風湯　見痢證類。

運氣八十一　附結核。

○運氣先須顚厚味。

【入方】

海藻一兩　黃連二兩。一云黃柏。又云黃芩。

右爲末。以少許置掌中。時時舐之。津嚥下。如消三分之二。止後服。

○結核或在項。在頸。在臂。在身。如雁壽者。多是濕痰流注作核不散。

【入方】　治耳後項間各一塊。

姜蚕炒　酒大黃　青黛

右爲末蜜丸。噙化。

又方　治項頸下生痰核。

二陳湯加大黃酒炒　連翹　桔梗

右以水煎食後服。

又方　治痞核作痛。

二陳湯加連翹　防風　川芎

酒黃芩　蒼朮

右以水煎服。

跌撲損傷八十二

○跌撲損傷。須用蘇木和血。黃連降火。白朮和中。童便煎炒。○在下者。可先須補接後下瘀血。在上者。宜飲韭汁。或和粥喫。○切不可飲冷水。血見寒則凝。但一絲血入心即死。

【入方】　治撲撲傷損。

跌傷出血者。姜汁、香油、各四兩。酒調服之。

治撲傷骨折及血出者。

用活石、甘草、爲末。入冬瓜湯調服。次用生姜自然汁一盞。米醋一盞。獨核肥皁四箇。敲破。按於姜汁米醋中。紗片濾過。去粗。入牛皮膠。煎成膏藥。貼之。遍身者皆可。

接骨散

沒藥　乳香各半兩　自然銅一兩煅淬。　滑石二兩。

龍骨三錢　赤石脂三錢　麝香一字另研。

右爲末。好醋浸沒。蒸多爲上。乾就炒燥爲度。臨睡服時。入麝香。抄以茶匙。留舌上。溫酒下。分上下食前後服。若骨已接尙痛。去龍骨、赤石脂而服多儘好。極効。

○世以自然銅爲接骨藥。然此等方儘多。大抵在補氣補血、補土。俗工惟在速効以圖利。迎合病人之意。而銅非煅不可服。若新出火者。其火毒仝毒相扶。香挾藥毒。雖有接傷之功。而燥散之禍。甚於刀劍。戒之。

又方

多瓜皮　阿膠等分。

右炒乾爲末。以酒調。飲醉爲度。

破傷風八十三

○破傷風多死。防風全蝎之類。非全蝎不開。十箇爲末。酒調。日三次。破傷風。血凝心。鴉翅燒灰存性。研細。酒調一錢。

【又方】　破傷風發熱。

瓜蔞子九箇　滑石一錢半　南星

赤芍　陳皮一錢　黃連

黃芩　白芷五分。　甘草些少。

右姜一片。煎服。

【附方】

天麻丸　治破傷風神效。

天麻　川烏生去皮各三錢。　草烏生。

右爲末。酒糊丸。梧子大。每服十丸。溫酒下。無時。

元戎治破傷風欲死者。

川烏　南星　半夏並生。

右爲細末。每服一錢。豆淋酒調下。稍溫服。次以酒三盞投之。

諸瘡痛八十四　附天泡瘡　凍瘡

○諸瘡痛不可忍者。用普寒藥加黃連、黃芩。詳上下根梢用。及引經藥則可。又云。諸瘡以當歸、黃連爲君。連翹、甘草爲佐。諸痛瘡屬火。若氣受壯盛。宜四物加大承氣湯下之。若性急而黑瘦血熱之人。因瘡而痛。宜四物加黃連、黃芩、大力子、甘草。在下焦者加黃柏。熱甚。防風、羌活、荊芥、白芷、苍朮、連翹。取其氣能勝濕。

○諸瘡藥　膿藥治熱燥濕爲主。用無名異。乾薑開導爲主。用萊菔。蕪荑、黑狗脊、白蘞、雄黃、硫黃、水銀、殺虫。樟腦、松香、頭上多加黃連。方解石、蛇脫、定痙殺虫。松皮炭、主瘕。腫多者。加白芷開導。痛多。加白芷、方解石。虫多。加梨蘆、斑貓。痒多。加枯礬。陰囊瘡。加萊菔。濕多。香油調。乾痒出血多。加大黃、黃連、猪脂調。紅色加黃丹。青色加青黛。虫多。加錫灰、蕪荑、檳榔。在上多服連翹散。在下多須用下。脚腫出血。分溫熱用藥。

【又方】　瘡有三種。

膿泡瘡治熱爲主。

黃芩　黃連　大黃各三錢。

寒水石三兩。　黃丹半錢。　白礬一錢。

白芷　無名異少許。炒。　木香少許。痛者用。

右爲末。油調傅。

沙瘡

蕪荑二錢。　剪草二錢。　蛇牀三錢。

蛇牀

輕粉

白礬枯。

202

吳茱萸　黃柏各一錢、
雄黃各五分、　寒水石二錢、
右爲末、油調傅、

疥瘡藥　春天發疥瘡、開窻爲主、不宜抓破傅、
白礬二錢、　吳茱萸二錢、
寒水石二錢半、　蛇牀三錢、
硫黃各一錢、　檳榔一箇、

又方

蕪荑　白礬枯、
樟腦各半兩另入、　管仲
雄黃各二錢半、
右爲末、香油調、須先洗瘡去痂傅之、

一上散

雄黃三錢半、　寒水石一兩、

蛇牀　白膠香
流黃三錢半、　吳茱萸三錢、

○天疱瘡　用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒、蜜調傅極妙、　從肚皮上起者、是裏熱發於外也、還服通聖散、見瘡疹類、

○凍瘡　用煎鹽桐油、調密陀僧末傅、

○脚上爛瘡久不愈　先以豆腐漿水洗三兩次、懸鉤袒葉、地蕻袒葉搗細、入鹽些少敷之、

白礬枯五錢、　斑猫十四箇去翅足、
右硫黃、雄黃、寒水石、另研如粉、次入斑猫和匀、蛇牀、狗脊等爲極細末同研匀、洗瘡令湯透去痂、用腦猪油調、手心中摩熱、鼻中吳三二次、却摩上、一上卽愈、如痛甚腫滿高起、加寒水石一倍、如不苦痒、只加狗脊、如微痒、只加蛇牀子、如瘡中有虫、加雄黃、如多火炙湯洗、加硫黃、口臭不止、亦可愈也、

【附方】

四物湯　見婦人類、

大承氣湯　見痢類、

郭氏升麻牛旁子散　治時毒瘡疹、脈浮紅、在表者、瘡發於頭面胸膈之際、

升麻　牛旁子　甘草　桔梗
葛根　玄參　麻黃各一錢、　連翹一錢、
右㕮咀、姜三片、水二盞、作一服、

升麻和氣飲　治瘡腫癤疥瘙痛、

甘草　陳皮各一兩半、
乾葛　蒼朮
當歸　半夏

芎藥七錢半、
桔梗　升麻各一兩、
茯苓　白芷各二錢、

乾姜　枳殼各半錢、　三四有皮朴半兩、
右㕮咀、每服一兩、水煎、
當歸依子　治瘡疥、風癬、濕毒、燥瘙瘡、
當歸　白芍　川芎
白蒺藜　防風　荊芥各一兩、
黃芪　甘草各半兩、
右㕮咀、每服一兩、水煎、臨熟入蜜些少、煎數沸、
聖散　見瘡疹類、

○凍瘡　用煎鹽桐油、調密陀僧末傅、

○脚上爛瘡久不愈　先以豆腐漿水洗三兩次、懸鉤袒葉、地蕻袒葉搗細、入鹽些少敷之、

丹溪先生心法卷五

癰疽八十五

癰疽只是熱勝血、　六陽經、六陰經、有多氣少血者、有少氣多血者、有多氣多血者、不可一概論也、若夫要害處近虛怯薄處、前哲已曾論及、惟分經之言未聞、諸經惟少陽厥陰經生癰疽、理宜預防、以其多氣少血、肌肉難長、瘡久未合、必成死症、遲用驅毒利藥、以伐其陰分之血、禍不旋踵、　陽滯於陰、脈浮洪弦數、陰滯於陽、脈沉細弱濇、陽滯以寒治之、陰滯以熱治之、　人中年以後、不可生癰、縱有瘡腫、參之脈證、但見虛弱、便與滋補氣血、可保終吉、若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥、虛虛之禍、如指諸掌、　內托之法、河間治腫脹于外、根盤不深、形證在表、其脈多浮、病在皮肉、非氣盛則必侵於內、急須內托以救其裏、宜復煎散、除溫散鬱、使胃氣和平、如咸未已、再煎半料飲之、如大便秘及煩熱、少服黃連湯、如微利及煩熱已退、却與復煎散半兩、如此使榮衛俱行、邪氣不能內傷也、然世俗多用排膿內補十宣散、若馬之於此、小瘡與冬月時令、卽可、若潰瘍於夏月用之、其柱朴之溫散、佐以防風、白芷、吾恐雖有參、芪、難爲倚杖、

一婦年七十、形實性急、前好酒、腦生疽、纔五日、脈緊急且濇、急用大黃酒煨細切、酒拌炒爲末、又酒拌人參炒、入姜煎、調一錢重、又兩時再與、得睡而上半身汗、睡覺病已失、此內托之意、　又一男子、年五十、形實色黑、背生紅腫、及胛骨下痛、其脈浮數而洪緊、食亦嘔、正冬月、與麻黃桂枝湯加酒黃柏、生附、瓜蔞子、

甘草節、羌活、青皮、人參、黃芩、半夏、生薑、六貼而消。此正內托之法。非精要內托散乳香、穿豆等藥。想此方專爲服丹石而發疽者設。不因丹石而發。恐非必用之劑。疽先發爲腫。氣血鬱積蒸肉爲膿。故其痛多少。治之始作時也。膿潰之後。腫退肌寬。痛必漸減。而反痛者。此爲虛。宜補。亦有穢氣所觸。宜和解。風寒遍者。宜溫散。

○腸癰　大腸有瘀積。死血流注。桃仁承氣湯加連翹、秦艽、近肛門破入風者難治。防風之類。

○乳癰　乳房、陽明所經。乳頭、厥陰所屬。乳子之母。不知調養。怒怨所逆。鬱悶所遏。厚味所釀。以致厥陰之氣不行。故寂不得通而汁不得出。陽明之血沸騰。故熱甚而化膿。亦有所乳之子。腦有滯痰。口氣觸熱。合乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。便須忍痛揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成癰疽。治法。踈厥陰之滯。以青皮。清陽明之熱。細研石膏。行汙濁之血。以生甘草之節。消腫導毒。以瓜蔞子或加沒藥、青橘葉、皂角刺、金銀花、當歸。或湯或散。或加減。隨意消息。然須以少酒佐之。若加以艾。火兩三壯於腫處。其効尤捷。不可輒用針刀。必至危困。若不得於夫。不得於舅姑。橫逆遂成隧穴。如大棋子。不痛不痒。數十年後。方爲瘡陷。名曰蜂岩。以其瘡形嵌凹。似岩穴也。不可治矣。若於始生之際。便能消釋病根。使心清神安。然後施之治法。亦有可安之理。

乳癰方

青皮　瓜蔞　橘葉　連翹　桃仁　皂角刺　甘草節各多加參芪

右以水煎。入酒服。

乳癰妳勞奴腫

石膏煨　樗皮炒　瓜蔞子　青皮

右以水煎服。

治乳有核

南星　貝母　甘草節

連翹半兩

右以水煎。入酒服。

又方

人參　黃芪　川芎　連翹　青皮　甘草節　乳岩小破加柴胡、川芎。

右以水煎。入酒服。

乳硬痛

沒藥一錢　甘草三錢。　當歸三錢。

右作一服。水煎。入酒少許。熱飲。

吹妳

金銀花　大麥麥　紫莧藤等分。

右以醋煎。洗患處立消。如無下二物。只金銀花亦可。

乳栗破　少有破。必大補。

人參　黃芪　白朮　川芎　連翹　白芍

右以水煎服。

附骨癰

熱在血分之癰。細初覺。先以青皮、甘草節。後破當歸。血初腿腫。以人參、黃連、茯苓各二錢。瓜蔞子四十八粒。作二貼。入竹瀝。熱飲之。

治環跳穴痛不已。防生附骨疽。

以蒼朮佐黃柏之辛。行以青皮。冬月加桂枝。夏月加條子芩。體虛者加牛膝。以生甘草爲使。大料煎。入姜汁帶辣。食前飲之。病深者恐止。柏、桂枝十數貼發不動。加少麻黃二三貼又不動。恐癰將成矣。急掘地坑。以火煅紅。沃以小便。赤體坐其上。以被席圍抱下蔽。使熱氣重蒸。勝理開。氣血暢而愈。

鉄圍散　治癰疽腫毒。

乳香　沒藥半兩。　大黃　黃連　南星　半夏　皂角刺　木鱉子　瓜蔞　草烏　阿膠

右爲末。酷調成膏。砂石器內火煞黑色。鵝翎傳之。

圍藥　諸般癰疽。傅上消散。

乳香　沒藥　大黃　黃芩　黃連　黃柏　半夏　防風　皂角刺　光活　阿膠

右研爲細末。好酷煎黑色。成膏。寒者熱用。熱者寒用。

圍藥鉄井欄

當歸　甘草節

貝母　南星各七錢
連翹　五倍子
細辛芙蓉葉各一兩
右碾爲細末。用水調傅四向腫處。止留中間一竅出毒氣。
隔皮取膿法
白鹽半兩　蒼麥麵一兩
鹽跳細切一兩
右爲末。水調作餅子。慢火炙微黃色。出火毒。研末。醋調成膏。用白紙攤貼患處。水自毛孔而出。其腫自退。
騎馬癰
草烏四錢。去皮
用大粉草帶節四兩。長流水一碗。以甘草浮焙水盡爲末。入皂角炭少許。作四服。湯調頓服效。
又方
甘草節、白芷、黃連、破者龜骨、枯礬、赤石脂併用。
數宜鄉方
草烏　黃連
大黃　芙蓉皮
右爲末。蜜水調敷。如猪膃。以蜜調雄黃末。圍定猪穴。大小前後數前藥末。
紫荊皮　白芷
朴硝　糠米各等分。
一人肛門生癤。久不收口。有針竅三孔。勞力則有膿。
黃芪　條芩
右爲末。神麴糊爲丸。
連翹
取朽骨。久疽及痔漏者有之。
取烏骨雞脛骨。以上等雌黃實之。鹽泥固濟。火煅通紅。取出地上。出火毒。去泥。用骨研細。飯丸如粟大。以紙撚送入孔中竅內。更用膏藥貼之。
秦艽
便毒
山梔子　大黃
當歸五分　瓜蔞仁三錢
右作一服煎。
乳香　沒藥
代赭石一錢
又方
木鱉子　大黃
草龍膽
右胶咀。濃煎。露星月一宿。清早溫服。立愈。
又方　白殭蠶、槐花爲末。酒調服。一方加酒大黃。

【附方】
消毒飲　治便毒初發。三四日可消。
皂角刺　金銀花　防風
大黃　甘草節　瓜蔞仁等分。
右咬咀。水酒各半煎。食前溫服。仍頻提聖頂中髮。立效。
機要內托複煎散　癰疽托裏健胃。
地骨皮　黃芩　茯苓
人參　黃芪　白朮
甘草　防己　當歸各一兩
右咬咀。先以蒼朮一斤。水五升。煎至三升。去朮。入前十二味。再煎至三四盞。取清汁。分三四次。終日飲之。又煎蒼朮粗爲湯。去粗。依前又煎前十二味。粗分飲之。
內疎黃連湯　治猪皮色腫硬。發熱而嘔。大便閉。脈洪實者。
黃連　芍藥　當歸
木香　黃芩　梔子
桔梗　甘草各一兩　連翹二兩
右咬咀。每服一兩。入姜煎。
疔癤八十六
疔癤用針刀鏃破頭上。以蝟酥敷之。後用蓖豆、野菊莎末。酒調飲。醉睡。覺卽定痛熱除。不必去疔自愈也。治一切疔疽。用紫梗、菊花根葉皆可。研碎。取汁。滴口中飲之。○瘰癧。血氣痰熱。以牡蠣煅過爲末。玄參搗膏爲丸。○桑椹黑熟者搗汁熬膏。湯調服。紅者晒乾爲末。湯調服。○師云。大田螺連肉燒灰存性爲末。入麝香少許。濕則乾敷。乾則油調敷。夏枯草大能散結氣。而有補養血脈之功。能退寒熱。虛者可倚仗。若實者。以行散之藥佐之。外施艾灸。亦漸取效。
【入方】　治瘰癧。
海藻洗去鹹　昆布洗去土　同上二味。先研爲末。
皂角刺炒令黃色　公蛇退樹上或檐上是雄用一條。平地上者是雌。
右五味爲細末。和勻一處。猪項下刀口肉燒熟。醋煎前藥末。喫食後倒患處眠一伏時。每核灸七壯。口中覺烟起爲度。膿盡卽安。初生起時灸曲池。男左女右。
【附方】
寶鑑保生艇子　治疔癤、背疽、瘰癧。一切惡瘡。
金銀倍　雄黃　礞砂各二錢

輕粉半大匙，牛大蒜，巴豆四十九粒，文武火炒研，
右爲極細末，用黃蠟五錢溶開，將藥和成挺子，冷水浸，少時取出，旋丸捏作餅子，如銀眼大，將瘡頭撥開，安一餅子，次用神聖膏貼，後服托裏散，若瘡氣入腹，危者服破棺丹，
神聖膏　治一切惡瘡，
當歸　蓖本各半兩，
黃蠟各二兩，　乳香二錢，
粉霜各一錢，　白膠香二兩，
巴豆十五箇，去殼，　槐枝，
右作一處，先將槐枝、柳枝下油內熬焦，取出不用，後下餘藥，熬至焦黑，亦漉出不用，將油澄清，下黃丹再熬成膏，用絳帛攤之，立效，
千金托裏散　治疔瘡發背，一切惡腫，
官桂　人參　甘草　川芎
白芷　芍藥各一兩，　木香　沒藥各三錢，
乳香二錢，　當歸半兩，　連翹一兩二錢，　黃芪一兩半，
防風　桔梗　厚朴各二兩，
右十五味爲細末，每服三錢，酒一大盞，煎三二沸，和粗溫服，無時，
破棺丹　治瘡腫一切風熱，
大黃二兩，半生半熟，　芒硝
右爲末，煉蜜丸如彈子大，每服半丸，食後茶清溫酒任化下，童便半盞研化服，亦得，忌冷水，
太乙膏　治癰子瘡神效，
腦子一錢，研，　輕粉　甘草各一兩，
沒藥四錢，研，　黃丹五兩，
右用清油一斤，先下黃丹熬，用柳枝攪，又用悉見憨七枝，先下一枝熬焦，再下一枝，憨盡爲度，下火不住手攪，候冷熱得所，入腦子等藥攪勻，磁器盛之，用時旋攤，
蛇蛻散　治癰子瘡，
官桂　硇砂各半錢，　乳香各二錢，研，　麝香三錢，研，
班猫四十九箇，不去翅足，　赤小豆　糙米各四十九粒，
右五味，研爲末，初服一字，次服二字，次服三字，次服四字，煎商陸根湯送下，空心服，小便淋瀝爲效，如惡心嘔吐，黃水無妨，瘡癰日日自消矣，
玉燭散　治瘰癧和血通經，服之自消，日進一服，七八日取效，　方見婦人類，

東垣升陽調經湯
治瘰癧遠顧或至頰車，此皆出足陽明胃經中來，若瘡深遠隱曲肉底，是足少陰腎經中來，乃戊脾傳於癸腎，是夫傳與妻，俱作塊子，堅硬大小不等，並皆治之，或作丸亦可，
升麻八錢，　葛根　草龍膽酒製，
羌活酒洗炒，　三稜酒炒，　甘草炙，
連翹　桔梗已上各五錢，　生黃芩四錢，
芍藥各三錢，　黃柏酒炒，二錢，　知母酒洗炒一兩，
右另秤一半作末，煉蜜爲丸，綠豆大，每服百餘丸，一半作咬咀，每服五錢，若能食，大便硬，可旋加至七八錢，水二盞，先浸半日，煎至一盞，去柤，臨臥熱服，足高去枕仰臥，臉一口，作十次嚥下，留一口在後送下丸藥服，畢其臥如常，
金瘡痊諸瘡八十七
金瘡　五倍子、紫蘇等分，
又方　白膠香三錢，龍骨一錢，
金瘡狗咬
五月五日午時，用陳石灰一斤，搗爲末，韭一斤，搗汁，和成餅，陰乾爲細末，敷之，
治陽證腫毒幷金瘡
大粉草銼細，用竹筒一段，斷去青，兩頭留節，節上開一竅，入粉草在內，滿後，用油灰塞孔竅，從立冬日放蓋缸內，待立春先一日取起，竪立在有風無日陰處二十一日多最好，却破竹取草爲細末，用傅金瘡，乾者水調，
火燒
桐油二錢，　水二錢，
右二件，以桃柳枝不住手攪成膏，再入少水溶，外用猫兒肚底毛細剪摻上，
湯浇　以淋了茅三次灰柤付患處，
湯火瘡　臘月猪膽塗黃柏，炙乾爲末，付之，
蹉跌
乳香　沒藥　水銀
川芎　貝母　黃丹二錢半，
右咬咀，除黃丹水銀外，先將餘藥用香油熬黑色，去柤，下黃丹水銀，又煎黑色，用柳桃枝攪成膏，油紙攤貼，
又方　當歸各半兩
真麻油五兩，

雞骨生用　血竭　頭髮如指大

黃蠟一兩　白膠香

香油不拘多少

右件先以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟、白膠香、却入龍骨、血竭、赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箬貼在外三日後番過再貼仍服活血藥

又方

用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石臼內搗平將葉貼瘡上日換二次

又方

以頭垢燒灰和桑肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏兩葉紙攤貼之

又方

地骨皮一兩　白蠟半兩

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去柤入黃丹一兩半緊火熬黑提起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎過以藥貼之

杖瘡疼

黃柏、生地黃、紫荊皮、皆要藥熬血作瘡涼血去瘀血先須下鷄鳴散之類　生地黃、黃柏、爲末重便調付或加韭汁　不破者以韭菜葱頭舂碎炒熱貼冷則易　膏藥紫荊皮、乳香、沒藥、生地黃、黃柏、大黃之類

又方

用大黃黃柏爲末生地黃汁調付乾卽再付

又方

野生苧麻根嫩者不拘多少洗淨搗搥付瘡上神效倘重多用罐

癬瘡

防風通聖散去硝黃加浮萍、皂角刺　又紫蘇、槐樹、蒼耳、浮萍煎湯洗

又方

浮萍一兩　蒼耳　苦參二兩

黃芩半兩　香附二錢半

右爲末酒糊丸

又方

蔥白　大黃　輕粉　雄黃

蛇床子　槐樹皮　槐郎

右爲末先刮癬用米醋調藥末塗之

蔥白研三錢　江子去殼十四粒　蓖麻子去殼十四粒　班猫七個去翅足

白蠟

右以香油二兩煮江子、蓖麻、班猫三藥以黑爲度去渣入蠟幷蔥會末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破以油塗上過夜略腫卽愈

下疳瘡

蛤粉　蠟茶　苦參

右爲末河水洗淨膩豬油調傳　兼治臁瘡

又方

米泔水洗瘡淨用頭髮以鹽水洗淨去油再用清湯洗晒乾燒灰敷瘡上卽時生機

【附方】

冰硫散　治火燒燎損傷油煎湯傷皮爛肉大痛

寒水石生　牡蠣煅　明朴硝

輕粉一錢

右爲末新水調成油調濕則乾貼痛處立止如神

聖粉散　治下注疳瘡蝕爛腐爛疼痛不可忍者

黃柏童炙　蜜陀僧　黃丹

乳香各三錢　輕粉一錢半　麝少許

右爲末用葱湯洗瘡後拭貼此藥兼治小兒疳瘡

下疳瘡洗藥

黃連　黃柏　當歸

獨活　防風　朴硝

右等分水煎入寢五十文烏梅五箇鹽一匙同煎溫洗日五七次用下藥敷

木香　槐郎　黃連

輕粉　枯礬　螵蛸

右爲極細末洗後至夜敷上

婦人八十八

○婦人經水過期血少也四物加參、朮、帶痰加南星、半夏、陳皮之類　經水不及期而來者血熱也四物加黃連　過期紫黑有塊赤血熱色也必作痛四物加香附、黃連　過期而來乃是血虛宜補血用四物加黃芪、陳皮、升麻　未及期先來乃是氣血俱熱宜涼氣血柴

胡、黃芩、當歸、白芍、生芐、香附之屬。經不調而血水淡血。宜補氣血。參、芪、芎、歸、香附、白芍、腹痛加膠珠、艾葉、玄胡索。經候過而作痛者。乃虛中有熱。所以作痛。經水將來作痛者。血實也。一云血滯。四物加桃仁、黃連、香附。臨行時腰疼腹痛。乃是鬱滯。有瘀血。宜四物加紅花、桃仁、玄胡索、香附、木香。發熱加黃芩、柴胡。紫色成塊者。熱也。四物加黃連、柴胡之類。痰多占住血海地位。因而下多者。且必漸停。肥人如此。用南星、芐朮、川芎、香附作丸子。服之。肥人不及日數而多者。痰多、血虛有熱。亦用前丸。藥中更加黃連、白朮、丸服。血枯經閉者。四物加桃仁、紅花。躯脂滿經閉者。以導痰湯加黃連、川芎。不可服地黃。泥膈故也。如用。以姜汁炒。肥胖飲食過度之人。而經水不調者。乃是濕痰。宜蒼朮、半夏、滑石、茯苓、白朮、香附、川芎、當歸。臨經來時肚痛者。四物湯加陳皮、玄胡索、牡丹、甘草。痛甚者。豆淋酒。痛緩者。童便煮。涉、入炒條芩末爲丸。經水去多不能住者。以三補丸加莎根、龜板、金毛狗脊。陰虛經脈久不通。小便澁。身體疼痛。以四物加芐朮、牛膝、陳皮、生甘草。又用芐莎丸加蒼耳、酒芎藥爲丸。就煎前藥吞下。

【入方】　治經水過多。

黃芩炒　白芍炒　龜板炙各一兩　黃柏炒三錢

右爲末。酒糊丸。空心溫酒或白湯下。五十丸。

又方　治積痰積經不行。夜則妄語。

瓜蔞子一兩　黃連半兩　紅鹽二錢　砂仁三兩

右爲末。生姜汁化。炊餅爲丸。桐子大。服百丸。空心。

又方　治一切瘀血爲痛。

香附四兩。醋煮　瓦楞子燒二兩。醋煮一壺夜　桃仁二兩　牡丹皮　當歸各一兩　川芎　大黃熟煮　紅花各半兩

右爲末。蒸餅丸。如桐子大。空心溫酒下。三五十丸。

【附方】

四物湯　治衝任虛損。月水不調。臍腹疼痛。

當歸　川芎　芍藥　熟芐等分

右以水煎服。加減于后。

若經候微少。漸漸不通。手足煩疼。漸瘦。生潮熱。脈微數。本方去地黃、芎、加澤蘭葉三倍。甘草半分。經候過多。本方去熟地黃、加生芐、或只加黃芩、白朮。經行身熱。脈數。頭昏。本方加柴胡、芩。經行微少。或腹或疼。四肢疼痛。加延胡、沒藥、白芷、與本方等。淡醋湯調下末子。經候不調。心腹疼痛。只用芎歸

二陳。名香芎散。氣沖經脈。故月事頻併。臍下多痛。加芍藥。經欲行。臍腹絞痛。加茴胡、梔椰、苦練炒末。香減半。經水漏少。加麥花、紅花。經水適來適斷。或有往來寒熱。先宜服小柴胡湯。後以四物和之。經候過而作痛。血氣俱虛也。宜本方對四君子湯服之。

治經事過期不行

玄胡索一錢　香附　枳殼各半錢

右爲末。杜牛膝搗汁半鍾。空心調服。

又加地黃丸　治經水不調。血塊氣痞。肚腹疼痛。

生芐一斤　老生姜一斤　玄胡索

川芎　白芍二兩　沒藥

桃仁去皮尖　人參各一兩半　香附子半斤

右先將地黃、生姜各搗汁。以姜汁浸地黃焙。地黃汁浸生姜焙。皆以汁盡爲度。次將餘藥爲末。其作一處。日乾。同爲末。醋糊丸如桐子大。空心服五十丸。姜湯下。

當歸散　治經脈不通。

當歸　川山甲蛤炒　蒲黃各半兩。炒

麝香少許

右爲末。酒調服二錢。

琥珀散　治月水不通。心腑迷悶。腹藏攪痛。

台烏二兩　當歸　藪朮各一兩

右爲末。空心溫酒調二錢。以食壓之。產後諸疾。炒姜酒調下。

通經丸　治婦人室女經候不通。腑腹疼痛。或成血瘕。

川椒炒　藪朮　乾漆炒煙盡　青皮　乾姜　大黃煨　川烏煨　桂心各等分

右爲末。將一半用米醋熬成膏子。和餘藥成劑。臼中杵之。丸如桐子。陰乾。每服三五十丸。醋湯下。

氏方。無川烏。有紅花。

紅花當歸散　治婦人血藏虛竭。或積瘀血。經候不行。時作痛。腰胯重疼。小腹堅硬。及室女經水不行。

紅花　當歸尾　紫蘇即凌霄花　甘草炙　蘇木各三兩　白芷　赤芍九兩　劉寄奴五兩

右爲末。空心熱酒調三錢服。一名凌霄花散。

導痰湯　見痰類。
三補丸　見諸虛類。
芩連丸　見咳嗽類。
越鞠丸　見六鬱類。

崩漏八十九

○血崩東垣有治法。但不言熱。其主在寒。學者宜尋思之。　急則治其標。用白芷湯調百草霜末。甚者用棕櫚灰。後用四物湯加炒乾姜調理。　因勞者。用參芪補升補藥。　因寒者。用乾姜。　因熱者。黃芩。　崩過多者。先用五靈脂末一服。當分寒熱。蓋五靈脂能行能止。　紫色成塊者熱。以四物湯加黃連之類。血出於大腸小腸之分。　肥人多是濕痰。海石半夏南星炒柏。蒼朮川芎。婦人血崩。用香附白芷丸服。　氣虛血虛者。皆以四物湯加參芪。　漏下乃熱而虛。四物加黃連。　崩中白帶。用椒目末。又用白芷石灰炒去灰。爲末。茜草少許。粥丸服。　一方。用生狗頭骨燒灰存性。或酒調服。或入藥服。　一方。五靈脂半生半炒。爲末。酒調服。　經血逆行。或血腥。或吐血。或唾血。用蔥菜汁服。效。夫婦人崩中者。由臟腑傷損。衝任二脈。血氣俱虛故也。二脈爲經脈之海。血氣之行。外循經絡。內榮臟腑。若氣血調適。經下依時。若勞動過極。臟腑俱傷。衝任之氣虛。不能約制其經血。故忽然而下。謂之崩中。治宜當大補氣血之藥。舉養脾胃。微加鎮墜心火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自止矣。

【附方】

小薊湯　治崩中不止。

小薊莖葉研取汁一盞。生苄汁一盞　白芷半兩

右三件。入水一盞。煎。溫服。

荊芥散　治婦人崩中。連日不止。

用荊芥穗於燈盞多著燈心。好麻油點燈。就上燒荊芥。焦色。

右爲末。每服三錢。童便調下。

又方

芥葉如雞子大　　阿膠半兩　　乾姜一錢

右爲粗末。用水五盞。先煮艾姜。後入膠。烊消。分作二服。空心。如聖散　治婦人血山崩。

棕櫚灰　　烏梅各一兩　　乾姜一兩五分。並燒灰存性

右爲末。每服二錢。烏梅酒調下。空心。

涼血地黃湯　治婦人血崩。是腎水月虛。不能鎮守包絡相火。故血走而崩也。

黃芩　　荊芥　　黃柏　　蔓荊子各一分。

知母　　藁本　　川芎各二分。

細辛

黃連　　芫活　　柴胡

防風各三分。　　牛蒡　　當歸各五分。

紅花炒。少許。

右作一服。水煎。空心稍熱服。

帶下九十

○帶下。赤屬血。白屬氣。主治燥濕爲先。漏與帶。俱是胃中痰積流下。滲入肠胱。無人知此。只宜升提。甚者上必用吐以提其氣。下用二陳湯加蒼朮白朮。仍用丸子。一本作丸服子。又云。赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分。　肥人多是濕痰。海石半夏南星炒柏。蒼朮川芎。椿皮。一方無椿皮有青黛。瘦人白帶少。如有者多熱。以炒黃柏。滑石。椿皮。川芎。海石。如無海石。以蛤粉亦可。一方有青黛作丸子服。赤白帶下。炒黃荊子爲末。酒調下二錢。或米湯亦可。又治心痛。羅先生法。或十棗湯。或神佑丸。或玉燭散。皆可服。質者可行。虛者不可峻攻。　血虛者加減四物湯。　氣痛者。參朮陳皮。間與之。　濕勝者。用固腸丸。　相火動者。於諸藥中少加黃柏。　滑者加龍骨。赤石脂。　澁者加麥花。麥花。白者治白帶。赤者治赤帶。　性燥者加黃連。　痰氣帶下者。蒼朮。香附。滑石。蛤粉。半夏。茯苓。丸服。塞月少加乾姜。臨機應變。必須斷厚味。

【入方】

良姜　　芍藥　　黃柏二錢。各炒成灰。　　椿樹根皮一兩半。

右爲末。粥丸。每服四五十丸。空心。

又方　一婦人白帶兼風痛。

半夏　　茯苓　　川芎　　陳皮

甘草　　蒼朮　　黃柏酒炒。　　南星

牛膝酒洗。

治婦人上有頭風鼻涕。下有白帶。

南星　　蒼朮　　柏皮炒。

半夏　　川芎　　辛夷

酒芩

右咬咀。水煎。去祖。食前服。

又方　治白帶。

龜板炙。　　枳子各二兩。　　黃柏炒。一兩。

香附半兩。　　乾姜炒。二錢半。　　山茱萸

椿根皮各半兩。　　貝母

升麻

甘草一錢。

白芍藥七錢半。

苦參

右爲末酒糊丸桐子大空心米湯下五十丸。

又方　治赤白帶下或時腹痛

龜板酒炙二兩　黃柏炒一兩　乾姜炒二錢　枳子二錢半

右爲末酒糊丸如桐子大每服七十丸日服二次。

又方　治婦人有孕白帶

蒼朮三錢　白芷二錢　黃連炒二錢　黃芩炒三錢

黃柏炒一錢半　白芍二錢半　椿根皮炒一錢半　山茱萸二錢半

右爲末糊丸空心溫酒下五十丸。

治結痰白帶　先以小胃丹半鐘半飽津液下數丸。候鬱積開。却宜服補藥。

白朮二兩　黃芩半兩　紅白葵花二錢半　白芍七錢半

右爲末蒸餅丸空心煎四物湯下三五十丸。

固腸丸　治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾用此以燥其濕。亦不可單用。須看病作湯使。

椿根白皮性涼而燥。須炒用

右爲末酒糊丸服。

又方

椿根皮四兩　滑石二兩

右爲末粥丸桐子大空心白湯下一百丸。

又方　治白帶因七情所傷而脈數者。

黃連炒　扁柏酒蒸　黃柏炒各半兩

白芍　白朮各一兩　椿根皮炒三兩

右爲末粥丸桐子大每服七十丸食前米飲下。

又方　治赤白帶因濕勝而下者。

蒼朮麩炒　白芍　滑石炒各一兩　枳殼炒

甘草各三錢　椿根皮炒二兩　乾姜炮二錢

右爲末粥丸空心米飲下一百丸。

〔附錄〕赤白帶者皆因七情內傷或下元虛憊。感非一端。叔和云。崩中日久爲白帶。漏下多時脊本枯。崩中者。始病血崩。久則血少亡其陽。故白滑之物下流不止。是本經血海將枯。津液復亡。枯乾不能滋養筋骨。執劑之法。須以本部行經藥爲引用。爲使大辛甘油脈之藥。潤其枯燥。而滋益津液。以大率熱之氣味。藥補其陽道。生其血脈。以塞苦之藥。澀其肺而救上熱傷氣。以人參補之。以微苦溫之藥爲佐。而益元氣。此治之大法也。

【附方】

感人玉燭散　治經候不通。腹脹或痛。

當歸　芍藥　川芎

芒硝　大黃　甘草

右咬咀。生姜三片。煎服。

十棗湯　見脇痛類。

神佑丸　見中濕類。

產前九十一

○產前諸熱產血。產婦因火動胎、逆上作喘急者。急用條芩、香附之爲佳。墮胎乃氣虛、血虛、血熱。黃芩安胎。乃上中二焦藥。能降火下行。後諸病。能行血養血。難產可煎作膏。地黃膏、牛膝膏、皆可用。懷妊愛物。氣止能生胎。無妨用也。又云。不能養其肝。肝虛故愛酸物。產前安胎。白朮、黃芩、爲妙藥也。條芩安胎聖藥也。俗人不知。以爲害而不敢用。反謂溫熱之藥可養胎。殊不知產前宜清熱。介血循經而不妄行。故能養胎。胎熱將臨月。以三補丸加炒香附、炒白芍。蒸餅丸服。抑熱。以三箇月必用順氣。須用枳殼、紫蘇梗。凡妊婦脈細勻。易產。大浮緩。火氣散。類爲末調下。條芩、水中取沉者。益母草。即茺蔚子。治產前產難。乃一臟之虛。假如肝臟之虛。肝虛、黃芩、爲妙藥也。條芩安胎聖藥也。俗人不知。以爲害而不敢用。反謂溫熱之藥可養胎。殊不知產前宜清熱。介血循經而不妄行。故能養胎。胎熱將臨月。以三補丸加炒香附、炒白芍。蒸餅丸服。抑熱。以三箇月必用順氣。須用枳殼、紫蘇梗。凡妊婦脈細勻。易產。大浮緩。火氣散。

【入方】　固胎。

地黃半錢　歸身　人參

白朮一錢半　川芎五分　陳皮一錢

甘草三分　黃連少許　黃柏少許

一本無芩

右咬咀。每二錢。入糯米二十四粒。煎服。血虛不安者。用阿膠。痛者。用砂仁止痛。安胎行氣故也。

束胎丸　第八箇月可服。

炒黃芩夏一兩。春秋七錢半。冬半兩　白朮一兩。不見火。

陳皮三兩。見火

右爲末。粥丸服。

又名束胎散。

逢生散　又名束胎散。

大腹皮三錢　人參　陳皮各半錢

芍藥各一錢　紫蘇葉半錢　甘草炙二錢

右作一服。入青葱五葉。黃楊膠七箇。此即黃楊樹葉稍兒也。或加枳殼、砂仁。以水煎。食後服。於八九箇月服十數貼。甚得力。夏月加黃芩。冬不必加。春加川芎。或有別證。以意消息于后。

白朮

歸身尾一錢

熟苄

○氣虛加參朮　氣質倍香附陳皮　血虛倍當歸加地黃　形實倍紫蘇　性急加黃連　有熱加黃芩　濕痰加滑石半夏　食積加山查　食後易飢倍黃楊腦　有痰加半夏　腹痛加木香桂

又方　第九箇月服

黃芩一兩酒炒不宜深製性前者減半　白朮一兩　枳殼炒七錢半　滑石七錢半臨月十日前小便多者減此一味

右爲末粥丸梧子大每服三十丸空心熱湯下多則恐損元氣氣實人宜服

又方　安胎

白朮　黃芩　炒黃　炒黃

右爲末粥丸服　一本云用條芩一二兩爲末每一錢或半錢澁煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治　多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰瘦者有熱須用二陳湯

【入方】

白朮不拘多少

右爲末水丸隨所好或湯或水下

○子腫　濕多

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

【入方】

山梔子炒用一合

右爲末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯　治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩　茯苓四兩　當歸　芎藭各三兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一盞半姜七片陳皮少許煎至七分去粗空心服

○胎漏　氣虛　血虛　血熱　可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲　治妊娠轉胞

四物湯加人參　白朮　半夏製　陳皮

甘草

右咬咀入生姜煎空心服

右爲末粥丸梧子大每服三十丸空心熱湯下多則恐損元氣氣實人宜服

又方　安胎

白朮　黃芩　炒黃　炒黃

右爲末粥丸服　一本云用條芩一二兩爲末每一錢或半錢澁煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治　多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰瘦者有熱須用二陳湯

【入方】

白朮不拘多少

右爲末水丸隨所好或湯或水下

○子腫　濕多

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

【入方】

山梔子炒用一合

右爲末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯　治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩　茯苓四兩　當歸　芎藭各三兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一盞半姜七片陳皮少許煎至七分去粗空心服

○胎漏　氣虛　血虛　血熱　可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲　治妊娠轉胞

四物湯加人參　白朮　半夏製　陳皮

甘草

右咬咀入生姜煎空心服

川芎各三兩

草麻子七粒去殼研細成膏塗脚心胞衣即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如神之妙

又方

臨月兔頭一枚燒灰

右爲末忌白湯調二錢立生

又方　治難產三日不下

伏龍肝細研每服一錢酒調服之　又威谷鷄子黃三箇并少苦酒服之立生　又威用赤小豆二升水九升煮取一升汁入炙了明黃膠一兩同煎少時一服五合　又用槐子十四枚即下　又方　當歸爲末酒調方寸匕服

胞衣不下

取皂屋黑處研爲細末酒調方寸匕

產後九十二

○產後無得令虛當大補氣血爲先雖有雜證以末治之一切病多是血虛皆不可發表　產後不可用芎藥以其酸澁伐生發之氣故也　產後血氣因虛火載血上行漸漸氣來方用鹿角燒灰出火毒研極細末好酒同煮使滾下一呷即醒行血極快　又方以韭葉細切盛於有粘瓶中以熱醋沃之急封其口以防邪穢產婦鼻中可愈眩冒　○產後中風切不可作風治必大補氣血爲主然後治痰當以左右手之脈分其氣血多少而治　產後中風口眼㖞斜切不可服小續命湯　產後水腫必用大補氣血爲主小佐苓朮茯苓使水自利　產後大發熱必用乾姜輕者用茯苓淡滲其熱一應寒苦并發表之藥皆不可用　產後發熱惡寒皆屬血虛　左手脈不足補血藥多於補氣藥　惡寒發熱腹痛者當去惡血腹滿者不是　產後發熱乳汁不通及膨者無子當消用麥蘗二兩炒研細末消湯調下作四服　有子者用木通、通草、猪蹄煎服　凡產後有病先固正氣　前條云產後大熱必用乾姜或曰用姜者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥大劑服之且乾姜能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙非天下之至神孰能與於此乎　產後脈洪數已產而洪數不改者多主死

【入方】　產後補虛

人參　白朮一錢　茯苓
陳皮　川芎各半錢　甘草炙三分
有熱加黃芩一錢生姜三片
右以水煎服

產後消血塊方

歸身尾　滑石三錢　沒藥二錢　血竭二錢如無以牡丹皮代之
右爲末醋糊丸　如惡露不下以五靈脂爲末神麯丸白朮陳皮湯下　葫蘆子能消血塊

又方

血竭　五靈脂
右爲末消產後血塊極好

又方　治產後泄瀉

黃芩　白朮　川芎
乾姜　滑石　陳皮
甘草炙
右㕮咀水煎服

又方　治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂　香附一方加蒲黃
右爲末醋糊丸吞者入桃仁不去尖用

獨行丸　治婦人產後血衝心勳及治男子血氣心腹痛有孕者忌服

五靈脂去土炒半　生

右爲末水丸彈子大每一丸臨酒臨姜湯化下

參朮膏　治產後胞損成淋瀝證

人參二錢半　白朮二錢　桃仁
黃芪一錢半　茯苓一錢　甘草炙半錢
右㕮咀水煎猪羊胞後入藥作一服

〔附錄〕產後血暈者皆由敗血流入肝經眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚至昏悶不省人事謂之血暈用酒調黑神散最佳切不可作中風治之凡血暈皆血乘虛逆上凑心故昏迷不省氣閉欲絕是也古法有云產婦殘分曉了預燒秤錘或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋氣可除血暈或以好醋久塗口鼻乃灑醋於傍便聞其氣兼細細少飲之此爲上法也　又法以乾漆燒烟熏產母面即醒無乾漆以破漆器亦可

【附方】

澤蘭葉　人參各二錢半　荊芥一兩
甘草二錢　川芎半兩
右爲末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開眼

清魂散　治血迷血暈

黑神散

黑豆炒半升　熟苄　當歸　肉桂
乾姜　甘草　白芍　蒲黃各四兩

生苄別本無

右爲末每服二錢。童便酒各半調服。一名烏金散。

子嗣九十三　附斷子法

○若是肥盛婦人。稟受甚厚。恣於酒食之人。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行濕燥痰。用星、夏、蒼朮、白芍、防風、羌活、滑石。或導痰湯之類。若是性瘦性急之人。經水不調。不能成胎。謂之子宮乾澁。無血。不能攝受精氣。宜涼血降火。或四物加香附、黃芩、柴胡、養血養陰等藥可宜。東垣有六位地黃丸。以補婦人之陰血不足。無子。服之者能使胎孕。出試効方。

○斷子法用白麵一升。無灰酒五升。作糊。煮至二升半。濾去粗。分作三服。候經至前一日晚。次早五更。及天明各喫一服。經即不一痛不宜行。終身無子矣。

小兒九十四

○乳下小兒。常多濕熱。食積。痰熱。傷乳爲病。大概肝與脾病多。小兒易怒。肝病最多。大人亦然。肝只是有餘。腎只是不足。

○小兒初生。未經食乳。急取甘草一寸。火上炙熟細切。置地上出火毒一時許。用水一小盞。煮至三分之一。去滓。用新綿蘸滴兒口中。令嚥盡。須臾吐痰及瘀血。方與乳食。年長知屬無病。

○小兒急慢驚風。發熱口禁。手心伏熱。痰熱咳嗽。痰喘。此類證並用湯法吐之。重劑瓜蒂散。輕劑用苦參、赤小豆末。須蝦蟆汁調服之。後用通聖散爲末。蜜丸服。間以桑樹上牛兒陰乾焙末調服。以平其氣。驚明大便泄爲度。溫粥補之。未利再服三五丸。

烏犀丸

丑頭末三兩　青皮三兩　史君子肉七錢半
鶴虱五錢　蘆薈一錢。另研。燒紅醋淬。

右炒令焦黑色爲末。麵丸。麻子大。每三五十丸。米飲送下。食前。量小兒大小加減。

【入方】黑龍丸　治小兒急慢驚風。

牛膽南星　青礞石煅研。各一分。燒各一兩。
青黛各半兩　蘆薈二錢半　辰砂三錢　麝香半錢

右用麵丸。麻子大。日晒乾。食後姜湯下。量兒大小加減。○烏犀、黃龍間服。食前服烏犀。食後服黃龍。

黃龍丸

三稜三兩　黑角豬尤三兩　青皮一兩半
乾姜七錢半　蜈蚣一錢半。燒存性。

右爲末。甘草煎膏丸。如鷄頭大。每服一二丸。急慢煎姜蜜薄荷湯下。慢驚煎桔梗白朮湯下。

治驚而有熱者

人參　茯苓　白芍酒炒　白朮
右㕮咀。姜煎。夏月加黃連、生甘草、竹葉。

【附方】

神聖牛黃琥珀散

楝樹牛兩　木香三錢　大黃二兩。煨。薑炒熟爲末
白犁牛一兩。一半炒。一半生用　黑犁牛粗末一半生用。一半炒

右爲一處。研作細末。入輕粉少許。每服三錢。用蜜漿水調下。不拘時候。微利爲度。

通聖散　見斑疹類。

朱砂安神丸　見驚悸類。

瓜蒂散　見疸類。

○疳病或肚大筋青。

胡黃連丸　治疳病肚大。

胡黃連五分。去果子積。阿魏一錢半。醋浸。去肉硬。
麝香四粒　炒黃連二錢。去鬚硬。

右爲末。猪膽汁丸。如黍米大。每服二三十丸。白朮湯送下。又云胡黃連丸十二粒。白朮湯下。

五積丸　治小兒諸般疳積。

丑頭末一兩　黃連半兩　陳皮一兩
山查半兩

右炒焦黑色爲末。每用巴豆霜半錢。前藥末半錢。宿蒸餅丸。麻子大。小兒二歲十丸。五更姜湯下。至天明大便泄爲度。溫粥補之。未利再服三五丸。

烏犀丸

丑頭末三兩　青皮三兩　史君子肉七錢半
鶴虱五錢　蘆薈一錢。另研。燒紅醋淬。

右炒令焦黑色爲末。麵丸。麻子大。每三五十丸。米飲送下。食前。量小兒大小加減。

黃龍丸

三稜三兩　黑角豬尤三兩　青皮一兩半
乾姜七錢半　蜈蚣一錢半。燒存性。

右用麵丸。麻子大。日晒乾。食後姜湯下。量兒大小加減。○烏犀、黃龍間服。食前服烏犀。食後服黃龍。

肥兒丸　治小兒疳積。

蘆薈另研　胡黃連三錢　炒麵四錢
白朮　山查炒半兩　蕪荑炒三錢

右爲末。蘆薈末和勻。猪膽汁丸。粟米大。每六十丸。食前米飲下。

黃連

疳黃食積
白朮　黃連
右爲末。麵糊丸。麻子大。食後白湯下。十五丸。
食傷胃熱頭痛
白朮一兩　半夏
右用粥丸。食後白湯下。二十丸。
〔附錄〕小兒疳病者。小兒臟腑嬌嫩。飽則易傷。乳哺飲食。一或失常。不爲疳者鮮矣。疳皆因乳食不調。甘肥無節而作也。或嬰幼缺乳。粥飯太早。耗傷形氣。則疳之根生。廷及歲月。五疳病成。甚者胸陷喘嗽。乳食直瀉。腿痛下利。顏脇腹疼。皮發紫斑。肌肉先紫。與夫疳勞渴瀉。面稿色天。骨露齒張。肚硬不食者。皆危篤矣。凡此等類。直宜復生。難施其巧。

〔附方〕

集聖丸　治小兒疳通用。
鹿茸　五靈脂
陳皮　青皮
使君子爲末。各二錢　黃連
右爲末。用雄豬膽二枚。取汁和藥入糕糊丸。麻子大。每服十五丸。米飲送下。
大蒼苔丸　治諸疳。
鹿茸　葉黃
檳榔　黃連炒。二錢半
麝香少許。
右爲末。猪膽汁二枚。取汁浸糕爲丸。麻子大。每服二十丸。米飲下。
褐丸子　治疳腹脹。
羅卜子二兩。炒　陳皮
黑韭半熱半生　五靈脂
木香一錢半。
右爲末。麵糊丸。蓖豆大。每服十五丸。煎紫蘇葉皮湯下。

○子熱
炒芍藥　香附
黃連二錢。
右作四服。水一盞半。生姜三片煎。乳母服。

好化明砂妙　砂仁
蓯朮煨　木香
蝦蟇日乾。炙焦。各三分。
右爲末。用雄豬膽二枚。取汁和藥入糕糊丸。麻子大。每服十五丸。米飲送下。
病止後。更服白附丸三五貼。

○小兒腹痛多是飲食所傷宜
白朮　陳皮　青皮
神麯　麥孽　砂仁
受寒痛者。加藿香、吳茱萸。有熱加黃芩。

小兒腹脹
蘿卜子炒。　紫蘇梗　乾葛
甘草減半。
食減者。加朮煎服。

小兒好喫粽。成腹脹疼。用白酒麴末。同黃連末爲丸。服之愈。

又方
茯苓皮　陳皮　赤小豆
木通各半錢。　木香二分。　甘草生少。
右咬咀。姜一片。煎服。

〔附錄〕小兒腹痛多因邪正交爭。與臟氣相擊而作也。挾熱作痛者。以面赤或壯熱。四肢煩。手足心熱。見之。挾冷作痛者。以面色或白或青見之。冷甚而證變。則面色黯黑。唇瓜甲皆青矣。熱證宜四順清涼飲。加青皮、枳殼。冷證宜迷七氣湯。冷熱不調。以桔梗枳殼湯加青陳皮、木香、當歸。

○小兒吐瀉黃疸
三稜　蓯朮　青皮
陳皮　甘草各三錢
滑石一兩。
右作四服。水一盞半。生姜三片煎。乳母服。

神麯炒　茯苓　麥蘗
甘草　白朮

右爲末調服。傷乳食吐瀉加山査。時氣吐瀉加滑石。發熱加薄荷。

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用。吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散、入熟蜜、加藿香丸名黃安神用米湯化下。夏月熱病六一散最妙。

○小兒痢疾　黃連　黃芩　陳皮

右以水煎服。赤痢加紅花、桃仁。白痢加滑石末。

又方　治小兒食積痢。

炒神麯　蒼朮　滑石
黃芩　白朮　甘草炙

右咬咀。水煎下保和丸。一方加茯苓。

○小兒赤痢壯熱。用藍青搗汁。飼服半盞與之妙。

【附錄】凡小兒痢疾。亦作食積論。初得之時。宜用木香檳榔丸下之。後用白朮、白芍藥、黃芩、甘草、滑石。如裏急後重。加木香、檳榔、枳殼。久不止者。用肉豆蔻、粟殼炒黃。小兒赤斑、紅斑、斑疹、麻疹。並宜用防風通聖散爲末調服。

○小兒口瘡　戴云。謂滿口生瘡者便是。

江茶　粉草

右爲末。敷之。一方用黃丹。

又方　黃參　黃丹　五倍子

右等分爲末敷之。

又方　青黛　芒硝

右爲末。敷口中。

又方　黃柏　細辛　青黛

右等分爲末。噙之。吐出涎。不過三日愈。亦治大人。治毒口瘡。五倍子、黃丹、甘草、江茶、芒硝等分爲末敷之。

○鵝胸　蒼朮　酒柏　酒芍藥
防風　威靈仙　山査
痢後加生芋

○小兒夜啼。此是邪熱乘心。

黃連去汁炒一錢半　甘草一錢

右用竹葉一十片煎服。又方。加人參二錢半。作二服。入姜一片。水煎。又法。夜啼不止。潛取捕鷄窠草一握。置小兒身下。

【附錄】夜啼。小兒臟冷也。陰盛於夜。則冷動。冷動則爲陰極發燥。寒盛作琢。所以夜啼而不欲。

鈎藤散　治小兒夜啼。

鈎藤　茯苓　茯神
當歸　木香各一錢　甘草炙五分

右爲末。每服一錢。姜棗煎服。又燈草燒灰塗傅乳上與之。

○小兒脫肛　戴云。脫肛者。大腸脫下之說。

○脫糞即外腎腫大　戴云。脫糞者。陰盛腫大。陰下不收上之說。戚云。潤燥。陰丸脫出。

【入方】

木通　甘草　黃連炒
黃芩炒　當歸　川芎

右以水煎服。

又方　治脫肛。用東北方陳壁土泡湯。先熏後洗。

又方　治脫糞。

紫蘇葉爲末。乾付。如爛。用香油調。鵝翎刷。又用青荷葉包上。

○小兒木舌　戴云。木舌者。舌腫硬不和軟也。又言。重舌者。亦是此類。二者皆是熱病。

【入方】

百草霜　芒硝　滑石

右爲末。酒調付之。

重舌用好膽礬研細付之。

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血。

【入方】

黑豆　甘草

右煎服。

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙。

○小兒喫泥胃氣熱故也。

【入方】

軟石膏　黃芩

白朮　甘草

右用水煎服。

又方

膩粉一錢。砂糖和丸。如麻子大。米飲下一丸。瀉出土立瘥。

○小兒解顱乃是母氣虛與熱多耳。

戴云即初生小兒頭上骨未合而開者。

【入方】

四君子與四物子母皆可服　有熱加酒炒黃芩、連、生甘草煎服。外用帛束緊用白斂末傅之。

小兒吐蚘蟲

以苦楝根爲君。佐以二陳湯煎服。

小兒冬月吐蚘多是胃寒胃虛所致。錢氏白朮散加丁香二粒。

【附方】

錢氏白朮散

藿香　白朮

甘草　人參各一錢。

右爲末。每一錢至二錢。水煎服。

○小兒口噤

治法用搐鼻方

藜蘆　藜蘆

陳皮

茯苓

又方

松樹厚皮燒灰　黃丹水飛一兩。　硼水石一兩細研。　白礬煅

黃連　大黃各半兩。　白膠香炒飛傾

輕粉四錢戒云一分

右爲末。熬熟油調傅瘡上。須先洗了瘡痂傅之佳。

又方　治小兒瘌頭并身瘌等證。

松皮燒灰　白膠香　枯礬

黃柏

右爲末。用熟油調敷。

小兒頭瘡

臘猪油半生半熟　雄黃　水銀等分

右研和勻。洗淨付瘡上。

又方

川芎　酒片芩　酒白芍

酒白朮　酒歸一兩半。　酒天麻

青耳七錢半。　酒柏　酒粉草四錢。

右爲末。水盪起煎服。日四五次。服後睡片時。

又方　單治頭瘡。

松樹皮燒者燒灰二兩。白膠香炒沸傾石上二兩。

白礬火飛半兩。　黃芩　黃連

蛇麻子　寒水石三錢。　白芷

木香少許。瘡者用。　輕粉

右爲極細末。熬熟油調。敷瘡上。須洗淨瘡去痂傅之佳。

又小兒瘡

猪牙皂角去皮。　胡椒些少。　枯礬

右爲末。樟腦燭油擦。七日如櫻桃膿窠。去椒。

陳皮半兩

芥朮

防風三錢。

黃丹一兩。大飛。

大黃各三錢。

無名異炒。少許。

輕粉

○小兒臍腫汗出
用枯白礬爲末付。或黃柏爲末付之。又小兒臍不乾。伏龍肝塗。

○小兒天火丹臍腹起者。赤溜不妨。
蚯蚓泥炒調付。

○小兒赤溜　主傷血熱。
用生苄、木通、荊芥、苦藥發表之類。外以芭蕉油塗患處。芒硝澁煎汁洗之。又方。鷄子清調伏龍肝傅之。

○小兒耳後月蝕瘡
黃連　枯白礬
右爲末傅之。

○小兒鼻赤
雄黃　黃丹
右同爲末。無根水調傅之。又芥耳葉酒蒸焙乾爲末。調服。最解食毒。又鼻下一道赤者。名曰蜈。以黃連末傅之。

辛夷散　專治小兒鼻流清涕不止。
辛夷葉一兩。洗淨焙乾。細辛　木通　白芷各半兩。
杏仁一兩。去皮。研如泥。木香半兩。
右爲細末。次用杏仁泥、羊骨髓、猪脂、各一兩。同諸藥和勻。於瓦石器中蒸成膏。赤黃色爲度。於地上放冷。入腦麝各一錢。拌勻。塗顖門上。每用少許塗鼻中。

○小兒變蒸。是胎毒散也。
○乳兒嬉疾寒塊
川芎二錢　生苄
半夏　炒苓一錢。
右作一服。姜三片。就煎下甲末半錢。

痘瘡九十五
○痘瘡分氣虛血虛。用補。氣虛者。人參、白朮、加解毒藥。血虛者。四物湯中加解毒藥。凡痘瘡初出之時。色白者。便用大補氣血。參、朮、芪、芎、升麻、乾葛、草、木香、丁香、酒洗當歸、白芍。若大便瀉。加訶子、肉豆蔻、酒炒苓連名解毒藥。但見紅點。傳忌葛根湯。恐發得裏虛也。吐瀉食少。爲裏虛。不吐瀉。能食。爲裏實。裏實而補。則結糞毒。陷伏倒僵爲表虛。灰白者亦表虛。或用燒人屎紅活綻凸爲表實。表實而更復用表藥。則反潰爛不結痂。吐瀉陷伏。二者俱見。爲表裏俱虛。黑陷甚者。亦用燒人屎。蜜水調服。出子和方。

痘瘡初出時。或未見時。人有患者。宜預服此藥。多者令少。重者令輕。方以綠瓜近蒂三寸。連皮子燒灰存性。爲末。砂糖拌乾。喫入。疹砂末尤妙。痘瘡分人清濁。就形氣上取勇怯。黑陷二種。因氣虛而毒氣不能發出者。酒炒黃芪、酒紫草、人參。顏色正者。如上治。將欲成就。却色淡者。宜助血藥。用當歸、川芎、酒洗芍藥之類。或加紅花。將成就之際。却紫色者。胎熱。用涼藥解其毒。升麻、葛根、黃連、黃芩、桂枝、連翹之類。黑者。犀角。大解痘毒。　痘瘡。以粉子、連翹、山查、甘草。此四味。始終必用之藥。　全白色。將發時。如豆殼者。蓋因初起時飲水多。其發不齊。俗呼倒發。不好。但服實表之劑。消息以大小便。如大便秘。通大便。小便秘。通小便。有飲水則後來發不齊。急以涼藥解其標。如益元散之類亦可服。　痒塌者。於形色脈上分虛實。實則脈有力。氣壯。虛則脈無力。氣怯。　輕者用淡蜜水調滑石末。以豸潤瘡上。　虛痒者。以實表之劑加涼血藥。實痒。如大便不通者。以大黃蜜涼之藥少許與之。下其結糞。　疎則無毒。蜜則有毒。宜涼藥解之。雖數十貼亦不妨。無害眼之患。　瘡乾者。宜退火。濕者。用瀉濕。退火止用輕劑。荊芥、升麻、葛根之類。瀉濕乃肌表閒濕。宜用風藥。白芷、防風之類。　如痘瘡傷眼。必用山梔、決明、赤芍、歸尾、苄、連翹、升麻、桔梗。作小劑末。調服。如眼無光。過百日後。血氣復自明。　痘癰多是實毒。血熱成癰。分上下用藥。一日不可緩。已成膿。必用涼藥爲主。赤芍、甘草節、連翹、桔梗。　上引用升麻、葛根。下引用梔、牛膝。助以貝母、忍冬草、白芷、白芷、連翹、穀斷之類。若屬寒。陳氏方可用。

【又方】解痘瘡毒。
綠瓜　升麻　酒芍藥
黑豆　山查　赤小豆
右水煎服。

又方　治痘瘡已出未出皆可服。
硃砂
右爲末。蜜水調服。多者可減。少者可無。

痘瘡敷藥
貝母　南星　殭蠶
寒水石各多　白芷　草烏
猪牙皂角
右爲末。醋調付之。

【附錄】小兒瘡疹大抵與傷寒相似。發熱煩燥。臉赤脣紅。身痛頭疼。乍寒乍熱。噴嚏呵欠。嗽喘痰涎。傷寒證候類有之。始發之時。有因傷風寒而得者。有時氣傳染而得者。有因傷食嘔吐而得者。有因跌撲驚恐苦血而得者。或爲宿眼禁牙發搐如風之證。或口舌咽喉肚腹疼痛。或煩燥狂悶昏睡。或自汗或下痢。或發熱。或不發熱。證候多端。卒未易辨。亦須以耳冷飢冷足冷驗之。蓋謂瘡疹屬陽。腎臟無證。耳與骹足俱屬於腎。故腎之所部獨冷。疑似之間。或中或否。不若視其耳後有紅脈赤縷爲真。於此可以稽驗矣。調護之法。首尾俱不可汗下。但溫涼之劑。衆而濟之。解毒和中。安表而已。如欲解肌。乾葛、紫蘇、升麻、柴胡、羌活、防風、薄荷、牛蒡子、蟬退、荊芥、蔓荊子、木賊、白芷、細辛之屬。發散太過。則表虛而邪乘之。反生他病。如欲瀉火。芩、連、梔、柏、知、母、石膏、寒水石之屬。過用則傷胃。胃氣虛弱。則不思飲食。或吐或瀉。或成疳積。如欲下痰。則用牛黃、青黛、天竺黃、海粉、礞石、金箔、銀箔之屬。過用則傷脾。脾氣虛弱。則不能運化。或成痞滿。如欲消導。則用山楂、麥芽、神麯、枳殼、檳榔、青皮、陳皮、萊菔子、砂仁、縮砂、蓽澄茄、木香、檀香、丁香、藿香、沉香、乳香、沒藥之屬。過用則傷氣。氣虛則不能運化。或成痞滿。如欲補養。則用人參、白朮、茯苓、甘草、山藥、扁豆、蓮肉、薏苡仁、糯米之屬。過用則滯氣。或成痞滿。如欲收斂。則用烏梅、五倍子、訶子、罌粟殼、赤石脂、禹餘糧、龍骨、牡蠣、白礬之屬。過用則閉邪。或成他病。如欲溫補。則用附子、乾薑、官桂、肉桂、吳茱萸、胡椒、丁香、木香、沉香、檀香、藿香、砂仁、縮砂、蓽澄茄、乳香、沒藥、硫黃、硇砂之屬。過用則動火。或成他病。如欲行血。則用當歸、川芎、芍藥、生地黃、熟地黃、牛膝、紅花、蘇木、桃仁、牡丹皮、益母草之屬。過用則動血。或成他病。如欲行氣。則用木香、檀香、藿香、沉香、砂仁、縮砂、蓽澄茄、烏藥、香附、青皮、陳皮、枳殼、枳實、檳榔、萊菔子、牛蒡子、蘇子、厚朴、大腹皮、烏藥、紫蘇、蔓荊子之屬。過用則耗氣。或成他病。如欲治風。則用羌活、獨活、防風、荊芥、細辛、白芷、蔓荊子、木賊、薄荷、牛蒡子、蟬退、天麻、白附子、僵蠶、全蠍、蜈蚣之屬。過用則動風。或成他病。如欲治痰。則用半夏、南星、瓜蔞、貝母、白芥子、竹瀝、姜汁、枳實、枳殼、青皮、陳皮、萊菔子、砂仁、縮砂、蓽澄茄、木香、檀香、藿香、沉香、乳香、沒藥、烏藥、香附、厚朴、大腹皮、紫蘇、蔓荊子之屬。過用則動氣。或成他病。如欲治熱。則用黃芩、黃連、梔子、柏、知、母、石膏、寒水石、青黛、天竺黃、海粉、礞石、金箔、銀箔之屬。過用則傷胃。或成他病。如欲治寒。則用附子、乾薑、官桂、肉桂、吳茱萸、胡椒、丁香、木香、沉香、檀香、藿香、砂仁、縮砂、蓽澄茄、乳香、沒藥、硫黃、硇砂之屬。過用則動火。或成他病。如欲治燥。則用當歸、川芎、芍藥、生地黃、熟地黃、牛膝、紅花、蘇木、桃仁、牡丹皮、益母草之屬。過用則動血。或成他病。如欲治濕。則用蒼朮、白朮、茯苓、甘草、山藥、扁豆、蓮肉、薏苡仁、糯米之屬。過用則滯氣。或成他病。如欲治氣。則用木香、檀香、藿香、沉香、砂仁、縮砂、蓽澄茄、烏藥、香附、青皮、陳皮、枳殼、枳實、檳榔、萊菔子、牛蒡子、蘇子、厚朴、大腹皮、烏藥、紫蘇、蔓荊子之屬。過用則耗氣。或成他病。如欲治風。則用羌活、獨活、防風、荊芥、細辛、白芷、蔓荊子、木賊、薄荷、牛蒡子、蟬退、天麻、白附子、僵蠶、全蠍、蜈蚣之屬。過用則動風。或成他病。如欲治痰。則用半夏、南星、瓜蔞、貝母、白芥子、竹瀝、姜汁、枳實、枳殼、青皮、陳皮、萊菔子、砂仁、縮砂、蓽澄茄、木香、檀香、藿香、沉香、乳香、沒藥、烏藥、香附、厚朴、大腹皮、紫蘇、蔓荊子之屬。過用則動氣。或成他病。如欲治熱。則用黃芩、黃連、梔子、柏、知、母、石膏、寒水石、青黛、天竺黃、海粉、礞石、金箔、銀箔之屬。過用則傷胃。或成他病。如欲治寒。則用附子、乾薑、官桂、肉桂、吳茱萸、胡椒、丁香、木香、沉香、檀香、藿香、砂仁、縮砂、蓽澄茄、乳香、沒藥、硫黃、硇砂之屬。過用則動火。或成他病。如欲治燥。則用當歸、川芎、芍藥、生地黃、熟地黃、牛膝、紅花、蘇木、桃仁、牡丹皮、益母草之屬。過用則動血。或成他病。如欲治濕。則用蒼朮、白朮、茯苓、甘草、山藥、扁豆、蓮肉、薏苡仁、糯米之屬。過用則滯氣。或成他病。

斃。陷肌肉黯然不旋踵而告變矣。其瘡痘者。一曰內崩泄瀉。一曰外傷風冷。三曰變黑歸腎。春夏爲順。秋冬爲逆。凡痘瘡初出之時。須看胸前稍密。急宜消毒飲加山查、黃芩酒洗、紫草、減食加人參。凡痘瘡初欲出時。發熱鼻尖冷。呵欠咳嗽。面赤。方是痘出之候。便宜服升麻葛根湯。加山查、大力子。其瘡稀疎而易愈。凡痘瘡發熱之時。便宜塞實子爲末。蜜調貼顴門上。免有患眼之疾。近世小兒痘瘡上爲陳文中木香散、異攻散。殊不知彼時立方之時。爲運氣在寒。司天時令又值嚴冬大寒。爲因寒氣鬱遏。痘瘡不紅綻。故用辛熱之劑發之。今人不分時令寒熱。一概施治。誤人多矣。時值溫熱。山野農家貧賤之人。其或偶中也。

【附方】

犀角地黃湯

犀角一兩　生苄二兩　赤芍三分

右㕮咀。三歲兒三錢。水煎。

人參敗毒散

人參　茯苓　甘草炙　川芎　羌活　獨活　柴胡已上並去苗頭　枳殼麩炒去瓤　各半兩

右爲粗末。每服二錢。水一盞。姜二片。薄荷少許。煎。溫服。

紫草飲子

紫草一兩

右剉細。百沸湯大椀沃之。蓋定勿令氣出。逐旋溫服。紫草能導大便。發出亦輕。

百祥丸

紅牙大戟。不以多少。陰乾。漿水煮極軟。去骨。日中曝乾。復內元汁中煮。汁盡。焙爲末。水丸。如粟米大。每服一二十丸。研赤脂麻湯下。無時。

宣風散

檳榔二兩　陳皮　甘草各半兩

右爲末。每一錢。量大小與服。蜜湯調下。

煜煜散　治小兒風熱及傷寒時氣痘瘡發熱。

白茯苓　細辛　桔梗

人參　甘草炙　白朮

右爲末。每一錢。水煎。入薄荷三葉同煎。服。

參蘇飲

牡丹皮一兩

前胡

桔梗

黑丑四兩半生半熟

瓜蔞根

川芎各分

前胡　人參
半夏湯泡七次姜汁制茯苓
甘草　桔梗
右剉。姜棗煎。微熱服。

人參羌活散

羌活　獨活
川芎　枳殼
北梗　天麻
加麻黃、薄荷、急白煎服。汗後尙熱。宜服此。去麻黃。加紫草。如已見三五點。加紫草、陳皮、赤芍。使熱退。瘡出亦輕。更調辰砂末半錢。以制胎毒。

升麻葛根湯

乾葛　升麻
右粗末。每服四錢。水一盞半。煎一盞。溫服。

化毒湯　瘡瘍已發。以此消毒。

紫草苴半兩　升麻
右剉散。每服二錢。糯米五十粒同煎。服。

加味四聖散

紫草　木通
木香等分　甘草炙減半
右爲粗末。水煎。大便秘。加枳殼。大便如常。加糯米百粒。楊氏曰。糯米能解毒發瘡。

紫草木香湯　治瘡出不快。大便泄瀉。

紫草　木香
甘草炙少許
入糯米煎服。楊氏云紫草能利大便。白朮、木香佐之。

紫草木通湯

紫草　人參
糯米等分　甘草減半
右剉。煎二錢。溫服。內虛大便利者。可入南木香。去紫草。

快斑散

紫草　蟬殼

蘇葉　乾葛
枳殼　陳皮

柴胡　人參
茯苓各半兩　前胡
地骨皮　甘草炙各二錢半
右剉。每服加紫草煎。

大連翹湯

連翹　犀麥　荊芥
車前　當歸　防風
赤芍　滑石　蟬蛻
黃芩　山梔子各半錢
右剉。每服加紫草煎。

甘露飲子

生苄　熟苄　天門冬去心
枇杷葉去毛　枳殼麩炒去瓤　黃芩
山茵陳　甘草炙各等分
右剉。每二錢。水一盞。煎八分。食後服。

五苓散　見中暑類。

小柴胡湯　見瘧類。

四順清涼飲

當歸　赤芍　大黃蒸者生
一方加陳皮糯米煎。

如聖飲子

桔梗　甘草生　鼠粘子炒各二錢
右末。竹葉煎。二三錢。一方加荊芥、防風。重者竹瀝同煎。

鼠粘子湯

鼠粘子炒四錢　荊芥穗二錢　甘草一錢
右爲細末。沸湯點服。去防風。名消毒散。

麻黃黃芩湯

麻黃三錢　赤芍
桂枝各半錢

右爲粗末煎。

桔梗根殼湯

桔梗根　桔梗各二錢
殼

右剉。姜煎。

甘草散

甘草炙　瓜蔞根等分

右爲末煎服一錢。

烏梅湯

小黑豆　蚕豆各一合

右咬咀。新汲水一椀。煎取清汁。旋服。

木香理中湯　見寒類。

本方中加木香、甘草、乾姜。

獨聖散

牛旁子炒五錢　白殭蠶二錢半

右末。入紫草三錢煎。連進三服。其瘡便出。

又方

穿山甲、湯洗淨炒焦黃爲末。每服半錢。入麝少許。本香煎湯調下。或紫草煎湯。入紅酒少許調。

犀角消毒飲

甘草炙一兩　防風半兩

惡實四兩炒　荊芥穗二兩

右爲末。煎紫草糯米團蒸子湯調。食後臨睡。日三。

論倒倉法九十六

○倒倉法。治癆勞蟲獭等證。推陳致新。扶虛補損。可吐可下。用黃色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤。順取長筋。急水於大鍋內煮。候水耗少再添湯。不可用冷水。以肉爛成粗爲度。濾去粗。用肉湯再煮如琥珀色。隔宿不喫晚飯。大便秘者。隔宿進神芎丸。不秘者不用。五更於密室不通風處。溫服一鍾。伺腦間藥行。身體皮毛皆痛方見吐下。寒月則重湯溫之。病在上。欲吐者可吐。吐時先以布巾腰勒緊。扯於不通風處行此法。一法。用羅荀子五合搥入漿水濾過。入滑油白蜜少許。旋半溫。用帛緊束肚皮。然後服。以鵝翎探吐。其鵝翎平時用桐油侵。皂角水洗晒乾待用。又法。苦參末、用雞帶穀半斤。入將葱姜等料物煮汁。先喫雞。後飲汁。以鵝翎勾引即吐。必須緊勒肚腹。又法。苦參末、赤小豆末各一錢。釜汁調。重則宜用三錢。吐法取逆流水。釜元散、吐濕痰。參蘆煎湯吐虛病。凡吐。先飲二椀。隔宿煎桔梗半兩。陳皮二錢。甘草二錢。帶。葱白湯亦解瓜蔕。甘草搥解諸藥。白水搥解。

充按三法中。惟湧劑爲難用。有輕重緩急之機。汗下則一定法也。故先生特註吐爲詳者。恐人不深造其理。徒倉皇顛倒。反有害於病耳。今搥列諸法于此。使臨病隨機應變。披卷瞭然。不必搜檢而便於施治也。

救急諸方九十八

魚骨鯁。用砂糖、白炭皮末、紫蘇葉、滑石末、和丸。含口中。津液嚥下。骨自下。

蕈毒。用木香、青皮等分。作湯飲之。

衆藥毒。用五倍子二兩重研細。用無灰酒調服。毒在上即吐。在下即瀉。

與湯。其小便必長。取以飲病者。名曰輪廻酒。與一二椀。非惟可以止渴。抑且可以滌濁餘垢。睡一二日。覺飢甚。乃與粥漸食之。待三日後。始與少藥漱口。養半月。氣精神漸發。形體輕健。沉痾悉定矣。大抵中間飲至七八鍾時。藥刀經涉經絡。骨節搜逐宿垢。正邪爭不已。猶有急悶似痛。非痛也。細曰。胃爲受盛之官。故五味入口。即入於胃。留毒不散。積聚既久。致傷冲和。諸病生焉。今川黃牯牛肉。其養至矣。夫牛、坤土也。黃、土之色也。以順爲德。而效法乎健。以爲功者。牡之用也。肉者、胃之藥也。熟而爲液。無形之物也。橫散入肉絡。由腸胃而滲透肌膚毛竅。瓜甲無不入也。積聚久則形質成。依附腸胃。回溜曲折處。以爲棲泊之窠窟。阻礙津液血氣。蒸熱燔灼成病。自非剖腸刮骨之神妙。孰能去之。又豈合勺珠兩之丸散。所能盪犯其藩牆戶壁乎。夫牛肉全重厚和順之性。潤枯澤槁。豈有損也。其方出於西域之異人。人於中年後行一二次。亦御瘵養壽之一助也。

論吐法九十七

○凡藥能升動其氣者。皆能吐。如防風、山梔、川芎、桔梗、芽茶。以生姜汁少許。醋少許。入盞汁搗服。以鵝翎勾引之。附子尖、桔梗、蘆、人參、蘆、瓜蔕、藜蘆、甜、不甚用。芡葉、牙茶。此皆自吐之法。不用手探。但藥但湯皆可吐。吐時先以布巾腰勒緊。扯於不通風處行此法。一法。用羅荀子五合搥入漿水濾過。入滑油白蜜少許。旋半溫。用帛緊束肚皮。然後服。以鵝翎探吐。其鵝翎。平時用桐油侵。皂角水洗晒乾待用。又法。苦參末、用雞帶穀半斤。入將葱姜等料物煮汁。先喫雞。後飲汁。以鵝翎勾引即吐。必須緊勒肚腹。又法。苦參末、赤小豆末各一錢。釜汁調。重則宜用三錢。吐法。取逆流水。釜元散、吐濕痰。參蘆煎湯吐虛病。凡吐。先飲二椀。隔宿煎桔梗半兩。陳皮二錢。甘草二錢。帶。葱白湯亦解瓜蔕。甘草搥解諸藥。白水搥解。

充按三法中。惟湧劑爲難用。有輕重緩急之機。汗下則一定法也。故先生特註吐爲詳者。恐人不深造其理。徒倉皇顛倒。反有害於病耳。今搥列諸法于此。使臨病隨機應變。披卷瞭然。不必搜檢而便於施治也。

救急諸方九十八

魚骨鯁。用砂糖、白炭皮末、紫蘇葉、滑石末、和丸。含口中。津液嚥下。骨自下。

蕈毒。用木香、青皮等分。作湯飲之。

衆藥毒。用五倍子二兩重研細。用無灰酒調服。毒在上即吐。在下即瀉。

220

解一切毒.

用粉草五兩重細切.微炒搗細.量病人喫得多少酒.取無灰酒一處研.去粗.溫服.須臾.大吐瀉.毒亦隨去.雖十分渴.不可飲水.飲水難救.

解九里蜂.用皂角鍼孔.貼在蜂叮處.就皂莢孔上.用艾灸三五壯.即安.

天蛇頭　用落蘇.即金絲草.金銀花藤五葉.紫背天葵.天蔴麥切碎.用十分好酷醋煎.先熏後洗.

又方　用人糞雞黃泥搗之.裹在患處.即安.

又方　用撲蛇燒爲炭存性.地上出火毒.研爲細末.用香油調.傅如洗.只用井花水.

天火瘡　用白鮮泥炒研細.香油傅之.

又方　雉鷄毛及鵝毛燒灰.傅之.用香油調.

治蜈蚣全蝎傷　方同九里蜂灸法.

治一切蛇咬　用金線重樓水磨少許.付咬處.又爲細末.酒調飲.

又方　柏樹葉.魚胎草.皺面草.草決明.一處研細.傅咬處佳.

中牛馬肉毒　方同解一切毒法.

狗咬　以紫蘇口嚼碎塗之.

風狗咬　取小兒胎髮.炒新香附.野菊花.研細.酒調服.盡醉.

拾遺雜論九十九

○小便黃.用黃柏.澁者數者.或加澤瀉.又云.小便不利.黃柏.知母爲君.茯苓.澤瀉爲使.　若濕熱流注下焦.小便赤黃.發之澁滯.用黃柏.澤瀉甚當.　若稟受甚壯.酒食過度.寡慾無慮之人.小便澁滯不利.蓋中痛苦.却不宜用寒涼藥併滲利之藥.只宜升麻.柴胡.羌活.甘草梢.服後却用鵝翎探而入.嘔吐數十聲.其小便自通.　若是下焦無血.小便澁數而赤.宜四物加黃柏.知母.牛膝.甘草梢.

○凡用引經藥.正藥六兩.引經藥只可用半兩.白朮爲金.藥收斂堅凝之氣.外科之要藥.生肌止血.定痛接骨.續筋補虛.與合歡樹皮.同入長肌肉.香藥用之神效.

○凡制玄明粉.朴硝一斤.蘿蔔一斤同煮.蘿蔔熟爲度.取出.用白皮紙濾在瓷器中.露一宿收之.冬月可川連痰湯.加姜炒黃連.香附.生姜煎下龍會丸.

制.

○凡治上升之氣.大概用香附.黃連.黃芩.山梔.

○狐臭.用硇砂.密陀僧.明礬.銅青.白附子.辰砂爲末.先以皂角水洗二方.加黃丹.水銀.用白梅肉爲丸.擦之.　又方.飛黃丹.密陀僧.枯礬.以

○凡補中氣藥.必多服而效遲.攻藥必速效.如汗下之法.

○治赤遊風.用二鹽沙炒研細.用剪刀草根.自然汁調勻.先塗腹了.却

○自芎藥酒浸炒.與白朮同用則補脾.與川芎同用則瀉肝.與參朮同用則補氣.能治血虛頭痛.除頭痛

爲效.剪刀草根即野茨菰.

皆不可用.

○金釵石斛.每二錢.洗淨.生姜一片.搥細.水盞起.煎沸去粗.食前飲之.

○凡面黑人.不可多服黃芪.以其氣實而又補之也.面白人不可多發散.以其氣虛而又虧之也.　面白

○酒風多搔.用白朮半兩.人參二錢半.甘草三錢.陳皮.苦朮.天麻.細切.

人不可飲酒.以酒耗血故也.　氣實人因服黃芪過多喘者.用三拘湯以泄其氣.

錢半.若小便多加五味子.右爲末.作丸服.

秘方一百

221

消六丸　治三焦濕。止泄瀉。產後腹痛。幷自利者。以補脾補血藥送之。治血痢效。

六一散一料　紅鹽炒半兩

右爲末。陳倉米飯丸。並不單用。與他丸同行。又加五靈脂一兩。名靈脂丸。能行血。

參萸丸　治濕而帶氣者。濕熱甚者。用之爲向導。上可治酸。下可治自利。

六一散一料　吳茱萸一兩製

右爲末。飯丸。若去茱萸加乾姜半兩。名溫消丸。治胃冷。

胃腸丸　見婦人類。

白朮牛斤　苓藥半兩　茯苓三兩

補脾丸　有脾虛而惡湯藥者。製此丸。用湯吞。省口苦而易於從也。

苓藥半兩　陳皮各三兩

右爲末。粥糊丸。加潤下丸。可作催生用。上熱甚者。加消金丸。尤妙。與此藥必無產患。

白朮丸

白朮一兩　苓藥半兩

冬月不用苓藥。加肉豆蔻。泄者炒丸服。　右爲末。

潤腸丸　能潤血燥。大便不通。

麻子仁　當歸

枳殼各一錢

右爲末。密丸。

胞令丸　瀉肝火。行濕爲之反佐。開痞結。治肝邪。可助補脾藥。

黃連六兩　茱萸一兩

右爲末。粥丸。一方名左金丸。治肺火。茱萸或半

抑清丸　瀉肝丸　方見脇痛類。

龍會丸　瀉肝火。治脇痛　方見脇痛類。

清金丸　瀉肺火。熱嗽　方見嗽類。

清化丸　治熱嗽　方見嗽類。

胭酸方　方見吞酸類。

黃連消化丸

黃連一兩　吳茱萸漫炒一錢

半夏一兩半

右爲末。神麴糊丸。綠豆大。每服百丸。姜湯下。

加減補陰丸

熟苄八兩　兔絲子四兩。酒浸一宿

白芍三兩。炒　猪腸三兩。酥炙　杜仲二兩。炒

破故紙　枸杞一兩半　虎骨二兩。酥炙

黃柏二兩。炒　山藥　人參

冬加乾姜一兩

右爲末。猪骨髓入蜜丸。梧子大。空心服一百丸。鹽湯下。

又方

白朮　白芍　人參

知母　黃柏等分

右爲末。糊丸。朱砂爲衣。服法如前。

清腦丸

黃芩半斤。酒浸。炒黃　南星四兩。生用　半夏浸洗七次

右爲末。姜糊丸。

寬中丸　治胸膈痞悶。停滯飲食。

山查不以多少。蒸熟曬乾

右爲末。作丸服。

溫清丸　治翻胃。伐肝邪。

乾姜一兩　滑石　甘草各二兩

右爲末。丸服。

大安丸　脾經消導之藥。

山查二兩　神麴炒　半夏

陳皮　蘿蔔子　連翹各半兩

右爲末。粥糊丸服。

右丹溪秘撰方。已散於各種甚多。如阿魏丸、保和丸、小胃丹、越鞠等。及諸秘法。不及一一重錄。姑舉此數方。以表其用藥之旨。大抵治法。以氣、血、痰爲主。凡病血虛、四物氣虛、四君子。有痰、二陳。酌量輕重。加入主病引經之藥。一循活其規徑矣。

當歸三兩。酒浸

牛膝四兩。酒浸

龜板一兩。酥炙

黃芪各二兩

蓮肉

附錄

故丹溪先生朱公石表辭

宋太史濂撰

丹溪先生既卒。宗屬失其所倚藉。并邑失其所依濕。嗜學之士失其所承事。莫不彷徨遙慕。至於酒漓。濂如是者數年。而其學堅定矣。歲當賓興。先生應詔秋闈。幸沾一命。以驗其所施。再往再不利。復歎曰。不仕固無義。然得失則有命焉。苟推一家之效。以遠於鄉。邑州閭。寧非仕乎。先是府君澄祭田三十餘畝。合爲一區。屬人遞司穡事。以隙時扈。然有恆祭而無恆所。先生乃即適意亭遺址。建祠堂若干楹。以奉先世神主。歲時行事。復考朱子家禮而損益其儀文。少長咸在。執事有恪。深衣大帶。以序就列。宴私洽比。不愆於禮。適意亭者。府君所造。以延徐文清公之地。先生弗忍其廢。改創祠堂之南。傳謂子姓肄習其中。包銀之不下。州縣承之。急如星火。一里之間。不下數十姓。民莫敢與辨。先生所居里僅上當賦二人。鄰守召先生自隔之曰。此非常法。若不愛頭乎。先生笑曰。守爲官。頭固當惜。民不愛也。此害將毒子孫。必欲多及民願倍輸吾產。當之。守雖怒。竟不能屈。縣有暴丞好諂瀆鬼神。欲俯偕宗祠以徼福。懼先生莫己與。以言脅之曰。人之生死。繫神貳司之。欲治其宮。孰敢干令。先生曰。吾受命于天。何庸媚士偶爲生死計耶。且獄神無知則已。使其有知。當此儉歲。民食糠覈不飽。能振吾民者。然後降之福耳。卒罷其事。賦役無藝。胥史高下其手。以爲民奸。先生集同里之人謂曰。有田則科徵隨之。若等入胥史餌而護相傾。非策之上也。宜相率以義。聚其力之贏。而歛之。衆翕然從。每官書下。相依如父子。議事必先集。若苛斂之至。先生即以身前。辭氣懇款。上官多聽。爲之損裁。縣大夫勸耕于鄉。將有要於民。先生聞其臨境。邪輻屣履。往迎于道左。大夫慙曰。先生何事乃爾耶。先生曰。民有役于官。禮固應爾。大夫曰。勸耕善乎。先生曰。私田不願官勸。第公田生青芻耳。是時圭田賦重。稱戶多逃亡。故先生以此爲風。大夫一笑而去。鄉有蜀墅坡。周圍凡三千六百步。溉田至六千畝。而歲堤坂而水竭。數以旱告。先生倡民興築。置坊扉。懸爲三資。時其深淺而舒洩之。民食其利。後十年。山水暴至。堤又圮。先生命再從子淳力任其事。以嗣其成。縣令長咸問決獄得失。先生必盡心爲之開導。東陽郭氏父子三人。虐歐小民幾斃。又貫鍼鱔腹。逼使吞之。事移義烏鞫問。當其子父皆死。先生曰。原其故。殺之情。亦一人可值爾。一子從父之令。宜從末減。若皆殺之。無乃已重乎。事上從先生議。張甲行小徑中。適李乙荷任器來。幾中甲目。甲怒拳其耳而死。甲乙皆貧人。甲又有九十之親。先生曰。貰甲罪。則廢法。狗法甲必瘐死。親無以養。亦死。乙屍暴於道。孰爲殮之。不若使竟其葬。薀且慰其親。徐來歸獄。服申刑耳。或曰。甲或逃。奈何。先生曰。若以贓待之。必不爾也。縣如先生言。後會赦免。細民有斬先生丘木者。先生訊之。民弗服。先生閉于縣。將遽之。人交讓民曰。汝奈何犯仁人耶。民曰。計將安出。人曰。先生長者也。急異木還之。當爾貸。民從之。先生果寘而不問。先生客吳妙淵院。尼刻木作人形。以爲厭蠱。館客陳庚得之。欲發其事。尼懼甚。先生知之。以計給陳出。碎其木。剡陳歸怒且詈。先生叱而去。方嶽重臣及廉訪使者。聞先生名。無不願見。既見。無不欲交。辱寵之。先生皆力辭。唯民瘼吏弊。必再三懇額告之。不啻親受其病者。覃懷鄭公持節浙東。尤敬先生。以尊客禮禮之。衆或不樂。競短其行於公。公笑曰。朱聘君蓋舉諸公之長而諸公顧反短之。何其量之懸隔耶。皆慚不能退。初。先生壯齡時。以母夫人病脾。顧智醫。後益研礪

四歧。詣驗獄案。必欲見諸實踐。抑其疏豪。歸於粹夷。理欲之關。誠僞之限。嚴辨確守。不以一毫苟且自恕。如是者數年。而其學堅定矣。歲當賓興。先生應詔秋闈。幸沾一命。以驗其所施。再往再不利。復歎曰。不仕固無義。然得失則有命焉。苟推一家之效。以遠於鄉。邑州閭。寧非仕乎。先是府君澄祭田三十餘畝。合爲一區。屬人遞司穡事。以隙時扈。然有恆祭而無恆所。先生乃即適意亭遺址。建祠堂若干楹。以奉先世神主。歲時行事。復考朱子家禮而損益其儀文。少長咸在。執事有恪。深衣大帶。以序就列。宴私洽比。不愆於禮。適意亭者。府君所造。以延徐文清公之地。先生弗忍其廢。改創祠堂之南。傳謂子姓肄習其中。包銀之不下。州縣承之。急如星火。一里之間。不下數十姓。民莫敢與辨。先生所居里僅上當賦二人。鄰守召先生自隔之曰。此非常法。若不愛頭乎。先生笑曰。守爲官。頭固當惜。民不愛也。此害將毒子孫。必欲多及民願倍輸吾產。當之。守雖怒。竟不能屈。縣有暴丞好諂瀆鬼神。欲俯偕宗祠以徼福。懼先生莫己與。以言脅之曰。人之生死。繫神貳司之。欲治其宮。孰敢干令。先生曰。吾受命于天。何庸媚士偶爲生死計耶。且獄神無知則已。使其有知。當此儉歲。民食糠覈不飽。能振吾民者。然後降之福耳。卒罷其事。賦役無藝。胥史高下其手。以爲民奸。先生集同里之人謂曰。有田則科徵隨之。若等入胥史餌而護相傾。非策之上也。宜相率以義。聚其力之贏。而歛之。衆翕然從。每官書下。相依如父子。議事必先集。若苛斂之至。先生即以身前。辭氣懇款。上官多聽。爲之損裁。縣大夫勸耕于鄉。將有要於民。先生聞其臨境。邪輻屣履。往迎于道左。大夫慙曰。先生何事乃爾耶。先生曰。民有役于官。禮固應爾。大夫曰。勸耕善乎。先生曰。私田不願官勸。第公田生青芻耳。是時圭田賦重。稱戶多逃亡。故先生以此爲風。大夫一笑而去。鄉有蜀墅坡。周圍凡三千六百步。溉田至六千畝。而歲堤坂而水竭。數以旱告。先生倡民興築。置坊扉。懸爲三資。時其深淺而舒洩之。民食其利。後十年。山水暴至。堤又圮。先生命再從子淳力任其事。以嗣其成。縣令長咸問決獄得失。先生必盡心爲之開導。東陽郭氏父子三人。虐歐小民幾斃。又貫鍼鱔腹。逼使吞之。事移義烏鞫問。當其子父皆死。先生曰。原其故。殺之情。亦一人可值爾。一子從父之令。宜從末減。若皆殺之。無乃已重乎。事上從先生議。張甲行小徑中。適李乙荷任器來。幾中甲目。甲怒拳其耳而死。甲乙皆貧人。甲又有九十之親。先生曰。貰甲罪。則廢法。狗法甲必瘐死。親無以養。亦死。乙屍暴於道。孰爲殮之。不若使竟其葬。薀且慰其親。徐來歸獄。服申刑耳。或曰。甲或逃。奈何。先生曰。若以贓待之。必不爾也。縣如先生言。後會赦免。細民有斬先生丘木者。先生訊之。民弗服。先生閉于縣。將遽之。人交讓民曰。汝奈何犯仁人耶。民曰。計將安出。人曰。先生長者也。急異木還之。當爾貸。民從之。先生果寘而不問。先生客吳妙淵院。尼刻木作人形。以爲厭蠱。館客陳庚得之。欲發其事。尼懼甚。先生知之。以計給陳出。碎其木。剡陳歸怒且詈。先生叱而去。方嶽重臣及廉訪使者。聞先生名。無不願見。既見。無不欲交。辱寵之。先生皆力辭。唯民瘼吏弊。必再三懇額告之。不啻親受其病者。覃懷鄭公持節浙東。尤敬先生。以尊客禮禮之。衆或不樂。競短其行於公。公笑曰。朱聘君蓋舉諸公之長而諸公顧反短之。何其量之懸隔耶。皆慚不能退。初。先生壯齡時。以母夫人病脾。顧智醫。後益研礪

之、且曰、吾既窮而在下、澤不能致遠、其可遠者、非醫將安務乎、時方僉行陳師文、裴宗元所定大觀一百九十七方、先生獨疑之、曰、用藥如持衡、隨物重輕而爲前却、古方新證、安能相值乎、於是尋師而訂其說、渡錢江走吳、又走宛陵、走建業、皆不能得、復囘武林、有以維司徒知悌爲言者、知悌、字子敬、宋寶祐中寺人、精於醫、得金士劉元素之學、而旁參於李杲張從正二家、然性倨、謁先生、謁焉、十往返不能通、先生志益堅、自揣立於其門、大風雨不易、或告維曰、此朱彥修也、君居江南而失此士、人將議君後矣、維遽偕客見之、一見如故交、爲言學醫之要、必本於素問難經、而濕熱相火爲病最多、人罕有知其說者、兼之長沙也、先生所居曰丹溪、學者尊之而不敢字、故因其地稱之曰丹溪先生云、夫自學術不明于天下、凡聖賢之治疾方、無所憾、區區陳裘之學、泥之且殺人、先生固之、夙夜以維世取信之具、聞有注意遺經、假若可倘、又膠於訓詁之間、異同紛拏、有如聚訟、其視身心皆漠然若不相關、此其知識反出於不學庸人之下、於戲、秦漢以來、則或然矣、然而靈爻不鳴、孽孤之妖弗息、黃鍾不奏、瓦缶之音日甚、天開文運、濂洛繼興、遠明凡聖之緒、流者泝而止之、膠者釋而通之、一期閭鄒其昏翳、挽囘其精明而後已、至其相傳、唯考亭集厥大成、而考亭之傳、又唯金華之四賢、紹其世胤之正、如印印泥、不差毫末、此所以輝連晉接而芳猷允著也、先生少負任俠之氣、不少屈撓、及聞道德性命之說、遽變之而爲剛毅、所以局量弘而載任重、篤踐先哲、唯日不足、民吾同胞之念、須臾莫忘、雖其力或弗支、苟遇惠利少足以濟物、必委蛇周旋、求盡其心、應接之際、又因人心感發之機而施仁義之訓、觸類而長、開物成化、所謂風雨霜露無非君子之教者、要亦不可誣也、致思於醫、亦能搜隱抉祕、倡期南方之絕學、嬰疾之家、倚以爲命、先生一布衣耳、其澤物有如此者、使其得位於朝以行其道、則夫明効大驗又將何如哉、嗚呼、先生已矣、其山嵱澗澄之色、井渫石貞之操、與其不可傳者、弗能卽矣、徒因其遺行而誦言之、見聞不博、寤能得十一於千百之間哉、雖然、舍是又無足以求先生者、敢撫狀之概、彼而爲之銘曰、

濂洛有作、性學復明、考亭承之、集厥大成、化裁剪揚、以及閩粵、時雨方行、區萌畢達、世風之正、質歸金華、緜延四葉、益煒其葩、辭諸上矩、眞彼逵路、隨其志分、不奪其度、有美君子、欲振其奇、血氣方剛、畸能悔予、七尺之軀、忍令頓越、壯齡已踰、頑更其轍、更之伊何、我笈有書、窮而彌篤、每見誇多鬪靡之士、輒語之曰、聖賢一言、終身行之、弗盡矣、以爲多、玉於拈英摘豔之辭、尤不登止惜陰、夜亦爲晝、昔離其鑒、今廓其蘧、始知人心與宇宙同出、將用世、時有小利、學惠家邦、庶享厥志、勤我祠事、以伸其宗、況有詩書、以陶以鬱、以暢其施、期壽夫物、若躬昭明道眞、釋除欲仇、上帝有赫、日注吾目、天人之交、間不容粟、聽者發然、如開巨鏁、有聲鏗鏘、無耳不聰、旁溢於醫、亦紹絕蹤、開闢玄微、功利尤博、斂其豪英、變爲毅弘、所以百爲、度越于人、帖帖世儒、出入口耳、競藥圃華、栝門殊軌、以經爲歲、此軌甚焉、不有躬行、其失曷鑄、世塗方冥、正資揚燎、夢夢者天、使埋其耀、精神上征、定爲長庚、與造化遊、白光煒煒、表德幽嫺、道古之義、僉曰允哉、是詞無愧、

丹溪翁傳

戴九靈良撰

丹溪翁者、婺之義烏人也、姓朱氏、諱震亨、字彥脩、學者尊之曰丹溪翁、翁自幼好學、日記千言、稍長、從鄉先生治經、爲舉子業、後聞許文懿公得朱子四傳之學、講道八華山、復往拜焉、益聞道德性命之說、宏深

碎密。遂爲專門。一日文懿謂曰。吾臥病久。非精於醫者不能以起之子聰明異常人。其肯游藝於醫乎。翁以母病脾。於醫亦粗習。及聞文懿之言。即慨然曰。士苟精一藝以推及物之仁。雖不什於時。猶仕也。乃悉焚舉向所習舉子業。一於醫致力焉。時方盛行陳師文、裴宗元所定大觀二百九十七方。翁窮晝夜是習。旣而悟曰。捨古方以治今病。其勢不能以盡合。苟將起度量立規矩。稱權衡。必也素難諸經乎。然吾鄉諸醫鮮克知之者。遂治裝出游。求他師而叩之。乃渡浙河。走吳中。出宛陵。抵南徐。達建業。皆無所遇。及還武林。忽有以其舉維氏告者。維名知悌。字子敬。世稱太無先生。宋理宗朝寺人。學精於醫。得金劉完素之再傳。而旁通張從正、李杲二家之說。然性褊衷。恃能厭事。難得意。翁往謁焉。凡數往返。不與接。已而求見愈篤。維乃進之曰。子非朱彥脩乎。時翁已有醫名。維故知之。翁既得見。遂北面再拜以謁。受其所教。維遇翁亦甚懽。即授以劉張李諸書。爲之敷揚三家之旨。面一斷於經。且曰。盡去而舊學。非是也。翁聞其言。渙焉無少疑滯於胸臆。居無何。盡得其學以歸。鄉之諸醫。泥陳裴之學者。聞翁言。即大譁而笑且排。獨文懿喜曰。吾疾其遂瘳矣乎。文懿得宋疾。醫不能療者徐十年。翁以其法治之。良驗。於是諸醫之笑且排者。始皆心服口譽。數年之間。聲聞頓著。翁不自滿足。益以三家之說推廣之。謂劉張之學。其論臟腑氣化有六。而於濕熱相火三氣。致病爲最多。遂以推陳致新瀉火之法療之。此固高出前代矣。然有陰虛火動。或陰陽兩虛濕熱自旺者。又當消息而用之。謂李之論飲食勞倦內傷脾胃。則胃脘之陽不能以升舉。并及心肺之氣。陷入中焦。而用補中益氣之劑治之。此亦前人之所無也。然天不足於西北。地不滿於東南。天陽也、地陰也。西北之人。陽氣易於升。東南之人。陰火易於降。其論臟腑氣化有六。而其升者亦從而用之。吾恐反增其病矣。乃以三家之論。去其短而用其長。又復參之以太極之理。易、緫記、通書、正蒙諸書之義。貫穿內經之言。以尋其指歸。而謂內經之言火。蓋與太極動而生陽五性感動之說有合。其言陰道虛。則又與禮記之養陰遺同。因作相火及陽有餘陰不足二論以發揮之。其論相火有曰。陽動而變。陰靜而合。而生水火木金土。然火有二焉。曰君火。曰相火。君火者。人火也。相火者。天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動皆屬火。以名而言。形質相生。配於五行。故謂之君。以位而言。生於虛無。守位稟命。故謂之相。天生物。悉於動。人有此生。亦悉於動。然其所以悉於動者。皆相火助之也。見於天者。出於龍雷。則木之氣。出於海。則水之氣也。具於人者。寄於肝腎二部。肝屬木而腎屬水也。腎者、肝之府。膀胱者、腎之府。心胞絡者、腎之配。三焦以焦言。而下焦司肝腎之分。皆陰而下也。天非此火不能生。人非此火不能以有生。天之火雖出於木。而皆本乎地。故雷非伏龍非蟄。海非附於地。則不能鳴。不能飛。不能波也。鳴也、飛也、波也。動而爲相火者也。肝腎之陰。悉具相火。人而同乎天也。或曰。相火、天人所同。東垣何以指爲元氣之賊。又謂火與元氣不兩立。一勝則一負。然則如之何而可使之無勝負乎。曰。周子曰。神發知矣。五性感動而萬事出。五者之性。爲物所感。不能不動。謂之動者。卽內經五火也。相火易動。五性厥陽之火。又從而扇之。則妄動矣。火旣妄動。則煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與熱言之。而相火之氣。則以火言。蓋表其暴悍酷烈有甚於君火也。故曰。相火元氣之賊。周子曰。聖人定之以中正仁義而

主靜。朱子亦曰。必使道心常爲之主。而人心每聽命焉。此善處乎火者也。人心聽命於道心。而又能主之以靜。彼天火將straight然不動。而相火者。惟有扶助造化。而爲生生不息之運用耳。夫何元氣之賊哉。或曰。內經相火甚少陰中陽矣。未嘗言及厥陰太陽。而吾子言之。何也。曰。是太陽少陰。東垣嘗言之。治以炒柏。取其味苦能瀉水中之火。火藏人亦言。腎與三焦。肝與胞絡。皆從火治。此歷指龍雷之火也。余以天人之火。皆生於地。如上文所云者。質厥二公之意耳。或曰。內經言火者非一。往往於六氣中見之。而言腦髓者未有也。二公獨他有所據耶。曰。經以百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者。岐伯歷指病機一十九條。而屬火者五。此非相火爲病之出於腦髓者乎。考之內經。諸熱瞀瘈、則屬之火。諸狂燥越、則屬之火。諸禁鼓慄、如丧神守、則屬之火。諸病附腫疼酸驚駭、則屬之火。又曰。病式曰。諸風掉眩。屬於肝火之動也。諸濕腫滿。屬於脾火之勝也。諸痿喘嘔。屬於心火之用也。是皆火之爲病出於臟腑者然也。噫。以陳無擇之通達。猶以暖識論君火。日用之火論相火。是宜後人之聖脅哉。其論陽有餘陰不足。有曰。人受天地之氣以生。天之陽氣爲氣。地之陰氣爲血。然氣常有餘而血常不足。何爲其然也。天、大也。爲陽而運於地之外。地居天之中。爲陰而承乎天之大氣舉之。日、質也。屬陽而運於月之外。月、缺也。屬陰而稟日之光以爲明。何爲其然也。天大也。爲陽而運於地之外。地居天之中。爲陰而承乎天之大氣舉之。日、質也。屬陽而運於月之外。月、缺也。屬陰而稟日之光以爲明。何爲其然也。天、

曰此熱甚而反寒也乃以辛涼之劑吐痰一升許而漿者之綿減半仍用防風通聖飲之愈周因喜甚翁曰病愈後須淡食以養胃內觀以養神則水可生火可降否則附毒必發殆不可救彼不能然後告疽發背死浙省平章南征閩粵還病反胃醫以爲可治翁診其脈告曰公之病不可言也即出獨告其左右曰此病得之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液亡腸胃枯損食雖入而不化食既不化五臟皆無所稟去死不遠矣平章不信翁退而使人問之翁曰脈弦而芤弦則木乘土芤則陽絕於陰胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰某以嗜酒前後沒見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐中堂自如翁診其脈不與言而出使詰之則曰公病在死法中之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰某以嗜酒前後沒見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐中堂自如翁診其脈不與言而出使詰之則曰公病在死法中不出三月且入鬼錄顧猶有驕氣耶後果如期死一老人病目無見使來求治翁診其脈微甚爲製人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一醫在庭煉礜石問之則已服之矣翁愕然曰此病得之氣大虛今不救其虛而反用礜石不出此夜必死至夜參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通醫治以利藥益甚翁診之右寸頗弦滑曰此積痰病也積痰在肺肺爲上焦而膀胱爲下焦上焦閉則下焦窒譬如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以發大吐之吐已病如失一婦人病不知稍蘇即號叫數四而復昏翁診之肝脈弦數而且滑曰此怒心所爲蓋得之怒而強酒也詰之則不得於夫每迟夜引滿自酌解其慍翁治以流痰降火之劑而加香附以散肝分之鬱立愈一女子病不食面北臥者且半載醫告術窮翁診之肝脈弦出左口曰此思男子不得氣結於脾故耳叩之則許嫁夫入廣且五年翁謂其父曰是病惟怒可解蓋怒之氣擊而屬木故能衝其土之結今茅鴟之使怒耳父以爲不然翁入而掌其面者三責以不當有外思女子號泣大怒怒已進食翁復酒謂其父曰思氣難解然必得喜則庶不再結乃詐以夫有書且夕且歸後三月夫果歸而病不作一婦人產後有物不上如衣裾醫不能喻翁曰此子宮也氣血虛故墮子而下即與芎芷當歸之劑而加升麻舉之仍用皮工之法以五倍子作湯洗濯數其皮少選子宮上翁嘅之曰三年後可再生兒無憂也如之一貧婦寡居病瘧翁見之惻然乃曰是疾世號難治者不守禁忌耳是婦貧而無厚味募而無欲庶幾可療也即自具藥療之病愈後復投四物湯數百遂不發動翁之爲醫皆此類也蓋其遇病施治不膠於古方而所療皆中然於諸家方論則雖所不通他人靳靳守古翁則操縱取舍而卒與古合一時學者咸聲隨影附翁教之孳孳忘疲一日門人趙良仁問大極之旨翁以陰陽造化之精微與醫道相出入者論之且曰吾於講生平未嘗論至於此今以吾子所問故偶及之是蓋以道相告非徒以醫言也趙出語人曰翁之醫其始纂翁於此乎雖成之自金陵來見自以爲精仲景學翁曰仲景之書收拾於殘篇斷簡之餘然其間或文有不備或意有未盡或編次之脫落又可以醫師少之哉

咸豐例之非舛吾每觀之不能以無疑因略摘疑義數條以示羅倚未悟及遇治一疾翁以陰虛發熱而用益陰補血之劑投之不三日而愈羅乃歎曰以某之所見未免作傷寒治今翁治此猶以弩歸之性辛溫而非陰虛者所宜服又況汗下之誤乎翁春秋既高乃猶張製等所諸而著格致餘論局方發揮傷寒辨疑本草衍義補遺外科精要新論諸書學者多誦習而取則焉翁簡慈貞良剛嚴介特襟心以正立身以誠而孝友之行質本乎天質奉時祀也訂其禮文而敬泣之事母夫人也時其飲食而宣以忠養之寧歡於己而必致愛於兄弟寧薄於己子而必施厚於兄弟之子非非其友不友非其道不道好論古今得失慨然有天下之憂世之名公卿多折節下之翁謂直陳治道無所顧忌然但語及榮利事則拂衣而起與人交一以三綱五紀爲去就嘗曰天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉夫行本也辭從而生者也苟見枝葉之辭去本而末是務嘅慈溢顏面若將浼焉翁之卓卓如是則醫又特一事而已然翁講學行事之大方已具吾友宋太史濂所爲翁墓誌茲故不錄而竊錄其醫之可傳者爲翁傳庶使後之君子得以互考焉

論曰昔漢嚴君平博學無不通賣卜成都人有邪惡非正之問則依箸龜爲陳其利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠史稱其風聲氣節足以激貪而厲俗翁在婺得學道之源委而混迹於醫或以醫來見者未嘗不以葆精鍛神開其心至於一語一默一出一處凡有關於倫理者尤諄諄訓誨使人奮迅感慨激厲之不暇左丘明有云仁人之言其利博哉信矣若翁者殆古所謂直諒多聞之益友又可以醫師少之哉



格致餘論序

目錄

飲食色欲箴序
飲食箴
色欲箴
治病必求其本論
養老論
夏月伏陰在內論
痛風論
病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論
大病不守禁忌論
面鼻得冷則黑論
難產論
胎婦轉胞病論
受胎論
陽有餘陰不足論
濇脈論
慈幼論
豆瘡陳氏方論
疫疫論
治病先觀形色然後察脈問證論
虛病痰病有似邪病論
胎自墮論
難產胞損淋瀝論
乳硬論
人迎氣口論

予聞載道之書也。詞簡而義深。去古漸遠。衍文錯簡。仍或有之。故非吾儕不能讀。學者以易心求之。宜其茫若望洋。淡如嚼蠟。遂直以爲古書不宜於今。厭而弃之。相率以爲局方之學。間有讀者。又以濟其方技。漫不之省。醫道隘晦。職此之由。可嘆也。震昌三十歲時。因母之患脾疼。衆工束手。由是有志於醫。遂取素問讀之。三年似有所得。又二年母氏之疾。以藥而安。因追念先子之內傷。伯考之咨問。叔考之昆弟。幼弟之腿痛。室人之積痰。一皆效於藥之候也。心腑摧裂。痛不可追。然猶慮學之未明。至四十歲。復取而讀之。顧以質鈍。遂朝夕鑽研。缺其所可疑。通其所可通。又四年而得羅太無諱知悌者爲之師。因見河間戴人東垣海藏諸書。始悟濕熱相火爲病甚多。又知醫之爲書。非素問無以立論。非本草無以立方。有方無論。無以識病。有論無方。何以模倣。夫假說問答。仲景之書也。而詳於內傷。醫之爲書。至是始備。醫之爲道。至是始明。由是不能不致疑於局方也。局方流行。自宋迄今。閭閻南北。翕然而成俗。豈無其故哉。徐而思之。濕熱相火。自王太僕注文。已成湮沒。至張李諸老。始有發明。人之一身。陰不足而陽有餘。雖諄諄然見於素問。而諸老猶未表章。是宜局方之盛行也。震昌不揣。輒陳於編。册。并述金匱之治法。以證局方之未備。間以己意。附之於後。古人以醫爲吾儕格物致知一事。故目其篇曰格致餘論。未知其果是否耶。後之君子。幸改而正諸。

春宜論
雞疝當分經絡論
蚘眼論
秦桂丸論
經水或紫或黑論
脈大必病進論
生氣通天論病因章句辯　太僕章句
倒倉論
左大順男右大順女論
吃逆論
天氣屬金說
醇酒宜冷飲論
脾約丸論
疝氣論
寒非寒病熱非熱病論
石膏論
新定章句
相火論
茹淡論
房中補益論
張子和攻擊注論

血氣遲何而不自惜我之所生湏爲我賊女之耽兮其欲實多因房之濟門庭之和士之耽兮其家自廢
旣喪厥德此身亦瘁還復輔濟放心乃收飲食甘美身安病瘳

陽有餘陰不足論

人受天地之氣以生天之陽氣爲氣地之陰氣爲血故氣常有餘血常不足何以言之天地萬物父母天大也爲陽而運於地之外地居天之中爲陰天之大氣粟之日實也亦屬陽而運於月之外月缺也屬陰眞日之光以爲明者也人身之陰氣其消長視月之盈缺故人之生也男子十六歲而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀以養陰氣始成而可與陽氣爲配以能成人而爲人之父母古人必近三十二十而後嫁娶可見陰氣之難於成而古人之善於攝養也禮記注曰惟五十然後養陰者有以加內經曰年至四十陰氣自半而起居衰矣又曰男子六十四藏而精絕女子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止供給得三十年之視聽言動已先虧矣人之情欲無涯此難成易虧之陰氣若之何而可以供給也經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛又曰至陰虛天氣絕至陽盛地氣不足觀虛與盛之所在非晉之過論主閉藏者腎也司疎泄者肝也二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也爲物所感則易動心動則相火亦動動則精自走相火翕然而起雖不交會亦暗流而疎泄矣所以聖賢只是教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午爲火大旺火爲肺金之夫火旺則金衰六月屬未爲土大旺土爲水之夫土旺則水衰況腎水常藉肺金爲佐以補助其不足故內經諄諄於資其化源也古人於夏必獨宿而澆味競競業業於愛護也保養金水二臟正嫌火土之旺爾內經曰冬不藏精者春必病溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛伏閉藏以養其本然之真而爲來春發生升動之本若於此時恣嗜欲以戕賊至春升之際下無根本陽氣輕浮必有溫熱之病夫夏月火土之旺冬月火氣之伏此論一年之虛耳若上弦前下弦後月即月空亦爲一月之虛大風大霧虹霓飛電暴寒暴熱日月薄蝕疑懼恐怒怒據動動又皆爲一日之虛若病患初退瘡瘢正作尤不止於一日之虛今者多有春末夏初患痛即喫食少穩熟仲景謂春夏劇秋冬差而脈弦大者正世俗所謂注夏病若犯此四者之虛便有老態仰事俯育一切隳壞與昔至此深可慨懼古人謂不見所欲使心不亂音之盛於耳面色之盛於目馨香之盛於鼻誰是鐵漢心不爲之動也善攝生者於此五箇月出居於外苟值一月之虛亦宜暫還帷幕各自珍重保全天和期無負敬身之教幸甚

治病必求其本論

病之有本猶草之有根也去葉不去根草猶在也治病猶去草病在臟而治腑病在表而攻裏非惟腹脇胃氣抑且資助病邪譬云乎哉族叔祖年七十稟甚壯形甚瘦夏末患泄利至深秋百方不應予視之曰病雖久而神不悴小便澀少而不赤兩手脈俱澀而頗弦自言嘗微悶食亦減因悟曰此必多年沉積僻在胃脘詢其平生喜食何物曰我喜食鯉魚三年無一日缺予曰積痰在肺肺爲大腸之臟宜大腸之本

格致餘論

元　金華　朱震亨彦脩撰

飲食色欲箴序

傳曰飲食男女人之大欲存焉予每思之男女之欲所關甚大飲食之欲於身尤切世之淪胥陷溺於其中者蓋不少矣苟志於道必先於此究心焉因作飲食色欲二箴以示弟姪幷告諸同志云

飲食箴

人身之貴父母遺體爲口傷身滔滔皆是人有此身飢渴汩興迺作飲食以遂其生嗜彼味者因縱口味五味之過疾病蜂起病之生也其機甚微餒涎所牽忽而不思病之成也飲食俱厭發貽父母醫藥百計山野貧賤淡薄是諳動作不衰此身亦安均氣同體我獨多病悔悟一萌塵開鋭淨曰卽飲食易之粢糒發尒小失大孟子所譏口能致病亦敗爾德守口如瓶服之無斁

色欲箴

惟人之生與天地參坤道成女乾道成男配爲夫婦生育攸寄血氣方剛惟其時矣成之以禮接之以時父子之親其要在茲賅彼昧者狥情縱欲惟恐不及濟以燥毒氣竭血陰人身之神陰平陽秘我體長春

不固也。當與澄其源而流自清。以茶黃陳皮青葱口苦根生薑煎濃湯和以沙糖飲一碗許。自以指探喉中至半時辰。吐痰半升許。如膠。是夜減半。次早又飲。又吐半升而止。又與平胃散加白朮黃連。旬日而安。東陽王仲延。過諸途來告曰。我每日食物。必屈曲自鼻而下。且硬澁作痛。它無所苦。此何病。脉之。右手之言無乃經妄乎。予曰。局方用燥劑。爲劫濕病也。濕得燥則愈。然而收局方用緩劑。爲劫虛病也。補腎不如補脾。脾得温則易化而食味進。下雖虛。亦可少回。內經治法。亦許用劫。正是此意。蓋爲質厚而病甚澁。而關尤沉。左却和。予曰。汚血在胃脘之口。氣因鬱而爲痰。此必食物所致。明以告我。彼亦不自覺。予又曰。汝去臘食何物爲多。曰我每日必早飲點酒兩三盞。過寒氣。爲製一方。用韭汁半銀盞。冷飲。細呷之。盡非藥半斤而病安。已而果然。又一鄰人。年三十餘。性寢而躁。素患下疳瘡。或作或止。夏初患白利。醫上微圓。醫與治中湯兩貼。昏悶若死。片時而甦。予脉之。兩手皆濇。重取略弦似數。予曰。此下疳瘡之深重者。與當歸龍會丸。去腐四貼而利減。又與小柴胡去半夏。加黃連芍藥川芎生薑煎五六貼而安。彼三人者。俱是濇脉。或弦或不弦。而治法迥別。不求其本。何以識藥。

濇脉論

人一呼。脉行三寸。一吸。脉行三寸。呼吸定息。脉行六寸。此平人血氣運行之定數也。醫者欲知血氣之病與不病。非切脉不足以得之。邪之狀不一。載於脉經者二十有四。浮沉弦滑實弦緊洪微緩濇遲伏濡弱數細動虛促結代革散。其狀大率多發見。人之爲病有四。曰寒。曰熱。曰實。曰虛。故學脉者。亦必以浮沉遲數爲之綱。以察病情。此不易之論也。然濇之見。固多虛寒。亦有痛熱爲病者。醫於指下見有不足之氣象。便以爲虛。或以爲寒。孟浪與藥。無非熱補。輕病爲重。重病爲死者多矣。何者。人之所藉以爲生者。血與氣也。或因憂鬱。或因厚味。或因無汗。或因補劑。氣騰血沸。清化爲濁。老痰宿飲。膠固雜糅。脉道阻澁。不能自行。亦見濇狀。若重取至骨。來似有力。且帶數。以意參之於證。驗之形氣。但有熱證。當作痛熱可也。此論爲初學者發。間機之一。必以爲資。東陽吳子方年五十。形肥味厚。且多憂怒。脉常沉濇。自春來得痰氣病。醫認爲虛寒。率與燥熱香窟之劑。至四月間。兩足弱。氣上衝。欲食減。召我治之。予曰。此熱鬱而脾虛。痰厥之證作矣。形肥而脉沉。未是死証。但藥邪太盛。當此火旺。實難求生。且與竹瀝下白虎湯。盡二斤。氣降食進。一月後大汗而死。書此以爲諸賢覆轍戒云。

養老論

人生至六十七十以後。精血俱耗。平居無事。已有熱證。何者頭昏目瞀。肌痒溺數。鼻涕牙落。涎多寐少。足痿耳聵。健忘眩運。腸燥面垢。髮脫眼花。久坐兀睡。未風先寒。食則易飢。唉則有淚。但是老境。無不有此。或曰局方烏附丹劑。多與老人爲宜。豈非以其年老氣弱下虛。理宜温補。今子皆以爲熱。烏附丹劑。將不可施之老人耶。余曉之曰。笑止烏附丹劑不可妄用。至於好酒膩肉。濕麪油汁。燒炙煿炒。辛辣甜滑。皆在所忌。或曰。子何忽之甚耶。甘旨養老。經訓具在。爲子爲婦。甘旨不及。孝道便虧。而吾子之言若是。其將有說以通之乎。願聞其略。予愀然應之曰。正所謂道並行而不悖者。請詳言之。古者井田之法行。鄉閭之教興。人知禮讓。比屋可封。肉食不及幼壯。五十纔方食肉。強壯恣饕。比及五十。疾已蜂起。氣耗血竭。筋柔骨痿。腸胃壅閼。涎沫充溢。而况人身之陰。難成易虧。六七十後。陰不足以配陽。孤陽幾欲飛越。因天生胃氣。尚

慈幼論

人生十六歲以前。血氣俱盛。如日方升。如月將圓。惟陰長不足。腸胃尚脆而窄。養之之道。不可不謹。童子陰暗消。是以下體不與。帛絹夾厚温煖之服。恐妨陰氣。實爲確論。血氣俱盛。食物易消。故食無時。然腸胃尚脆而窄。若稠粘乾硬。酸鹹甜辣。一切魚肉木果。濕麪燒炙。煿炒但是發熱難化之物。皆宜禁絕。只與乾

柿以染白粥。非惟無病。且不縱口。可以養德。此外生果味鹹。乾柿性涼。可爲發陰之助。然果大補。柿大澁。供爲難化。亦宜少與。婦人無知。惟務姑息。聽其啼哭。無所不與。積成痼疾。雖悔何及。所以富貴驕養有子多病。逮至成人。筋骨柔弱。有疾則不能忌口。以自養。居喪則不能食素。以盡禮。小節不謹。大義亦虧。可不愼歟。至於乳子之母。尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便通。情欲動中。乳脈便應。病氣到乳。汁必凝澁。兒得此乳。疾病立至。不吐則瀉。不瀉則熱。或爲口瘡。或爲驚搐。或爲夜啼。或爲腹痛。病之初來。其溺必甚少。便須詢問。臨証設調治。母安亦安。可消患於未形也。夫飲食之擇。猶是小可。乳母稟受之厚薄。情性之緩急。骨相之堅脆。德行之善惡。兒能遂肖。尤爲關係。或曰可以已矣。曰求也古之胎教。其在方册。慥不必贅。若夫胎孕致病。事起茫昧。人多玩忽。醫所不知。兒之在胎。與母同體。得熱則俱熱。得寒則俱寒。病則俱病。安則俱安。母之飲食起居。尤當愼密。東陽張進士次子二歲。滿頭有瘡。一日瘡忽自平。遂患痰喘。予視之曰。此胎毒也。宜勿與解利藥。衆皆愕然。予又曰。乃母孕時。所喜何物。張曰辛辣熱物。是其所喜。因口授一方。用人參連翹芎藭等。舉有監制輔佐之藥。不專務於溫補耳。然其用涼寒者多。而於輔助一法。略開端緒。未甘深及。疑人受得深。決無外感。非胎毒而何。予之次女。形瘦性急。證本有熱。懷孕三月。適當夏暑。口渴思水。時發小熱。途教以四物湯加黃芩陳皮。生甘草木通。因循於煎煮數貼而止。其後此子二歲。瘡痍遍身。忽一日其瘡頓愈。數日。途成疳瘡。予曰。此胎毒也。瘡若再作。病必自安。已而果然。若於孕時。確守前方。何病之有。又陳氏女八歲。時得癉病。遇陰雨則作。遇熱亦作。口出涎沫。聲如羊鳴。予視之曰。此胎受驚也。其病深痼。醫治半年。病亦可安。仍須淡味以佐藥功。與燒丹元。繼以四物湯。入黃連。隨時令加減。半年而安。

夏月伏陰在內論

天地以一元之氣。化生萬物。根於中者。曰神機。根於外者。曰氣血。萬物同此一氣。人靈於物。形與天地參而爲三者。以其得氣之正而通也。故氣升亦升。氣降亦降。氣沉亦沉。人與天地。同一轉耳。子月一陽生。陽初動也。寅月三陽生。陽初出於地也。此氣之升也。巳月六陽生。陽盛出於上矣。此氣之浮也。人之腹。圖地氣。於此時。浮於肌表。散於皮毛。腹中虛矣。經曰。夏月經滿地氣溢滿。入經絡。受血。皮膚充實。長時里中多發豆者。誰不知。人與藥則飲。與粥則食。遂教參芪當歸白朮陳皮大料煎與之。飲至三十餘貼。豆始出。又二十餘貼。則成濕泡。身無全腐。或曰病勢可畏。何不用陳氏全方治之。余曰。此但虛耳。無寒也。只守前方。又數十餘貼而安。後詢其病因。謂先四五日。恐有出豆之病。遂極力攙採。連日出汗甚多。若用陳氏全方。舉無後悔。至正甲申春。陽氣早動。正月間。邑間豆瘡不越一家。卒投陳氏方。童幼死者百餘人。雖由天數。吾恐人事亦或未之盡也。

痛風論

氣行脈外。血行脈內。晝行陽二十五度。夜行陰二十五度。此平人之造化也。得寒則行遲。而不及。得熱則行速而太過。內傷於七情。外傷於六氣。則血氣之運。或遲或速。而病作矣。彼痛風者。大率因血受熱已自沸騰。其後或涉冷水。或立濕地。或扇取涼。或臥當風。寒涼外搏。熱血得寒。汗濁凝澁。所以作痛。夜則痛甚。行於陰也。治法以辛熱之劑。流散寒濕。開發腠理。其血得行。與氣相和。其病自安。然亦有數種。治法稍異。謹書一二。以證予言。東陽傅文年識六十。性急作勞。患兩腿痛甚。動則甚痛。予視之曰。此衆虛證。當補血

流經絡。開分表裏虛實。開陳其施治之法。而又證以論辯之言。深得著書垂教之體。學者讀而用之。如求方圓於規矩。較平直於準繩。引而伸之。觸類而長之。可爲無窮之應用也。今人不知致病之因。不求立方之意。倉卒之際。攜證檢方。沒爾一試。設有不應。并其書而廢之。不思之甚也。近因局方之敎久行。索問之學不講。抱疾談醫者。類皆喜溫而惡寒。喜補而惡解利。忽得陳氏方論。皆燥熱補劑。其辭確。其文簡。懽然用之。翕然信之。遂以爲錢氏不及陳氏遠矣。或曰子以陳氏方爲不足歟。曰陳氏方誠一偏論。雖然亦可謂善求病情者。其意大率歸重於太陰一經。蓋以手太陰屬肺主皮毛也。足太陰屬脾主肌肉。肺金惡寒而易於感。脾胃土惡濕而摊物不受。觀其用丁香官桂。所以治肺之寒也。用附子半夏。所以治脾之濕也。使其肺果有寒。脾果有濕。而彙有虛也。證而與之。中病則止。何傷之有。今也不然。徒見其疒之出遲者。身熱者。泄瀉者。嘔悸者。氣急者。渴思飲者。不問寒熱虛實。率投木香散異功散。問有偶中。隨手獲效。設或誤投。耦不旋踵。何者。古人用藥製方。有向導。有監制。有反佐。有因用。若錢氏方固未嘗廢。細辛丁香白朮參芪等。率有監制輔佐之藥。不專務於溫補耳。然其用涼寒者多。而於輔助一法。略開端緒。未甘深及。疑人之前不可說夢。錢氏之慮至矣。亦將以候達者。慊充推廣而用。雖然渴者用溫藥。痙攣者用補藥。自陳氏發之。過出前哲。然其多用桂附丁香等燥熱。恐未爲適中也。何者。桂附丁香燥熱補之。固其宜也。今永挾寒而用一偏之方。寧不過於熱乎。予嘗會諸家之粹。求其意而用之。暫未敢編其成方也。誠舉一二以證之。從子六七歲時。患豆瘡發熱。徹渴自利。一小方脈視之。用木香散。每貼又增丁香十粒。予切疑焉。假其出而未必寒者。其爲害當何如耶。陳氏立方之時。必有挾寒而豆瘡者。其用

濕血病當自安。遂與四物湯加桃仁陳皮牛膝生甘草煎。入生薑研澄行散。熱飲三四十貼而安。又朱宅閨內。年近三十。食味甚厚。性躁急。患痛風。蜷縮數月。醫藥不應。予視之曰。此挾痰與氣證。當和血疎氣導痰。病自安。遂以滑行散入生甘草牛膝炒枳殼通草陳皮桃仁薑汁煎服。半年而安。又鄰媼六年二十餘。偏倖小人所爲。萬衆森羅。果報昭顯。其可不究心乎。請舉一二以爲凡例。朱康呂親。形瘦色黑。平生喜酒。多飲不困。年近半百。且有別館。忽一日大怒。寒發戰。且自言渴。却不欲予診其脈。大而弱。惟右關稍實。略數。重取則濇。遂作酒熱內鬱。不得外泄。由表熱而不虛也。黃芪一物。以乾葛湯煎與之。盞黃芪二兩。乾葛一兩。大得汗。次早安矣。又舉先生患滯下。後甚逼迫。正合承氣證。予曰。氣口虛。形雖實。而面黃稍白。此必平昔食過飽而胃受傷。寧忍一兩日辛苦。遂與參朮陳皮芍藥等補藥十餘貼。至三日後。胃氣稍完。與承氣兩貼而安。苟不先補完胃氣之虛。而遽行承氣。吾恐病安之後。寧免瘦憊乎。又一婢。色紫稍肥。性沉多髮。年近四十。經不行三月矣。小腹當中有一氣塊。初起如棗。漸如炊餅。予脈之。兩手皆濇。重取却有。試令按其塊痛甚。猶之葛半寸。遂與千金消石丸。至四五次。彼忽自言乳頭黑。且有汁。恐有娠。予曰非也。濇脈懸孕之理。又與三五貼。脈之稍覺虛豁。予悟曰。藥太緩矣。令止前藥。與四物湯倍加白朮。佐以陳皮。至三十貼。候脈完。再與消石丸至四五次。忽自言塊消一盤。便令莫服。又半月經行痛甚。下黑血半升。內有如棋核數十粒。乃塊消一半。又來索藥。以消餘塊。余曉之曰。勿性急。塊已開矣。不可又攻。若次月經行。當盡消矣。次月經行下少黑血塊。又消一盤。又來問藥。余曰但守禁忌。至次月必消盡。已而果然。大凡攻堅之藥有病則病受之。病邪輕而藥力重。則胃氣受傷。夫胃氣者。淸純沖和之氣也。惟與穀肉菜果相宜。蓋藥石皆是偏勝之氣。雖參芪堅劇性亦偏。況攻擊之藥乎。此婦胃氣自弱。好血亦少。若塊盡而却藥。胃氣之存者幾希矣。議論至此。略云乎哉。

治病先觀形色然後察脈問證論

經曰。診脈之道。觀人勇怯。肌肉皮膚。能知其情。以爲診法也。凡人之形。長不及短。大不及小。肥不及瘦。人之色白不及黑。嫩不及蒼。薄不及厚。而況肥人濕多。瘦人火多。白者肺氣虛。黑者腎氣足。形色既殊。脈亦異。外證雖同。治法迥別。所以肥人貴脈浮。瘦人貴脈沉。躁人宜脈緩。緩人宜脈躁。以其不可一槩觀也。試陳一二。可以例推。東陽陳兄。露筋體稍長。患證虛而勞。頭痛甚至有決別之言。余察其脈弦而大。帶數。以人參白朮爲君。川芎陳皮爲佐。至五六日未減。衆皆訝之。以藥之不對也。余曰。藥力有次第矣。更少俟一二宿。當自安。忽其季來問曰。何不少加黃芪。予唉不答。又經一宿。忽自言病頓愈。予脈之。弦指下稍盛。又半日。病者言腦上滿。不覺飢。視其腹紋已陷矣。予曰。夜來藥中莫加黃芪否。曰然。止與三貼。遂速與二陳湯加厚朴枳殼黃連以瀉其衝。三貼而安。又浦江義門鄭兄。年二十餘。秋間大發熱。口渴妄言。妄見。病倡邪鬼。七八日後。召我治。脈之兩手洪數而實。視其形肥面赤。帶白却喜露筋。脈本不實。涼藥所致。此因勞倦成病。與溫補藥自安。曰柴胡七八貼矣。以黃芪附子湯冷與之。飲三貼後。困倦酣睡。微汗而解。脈亦稍軟。繼以黃芪白朮湯至十日。脈漸收斂而小。又與半月而安。夫黃芪補氣藥也。此兩人者。一則氣虛。一

病邪雖實。胃氣傷者勿使攻擊論

凡言治國者多借醫爲論。仁哉斯言也。眞氣。民也。病邪。賊盜也。或有盜賊。必須剪除而後已。良相良將。必先審度兵食之虛實。與時勢之可否。然後動動涉輕妄。則吾民先困於盜。次困於兵。民困而國弱矣。行險僥倖。小人所爲。萬衆森羅。果報昭顯。其可不究心乎。請舉一二以爲凡例。朱康呂親。形瘦色黑。平生喜酒。多飲不困。年近半百。且有別館。忽一日大怒寒發戰。且自言渴。却不欲予診其脈。大而弱。惟右關稍實。略數。重取則濇。遂作酒熱內鬱。不得外泄。由表熱而不虛也。黃芪一物。以乾葛湯煎與之。盞黃芪二兩。乾葛一兩。大得汗。次早安矣。又舉先生患滯下。後甚逼迫。正合承氣證。予曰。氣口虛。形雖實。而面黃稍白。此必平昔食過飽而胃受傷。寧忍一兩日辛苦。遂與參朮陳皮芍藥等補藥十餘貼。至三日後。胃氣稍完。與承氣兩貼而安。苟不先補完胃氣之虛。而遽行承氣。吾恐病安之後。寧免瘦憊乎。又一婢。色紫稍肥。性沉多髮。年近四十。經不行三月矣。小腹當中有一氣塊。初起如棗。漸如炊餅。予脈之。兩手皆濇。重取却有。試令按其塊痛甚。猶之葛半寸。遂與千金消石丸。至四五次。彼忽自言乳頭黑。且有汁。恐有娠。予曰非也。濇脈懸孕之理。又與三五貼。脈之稍覺虛豁。予悟曰。藥太緩矣。令止前藥。與四物湯倍加白朮。佐以陳皮。至三十貼。候脈完。再與消石丸至四五次。忽自言塊消一盤。便令莫服。又半月經行痛甚。下黑血半升。內有如棋核數十粒。乃塊消一半。又來索藥。以消餘塊。余曉之曰。勿性急。塊已開矣。不可又攻。若次月經行。當盡消矣。次月經行下少黑血塊。又消一盤。又來問藥。余曰但守禁忌。至次月必消盡。已而果然。大凡攻堅之藥有病則病受之。病邪輕而藥力重。則胃氣受傷。夫胃氣者。淸純沖和之氣也。惟與穀肉菜果相宜。蓋藥石皆是偏勝之氣。雖參芪堅劇性亦偏。況攻擊之藥乎。此婦胃氣自弱。好血亦少。若塊盡而却藥。胃氣之存者幾希矣。議論至此。略云乎哉。

治病先觀形色然後察脈問證論

經曰。診脈之道。觀人勇怯。肌肉皮膚。能知其情。以爲診法也。凡人之形。長不及短。大不及小。肥不及瘦。人之色白不及黑。嫩不及蒼。薄不及厚。而況肥人濕多。瘦人火多。白者肺氣虛。黑者腎氣足。形色既殊。脈亦異。外證雖同。治法迥別。所以肥人貴脈浮。瘦人貴脈沉。躁人宜脈緩。緩人宜脈躁。以其不可一槩觀也。試陳一二。可以例推。東陽陳兄。露筋體稍長。患證虛而勞。頭痛甚至有決別之言。余察其脈弦而大。帶數。以人參白朮爲君。川芎陳皮爲佐。至五六日未減。衆皆訝之。以藥之不對也。余曰。藥力有次第矣。更少俟一二宿。當自安。忽其季來問曰。何不少加黃芪。予唉不答。又經一宿。忽自言病頓愈。予脈之。弦指下稍盛。又半日。病者言腦上滿。不覺飢。視其腹紋已陷矣。予曰。夜來藥中莫加黃芪否。曰然。止與三貼。遂速與二陳湯加厚朴枳殼黃連以瀉其衝。三貼而安。又浦江義門鄭兄。年二十餘。秋間大發熱。口渴妄言。妄見。病倡邪鬼。七八日後。召我治。脈之兩手洪數而實。視其形肥面赤。帶白却喜露筋。脈本不實。涼藥所致。此因勞倦成病。與溫補藥自安。曰柴胡七八貼矣。以黃芪附子湯冷與之。飲三貼後。困倦酣睡。微汗而解。脈亦稍軟。繼以黃芪白朮湯至十日。脈漸收斂而小。又與半月而安。夫黃芪補氣藥也。此兩人者。一則氣虛。一

則氣宜便有宜不宜存焉可不審乎。

大病不守禁忌論

病而服藥須守禁忌孫眞人千金方言之詳矣。但不詳言所以守禁忌之由敢陳其略。以爲規戒。夫胃氣者。清純沖和之氣。人之所賴以爲生者也。若謀慮神勞。動作形苦。嗜欲無節。思想不遂。飲食失宜。藥餌違法。皆能致傷。既傷之後。須用調補。恬不知怪。而乃恣意犯禁。傷染之證與日俱積。吾見醫將日不暇給。而傷敗之胃氣。孰復完全之望。去死近矣。予族叔形色俱實。痰癖又患痢。自恃強健。能食絕無忌憚。一日召我曰。我雖病。却能而能食。但苦汗出耳。汝能止此汗否。予曰。痰癖非汗出不能愈也。可慮者正在健與能食耳。此非痢也。胃熱善消。脾病不化。食積與病勢已甚矣。此時節擇飲食以養胃氣。省出入以避風寒。候汗透而安。叔曰。世俗謂無飽死痢。我今能食。何謂可慮。余曰。痢而能食者。知胃氣未病也。故言不死。非謂恣食不節擇者。不從所言。恣口大啖。過傷又多啖水。果如此者。月餘後。雖欲求治。不可著手矣。淹淹又月餘而死。內經以腦惡不倫於理爲不治之病。信哉。又周其姓者。形色俱實。患痢善食而易飢。大啖不擇者。五日矣。予責之曰。病中當調補自養。豈可滋味哉賊。遂教之只用熟蘿蔔喫粥耳。少與調治。半月而安。

虛病痰病有似邪祟論

血氣者。身之神也。神既衰乏之邪因而入。理或有之。若夫血氣兩虛。痰客中焦。妨礙升降。不得運用。以致十二宮各失其職。視聽言動。皆有虛妄。以邪治之。其人必死。吁哉冤乎。惟執其咎。憑巫之子傳兄年十七八。時暑月。因大勞而渴。恣飲梅漿。又連得大驚三四次。妄言妄見。病似邪鬼。診其脈。兩手皆虛弦而帶沉數。予曰。數爲有熱。虛弦是大虛。又梅酸之漿。鬱於中脘。補虛清熱。導去痰滯。病乃可安。遂與人參白朮陳皮茯苓半夏連等。濃煎湯。入竹瀝薑汁。與旬日未效。衆皆尤難之。不審余脈之知其虛之未完。與痰之未導也。仍與前方。入荊瀝。又旬日而安。外弟葛一日醉飽後。亂言妄語。妄見。詢之係伊亡兄附體。言生前事甚的。乃叔在邊叱之曰。非邪。食腥與酒太過。痰所爲耳。潛鹽湯一大碗。吐痰一二升。汗因大作。困睡一宵而安。又金氏婦。壯年暑月赴筵。歸乃姑詢其坐次失序。遂赧然自愧。因成此病。言語失倫。其中又多間一句曰奴奴不是。脈皆數而弦。余曰。此非邪。乃病也。但與補脾消熱導痰數日當自安。其家不信。邀數巫者噴水而咒之。旬餘而死。或問曰。病非邪而邪治之。何遽至於死。余曰。暑月赴宴。外境蒸熱。辛辣適口。內境鬱熱。而況素有積痰。加之愧悶。其痰與熱何可勝言。今乃驚以法尺。是激其神而血不寧也。噴以法水。是審其體。密其腐。使汗不得泄也。汗不泄則蒸熱內熾。血不得寧。則陰消而陽不能獨立也。不死何俟。或曰。外證有禁呪一科。庸可廢乎。予曰。移精變氣。乃小術耳。可治小病。若內有虛邪。外有實邪。當用正大之法。自有成式。昭然可考。然符水慌腦上熱痰。一呷涼水。胃熱得之。豈不消快。亦可收安。若內傷而虛。與多嗽。符水下咽。必冰胃而致害。彼鬱熱在上。熱邪在表。須以汗解。率得清冷。膚腠固密。熱何由解。必致內攻。陰陽離散。血氣乖爭。去死爲近。

面鼻得冷則黑論

諸陽聚於頭。則面爲陽中之陽。鼻居面中央。而陽明起於額中。一身之血運到面鼻。到面鼻陽部皆爲至清至精之血矣。酒性善行而喜升。大熱而有峻急之毒。多酒之人。酒氣熏蒸。面鼻得酒。血爲極熱。熱血得冷。爲陰氣所搏。汗濁凝結。滯而不行。宜其先爲紫而後爲黑色也。須用融化滯血。使之得流。滋生新血。可以運化。病乃可愈。予爲酒製四物湯加妙片茯苓陳皮生甘草酒紅花。生薑煎。調五鎰脂末飲之。氣弱者加泡黃芪。無有不應者。

胎自墮論

陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛損。不足榮養。其胎自墮。或勞怒傷情。內火便動。亦能墮胎。推原其本。皆因於熱。火能消物。造化自然。病源乃謂風冷傷於子臟而墮。此未得病情者也。予見賈氏婦。但有孕至三個月左右必墮。診其脈左手大而無力。重取則濇。知其少血也。以其妙年。只補中氣。使血自榮。時正初夏。教以湯煎白朮湯下黃芩末一錢。服三四十貼。遂得保全而生。因而思之。墮於內熱而虛者。於理爲多。曰熱曰虛。當分輕重。好生之工。幸毋輕視。

難產論

世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤辛苦者。無有也。方書止有瘦胎飲一論。而其方爲湖陽公主作也。實非極至之言。何者。見有此方。其難自若。予族妹苦於難產。後遇胎孕則觸而去之。余甚悶焉。視其形肥而勤於針指。揣思旬日。忽自悟曰。此正與湖陽公主相反。彼奉養之人。其氣必實。肥甚氣便和平。故易產。今形肥。知其氣虛。久坐知其不運。而其氣愈弱。久坐胞胎。因母氣不能自運耳。當補其母之氣。則兒健而易產。今其有孕至五六箇月。遂於大全方紫蘇飲加補氣藥。與十數貼。因得男而甚快。後遂以此方隨母之形色性稟。參以時令加減與之。無不應者。因名其方曰大達生散。

難產胞損淋瀝論

常見尿胞因收生者不謹。以致破損。而得淋瀝病。遂爲廢疾。一日有徐姓婦。壯年得此。因思肌肉被傷。在外者且可補完。胞雖在腹。恐亦可治。遂診其脈虛甚。曰難產之由。多是氣虛。難逐之後。血氣尤虛。試與峻補。因以參芪爲君。芎歸爲臣。桃仁陳皮黃芪茯苓爲佐。而煎以豬羊胞中湯。極飢時飲之。但劑率用一兩。至一月而安。蓋是氣血雖長。其胞自完。恐稍遲緩亦難成功。

胎婦轉胞病論

轉胞病。胎婦之稟受弱者。憂悶多者。性急躁者。食味厚者。大率有之。右方皆用滑利疎導藥。鮮有應效。因思胞爲胎所墮。展在一邊。胞系了戾不通耳。胎若舉起。墮在中央。胞系得蹺。水道自行。然胎之墮下。必有其由。一日吳宅孺人患此。脈之兩手似濇。重取則弦。然左手稍和。余曰。此得之憂思胞爲胎所墮。展在一邊。胞系了戾不通耳。胎若舉起。墮在中央。胞系得蹺。水道自行。然胎之墮下。必有其由。一日吳宅孺人患此。脈之兩手似濇。重取則弦。然左手稍和。余曰。此得之憂思。濇爲血少。氣多。弦爲有飲。血少則胞弱而不能自舉。氣多有飲。中焦不清而溢。則胞之所避而就下。故墮。遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草。生薑。空心飲。隨以指探喉中吐出藥汁。俟少頃氣定。又與一貼。次早亦然。如是與八貼而安。此法未爲的確。恐偶中耳。後又歷用數人。亦效。未知果如何耶。仲景云。婦人本肥盛。且舉自滿。全區

瘦且黑。發脚弱了。原亦致脚弱。其發未詳。必有能知之者。

乳硬論

乳房陽明所經。乳頭厥陰所屬。乳子之母。不知調攝。怒忿所逆。醇醪所過。以致厥陰之氣不行。故致不得通而汁不得出。陽明之血沸騰。故熱甚而化膿。亦有所乳之子。腦有滯痰。口氣煩熱。含乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。便須忍痛。揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成難癒。治法疎厥陰之滯。以清陽明之熱。細研石膏。行汗濁之血。以生甘草之節消腫導毒。以瓜蔞子或加浚藥青橘葉皂角刺金銀花當歸。或湯或散。或加減。隨意消息。然須以少酒佐之。若加以艾火兩三壯於腫處。其效尤捷。彼庸工置於自衛。便用針刀引惹。拙痛良可哀憫。若夫不得於夫。不得於舅姑。憂怒鬱悶。昕夕積累。脾氣消阻。肝氣橫逆。遂成腫核。如大棗子。不痛不痒。數十年後。方爲猪陷。名曰妳岩。以其猪形嵌凹似岩穴也。不可治矣。若於始生之際。便能消釋病根。使心清神安。然後施之以治法。亦有可安之理。予族姪婦年十八時。曾得此病。察其形脈稍實。但性急躁。伉儷自諸。所難者。後姑耳。遂以本草單方。肯皮湯間以加減四物湯。行以經絡之劑。兩月而安。

受胎論

成胎以精血之後先分男女者。諸證之論。愈切惑焉。後閱李東垣之方。有曰經水斷後。一二日血海始淨。精勝其血。感者成女。此確論也。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之情性也。左右陰陽之道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血因感而會。精之施也。血能攝精成其子。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。陰陽交媾。胎孕乃凝。所謂之處。名曰子宮。一系在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血則陽爲之主。受氣於左子宮而男形成。精不勝血則陰爲之主。受氣於右子宮而女形成。或曰分男分女吾知之矣。男不可爲父。女不可爲母。與男女之雖形者也。又若何而分之耶。余曰。男不可爲母。得陰氣之盛者也。女不可爲夫。得陽氣之壯者也。雖形者。由陰爲陽。陽氣所乘而成。其類不一。以女而男有二。一則遇男爲妻。遇女爲夫。一則可妻而不可夫。其有女具男之全者。此又陽之甚者。或曰陽氣所乘。獨見於陰。而所乘之形。又若是之不同耶。予曰。陰體虛。陽氣易於乘也。陽氣所乘。陰陽相混。無所爲主。不可謂左不可謂右。受氣於兩歧之間。隨所得陽氣之輕重而成形。故所象之形。有不可得而同也。

人迎氣口論

六陽六陰脈分屬左右手。心小腸肝膽腎膀胱在左。主血。肺大腸脾胃命門三焦在右。主氣。男以氣成胎。故氣爲之主。女以血成胎。故血爲之主。若男子久病。氣口充於人迎者。有胃氣也。病雖重可治。女子久病人迎充於氣口者。有胃氣也。病雖重可治。反此者逆。或曰人迎在左。氣口在右。男女所同。不易之位也。脈法讀曰。左大順男。右大順女。何子言之悖耶。曰脈經一部。王叔和諄諄於教誨者。此左右手以醫爲主而言。若主於病者。奚止千里之謬。

春宜論

春。蠢也。陽氣升浮。草木萌芽。蠢然而動。前哲謂春時人氣在頭。有病宜吐。又曰。傷寒大法。春宜吐。宜之爲言揚也。謂吐之法。自上出也。今之世俗。往往有瘡瘍者。腦滿者。蟲積以爲不於春時宜瀉以湯藥。不可愈也。醫者遂用牽牛巴豆大黃枳殼防風滾爲丸。名之曰春宜丸。於二月三月服之。得下利而止。於初瀉之時。腦脾得通。時暢輕快。不知氣升在上。則在下之陰甚弱。而用利藥戕賊其陰。其害何可勝言。況仲景用承氣湯等下藥。必有大滿大實。堅有燥屎。轉失氣下逼迫而無表證者。方行此法。可下之證未悉具。猶須遲以待之。泄利之藥。其可輕試乎。余伯考形肥骨瘦。昧厚性沉。五十歲。輕於聽信。忽於三月半晴。春宜丸二貼服之。下兩三行。每年舉以爲常。至五十三歲。時七月初。炎熱之甚。無病暴死。此豈非妄聽春宜丸而致禍耶。自上召下曰宜。宜之一字吐也。明矣。張子和先生已詳論之。昔賢豈妄言哉。詳之審訂無疑。後之死者。又有數人。慾故表而出之。以爲後人之戒。

醇酒宜冷飲論

醇酒之性。大熱大毒。清香美味。既適於口。行氣和血。亦宜於體。由是飲者。不自覺其過於多也。不思肺喘金性。性提火。其體脆。其位高。爲氣之主。腎之毋。水之夫。酒下咽。腦肺先受之。若是醇者。理宜冷飲。過於肺。入於胃。然後漸溫。肺先得溫中之寒。可以補氣。一益也。次得寒中之溫。可以發胃。二益也。冷酒行遲。傳化以漸。不可恣飲。三益也。古人終日百拜。不過三爵。既無酒病。亦免酒禍。今余猪之於禮經。則曰飲齊視多時。飲齊酒也。視猶比也。多時寒也。恭之內經。則曰熱因寒用。厥旨深矣。今則不然。不顧受傷。只圖取快。蓋熱飲有三樂存焉。腦滑通快。喉舌辛美。盃行可多。不知酒性喜升。氣必隨之。痰鬱於上。濁澀於下。肺受戕邪。金體必燥。恣飲寒涼。其熱內鬱。肺氣得熱。必大傷耗。其始也病淺。或嘔吐。或自汗。或心脾痛。尚可發散而去之。若其久也。爲病深矣。爲消。爲渴。爲內疽。爲肺痿。爲內痔。爲鼓脹。爲失明。或喘嗽勞瘵。爲癲癎。亦爲難明之病。倘非具眼。未易處治。可不謹乎。或曰。人言一盞冷酒。須二盞血乃得行。酒不可冷飲明矣。余曰。此齊東之語耳。今參之於經。證之以理。發之爲規戒。子以爲迂耶。

瘡疽當分經絡論

六陽經六陰經之分布周身。有多氣少血者。有少氣多血者。有多氣多血者。不可一槩論也。若夫要害處。近虛怯薄處。前哲已曾論及。惟分經之言。未聞也。何則。諸經惟少陽厥陰經之生瘡疽。理宜預防。以其多氣少血。其血本少。肌肉難長。瘡久未合。必成死證。其有不思本經少血。遽用腥葷利藥。以伐其陰分之血。氣不旋踵矣。請述一二成敗之迹。以告來者。余從叔父平生多慮。質弱神勞。年近五十。忽左膊外側廉上起一小紅暈。大約如栗。予視之曰。愼勿輕視。且生與人參大料作湯。得二三斤爲好。人未之信。漸進小貼數服。未解而止。旬餘值大風拔木。瘡上起一道紅如線。纔至背脾。直抵右肋。予曰。必大料人參少加當歸川芎陳皮白朮等補劑與之。後與此方兩貼月而安。又東陽李兄。年踰三十。形瘦肩厚。運得疑思。又因作勞且過於色。忽左腿外側廉上一紅暈。其大如栗。一醫問其大腑堅實。與承氣兩貼下之。不效。又一醫教

與大黃硃砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後召予視之曰事去矣又一李兒年四十餘面面稍白神甚勞忽臨下生一紅胭如桃一人教用神劑衆唉且排於是流氣飲十貳散雜而進之旬餘召予視之予曰非惟不與補藥抑且多得解利血氣俱憊矣已而果然咸曰太陽經非多血少氣者乎何暫遲之生初無甚苦往往間有不救者吾子其能治之乎予曰醫居小腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位卑雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年之後不可生癰縱有痈腫參之脈證但見虛羸便與滋補血氣攝養可保終吉若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥虛虛之禍如指諸掌

脾約丸論

成無己曰約者結約之約胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便硬故曰脾約與此丸以下脾之結燥腸潤結化津流入胃大便利小便少而愈矣愚切有疑焉何者既曰約脾弱不能運也脾弱則土虛矣必脾氣之散脾血之耗也原其所由久病大下大汗之後陰血枯槁內火燔灼熬傷元氣又傷於脾而成此證傷元氣者肺金受火氣無所攝傷脾者肺爲脾之子肺耗則液竭必藉母氣以自救金耗則木爭於我土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官宜大便秘而難下小便數而無窮者也理宜滋養陰血使孤陽之火不燥而金行清化木邪有制脾土清健而運行精液乃能入胃則腸潤而通矣今以大黃爲君枳實厚朴爲臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之潤燥爲之佐使用之熱甚而氣質者無有不安愚恐西北二方地氣高厚人稟壯實者可用若用於東南之人與熱雖盛而血氣不實者得暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣後之欲用此方者須知在西北以開結爲主在東南以潤燥爲主愼勿膠柱而調瑟

鼓脹論

心肺陽也居上肝腎陰也居下脾居中亦陰也陽主化陰主受陽主氣陰主血飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是爲無病之人今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否於斯時也精濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀塞而爲熱熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病腰圍雖以治療又名曰蠱若蠱侵蝕有蟲之殘驗之治法理宜補脾又須發肺金以制木使脾無賊邪之塵滋腎水以制火使肺得清化之令却驗味以防助邪斷妄想以保母氣無有不安醫不察病起於虛急於作效衝能希賞病者苦於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其脹愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠古方惟禹餘糧丸又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊爲切當亦須隨證亦須順時加減用之余友俞仁叔儒而醫連得家難年五十得此疾自制禹餘糧丸服之則萬物發生冬氣寒凜則萬物消殞非桑桂丸之溫熱何由得子臨溫暖而成胎耶予曰詩言婦人和平則樂有子和則氣血不乖平則陰陽不爭今得此藥經血轉紫黑漸成衰少或先或後始則欲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成胎縱使成胎生子亦多病而不壽以桑桂丸之耗損

桑桂丸論

無子之因多起於婦人醫者不求其因起於何處遍閱方方惟桑桂丸其辭確其意尋用藥溫熱近乎人情欣然授之銳然服之甘受燔灼之禍猶且悵然不悔何者湯藥之施也陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也因非一端然欲得子者必須補其陰血使無虧欠乃可推其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬腦髓血氣潰膠禍不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物消殞非桑桂丸之溫熱何由得子臨溫暖而成胎耶予曰詩言婦人和平則樂有子和則氣血不乖平則陰陽不爭今得此藥經血轉紫黑漸成衰少或先或後始則欲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成胎縱使成胎生子亦多病而不壽以桑桂丸之耗損

痎氣論

痎氣之甚者峯丸連小腹急痛也有痛在峯丸者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有聲或無聲有形無形有聲如蛙自柴胡以下歷代名醫皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒故引不行所以作痛理固然也有得寒而無痎者又必有說以通之可也予嘗腿因門戶雪上有霜沒酔之水踢沐徒涉不曾病此以予素無熱在內也因而思之此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束濕熱之邪不得疎散所以作痛若只作寒論恐爲未備或曰厥陰一經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之久毋能生子血濕氣便盛厥陰固本係於肝爲將軍之官其性急速火性且又暴爲寒所束宜其痛之大暴也愚見有用烏頭桂枝等分作湯用之其效亦敏後因此方隨證與形加減用之無有不應然濕者腿多腫病是也又有挾虛而發者當以參朮爲用而以疎導藥佐之診其脈有甚沈緊而大豁無力者是也其痛亦輕惟覺重墜牽引耳

鼓脹論

心肺陽也居上肝腎陰也居下脾居中亦陰也陽主化陰主受陽主氣陰主血飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是爲無病之人今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否於斯時也精濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀塞而爲熱熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病腰圍雖以治療又名曰蠱若蠱侵蝕有蟲之殘驗之治法理宜補脾又須發肺金以制木使脾無賊邪之塵滋腎水以制火使肺得清化之令却驗味以防助邪斷妄想以保母氣無有不安醫不察病起於虛急於作效衝能希賞病者苦於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其脹愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠古方惟禹餘糧丸又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊爲切當亦須隨證亦須順時加減用之余友俞仁叔儒而醫連得家難年五十得此疾自制禹餘糧丸服之則萬物發生冬氣寒凜則萬物消殞非桑桂丸之溫熱何由得子臨溫暖而成胎耶予曰詩言婦人和平則樂有子和則氣血不乖平則陰陽不爭今得此藥經血轉紫黑漸成衰少或先或後始則欲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成胎縱使成胎生子亦多病而不壽以桑桂丸之耗損

痎氣論

痎氣之甚者峯丸連小腹急痛也有痛在峯丸者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有聲或無聲有形無形有聲如蛙自柴胡以下歷代名醫皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒故引不行所以作痛理固然也有得寒而無痎者又必有說以通之可也予嘗腿因門戶雪上有霜沒酔之水踢沐徒涉不曾病此以予素無熱在內也因而思之此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束濕熱之邪不得疎散所以作痛若只作寒論恐爲未備或曰厥陰一經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之久毋能生子血濕氣便盛厥陰固本係於肝爲將軍之官其性急速火性且又暴爲寒所束宜其痛之大暴也愚見有用烏頭桂枝等分作湯用之其效亦敏後因此方隨證與形加減用之無有不應然濕者腿多腫病是也又有挾虛而發者當以參朮爲用而以疎導藥佐之診其脈有甚沈緊而大豁無力者是也其痛亦輕惟覺重墜牽引耳

桑桂丸論

無子之因多起於婦人醫者不求其因起於何處遍閱方方惟桑桂丸其辭確其意尋用藥溫熱近乎人情欣然授之銳然服之甘受燔灼之禍猶且悵然不悔何者湯藥之施也陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也因非一端然欲得子者必須補其陰血使無虧欠乃可推其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬腦髓血氣潰膠禍不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物消殞非桑桂丸之溫熱何由得子臨溫暖而成胎耶予曰詩言婦人和平則樂有子和則氣血不乖平則陰陽不爭今得此藥經血轉紫黑漸成衰少或先或後始則欲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成胎縱使成胎生子亦多病而不壽以桑桂丸之耗損

奚天真之陰也。戒之慎之。鄭廉使之子。年十六。求醫曰。我生七箇月。患淋病。五日七日必一發。其發也大痛。捫地叫天。水道方行。狀如漆和粟者。約一盞許。然後定。診其脈。輕則濇。重則弦。視其形。瘦而稍長。其色青而蒼。蓋其父必因多服下部藥。遺熱在胎。留於子之命門而然。遂以紫雪和黃蘗細末丸梧子大。晒十分乾而與二百丸。作一服。率以熱湯下。以食物壓之。又經半日。痛大作。連腰腹。水道乃行。下如漆和粟者一大碗許。其病減十分之八。後張子忠以陳皮一兩。桔梗木通各半兩。作一貼與之。又下穬粟者一合許類是也。以石膏火煅細研。醋調封丹田。其固密甚於脂。苟非有膏焉能爲用。此雖曾與能而得名。正與石脂同意。閻孝忠妄以方解石爲石膏。況石膏其味甘而辛。本陽明經藥。陽明主肌肉。其甘也。能緩脾益氣止渴去火。其辛也。能解肌出汗。上行至頭。又入手太陰手少陽。彼方解石者。止有體重質堅。性寒而已。求其所謂有膏而可爲三經之主治者。焉在哉。醫欲貴效。不亦難乎。

脈大必病進論

脈。血之所爲。鼓擊。大洪之則名。火之象。屬陽。其病得之於內傷者。陰虛爲陽所乘。故脈大。當作虛治之。其病得之於外傷者。邪客於經。脈亦大。當作邪勝治之。合二者而觀之。皆病證方長之勢也。謂之病進。不亦宜乎。海藏云。君使臣之事也。孰爲是否。幸有以教之。

生氣通天論病因章句辨

證記曰。一年視離經。謂離析經理。在乎章句之絕。內經生氣通天論。病因四章。第一章論因於寒。欲如運樞。以下三句。與上文意不相屬。當衍文也。體若燔炭。汗出而散兩句。當移在此。夫寒邪初客於肌表。邪鬱而爲熱。有似燔炭。得汗則解。此仲景麻黃湯之類是也。第二章論因於暑。暑者君火爲病。火主動則散。故自汗煩渴而多言也。第三章論因於濕。濕者土濁之氣。首爲諸陽之會。其位高而氣清。其體虛。故聰明得而係焉。濁氣熏蒸。清道不通。沉重而不爽利。似乎有物以蒙冒之。失面不治。濕鬱爲熱。熱留不去。大筋緛短者。熱傷血不能養筋。故爲拘攣。小筋弛長者。濕傷筋。不能束骨。故爲痿弱。因於濕。首如裹。各三字爲句。濕熱不攘。以下各四字爲句。文正而意明。前四章論因於氣。爲腫。下文不序病證。蓋是脫簡。四維相代二句。與上文意不相屬。亦衍文也。王太僕曰。暑熱濕氣三病。皆以爲發於傷寒之毒。次第相仍。展轉生病。五段通爲一章。余有疑焉。暑病不治。伏而生熱。熱久生濕。濕久氣病。蓋有之矣。內經止有冬傷於寒。不即病。至夏有熱病之言。未聞寒毒伏藏。至夏發於暑病。至於濕病。亦蒙上文之熱。謂反濕其首。望濕物晏之望。除其熱。當以因於濕首爲句。如裹濕又爲句。則濕首之濕。裹濕之濕。皆人爲也。與上下文列言寒暑之病因文義舛乖。不容於不辨。或曰先賢言溫濕寒濕風濕矣。未聞有所謂濕熱病者。攷之內經亦無有焉。吾作病者。或塊者。舉指爲風冷而行溫熱之劑。禍不旋踵矣。良田病源論月水請病。皆曰風冷乘之。宜其相習而成俗也。或曰。黑北方水之色也。紫淡於黑。非冷而何。予曰。經曰。亢則害。承乃制。熱甚者必兼水化。所以熱則紫甚則黑也。況婦人性執而見鄙。嗜欲加倍。臟腑厥陽之火。無日不起。非熱而何。若夫風冷必須外得。設或有之。蓋千百而一二者也。

石脂論

本草藥之命名。固有不可曉者。中間亦多有意義。學者不可以不察。以色而名者。大黃紅花白前青黛烏梅之類是也。以形而名者。人參狗脊烏頭貝母金鈴子之類是也。以氣而名者。木香沉香檀香麝香茴香之類是也。以質而名者。厚朴乾薑伏苓生熟地黃之類是也。以味而名者。甘草苦參淡竹葉草龍膽苦酒之類是也。以能而名者。百合當歸升麻防風滑石之類是也。以時而名者。半夏兩頭冬寒黃雞夏枯草之類是也。以石膏火煅細研醋調封丹田。其固密甚於脂。苟非有膏焉能爲用。此雖曾與能而得名。正與石脂同意。閻孝忠妄以方解石爲石膏。況石膏其味甘而辛。本陽明經藥。陽明主肌肉。其甘也。能緩脾益氣止渴去火。其辛也。能解肌出汗。上行至頭。又入手太陰手少陽。彼方解石者。止有體重質堅。性寒而已。求其所謂有膏而可爲三經之主治者。焉在哉。醫欲貴效。不亦難乎。

脈大必病進論

脈。血之所爲。鼓擊。大洪之則名。火之象。屬陽。其病得之於內傷者。陰虛爲陽所乘。故脈大。當作虛治之。其病得之於外傷者。邪客於經。脈亦大。當作邪勝治之。合二者而觀之。皆病證方長之勢也。謂之病進。不亦宜乎。海藏云。君使臣之事也。孰爲是否。幸有以教之。

生氣通天論病因章句辨

證記曰。一年視離經。謂離析經理。在乎章句之絕。內經生氣通天論。病因四章。第一章論因於寒。欲如運樞。以下三句。與上文意不相屬。當衍文也。體若燔炭。汗出而散兩句。當移在此。夫寒邪初客於肌表。邪鬱而爲熱。有似燔炭。得汗則解。此仲景麻黃湯之類是也。第二章論因於暑。暑者君火爲病。火主動則散。故自汗煩渴而多言也。第三章論因於濕。濕者土濁之氣。首爲諸陽之會。其位高而氣清。其體虛。故聰明得而係焉。濁氣熏蒸。清道不通。沉重而不爽利。似乎有物以蒙冒之。失面不治。濕鬱爲熱。熱留不去。大筋緛短者。熱傷血不能養筋。故爲拘攣。小筋弛長者。濕傷筋。不能束骨。故爲痿弱。因於濕。首如裹。各三字爲句。濕熱不攘。以下各四字爲句。文正而意明。前四章論因於氣。爲腫。下文不序病證。蓋是脫簡。四維相代二句。與上文意不相屬。亦衍文也。王太僕曰。暑熱濕氣三病。皆以爲發於傷寒之毒。次第相仍。展轉生病。五段通爲一章。余有疑焉。暑病不治。伏而生熱。熱久生濕。濕久氣病。蓋有之矣。內經止有冬傷於寒。不即病。至夏有熱病之言。未聞寒毒伏藏。至夏發於暑病。至於濕病。亦蒙上文之熱。謂反濕其首。望濕物晏之望。除其熱。當以因於濕首爲句。如裹濕又爲句。則濕首之濕。裹濕之濕。皆人爲也。與上下文列言寒暑之病因。文義舛乖。不容於不辨。或曰先賢言溫濕寒濕風濕矣。未聞有所謂濕熱病者。攷之內經亦無有焉。吾作病者。或塊者。舉指爲風冷而行溫熱之劑。禍不旋踵矣。良田病源論月水請病。皆曰風冷乘之。宜其相習而成俗也。或曰。黑北方水之色也。紫淡於黑。非冷而何。予曰。經曰。亢則害。承乃制。熱甚者必兼水化。所以熱則紫甚則黑也。況婦人性執而見鄙。嗜欲加倍。臟腑厥陽之火。無日不起。非熱而何。若夫風冷必須外得。設或有之。蓋千百而一二者也。

太僕章句

之治法者。太僕啓之也。君其歸取原病式熟讀而審思之。幸甚。

因於寒欲如運樞起居如常神氣乃浮
因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散因於濕首句如裹濕句熱不攘句大筋緛短小筋弛長爲痿
長緛短爲拘弛長爲痿
因於氣爲腫云云
因於氣爲腫云云

新定章句

因於寒體若燔炭汗出而散
因於暑汗煩喘喝靜則多言
因於濕首句如裹句濕熱不攘句大筋緛短小筋弛長爲痿
因於氣爲腫云云

倒倉論

經曰腸胃爲市以其無物不有而穀爲最多故謂之倉若積穀之室也倒者傾去積穀而滌濕使之潔淨也胃居中脘土喜容受而不能自運者也人之飲食過適口之物寧無過量而傷積之乎七情之偏五味之厚寧無傷於冲和之德乎精粕之餘停痰瘀血互相糾繳日積月深鬱結成聚甚者如核桃之積諸般奇形之蟲中宮不清矣土德不和矣誠於中形於外發爲癰瘍爲勞瘵爲蠱脹爲痢疾爲無名奇病先哲製爲萬病丸溫白丸等劑攻補兼施寒熱並用期中病情非不工巧然不若倒倉之爲便捷也以黃牡牛擇肥者只一二十斤長流水煮糜爛融入湯中爲液以布濾出查滓取淨汁再入鍋中文火熬成琥珀色則成矣每飲一鍾少時又飲如此者積數十鍾寒月則重湯溫而飲之病在上者欲其吐多病在下者欲其利多病在中者欲其吐下俱多全在活法而爲之緩急多寡也須先設一室明快而不通者以安病人視所出之物可驗病根則止吐利後或渴不得與湯其小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二椀非惟可以止渴抑且可以滌濯餘垢睡一二日覺飢甚乃與粥淡食之待三日後始與少葷薄自養半月健精神漸發形體輕健沈痾悉安矣其後須五年忌牛肉壽師許文懿始病心痛用藥燥熱香辛如丁附桂姜監治數十年而足蠹痛甚且惡寒而多嘔甚而至於舌黑齒黃芽蕨丹繼之以艾火十餘壯又雜治數年而痛甚自分爲廢人矣衆工亦技窮矣如此者又數年因其煩渴惡食者一月以通聖散與半月餘而大腑通迫後重肛門熱氣如燒始時下積滯如五色爛鍋者如柏燭油凝者近半月而病似退又半月而略思穀而兩足難移計無所出至次年三月遂作此法節節如應因得爲全人次年再得一男又十四年以壽終其餘與衆一婦人久年脚氣吐利而安又鎮海葛戶蕭伯善公以便濁而精不禁親與試之有效又臨海林兄患久嗽吐紅發熱消瘦衆以爲瘵百方不應召予視之脈兩手弦數日輕夜重計無所出亦因此而安時冬月也第二年得一子牛坤土也肉者胃之樂也熟而爲液無形之物也積散入肉絡由腸胃而滲透肌腐毛竅爪甲無不入也積聚久則形質成依附腸胃回薄曲折處以爲栖泊之窠臼租穢津液氣血蒸蒸燔灼成病自非割腸刮骨之神

妙孰能去之又豈合勾銖兩之丸散所能驟犯其藩籬戶牖乎竊詳肉液之散益腸胃受之其厚皆倍於前有假乎腫其何滯曲折處非復向時之猪肉汲充滿流行有如洪水泛溢其浮莖陳朽皆推逐蕩滌順流而下不可停留表者因吐而汗滑道者自吐而通濁道者自泄而去凡腸滯礙一洗而定牛肉全重厚和順之性粲然渙然潤澤枯槁補益虛損舉無精神煥發之樂乎正似武王克商之後散財發粟以賑般民之仰望也其方出於西域之異人人於中年後亦行一二次亦御疾養壽之一助也

相火論

太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恆於動人有此生亦恆於動其所以恆於動皆相火之爲也見於天者由於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也腑者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也故曰相火天人之所同何東垣以爲元氣之賊又曰火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可以使之無勝負也曰周子曰神發知矣五性感動而萬事出有知之後五者之性爲物所感不能不動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉此養處乎火者人心聽命乎道心而又能主之以靜彼五火之動皆中節相火雖有裨補造化以爲生生不息之運用耳何賊之有或曰內經相火注曰少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何邪曰足太陽少陰東垣嘗言之矣治以炒棄取其味辛能瀉水中之火是也藏人亦言膀與三焦專司火治肝和胞絡都無異此歷指龍雷之火也予亦備述天人之火皆生於動如上文所云者實推廣二公之意或曰內經言火不一往往於六氣見之言臟腑者求之見也二公豈它有所據耶子能爲我言之乎經曰百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五此非相火之爲病之出於臟腑者乎故諸內經少陽病爲癉瘧太陽病時眩仆少陰病脊痛腰痛太陽病惡寒鼓慄腑病振寒少陰病洒淅惡寒振慄厥陰病洒淅振寒非諸禁鼓慄如喪神守之屬火乎少陽病嘔逆厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥氣上衝胸小腹控睾引腰脊上衝心少陰病氣上衝胸嘔逆非諸逆衝上之屬火乎少陽病讝妄膀胱病狂顛非諸躁狂越之屬火乎少陽病腑腫善驚少陰病苛熱以酸附腫不能久立非諸病腑腫疼酸驚駭之屬火乎又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸氣膹鬱病痿屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也諸痛痒瘡瘍屬於

心火之用也是智火之爲病出於陰厥者然也注文未之發耳以陳無擇之通敏且以暖熱論君火曰前之火言相火而又不曾深及宜乎後之人不無疑哉悲夫

左大順男右大順女論

肺主氣其脈居右寸脾胃命門三焦各以氣爲變化運用故皆附焉心主血其脈居左寸肝腎膀胱皆精血之隧道繫屬故亦附焉男以氣成胎則氣爲之主女挾血成胎則血爲之主男子久病右脈充於左者有胃氣也病雖重可治女子久病左脈充於右者有胃氣也病雖重可治反此者虛之甚也或曰左心小腸肝胆腎膀胱右肺大腸脾胃命門三焦男女所同不易之位也脈法贊曰左大順男右大順女吾子之言非惟左右倒置似以大爲充果有說以通之乎曰大本病脈也今以大爲順蓋有充足之義故敢以充言之脈經一部諄諄於教爲醫者爾此左右當以醫者爲言若主於病奚止於千里之謬或曰上文言左爲人迎右爲氣口皆以病人之左右而爲言何若是肝心出左脾肺出右左主司官右主司府下文言左爲人迎右爲氣口皆以病人之左右而爲言何若是之和反耶曰脈經第九篇之第五章上文大浮數動長滑沉濇緊弦短微此言形狀之陰陽下文關前關後等語又言部位之陰陽陰附陽陽附陰皆言血氣之陰陽同爲論脈之陰陽而所指不同若此上下異文何足疑乎證曰陰病治官非治血乎陽病治府非治氣乎由此參考或恐於經意有合

茹淡論

或問內經謂精不足者補之以味又曰地食人以五味古者年五十食肉子今年過七十矣盡卻腥膻豈中道乎何子之神茂而色澤也曰味有出於天賦者有成於人爲者天之所賦者若穀菽菜果自然沖和之味有食人補陰之功此內經所謂味也人之所爲者皆烹飪調和偏厚之味有致疾伐命之毒此晉子所疑之味也今腥醍之卻非眞茹淡者大麥與粟之醯粳米山藥之甘蔥薤之辛之類皆味也子以爲淡乎安於沖和之味者心之收火之降也以偏厚之味爲安者欲之縱火之勝也何疑之有內經又曰陰之所生本在五味非天賦之味乎陰之五宮倡在五味非人爲之味乎聖人防民之具於是爲備凡人飢則必食彼粳米甘而淡者土之德也物之尟陰而最補者也推可與菜同進經以菜爲充者恐於飢時頓食或過多因致胃損故以菜助其充足收其蔬通而易化此天地生物之仁也論語曰肉雖多不使勝食氣傳曰資生終日百拜而酒三行以避酒禍此聖人施教之意也蓋穀與肥鮮同進厚味得穀爲助其積之也久寧不助陰火而致毒乎故服食家在卻穀者則可不卻穀而服食未有不被其毒者內經謂久而增氣物化之常氣增而久天之由也彼安於厚味者未之思爾或又問精不足者補之以味何不言氣補曰味陰也氣陽也補精以陰求其本也故補之以味若甘草白朮地黃澤瀉五味子天門冬之類皆味之厚者也經曰虛者補之正此意也上文謂形不足者溫之以氣夫爲勞倦所傷氣之虛故不足溫者養也溫存以養使氣自充氣完則形完矣故言溫不言補經曰勞者溫之正此意也彼爲局方者不知出此凡諸虛損證悉以溫熱佐輔補藥名之曰溫補不能求經旨者也

吃逆論

吃病氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬於火東垣謂火與元氣不兩立又謂火氣之賊也古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未嘗執爲降火孰爲補虛人之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之矣此七敗不賊也陰爲火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此似爲死證然亦有實者不可不知攻陳其說趙立道年近五十質弱而多怒七月炎暑大飢索飯其家不能急具因大怒兩日後得滯下病口渴自以冷水調生蜜飲之甚快滯下亦漸緩如此者五七日召予視脈稍大不數遂令止蜜水渴時但令以人參白朮煎湯調益元散與之滯下亦漸收七八日後倦甚發吃予知其因下久而陰虛也令其守前藥然滯下尚未止又以煉蜜飲之如此者三日吃猶未止乘皆尤藥之未當將以豆附飲之予曰補藥無速效附子非補陰者服之必死乘曰冷水飯多得無寒乎予曰炎暑如此飲涼非寒勿多疑待以日數力到當自止又四日而吃止滯下亦安又陳擇仁年近七十厚味之人也有久喘病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃作召予視脈皆大豁乘以爲難予曰形瘦者尚可爲以人參白朮湯下大補丸以補血至七日而安此二人者虛之爲也又一女子年踰笄性躁味厚暑月因大怒而吃作每作則舉身跳動神昏不知人問之乃知暴病視其形氣俱實遂以人參麻煎湯飲一椀大吐頑痰數椀大汗昏睡一日而安人參入手太陰補陽中之陰者也蓋則反瀉大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆氣因怒逆肝木乘火侮肺故吃大作而神昏參蓋喜吐痰蓋氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解麻黃發汗節能止汗殺蜈金蟬之性熱麥門冬之性涼先儒謂物物具太極學者其可不觸類而長引而伸之乎

房中補益論

或問千金方有房中補益法可用否予應之曰傳曰吉凶悔吝生乎動故人之疾病亦生於動其動之極也病而死矣人之有生心爲火居上腎爲水居下水能升而火能降一升一降無有窮已故生意存焉水之體靜火之體動動易而靜難聖人於此未嘗忘言也儒者立教曰正心收心窒心皆所以防此火之動於妄也醫者立教恬澹虛無精神內守亦所以遏此火之動於妄也蓋相火藏於肝腎陰分君火不妄動相火惟有眞命守位而已焉有燔灼之虐燄飛走之狂勢也哉易兌取象於少女兌說也遏少男艮爲成之也艮止也房中之法有艮止之義焉若艮而不止徒有成賊何補益之有縱詳千金之意彼壯年貪縱者水之體非向日之靜也故著房中之法爲補益之助此可用於質壯心靜遏敵不動之人也苟無聖賢之心神仙之骨未易爲也女法水男法火水能制火一藥於興一藥於取此自然之理也若以房中爲補殺人多矣況中古以下風俗日偸資稟日薄說夢向癡難矣哉

天氣屬金說

鄒子曰天依地地依天天地自相依附內經曰大氣舉之也夫自清濁肇分天以氣運於外而舉水地以形居中而浮於水者也是氣也卽天之謂也自其無極者觀之故曰大氣至清至剛至健周乎金者也非

至剛不能攝此水。非至健不能運行無息。以舉地之重。非至清其剛健不能長上右而不老。或曰子以天氣窮扃金者。固易卦取象之義。何至遂以扃金言之乎。蓋言天者。必有證於人。若言大者。必有譬於小。顧明以告我曰天生萬物。人爲貴。人形象天。可以取脾肺主氣。外應皮毛。內經謂陽爲外衞。非皮毛乎。此天之象也。其包裹骨肉腑臟於其中。此地之象也。血行於皮裏肉膚。晝夜周流無端。此水之象也。合三者而觀。非水浮地。天攝水。地懸於中乎。聖人作易取金。爲氣之象。厥有旨哉。

張子和攻擊注論

愚閱張子和諸惟務攻擊。其意以爲正氣不能自病。因爲邪所客。所以爲病也。邪去正氣自安。因病有在上在中在下。深淺之不同。立爲汗吐下三法以攻之。初沿其術。將謂醫之法。盡於是矣。後因思內經有謂之虛者。精氣虛也。謂之實者。邪氣實也。夫邪所客必因正氣之虛。苟正氣實。邪無自入之理。由是於子和之法。不能不致疑於其間。又思內經有言陰平陽秘。精神乃治。陰陽離決。精氣乃絕。又思仲景有言病當汗解。診其尺脈滑。當與黃芩湯中湯補之。然後汗之。於是以子和之書。非子和之舉也。駸駸中土。其法必有過於明發者。何其書之所言。與內經仲景之意。若是之不同也。於是決意於得名師以爲之依歸。發其茅塞。遂遊江湖。但聞某處有某治醫。便往拜而問之。遍經數郡。獨一人焉。後到定城。始得原病式。東垣方鑑。乃大悟子和之孟浪。然終未得的然之議論。將謂江浙間無可爲師者。參定乙丑夏始得聞羅太鼎。并隨芝岩之言。遂往拜之。稟叱駡者五七次。越超三閱月。始得降接。因觀羅先生治一病憎。責擯倦怠。羅公診其病。因乃謂人出。家時其母在堂。及遊浙右。經七年。忽一日念母之心不可遏。欲歸無腰纏。徙爾朝夕西望而泣。以是得病。時值二十五歲。羅令其隔壁泊宿。每日以牛肉豬肚甘肥等煮爛與之。凡經半月餘。且時以慰諭之言勞之。又曰我與鈔十錠。作路費。我不望報。但欲救汝之死命爾。察其形稍甦。與桃仁承氣一日三貼下之。皆是血塊痰積方止。次日只與熟菜稀粥。將息又半月。其人遂如故。又半月餘。與鈔十錠遂行。因大悟攻擊之法。必其人充實。贏壯。乃可行也。否則邪去而正氣傷。小病必重。重病必死。羅每日有求醫者來。必令其診視脈狀。回稟。羅但臥聽。口授用某藥。治某病。以某藥監某藥。以某藥爲引經。往來一年半。並無一定之方。至於一方之中。自有攻補兼用者。亦有先攻後補者。有先補後攻者。又大悟古方治今病。焉能盡合。隨時取中。其此之謂乎。是時羅又言用古方治今病。正如拆舊屋換新屋。其材木非一。不再經匠氏之手。其可用乎。由是又思許學士釋微論曰。予謂仲景書用仲景之法。然未嘗守仲景之方。乃爲得仲景之心也。遂取東垣方參手自抄錄。乃悟治病人。當如漢高祖縱秦暴。周武王誅商之後。自非益財散衆。與三章之法。其受傷之氣。倦憊之人。何由而平復也。於是定爲陰易乏陽易亢。攻擊宜詳審。正氣須保護。以局方爲戒焉。

雲岐子保命集論類要

撰人未詳

辨脉三部九候

凡持脉須明三部九候不知者未足言診脉之道三部者寸為上部主鬲上至頭之有疾見上部主鬲下至臍之有疾見中部主臍下至足之有疾故為下部三部也九候者三而成人沉診三之下浮診三候者三而成天中診三候此四十五動平脉法也候者二而成地二而三之故為九候此四十五動平脉法也如三指之下浮診得六數七極者熱實於表當為表實宜麻黃湯如浮診得二遲二敗者為表虛也當補其虛宜桂枝湯如中診得六數七極者是中焦之熱實當調胃承氣湯瀉之如中診得二遲二敗者中焦虛也當補之以建中湯理中湯如沉診得六數七極者下焦熱實以大承氣湯瀉之如沉診得二遲二敗者下焦之虛也以姜附湯補之

辨傷寒温病

問曰傷寒温病何以脉辨答曰温病冬傷於寒所得也至是變為温病傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦温病也經曰温病之脉行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之

如太陽證汗下後過經不愈訝得尺寸俱浮者太陽温病也

如身熱目疼汗下後過經不愈訝得尺寸俱弦者陽明温病也

如胃腸痛汗下後過經不愈訝得尺寸俱弦少陽温病也

如腹滿嘔乾訝得尺寸俱沉細過經不愈太陰温病也

如口燥舌乾而渴訝得尺寸俱沉過經不愈少陰温病也

如煩滿裏痛訝得尺寸俱微緩過經不愈厥陰温病也

是故隨其經而取之隨其證而治之如發癍乃温毒也

傷寒下後結胸痞氣

傷寒下後結胸痞氣宜足三陰之終手二陰之始胃中結痞過在足少陰腎手厥陰包絡刺兩經之井原以瀉胃中之氣心中結痞過在足太陰脾手少陰心刺兩經之井原以瀉心中之氣

胃中結痞過在足厥陰肝手太陰肺刺兩經之井原以瀉胃中之氣　或上中下三脘應痞結而瀉之

刺傷寒三陽頭痛

傷寒三陽頭痛何法刺之答曰手之三陽足之三陽皆會於頭者謂諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色脉知在何經

如脉浮而頭痛過在足太陽刺膕骨京骨

如脉浮而長過在手陽明刺合谷曲池

如脉浮而弦過在手足少陽刺陽池立墟風府風池刺頭痛之法也

刺三陰腹痛

傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹如脉弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵

如脉沉而腹痛過在足少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵

如脉沉細而腹痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交刺腹痛之法也

桂枝湯二十八證方一十四道

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂麻各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝加桂湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去桂加白朮湯

桂枝湯論

尺寸俱浮太陽受病當一二日發以其脉上連風府頭項痛腰脊強太陽經始於目內眥從頭下至足終於至陰為表之表其太陽者標熱本寒為太陽之表表陽明熱本寒為太陽之裏主水故寒脉浮為在表故太陽經病身熱惡寒頭痛項強腰痛凡治太陽不可利小便不可妄下利小便者熱傳於裏而為血證下之則變為結胸此太經病所禁也若傳於本者可利小便本為膀胱有熱小便赤澁何禁也太陽中風風傷衛衛氣虛而脉浮身熱自汗惡風宜桂枝湯桂枝辛熱生姜辛溫甘草甘平大棗甘溫芍藥酸苦微寒而收實其衛熱而止汗芍甘發散風邪為陽矣

桂枝湯

桂枝　芍藥　生姜各參兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚

如剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽中風陽浮者汗浮也陰弱者人弱也表虛自汗鼻鳴者肺通於鼻鼻和自閉者良矣肺氣受邪而不通肺主衛風傷衛衛氣虛而脉浮身熱自汗惡風宜桂枝湯補之表虛故也桂枝辛熱生姜辛溫甘草甘平大棗甘溫芍藥酸苦微寒而收實其衛熱而止汗芍甘發散風邪為陽矣

桂枝湯

桂枝　芍藥　生姜各參兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚

如剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽中風陽浮而弱自汗惡風者太陽標病也凡發熱不惡寒者陽明標病與太陽相併均宜桂枝加葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根倍　生姜　芍藥　甘草各壹兩　大棗擘十二枚

右剉如麻豆大每服五錢煎服

太陽標病脉浮而長項背強者太陽也凡發熱汗出惡風者太陽標病當補其衛汗不得久泄故宜桂枝湯補之

桂枝湯

桂枝　芍藥　生姜各參兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚

如剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽標病脉浮而弱不及平脉頭痛項強發熱汗出惡風者太陽標病故宜桂枝湯

桂枝湯

桂枝　芍藥　生姜各參兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚

如剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽標病脉浮而長項背強惡風汗出者太陽也凡發熱不惡寒者陽明標病與太陽相併均宜桂枝加葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根倍　生姜　芍藥　甘草各壹兩　大棗擘十二枚

右剉如麻豆大每服五錢煎服

太陽中風脉浮而弱自汗而喘鼻鳴乾嘔汗出惡寒太陽標病當補其衛使榮氣內守宜桂枝湯

桂枝湯

桂枝　芍藥　生姜各參兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚

如剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽標病脉浮而弱自汗而喘項強惡風身寒自汗脉浮而微發汗不愈太陽標與少陰本相併也經曰溫病之脉行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之

如太陽證汗下後過經不愈訝得尺寸俱浮者太陽溫病也

桂枝加芍藥湯

桂枝　生薑各壹兩半　芍藥壹兩半　大棗陸枚

痛甚者加大黃大實痛實傷表

右㕮咀每服五錢水煎服

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝　甘草　生薑各壹兩半　大棗陸枚　附子大者壹枚炮去皮臍破

右㕮咀每服五錢水煎服

大陽標病脈浮而大頭痛項強八九日如瘧狀熱多寒少不嘔者無少陽清便自調者裏和也寒熱榮衛俱病故宜

桂枝麻黃各半湯

桂枝取皮壹兩　芍藥　生薑各壹兩半　甘草各半兩　大棗壹枚　麻黃去節壹兩半

右㕮咀每服五錢水煎服

大陽標病頭痛項強身熱惡寒脈浮而洪過於平脈而自汗不止衛氣不與榮氣諧和刺風池風府經大陽之綱却與桂枝不愈可與桂枝二麻黃一湯和其榮衛

桂枝二麻黃一湯

桂枝取皮壹兩　芍藥壹兩　麻黃去節壹兩　生薑切碎壹兩　甘草炙壹兩　大棗擘碎壹枚　杏仁去皮尖壹兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎服

大陽病頭痛項強挽多寒少脈微而弱陰脈也挽多寒少者陽明大陽與陽明標併宜

桂枝葛根湯

桂枝　芍藥　甘草　麻黃各壹兩　生薑切碎壹兩半　大棗擘碎壹枚　葛根壹兩半

右剉如麻豆大每服五錢水煎服

大陽病頭痛項強挽多寒少脈微而弱陰脈也挽多寒少者陽明大陽與陽明標併宜

桂枝葛根湯

桂枝　芍藥　甘草　麻黃各壹兩　生薑切碎壹兩半　大棗擘碎壹枚　葛根壹兩半

右剉如麻豆大每服五錢水煎服

大陽病頭痛項強身熱不能有汗心下痞滿喘發熱無汗心下痞滿喘發熱無汗除宜

桂枝麻黃各半湯

桂枝　芍藥　麻黃各壹兩半　大棗擘碎壹枚　甘草　生薑　茯苓　白朮各壹兩

右㕮咀每服五錢水煎服小便利止後服

大陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱挽陰虛則發挽陽浮則惡寒翕翕發挽為肌挽鼻鳴乾嘔者裏和表有病桂枝湯主之

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病如瘧頭痛項強發挽惡寒挽多寒少一日三二度發脈浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

證也身疼者榮衛不行可用桂枝脈微各半湯

大陽經病外證未解脈浮弱者浮者為陽弱者為陰法當自汗其脈數者醫又灸之火邪隨經而為煩逆助陽損陰要虛而助實流散脈中焦骨傷筋焦骨為筋髓從腰下重者傳陰分也名曰火逆禁之二也

凡病欲解必先煩燥汗欲出也醫又燒針令汗榮衛不和加燒針則寒邪核起而赤不散盛火之氣發膵脈從少腹上衝心痛皆燒針之過也所禁者三也大陽標病頭痛身熱惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也

桂枝加大黃湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　大黃壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服

大陽病外未除數下之頭痛身熱惡風脈浮而弱醫反數下之後又發其汗不當下而心悸悸欲得按者因發汗多虛故也宜

桂枝甘草湯

桂枝　甘草各壹兩

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病身熱頭痛項強身挽發汗則解半日復煩者脈浮而緩之也

桂枝甘草湯

桂枝　甘草各壹兩

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病身熱惡寒脈浮而緊無汗醫發汗過多其人又手自冒心心悸欲得按者因發汗多虛故也宜

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝　甘草　龍骨　牡蠣各壹兩

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病脈浮而弱身挽惡寒惡風脈浮者表未解下之逆也解表宜

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病身挽惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病脈浮而弱身熱小便清知不在裏大陽本不病邪在標

宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病頭痛脈浮而緊醫反數下之後又發其汗不當下而心悸悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病頭痛身熱惡寒脈浮而緊醫反數下之後又發其汗不當下而不止身疼痛其脈緊而微當救裏宜四逆湯假身不疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病脈浮而弱身挽惡風頭痛項強自汗出而不止榮弱衛強榮弱者汗自出血不能守而讲於外衛不能護是知榮衛不和也欲救邪風宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽經病頭痛項強身挽不能有汗不可下之以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也

桂枝麻黃各半湯

桂枝　芍藥　甘草　麻黃各壹兩　生薑切碎壹兩半　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱挽陰虛則發挽陽浮則惡寒翕翕發挽為肌挽鼻鳴乾嘔者裏和表有病桂枝湯主之

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病如瘧頭痛項強發挽惡寒挽多寒少一日三二度發脈浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

或劇血皆火邪所致也是謂微虛挽之二也

其脈數者醫又灸之火邪隨經而為煩逆助陽損陰要虛而助實流散脈中焦骨傷筋焦骨為筋髓從腰下重者傳陰分也名曰火逆禁之二也

凡病欲解必先煩燥汗欲出也醫又燒針令汗榮衛不和加燒針則寒邪核起而赤不散盛火之氣發膵脈從少腹上衝心痛皆燒針之過也所禁者三也大陽標病頭痛身熱惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也發汗者宜

桂枝加葛根湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　葛根壹兩半

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病外未除數下之頭痛身熱惡風脈浮而弱醫反數下之後又發其汗不當下而心悸悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

其中辛散其表故宜

桂枝加人參湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　人參　乾薑各壹兩

此其禁也表證不除脅熱而利邪氣從虛而入其脈尚浮宜桂枝加人參湯入參甘溫以甘緩之桂辛熱以辛散之甘緩之

大陽病身熱頭痛脈浮而緊無汗醫發汗過多其人又手自冒心心悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病頭痛身熱惡寒脈浮而緊醫反數下之後又發其汗不當下而不止身疼痛其脈緊而微當救裏宜四逆湯假身不疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病脈浮而弱身挽惡風頭痛項強自汗出而不止榮弱衛強榮弱者汗自出血不能守而讲於外衛不能護是知榮衛不和也欲救邪風宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽經病頭痛項強身熱不能有汗不可下之以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也

桂枝麻黃各半湯

桂枝　芍藥　甘草　麻黃各壹兩　生薑切碎壹兩半　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱挽陰虛則發挽陽浮則惡寒翕翕發挽為肌挽鼻鳴乾嘔者裏和表有病桂枝湯主之

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病如瘧頭痛項強發挽惡寒挽多寒少一日三二度發脈浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

甚當汗而不汗也故其人躁煩者邪氣不在表在四肢在腹中按之不能得經一二次汗解邪氣不除則致病人短氣但坐者虛也故汗出不徹脈浮而遲故知之更發汗則愈大陽中風脈浮而緩令反浮而濇者因小發汗脈濇而緊者身必疼痛當大發汗如尺中弱者不可發汗尺者陰也弱者陰虛也陰主血血虛則尺虛不能作汗故知禁也病當自汗出榮氣和也不解者衛氣不和則脈痺當和榮衛使脈得衛之中榮衛和則脈平榮衛不和則脈痺不仁榮衛俱和則脈平宜桂枝湯

平宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病苦頭痛者必劇乃邪無從出也宜

麻黃湯

麻黃去節壹兩　桂枝　甘草各壹兩　杏仁去皮尖壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病苦頭痛身熱項背強脈浮而大不惡寒反惡風者名曰柔痓宜

麻黃附子甘草湯

麻黃去節壹兩　附子炮去皮臍破壹枚　甘草壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽標病頭痛身熱惡寒惡風脈浮而弱醫反數下之後又發其汗不當下而其脈數者醫又灸之火邪隨經而為煩逆助陽損陰要虛而助實流散脈中焦骨傷筋焦骨為筋髓從腰下重者傳陰分也名曰火逆禁之二也

凡病欲解必先煩燥汗欲出也醫又燒針令汗榮衛不和加燒針則寒邪核起而赤不散盛火之氣發膵脈從少腹上衝心痛皆燒針之過也所禁者三也大陽標病頭痛身熱惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也發汗者宜

桂枝加葛根湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　葛根壹兩半

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病外未除數下之頭痛身熱惡風脈浮而弱醫反數下之後又發其汗不當下而心悸悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

其中辛散其表故宜

桂枝加人參湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　人參　乾薑各壹兩

此其禁也表證不除脅熱而利邪氣從虛而入其脈尚浮宜桂枝加人參湯入參甘溫以甘緩之桂辛熱以辛散之甘緩之

大陽病身熱頭痛脈浮而緊無汗醫發汗過多其人又手自冒心心悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病頭痛身熱惡寒脈浮而緊醫反數下之後又發其汗不當下而不止身疼痛其脈緊而微當救裏宜四逆湯假身不疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病脈浮而弱身挽惡風頭痛項強自汗出而不止榮弱衛強榮弱者汗自出血不能守而讲於外衛不能護是知榮衛不和也欲救邪風宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽經病頭痛項強身熱不能有汗不可下之以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也

桂枝麻黃各半湯

桂枝　芍藥　甘草　麻黃各壹兩　生薑切碎壹兩半　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱挽陰虛則發挽陽浮則惡寒翕翕發挽為肌挽鼻鳴乾嘔者裏和表有病桂枝湯主之

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病如瘧頭痛項強發挽惡寒挽多寒少一日三二度發脈浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

甚當汗而不汗也故其人躁煩者邪氣不在表在四肢在腹中按之不能得經一二次汗解邪氣不除則致病人短氣但坐者虛也故汗出不徹脈浮而遲故知之更發汗則愈大陽中風脈浮而緩令反浮而濇者因小發汗脈濇而緊者身必疼痛當大發汗如尺中弱者不可發汗尺者陰也弱者陰虛也陰主血血虛則尺虛不能作汗故知禁也病當自汗出榮氣和也不解者衛氣不和則脈痺當和榮衛使脈得衛之中榮衛和則脈平榮衛不和則脈痺不仁榮衛俱和則脈平宜桂枝湯

平宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病苦頭痛者必劇乃邪無從出也宜

麻黃湯

麻黃去節壹兩　桂枝　甘草各壹兩　杏仁去皮尖壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病苦頭痛身熱項背強脈浮而大不惡寒反惡風者名曰柔痓宜

麻黃附子甘草湯

麻黃去節壹兩　附子炮去皮臍破壹枚　甘草壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽標病頭痛身熱惡寒惡風脈浮而弱醫反數下之後又發其汗不當下而其脈數者醫又灸之火邪隨經而為煩逆助陽損陰要虛而助實流散脈中焦骨傷筋焦骨為筋髓從腰下重者傳陰分也名曰火逆禁之二也

凡病欲解必先煩燥汗欲出也醫又燒針令汗榮衛不和加燒針則寒邪核起而赤不散盛火之氣發膵脈從少腹上衝心痛皆燒針之過也所禁者三也大陽標病頭痛身熱惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也發汗者宜

桂枝加葛根湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　葛根壹兩半

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病外未除數下之頭痛身熱惡風脈浮而弱醫反數下之後又發其汗不當下而心悸悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

其中辛散其表故宜

桂枝加人參湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚　人參　乾薑各壹兩

此其禁也表證不除脅熱而利邪氣從虛而入其脈尚浮宜桂枝加人參湯入參甘溫以甘緩之桂辛熱以辛散之甘緩之

大陽病身熱頭痛脈浮而緊無汗醫發汗過多其人又手自冒心心悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病頭痛身熱惡寒脈浮而緊醫反數下之後又發其汗不當下而不止身疼痛其脈緊而微當救裏宜四逆湯假身不疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病脈浮而弱身挽惡風頭痛項強自汗出而不止榮弱衛強榮弱者汗自出血不能守而讲於外衛不能護是知榮衛不和也欲救邪風宜桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水煎

大陽經病頭痛項強身熱不能有汗不可下之以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也

桂枝麻黃各半湯

桂枝　芍藥　甘草　麻黃各壹兩　生薑切碎壹兩半　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱挽陰虛則發挽陽浮則惡寒翕翕發挽為肌挽鼻鳴乾嘔者裏和表有病桂枝湯主之

桂枝湯

桂枝　芍藥　甘草　生薑　大棗擘碎壹枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服小便利止後服

大陽病如瘧頭痛項強發挽惡寒挽多寒少一日三二度發脈浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

麻黃升麻湯

太陽尺寸脉俱浮脉從標本桂枝主衛而在表故風則傷衛桂枝主榮而在裏故寒則傷榮榮衛皆周不息者血也無為有形之說血近於經經有始終榮衛皆周不息豈有止也寒邪傷榮脉浮而緊身熱惡寒頭項痛而無汗故太陽病先桂枝次麻黃為為表之實

麻黃湯（風勿半）　桂枝（去皮尖）湯　甘草半兩　杏仁（去皮尖）伍拾枚

右剉如麻豆大每服五錢水煎服取微汗

太陽標病頭痛身熱惡風無汗而喘者宜麻黃湯解表從太陽標病身熱頭痛項背強身疼惡風是裏則傷榮脉浮而緊表實無汗而喘者宜麻黃湯

太陽標病頭痛身熱合陽明標發熱不惡風而反惡熱脉浮而長喘而胃脘不可下當從脉浮而治以麻黃湯解表從太陽標病身熱惡寒脉浮而緊無汗身疼痛表實榮氣不得泄也

太陽病頭痛項背強二十余日不解脉浮而細胃中痛腸鳴下利日數行大陽少陽併病頭痛小柴胡湯如脉浮而不細反緊者宜麻黃湯解表從太陽標病身熱惡寒脉浮而緊無汗身疼痛表實榮氣煩燥必劇宜麻黃湯　當汗不汗則劇也

太陽標病脉浮緊而頭痛已發其汗雖痛不止不可行桂枝自汗而喘邪在上焦而無大熱者未傳入裏也宜麻黃杏子甘草石膏湯治之氣清治太陽頭痛甘緩其中杏仁治上焦之喘非麻黃發汗之治也

麻黃甘草湯（各壹兩）　杏仁（去皮尖）伍拾枚　石膏（四兩）

右㕮咀每服五錢水煎

太陽標病頭痛惡寒脉浮而緊無汗身疼痛八九日不解者表實榮氣不得泄也經發汗微發其汗小除其煩自瞑劇者邪氣痛經上攻頭者諸陽之會必作劇也陽氣重故耳宜麻黃湯

少陰本病脉沉而進身熱頭疼背強自太陽所變也當從少陰治以辛熱宜

麻黃細辛湯（各貳兩）　附子（壹枚炮去皮臍）

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病項背強頭痛太陽從上至足几几而無汗肌緩者屬太陽明惡風在表也脉浮而過於平脉宜葛根湯

太陽經病頭痛項背強几几而熱不惡風目疼鼻乾而渴者陽明也脉浮大而長傳實則嘔宜葛根湯

太陽經與陽明合病頭痛項強身熱不惡風脉浮弦不下利陽明本實但發者少陽也宜葛根加半夏湯

葛根（半兩）　麻黃（去節三分）　甘草（炙）　芍藥　桂枝（各半兩）

大棗（擘破）半夏（湯洗七遍）各貳拾枚

右㕮咀每服五錢水煎日三

太陽經與陽明標為病頭痛項強身熱鼻乾脉浮大而長當為根湯解肌從陽明之治也若無陽明脉證獨有太陽脉浮自

汗惡風桂枝湯主之反下之裏虛利不止脉浮大而長者為根加黃芩黃連湯黃連苦而堅內能止下利黃芩苦寒主表熱裏實是以加之

葛根加黃芩黃連湯

葛根（壹兩）　黃芩（壹分）　甘草（半兩炙）　黃連（壹分）

右㕮咀每服五錢水煎

青龍湯五證方二道

大青龍湯

傷寒六經以太陽為始故背為外腹為內背主表腹主裏太陽行身之後為諸陽之表服寒中人先傷於表故外而之內邪中衛者桂枝中榮者麻黃在肌者為根在筋者青龍去葛根而加石膏使為大青龍無水者不用因水而用之也

麻黃（去節二兩）　桂枝（去皮二兩）　杏仁（去皮尖五十个）　大棗（五枚）

生姜（半兩）　甘草（去皮二兩）　石膏（如半个鵝子大）

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經中風頭痛項強脉浮而緊發熱惡風不解心下有水氣而嘔咳者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

小青龍湯

太陽經病身熱頭痛惡風脉浮而滑表不解心下有水氣而嘔咳者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

麻黃（去節）芍藥　細辛（各壹分）　半夏（洗去滑）乾姜（各壹分）炮

甘草（炙）桂枝（去皮）各半兩　五味子半兩

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風因飲水而飲者亦在於表因飲水而不消形寒飲冷則傷肺故微喘脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病頭痛項強腰脊強脉浮而緊發熱惡風目疼鼻乾而渴者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

麻黃　芍藥　細辛（各壹分）　半夏（洗去滑）乾姜（各壹分）炮

甘草（炙）桂枝（去皮）各半兩　五味子半兩

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風脉浮而滑表不解心下有水氣而嘔咳者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

麻黃　芍藥　細辛（各壹分）　半夏（洗去滑）乾姜（各壹分）炮

甘草（炙）桂枝（去皮）各半兩　五味子半兩

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病身熱頭痛項強脉浮而緊發熱惡寒身不疼但重乍有輕時中風即脉緩宜

大青龍湯

麻黃（去節二兩）　桂枝（去皮二兩）　杏仁（去皮尖五十个）　大棗（五枚）

生姜（半兩）　甘草（去皮二兩）　石膏（如半个鵝子大）

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經中風頭痛項強脉浮而緊發熱惡風不解心下有水氣而嘔咳者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

麻黃　芍藥　細辛（各壹分）　半夏（洗去滑）乾姜（各壹分）炮

甘草（炙）桂枝（去皮）各半兩　五味子半兩

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風因飲水而飲者亦在於表因飲水而不消形寒飲冷則傷肺故微喘脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病頭痛項強腰脊強脉浮而緊發熱惡風目疼鼻乾而渴者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

葛根加黃芩黃連湯

葛根（壹兩）　黃芩（壹分）　甘草（半兩炙）　黃連（壹分）

右㕮咀每服五錢水煎

青龍湯五證方二道

大青龍湯

小青龍湯

傷寒六經以太陽為始故背為外腹為內背主表腹主裏太陽行身之後為諸陽之表服寒中人先傷於表故外而之內邪中衛者桂枝中榮者麻黃在肌者為根在筋者青龍去葛根而加石膏使為大青龍無水者不用因水而用之也

麻黃（去節二兩）　桂枝（去皮二兩）　杏仁（去皮尖五十个）　大棗（五枚）

生姜（半兩）　甘草（去皮二兩）　石膏（如半个鵝子大）

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經中風頭痛項強脉浮而緊發熱惡風不解心下有水氣而嘔咳者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

麻黃　芍藥　細辛（各壹分）　半夏（洗去滑）乾姜（各壹分）炮

甘草（炙）桂枝（去皮）各半兩　五味子半兩

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風因飲水而飲者亦在於表因飲水而不消形寒飲冷則傷肺故微喘脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病頭痛項強腰脊強脉浮而緊發熱惡風目疼鼻乾而渴者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味子酸收而止渴故宜

麻黃　芍藥　細辛（各壹分）　半夏（洗去滑）乾姜（各壹分）炮

甘草（炙）桂枝（去皮）各半兩　五味子半兩

右㕮咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病身熱頭痛項強脉浮而緊發熱惡寒身不疼但重乍有輕時中風即脉緩宜

大青龍湯

足交膕中故肾中痛絡耳則耳聾循脇則脇痛風熱交於目
統皆尺寸俱弦從膽經論寫木脉從其本也足少陽本陰行身
之側從標陽水之子故發熱從本陰木之母故悪寒前有陽
明後有太陽木居於中故往來寒熱治必陽有三禁不可汗
不可下不可利小便表解者有高下有淺深皆各不同自桂
枝至青龍表解盡也已下有太陽柴胡證與少陽標與經相
併所致也三陽自少陽而傳陰陰權邪而嘔傳陽則寒熱交
爭少陽者為病內不得入外不得出半陰半陽非專辛甘酸
苦之藥柴胡黄芩味苦寒而從陰半夏生姜味辛熱而從陽
人參甘草大棗味甘和而從中欲使風木從乎中也主春分
之氣也其次有大柴胡從陰者三分之一從陽者一與承氣
相近為表之裏藥也生姜半夏大棗之辛甘發散為陽裏者

大黄和芒硝藥黄芩柴胡酸苦涌泄為陰多陰而少陽
名大柴胡湯陰陽各半故名小柴胡湯

小柴胡湯　柴胡貳兩　黄芩參分　半夏四分　大棗擘二枝　甘草大分　人參參分　生姜五分

右�once咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛項強脊熱過經者六經傳變至十余日先汗
而表解後下之後柴胡證仍在大便結而煩喘脉數者宜
浮宜麻黄湯

太陽經病五六日頭痛項強腰痛脉弦而浮往來寒熱休作有時
少陽也喜嘔者欲傳於裏也宜小柴胡湯
血弱氣盡腠理開邪氣因入與氣分爭往來寒熱非桂枝證而
宜小柴胡湯主之

太陽經病頭痛脊強身熱過經者六經傳變至十余日先汗
而表解後下之後柴胡證仍在大便結而煩喘脉數者宜
浮而細者表已和也設胃滿者少陽經病宜小柴胡湯
浮宜麻黄湯

太陽經病五六日頭痛項強腰痛脉弦而浮往來寒熱休作有時
少陽也喜嘔者欲傳於裏也宜小柴胡湯
血弱氣盡腠理開邪氣因入與氣分爭往來寒熱宜大柴胡湯

大柴胡湯　柴胡肆兩　黄芩　芍藥各壹兩半　枳實半兩　大黄半兩

右�once咀每服五錢生姜四片棗一枚同煎以利為度

太陽經病頭痛項強身熱悪寒脉浮而緊已發其汗而小差過
經十三日不解胃脇滿而嘔者少陽經病也日晡發潮熱者
陽明經病也必大便硬宜大柴胡湯

大柴胡湯　柴胡肆兩　黄芩參分　人參　甘草各半兩　芍藥參分　生姜　半夏壹分　大棗參枚

右�once咀每服伍錢水煎去滓入硝再煎三沸溫服

太陽傷寒五六日中風不解往來寒熱非桂枝證而
太陽傷寒頭痛項強五六日中風不解往來寒熱脉弦而長大便溏陽明
陽明經病潮熱鼻乾自汗出不解心下痞悪吐下利者宜大柴胡湯

少陽經病胃脇苦痛嘿嘿不欲食者傳裏也心煩喜嘔者胃
虚也或胸中煩者邪在上焦也不嘔者胃實也或渴者裏熱
也或腹中痛者裏實也或心下痞硬者少陽結也或心下悸
動者裏熱也或不渴者裏和也或微熱欬者氣逆也宜小柴
胡湯加減用之

太陽經病六七日脉遲陰也浮弱者陽虚也虚則悪風寒手足
温者表病也醫二三下之裏虚不能實而脇滿痛陽則寒熱交
日及身黄者濕熱也項強者太陽經病也小便難者傳表也當隨證加減而治脉浮而弦者宜小柴
胡湯

承氣湯二十七證方三道

大承氣湯　小承氣湯　調胃承氣湯

凡治傷寒須明標本經絡始終陰陽脉變濟濟浮沉發表攻裏
淺深皮膚腠理肌肉筋骨高下不
撰本逆從邪氣所感而有淺深者桂枝次者麻黄次附子細辛此
同源症攻實治皆各異淺者桂
淺深之次也表之裏者小柴胡
證雖作一剂　加黄芩耳
太陽經病傷寒陽脉滿陰也陰脉弦弦者陰
陰脉也病當腹中痛先与小建中湯止裏表不和者与小柴
胡湯和之

太陽傷寒頭痛項強胃脇痛痛者足太陽經病脉當浮弦日晡潮熱者陽明本也當大柴胡
堅大黄味苦寒能泄實除痛燥實四證全則可用故曰大承
氣湯

小承氣湯　大黄酒浸　厚朴炙姜　芒硝各半兩

右�once咀每服五錢水二盞先煮厚朴枳實至一盞後入大黄
取六分去滓入芒硝煎一二沸於溫服以利為度未利再服

大承氣湯　大黄酒浸　厚朴炙姜　枳實各半兩　芒硝壹兩

右�once咀煎服同前　若微滿者加用枳實

調胃承氣湯　加當歸為發表散治時氣　大黄酒浸　甘草炙　芒硝各半兩

右�once咀煎服同前　加牛膝為引導散治時氣

太陽經病五六日頭汗出者陽動於上微悪寒者
足逆冷者傳於內也心下滿大便難不欲食脉細者陽氣結
也非少陰也宜小柴胡湯二陰無頭汗故非也
太陽經傷寒汗出不解心下痞悪吐下利者宜大柴胡湯
陽明經病潮熱鼻乾自汗小便數者傳陽明也微
逆者外熱而裏寒也作甘草乾姜湯與之汗止藥衛內守更

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得臥者
作甘草乾薑湯與之其脚即伸若胃中氣不和
者先與調胃承氣湯和之後十三日不解胃中
必燥煩實大便難是也

下之動數參差邪热乘入結於胃故腦內拒痛也胃中空虛下之早故也短氣煩躁热結於內也心中懊憹者煩而不安也陽氣內陷心中結痛而硬手不可近宜大陷胸湯

太陽經病下之太早而為結胸頭汗出余處無汗者陽往上奔也到頸而還者热結於上也小便不利者太陽本病也故身必發黃宜大陷胸湯

太陽病脈寒頭痛身热雖不徹腎為六日而下之傳為結胸邪热拒腦而痛脈沉而緊當心下痛按之石硬者結之甚也宜大陷胸湯

但做手出者無大热者此為水結在胸脇間痛宜大陷胸湯

太陽經病未解反下之飲冷水結於胸中非陽也為寒實結胸故無热證宜三物小陷胸湯

瀉心湯九證方五道　又十藥陽一方

凡三陰三陽之標本治各不同而發於陽者下之浮數動滑發於陰者下之為病氣謂沉滑弱弦下之為病皆不同有用寒藥而為热病黃連大黃之類也有用寒热藥者陰盛陽不和而病大黃黃連加附子之類有用寒热藥者陰盛陽虛而病半夏瀉心湯生姜瀉心湯之類瀉心湯者非瀉心火之热之病也通而論之其藥陽多陰少蓋病發於陰而得之有大黃黃連瀉心湯獨為陰心下病而脈狀一證挂枝後用從太陽浮弱所變余者皆陰陽雜用

大黃黃連瀉心湯

大黃　黃連各貳兩　甘草壹兩

右剉如麻豆大拂湯一盞熱漬之一時久絞出浮數動分一服

附子瀉心湯

大黃　黃連　黃芩各壹兩　附子炮去皮臍煎分用

右剉如麻豆大拂湯二大盞熱漬之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯

半夏洗焙乾秤兩　黃芩

甘草炙　大棗擘　乾薑炮各壹兩半

右剉如麻豆大每服五錢水二盞棗至八分去滓溫服

甘草瀉心湯

甘草炙兩半　黃芩　乾薑炮各半兩

人參

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

生薑瀉心湯

生薑壹兩　黃芩炙壹兩半　人參壹兩半　乾薑炮半兩

半夏瀉心湯　黃連半兩　大棗擘

右剉如麻豆大每服五錢水煎

太陽經病頭痛惡寒六七日嘔而發热宜柴胡湯服藥發汗而發热汗出不解者表解心下有痛者為結胸於內也知痛而不痛為痞發於陰而得宜半夏瀉心湯柴胡後變心下痞按之軟者脈疾者宜大黃黃連瀉心湯心下痞而惡寒汗出脈沉者附子瀉心湯發於陰陽而得心下痞瀉心湯不解者氣不降也與五苓散非太陰不用瀉心湯太陰主痞痛也

傷寒汗後胃中不和心下痞不發热而身涼宜生薑瀉心湯

太陽中風反下之心下痞醫反覆下之痞益甚脈浮而緊者下之則愈宜甘草瀉心湯

太陽經病頭痛惡寒此太陽傷寒反下之後復發其汗不解心下痞而惡寒脈浮者不可攻痞表未解也當先解表宜桂枝湯惡寒脈浮已解表和也可攻痞宜大黃黃連瀉心湯

太陽經病頭痛發熱太陽也嘔者少陽也脈浮而緊浮為風緊為寒風寒相搏也以他藥下之柴胡證仍在未解也復與柴胡湯雖下後不為逆

大黃黃連瀉心湯

大黃　黃連各貳兩　甘草壹兩

右剉如麻豆大拂湯一盞熱漬之一時久絞出浮數動分一服

附子瀉心湯

大黃　黃連　黃芩各壹兩　附子炮去皮臍煎分用

右剉如麻豆大拂湯二大盞熱漬之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯

半夏洗焙乾秤兩　黃芩

甘草炙　大棗擘　乾薑炮各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水二盞棗至八分去滓溫服

甘草瀉心湯

甘草炙兩半　黃芩　乾薑炮各半兩

人參

右剉如麻豆大每服五錢水煎

生薑瀉心湯

生薑壹兩　黃芩炙壹兩半　人參壹兩半　乾薑炮半兩

入邪在太陽或小便自利反利其小便使邪氣行皆從於內故有桃仁承氣湯抵當丸抵當湯二藥之變大陽標與陽明變抵當丸太陽標本變抵當湯陽明標與少陽陽明變抵當丸太陽標本變亦有抵當湯此血證傳變之法也水蛭味鹹苦寒鹹能勝血苦則入心盲虫味苦寒能泄實而去熱故破蓄血桃仁味苦甘能破血大黃味苦寒能泄實而去熱故有少陽之輕治抵當丸水蛭盲虫各倍大黃二倍桃仁亦多於方故有大陽之重治抵當湯桂枝甘草為表藥大黃芒硝為裏藥桃仁散血故從太陽陽明之實治也抵當丸

抵當丸

水蛭　盲虫各五十個　桃仁二十個　大黃五分

右為細末只一丸以水一大盞煮一丸至七分頓服醉時當下血愈不下更服

抵當湯

水蛭　盲虫各二十個　桃仁二十個　大黃乙兩　桂枝　甘草　芒硝各半兩

右剉如麻豆大以水二盞煎至八分去滓下硝煎化溫服未利再服

水蛭　盲虫

水蛭　盲虫各二十個　大黃乙兩　桃仁二十個

右剉如麻豆大作一服以水二盞煎至八分去滓溫服

太陽經病頭痛身熱不解小便利而赤者熱在膀胱也大便狀如豚肝者有血也其人如狂者抵結膀胱也宜桃仁承氣湯

太陽經病頭痛身熱未解也反小便赤而利脈沉數者邪氣下入膀胱當血於內其人發狂者抵在下焦少腹滿痛下血則愈宜抵當湯

太陽經病頭痛身熱法當汗解反利小便抵熱於內則身黃脈沉沉為裏少腹硬小便自利其人如狂者下焦有血血證諦

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

猪苓去皮　白朮　茯苓　澤瀉　桂枝去皮各等分

太陽經病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

猪苓去皮　白朮　茯苓　澤瀉　桂枝去皮各等分

太陽

一證從太陽傳變而來也

少陰本病論

少陰脉尺寸俱沉標本俱陰其經絡於足心循腹上行繫舌本貫腎絡肺故口燥舌乾而渴為經病也身寒自汗四肢挛小便清腹滿惡寒脉沉而微此少陰本病也當溫之宜附子輩治少陰乃以熱治寒皆少陰本藥也

乾薑附子湯　乾薑（炮）附子（去皮臍炮）各等分

右㕮咀每服五錢水煎

大陽病傷寒頭痛強項發其汗反下之清穀不止表裏俱虛身疼痛者表寒也急當救裏裏者先治其本宜四逆湯本也裏和外身疼痛後治其表宜桂枝湯

桂枝湯　甘草（炙）芍藥各等分　附子（半生半炮去皮臍）　乾薑各等分　桂枝（去皮）各等分

右㕮如麻豆大水二盞煎至七分去滓溫服

大陽經證表感風溫之氣相搏骨節煩痛者溫氣也湯不利故疼劇而不能屈伸者風也汗出身寒脉沉微便清而不利者寒閉也無風者表虛也或微腫者陽氣不行也宜甘草附子湯

甘草附子湯　甘草（炙）二兩　附子（生用去皮臍）　桂枝（去皮）各等分

右㕮如麻豆大水二盞煎至七分去滓溫服

大陽病傷寒頭痛強項發其汗反下之清穀不止表裏俱虛身疼痛者表寒也急當救裏裏者先治其本宜四逆湯本也裏和外身疼痛後治其表宜桂枝湯

桂枝湯　甘草（炙）二兩　附子（生用去皮臍）　乾薑各等分　桂枝（去皮）各等分

右㕮如麻豆大水二盞煎至七分去滓溫服

大陽經證表感風溫之氣相搏骨節煩痛者溫氣也湯不利故疼劇而不能屈伸者風也汗出身寒脉沉微便清而不利者寒閉也無風者表虛也或微腫者陽氣不行也宜甘草附子湯

甘草附子湯　甘草（炙）二兩　附子（生用去皮臍）　桂枝（去皮）各等分

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服汗出即解

陽明令病身熱鼻乾脉浮而遲遲則為寒表熱而裏寒清穀下利宜四逆湯

四逆湯　甘草（炙）二兩　附子（生用去皮臍）　乾薑各等分

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服

大陰病腹痛脉浮者大陽也故宜桂枝湯自利不渴者裏屬大陰脾本藏寒也脉沉而細當溫之宜四逆輩

少陰病足腫寒躭重痛手足冷而逆骨節疼脉沉者本病也宜附子湯

附子湯　附子（炮）一個　茯苓　人參各一兩　白朮（炒）兩半　芍藥

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服日三

少陰本病身寒脉沉遲口中和背惡寒四肢冷小便清者宜附子湯

少陰病足腫寒如泄小便清吐逆者裏寒也寒多不下食手足逆冷表寒也煩燥欲死者陽虛也宜四逆湯

異病重三兩半　人參七分半　生薑半兩　大棗三枚

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足逆冷脉微欲絕或利止脉不出宜通脉四逆湯

通脉四逆湯　甘草（炙）二兩　附子（大者一個炮）　乾薑三兩炮

右㕮如麻豆大每服五錢水煎服未差再服

面赤者加連蔥白五莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

脉不出者去桔梗加人參二兩

少陰病足脛寒腫四肢冷其人或咳者肺寒也乾嘔者胃虛也病人躁無暫安者此為藏厥非蚘厥也宜四逆湯

小便清而不利者寒閉也腹中痛者腎病也宜四逆湯

在下焦也故曰宜四逆湯

少陰病足脛寒食入則吐裏寒也心中溫溫欲吐者胃虛不能吐者肝氣也始得之手足寒脉弦而遲者腎肝也胃中實不可下陰氣在上也當吐脯上寒飲欲嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯

諸變證方一十四道

厥陰病手足厥冷自汗小便清而利脉細欲絕者厥陰也宜當歸四逆湯

當歸四逆湯　當歸　桂枝　各等分　甘草　通草各半分　細辛各一兩

右㕮如麻豆大每服五錢水二盞棗一枚煎至八分去滓溫服

厥陰病四肢拘急大汗出熱不去者虛陽之氣也內拘急痛下利氣逆於上無寒厥逆脉細而微者宜四逆湯

厥陰病四肢拘急大汗出而下利者表裏俱寒者也其脉細而絕者陽氣衰也宜通脉四逆湯

厥陰病傷寒厥陰本自寒下醫復吐下之胃中虛寒故食入吐法當胃中痛當補胃宜先與小建中湯不差與小柴胡湯

大陽傷寒嘔者表服下藥利不止心下痞者脾胃虛也當與理中丸和之利差嘔者邪在下焦也宜四逆湯加人參湯

四逆湯加人參湯　乾薑　附子　甘草　各等分　人參半兩

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服

厥陰病四肢拘急下利清穀裏寒外熱也汗出而厥者表虛也脉細而絕者陽氣衰也宜通脉四逆湯

通脉四逆湯　甘草　乾薑　附子　各等分　葱白三莖

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服

厥陰病四肢拘急下利清穀裏寒外熱汗出而厥者表虛也脉細而絕者陽氣衰也宜通脉四逆湯

通脉四逆湯　甘草　乾薑　附子　各等分　葱白三莖

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服

厥陰病四肢拘急而嘔脉弱宜除病也小便復利者裏虛也身微熱見厥者不相應也故為難治宜四逆湯

厥陰病四肢厥逆脉細而微內傷寒邪胃中無食而蚘厥時靜時煩為之藏寒蚘上入膈時時煩也得食而吐蚘者聞食氣而上出也宜烏梅丸

烏梅丸　烏梅（取肉）二十個　細辛　桂枝（去皮）　人參　黃柏　當歸　附子（炮）　蜀椒（出汗）各一兩半　黃連四兩　乾薑十兩　大棗（去核）一百個

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內臼中與蜜同杵二千下丸如梧子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物等

厥陰病七八日膚冷者表寒也病人躁無暫安者此為藏厥非蚘厥也宜四逆湯

蚘厥也藏厥者藏寒也宜烏梅丸

其人常自吐蚘者亦蚘厥也宜烏梅丸

厥陰病四肢厥冷脉乍緊心下滿而煩者寒實在胃而煩也宜吐之以瓜蒂散

瓜蒂散　瓜蒂（熬黃）二十個　赤小豆（末）一錢匕

右搗篩已合治之取一錢匕豉一合湯七分令先煮之須臾煮取作稀糜去滓取汁和散頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

厥陰病四肢拘急心下悸寒有水宜先治水以茯苓甘草湯

茯苓甘草湯　茯苓　生薑各等分　甘草　桂枝　各半分

右㕮如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

厥陰病四肢拘急內傷寒物下利日十余行脉反實者脉病不相應也故死下利欲飲水者有熱故也脉當實宜白頭翁湯

白頭翁湯　白頭翁　半兩　黃檗　秦皮　黃連各等分

右㕮如麻豆大每服五錢水二盞煎服不差再服

傷寒陽脉滿陰脉弦大滿者陰也陰脉弦者肝脉也不能生土法當腹中痛當補脾宜先與小建中湯不差與小柴胡湯

大陽傷寒嘔者表服下藥利不止心下痞者脾胃虛也當與理中丸和之利差嘔者邪在下焦也宜四逆加人參湯

四逆加人參湯　乾薑　附子　甘草　各等分　人參半兩

右㕮如麻豆大每服五錢水煎溫服

服藥後利不止者邪在太陽之本故當利小便却與禹餘糧湯

湯前食

理中丸　人參　乾薑　甘草　白朮　各等分

右為細末煉蜜為丸如鷄黃大以湯數合和九碎研温服日三服中未熱益至二四丸煎熱粥飲之

太陽中風自汗出鼻鳴反發其汗必恍惚心乱以虚而反又一虚之則心神虚而恍惚小便已陰疼氣虚也宜再餘根湯

太陽傷寒頭痛當以桂枝發其汗而解醫反以火迫劫之而亡陽必驚狂起臥不安者火邪內攻也宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝　生姜　蜀漆各當兩半　甘草壹兩　牡蠣或兩半　龍骨或兩半　大棗擘破

右剉細每服五錢水煎温服

病和桂枝証頭痛項不強身熱自汗當與桂枝湯服藥後其解寸脉浮者中痞故寸為上部者膈上病也氣上衝不得息者邪結在上也此為胸中有寒宜吐之以瓜蒂散

太陽經病欲傳少陽必自利傳裏也宜茯苓湯

若嘔者少陽也宜茯苓加半夏生姜湯

茯苓湯

黄芩　茯苓各半　甘草炙各半　桂枝　生姜各當兩　大棗擘破

右剉細每服五錢水煎温服

太陽經病寒傳裏者中有熱胃有邪氣傳陽明本也腹中痛欲嘔者熱在內也宜黄連湯

甘草　黄連　乾姜　人參各等分　大棗擘破

右剉細每服五錢水煎服

傷寒發表攻裏後又吐下之表解後心下痞硬噫氣不除寒熱不交則氣噫而不除宜旋覆代赭湯

旋覆花洗去土半　人參半兩　生姜乙兩　代赭燒赤半兩　甘草炙半兩　半夏湯洗七次半兩　大棗擘破

右剉細分三服水煎温服

諸雜證方十二道

傷寒少陰經絡於肺繫舌本邪在胃結咳咽喉中痛而不利或為失音白通豬膽汁甘桔苦酒之類皆少陰之經藥也非少陰本藏之藥也脉虚浮弱是以膈上至頭之有疾雖在上部之法亦少陰也

傷寒病在裏當下脉仁九實導煎土瓜根豬膚湯之類非熱氣在胃而實解的中燥而結跌陽脉浮而滑脉沉而無力下之而弱雖當下之不可便用承氣何也內陰結故也下之則損胃傷陽故當閉而通之勿令損氣察脉之虚實勿令誤也

傷寒六經發表攻裏標本論後各有其法少陰之標本病也當温之以附子四逆湯單向太陽麻黄桂枝之法如桃花湯禹餘粮湯龍骨牡蠣救逆湯單重泄之藥旋覆代赭乃輕重之藥同太陽大柴胡承氣輕重緩急重者

陽明經病自汗出譬又發其汗小便當不利今反自利津液內竭也雖大便硬乾燥不可攻之宜蜜煎導

豬膽汁皆可為導

蜜煎導　蜜四兩

右一味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦捻作銳子如指長二寸當熱時急作令頭銳內穀道中欲大便去之

大猪膽去脂瀉汗和法醋少許以濃穀道中如一食頃當大便

大陽經病反小便不利者熱結膀胱也大便雖難而小便數者有微熱也宜大承氣湯下後食穀欲嘔者胃氣虚也宜服

吳茱萸湯

吳茱萸湯洗七次半　人參三兩　生姜切六兩

右剉細每服五錢水煎温服日三

陽明脉浮而滑小便數陽者胃脉也是以上衝陽者也脉當浮緩今反多浮滑者雖小便數大便硬非流數不可下浮滑者有邪氣傳陽明本也腹中痛欲嘔者陽明胃虚也宜

脾約丸

麻仁半升　芍藥　枳實　大黄各一兩　厚朴一尺　杏仁一百枚

右為末煉蜜和丸如梧子大飲服十丸漸加以知為度

大陽病三日已去陽明本病也脉浮而緊者為寒也心下滿而硬痛者為實也當下之宜大陷胸湯

大陷胸湯

大黄六兩去皮　芒硝一升　甘遂一錢匕

右以水六升先煮大黄取三升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末温服一升得快利止後勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者少陰本受病也宜桃花湯

赤石脂一斤一半細末一半熬　乾姜一兩　粳米一合半

右以水七升煮米熟去滓內赤石脂末方寸匕温服

大陽病發熱而渴不惡寒者為之痓温氣感而發也

大陽病發熱無汗惡寒者表實也頭項強而脉浮緊背反張名剛痓宜麻黄湯發汗

麻黄湯

麻黄三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙　杏仁七十箇去皮尖

右剉細每服五錢水二盞煮至一盞二分去滓温服

大陽病發熱汗出惡寒者表虚也項背強而脉浮緩名柔痓宜桂枝加瓜蔞根湯

桂枝湯　方在前解肌中

瓜蔞根　方在前解肌中

大陽病發熱而渴不惡寒者為之痓温氣感而重者為濕痓風濕相搏一身盡痛法當汗出而解若重發汗復加燒針因致風火相搏名為逆也

大陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔痓

大陽病發熱脉洪大而渴名曰剛痓

大陽病發熱脉浮緊無汗而喘者名曰剛痓宜麻黄加朮湯發汗

麻黄加朮湯

麻黄三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙　白朮二兩　杏仁七十箇去皮尖

右剉細每服五錢水二盞煮至一盞二分去滓温服日三

大陽病發熱而喘無汗惡寒者表實也脉反沉細者附大陰也沉為尸　細

若必服桂枝加芍藥防風湯方在下雜知中
太陽經與陽病同發汗過多榮氣內虛不能榮於筋風氣變動故口噤因汗多而傳陽明也陽明經使口噤脣青及發者大陽病身之後為所生病宜去風養血防風當歸散方在前冊雜知中傳寒汗後不解卞靜卞燥目直視口噤往來寒熱脈弦者大陽風痙也宜小柴胡加防風湯方在下雜知中

濕病

太陽經與陽有濕乘衛俱病也閉節煩疼而小便不利脈沉細者濕氣在內也屬太陰故小便不利大便反快宜勝濕利小便五苓散豬苓湯
大陽陽病一身盡痛者表也身如薰黃者陽明脾胃相傳之變也宜陳蒿湯
濕家病者太陰也頭汗出背強欲得被向火者本陰也勿下之下之早則為痞氣乃胃冷則為痞胃滿小便不利舌上白胎者陰陽反作也寒反在上則舌上白胎熱反在下則小便不利故曰丹田有熱胸中有寒渴欲飲水者丹田有熱也得而不能飲者胸中之寒也故不治為關格病也
濕家下後陰陽和頭上無汗上焦和也小便利者下焦治也故生如下後小便不利頭上汗出不止微喘陰陽相離故死也
太陽表病風濕相搏榮衛俱病一身盡疼表氣不和當汗而解之風濕在天陰雨不止濕氣不除後微發其汗風濕皆去也宜天雄散方在前雜知中
天雄　桂枝　葛根各去皮一兩　甘草半兩　杏仁二十五枚去皮尖
右㕮咀每服五錢或一兩水三盞煎至七分去滓溫服
濕家一身盡疼發熱面黃而喘頭重鼻塞而煩其脈沉食飯中和無病病在頭中寒濕故鼻塞而煩內藥鼻中則愈

暍病

大陽中熱者暍是也汗出惡寒者在表也身熱而渴者在上焦也宜白虎加人參湯頓服之
大陽中暍者身熱而煩汗欲出反飲冷水嗜之汗不能出水行皮中而解微腸表有水也當發其汗宜升麻葛根湯方在前雜知中
升麻　葛根　芍藥　甘草各一兩
右㕮細每服一兩水三盞煎服
大陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已洒浙毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚何也為脈弦細芤遲此　禁也齒乾者牙乃骨之精今燥者骨熱也針經不能治齒乾

治當炙大杼穴

論傷寒霍亂并治

夫傷寒霍亂者其本於陽明胃經也胃者水穀之海主禀四時皆以胃氣為本與脾藏為表裏皆主中焦之氣痛熱水穀入胃相通濕熱相合中焦氣滯或因寒飲或因飲水毒或感濕熱冷熱不調水火相干陰陽相搏上下相離榮衛不能相維故轉筋攣痛經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也有從標而得之者有從本而得之者有從標本而得之者六經之變治各不同察其色脈知犯何道隨經標本各施其治此治霍亂之法也

傷寒吐瀉轉筋身熱足陽明本病也宜和中平胃散建中湯或四君子湯方在下雜知中

脈浮自汗者四君子加桂五錢主之
脈浮無汗者四君子加麻黃五錢主之
傷寒吐瀉轉筋腹痛脈弦者木剋土也故痛甚平胃散加木瓜五錢亦可治宜建中加柴胡木瓜湯方在下雜知中
傷寒吐瀉後大小便不通胃中實痛者四君子加大黃一兩主之
傷寒吐瀉轉筋腹中痛脈實脈沉而細者宜四君子加芍藥高良薑湯方在前雜知中
傷寒吐瀉四肢拘急脈沉而遲此少陰霍亂也宜四君子加附子當歸湯方在前雜知中
厥陰霍亂必四肢厥冷脈微緩宜建中加附子當歸湯方在前雜知中

雲岐子保命集論類要卷下　濟生拔粹方卷第十三

勞傷并治

大病差後真氣未全強行勞事勞損督任二經故少腹裏急或引陰中急痛拘急熱氣上衝胃脘重不能舉目中生花脛拘牽兩足踡脈督任四經病可易取男子婦人視燒之名燒視散方在前陰證略例內
大病差後勞後身熱而煩脈微數無汗下證者於實梔子湯主之有表則汗之　有裏則下之
大病差後正氣尚虛不能施化水穀為榮氣故臍下有腫當利其水行其氣宜牡蠣澤瀉散
大病新愈喜唾不休正氣尚虛胃中寒腎主液自入為唾宜理中丸
大病新差又虛瘦少氣欲吐正氣不復也宜竹葉石膏湯
大病已解因食後微煩者正氣不能勝穀氣也穀氣與正氣相搏故日暮而煩減食則愈　若勞乎氣無力與精神者微擊之若勞乎血與筋骨以四物之類補之若勞在脾為中州也調中可矣

諸證辨

水證

凡病表裏俱寒而口乾引飲水氣在內傷除內有水者小青龍湯主之
表證外除裏有水氣不散者十棗湯主之

渴飲水證

與桂枝麻黃發汗之後脈洪大而渴者有三下中下有熱分三藥所主而治之肺熱於上雀渴而飲水故上焦之渴白虎湯也　熱在中焦胃熱飲水小便不利故中焦之渴豬苓湯也
熱在下焦膀胱有熱而消小便不利五苓散也

陽厥陰厥證

凡厥者厥陰也或脈見與不見併之陽明本胃中實口乾而渴欲飲水為熱厥其人狂言妄語如見鬼狀雖熱不見脈伏於內也故厥深熱亦深厥微熱亦微併於大陰少陰之中大便自利躁煩悶人聲雖有狂言口乾而不渴此寒厥也雖脈沉者為沉數也非沉遲也沉遲為陰也

小便不利證

凡病小便不利者大陽之本也所併既異治法亦不同併之陽明之本不利者下之則利不必五苓也

右剉細每服七錢生薑同煎
傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者（人參散）
人參　梔子　甘草　白鮮皮各半兩
右剉細每服五錢水煎服
傷寒汗下後熱不除而渴者（人參散）（已見）
大黃一兩　桃仁十二個去皮尖　木香五分　檳榔五分　訶子皮五分
右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十丸溫水下
傷寒汗下後大小便自利腹中痛者（調胃丸）
附子一個炮　龍骨半兩　乾薑一兩　吳茱萸半兩　米殼半兩
阿膠炒勃皮半兩
右為細末酒糊為丸如梧子大每服三十丸溫水下利止勿服
傷寒汗下後喘咳不止恐傳肺痿（調胃散）
人參一兩　五味子炒　桑白皮炒　款冬花　蛤蚧一對
右為細末每服五錢沸湯一盞調服
傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音斯敗者（阿膠散）
阿膠一兩炒　人參一兩　五味子一兩　麥門冬一兩去心
薯蕷一兩　乾薑二分炮　桂枝三分去皮　杏仁三分去皮尖
白朮一兩
右剉細每服五錢水煎服
傷寒汗下後飲食不入而逆氣者（調胃理中丸）
木香　木通　檳榔　獨活各一兩　丹參七分
仲景有方陳文治下。
傷寒汗下後氣逆利不止者寒也（枳實甘草湯）
芍藥半兩　甘草半兩炙　枳殼麩炒半兩　乾薑兩半
右剉細每服五錢水煎服
傷寒噫氣者胃氣使然若曰胃中氣不交故也少陰經至胃中
交於厥陰水火之相傳而有聲故噫氣也（加減枳實甘草湯）
甘草　桔梗　枳實炒一味各五分
右剉細每服五錢入五味子半錢水煎
傷寒氣逆而其無汗下證（調胃四逆湯）
甘草　桔梗　吳茱萸炒五分

右剉細每服五錢入五味子半錢同煎
傷寒汗下後喘而噫氣者（人參散）（已見）
甘草　桔梗　人參　藿香各五分
右剉細每服五錢水煎服
傷寒汗下後熱不除而渴者（人參散）（已見）
大黃一兩　桃仁十二個去皮尖　木香五分　檳榔五分　訶子皮五分
右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十丸溫水下
傷寒汗下後大小便自利腹中痛者（調胃丸）
附子一個炮　龍骨半兩　乾薑一兩　吳茱萸半兩　米殼半兩
阿膠炒勃皮半兩
右為細末酒糊為丸如梧子大每服三十丸溫水下利止勿服
傷寒汗下後喘咳不止恐傳肺痿（調胃散）
人參一兩　五味子炒　桑白皮一兩　款冬花　蛤蚧一對
右為細末每服五錢沸湯一盞調服
傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音斯敗者（阿膠散）
阿膠一兩炒　人參一兩　五味子一兩　麥門冬一兩去心
薯蕷一兩　乾薑二分炮　桂枝三分去皮　杏仁三分去皮尖
白朮一兩
右剉細每服五錢水煎服
傷寒汗下後飲食不入而逆氣者胃氣虛故也（我實理中丸）
仲景有方陳文治下。
傷寒汗下後氣逆利不止者寒也（枳實甘草湯）
芍藥半兩　甘草半兩炙　枳殼麩炒半兩　乾薑兩半
右剉細每服五錢水煎服
傷寒噫氣者胃氣使然若曰胃中氣不交故也少陰經至胃中
交於厥陰水火之相傳而有聲故噫氣也（加減枳實甘草湯）
甘草　桔梗　枳實炒一味各五分
右剉細每服五錢入五味子半錢水煎
傷寒氣逆而其無汗下證（調胃四逆湯）
甘草　桔梗　吳茱萸炒五分

右剉細每服一兩水三盞煎服
婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱在躁書夜如
見鬼狀經水適斷熱入血室大要論者桃仁承氣湯主之又
實滿者宜（柴胡細辛湯）
柴胡二兩　黃芩半兩　人參二兩半　夏製六分
甘草半兩　生薑半兩　牡丹皮二兩
右剉細每服一兩生薑同煎
婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水過多
無論實者（柴胡桂枝湯）
甘草　芍藥　生地黃　川芎各一兩　桂枝半兩　人參各五分
右剉細每服一兩水三盞煎至一盞半去滓入桂枘灸五錢
調勻溫服不止者刺隱白
婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標與少陰
本病經水適斷（桂枝加附子湯）
桂枝三兩　芍藥　生薑各一兩半　甘草炙一兩　附子炮
紅花各五分
右剉細每服一兩水三盞煎服
婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉而
不行心下結硬口燥舌乾實熱往來往言如見鬼狀脈沉而
數當下之宜（柴胡加芒硝大黃湯）
柴胡二兩　黃芩半兩　半夏製一兩　芒硝七分　大棗三枚　生薑半兩
大黃七分　甘草半兩
右剉細每服一兩生薑同煎去滓下硝再沸溫服若脈不沉
即不可下
婦人有孕傷寒二十證方二十道
婦人傷寒脈浮頭腫自利腹中切痛宜（桂枝加芍藥當歸湯）
桂枝　芍藥　當歸各一兩
右剉細每服一兩水煎
婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者大陰也宜芍藥湯
芍藥　白朮各一兩　甘草　茯苓各半兩　黃芪一兩
右如前修服
產後二證
產後往來寒熱而脈弦者少陽也（柴胡加生地黃湯）
柴胡二兩　黃芩半兩　人參五分　半夏製一兩五分　甘草半兩
大棗三枚　生地黃　梔子　枳殼麩炒各五分
右如前修服

產後虛煩不得眠參棗湯主之

芍藥　當歸　梔子各五分　香豉半合

右如前修服產後傷寒便同下後安證

妊娠諸證合用四物等湯方俱在婦科下元戎方中

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後虛損食飲不下加建中人參白朮茯苓諸虛不足飲食不

進加建中湯

產後血痢腹疼痛四物內加棉花黃連御米殼等分

產後血崩如豆汁溲黑過多者加蒲黃生地黃汁阿膠酌根艾

白芷荊腎腹疼痛大便自利經事頻併加白芍藥

治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎　當歸各等分

右為麤末每秤三錢水煎食前服

治婦人胎漏下血或因事下血

牡丹皮　川大黃炒各一兩　赤茯苓　桃仁　當歸　桂心　赤芍藥　白朮各半兩　石韋去毛　木香各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片至七分去滓空心溫服

治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

五靈脂二兩半一半生一半炒

右為細末每服一錢溫熱水調下口噤者斡開灌之

若血崩不止用炒熟者加當歸酒同煎或水酒童便各半盞

同煎　又方水煎為胥加神麯末和丸桐子大空心溫酒下

調經門

黃芩丸　治女人月經淡閉月候不來統腰痛及產後血氣不調

乾漆炒煙出　艾葉炒令斷煙出　青白各一兩　牛膝去苗酒洗焙乾一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬可

丸即丸如桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

當歸湯　治婦人經候不行或積淡血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花　當歸尾　紫蘇　牛膝　甘草

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛

為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空心溫酒調下

延胡索丸　治月經不調腹內諸痛

延胡索　蒲黃各一兩　五靈脂　當歸各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下

若久血不行濃煎紅花酒調下孕婦休服

治心腎俱虛勞嗽唾中有紅絲發熱盜汗名曰肺痿

白芍藥炒黃　甘草　人參　當歸　阿膠炒各二兩

右咬咀每服三大錢水一盞半生姜十二片棗三不煎至九

分溫服日三

治少男室女骨蒸婦人血風攻注肌熱盜汗

鱉甲　大黃煨　常山　赤茯苓　柴胡　白朮　當歸　乾漆炒令煙盡　生地黃　石膏各兩　甘草半兩

右為細末每服三錢水一大盞小麥五十粒煎至六分臨日

溫服　若有虛汗加麻黃根一兩同煎

治婦人月水不利腑腰疼痛

牡丹皮　川大黃炒各一兩　赤茯苓　桃仁　當歸　桂心　赤芍藥　石韋去毛　木香各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片至七分去滓空心溫服

治婦人月水不利腑腰疼痛

牛膝一兩　桂心　赤芍藥　桃仁　牡丹皮　川芎　木香各半兩

每服方寸匕為極細末溫酒調下食前

治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

五靈脂二兩半一半生一半炒

右為細末每服三錢水一盞半空心溫服日二

治產後血崩腹痛及桂枝桃仁湯禹

當歸　川芎　芍藥　桂心　生地黃　桃仁各十個　甘草一兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片棗一個同煎去滓溫服

治產後惡露不快血

芍藥　生地黃　桃仁各十個　甘草一兩

右為粗末每服五錢水二盞姜三片棗一個同煎去滓溫服

治月經壅滯心腰疼痛不可忍及治產後惡露不快血

上搶心迷悶不省氣絕欲死

芍藥　赤芍藥　牡丹皮　劉寄奴　三稜　莪茂　當歸　熟地黃　桂心　烏藥各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛

為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空心溫酒調下

治婦人經候不行或積淡血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花　當歸尾　紫蘇　牛膝　甘草

一兩　蘇木細剉各二兩　白芷　桂心各一兩半　赤芍藥九兩

劉寄奴五兩

右為細末空心熱酒調二錢服食前臨臥再服

治產後虛煩不得眠參棗湯主之

芍藥　當歸　梔子各五分　香豉半合

右如前修服產後傷寒便同下後安證

妊娠諸證合用四物等湯方俱在婦科下元戎方中

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後虛損食飲不下加建中人參白朮茯苓諸虛不足飲食不

進加建中湯

產後血痢腹疼痛四物內加棉花黃連御米殼等分

產後血崩如豆汁溲黑過多者加蒲黃生地黃汁阿膠酌根艾

白芷荊腎腹疼痛大便自利經事頻併加白芍藥

治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎　當歸各等分

右為麤末每秤三錢水煎食前服

治婦人胎漏下血或因事下血

牡丹皮　川大黃炒各一兩　赤茯苓　桃仁　當歸　桂心　赤芍藥　石韋去毛　木香各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片至七分去滓空心溫服

治婦人帶病熱入小腸為赤熱入大腸為白皆任脉經虛也宜

牛膝一兩　桂心　赤芍藥　桃仁　牡丹皮　川芎　木香各半兩　當歸　延胡索各一兩

右為細末每服一錢溫熱水調下口噤者斡開灌之

若血崩不止用炒熟者加當歸酒同煎或水酒童便各半盞

同煎　又方水煎為胥加神麯末和丸桐子大空心溫酒下

調經門

治女人月經淡閉月候不來統腰痛及產後血氣不調

乾漆炒煙出　艾葉炒令斷煙出　青白各一兩　牛膝去苗酒洗焙乾一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬可

丸即丸如桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

治婦人經候不行或積淡血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花　當歸尾　紫蘇　牛膝　甘草

一兩　蘇木細剉各二兩　白芷　桂心各一兩半　赤芍藥九兩

劉寄奴五兩

右為細末空心熱酒調二錢服食前臨臥再服

治產後虛煩不得眠參棗湯主之

芍藥　當歸　梔子各五分　香豉半合

右如前修服產後傷寒便同下後安證

妊娠諸證合用四物等湯方俱在婦科下元戎方中

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後虛損食飲不下加建中人參白朮茯苓諸虛不足飲食不

進加建中湯

產後血痢腹疼痛四物內加棉花黃連御米殼等分

產後血崩如豆汁溲黑過多者加蒲黃生地黃汁阿膠酌根艾

白芷荊腎腹疼痛大便自利經事頻併加白芍藥

治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎　當歸各等分

右為麤末每秤三錢水煎食前服

治婦人胎漏下血或因事下血

牡丹皮　川大黃炒各一兩　赤茯苓　桃仁　當歸　桂心　赤芍藥　石韋去毛　木香各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片至七分去滓空心溫服

治婦人帶病熱入小腸為赤熱入大腸為白皆任脉經虛也宜

牛膝一兩　桂心　赤芍藥　桃仁　牡丹皮　川芎　木香各半兩　當歸　延胡索各一兩

右為細末每服一錢溫熱水調下口噤者斡開灌之

若血崩不止用炒熟者加當歸酒同煎或水酒童便各半盞

同煎　又方水煎為胥加神麯末和丸桐子大空心溫酒下

調經門

治女人月經淡閉月候不來統腰痛及產後血氣不調

乾漆炒煙出　艾葉炒令斷煙出　青白各一兩　牛膝去苗酒洗焙乾一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬可

丸即丸如桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

治婦人經候不行或積淡血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花　當歸尾　紫蘇　牛膝　甘草

一兩　蘇木細剉各二兩　白芷　桂心各一兩半　赤芍藥九兩

劉寄奴五兩

右為細末空心熱酒調二錢服食前臨臥再服

治產後虛煩不得眠參棗湯主之

芍藥　當歸　梔子各五分　香豉半合

右如前修服產後傷寒便同下後安證

妊娠諸證合用四物等湯方俱在婦科下元戎方中

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後虛損食飲不下加建中人參白朮茯苓諸虛不足飲食不

進加建中湯

產後血痢腹疼痛四物內加棉花黃連御米殼等分

產後血崩如豆汁溲黑過多者加蒲黃生地黃汁阿膠酌根艾

白芷荊腎腹疼痛大便自利經事頻併加白芍藥

治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎　當歸各等分

右為麤末每秤三錢水煎食前服

治婦人胎漏下血或因事下血

牡丹皮　川大黃炒各一兩　赤茯苓　桃仁　當歸　桂心　赤芍藥　石韋去毛　木香各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片至七分去滓空心溫服

治婦人帶病熱入小腸為赤熱入大腸為白皆任脉經虛也宜

牛膝一兩　桂心　赤芍藥　桃仁　牡丹皮　川芎　木香各半兩　當歸　延胡索各一兩

右為細末每服一錢溫熱水調下口噤者斡開灌之

若血崩不止用炒熟者加當歸酒同煎或水酒童便各半盞

同煎　又方水煎為胥加神麯末和丸桐子大空心溫酒下

調經門

治女人月經淡閉月候不來統腰痛及產後血氣不調

乾漆炒煙出　艾葉炒令斷煙出　青白各一兩　牛膝去苗酒洗焙乾一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬可

丸即丸如桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

治婦人經候不行或積淡血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花　當歸尾　紫蘇　牛膝　甘草

一兩　蘇木細剉各二兩　白芷　桂心各一兩半　赤芍藥九兩

劉寄奴五兩

右為細末空心熱酒調二錢服食前臨臥再服

加荊芥穗天麻香附子名曰薑膏各三錢半四物料共一兩
中加之水煎服
若虛熱心煩与血相搏口舌乾渴欲飲水者加栝蔞根一兩
麥門冬七錢半
若寒熱往來加炮乾姜牡丹皮各二錢半
若婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯
若老人風秘加青皮檳榔亦加膠艾煎　若血痢亦加膠艾煎
若瘧疾加荊芥酒煎常服
若以四物湯四兩加甘草半兩蜜丸每兩作八丸酒醋共半
盞溫湯同化下名當歸煎去敗血生好血
婦人百疾只四物湯加吳茱萸煎若陽藏少便茱萸陰藏多
使茱萸

治榮衛不和月經湛濁保產散惡血腹痛血經諸疾並皆
治之

生姜十或一斤切　生地黃乙斤或一斤酒製　白芍藥
延胡索酒炒搗碎令熟　桂心各乙兩　紅花炒去煙不用
沒藥另研各半兩　蒲黃乙兩隔紙炒

右為粗末每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服空心
若婦人室女紅脈不通煎紅花蘇木酒下及良姜浸酒下
皆可　若婦人產後惡露不盡煎當歸酒下
若經脈不調或前或後或多或少煎當歸酒下
若大小便秘結灯心煎湯下
若乳汁不行苦蕎炙猪蹄羹下
若產後腰疼煎芍藥酒下

當歸湯 治風毒脚氣腰內痠疼脚重虛腫

當歸　柴胡　木通　桑白皮　羌活　獨活　荊芥穗
甘草各半兩　大腹子十个

右㕮咀每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服空心
若產後下血不止燒漆灰一錢調酒下
若產後赤白痢乾姜甘草湯下
若產後腰疼煎芍藥酒下
若產後渾身虛腫陳皮去白焙乾浸酒下
若頭疼薄荷茶下　若赤白帶下燒蒜燃灰酒下
若久年血氣成塊築心痛溫酒下炒姜酒下
若催生胎衣不下醋熬白礬一寸燒酒下
若胎前產後瀉紫蘇姜酒下
若胎前頭痛煨葱茶下
若胎前渾身發熱甘草湯下
若胎前咳嗽煨姜鹽湯下　若胎前頭痛川芎白芷湯下
若胎前飲食不得渾身倦怠宜茯苓湯下
若胎前渾身虛腫赤小豆當歸散下

大腹子散 治風毒脚氣腰膝節痛痰心神壅悶

大腹子　紫蘇　木通　桑白皮　羌活　木瓜
荊芥　赤芍藥　青皮　枳殼去瓤麩炒各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片葱白七寸去滓空心溫服

獨活湯 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腰脇拘急腰節不持
骨碎補炒去毛　桂心　牛膝　當歸　檳榔各一兩
川芎各七錢半　枳殼半兩

右為粗末每服三錢水一大盞姜三片棗一个煎至六分去滓食前
熱服

羌活湯 治風毒脚氣腰內痠疼脚重虛腫

羌活　獨活　荊芥穗　木通　桑白皮　木瓜
甘草各半兩　大腹子十个

右㕮咀每服三錢水一大盞姜三片葱白一莖同煎
至六分去滓溫服空心

白朮湯 治脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澁腹脇脹滿氣急坐
卧不得

桑白皮　郁李仁各二兩赤者炒　赤茯苓　木香
大腹子二兩紫蘇子　木通　檳榔　青皮各七錢半

右㕮咀每服三錢姜三片葱白一莖同煎

薏苡仁散 治脚氣弱痺腫滿心下急大便澁

薏苡仁　防風　豬苓　杜仲　細辛
都里仁各一兩　檳榔　大麻仁各乙兩　白芍藥　桂心
甘草半兩　羚羊角屑乙兩　當歸各乙兩　防己
川芎　防己

右為末每服三錢水煎

四白湯 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗羸瘦肌痛不能行

黃耆　厚朴　益智仁　白朮各一兩　白茯苓　人參
白扁豆　陳皮各乙兩半夏　烏藥　甘草　白芷各半兩

右為末每服二錢姜三片棗一个水煎

木瓜湯 治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行

獨活三兩桑寄生　續斷　牛膝　秦艽　茯苓
川芎　防風　人參各七錢半　熟地黃　當歸各乙兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服空心
若胎前嘔逆吐食粳米飲下
若胎前飲食不得渾身倦怠宜茯苓湯下
若胎前渾身發熱甘草湯下
若胎前咳嗽煨姜鹽湯下　若胎前頭痛煨葱茶下
若胎前產後瀉紫蘇姜酒下
若催生胎衣不下醋熬白礬一寸燒酒下
若產後赤白痢乾姜甘草湯下
若產後下血不止燒漆灰一錢調酒下
若產後渾身虛腫陳皮去白焙乾浸酒下
若頭疼薄荷茶下　若赤白帶下燒蒜燃灰酒下
若久年血氣成塊築心痛溫酒下炒姜酒下
若催生胎衣不下醋熬白礬一寸燒酒下
若胎前產後瀉紫蘇姜酒下
若胎前頭痛煨葱茶下
若胎前渾身發熱甘草湯下
若胎前咳嗽煨姜鹽湯下　若胎前頭痛川芎白芷湯下
若胎前飲食不得渾身倦怠宜茯苓湯下
若胎前渾身虛腫赤小豆當歸散下

乳香　沒藥各等分別研　牛膝　青鹽各半兩

熟艾四分川烏二枚全用炮

右為細末共研藥和勻以木瓜一个大者切一頭留作蓋去穰入上件藥於內將蓋蓋定安木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末拌勻丸如桐子大每服五十丸空心木瓜湯下以溫鹽酒亦可日三服忌血毒蒜

諸病門

雞鳴丸 治虛損昏冒倦怠下虛上壅嗽血吐血

雞蘇葉半兩甘草乙兩　川芎各半兩　防風乙兩

桔梗半兩荊芥穗乙兩甘菊花各一兩生地黃半兩腦子半分

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去心煎湯嚼下若肺損吐血日漸之力瘦弱行步不得喘嗽痰涎或發寒熱小便赤澁加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

黃耆散 治婦人客熱心胸壅悶肢節煩疼

甘草　黃芩　桑白皮　防風各一兩　杏仁二十七粒劍

人參　茯神各半兩　麥門冬二分半

以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯神麥門冬同為細末每服三錢蠟一豆大水煎食後服

麥煎散 涼心肺解勞熱

黃耆一兩白芍藥　人參　白茯苓

麥門冬　桔梗　生乾地黃各半兩

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞棗三枚煎至一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

補肺湯 治勞嗽

桑白皮　熟地黃各二兩　人參　柴苑

黃耆　五味子各一兩

右為末每服三錢水煎入蜜少許食後

四君子湯加秦艽黃蠟煎服 治小男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢

赤茯苓　當歸　乾漆炒　鱉甲醋炙　常山

大黃煨　柴胡　白朮　生地黃　石膏各一兩

甘草半兩

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨臥服　若有虛汗加麻黃根一兩　東坡曰此黃州吳判官療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極効吳君宅之如希世之珍其効可知

羌活湯 治婦人客熱四肢煩悶疼痛

羌活　沒藥各等分別研　牛膝　青鹽各半兩

熟艾四分川烏二枚全用炮

右為細末共研藥和勻以木瓜一个大者切一頭留作蓋去穰入上件藥於內將蓋蓋定安木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末拌勻丸如桐子大每服五十丸空心木瓜湯下以溫鹽酒亦可日三服忌血毒蒜

犀角屑　赤芍藥　地骨皮　紅花　甘草各半兩

柴胡一兩　黃耆半兩　麥門冬　人參　枳殼

赤茯苓　生地黃各七錢半

右咬咀每服四錢薑三片水煎

黃耆散 治婦人客熱心胸壅悶肢節煩疼

生乾地黃一兩　犀角屑　甘草

瓜蔞仁　黃芩各半兩　人參　茯神各七錢半

右為末每服三錢淡竹葉五片水煎

地骨皮散 治血風氣体虛發渴寒熱

柴胡　地骨皮　桑白皮　枳殼　甘草

黃耆各七錢半　白茯苓　五加皮　人參　前胡

桂心　白芍藥各半兩

右咬咀每服三錢生薑三片水煎

柴胡散 治寒熱体瘦肢節疼痛口乾心煩

柴胡　黃耆　赤茯苓　白芍藥各一兩

地骨皮　枳殼製　桔梗　桑白皮　甘草

生乾地黃各七錢半　麥門冬二兩甘草半兩

右咬咀每服四錢薑三片水煎

羚羊角湯 治婦人熱毒上攻吐血不止

羚羊角一兩刺劍　生地黃　黃耆各一兩

伏龍肝二兩刺劍　當歸半兩　赤芍藥二兩　阿膠二兩

右為麤末每服四錢薑三片竹茹彈子大水同煎

五神湯 治一切冷氣不和及本藏腸胃氣攻衝疼痛大治產前後腸胎不安忽血刺痛宿冷帶癖

陳皮去白麻黃去節香附子　甘草各一兩　厚朴製　桂心

厚朴製二兩草果仁三枚　桔梗　生乾地黃各半兩

右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麵塵一錢服

清魂湯 方在前雜和內附　治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎聲晝夜不安飲食不下

當歸半兩　赤芍藥　阿膠二兩

鵝蘇葉　黃芩各一兩

右為麤末每服四錢薑二片竹茹彈子大水同煎

五神湯 治婦人熱毒上攻吐血不止

生地黃　黃耆各一兩

伏龍肝二兩刺劍

右為麤末每服四錢薑三片水煎

神效湯 治一切冷氣不和及本藏腸胃氣攻衝疼痛大治產前後腸胎不安忽血刺痛宿冷帶癖

生地黃汁　生薑汁各三盞　生薑汁半盞白蜜一盞

右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麵塵一錢服

當歸散 方在前雜和內附

當歸　赤芍藥　阿膠各一兩

生地黃　黃耆各一兩

右為麤末每服四錢薑三片竹茹彈子大水同煎

神效湯 治療喘

半夏七枚破開作兩片　皂角去皮一寸炙　生薑如指大

右同以水一椀煮去半頓服

嘔吐腰痛門

阿子散 治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心痛及心脾冷痛不可忍神効

阿子　甘草　厚朴製　乾姜　草果仁

陳皮　良姜　茯苓　神麴　麥蘗各等分

右為末每服三錢候發刺痛不可忍用水一盞半煎七分入鹽服

薑附散 治虛損氣逆吐血不止

鵝蘇葉　黃芩各一兩　當歸半兩　赤芍藥半兩　阿膠二兩

生地黃　黃耆各一兩

右咬咀每服三錢生薑三片水煎

五神湯 治療喘

半夏七枚破開作兩片　皂角去皮一寸　生薑如指大

右同以水一椀煮去半頓服

嘔吐腰痛門

阿子散 治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心痛及心脾冷痛不可忍神効

阿子　甘草　厚朴製　乾姜　草果仁

陳皮　良姜　茯苓　神麴　麥蘗各等分

右為末每服三錢候發刺痛不可忍用水一盞半煎七分

氣十服腸氣癖癖五服血瘕二丸當差

桃仁湯 治婦人血瘕血積經候不通

桃仁（大黃各一兩蟲蟲半兩炒黑）朴消一兩

右四味為末以醋二升半銀石器中慢火煎取一升半下大黃桃仁蟲蟲等不住手攪欲下手丸下朴消更不手攪良久出之丸如桐子大前一日不用喫晚食五更初用溫酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如鷄肝鼈蟲衣狀未下再作如鮮血來即止

沒藥散 治一切血氣腸腹撮痛及產後惡露不行兒枕塊痛

血竭（沒藥研細）桂心　當歸　蒲黃

紅花　木香　延胡索　乾漆炒　赤芍藥各等分

右為極細末每服二錢熱酒調下食前　若血塊衝心痛甚危者以大順散二錢熱酒調服立止

大順散 治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛

牡丹皮　桂心　當歸　延胡索各兩　莪茂

牛膝　赤芍藥各二兩　荆三稜半兩

右為細末每服三錢水酒各半煎

妊娠惡阻門

人參湯 治阻病嘔吐痰水

人參　橘紅　白朮　麥門冬去心各一兩

甘草二分炙厚朴製　白茯苓各半

右為麤末每服四錢淡竹茹彈子大生薑三片水同煎食前

當歸湯 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効者

人參　甘草　川芎　當歸　芍藥

丁香各半兩　白茯苓　白朮　陳皮各一兩半　桔梗炒

枳殼去瓤炒半夏湯洗七次炒各一兩

右咬咀每服三錢生薑五片棗一枚水同煎

厚朴湯 治妊娠惡阻心中悶頭重目眩嘔逆不食或胎動不安腰腹疼痛

甘草　茯苓　當歸　熟地黃　川芎

白朮　黃耆　白芍藥　半夏湯洗七次炒黃　阿膠炒

地榆各等分

右咬咀每服三錢姜四片水同煎

當歸芍藥散 治妊娠惡阻虛煩吐逆百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏湯洗七次生薑五兩　茯苓　熟地黃各二兩

橘紅　細辛　人參　芍藥

川芎各一兩　桔梗　甘草各半

右咬咀每服五錢姜七片水煎空心兼服茯苓丸

若有客熱煩渴口瘡去橘皮細辛加前胡知母各二兩

若腹冷下痢去地黃加炒桂心二兩

若胃中虛熱大便秘小便赤澁加大黃二兩去地黃加蕪荑一兩然半夏雖能動胎若炒過前無妨也

茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶痰吐羹墻先服此藥

續後服此藥

赤茯苓　人參　桂心　乾姜

橘紅各兩　白朮　葛根　甘草

右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十丸米飲下日三

一方加麥門冬　肘後加五味子

竹葉湯 治妊娠胎上逼脹滿痰痛諸證之子懸著不下結連胃不下

當歸　甘草各半大塊子　人參

陳皮　白芍藥各半兩　紫蘇二兩

右咬咀每服半兩水一盞半姜四片棗二枚白十丸空心

竹茹散 治妊娠胎上逼脹滿痰痛諸證之子懸著不下結連胃不下心

牡丹皮　白茯苓　桂心　桃仁製

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼淡醋湯下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下

黃龍湯 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効者

人參　甘草　川芎　當歸　芍藥

丁香各半兩　白茯苓　白朮　陳皮各一兩半　桔梗炒

枳殼去瓤炒半夏湯洗七次炒各一兩

右咬咀每服三錢生薑五片棗一枚水同煎

厚朴湯 治妊娠惡阻心中悶頭重目眩嘔逆不食或胎動不安腰腹疼痛

甘草　茯苓　當歸　熟地黃　川芎

白朮　黃耆　白芍藥　半夏湯洗七次炒黃　阿膠炒

地榆各等分

右咬咀每服三錢姜四片水同煎

當歸芍藥散 治妊娠惡阻虛煩吐逆百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏湯洗七次生薑五兩　茯苓　熟地黃各二兩

橘紅　細辛　人參　芍藥

川芎各一兩　桔梗　甘草各半

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作二服

五加皮丸 治妊娠腰痛不可忍或連胯痛

杜仲四兩五加皮　阿膠炙　防風　狗脊

川芎　白芍藥　細辛　蕪荑各三兩　杏仁八十個去皮尖炒

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作二服

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或連胯痛

杜仲四兩五加皮　阿膠炙　防風　狗脊

川芎　白芍藥　細辛　蕪荑各三兩　杏仁八十個去皮尖炒

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下四十丸日三

續斷湯 治妊娠胎動腰痛如刀刺

續斷　杜仲酥炙各二兩半　芎藭　川芎

狗脊　萆薢　芍藥　人參　甘草

右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十丸米飲下日三

獨活寄生湯 治妊娠腰痛不可忍者　次服此丸

獨活各三兩五加皮

桑寄生　呵子肉各八兩

破故紙不以多少先上炒香熟為末嚼胡桃肉一個空心溫酒調下三錢

防風散 治妊娠腰疼不可忍或連胯痛　先服此散

防風　狗脊

萆薢各三兩　杏仁八十個去皮尖炒

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作二服

安胎散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

天門冬去心一兩　貝母

桑白皮　桔梗　紫蘇各半兩

右咬咀每服四錢姜二片水煎

麥門冬湯 治妊娠肺壅咳嗽喘急

天門冬去心一兩　貝母

桑白皮　桔梗　紫蘇各半兩

右咬咀每服四錢姜二片水煎

麻黃散 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃去節陳皮去白前胡各一兩半　半夏先炒　人參

白朮　枳殼炒　貝母　甘草各半兩

右咬咀每服四錢姜三片棗一个水同煎

紫蘇湯 治妊娠咳嗽不止胎不安

紫蘇一兩　桔梗半兩　甘草

天門冬一兩　杏仁　桑白皮各二分半

右咬咀每服二錢竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙再煎二沸溫服

升麻散 治妊娠壅熱心神煩躁只乾渴逆

升麻　黃芩　人參　白朮各一兩　麥門冬　枳子仁

柴胡　茯神　瓜蔞根　犀角各一兩

知母　甘草各半兩
右咬咀每服四錢水煎

治婦人雜病煩躁悶亂口乾及胎藏熱
知母　麥門冬　甘草炙各半兩　黃耆　子苓
赤茯苓各七分半
右咬咀每服四錢竹葉一堆水煎

治婦人雜病胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食
葛根　黃芩　人參　麥門冬各等分　甘草
右咬咀每服四錢竹葉十七片水同煎

治婦人雜病身熱煩躁口乾食少
人參　黃耆　葛根　秦艽　麥門冬各一兩
知母半兩　甘草半兩　赤茯苓一兩
右咬咀每服四錢姜三片淡竹葉十四片水同煎

治雜病風邪頭痛項強身熱惡寒
子痫
麻黃去節　防風　獨活各一兩　桂心　羚羊角屑各半兩
升麻　甘草　酸棗仁　秦艽各七分　川芎
當歸　杏仁製各七分
右咬咀每服四錢姜四片竹瀝一合水同煎

治雜病中風腰背強直時復反張
防風　葛根　川芎　生地黃各二兩
杏仁製　麻黃去節各一兩半　桂心　獨活
甘草　防己各一兩
右咬咀每服四錢水煎

治雜病臨月因發風痙閉口不識人吐逆眩倒名子癎
葛根　貝母去心　牡丹皮　防己　防風
當歸　川芎　白茯苓　桂心　澤瀉
甘草炙一兩　獨活　石膏　人參各二兩
右咬咀以水九升煮取三升分二服貝母令人易產未臨月
升麻代之
傷寒門

治雜病傷寒頭痛身体壯熱
升麻　蒼术炒　麥門冬　麻黃去節　黃芩
大青各半兩　石膏碎　赤茯苓各七分半
右為麤末每服四錢竹葉二十七片水同煎

治婦人雜病胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食
葛根　黃芩　人參　麥門冬各等分　甘草　黃耆
右咬咀每服四錢竹葉十四片水同煎

治雜病時氣五六日不得汗口乾多嗽冷水狂語喘逆
柴胡各二兩　石膏碎　前胡　秦艽　甘草　葛根
赤茯苓各半兩
右為細末每服二錢姜二片棗二枚水煎要出汗

治雜病時氣五六日不得汗口乾多嗽冷水狂語喘逆
柴胡　前胡　川芎　當歸　芍藥　粉草　生地黃各等分
右為細末每服二錢姜二片棗二枚水煎要出汗

治婦人雜病胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食
柴胡　前胡　川芎　當歸　芍藥　粉草　生地黃各等分
右為細末每服四錢姜四片竹葉二十七片水同煎

治婦人雜病頭痛身熱煩躁口乾食少
人參　黃耆　葛根　秦艽　麥門冬各一兩
知母半兩　甘草半兩　赤茯苓一兩
右咬咀每服四錢姜三片淡竹葉十四片水同煎

治雜病風邪頭痛項強身熱惡寒
升麻　蒼术炒　麥門冬　麻黃去節　黃芩
大青各半兩　石膏碎　赤茯苓各七分半
右為麤末每服四錢竹葉二十七片水同煎

治婦人雜病胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食
葛根　黃芩　人參　麥門冬各等分　甘草　黃耆
右咬咀每服四錢姜四片竹葉二十七片水同煎

治婦人雜病身熱煩躁口乾食少
人參　黃耆　葛根　秦艽　麥門冬各一兩
知母半兩　甘草半兩　赤茯苓一兩
右咬咀每服四錢姜三片淡竹葉十四片水同煎

治雜病中風角弓反張口噤語澀謂之風痙亦名子癎
麻黃去節　防風　獨活各一兩　桂心　羚羊角屑各半兩
升麻　甘草　酸棗仁　秦艽各七分　川芎
當歸　杏仁製各七分
右咬咀每服四錢姜四片竹瀝一合水同煎

治雜病中風腰背強直時復反張
防風　葛根　川芎　生地黃各二兩
杏仁製　麻黃去節各一兩半　桂心　獨活
甘草　防己各一兩
右咬咀每服四錢水煎

治雜病臨月因發風痙閉口不識人吐逆眩倒名子癎
葛根　貝母去心　牡丹皮　防己　防風
當歸　川芎　白茯苓　桂心　澤瀉
甘草炙一兩　獨活　石膏　人參各二兩
右咬咀以水九升煮取三升分二服貝母令人易產未臨月
升麻代之
傷寒門

治雜病傷寒頭痛身体壯熱
升麻　蒼术炒　麥門冬　麻黃去節　黃芩
大青各半兩　石膏碎　赤茯苓各七分半
右為麤末每服四錢竹葉二十七片水同煎

治婦人雜病胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食
柴胡　前胡　川芎　當歸　芍藥　粉草　生地黃各等分
右為細末每服二錢姜二片棗二枚水煎要出汗

治雜病時氣五六日不得汗口乾多嗽冷水狂語喘逆
柴胡各二兩　石膏碎　前胡　秦艽　甘草　葛根
赤茯苓各半兩
右為麤末每服四錢姜四片淡竹葉二十七片水同煎

治婦人雜病胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食
葛根　黃芩　人參　麥門冬各等分　甘草　黃耆
右咬咀每服四錢竹葉十四片水同煎

治婦人雜病

朴硝研細半兩以童子小便溫調下一劑効

治婦人敗血奔心胎死腹中胎衣不下等證極妙方在機要中

治產後血暈　人參各貳分半　荊芥煮兩小盞　甘草貳分　澤蘭葉

右為末用溫酒熱湯各半盞調二錢急灌之

治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕　生地黃汁壹合　甘草　丹參並炙咀各壹兩　芍藥

右水二升先煮前三味取八合下地黃生姜汁攪分為二分

治產後血暈昏迷不省衝心閉絕　五靈脂半生半炒各兩

右為細末溫酒調下二錢口噤者物開口灌之入喉即愈

一方加荊芥等分為末童便調下

治產後血暈危困　生地黃汁壹大盞　當歸貳錢半剉　赤芍藥貳分半剉

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便半盞煎一調下二錢良久再服其惡血自下

治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志　沒藥　血竭等分

右細研為末產後便用童子小便與細酒各半盞煎一調下二錢良久再服其惡血自下

蘇合香丸童子小便調下亦妙

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉盛大者　乾荷葉　生地黃乾　牡丹皮等分

右三味濃煎湯調蒲黃二錢七一服即定　四物湯加柴胡小柴胡加生乾地黃等分煎服亦可

治產後中風不省人事口吐涎手足瘛瘲　當歸　荊芥穗各等分

右為細末每服二錢水一盞酒少許煎至七分灌之如口噤關緊用起斡開灌下屢用救人有効

治產後中風腰背強直時時反張名曰風痙　防風　乾薑　川芎　地黃各貳兩　麻黃去節

右為末每服二錢生姜三片棗一枚水同煎食前

治產後三四日惡露不下腹滿壯熱　芍藥二兩　知母二兩生姜　當歸

右為末每服三錢生姜三片棗一枚水同煎食前

治產後惡露不下腹滿小腹如刺寒熱頭痛久有瘀血　牡礪　川芎　熟地黃　白茯苓　龍骨各一兩　續斷　當歸炒　艾葉百炒五味子　人參各半兩　甘草二分半　地榆半兩

右為末每服二錢生姜三片棗一枚水同煎食前

治產後惡露不下腹滿　延胡索　桂心各半兩　當歸壹兩

右為細末熱酒調下

治產後惡露不快腰痛小腹如刺寒熱頭痛久有瘀血月水不調亦可治心痛與失笑散同　延胡索　當歸　白芍藥　川芎　乾薑各等分　紅花五分　荷葉中心帶七个　生地黃汁壹合

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃末攪和

治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊　五靈脂　真蒲黃等分

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和

九如櫻桃大每服一二丸水煎童子小便各半盞煎至七分

以綿紋大黃一兩為細末用醋半升同煎成膏丸如桐子大患者用醋七分盞花五丸至七丸服之須臾血下即愈

治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈　五靈脂　蒲黃各等分

右為末先用醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前熱服是驗

治產後惡物不盡腹內污痛　生乾地黃　當歸並各壹兩　生姜半兩細切如蠶豆大

右為細末每服二錢酒調一錢服

治產後血上衝心血刺血暈腹痛惡露不快　初出卷荷　紅花　當歸各壹兩　蒲黃　牡丹皮各半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下一服內用童小便調下

療產後血結下不盡腹中絞痛不止　大黃另煎　生乾地黃　當歸酒浸剉　桂心各壹兩　甘草

右切細以水七升煮取二升半去滓食前服

治先患冷氣因產後腹痛　官桂　當歸　芍藥　甘草各壹兩半　茯苓　吳茱萸各壹兩

右咬咀每服半兩水二盞煎至一盞半去滓食前服

治產後腰痛　桃仁半升去皮尖　芍藥　當歸　川芎　乾薑炮各壹兩　桂心　甘草各貳兩

右以水三升煮取一升去滓內地黃汁攪令勻分二服

治產後腹痛　當歸　川芎　熟地黃　白芍藥　龍骨各一兩　續斷　當歸炒　艾葉百炒五味子　人參各半兩　甘草二分半　地榆半兩

右為末每服二錢生姜三片棗一枚水同煎食前

治產後腹痛　延胡索　桂心各半兩　當歸壹兩

右為細末熱酒調下

治腹中絞痛不可忍　延胡索　當歸　白芍藥　川芎　乾薑各等分

右為末每服二錢溫酒調下

治產後同前　延胡索　桂心各半兩　當歸壹兩

右為細末熱酒調下

治產後惡露不快腰痛小腹如刺寒熱頭痛久有瘀血　芍藥二兩　生姜　當歸　川芎　乾薑各等分　紅花五分　荷葉中心帶七个　生地黃汁壹合　真蒲黃等分

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和九如櫻桃大每服一二丸水煎童子小便各半盞煎至七分



秘傳證治要訣

戴元禮述

秘傳證治要訣卷之一

明　大醫院使戴元禮述

諸中門

中風附破傷風論風

天地間惟風無所不入。一罅不塞。來不可禦。人之一身。縝密者少。疎漏者多。風乘之也。輕則爲感。重則爲傷。又重則爲中。古人謂避風如避寇。蓋欲窒源以防患。中風之證。卒然仆倒。昏不知人。或痰涎壅盛。咽喉作聲。或口眼喎斜。手足癱緩。或半身不遂。或舌強不語。風邪既盛。氣必上逆。痰隨氣上。停留壅塞。昏亂仆倒。皆痰爲之也。五臟雖皆有風。而犯肝經爲多。蓋肝主筋屬木。風易入之。各從其類。肝受風則筋緩不榮。或緩或急。所以有喎斜、癱緩、不遂、舌強、語澁等証。治之之法。調氣爲先。經云善治風者以氣理風。氣順則痰消。徐理其風。庶可收效。先用麻油調蘇合香圓。或用姜汁或用白湯調。如口噤抉開灌之。稍甦。則進八味順氣散。

味順氣散。

諸中。或未甦或已甦。或初病或久病。忽吐出紫紅色者死。昏沉不省人事。口噤不可進藥。急以生半夏爲末。吹入鼻中。或用細辛皁角爲末。吹入喉。噴嚏則甦。此可以驗其受病深淺。則知其可治不可治。若稍得

其有害大風者。古謂之癩風。俗呼爲麻風。病之至惡無出於此。得此病面眉髮鬚影先落。猶風蝕木面葉

先落也。間有食蛇服大風油而愈者亦幸耳。

破傷風者。因皮肉骨有破傷處。風從此口入。其證項強牙關緊。狀如發痙。不似中風。又似痙後角弓反張。用蘇合香圓。進防風散。玉真圓。

濕風不論冬夏。額上當有汗出。得之醉後當風所致。頭乃諸陽之會。酒能發陽。所以飲必見面。醉後陽氣上升。頭面之毛竅必開。當風坐臥。風邪入之。以致頭面汗名曰濕風。黃耆六一湯加防風麻黃桂枝名曰。半發。風已除。只口閉喘急。未正者。以草麻去殼。燃揭石喘。塗在左右。左喘塗在石。或以膀魚血入麝香少許。塗之也。

有虛熱生風。元氣虛。虛則風乘之。治虛當兼風治。有虛證似風。此權當治其虛。不可以風論。

中風而疼痛甚者。或在通身。或在手足。惟鐵彈圓作。如碁骰丹。青州白圓子。防風圓。皂角圓。八風散。骨碎補圓。烏荊圓。大三五七散。四生散。省風湯。五痹湯。四生圓。輕腳圓。伏虎丹。秘方換腿圓。左經圓。木瓜圓。胡麻散。皆治諸中風。斟酌病源。當用治效方藥。

中氣

中氣。因七情內傷。氣逆鬱病。痰潮昏塞。牙關緊急。但七情皆能使人中。因怒而中尤多。中氣之狀。大略與中風同。風與氣亦自難辨。以氣藥治風則可。以風藥治氣則不可。纔覺中氣。急以蘇合香圓灌之。候醒。糙則手足厥逆冷汗自出。或吐而不瀉。或瀉而不吐。或兼作吐瀉。或吐瀉不透。且蘇合香圓。以通其痞塞。繼進藿香正氣散。加木香半錢。仍以蘇合香圓調灌。來復丹。若累瀉已甚。則不可用。來復丹。若累瀉已甚。則用生枳殼。若不能見效。逼迫已甚。其勢不容不用神保圓。但神保雖能通利。亦入大腸而復有功。若膈於上而不能下。轉服轉悶。須用來復丹研末。湯調吞下。養正丹百粒。庶可引前藥到下。吐瀉兼作。心腹攪擾未安者。須藿香正氣散加官桂木香各半錢。不愈。則投四順湯。

吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或水粒不入。或口渴喜冷。或噤塞戰掉。手足冷逆。或發熱煩躁。欲去衣被。此蓋內虛陰盛。卻不可以其喜冷欲去衣被。爲熱。宜理中湯。甚則附子理中湯。不效。則四逆湯。並宜放手分冷服。

欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹攪擾。痛不可忍。上下不通。言語不定。如見鬼神。俗謂之乾霍亂。先以濃鹽湯頓服。次調蘇合香圓。吞下來復丹。仍進藿香正氣散加木香枳殼各半錢。近世俗醫謂之搶腸沙。多值之。殊不知卽是霍亂。僥倖而愈者。一通之功耳。

霍亂轉筋。理中湯加凍膠。炒一錢。仍令其緊縛腿脛。若筋入腹。及通身轉筋者。不可治。筋轉者。以造麵麥汁暖熱浸。或用濃鹽湯浸。

霍亂已透。面餘吐餘瀉未止。腹有餘痛。宜一味糗秋荳蔻煎服。乾者尤佳。

霍亂之後。陽氣已脫。或遺尿而不知。或氣少而不語。或害汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。皆不可治。

霍亂幷諸吐瀉後。胸膈高起。痞塞欲絕。理中湯加枳實半錢。狀若半錢。名枳實理中湯。吐瀉已愈。而力怯

又有胷膈一證。似中而輕。欲睡而語。實人香蘇飲加黃連一錢。虛人理香飲加香蘇一錢。手足間連頻悶多渴。香宜香蘇。甦後爲腎者過投冷劑。致吐利不止。外熱內寒。煩躁多渴。甚欲躁起。狀如傷寒。陰盛隔陽。當用溫藥。香蘇飲加附子。設冷服。渴者縮脚飲加附子亦設治服。

中濕

風寒兼濕。習能中人。惟濕氣積久。留滯關節。故能中。非如風寒者之有暴中也。中濕之證。由節痛重浮。嘔濕腹脹。煩悶昏不知人。宜白朮酒。有破傷處。因澡浴濕氣從傷口中入。其人昏迷沉重。狀如中濕。名曰破傷。宜白朮酒。

中惡

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋眩倒。昏不知人。卽此是卒厥。客忤、飛尸、鬼擊、吊死、問喪、入廟、登塚、多有此病。蘇合香圓灌之。候稍甦。以調氣散和平胃散服。名調厥平胃散。

霍亂之病。揔霍變亂。起於倉卒。與中惡相似。俗呼爲觸惡。但有吐利爲異耳。其證胸膈痞脹。氣不升降。甚則手足厥逆冷汗自出。或吐而不瀉。或瀉而不吐。或兼作吐瀉。或吐瀉不透。且蘇合香圓。以通其痞塞。繼進藿香正氣散。加木香半錢。仍以蘇合香圓調吞。來復丹。若累瀉已甚。則不可用。來復丹。甚則不可用。來復丹。瀉而不吐。胸膈痞滿。先以陰陽湯。或濃鹽湯。頓服以導其吐。已吐未吐。並藿香正氣散。加進蘇合香圓。吐而不瀉。心膈痞痛。頻欲登圓。吞於不通。藿香正氣散加枳殼一錢。多下來復丹。欲提則用生枳殼。若不能見效。逼迫已甚。其勢不容不用神保圓。但神保雖能通利。亦入大腸而復有功。若膈於上而不能下。轉服轉悶。須用來復丹研末。湯調吞下。養正丹百粒。庶可引前藥到下。吐瀉兼作。心膈攪擾未安者。須藿香正氣散加官桂木香各半錢。不愈。則投四順湯。

精神未復者十補飲。

夏天暍暑吐瀉如霍亂者六和湯、香薷湯皆是要藥大吐瀉復厥逆躁擾者之因暑得之止宜香薷飲。

人於夏月多食瓜菓及飲冷乘風以致食留不化因食成痞脇絕上下途成霍亂六和湯倍藿香煎熱調蘇合香圓。

厥

厥者逆也手足逆冷也其證不一故之方書者甚多今始撮其大概寒熱厥逆見諸傷門風寒證尸厥卽飛尸卒厥本門中惡證。

蚘厥見嘔吐門吐蚘證。

痰厥飲厥見嘔吐門各證。

氣厥卽中氣見本門中氣證。

祕傳證治要訣卷之二

諸傷門

傷風寒（附感冒凡看病不令發用葉黃末發出於孔及須知避忌行從客位逢入男子病從左出於口女子病從右出於陰陰陽立對語問宜識得向背）傷風、傷寒。俗呼爲傷寒傳經分三陽三陰。三陽是太陽、陽明、少陽經也。三陰太陰、少陰、厥陰經也。經之陰陽以臟腑言。腑爲陽。膀胱、胃、膽是也。臟爲陰。脾、腎、肝是也。病之陰陽乃是外邪之陰陽。陰氣陽氣是也。陰陽二氣皆能犯臟腑。故陽氣犯太陽則爲傷風。惡風而有汗。陰氣犯太陽則爲傷寒。惡寒而無汗。在太陽未得解。轉入陽明、少陽二經。則純乎陽。不如太陽易其治。若陽氣未能龍以次傳入陰經。則爲陰中之陽。蓋緣陽經之陽氣來入陰經。雖有自利、欲寐、脣青、手足厥冷、舌卷、囊縮等證。不可妄投熱藥。宜瀉其陽之在陰經也。

若陽病下之太過。陽氣已脫。遂變爲陰。所謂害熱未已。寒病復起。或初得病便是陰證。此是陰中之陰。蓋緣陰氣攻陰經。陰自得傳。非自傳諸陽經來。只當以溫藥回其陽。故陽入陰者。扶陽以救陰。陰入陽者。用陽二者不可不辨。

傷風傷寒初得病時。俱見發熱頭疼體痛。竭太陽經。但傷風惡風有汗。傷寒惡寒無汗。並宜和解散。若證是下利清穀。手足四逆。其人面赤或腹痛。或乾嘔。或咽痛。四逆湯。倍乾薑。面赤者加蔥一根。腹痛

加芍藥一錢半。嘔加生薑。咽痛加桔梗一錢。

若口中和而背惡寒。宜正方四逆湯。不必加減。四逆散、四逆湯。俱治少陰下利。四肢逆冷。泄利下重者。與四逆湯治四逆陰疾。

下利清穀者。一涼一溫。又自有陰有陽之別。四逆散是治四逆湯是治四逆陰疾。

若初得病。便見少陰證。其人發熱惡寒。身疼頭不痛者。宜麻黃細辛附子湯微汗之。或五積散加熟附半錢。或五積散加以順元散。若頭痛厥逆。或舌捲囊縮。或下利清穀。裏寒外熱。此屬厥陰經下利清穀者。陰中之陰。宜進通脈四逆湯。或當歸四逆湯加生薑葉。吳茱萸。舌捲囊縮。不特陰中之陰有之。陽明之熱。陷入厥陰亦有之。蓋陽明主宗筋。宗筋為熱毒風所致。故那榮而急。引舌與卵風以舌捲囊縮。當瀉陽以救陰。宜大承氣湯。陽傳太陰而利。故用小建中湯。及小柴胡湯去黃芩加芍藥。此一藥治太陰洩利。腸鳴而痛已利而痛為虛。虛則腸鳴。蓋為傳陰之陽氣漸微。不敢過用冷劑。但以芍藥通藥耳。

南陽謂傷寒手足必微冷。若手足自溫者。係太陰也。說欠分曉。若陽明手足安得微冷。少陽厥陰而太冷。安得言微冷。但當言三陰經。少陰厥陰。手足厥冷。惟有太陰手足自溫耳。

凡渴、問其所飲。欲冷欲熱。欲多欲少。若飲多而欲冷者陽渴也。更須審其有何證在經也。其太陽證、小便不利而渴者五苓散。其陽明證、大便不利而渴者宜於前本經求之。已利猶渴。宜白虎湯。其少陽證。寒熱往來而渴者。小柴胡湯去半夏。加括蔞根如其數。陰亦有渴。古人多有冷熱。以其皆按陽氣耳。經雖陰而病則陽也。然亦有下利清穀。不係熱利。純是陰證。而反見渴者。此是陰在下隔陽於上。兼因洩渴。津液既去。枯燥而渴。其人雖引飲。所飲自少而常喜溫。不可致冷劑。宜理中湯。或四逆湯加人參一錢。渴甚連理湯。

有陽證不渴。陰證反渴者。陽明不甚渴。太陰乃大渴。不可不知。治渴一也。有堅腎水而渴止者。有利小便而渴愈者。堅腎水則用天花粉之屬。利小便則用茯苓豬苓之類。蓋太陰以利小便為先。陽明以利小便為戒。少陽以膽經半表半裏未可下之。其人或大渴不止。當以小柴胡湯加天花粉之屬。堅其腎水。腎水汗汗出太過。所謂陽微則惡寒。宜芍藥甘草附子湯。只發熱者。是表已解而裏不清。所謂陰微則發熱。宜大柴胡湯。或小承氣湯。

又有汗下後陰陽不相人。水火不相濟。致餘熱未退。不可更用冷藥。內外俱未可攻。宜小柴胡加大黃一錢。已虛。虛能生熱。宜小建中湯加當歸一錢。或四君子湯加黃芩半錢。或十全大補湯調其榮衛。虛寒四柱湯與武湯。治之。是邪熱未解。雖經汗下。卻不畏虛。湯養病。宜竹葉石膏湯。

陽氣必客於外。所以外反熱。要知陰陽二證。發熱自是不同。發於陽而發熱者。頭必移。發於陰而發熱者。頭不痛。此為驗矣。

又有潮熱一證。經云潮熱者。胃家實也。屬陽明經。當下。此之潮熱。乃獨熱往來。多於日晡時發。如潮之期。長落。非若先寒後熱。寒往即熱來此也。

汗下後發寒熱。又發汗後只惡寒者為虛。虛乃表虛。發汗後只惡熱者。是裏虛。發汗後有病無熱。利後卻熱。或初得病即身熱。雖而自利。此陰利。非陽傳陰經之利。詳見後段發熱證。

外有病瘧後。多食發熱。名曰食復。作勞發熱。名曰勞復。復者。愈而復作之義。食復宜小柴胡加大黃一錢。勞復宜枳實梔子湯。或小柴胡湯。今人有澡心浣衣沐髮易床之戒。遂以幽冥鬼神之說。蓋虛思者初愈。自利須辨陰陽。三陽自利。各已本經見之。太經與陽明合病。下利頭痛。頭痛連腰。移肌熱。目疼鼻乾。宜葛根湯。陽明與少陽合病。下利身熱胸脇痞滿而嘔。或往來寒熱。目疼鼻乾。宜大柴胡湯。大抵陽熱之利。與陰寒之利。自不同。陽利黃色必重。黃熱臭。出作氣。肝下必熱。得涼藥則止。得熱藥愈增。陰利必洞下清穀。糞色或白或淡黃。肝下多寒。宜溫中止渴之劑。此之謂陰利陽利。指陰陽二氣而言。非曰陰陽二經也。緣陰中亦自有陽利。不可因下利便以為陰也。

外有太陽證。醫反下之。遂下利清穀。身體又自疼痛者。急用四逆湯救其裏。後得大便已調。身上疼痛。卻用桂枝湯解其表。先救裏後解表。恐洞下陽虛。亟不測。

又有內不太滿。猶生寒熱。未可下。而便下之。內虛熱入。挾熱自利。肝下垢膩。名曰利膿。宜白頭翁湯。黃芩湯。

要知均自為利。身不熱手足自溫者。太陰。身體四逆者。少陰、厥陰。其餘身熱下利。皆屬陽經。然陰利有反發熱。或初病無熱。利後卻熱。或初得病即身熱。雖而自利。此陰利。非陽傳陰經之利。詳見後段發熱證。

又有大便祕五六日。以藥利之。利遂不止。用極熱劑方瘥。陽有利。陽有祕。當更以他證別之。

外熱內煩。下利止渴。或痞或痛或嘔。當法多用黃芩湯。半夏瀉心湯之當。或溫膽湯加入黃連。其中枳殼去取在人。

諸陽發熱。已見前三陽經。陰不發熱。惟少陰能發熱。然少陰發熱。有二證。初得病即見少陰證。發熱惡寒。頭不疼。宜麻黃細辛附子湯。（少陰病始得之。反發熱者。多在表。宜此湯。）

若下利清穀。身熱躁擾。裏寒外熱。仲景謂之反發熱。此乃陰盛隔陽。宜四逆湯。附子理中湯。蓋陽氣傳陰經而下利者。乃是熱利。陽陷入裏。外所以無熱。陰氣入陰經而下利者。乃是裏寒。自利。寒既在裏為主。則陽氣必客於外。所以外反熱。要知陰陽二證。發熱自是不同。發於陽而發熱者。頭必移。發於陰而發熱者。頭不痛。此為驗矣。

汗下後發寒熱。又發汗後只惡寒者為虛。虛乃表虛。發汗後只惡熱者。是裏虛。發汗後有病無熱。利後卻熱。或初得病即身熱。雖而自利。此陰利。非陽傳陰經之利。詳見後段發熱證。

又有汗下後陰陽不相人。水火不相濟。致餘熱未退。不可更用冷藥。內外俱未可攻。宜小柴胡加大黃一錢。已虛。虛能生熱。宜小建中湯加當歸一錢。或四君子湯加黃芩半錢。或十全大補湯調其榮衛。虛寒四柱湯與武湯。治之。是邪熱未解。雖經汗下。卻不畏虛。湯養病。宜竹葉石膏湯。

又有潮熱一證。經云潮熱者。胃家實也。屬陽明經。當下。此之潮熱。乃獨熱往來。多於日晡時發。如潮之期。長落。非若先寒後熱。寒往即熱來此也。

外有病瘧後。多食發熱。名曰食復。作勞發熱。名曰勞復。復者。愈而復作之義。食復宜小柴胡加大黃一錢。勞復宜枳實梔子湯。或小柴胡湯。今人有澡心浣衣沐髮易床之戒。遂以幽冥鬼神之說。蓋虛思者初愈。自利須辨陰陽。三陽自利。各已本經見之。太經與陽明合病。下利頭痛。頭痛連腰。移肌熱。目疼鼻乾。宜葛根湯。陽明與少陽合病。下利身熱胸脇痞滿而嘔。或往來寒熱。目疼鼻乾。宜大柴胡湯。大抵陽熱之利。與陰寒之利。自不同。陽利黃色必重。黃熱臭。出作氣。肝下必熱。得涼藥則止。得熱藥愈增。陰利必洞下清穀。糞色或白或淡黃。肝下多寒。宜溫中止渴之劑。此之謂陰利陽利。指陰陽二氣而言。非曰陰陽二經也。緣陰中亦自有陽利。不可因下利便以為陰也。

外有太陽證。醫反下之。遂下利清穀。身體又自疼痛者。急用四逆湯救其裏。後得大便已調。身上疼痛。卻用桂枝湯解其表。先救裏後解表。恐洞下陽虛。亟不測。

又有內不太滿。猶生寒熱。未可下。而便下之。內虛熱入。挾熱自利。肝下垢膩。名曰利膿。宜白頭翁湯。黃芩湯。

要知均自為利。身不熱手足自溫者。太陰。身體四逆者。少陰、厥陰。其餘身熱下利。皆屬陽經。然陰利有反發熱。或初病無熱。利後卻熱。或初得病即身熱。雖而自利。此陰利。非陽傳陰經之利。詳見後段發熱證。

又有大便祕五六日。以藥利之。利遂不止。用極熱劑方瘥。陽有利。陽有祕。當更以他證別之。

外熱內煩。下利止渴。或痞或痛或嘔。當法多用黃芩湯。半夏瀉心湯之當。或溫膽湯加入黃連。其中枳殼去取在人。

諸陽發熱。已見前三陽經。陰不發熱。惟少陰能發熱。然少陰發熱。有二證。初得病即見少陰證。發熱惡寒。頭不疼。宜麻黃細辛附子湯。（少陰病始得之。反發熱者。多在表。宜此湯。）

若下利清穀。身熱躁擾。裏寒外熱。仲景謂之反發熱。此乃陰盛隔陽。宜四逆湯。附子理中湯。蓋陽氣傳陰經而下利者。乃是熱利。陽陷入裏。外所以無熱。陰氣入陰經而下利者。乃是裏寒。自利。寒既在裏為主。則陽氣必客於外。所以外反熱。要知陰陽二證。發熱自是不同。發於陽而發熱者。頭必移。發於陰而發熱者。頭不痛。此為驗矣。

汗下後發寒熱。又發汗後只惡寒者為虛。虛乃表虛。發汗後只惡熱者。是裏虛。發汗後有病無熱。利後卻熱。或初得病即身熱。雖而自利。此陰利。非陽傳陰經之利。詳見後段發熱證。

又有汗下後陰陽不相人。水火不相濟。致餘熱未退。不可更用冷藥。內外俱未可攻。宜小柴胡加大黃一錢。已虛。虛能生熱。宜小建中湯加當歸一錢。或四君子湯加黃芩半錢。或十全大補湯調其榮衛。虛寒四柱湯與武湯。治之。是邪熱未解。雖經汗下。卻不畏虛。湯養病。宜竹葉石膏湯。

陽氣必客於外。所以外反熱。要知陰陽二證。發熱自是不同。發於陽而發熱者。頭必移。發於陰而發熱者。頭不痛。此為驗矣

熱頭疼項強煩熱鼻乾口渴面嘔宜葛根湯加半夏一錢太陽與少陽合病頭疼腰疼往來寒熱胸脇疼痛面嘔宜黃芩湯加半夏一錢半入生薑五片煎若少陽證俱不係合病嘔而熱者宜小柴胡湯若陽明證具雖潮然有可下之者兼之嘔多猶屬上焦未可遽下宜小柴胡湯若太陽不與少陽陽明合病而獨見太陽證或吐瀉者恐病人胸間素有痰飲傷滯且以二陳湯定之候嘔吐定徐進解太陽經藥若先嘔卻渴者宜猪苓湯先渴卻嘔者宜治胸間有水小半夏茯苓湯渴欲飲水水入卽吐吐已復渴名曰水逆由心經受熱而小腸不利也宜五苓散若少陰不渴而吐或乾嘔者理中湯去白朮加生姜嘔而吐涎沫者吳茱萸湯太陰厥陰間有嘔吐太陰宜理中湯厥陰宜四逆湯並加生姜煎已上陰證乃陰中之陽宜用熱劑陽入陰者能爲利而不爲嘔嘔屬上而近於外也陽之所入者深故利也又有陽證病新差後見嘔別無所因此餘熱在胃脘也宜竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯

大凡得之太陽而嘔者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人初得病太陽證在嘔吐不止藥投暖劑莫能治之知太陽已汗解固當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則合少陽其嘔爲熱用暖劑非矣

（曾見太陽證大嘔因暖吐藥只解表自除）

又記人有初病具太陽證而嘔一家少長患狀悉類進養胃湯八服無不立效此時行之氣適然如此是爲傷寒雜病又非可以正經傷寒律之

面赤分陰陽毒太陽不解陽氣怫鬱令人面赤宜敗毒散下臟故面藏陽而赤此陰證更審有何病在何經用藥施治

仲景謂咳逆爲噦有陰陽二證陰證乃胃寒所生亦有初本是熱因大發汗後復吐下之攻熱太過以致胃寒因寒而咳逆者橘皮乾姜湯或半夏生姜湯咳逆就桔梗枳殼湯中加半夏陳皮等分生姜十片煎亦治陰咳逆陽證咳逆乃胃家熱小柴胡湯橘皮竹茹湯陽咳逆而又兼腹痛者問其前後知何部不利前部猪苓湯後部調胃承氣湯

發黃有陰陽二證陽證發黃留熱蓄在脾胃撥熱與宿穀相搏蒸鬱而黃凡病人身體發熱頭面汗出頸以下都無汗渴飲水漿小便不利通身頭目悉黃身乾無汗溺又不利則熱不外越必蘊蓄而成黃證宜五苓散用茵陳煎湯調或梔子湯調服

又有瘀血一證徧身亦黃但瘀血則發狂大便必黑小腹按之急痛而大便卻自利以蓄血不利小便也宜桃核承氣湯

陰黃乃太陽經中濕體痛發熱身如薰黃終不如陽黃之明如梔子色也當叩其小便之利與不利小便自利此非陽黃之比也當叩其小便之利與不利小便不利大便反快者五苓散

痙有剛痙柔痙又有陰痙陽痙痙有汗爲柔無汗爲剛緣先因傷風又感寒濕致然外證俱能發熱惡寒頸項強急腰背反張或癒擬口噤狀如發癎又如產後角弓反張風痙小續命湯皆可用審是柔痙有汗者桂枝湯加葛根一錢重則附子防風散

痙病證治要訣　卷之二

審是剛痙無汗宜葛根湯若胸滿口噤臥不着席腳攣反張牙不惡寒者大承氣湯

發狂陽證有二陰證有一陽證當血如狂已見發黃條中陽毒發狂躁而狂走妄言叫罵如見鬼狀面赤咽痛鼻如煙煤或身斑如錦或下利赤黃宜陽毒升麻湯陰證乃是病發於少陰不當正發汗將見其惡寒逐漸發之汗因循不止其人亡陽故狂大略與陰極發躁同而陽云亦無此一證當用陰躁之藥加以收汗之劑玉屏風散入熟附子一錢仍外以溫粉摶之或冷汗自出手足逆冷其人狂不止者宜四逆湯

（證見狂亡陽證多死）

腎治傷寒多問其小便利不利赤不赤以別其陰陽亦有小便自利徧數多所出且少色不甚清不可因其利而遽謂之陰必是小便如常清而不赤又無諸陽證方信裏之無熱若病在太陽身體熱太陽屬膀胱未有小便不赤者不可因其赤遽謂之實熱必是小便如灰汁或如陳酒或如血色無諸表證方見其熱已入裏又有因發汗過多津液枯竭以致小便不利或漏而赤腎者往往利之重竭其澤液又陽明病不大便而小便赤澁或誤利其小便則津液愈無胃愈乾燥此又利小便之戒

不得眠陰陽皆有之正病於不得眠者陽明也若少陰當病於欲寐今乃不得眠陰陽俱病也仲景云二三日身熱目瞑鼻乾不得臥者陽明也於前陽明證中求藥少陰下利而渴六七日正病也仲景云二三日身熱目瞑鼻乾不得臥者陽明也於前陽明證中求藥少陰下利而渴六七日欲而嘔心煩不得眠宜猪苓湯若少陰病得之三二日以上心中煩不得眠黃連阿膠湯外有因發汗大過陽氣衰遂成病獲後自不得眠宜溫膽湯或眠而精魂散亂異夢驚悸者溫膽湯尤宜

過胸中煩躁不得眠欲飲水者少少與之其人發渴小便不利者五苓散若因吐下後心煩氣之盡夜不得眠宜黃連解毒湯又有得嘔宜摩臍湯若下後復汗盡夜煩躁不得眠夜則安靜不嘔不渴身無大熱者是汗太過陽氣衰遂成陰證乾姜附子湯外有傷寒已解或因飲食復劇煩悶乾嘔口噪呻吟錯語不得眠宜黃連阿膠湯外有因發汗大病獲後自不得眠宜溫膽湯或眠而精魂散亂異夢驚悸者溫膽湯尤宜

古論鼻衂屬太陽經風寒皆有之既衂而表證仍在於寒當用麻黃湯於風當再用桂枝湯且謂發煩目瞑極者必衂既發煩目瞑豈純是太陽經兼陽明之脈循鼻是太陽陰入陽明汗下俱難若衂已而熱不退者惟升麻葛根湯敗毒散陽旦湯爲穩衂而煩渴飲則吐水先服五苓散次服竹葉石膏湯大衂不止宜茅花湯或黃芩芍藥湯加茅花一撮

若少陰初得病醫誤以正發汗之法致迫血動經妄行而衂其血非獨出於鼻或從口中或從耳目又有陽陷入陰四肢厥逆證見其厥謂寒邪在表從而汗之當下反汗以致動血是謂下厥上竭爲難治先哲云桂枝下咽陽盛則斃正以此也要知汗不出徹爲陽之衂誤發其汗爲陰之衂二者大不同也又云陽盛陰虛汗之則死

寒陰陽皆有之太陽經傷寒病在表故惡寒少陽半在表半在裏亦微惡寒陽明在裏本不惡寒陽明或惡寒者與太陽合病未可下宜小柴胡湯

三陰惟少陰經有惡寒之證太陰厥陰皆不惡寒然少陰惡寒又有二證發於少陰者無熱而惡寒宜溫之屬理中湯四逆湯少陰無熱惡寒似與前太陽經未卽熱一條相似所謂寒未卽熱者爲太陽證具而

未熱耳。此之無熱惡寒。蓋無太陽頭痛等證。知爲少陰也。陽氣傳入少陰者。或惡寒而倦。時時自煩。不欲
眞衣。屬大柴胡湯。
若太陽得汗後。大惡寒者。表虛也。芍藥甘草附子湯。表虛惡寒而筋惕肉瞤者。與武湯。外有太陰自利不
渴。厥陰下利。厥逆。俱或惡寒。太陰宜理中湯。厥陰宜四逆湯。前既言二陰不惡寒。今又言或惡寒。要知太
陰厥陰。皆不惡寒者。必口中不仁。口燥舌乾也。少陰病皆惡寒者。必口中和也。以此別之。合病自虎湯。少陰
附子湯。（仲景云有熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。與此理同。）
身體痛。陽證病在太陽。陰證病在少陰。厥陰。在太陽宜汗。於前本經求藥。自利而身體痛。無熱證者。爲陰
病也。急當救裏。宜四逆湯附子湯。眞武湯。去芍藥加乾姜。或加官桂。如其數。若發汗後身大痛不止。宜小
建中湯。和其榮衛。加以筋惕肉瞤者。眞武湯。外有陰毒身疼。如被杖。與中濕風濕等證。皆能身體痛重。活
人書載之。以詳。茲不復述。
白汗九證。備見活人書。但少陰不得有汗。而或反自汗出。以陽氣衰少。無以固陰液。故汗不當出而出。宜
眞武湯。陽明病法多汗。而或反無汗。如蟲行皮中狀者。以病人久虛。津液竭不能爲汗。宜用黃耆建中湯。
得津液既和。而陽明證仍在。徐用小柴胡湯。若太陽發汗多。遂漏不止。其人惡風。宜桂枝湯加熟附子一
錢。漏汗而筋惕肉瞤。身欲振振擺地者。眞武湯。外有頭汗數證。未欲小便不利。身必發黃。已見前發黃證。
胸脇微痛。但頭汗出。往來寒熱心煩者。小柴胡湯。心下緊滿。無大熱。但頭有汗。此名爲水結胸。以頭汗別
水結證。小半夏茯苓湯。內加茶倍半夏。
白胎舌上微白者。未可便爲熱證。必胎白而厚。其上如刺焦裂破紋。摸之略無小潤。甚或黑胎。方爲熱極。
加以下證悉具。無表裏證。方可用小承氣湯。大柴胡湯亦有病屬陰證。下利清穀。陽氣客於上焦。煩躁引
飲。舌胎如前證。或鼻燕煤。欲去衣被。不可誤以爲陽。附子理中湯。四逆湯治服。
胸脇微痛。但頭汗出。往來寒熱心煩者。小柴胡湯。心下緊滿。無大熱。但頭有汗。此名爲水結胸。以頭汗別
水結證。小半夏茯苓湯。內加茶倍半夏。
白胎舌上微白者。未可便爲熱證。必胎白而厚。其上如刺焦裂破紋。摸之略無小潤。甚或黑胎。方爲熱極。
加以下證悉具。無表裏證。方可用小承氣湯。大柴胡湯亦有病屬陰證。下利清穀。陽氣客於上焦。煩躁引
飲。舌胎如前證。或鼻燕煤。欲去衣被。不可誤以爲陽。附子理中湯。四逆湯治服。
陰陽之病。皆能發厥。故有陽厥。有陰厥。皆病之深也。二厥惟陽厥易誤。當問其初得病如何。若初得病。頭
不痛。四肢逆冷。足多蜷臥。而惡寒。或汗。自引衣蓋覆。或不渴。或利清穀。或小便自調。人多惓惓而靜。此寒
厥也。是爲陰中之陰。宜四逆湯。附子理中湯。若初得病。頭痛身熱。外別有陽證。至五六日方發厥。其人雖
厥。或畏熱。或飲水。或揚手擲足。煩躁不得眠。大便祕。小便赤。多昏憒者。此熱厥也。是爲陰中之陽。宜白虎
湯。或大承氣湯。熱厥。雖手足冷而指甲煖。不若寒厥。并指甲俱冷。此辨陰陽要法也。
近有陽病。自腰以上極熱。兩腳常冷。蓋三陰脈。上不至頭。故頭不疼。三陽脈。下不至足。故足冷也。
咽喉痛。有陰陽二證。而赤。身發斑如錦。唾膿血。而咽喉痛者。此陽毒證。宜陽毒升麻湯。手足厥冷。或吐利
而咽喉痛甚。此少陰證。宜通脈四逆湯。於中加桔梗一錢。
又有非是暴寒中人。伏氣於少陰。經旬月方發。先咽痛而次下利。宜半夏桂甘湯。謂之腎傷寒。此證人
亦有初得病。頭痛發熱。無陽毒少陰諸證。而咽喉自痛者。此因感冒後。頓厚衣被。或用發法。服生姜熱酒

裏實宜下。調胃承氣湯。熱躁甚而妄言不休。大渴喜冷。宜理中湯。陰隔陽宜溫脾湯。四逆湯。附子理中湯。又有不係正陽明。假困非困。間時有一二聲譫語者。當隨證施治

外有已得汗。身和而言妄者。此是汗出後。津液不和。懵不可下。乃非陽非陰者。宜小柴胡湯。和建中湯各半貼。和榮衛。通津液。若陽傳入陰。自利。手足厥逆。語或錯亂。此雖已自利。其中必燥屎。猶當下之。陰中之陽。宜調胃承氣湯。瘀血在裏。大便黑。小便利。小腹痛。其人如狂。譫語者。桃核承氣湯。婦人傷寒發熱。經水隔斷。此熱入血室。其血必結。亦能譫語。宜小柴胡湯。病後血氣未復。精神未全。多於夢寐中不覺失聲如鬾。此不係譫語。鄭聲。宜溫膽湯。去竹茹。入人參半錢。或用六君子湯。

多寐四證。風濕多寐。見活人書。不可更發汗。宜敗毒散。加陽經。

久不得寐。一旦欲寐。別無餘病。此爲陰陽和而愈也。若少陰得病。但欲寐者。急投四逆湯。

外有狐惑。忽忽喜寐。當於活人書求之。

小便難。須別陰陽。經云。陰虛則小便難。然陰虛則陽必湊之。於小便故難。而其色赤黃者。爲陽所湊。中有熱也。是陰血虛。不足以勝陽氣。則陽盛而便難。宜五苓散加滑石末。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。四肢微急。難以屈伸。而小便難者。是陽氣虛。不足以固陰液。則液乾而便難。宜桂枝湯加熟附子一錢。或更加茯苓。又有陽明短氣。腹滿。脇下及心痛。鼻乾。不得汗。身黃。小便難。潮熱而嚏者。小柴胡湯加茯苓一錢。經云日晡所發潮熱者。胃家實也。此屬陽明當下證。然亦有每至晡時發熱。五更復退。而大便自利。用藍附辛熱劑而愈。豈可以日晡潮熱。遽謂之陽。遽謂之實。要須以他證參之。愈曾治患人沈其姓之子。乃所親見而親試者也。

三陽有頭痛。三陰無頭痛。此論古矣。然陰間有頭痛。厥陰循喉嚨之後。與督脈會於顚。陽間不頭痛。似非正法。曾治隣婁范家。身熱。頭略不痛。進小柴胡湯八服纔愈。亦不可不知。諸病已解。無別證。但頭疼者。加茯苓。又有陽明短氣。腹滿。脇下及心痛。鼻乾。不得汗。身黃。小便難。潮熱而嚏者。小柴胡湯加茯苓一錢。經云日晡所發潮熱者。胃家實也。此屬陽明當下證。然亦有每至晡時發熱。五更復退。而大便自利。用藍附辛熱劑而愈。豈可以日晡潮熱。遽謂之陽。遽謂之實。要須以他證參之。愈曾治患人沈其姓之子。乃所親見而親試者也。

三陽有頭痛。三陰無頭痛。此論古矣。然陰間有頭痛。厥陰循喉嚨之後。與督脈會於顚。陽間不頭痛。似非正法。曾治隣婁范家。身熱。頭略不痛。進小柴胡湯八服纔愈。亦不可不知。諸病已解。無別證。但頭疼者。加茯苓。又有陽明短氣。腹滿。脇下及心痛。鼻乾。不得汗。身黃。小便難。潮熱而嚏者。小柴胡湯加茯苓一錢。經云日晡所發潮熱者。胃家實也。此屬陽明當下證。然亦有每至晡時發熱。五更復退。而大便自利。用藍附辛熱劑而愈。豈可以日晡潮熱。遽謂之陽。遽謂之實。要須以他證參之。愈曾治患人沈其姓之子。乃所親見而親試者也。

犯陽明之類。不皆始於太陽也。亦有首尾止在一經。不傳他經。亦有止傳一二經而止者。不必盡傳諸經也。至如病之淪越。不可泥於次序。當隨證施治。所以傷寒得外證爲多。仲景云。日數雖多。有表證者。猶宜汗。日數雖少。有裏證者。卽宜下。

右論少陽居陽明之次。此以五行生尅論。若謂陽主生。則水生木。太陽膀胱陽水。合傳之少陽膽木。膽木在表。少陽表裏之間。陽明在裏。自外漸入內。次第正當。如此。果如傷寒論中所說。一日太陽。二日陽明。三日少陽。豈可第二日病在裏。而第三日方半表半裏者乎。恐倒不能輒反其說。然於心終所未安。

傷寒六日。或七日。若一手有脈。若兩手俱無。此欲成候也。宜半夏瀉心湯。或生姜瀉心湯。此合病之劑。

傷寒有傷寒雜病。有傷寒正病。傷寒雜病者。難以正病治。如病人證狀不一。有冷有熱。陰陽顚在目前。當就其中大節先治。徐治其餘證。然亦不可用獨熱獨寒之劑。又如嘔渴煩熱。進小柴胡湯。嘔渴煩熱者止。而下利不休。以小柴胡湯爲非。則嘔渴煩熱不應止。以爲是。則下利不應見。吐利厥逆。進附姜湯。吐利厥逆止者。而熱渴證候昏不知人。以姜附爲非。則吐利厥逆不應止。以爲是。則熱渴證候不應見。此亦傷寒雜病。雖無前項冷熱二證。顯然並見之跡。而陰中有陽。陽中有陰。潛伏其間。來卽發見。用藥一偏。此衰彼盛。醫者當病有可疑之處。能反覆體認。無致舉一廢一。則善矣。

傷寒有壞病者。緣已發汗吐下。仍不解。爲壞病。如或病中。又或寒熱異氣。若重感於寒。則先熱後寒。而爲溫。虛重感於風。則四肢不收。頭疼身熱。當自汗出而爲風溫。重感溫熱。則身發斑。爲病最重。而爲溫毒。至此。則經候傳變。無復紀綱。皆名壞傷寒。當活人書中本病而治之。

傷寒要緊處。在分表裏。而爲汗下。有病人自汗自下者。有醫用藥汗之下之者。中間節目頗多。汗藥宜早。下藥宜遲。此亦大綱之論耳。且如失血家不可發汗。淋家不可發汗。如此等類。豈宜遲用表劑。當徐徐解散。

苟或不當汗而強汗。則津液耗竭。變生百病。因茲夭傷。豈可一以汗藥宜早爲說。陽明汗出而多。宜急下。少陰下利而渴。宜急下。厥陰舌卷縮。宜急下。如此等證。當速用利下之劑。苟或當下而不下。則熱毒傳深。遂致失下。不可救療。豈可一以下藥宜遲爲說。

又發汗法。但欲遍身濈濈。不欲如淋漓下之法。進一服後。如人行十里許未遍。方進次服。已遍之後。服不必盡劑。傷寒用藥。不可輕易解表。雖當用麻黃桂枝。亦且先用葛花朴朮。如和解散。葛花香薷飲加香朮之類。攻裏雖當用大承氣。大柴胡。且先用小承氣。小柴胡。又陰證雖合用四逆湯。且用三白湯。庶不失古人並敵之意。若證候已危。不可失機。勿拘此說。

傷寒有陰證而頭或移。未有正陽證而頭略不移者。有陰證而反發熱。未有正陽證而身不熱者。有陰證而或小便自赤。未有正陽證而小便不赤者。此當正法也。

感冒爲病。亦有風寒二證。卽是傷寒外證。初感之輕者。故以感冒名之。若入裏而重。則是正傷寒。初感卽有微惡風。微發熱。起居飲食自如。當其躁擾。謾用冷劑。徐害非輕。不可不審也。

藥與前項太陽證亦同。今病人往往忽言傷寒。不知輕則爲感。重則爲傷。又重則爲中。有其病而諱其名。甚爲無義。特以俗呼爲大病。故諱言之耳。

仲人發熱提寒。身疼頭痛。醫謂太陽證。以五積散表之。六日後。發渴譫語。大便自得。病竟不遁。用小柴胡湯。繼以大柴胡湯。得利後。忽四肢逆冷。舌卷囊縮。氣息喘急。而晝睡臥。用與武湯。利不止。而病如故。遂用附子理中湯。四逆湯。方得利止。手足稍温。當夜貼然。次日忽又發熱。譫語口渴。小便赤痛。又經六七日。大便仍復不通。再用調腸湯。通得大便。而諸證不減。後來只用温膽湯。加人參。及減桂五苓散。久而漸愈。此病用涼藥則陰勝。隨手輒變。皆是用之過也。若四逆之後。陽證仍復。醫苟不審。再用大柴胡承氣之屬。必又復爲陰。所以終收功於温膽湯五苓散。以全穩故也。故知爲用藥太過之戒。

春病曰温。夏病曰熱。不出此諸證。但因時而異其名耳。其時有不正之氣。感襲於人。因得時氣之名。今俗總呼爲傷寒。只是天氣尚熱。古人有用熱遠熱之戒。桂枝湯宜加黄芩。名陽旦湯。五積散宜加石膏升麻知母。其真武湯。乃陰證之先劑。或未敢遽用熱附。則不若生附爲穩。或半生半熟。若其人多痰。附子尤宜生用。寒常感冒。和解散。香蘇飲。或可加芩連。不換金正氣散。普賢正氣散。對金散子。養胃湯。皆是兩手表散之劑。解肌熱。及上焦熱。參蘇飲。敗毒散。百解散。十神湯。

病之不同。不可不別。

北人初得病。以蒼朮麻黄並用相半。爲發汗第一義。穀壘壯熱。便用防風通聖散。南北殊俗。其真受素質故也。

會記一老成人言。感冒服發汗藥。得汗證候盡除。只身熱未退。再用熟藥。而熱仍在。表裏都無別病。温涼汗下。俱所不可者。宜進養正丹四五十粒。病愈後。別無他證。只微熱未盡除。其人脾氣久虚。欠調理。脾主肌肉。故生餘熱。燥補不可。宜用理中湯。加蜜一匙頭許煎。

元是陽證。因汗下大過。遂變成陰。便當作陰證治。御不可謂其先初是陽。拘拘於陽傳陰之說。乃是三陽壞證。轉爲陰也。此爲陽之反。而非陽之傳。

有感人感冒發熱。纔得一日。熱不爲久。又不爲重。便見譫語。此乃虚不禁熱。不可遽用十分冷劑。三陰頭痛。非是正病。然陰盛隔陽者。亦有頭疼。以其病本在陰。而陽又爲陰所病。故亦見陽證也。

有元是陽證。因冷劑太驟。遂見下利不止。而諸陽證仍在。略不少衰。此當以煖藥固其下洞。稍定。又宜醫證治之。不可用熱。初病是陽。經見頗移。以次陽傳入陰。頭略不移。不可便謂不移爲陰證。須問其得病之初。頭疼與否。

有汗下而熱不退。多用涼肌藥。而又不退。動至半月。或雖旬者。乃是陽氣雖經。不能復還。客於皮肉之間。病此甚衆。此當調補收斂之。不可用辛熱重劑藥。又病六七日。候至裏熱作汗之時。反太躁擾。復得汗而

解。益緣候至之時。汗已成而未徹。或者當其躁擾。誤用冷劑。徐害非輕。不可不審也。

有微惡風。微發熱。起居飲食自如。當其躁擾。謾用冷劑。徐害非輕。不可不審也。

宜神朮散。有陽證下後。熱退脈平。而神思恍惚。悸悸不知痛癢處。不省人事。如癡如狂。不可謂其爲虚妄投猪劑。只一味參湯。或不藥自愈。

陽證身熱。而胸膈痞塞者。誠梔梗枳殼之半。前胡柴胡是其數。

傷暑

傷暑必自汗背寒。面垢。或口熱煩悶。或頭疼發熱。神思倦怠。胸悶。所謂暑傷氣。而不傷形。是也。但身體不痛。與感風寒異。宜香薷飲。六和湯。香薷湯。

嘔而渴者。被冷香薷湯。或五苓散。兼香薷湯。嘔不止者。枇杷葉散。去茅根。香薷復丹。嘔而痰。卻暑散。香薷圓。或小半夏茯苓湯。或消暑飲。

瀉而渴者。生料平胃散。和生料五苓散各半貼。名胃苓飲。間進來復丹。此丹本非治瀉之藥。惟施之暑瀉則宜。然瀉甚亦不可用。瀉定仍渴。春澤湯。或縮脾飲。傷暑心頭痞悶。人皆謂暑毒攻心。不知有暑卽有痰。痞悶者痰爲之也。

盛暑途中。倉卒無水。渴甚。急嚼葱頭二寸許。抵飲水二升。

瀉而復痛。有積者。生料五苓散。藿香正氣飲。勻各半貼。若瀉雖無積。其腹痛甚。生料五苓散。或六和湯。加木香半錢。或不加木香。止與二藥。煎熟去滓。調下蘇合香圓。

又有不渴而腹乾痛者。六和湯煎熟。調蘇合香圓尤宜。

瀉而發熱者。胃苓飲。瀉而發渴者。胃苓飲。兼進縮脾飲。瀉渴兼作。未遽者。湯化蘇合香圓。作來復丹。未白湯調下。已遽者。香薷飲。或胃外發熱者。六和湯。香薷湯。香薷飲。身熱頗者。胃苓飲。加黄連一錢。熱而汗多。煩甚者。生料五苓散。熱而渴者。五苓散。兼進縮脾飲。暑氣攻裏。熱不解。心煩口乾。辰砂五苓散。或香薷飲。加黄連一錢。若大渴不止。辰砂五苓散。或香薷飲。加黄連一錢。

暑氣攻裏。腹內刺痛。小便不通。生料五苓散。加木香七分。

冒暑飲酒。引暑入腸。內酒熱與暑氣相并。發熱大渴。小便不利。其色如血。生料五苓散去官桂。加黄連一錢。五苓散去桂。香酒煮黄連圓。

暑氣入腸胃而小便艱澁不通者。加味香薷飲。仍佐以三黄圓。

暑氣入心。身煩熱而煩者。宜辰砂五苓散。或香薷飲。加黄連一錢。

傷暑而傷食者。其人頭移背寒。自汗發熱。畏食惡心。嘔酸臭氣。胸膈痞滿。六和湯。倍砂仁。

若因暑渴飲食冷物。致內傷生冷。外傷暑氣。亦宜此藥。暑氣所入。各從其類。小湯爲心之腑。利心經暑毒。使由小腸中出。五苓散利小便。爲治暑上劑也。

有傷於暑。四面寒風。又爲冷氣所入。其人感暑復感冷。自汗怯風。身移頭痛。去衣則凍。著衣則煩。或已發熱。或未發熱。並宜六和湯。內加扁豆砂仁一方用藿香。一方用紫蘇。正治已感於暑。而復外感於風寒。或內傷生冷。以藿香紫蘇。兼能解表。砂仁扁豆。兼能溫中。然感暑又感冷。亦有無汗者。只宜前藥。若加以感風。則頭然多汗。審是此證。宜生料五苓散。內用桂枝爲佳。市井中多有病往往冒熱經久。夜間開戶納風。欲取清涼。失蓋不覺。用藥所當詳審。有此證而發潮熱。似瘧。猶未成瘧者。六和湯。養胃湯。各半貼。相和煎。有此證而鼻流清涕。或鼻孔熱氣時出。六和湯加川芎半錢。羌活七分。

有因傷暑。遂極飲以冷水。致暑毒留結。心胸精神昏憒。語音不出。煎香薷湯。化蘇合香圓服。

有因傷暑。用水沃面。或入水洗浴。暑濕相搏。自汗發熱。身重。小便不利。宜五苓散。

傷暑而大汗不止。甚則眞元耗散。宜急收其汗。生料五苓散倍官桂。或加黃耆如朮之數。此亦古法也。

傷暑自汗。手足厥冷者。煎六和湯。調蘇合香圓。

傷暑自汗。手足時自搐搦者。謂之暑風。線已傷於暑。毛孔開。而又邪風乘之。宜香薷飲。或香薷湯。並可加羌活一錢。痰盛者六和湯半貼。和蘇合香散半貼。

暑月身痒如針刺。間有赤腫處。亦名暑風。末子六和湯。並香正氣散。各半貼。加全蝎三箇。

有毒暑客於上焦。胸膈痞塞。湯藥至口即出。不能過關。或上氣喘急。六和湯倍冷。調入麝香少許。

伏暑煩渴。而多熱痰者。於消暑圓中。每兩入黃連末二錢。名黃連消暑圓。或二陳湯。或小半夏茯苓湯。並可加黃連一錢。暑氣久而不解。遂成伏暑。內外俱熱。煩躁自汗。大渴喜冷。宜香薷飲加黃連一錢。糯進白虎湯。若服藥不愈者。暑毒深入。結熱在裏。證語煩渴。不顧去近衣。大便祕結。小便赤澁。當作熱病治。可於

傷寒陽明證求藥。

傷濕附

傷濕爲病。發熱惡寒。身重自汗。骨節疼痛。小便祕澁。大便多泄。腰腳痺冷。皆坐臥卑濕。或冒雨露。或着濕衣所致。並除濕湯。

又前諸證。而腰痛特甚。不可轉側。如經五六日重。皆由濕氣入腎經。腎屬水。從其類也。宜腎着湯。或渗濕湯煎服。

小便祕。大便溏者。尚書。雨淫腹疾者是也。五苓散。香戊巳圓。戊巳屬土。土能蒐水。因以得名。五苓乃濕家之要藥。經云。治濕不利小便。非其治也。義蓋取此。

傷濕而兼感風者。既有前項證。而又惡風。不願去衣被。或額上微汗。或身體微腫。汗清衣濕。當風坐臥。多有此證。宜除濕湯。桂枝湯各半貼。和服。合微發汗。若大發其汗。則風去濕在。已得汗而發熱不去者。敗毒散。加荊芥一錢。防風半錢。

傷濕又兼感寒。有前諸證。但無汗。慘慘煩痛。宜五積散。和除濕湯各半貼。微發汗已。仍復熱而渴者。除濕

湯煎服。

傷食

傷食之證。胸膈痞塞。吐出宿酒。香冒眩暈。頭痛如破。宜冲和湯。半夏湯。加神麥。煙各半錢。冲和湯。加半夏一錢。茯苓七分。或理中湯。和縮脾飲。酒渴縮脾湯。或煎乾葛湯。調五苓散。久困於酒。途成酒積。順痛泄瀉。或暴飲有灰酒。亦致然。並宜酒煮黃連丸。多飲結成酒癖。腹中有塊。隨氣上下。冲和湯。加蓬朮半錢。酒停胸膈。爲痰飲。香。

傷食兼感風寒。其證與前同。但渾身疼一證。俗謂之夾食傷寒。宜生料五積散。或養胃湯。香蘇飲。和解散。

傷食不痊。而病入裏者。用瀉。少見諸傷門。傷寒證。食蟹。太過。致傷。一味丁香。足以治之。有飲食不節。傷以致半身不遂。狀如中風。不可作風治。蓋人之飲食。下咽而入肝。由肝而入脾。由脾而入胃。因食所傷。食不理。故痰涎壅塞。若中風然。亦有半身不遂者。肝主筋。故也。治以風藥則慢矣。宜用消食之劑。其中木瓜散。卻不可妄下之。食毒物。非時物。多病。此不傷脾。不傷胃而傷肝。病不在下。故不可妄下。

傷內傷。選。食肝當

秘傳證治要訣卷之三

諸氣門

七氣

七氣致病。雖本一氣。而所以爲氣者。隨證而疑。三因方論最詳。喜怒憂思悲恐驚。謂之七氣。所傷有小疾。在咽喉間。如綿絮相似。咯不出嚥不下。並宜四七湯。未效。進丁沉透膈湯。審知是思慮過度。宜四七湯。去伏苓。加半夏如數。仍加石菖蒲人參各半錢。審如聲怒成疾。面色青黃。或兩脇脹滿。宜調氣散。或四七湯。加枳殼木香各半錢。因驚恐得疾。心下憧忡者。見驚悸門。外有七氣眩暈者。當於諸中門中氣證收藥。

痞塞 附噫膈

諸痞塞。及噎膈。乃是痰爲氣所激而上。氣又爲痰所膈而滯。痰與氣搏。不能流通。並宜用二陳湯。加枳實縮砂仁各半錢。木香一錢。或五膈寬中散。應諸痞塞脹滿。胸膈不利。或氣上逆。或腹脇痛。並宜木香流氣飲。應膈上諸般冷氣。不問痞塞。及脇痛。且與姜汁一二盞。痰飲尤宜。

邪氣作痞。宜用辣劑。若氣不順。逆上爲痞。此乃虛痞。愈辣而痞愈作。宜於收補中。微有辣遣之意。不可干分用香劑。古方戒嘗後脇痞。用理中。卽此意也。

因七氣所傷。結聚成疾。痞塞滿悶。宜四七湯。或導痰湯。加木香半錢。或下來復丹。因冷氣濁唾中痞。痞塞。並可用搗脾湯。加丁香。或丁沉透膈湯。因食痞塞。見諸傷門。傷食証。氣虛上逆。逆成痞塞而脇者。六磨飲。若黑錫丹。

若痞塞服諸藥不效。大便不甚通者。宜感應丸。加巴豆或半械丸。備急丸。木香檳榔丸通之。

若怒痞塞。見本門七氣証。諸五噎五膈。並宜五膈寬中散。不效。若神加禾散。商陸塞諸藥。皆可選用。噎膈胃脘水漿不入。藥食皆不下。食入口卽吐者。當鎮陰之。宜獨滑石散。或滑石湯下養砂丹。仍以蓋禾散作末。乾點服。

積聚

五臟之積曰五積。六腑之積曰六聚。積有定形。聚無定處。不問何經。並宜十味大七氣湯。吞下。尊貴紅圓子。須日數服。木香檳榔去氣積。神麴麥蘗去酒積。茯苓水蛭去血積。礞石巴豆去食積。牽牛甘遂去水積。雄黃膩粉去涎積。硇砂水銀去肉積。各從其類也。

有飲癖結成塊。在腹脇之間。病類積聚。用破塊藥。多不效。此當行其飲。宜導痰湯。何以知爲飲。其人先曾病涎。口吐涎沫。清水或痰多痰者是也。

又多飲人。結成酒癖。腹肚積塊。脹急疼痛。或全身腫滿。肌黃少食。宜十味大七氣湯。用紅酒煎服。

肝積在左脇下。狀如覆杯。或如弩。或嘔逆。或痛在兩脇。牽引小腹。是實轉筋。久則如瘧。名曰肥氣。宜大七氣湯。如桑白皮半夏杏仁各半錢。

心積起臍下。直至心。大如臂。腹熱咽乾。心煩甚。則吐血。名曰伏梁。宜大七氣湯。加石菖蒲半夏各半錢。

脾積在胃脘。大如覆杯。痞塞不通。背痛心疼。饑減倦見。腹滿吐泄。是腫肉消。久則四肢不收。名曰痿氣。宜大七氣湯。下紅圓子。

腎積發於小腹。奔上至心。上下無時。如奔豚走。饑見飽減。小腹急。腰痛口乾。日晡骨冷。久則骨痿。名曰奔豚。宜大七氣湯。倍桂。加茴香炒練子肉各半錢。

若腹中似有癖瘕。隨氣上下。未有定處。宜散聚湯。

若氣作痛。遊走心腹間。攻刺上下。隱若雷鳴。或已成積。或未成聚。有正當積聚處。內熱如火。漸漸遍及四肢。一日數發。如此二三日又愈。此不當攻其熱。

又有元得熱病。熱留結不散。遂成癥癖。此卻當兼用去熱之劑。

有病癥瘕腹脹。純用三稜莪朮以酒煨服。下一物如黑魚狀。面愈。或加入香附子用水煎。多服取效。

又有病此者。用姜蘇湯。吞六味圓。六味者。乃小七香圓。紅圓子。小安肾圓。通劑圓。三稜煎。理中圓。六件等也。

陰癪氣

一核偏墜。或俱肿脹。或一核縮入小腹。痛不可忍。用手按捺。方得還復。是爲癪氣。宜蟠葱散。吞下茱萸內消丸。若未愈。宜澄茄散。下大茴香丸。

若人小腸不通。宜木香丸半貼。以通潤之。卻以塊貓十箇。去足頭翅。對碎同炒。去貓出火毒。濃煎燈心湯。調五苓散下五七十丸。或用燈心葱。入水酒內煎。去燈心葱。調五苓散。若痛入腹。逆上攻心。至放嘔逆。先用鹽酒下養正丹。次用生料五積散。加吳茱萸茴香桃仁玄胡索各炒入半錢。有因登高擲傷外核。以致腫墜。或小便出血。或小便不通。宜五苓散。和復元通氣散服。有陰癪大如斗。諸藥不能効者。宜當歸四逆湯。加生姜茱萸。數復疼甘用之効。

手氣

手氣。手腫痛。或在掌指連臂脚。並五痹湯。鐲痹湯。

小腸氣

氣因塞聚爲疝。血因塞聚爲瘕。卽是疝氣。今謂之橫弦緊弦。統瞬走注。小腹疼痛。宜蟠葱散。吞下茱萸內消丸。或鹽酒調異攻散。

不問何證。皆可用生料五苓散。加炒茴香半錢。或一錢。服藥未効。大痛攻刺不已。陰縮。手足厥冷。宜香附子。炒鹽。乘熱用紙裹熨臍下。若大小腸不通者。五苓散加柱下青木香丸。

初發或頭疼身熱。或增寒壯熱。並宜參蘇飲。加木香。有逆上攻心。下不發痛。而見心疼者。宜以生韭搗取自然汁。和五苓散爲丸。茴香湯下。亦於心痹疼證中五言之。有腎氣繼動。心氣亦發。上下俱疼者。宜異攻散。吞茱內消丸。或且專治下。下痛定。則上痛定矣。

有腎氣逆上。痰涎壅塞。迷悶。宜腎逆散。吞養正丹。凡人忽患胸背手足、頸項腰膀、痛不可忍。連筋骨牽引。痛。坐臥不安。走易不定。俗醫不曉。謂之走注。用風藥及針灸。非也。又疑風毒結聚。欲成癰疽。妄以熨貼。亦非也。或頭痛不可舉。或神意昏倦。多睡。或飲食無味。痰唾稠粘。夜間喉中如鋸聲。多流涎唾。手足重腫。痹冷。脈不通。誤認爲癱瘓。亦非也。凡此乃是痰飲頑涎。伏在心脇上下。變爲此疾。於後倣此。或飲酒過多。及食熱物而吐。先用茅花湯。吐盡。甚則埋中湯加乾葛川芎各半錢。或北川芎。不必乾葛。或於

秘傳證治要訣卷之四

諸血門

鼻衄

鼻通於腦。血上溢於腦。所以從鼻而出。凡鼻衄。並茅花湯調止衄散。時或以蘿蔔汁滴入亦可。茅花白爲藥對半。尤穩。

諸失血而發熱甚者。難治。十値可一二全者。

有頭風纔發。則自衄不止。宜芎附飲。間進一字散。

有因虛致衄。此爲下虛上盛。不宜過用涼劑。宜養正丹。及紫雪丹。仍佐以四物湯。芎歸湯。膿沉香服。

傷濕面衄。腎著湯。加川芎名除濕湯。

傷胃致衄者。名爲酒食衄。擬撰致衄者。名爲折傷衄。外喜怒憂思諸氣。上脘極熱而衄者。金沸草散。去麻黃半夏。加茅花如荊芥數。或用黃芩補肺湯。

現中湯去乾姜用乾葛或只依本方并芎不必加或止用乾姜甘草二味
擬而證不止蘇合香丸一圓或以小烏沉湯一錢白湯調下或煎濃蘇湯獨調小烏沉湯或稍入黑神散
一錢隨湯調下亦得仍慕然以水噴其面使戚懼則止小烏沉濃蘇湯調非特擬而證而五竅出血皆治
不因擬而證者亦治諸竅血皆可以水沃噀懼則血止
曾病衄愈後血因復路一月或三四衄又有洗面而衄曰以爲常此卽水不通借路之意並宜止衄散茅
花煎湯調下或四物湯加石菖蒲阿膠蒲黃各半錢煎熟調火煨石榕末一匙頭許兼進食正丹前諸證
服不效大衄不止者養正丹多服仍佐以蘇子降氣湯使血隨氣下
衄後頭痛四物湯或芎歸湯十全大補湯
伏暑而衄者茅花湯調五苓散伏暑吐血者亦治有先因衄血衄止而變生諸證或寒熱間作或喘急無
寐病狀不一漸成勞瘵當於虛損諸證詳之後吐血同上治法

舌衄

舌衄梔花爲末摻之或麥門冬煎湯調妙香散

肌衄

血從毛孔而出名曰肌衄以男胎髮燒灰摻之

牙宣即齒衄

牙宣有二證有風壅牙宣有腎虛牙宣風壅牙宣消風散擦之仍服腎虛牙宣以腎主骨牙者骨之餘虛
加上炎故宣服涼劑而愈甚者此因腎經下虛上盛宜鹽湯下安腎丸間黑錫丹仍用鹽炒香附黑色
爲末揩擦其妙不可言也

吐血

吐血者血從入濁道留聚腸胃滿則吐血名曰內衄宜蘇子降氣湯加人參阿膠各半錢下養正丹濕痰
血傷能令吐血腎著湯加川芎名除濕湯此乃濕毒鬱於經絡血溢妄行從鼻則衄衄行清道吐行濁道
流入胃腑令人吐血妄行於上或吐或咯或嗽用琥珀効者固多有之宜擇末藥中入此一味或煎藥去
滓可調服
一吐血咯血炒蒺藜紛和小烏沉湯白湯點服吐血不止者菜頭搗汁呷之咯血者每日空心進一二呷
入側柏一兩沙參一兩焙研末入飛麵二錢調如稀糊啜服
上膈壅熱吐血四物湯加荊芥阿膠各半錢更不止於本方中加大黃滑石各半錢或降氣湯吞木香檳
榔丸從大便導之此實熱則可虛勞則不可
吐甚頓暈發爲寒熱者降氣湯加四物湯各半貼加阿膠一錢若單單發熱者秩苓補心湯
胃傷吐血宜理中湯加川芎乾葛倶各半錢或只依理中本方加川芎扁豆尤好不必乾葛若渴甚用葛
打損惡血滲入胃中以致吐血宜先進蘇合香丸仍以黑神散和小烏沉湯量便調治夏月伏暑吐血茅

花湯調五苓散有因勞力太過吐血不止蘇子降氣湯加人參半錢煎
有時或吐血兩口隨卽無事數日又發經年累月不愈者宜黑神散和小烏沉湯各一錢或新掘生地黃淨洗生姜少許搗汁去滓溫進又有以生姜一片四面醮百草霜含嚥如
爲血潮四物湯十全大補湯益胃氣虛寒用之吐血後血止而變生諸證者見衄血證

咯血

咯血不嗽而咯出血也初得病且宜白扁豆散加入生地黃藕節各半錢尤佳及濃磨京墨調黑神散小
烏沉湯各一錢或新掘生地黃淨洗生姜少許搗汁去滓溫進又有以生姜一片四面醮百草霜含嚥如
百草霜已淡吐出再醮如姜已無味則吐出易之嗽血亦治
勞瘵吐咯血七珍散加阿膠醬歸各半錢蜜酯人更加百藥煎半錢仍調鍾乳粉尤佳一味鍾乳粉用糯
米飲調吐血嗽血亦治因飽屈身傷肺吐血者白茯枇杷丸或白茯蓮須散

嗽血即肺癰

熱壅於肺能嗽血久嗽損肺亦能嗽血壅於肺者易治不過涼之而已損於肺者難治已久成勞也熱嗽
有血者宜金沸草散加阿膠半錢勞嗽有血者宜補肺湯加阿膠白茯各半錢嗽血而氣急者補肺湯加
阿膠杏仁桑白皮各半錢吞養正丹或蠟砂丹或三砂丹間進百花膏嗽血肺損蘆薈仁十兩杵碎水三
升煎取一升入酒少許分二三次服或以蘆薈仁研細末煮豬肺白撰食之豬心一箇竹刀切開勿令相
離以沉香末一錢重半夏七箇入在縫中紙裹醃小便內令溫煨熟取出去半夏只吃豬心此方嗽血吐
血均治熱嗽咽疼痰帶血絲或痰中多血其色鮮者並宜金沸草散若服涼劑不愈其色猶者此非熱證
宜杏子湯肺癰爲病胸痛喘滿咯嗽濃血腥臭異常久則唾出如粥或口燥咽乾皆由肺氣不通以致熱
血凝滯蓄結宜千金內補散去官桂和補肺湯半貼煎服或金沸草散去麻黃加桔梗如數或更加桑白
皮枇杷葉仍用杏仁去皮尖研成膏入百藥煎末圓如彈子大含化四和膏亦可

小便血見大小腸門本證

痛者爲血淋不痛者爲尿血血淋別見後大小腸門淋閉證尿血先與生料五苓散和四物湯若服藥不
效其人素病於色者此屬虛證宜五苓散和膠艾湯吞鹿茸圓或附子八味圓或辰砂妙香散加五苓散
吞二項圓子若小便自清後有數點血者五苓散加赤芍藥一錢亦有如砂石色紅卻無石淋之痛亦屬
虛證宜五苓散和膠艾湯或五苓散和辰砂妙香散吞鹿茸圓八味圓玉壺腫痛其證不一有通身水氣
癰壅俱腫者此當求之諸氣門水腫氣證以治水之法腎風痒抓搔過傷以致腫疼此當求之瘡毒門癤
風證癰風愈則腫自消有妬精傷瘡用乾瘡之藥太緊毒氣未散蘊結成腫有服金石秘澁之劑精氣壅
遏不能宣揚或試緊蝨之方取一時之快不知熱毒反着自身倶能爲腫有血氣凝滯陰癤關竅道閉塞
致使壅腫近俗戲名吹大或緣忍溺而得下三證並宜煖心湯調五苓散服餌以滌其內荊芥甘草木通
煎湯淋洗以宣其外
淋痛五淋者血石氣膏勞是也血淋溺中有血石淋溺中有砂石之狀其溺於盆也有聲此卽是精氣結

成砂石以溺俱出氣淋氣鬱所致小腹有若膀胱氣之狀宜淋上如脂窩狀勞淋病在多色下元虛憊清濁不分宜氣不行鬱結而爲淋或勞心過度火不得其養小腸爲心之腑腦病而腑與俱病或心腎不交腎之不温津道閉塞或出汗大過或失血太多津道欲枯竭皆成勞淋五者得名而不及熱則冷何哉蓋五者皆有冷有熱血有熱血有瘀血氣有熱氣有冷氣勞有虛冷有虛熱若與湯藥過差精不由其道妄行不禁與溺俱出此乃熱劑之傷未可槩以爲冷也治淋之法除的然虛冷之外其餘諸證若用本類藥不効便宜施以調氣之劑蓋津道之逆順皆一氣之通塞爲之也如木香流氣飲御爲的當其中自有木通麥門冬腹皮滑比如不効但宜投以益血之方蓋小便者血之餘也血苟充滿則溲溜下過自然流通如火府丹白御爲的當其中有地黄滑然此非特言血淋氣淋一應淋皆可用猶不可用之虛冷耳淋病小便之色多是見赤未可便以赤爲熱氣道蘊結故如此爾

便血不止者用松楊柿一箇燒存性研末米飲調下即愈

破傷血見瘡毒類攷證

大便血見大小腸門本證

指毒血見瘡門本證

秘傳證治要訣卷之五

諸痛門

頭痛

諸頭痛有因氣因痰因虛及外感四氣或酒食所傷或作勞失力以致頭痛不問何證疑似之際並可與如聖餅子烏荳湯外有臭毒頭痛一味吃炒香附愈荊公解痛字義云宜通而塞則爲痛有偏正夾腦風服川烏附不愈用蓮子草烏而愈者此乃毒攻毒之意不可不知有上焦熱頭痛宜敗毒散去柴胡加甘菊花如其數有頭風症眩不可謂其無痛而不以爲風切宜詳審未宜遽作虛治若投補劑愈甚別又無疾所失血等患又非諸般病後卒然得此是風氣分證宜小續命湯加全蝎三四箇

有頭風發動頂後兩向筋緊吊起作痛者看其人挾寒挾虛宜大三五七散

頭風用熱藥者多間有挾熱而不勝熱劑者宜消風散通關散茶調散滿上之類偏正頭風作痛痛連於腦常如牽引之狀發則目不可開眩暈不能操舉宜芎辛湯每服加全蝎五箇間進太陽丹及如聖餅子或用大茶調散八生散追風散大三五七散覺上腦有熱大茶調散并一字散

或作頭痛其人嘔吐痰多者宜芎朮湯或芎辛湯去茶牙加瓜蔞半夏湯加芎半錢八生散亦可用有病此發作無時俗名痰飲頭風氣不順停痰上攻頭痛順氣爲上二陳湯瓜蔞半夏湯並有加料法

頭痛挾熱項生瘰塊作痛宜都梁丸

有爛頭風痒而痛者於服頭風藥外用烏醋磨鐵銹塗生姜汁亦可搽搽

怒氣傷肝及肺氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香降氣湯井蘇子降氣湯下養正丹或用芎附飲

因虛頭痛此爲腎厥頭痛宜用正元散或大三五七散入鹽煎服或於正元散入炒椒十五粒下來復丹

間進黑錫丹有服諸藥不効其痛愈甚宜葺硃丹所以用葺者已於虛損門眩暈證詳論之

或風寒暑濕四氣及傷食頭痛見諸傷門

中酒頭痛見諸傷門酒食證

作勞失力頭痛見本門身體痛證頸痛因頭痛牽引致痛者當於頭痛諸證中求藥若別無處獨在頸者非是風邪卽是氣挫亦有落枕而成痛者並宜和氣飲食後服

眼眶骨痛附眉稜痛

痛有二證眼屬肝有肝虛而痛纔見光明則眶骨痛甚宜生熟地黄丸又有肝經停飲一證發則眉稜骨痛眼不可開整靜夜劇宜導痰飲或芎辛湯去茶牙或二陳湯吞青州白丸子併於痰飲選藥

牙痛

牙痛有風毒熱壅齲蛀腎虛未辨何證俱用消風散揩抹諸證俱宜香附炒黑三分炒鹽一分研均揩用如常

風毒牙疼用皂角寸節雪之以鹽火煅熱湯泡通口啾吐下涎沫風毒及熱壅上攻牙齦痛或齒縫有紅肉腎出宜消風散食後臨臥入茶點仍入荊芥防風白芷蜂房之屬煎冷頻頻漱口有牙蟲已出其孔穴空虛而痛者此乃不可不知宜用乳香少許火炙令軟以貼之若熱壅甚牙腫連頰疼不可忍宜金沸草散去麻黄加薄荷如其數

腎虛牙疼而痛甚則增寒壯熱金具如欲脫之狀宜安腎丸間進黑錫丹

蛀痛用巴豆一粒燃研搓乳香細末丸之塞蛀孔中

咽喉痛附上顎

傷寒陰喉痛有陰陽二證已於諸傷門傷寒證詳言之今止言諸雜病咽痛宜甘桔湯熱毒上攻或有痰或無痰服甘桔湯不効者宜於甘桔湯加荊芥一錢半重名如聖湯或如聖湯中更加連翹一分防風半分或甘露飲仍用碧雪散旋旋煎點間用鹽水吞養正丹兼以薄荷煎鷄蘇丸含化

有咽疼服冷劑反甚者宜用姜汁洋見噤門熱噤證矣

有內熱熱形於上焦以致咽疼宜用黄柏皮黄連大黄研末水調塗在心與患處此出於葉氏方書熱壅咽痛或嗽中帶血者宜金沸草散佐以反砂化痰丸咽喉痛用諸冷藥不効者宜枳南湯

喉痹作痛。腫滿不能言。咽中生物。名喉風。宜甘桔湯。若熱盛上焦。咽喉移痛。而吞嚥乾物。不若常時之潤。睡覺口舌全無津液者。如聖湯。加人參半錢。玄參七分。或佐以碧雲散。鴉蘇丸。有上證兼心頭煩燥。辰砂五苓散。凡上證並宜縮砂殼。燒灰存性。研末。水調服之。

腦痛附心痛

多因積冷與痰氣而成。宜五膈寬中散。或四七湯。加木香桂各半錢。或搗脾湯。加丁香。腦痛而氣上急者。宜蘇子降氣。去前胡。加木香如數。

痰涎壅盛而痛者。宜小半夏茯苓湯。加枳實一錢。間進半硫丸。

心搖。有痰飲所致。俗名飲搖。有胃曰熱。食易消。故搖。素問謂之食搖。亦類消中之狀。俗名肚搖。瘧氣宜小半夏茯苓湯。加枳實一錢。胃中熱。宜二陳湯。加黃連一錢。或五苓散。加桂與辰砂。

腦痛與心痛不同。心痛則在岐骨陷處。本非心痛。乃心支別絡痛耳。腦痛則痛橫滿胸間。比之心痛爲輕。痛之得名。俗爲之稱耳。諸方稱爲嘈雜煩悶怔忡。痰飲證也。五苓散。利心小腸之熱。恐非其對。不若用四物湯。十全大補湯。去桂生血而益陰。此亦非水制火之義。亦有病搖。呷姜湯數口。或進乾姜劑而愈。此腦有腎氣逆上攻心。以致心痛。用生韭研汁。和五苓散爲丸。空肚茴香湯下。

脇痛

諸脇痛。各有所感。若止是冷氣作楚。與顛撲閃挫。宜和氣飲。及烏藥順氣散。或滾痰慈白湯。下枳殼散。左右脇有氣塊而痛者。此是積聚。見諸氣門。積聚證。停飲脇痛。本事方面丸。最佳。

忤有人脇痛連腦。進諸氣藥。并自大便導者。其痛殊甚。後用辛熱補劑。下黑錫丹方愈。此乃虛冷作痛。愈疎而愈虛耳。脇痛病在肝膽。傷寒脇痛屬少陽經。合用小柴胡湯。痛甚而不大便者。於內加枳殼。若尋常脇痛。不係正傷寒時身體帶微熱者。本事方中。枳殼煮散。用枳殼桔梗細辛芎防風各四分。乾葛錢半。甘草一錢。若只是脇痛。別無雜證。其痛在左爲肝經受邪。宜用川芎枳殼甘草。其痛在右。爲肝經移病於肺。宜用片姜黃枳殼桂心甘草。此二方出嚴氏濟生續集。加減在人。又有肝膽經。停痰伏飲。或一邊脇痛。宜用嚴氏導痰湯。痰結成癖。間進半硫丸。蓋枳殼乃治脇痛的劑。所以諸方中皆不可少。曾見潘子先說有人脇痛。下青龍湯。痛止。發嗽。待可。此其痛必在右脇故也。灼然知是寒氣作痛。枳實理中湯爲宜。戴復菴云。腹內諸般冷痛。一箇枳實理中湯加減。作無限用。

腰痛

腰者。腎之所附。皆屬腎有寒。有濕。有風。有虛。皆能作痛。有閃挫勞役而痛者。宜生料五積散。加炒桃仁五枚。

腰痛如錐刀所刺。大便黑。小便赤黃。或黑。由血滯腰間。名瀝血腰痛。桃仁酒。調黑神散。

若寒腰痛。見熱則減。見寒則增。宜五積散。每服加吳茱萸半錢。

若濕腰痛。如坐水中。蓋腎屬水。久坐水濕處。或爲雨露所着。濕流入腎經。以致腰痛。宜滲濕湯。

若風傷而腰疼者。或左或右。痛無常處。牽引兩足。宜五積散。每服加防風半錢。或加牽牛三箇尤好。小續命湯。獨活寄生湯。皆可選用。仍吞三仙丹。杜仲姜汁炒。研末。每一錢。溫酒調。空心服。名杜仲酒。治腎虛腰疼。兼治風冷爲患。

婦人血過多。及素患血虛致腰痛者。當益其血。見婦人門。若腎虛腰痛。轉側不能。嗜臥疲弱者。大建中湯。

有近方得病者。有病得之已久。時發動者。不問諸證。並宜異攻散。香蘇湯。仍佐以搗脾湯。若積冷而痛者。宜手粘散。酒調下。於內加官桂等分。仍以搗脾湯。鐵刷湯佐之。或用蘇合香圓。姜汁和酒。調開熱服。前後心痛。亦可用。

若服溫藥不効者。痛愈甚。宜微利其大便。量虛實先進神保丸。以利爲度。繼進加味七氣湯。若因飲食冷物而痛者。宜調氣散。和搗脾湯。

若因蛔作痛。蛔攻嘈心痛。有休止。其人吐蛔。或與之湯飲藥餌。轉入轉吐。蓋綠物入則蛔動。蛔動則令人惡心而吐。用川椒十數粒。煎湯下烏梅丸。

有腎氣逆上攻心。以致心痛。用生韭研汁。和五苓散爲丸。空肚茴香湯下。

脇痛

諸脇痛。各有所感。若止是冷氣作楚。與顛撲閃挫。宜和氣飲。及烏藥順氣散。或滾痰慈白湯。下枳殼散。左右脇有氣塊而痛者。此是積聚。見諸氣門積聚證。停飲脇痛。本事方面丸。最佳。

忤有人脇痛連脇。進諸氣藥。并自大便導者。其痛殊甚。後用辛熱補劑。下黑錫丹方愈。此乃虛冷作痛。愈疎而愈虛耳。脇痛病在肝膽。傷寒脇痛屬少陽經。合用小柴胡湯。痛甚而不大便者。於內加枳殼。若尋常脇痛。不係正傷寒時身體帶微熱者。本事方中。枳殼煮散。用枳殼桔梗細辛芎防風各四分。乾葛錢半。甘草一錢。若只是脇痛。別無雜證。其痛在左爲肝經受邪。宜用川芎枳殼甘草。其痛在右。爲肝經移病於肺。宜用片姜黃枳殼桂心甘草。此二方出嚴氏濟生續集。加減在人。又有肝膽經。停痰伏飲。或一邊脇痛。宜用嚴氏導痰湯。痰結成癖。間進半硫丸。蓋枳殼乃治脇痛的劑。所以諸方中皆不可少。曾見潘子先說有人脇痛。下青龍湯。痛止。發嗽。待可。此其痛必在右脇故也。灼然知是寒氣作痛。枳實理中湯爲宜。戴復菴云。腹內諸般冷痛。一箇枳實理中湯加減。作無限用。

腰痛

腰者。腎之所附。皆屬腎有寒。有濕。有風。有虛。皆能作痛。有閃挫勞役而痛者。宜生料五積散。加炒桃仁五枚。

腰痛如錐刀所刺。大便黑。小便赤黃。或黑。由血滯腰間。名瀝血腰痛。桃仁酒。調黑神散。

若寒腰痛。見熱則減。見寒則增。宜五積散。每服加吳茱萸半錢。

若濕腰痛。如坐水中。蓋腎屬水。久坐水濕處。或爲雨露所着。濕流入腎經。以致腰痛。宜滲濕湯。

若風傷而腰疼者。或左或右。痛無常處。牽引兩足。宜五積散。每服加防風半錢。或加牽牛三箇尤好。小續命湯。獨活寄生湯。皆可選用。仍吞三仙丹。杜仲姜汁炒。研末。每一錢。溫酒調。空心服。名杜仲酒。治腎虛腰疼。兼治風冷爲患。

婦人血過多。及素患血虛致腰痛者。當益其血。見婦人門。若腎虛腰痛。轉側不能。嗜臥疲弱者。大建中湯。

心脾痛

加川椒十粒。吞下。腰腎間及生料鹿茸間之類。仍以茴香炒研末。破開諸膠子。作湯片。不令斷。層層摻藥。外水紙裹。煨熟。細嚼酒嚥。

若因閃肭。或擒撲傷損而痛。宜黑神散。和復元通氣散。酒調下。不効。則恐有惡血停滯。宜先用酒調下蘇合香圓。仍以五積散。每服加大黃半錢。蘇木半錢。當歸梢元數。若因勞役負重而痛。宜用和氣飲。或普賢正氣散。

腹痛

腹痛之痛。所感不一。或因寒熱。或因暑濕。或因飲食饑飽。不問何證。皆可用薑香正氣散。加木香半錢。或正氣散。調化蘇合香丸。

若胃痛欲得熱手按。及喜熱食者。此是積冷作痛。當用理中湯。或治中湯。小建中湯等藥。若冷痛。用溫藥不効。痛愈甚。大便不通。當微利之。用薑香正氣散。每服加官桂木香枳殼各半錢。吞下來復丹。或用蘇感丸。不利。則量虛實用神保丸。

有全不喜食。其人本體素怯弱。而又加以腹冷疼者。養胃湯。以白朮茶朮。仍加桂茱萸各半錢。木香一分。應腹冷痛。或心脾疼者。生姜均治之。

秘傳證治要訣卷之六

諸嗽門

嗽證

古人云。臟腑皆有咳嗽。夫嗽屬肺。何爲臟腑亦皆有之。蓋咳嗽爲病。有自外而入者。有自內而發者。風寒暑濕外也。七情饑飽內也。風寒暑濕。先自皮毛而入。皮毛者。肺之合。故雖外邪。欲傳臟腑。亦必先從其合而爲嗽。此自外而入者也。七情饑飽。內有所傷。則邪氣上逆。肺爲氣出入之道。故五臟之邪。上蒸於肺而爲嗽。此自內而發者也。然風寒暑濕。有不爲嗽者。蓋病尙淺。止在本臟。未即上攻。所以傷寒以有嗽爲輕。而七情饑飽之嗽久而復見。凡諸嗽未發內外所感。並宜二陳湯。加杏仁五味。人參各半錢。重欽水一二口而將止者。熱嗽也。卽熱湯而暫停者。冷嗽也。治熱嗽以小柴胡湯。加五味。冷嗽理中湯。加五味。皆已試之驗。此出醫鑑。

諸嗽皆可佐以應夢觀音散。而加喘者。以此於食前吞下。發熱惡寒。頭痛鼻塞。氣急。狀如傷冷。熱連咳不已。初得病。卽伏枕時行嗽。發熱惡寒。或咳有血。以薄荷生胡麻各一撮。細嚼。煎蘇子降氣湯送下。

此病。最時甲午年。夏秋之交。此病又自南而北。得免者少。並呼爲蝦蟆瘟。或風而嗽者。惡風有汗。或身體發熱。或鼻流清涕。桂枝湯加人參杏仁五味各半錢。

哮喘

喘氣之病。哮吼如水鷄之聲。牽引胸背。氣不得息。坐臥不安。此謂嗽而氣喘。或宿有此根。如遇寒暄則發。一時暴感。並於前嗽藥中。加桑白皮。則緩加仍吞養正丹。間進青金丹。風寒喘嗽。宜九寶湯。若乾喘不嗽。不分久遠近發。宜蘇子降氣湯。或神秘湯。吞養正丹。重則四劑飲。或六劑飲。吞靈砂丹。或應夢觀音散。吞養正丹。尤宜。

喘而服藥不効者。利導之。宜神保丸。大便已泄者。不可用。

不嗽而氣自急者。病初得。氣不急。必發外證。此謂之喘。若用耗氣藥。又有嘔吐。諸藥不効。又別無前項痰氣等證。乃蚘在胸膈作嘔。見藥則動。動則不納藥。藥出而蚘不出。難非吐蚘之比。亦宜用吐蚘藥。或於治嘔藥中。入炒川椒十粒。蚘見椒則頭伏。故也。

吐血衄血

有患人用附子理中湯四逆湯。加丁香到口即吐。後去乾姜。只參附加丁香。亦有患人用附子理中湯四逆湯。加丁香到口即吐。後去乾姜。只參附加丁香。二香煎熟。更磨入沉香。末二錢。立吐定。蓋虛痰氣凝結。丁附既溫。佐以沉木香則通。乾姜白朮則泥膈。

停飲伏痰

飲凡有六。懸澄交痰留伏。痰飲。特六飲之一耳。人病此而止曰痰飲者。蓋停既久。未有不爲痰。多因氣道閉塞。津液不通。譬如溝渠壅塞。積滯則倒流逆上。痰濁臭穢。無所不有。若不疎決溝渠。而欲澄治已壅之水。而使之清。無是理也。

凡爲喘。爲咳。爲嘔。爲泄。爲眩。爲暈。心嘈。怔忡。驚悸。爲寒熱。痛腫。爲痞膈。爲壅閉。或胸脇間轆轤有聲。或背心一片常如水冷。胃飲食所致。此即如水之壅。有痰濁臭穢。故善治痰者。不治痰而治氣。氣順則一身之津液。亦隨氣而順矣。並宜蘇子降氣湯。導痰湯各半貼和煎。或小半夏茯苓湯。加枳實木香各半錢。吞五套圓。或以五套圓料。依分兩作飲子煎服。尤好。平居皆無他事。只有痰數口。或清或堅。宜二陳湯小半夏茯苓湯。痰多。間進青州白圓子。和來復丹服。來白圓如和以八神來復丹。即名青神圓。此非特治痰飲。尤甚療喘嗽嘔吐逆。翻胃。若服藥未効者。二生湯。加木香半錢。若頑涎隨氣逆上。不爲藥解。當自下部利之。宜五膈寬中散。加半夏半錢。吞破飲圓。仍佐以半硫圓。恐大便復秘。飲利不盡。半硫圓當常服。若大便先不因藥自利。及老人虛人。當利其小便。宜小半夏茯苓湯。改用赤苓而倍之。或導痰湯。加猪苓半錢。痰飲蛊眩。及成飲厥者。宜別加木香二生湯吞。青州白圓子。和靈砂丹。名青令丹。或吞養正丹。半硫圓。痰飲流入四肢。令人肩背痠疼。兩手軟痹。醫誤以爲風。則非其治。宜導痰湯。加木香姜黃各半錢。病痰飲而變生諸證。不當爲諸證。率擊妄言作名。且以治飲爲先。飲消則諸證自愈。有卒然作悶。口眼喎斜。似中而實非中。四肢戰曳。身如浮雲。似虛而實非虛。皆痰飲所爲也。又有腎虛塞不能攝水。致邪水溢上。故作痰飲。宜八味圓。

翻胃

翻胃之病。所以重於嘔吐者。嘔吐食入即吐。翻胃則或一日半日。食復翻上。不化如故。腹中非不欲食。不肯留胃。氣不温。不能消食。食既不消。不爲精粕。而入大腸。必隨氣逆上。從口而出。故翻胃人。胸膈多爲冷氣所痞。二陳湯。加丁香十粒。枳殼半錢。或治中湯。加枳殼砂仁各半錢。半夏一錢。若胃塞甚。服藥而翻者。宜附子粳米湯。加丁香十粒砂仁半錢。大便秘者。更加枳殼半錢。若胸膈痞甚而翻。宜谷神嘉禾散。生附一錢。或丁沉透膈湯。五膈寬中散。加生附一錢。或丁沉透膈湯。治中湯。皆可用。其陰陽通其隧道。半硫圓。亦可通之。隧道久不通。名結腸翻胃。半硫圓尤宜。百藥無効。勢危篤者。宜桂香

青金散以墜之。一法用胡椒一味。醋浸之。曬乾。醋浸不計徧數。愈多愈好。候末醋糊爲圓。淡醋湯下十圓。加至三四十九。

不喜食

脾運食而俾於肺。脾氣不足。故不喜食。宜資脾丸。資朴丸。若脾虛而不進食者。資脾。宜鹿茸橘皮煎丸。若脾冷甚而不進食者。理中湯。未効。附子理中湯。加砂仁半錢。或丁香煮散。心腎虛。致脾氣不足以運者。鹿茸橘皮煎丸。脾上交於心。下交於腎者也。

噯氣吞酸

吞酸者。宿食所爲。故曰中脘有飲。嚏有宿食。則酸。噯氣吞酸。噯宿腐氣。逆嗌酸水。亦有每晨吐清酸水數口。日間無事者。亦有腸間常如酸折。皆飲食傷。兼中脘所致。生料平胃散。加神麯麥蘗各半錢。或八味平胃散。

寒熱門

瘧寒熱

瘧證不一。其名亦殊。初得之。病勢正熾。一二發間。未宜遽截。不問寒熱多少。且用清脾飲。草果飲。或二陳湯。加草果半錢。或生料平胃散。加草果半錢。前胡半錢。亦有非瘧非瘴。不可不審。去痰行飲。則愈。

初發之際。風寒在表。雖寒熱過後。而身體常自移。常自畏風。宜草果飲。或發胃湯。每服加川芎草果各半錢。熱少者。進取微汗。寒多者。宜快脾湯。或發胃湯。每服加草果半錢。

或瘧已愈而猶不忌口或寒熱正作時吃食其人噁氣吞酸胸膈不利宜生料平胃散每服加草果半錢砂仁半錢仍佐以紅丸子七香散

暑瘧其人面垢口渴雖熱已退後無事之時亦當有汗宜養胃湯一貼香薷飲一貼和勻作二服渴甚汗出多者加味香薷飲間進數砂五苓散不問未發其人嘔吐痰食俱出宜多進二陳湯每服草果加之半錢又恐伏暑纏結爲痰宜消暑丸更於暑瘧中求之有四五發已後應諸證並可截瘧丹未愈再進

久瘧經年累月名曰瘧母又名勞瘧不宜十分攻之所謂久瘧不治者是也進四獸飲間山甲固瘧愈後調理宜生料平胃散每服加人參茯苓各半錢或用四君子湯加陳皮一錢半即異功散

外有傷寒往來寒熱如瘧勞病往來寒熱亦如瘧謂之如瘧非眞瘧也然傷寒寒熱如瘧初必惡風寒發熱頭痛體疼自太陽經而來勞病寒熱如瘧初必五心發煩熱勞倦咳嗽久乃成寒熱與正瘧自不同諸病皆有寒熱如失血痰飲瘡瘕積聚小腸癰氣風寒暑濕食傷發勞勞瘵蠱毒腳氣已各見本門其餘不能盡舉應有不如發瘧之傳爲寒熱者須問其元有何病而生寒熱則隨病施治寒熱發作有期者瘧也無期者諸病也

近世因寒熱發作見其指甲青黑遂名曰沙或叉或挑或灌以油茶且禁其服藥此病即是南方瘴氣生料平胃散加草果檳榔正宜所治豈有病而無藥哉

獨寒

有寒而未即爲熱者或寒一二日後方熱有寒而終於無熱者惟傷寒有此爲多他證亦或有之當臨證施治

有虛常自畏寒或覺冷在骨肉間或冷從下起經旬積月宜以果附爲君治之

獨熱

三消諸失血後虛勞久痢諸虛後發熱者皆非美證有當直攻其發者有不當專治其熱者因他病而發爲熱者也當隨證用藥中加入退熱藥

外有每遇夜身發微熱病人不覺早起動作無事飲食如常既無別證可疑只是血虛陰不濟陽宜潤補之參蘇飲二分四物湯一分和勻名茯苓補心湯候熱稍減繼以養榮湯十全大補湯

又有服金石辛熱者甘草烏豆湯下火邪者艾湯下飲食者乾姜湯下炙煿者枳殼甘草湯下

潮熱附虛煩

潮熱有二有實而潮熱者有虛而潮熱者惟傷寒日晡發熱乃胃實別無虛證

其餘有潮熱者當審其虛實若潮熱大便堅澁喜冷畏熱心下愊然睡臥不着此皆氣虛所謂實而潮熱者也輕宜參蘇飲重則小柴胡湯

若潮熱而氣消乏精神憔悴飲食減少日漸疸羸病證去而五心常有餘熱此屬虛證宜茯苓補心湯十全大補湯養榮湯之類病後欠調理者八珍散主之

有潮熱似虛胸膈痞悶背心疼痛服補藥不効者此乃飲證隨氣而潮故熱證飲而亦潮宜於傷飲中尋藥

諸汗併作嘔吐瀉後應有滲泄而津液去多五內枯燥者皆能虛煩以陰血不足以濟陽陽氣偏勝故熱而煩宜參蘇飲去蘇倍參加麥門冬半錢煩而渴者獨味人參湯加以小便不利者茯澤陽加以心經不寧者溫膽湯大煩身熱甚者竹葉石膏湯血虛生煩見前諸證者茯苓補心湯外有一得病時節即患寒身不疼頭不痛但煩熱者亦名虛煩內外俱不可攻之必遂損脫宜參蘇飲去蘇倍參或更加石膏半錢不愈者竹葉石膏湯兼有上項證候者於前藥選用其人虛甚不宜專用涼劑者茯苓補心湯

綱傳證治要訣卷之八

大小腑門

小便多

小便多者乃下元虛冷腎不攝水以致滲泄宜菟絲子丸八味丸玄菟丹生料鹿茸丸

有人每日從早至午前定尿四次一日之間又自無事此腎虛所致亦由脾腎泄早泄而晚愈次日又復然者也

若小便常急偏數雖多而所出常少放了復急不澁痛卻非淋證亦有小便畢少頃忽再出些小者多因自忍尿或忍尿行房事而然宜生料五苓散減澤瀉之半加阿膠一錢吞八味丸此丸須用五味子者

睡者遺尿者此亦下元冷小便無禁而然宜大菟絲子丸雞胞炙碎煎湯下（凡遺尿宜用古紙末實則失氣虛則遺尿）

有盛喜致小便多日夜無度乃喜極傷心心與小腸爲表裏宜分消飲四七湯各半貼和煎仍以辰砂妙香散吞小菟絲子丸或玄菟丹

淋閉

古名曰癃者能也不通爲癃不約爲遺小便滴瀝澁痛者謂之淋小便急滿不通者謂之閉宜五苓散燈

心湯調服。若月多有此患。止宜本藥。閉而不通。臍下腹爲癰。起以燈心湯。五苓散。或洗慈湯。調獨味琥珀末。仍令其以臍填臍下。更滿之以水。

若服涼藥不效。審是冷秘。宜妙鹽熨其小腹。或洗慈湯蒸洗。有腹急而小便若不通。用劑愈甚。宜以鹽貼臍中。就鹽上灼艾十壯。

有淋病。下語通便劑愈。不通。用木香流氣飲。或別用通氣香劑轉愈者。此乃氣淋。出於冷熱淋之外。有似淋非淋。小便色如米泔。或便中有如鼻涕之狀。此乃精尿俱出。精竅竅道。故便徹出不能而痛。宜大絲子圓。鹿茸圓之類。然此即膏淋。謂其非淋。亦不可。血淋一證。須看血色。分冷熱。色鮮者心小腸實熱。色瘀者。腎膀胱虛冷。若的是冷淋。及下元虛冷。血色瘀者。並宜溫椒根劑。碎不拘多少。白水煎候冷進。

小便澁痛。常急欲溺。及去點滴。莖中痛不可忍者。此五淋病。生料五苓散。加阿膠七分。或五苓散。加車前子末少許。或五苓散和益元散等分。或五苓散。並可吞火府丹。佐以導赤散。

若熱極成淋。服藥不効者。宜滅桂五苓散。加木通滑石燈心瞿麥各少許。仍令其研麥門冬草。連根車前草。白龍草。密水調下。

若淋澁有血者。宜加五苓散。或生料五苓飲。和五淋飲。或導赤散。仍研地錦草水解服。進冷劑愈甚者。此是冷淋。宜地髓湯。下附子八味圓。有因服五苓散等藥不効者。用生料鹿茸圓郁愈。此症病於下元虛冷之故。

有小便艱澁如淋。不痛而痒者。此亦屬虛。宜八味圓。生料鹿茸圓之類。若因思慮用心過度。致淋。辰砂妙香散。吞威喜圓。或妙香散。和五苓散。

汗多而小便亦澁。暑月多有此證。盛暑所飲既多。小便反澁少而赤。緣上停爲飲。外發於汗。津道不通。小腸澁閉。則水不運。下五苓散。一名導通。內有肉桂收汗。豬苓澤瀉伏苓分水道。收在其外者。使之內。又從汗多而小便亦澁者。本事方清心圓。仍服黃耆六一湯。使雖非對緣精竭滿溢。審是非盛滿溢者。本事方清心圓。仍服黃耆六一湯。使雖非對緣精竭滿溢。蛸以白燥之。遺溺。比之遺精稍少。小便有數點糊粘。莖頭微痛。或小便已停。原時方有一二滴沽褪。其病不出前所因。宜審用前藥。

若審是思色欲不遂得之。且以四七湯。吞白圓子。甚者耳聞目見。其精卽出。名曰白淫。妙香散。吞玉華白丹。

若審是色欲過度。下元虛憊。泄瀉無禁。宜正元飲。加牡蠣粉。肉蓯蓉各半錢。吞金氣丹。或鹽砂丹。仍佐以恍惚腦熱。乃驗其熱證也。以此見赤濁。亦有自熱而得。亦可用此。

若是用心過度。得之。宜遠志圓。用交感湯。加蓮子肉。五味子吞下。仍佐以鹿茸圓。由藥圓。大菟絲子圓。固陽圓之類。

若審是思色欲不遂得之。且以四七湯。吞白圓子。甚者耳聞目見。其精卽出。名曰白淫。妙香散。吞玉華白丹。

有白濁人。服玄菟丹不愈。服附子八味圓卽愈者。不可不知。

有小便如常。停久縰方淀濁。有小便出卽如泔。若小兒泄痢者。並宜分清飲。加白茯苓半錢。

如服藥未効。宜四七湯。吞青州白圓子。及辰砂妙香散。吞玄菟丹。及小菟絲子圓。山藥圓。如白濁甚。下淀如泥。或桐油如膠。類遺而澁痛異常。此非是熱淋。此是精濁窠窟竅道而結。宜五苓妙香散。吞八味圓。小

菟絲子圓。精者血之所化。有濁去太多。精化不及。赤未破白。故成赤濁。此虛之甚也。何以知之。有人天癸未至。強力好色。所泄半精半血。

若濁不赤。無他熱證。縱雖赤濁。不可以赤爲熱。只宜以治白濁施之。

若濁赤下濁亦赤。口渴時發熱者。辰砂妙香散。吞琥砂丹。或清心蓮子飲。發熱不退。口燥舌乾之甚者。此乃精虧肉燥。腎枯不潤。四物湯。吞玄菟丹。和八味圓久服。乃効。

遺精附遺溼夢遺

遺精。得之有四。有用心過度。心不攝腎。以致失精者。有因思色欲不遂。精色失位。輸瀉而出者。有欲太過。滑泄不禁者。有年壯氣盛。久無色欲。精氣滿溢者。然其狀不一。或小便後去多不可禁者。或不小便而自出。或蓋中出而痒痛。常如欲小便者。並宜先用辰砂妙香散。吞玉華白丹。佐以威喜圓。或分清飲。別以綿裹龍骨同煎。或分清飲半貼。加五倍牡蠣粉白茯苓五味子各半錢。

失精夢泄。亦有經絡熱而得者。若以虛冷用熱劑。則精愈失。本事方清心圓。用黃皮膠子者。最良。然亦必恍惚腦熱。乃驗其熱證也。以此見赤濁。亦有自熱而得。亦可用此。

若是用心過度。得之。宜遠志圓。用交感湯。加蓮子肉。五味子吞下。仍佐以鹿茸圓。由藥圓。大菟絲子圓。固陽圓之類。

若審是思色欲不遂得之。且以四七湯。吞白圓子。甚者耳聞目見。其精卽出。名曰白淫。妙香散。吞玉華白丹。

若審是色欲過度。下元虛憊。泄瀉無禁。宜正元飲。加牡蠣粉。肉蓯蓉各半錢。吞金氣丹。或鹽砂丹。仍佐以

三消

三消得之氣之實。血之虛也。久久不治。氣儘虛則無能爲力矣。有一僧專用黃芩飲加減。其論蓋洋之。謂血爲主。三消。小便去多。上消消心。心火炎上。大渴而小便多。中消消脾。脾氣熱燥。飲食悟常。皆消穀小便。下消消腎。腎衰不能攝水。故小便雖多而渴。然小便既多。津液必竭。久而未有不渴者。謂之全不渴。未有

的論諸消不宜用燥烈峻補之劑惟當滋養除消脾外心腎二消宜用黃蓍飲吞八味丸或玄菟丹或小菟絲子圓又竹瀝散皆可又用六神飲亦治腎消惟脾消則加當歸去黃蓍三消小便既多大便必秘宜常服四物湯潤其大腸如加人參木瓜花粉花人仍煮四皓粥食之糯米泔折二亦可冷進三消久而小便不見反作甜氣在溺桶中滾涌其病爲重更有浮在溺面如豬脂濺在桶邊如櫨燭淚此精不禁眞元竭矣

上消中消心脾既如此熱小便澁少而反無禁蓋燥熱在上虛冷在下陰陽不交所以成消渴三消久之精血既虧或目無見或手足偏廢如風疾非風然此證消腎得之爲多消心之病往往因欲飲食過多及食腴辛熱飲引既多小便亦多當抑心火使之下降自然不渴宜半夏瀉心湯去乾姜加梧桑乾葛如其數吞豬肚圓或酒蓮圓仍佐猬咪黃連湯多煎候冷遇渴恣飲久而自愈或白糯米煮稀粥然同調湯梅花湯二藥於三消有渴者皆可用若因用心過度致心火炎上渴而消者宜黃蓍飲加蓮肉遠志各半錢吞玄菟丹仍以大麥煎湯調下鹽砂丹。

消脾緣脾經燥熱食物易化皆爲小便轉食轉饑然脾消又自有三曰消中曰寒中曰熱中宜用蓮茗飲加生地黃乾葛各半錢或烏金散或止用蓮茗飲間有一等盛暑又復內傷生冷非連理湯不可下泄無度泄後卻彈過變肛門熱小便亦澁心下煩渴且又豈冷此藥爲宜若元是暑瀉經久下元虛甚日夜頻併暑毒之勢已然而瀉不已後用暑藥則決不能取效便用姜附鹽又以難施疑似之間尤宜用此余生治傷寒協然自利有用白姜黃連對半名金銀湯即此意也然不若連理湯爲穩如寒瀉服上藥未效宜木香湯或姜附湯六柱湯吞震靈丹養氣丹手足厥逆者兼進硃砂丹藥食方入口而卽下者名曰直腸難治如瀉已愈而精神未復舊者宜十補湯寒瀉腹中大疼於服前藥外間進乳豆圓服諸熱藥以溫中並不見效發固不透穢物而出此腦下焦宜桃花圓二五粒阿梨勒圓以澁之

熱瀉糞色亦黃彈變作痛糞門焦痛糞出穀道猶如湯熱煩渴小便不利宜五苓飲吞震靈丹養氣丹暑瀉由胃感暑氣或飲啖白中之所晒物坐日中熱處證狀與熱瀉略同宜胃苓飲或五苓散加車前子少許兼進來復丹凡瀉津液既去口必渴小便多是亦澁未可便作熱論的知熱瀉方用冷劑不然勿妄投以致增劇瀉止渴自止小便亦能如常

氣瀉腸鳴氣走胸脇痞悶腹急而痛瀉則腹下須臾又急亦有腹急氣塞而不通者此由中脘停滯氣不流轉水穀不分所致宜大七香圓入米煎服久而不愈者宜中散吞震靈丹仍佐以米飲調香附末

濕瀉由坐臥濕處以致濕氣傷脾土不克水梅雨絡久多有此病宜除濕湯吞戊己圓佐以胃苓湯重者宜尤附湯如其人本不甚瀉每日兩三次鴨溏此脾家不燥常服平胃散自愈緣內有蓄血可以燥脾

傷食瀉因飲食過多有傷脾氣遂成瀉泄俗呼爲傷敗腹其人必噫氣如敗卵臭宜治中湯加砂仁半錢或七香圓紅圓子雜服

食積腹疼而瀉不可遽用治中兜住先用調脾飲吞感應圓或因食一物過傷而瀉後復食之即瀉者以

大便秘

有風秘冷秘氣秘熱秘又有老人津液乾燥是名虛證婦人分產亡血及發汗利小便病後血氣未復皆能作秘俱宜麻仁圓風秘之病由風搏肺臟傳於大腸故傳化難或其人素有風病者亦多有秘宜小續命湯去附子倍芍藥入竹瀝兩蜆殼許實者吞脾約麻仁圓虛者吞養正丹冷秘由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通胃道秘塞其人腸內氣攻喜熱惡寒宜薑香正氣散加官桂枳殼各半錢吞半硫圓熱藥多秘惟硫黃煖而通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄氣秘則氣不升降穀氣不行其人多噫宜蘇子降氣湯加枳殼吞養正丹或半硫圓來復丹未效佐以木香檳榔圓欲其速通則枳殼生用

熱秘面赤身熱腸胃眼悶時欲得冷或口舌生瘡此由大腸熱矣宜四順清涼飲吞順腸圓或木香檳榔圓有氣作疼大便秘結用通劑而便愈不通便有秘氣強飲通之雖通復閉或迫之使通因時下血者此惟當順氣氣順便自通順氣之法又當求溫煖之劑曾有下巴豆等藥不通進丹附卻通不可不知

老人虛秘及出汗利小便過多一切病後血氣未復而秘者宜蘇子降氣湯倍加當歸吞威靈仙圓或肉

脾爲其所傷未復而然宜健脾湯因食冷物停滯傷脾脾氣不攝所食之物不能消化瀉出而食物如故宜治中湯加乾葛吞酒煮黃連圓於瀉中求之

有脾氣久虛不受飲食者食畢卽腸鳴腹急盡下所食物縱方覺快不食則無矣俗名錄食瀉經年累月宜快脾圓下二五粒因傷於酒每晨起必瀉宜理中湯加乾葛吞酒煮黃連圓

或重而瀉泄頻數者宜冲和湯

因傷麵而瀉者養胃湯加羅葛子炒研破一錢痛者更加木香半錢瀉甚者去藿香加炮姜如其數

瀉已愈痛年及後期復瀉古論云病有期年而發者有積故也宜感應丸

有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效米飲下五味圓或專以杜五味煎飲宜治脾腎泄雖省節飲食大段忌口但得日間上半夜無事近五更其瀉復作此病在腎俗呼脾腎泄分水飲下二神圓及椒朴圓或平胃散下小茴香圓病久而重其人虛甚椒附湯

交腸

交腸之病大小便易位而出蓋因氣不循故道清濁混淆宜五苓散調氣散各一錢加阿膠末半錢湯調服或研黃連阿膠丸爲末加木香末少許再以煎湯送下

瀉血

瀉血當排其色色鮮爲熱色瘀爲寒熱血連痛飲寒血理物湯血色鮮紅者多因內蘊熱毒毒氣入腸胃或因飲酒過多及噎糟醯炙煿引血入大腸故瀉鮮血宜連蒲散吞黃連阿膠丸及香連丸或一味黃連煎飲大瀉不止者四物湯加黃連槐花仍取血見愁草少許生姜搗取汁和米飲服於血見愁草中加入側柏葉與生姜同搗汁尤好有毒著入腸胃下血者一味黃連煎湯飲

有腸風下血以香附末加百草霜米飲調服加入麝香少許其應尤捷

瀉血色瘀者爲寒血逐氣走冷氣入客腸胃故下瘀血理中湯不效宜黑神散米飲調下中用附子者佳或用膠艾湯加米煎吞震靈丹

擷撲內損惡血入腸胃下出濁如瘀血者宜黑神散加老黃茄爲末酒調下

有風入腸胃純下清血或風濕入腸胃下如豆汁或下瘀血並宜胃風湯膠艾湯

瀉血或淡或濁或鮮或瘀亦宜胃風湯吞駐車丸或獨瀉血或與糞俱出當辨其色與所感施治

有腹痛者乃是血不循理故爾作痛卻無裏急後重及糞墜等患不可因痛認爲血痢

婦人因月事不通血不循故道從後分出者當調其經見婦人門

瀉血過多手足厥冷而眩暈者當審其塞熱施治不可因眩暈而便用附子熱藥塞血猶可熱血爲害不少

腸風臟毒附痔瘻瘺

血清而色鮮者爲腸風濁而黯者爲臟毒或在糞前或在糞後並宜米飲湯調枳殼散下酒煮黃連圓或

枳殼散或烏梅圓此乃因卷證糞中有血卻與瀉血不同或用小烏沉湯和黑神散米飲調下糞前後有血皆可用色瘀尤甚

臟毒者蘊積毒氣久而始見腸風者邪氣外入隨感隨見此三因方五痔臟毒腸風辨之甚詳臟毒腸風之血出於腸臟間五痔之血出於魄門傳送諸孔竅治各不同無擇翁烏連湯治脈痔外無形而所下血一線如箭或點滴下不能已此由脈竅中來也其方已錄千里鏡

血色清鮮者以瓦松燒灰研細米飲調服宜槐枳五苓飲加茅花半錢吞荊梅花圓仍以側柏葉同姜爨搗冷水解下佐些米飲佳

如血色淡濁者胃風湯吞蒜連圓或烏荊圓或棕灰散仍以米飲調香附末或三灰散

或久而不已面色痿黃漸成虛熄下元衰弱者宜黃耆四君子湯下斷紅圓或十全大補湯或黃耆飲諸般腸風臟毒並宜生銀杏四十九箇去殼膜擂研入百藥煎末圓如彈子大每兩三圓空心細嚼米飲下

痔漏證狀頗多自屬外科不復繇引既血自內出不可全仗外傅宜只薤散吞釣腸圓痔正發而血多者亦宜自裏托之宜千金內補散減桂之半加縮頭血尤妙

腸癰卽腸中生癰也腹中疼痛其始發熱惡寒證狀難辨因下膿血乃覺或小腹痛滿或小便澁滯或膿從臍出宜千金內補散太乙餌

痢附刺後風腫紅

痢疾古名滯下以氣滯成積積成痢治法當以順氣爲先須當開胃故謂無飽死痢病也

痢疾不問赤白而知爲冷熱之證若手足和暖則爲陽先用藥殼飲調五苓散進或應圓若覺手足厥冷則爲陰當用煖痢須常識此

凡痢初發不問赤白裏急後重頻欲登圊及去而所下無多既起而腹內復急宜用藿香正氣散加木香半錢吞或應圓或蘇合香圓吞或應圓

赤痢血色鮮紅或如蛇蟲形而間有血鮮者此屬熱痢宜藿香正氣散加黑豆三十粒五苓散加木香半錢粟米少許下黃連圓或黃連阿膠圓熱甚服上項藥未效宜白頭翁湯

若赤痢發熱者收毒散加陳倉米一撮煎

若血色黯如瘀服冷藥所下愈多去愈頻者當作冷痢宜理中湯或四君子湯加肉豆蔻木香各半錢

若感暑氣而成痢疾者其人自汗發熱而垢嘔逆渴欲引飲腹內攻刺小便不通瘀血頻併宜香薷飲加黃連一錢佐以五苓散白湯調服不愈則用蜜水調或暑成痢緣甚而食不進者六和湯藿香正氣散各半帖名木香交加散

白痢下如凍膠或如鼻涕此屬冷痢先宜多飲除濕湯加木香一錢吞或應圓繼進理中湯亦有下如魷色或如腐茶色者亦宜用前白痢藥

赤白雜者宜胃苓飲加倉米一撮煎吞駐車圓

凡治痢須先逐去積滯。去已多三五日後。自可兜澁。不問赤白。俱宜水煮木香圓。或水煮木香飲。與人參蘿湯。或斷下圓。如白痢久而虛甚者。參蘿湯加縮附。赤痢加黑豆一小撮。白痢加乾姜一錢。赤痢亦可加黃連一錢。新下者不必加此。在人活法。

禁口痢者。有得病即不能進食者。或因冷藥并藥過多不食者。卻不可拘於赤痢難用熱藥之說。當以溫中進食爲先。宜治中湯加木香半錢。或縮砂一錢。

休息痢因兜住大早。積不盡除。或因痢愈而不善調理。以致時止時作。宜四君子湯加陳皮一錢。木香半錢。吞駐車圓。只緣兜住積滯。遂成休息。再投去積御用兜劑。

勞痢因痢久不愈。耗損積血。致腸胃虛空。變生他證。或五心發熱。加勞之狀。宜補遂飯。赤多倍蓮肉。白多倍山藥。痢後調補。宜四君子湯加陳皮一錢半。即異攻散。惡甜者生料平胃散加人參茯苓各半錢。

痢後風因痢後下虛。不善調將。或多行。或房勞。或感外邪。致兩腳酸軟。若痛若痹。遂成風痢。猶活寄生湯。諸病變證。久下膿血。或如死豬肝色。或五色雜下。類出無禁。有類於痢。俗名刮腸。此乃臟腑俱虛。脾氣欲絕。故腸胃下脫。若投痢藥則誤矣。六柱飲爲穩。或可囊其萬一。

痢後風因痢後下虛。不善調將。或多行。或房勞。或感外邪。致兩腳酸軟。若痛若痹。遂成風痢。獨活寄生湯。

呑虎骨四斤丸。或用大防風湯。或多以生樟卽骨碎補。俗乎爲胡孫姜三分之一。同研取汁酒解服。外以杜仲牛膝杉木節白芷南星蒼朮煎湯薰洗。

脫肛一證。最難爲藥。熱則肛門閉。寒則肛門脫。內用礎石研末。每二錢。食前米飲調下。外用鹽湯洗。

下痢小便不通者。黃連阿膠丸爲最。

秘傳證治要訣卷之九

虛損門

五勞

五勞者。五臟之勞也。皆已不量才力。勉強運爲。憂思過度。嗜欲無節。或病失調理。將積久成勞。其病頭旋眼黑。身疼腳弱。心怯氣短。自汗盜汗。或發寒熱。或五心常熱。或往來潮熱。或骨蒸作熱。夜多惡夢。婁少精神。耳內蟬鳴。口苦無味。飲食減少。此皆勞僞之證。五臟雖皆有勞。心腎爲多。心主血。腎主精。精竭血燥。則傷生。治勞之法。當以調心補腎爲先。不當用峻烈之劑。惟當溫養滋補。以久取效。天雄附子之類。投之太多。適足以發其虛陽。緣內無精血。不足當此猛劑。不可因有熱純用甜冷之藥。以傷腎氣。獨用熱藥者。猶釜中無水而進火也。過用冷藥者。猶釜下無火而添水也。并宜無益。又害之耳。宜十全大補湯。或雙和散、養榮湯、七珍散、藥分建中湯皆可。選用間進。雙補圓。若有無故身體痠軟。絕無力氣。別無他證。此平日作勞太過。血氣虛而筋失養。宜朔勞散或和氣湯。倍芎歸。又有言語謳誦過耗神氣。致成虛損。是爲叫呼走氣。宜於十全大補湯等藥選用。

虛人老人病中忽一旦語言不出。扣之不應。此不是啞風。久欠藥力到。補調功成。自復應矣。

氣虛人多不得寐。亦有痰多。膠經伏涎。欲臥不得者。不可例作虛治。妄補則痰愈盛。若陰汗惟蜜陀僧和蛇床子研末撲之立止。若服藥汗仍出者。小建中湯加熟附子一錢。不去皮。或正元飲。仍以溫粉撲之。大汗不止。宜於諸藥入煅牡蠣粉一分。幷吞硃砂丹。或茸硃丹。

有於坐臥之中。似欲得人按捻。意方始安者。此亦虛證也。諸發及有寒熱者。已各見本門。審知因虛勞得之。並宜用前藥。未效。用十四味建中湯。渴而不勝熱藥者。七珍散加木香五味子各七分。熱多。黃芩減半。散。或人參散。獨五心發熱。將欲成勞者。茯苓補心湯。外雖惡熱。內自畏寒。盛夏不可單衣。大建中湯、十四味建中湯、正元飲、參附湯。

常自汗出。經年累月者。多用黑錫丹。久病及大病新愈。汗出者。亦可用此。若不宜熱補。須妥濟其陰陽。自愈。當以靈砂丹主之。凡此皆非爲他病而止病於汗者設。非謂有汗病者也。

味建中湯、正元飲、參附湯。

欲食減少。畏食而嘔者。難獨用前湯。甜藥須斟酌用。前快脾之劑。縮砂陳皮藥卻不可少。如藥令建中湯內有陳皮半夏細辛卻可用。仍下鹿茸橘皮煎圓。如不嘔不畏食。用前十全大補湯。雙和散等藥。亦當少加快脾之劑。以爲之防。

若服諸藥。欲止汗固表。屢並無效驗。藥愈熱而汗愈不收。可只理心血。蓋汗乃心之液。心無所養。不能攝血。故溢而爲汗。宜用大黃者湯。炒酸棗仁半錢。有微熱者。更加炒石斛半錢。兼下靈砂丹。

有患精血不足。明知當補腎。方欲一求之歸者。孰藥。其人素減食。又恐不利於脾。方欲理脾氣。則不免用疎刷之藥。又恐愈耗腎水。全一舉而兩得之功。莫若鹿茸橘皮煎圓爲第一。故曰。精不足。補之以味。又曰。補腎不如補脾。以脾上交於心。下交於腎故也。道家交梅心腎。以脾爲黃婆者。即此意。若腎元大段虛損。病勢困篤。則腎不容少緩。又不拘於此說。要知於滋腎之中。佐以砂仁澄茄之類。於壯脾之中。參以北五味黃者之屬。此又臨時審病用藥之活法。勞疾久而嗽血。咽疼無痰。此病自下而傳上。若不嗽不痛。久而潮濁脫精。此爲自上傳下。皆死證已。

治心虛多汗不睡。猪心一箇。破開帶血。用人參二兩。當歸二兩。粳入心中煮熟。去二味藥。止吃猪心。不滿三四日。其病卽愈。

眩暈

有面色如故。肌體自充。外若無病。內實虛損。俗呼爲桃花蛙。宜看其何證。於前藥審而用之。

有傳尸勞。皆肉相傳。甚至滅門。此其五臟中皆有勞蟲。古名瘵疾。難以醫之。

有因虛致暈。難暈醒時。面常欲近火。欲得煖手按之。蓋頭面乃諸陽之會。陽氣不足故耳。

外有因動作勞力。或發寒熱。或身疼氣短。或勞倦嗜臥。乃一時發勞。卻非五勞者比。宜和氣飲。詳見諸痛門。

有頭風證。耳內常鳴。頭上有如鳥雀啄啄之聲。切不可企謂其鳴爲虛。此頭腦挾風所爲也。有眩暈之甚。操頭則屋轉。眼常黑花。視見常如有物飛動。或見物爲兩。宜小三五七散。或芎附湯。生料正元飲。加鹿茸一錢。下靈砂丹。或用正元飲。炒川椒一十五粒。下茸硃。若不效。則獨用鹿茸一味。每服半兩。用無灰酒三盞。煎至一盞。去滓。入麝香少許。服。緣鹿茸生於頭。頭暈而治以鹿茸。蓋以類相從也。曾有頭疼痛不愈。服茸硃丹而效。

虛炎短乏

眠熟而汗出者。曰盜汗。又名一寢汗。不分坐臥而汗者。曰自汗。傷風傷暑。傷寒傷濕。痰嗽等自汗。各載本門。其無病而常自汗出。與病後多汗。皆屬表虛。胃氣不固。榮血漏泄。宜黃耆建中湯。加浮麥少許。煎黃耆六一湯。或玉屏風散。或身溫如常而汗出冷者。或身體冷而汗亦冷。別無他病。並屬本證。

有發證冷汗自出者。宜七氣湯。此方已載二百四十九腎逆散之下。有氣不順而自汗不止。須理氣。使榮衛調和。小建中湯加木香。

有病後多汗。服正元飲醋煎補劑。不愈。惟八珍散宜之。有別處無汗。獨心孔一片有汗。思慮多則汗亦多。

痰多之人。嘗易熟附子作生附。在人活法。餘皆倣此。藥輕病重。四柱飲不足取效。宜於本方去木香加炒川椒十五粒。更不效。則用椒附湯。上焦乾燥不勝熱藥者。宜於椒附湯加人參一錢。若不勝熱藥及短乏者。下氣不接上。呼吸不來。語言無力。宜補虛四柱飲。木香減半。加黃耆山藥各一錢。若不勝熱藥。尊常病當用姜附。而

5

282

氣短乏力之人。於進藥之外。選一健壯男子。吸自己之氣。噓入病人口中。如此數次。亦可爲藥力一助。此法不特可治虛乏。尋常氣暴逆致死者。用之良驗。

驚悸附健忘

驚悸者。因事有所大驚。觸忤心神。氣與涎礙。遂生驚悸。此乃心虛膽怯所致。宜溫膽湯。嘔則以人參代竹茹。

若驚悸眠多異夢。隨即驚覺者。宜溫膽湯加酸棗仁遠肉各一錢。以金銀煎下十四友圓。或鎮心丹遠志圓。酒調妙香散。

健忘者。所過之事。轉盼遺忘。此乃思慮過度。病在心脾。宜歸脾湯。

憧忡

憧忡。久思所愛。觸事不意。虛耗眞血。心血不足。遂成憧忡。俗謂心忡脈亂是也。宜益榮湯。

憧忡即怯悸也。怯悸與驚悸者相類而實不同。驚悸者因事有所驚而悸。怯悸者本無所驚。常心怯而自悸。莫得無辨。

感風寒暑濕閉塞諸經而怯忡。各見本門。

因痰飲憧忡者。導痰湯加炒酸棗仁下琥珀圓。

失志者。由所求不遂。或過誤自咎。懊恨嗟嘆不已。獨語書空。若有所失。宜溫膽湯。去竹茹加人參柏子仁各一錢。下定志圓。仍佐以酒調辰砂妙香散。

有痞塞不飲食。心中常有所怯。愛處暗或倚門後。見人則驚避。似失志狀。此名爲卑慄之卑。以血不足故。示谷神嘉禾散。加當歸半錢。黃耆半錢。

五痫

痫有五。馬牛雞羊豬。五者以其病狀似類之耳。雖非痰涎壅塞。迷悶孔竅。發則頭旋顛倒。手足觸搐。口眼相引。胸背強直。叫吼吐沫。食頃乃蘇。俗止呼爲發豬痫疾。發鷄瓜。宜琥珀香散。加全蝎三箇。下蘇角圓。

癲狂附心風

癲狂由七情所鬱。遂生痰涎。迷塞心竅。不省人事。目瞪不瞬。妄言叫罵。甚則踰垣上屋。裸體打人。當治痰寧心。宜辰砂妙香散。加金箔珍珠末。雜青州白圓子末。濃姜湯調下。吞十四友圓。滑石六一湯。加珍珠末。白湯調下。

有病癲人專服四七湯而愈。蓋痰迷爲顛。氣結爲痰。故也。如健忘。如驚悸。如怔忡五種。亦宜用此。

如顛狂不定。非輕劑所能愈者。宜太乙膏及抱胞丸。心風者。精神恍惚。喜怒不常。無語時或錯亂。有顛之意。不如顛之甚。亦痰氣所爲也。宜琥香散。加石菖蒲人參各半錢。下琥珀圓。

有病癲人專服四七湯而愈。蓋痰迷爲顛。氣結爲痰故也。如健忘。如驚悸。如怔忡五種。亦宜用此。

如顛狂不定。非輕劑所能愈者。宜太乙膏及抱胞丸。心風者。精神恍惚。喜怒不常。無語時或錯亂。有顛之意。不如顛之甚。亦痰氣所爲也。宜琥香散。加石菖蒲一錢。下定志圓。

有心經蘊熱。發作不常。或時煩燥。鼻眼各有熱氣。不能自由。有類心風。稍定復作。麥蘇飲加石菖蒲一錢。

有婦人狂言叫罵。歌笑不常。似祟憑依。一邊眼與口角吊起。或作顛治。或作心風治。皆不效。乃是蓄有瘀

不雜

不雜有二種。有病後虛弱及年高人陽衰不雜。有痰在膽經。神不歸舍。亦令不雜。虛者六君子湯加炒酸棗仁炙黃各半錢。痰者宜溫膽湯。減竹茹一半。加南星炒酸棗仁各半錢。下青礞丹。

傷寒不雜。當於病人言中求之。

自驚悸以後諸證。亦可用溫膽湯。加以同金銀煎竹茹。則隨其證熟虛實而去取之。導痰湯加石菖蒲半錢尤治。

大抵驚悸健忘。憧忡失志不雜。心風。皆是膽涎沃心。以致心氣不足。若用涼心之劑。太過則心火愈微。痰涎愈盛。病愈不減。惟當以理痰氣爲第一義。

秘傳證治要訣卷之十

拾遺門

渴

諸病中有渴。已各見本證。今特舉其無病自渴與病癒後渴者。參朮散。四君子湯。縮脾湯。或七珍散加木瓜一錢。皆可選用。生料五苓散加人參一錢。名春澤湯。以五苓散和四君子湯。亦名春澤湯。尤是要藥。並參作四皓粥食之。

諸病久損腎虛而渴。宜八味丸。黃耆飲。四物湯加人參木瓜各半錢。或七珍飲大補湯。去朮加木瓜如數。

諸失血及產婦虛中渴者。名曰血渴。宜求益血之劑。已於血門味血證中論之。

有無病或然大渴。少頃又定。只宜蜜湯及縮脾湯之類。折二汁冷進數口亦可。

酒渴者。乾葛調五苓散。

疸附面黃

黃而自疸。大略有五。黃脾土色也。脾臟受傷。故病見於外。通身面目悉黃。並宜生料五苓散。加茵蔯或五苓散平胃散各半貼。名胃苓飲。黃汗因脾胃有熱。汗出入水澡浴所致。故汗黃熱染衣。只宜前藥。黃疸因

酒食過度。臟腑積熱。復爲風濕所搏。結滯不散。濕熱蒸蒸。故通身眼目悉黃。或發寒熱。亦宜前藥。酒疸因飲酒過傷而黃。俗名爲酒黃。宜乾葛煎湯。或梔子仁煎湯調五苓散。或生料五苓飲。加乾葛一錢。

有酒疸後變成腹脹。漸至面足俱腫。及偏身。宜藿香脾飲加木香三錢。或木香麥蘗各半錢。

飲酒即睡。酒毒薰肺。脾土生肺金。肺爲脾之子。子移病而甦於母。故黃。又肺主身之皮膚。肺爲酒毒薰蒸。故外發於皮而黃。此二說故通。法當合脾肺而治。宜藿枇飲。

穀疸因失饑傷飽。胃氣薰蒸而黃。食必即眩。筆。宜紅圓子。

女勞疸因色後爲水濕所搏。故額黑身黃。小腹急滿。大便不利。以大麥一撮。同滑石石膏末各一錢。煎。

諸疸口渴。怔忡。耳鳴。腳軟。當作虛治。宜四君子湯。吞八味圓。五味子附子。皆可用。不可過用涼劑。強通小便。恐腎水枯竭。久而面黑黃色不治。

傷脾致疸。已見之前黃疸證下。外有毒傷脾。小便不利。亦能成疸。煎茆花湯。調五苓飲。

諸失血後。多令面黃。蓋血爲榮。而色紅潤者。血榮之也。血去則面見黃色。醫之草木。春夏葉綠。遇秋葉黃。腎經久虛。耳中潮聲蟬聲。無休止時。妨害聽聞者。當隆氣補腎正元飲。嚥黑錫丹。間進安腎圓。

潤與燥之別也。宜養榮湯。枳歸湯十全大補湯。妨食者。四君子湯。加黃若扁豆各一錢。即黃者四君子湯加陳皮。名異攻散。加此二味。亦得。亦有偏身黃者。但黃不及耳目。或以多年陳皮去白。麻油燈上燒存性。碾末。入麝香少許。加桃花散。法加用乾臙脂白蠟。

病瘧後多黃。蓋瘧謂之脾寒。脾受病故色見於面。宜理脾爲先。異攻散加黃若扁豆各半錢。諸痛後黃者亦宜。

鼻

鼻爲肺風。有不能收而自生者。非鼻因酒。酒渣乃俗呼耳。宜一味折二泔。食後用冷飲。外用硫黃入大菊頭內。碾末之。若鼻尖微赤及鼻中熱生瘡者。羊灰碾末入腦麝少許。綿裹納之。或以枇杷葉拭去毛。不須塗炙。剉細煎膿湯候冷。調消風散。食後臨臥進。

鼻塞流涕不止。有冷熱不同。清涕者腦冷肺寒所致。宜細辛烏附乾薑之屬。濁涕者乃素問所謂膽移熱於腦。故煩鼻淵是也。宜防風甘菊之屬。須以清濁別冷熱。

一方用蒼耳子。即緜絲草子。炒碾爲細末。食後入藥末點服立效。

有不因傷冷而涕多。涕或黃或白。或時帶血。如腦髓狀。此由腎虛所生。不可過用涼劑。宜補腦散。仍以黑錫丹。紫雪丹。靈砂丹。

傷冷熱。鼻塞。流涕多者。通關散。

鼻衄見血門鼻衄證。

鼻衄見血。有生於他處。無毒。獨鼻尖色青黃者。此其人必爲淋也。鼻尖微白者。亡血也。赤者血熱也。

口舌附唇

口舌生瘡。皆有上焦熱鬱所致。宜如聖湯。或口梗湯加黃芩一錢。仍用杏花散。參之。未效則參以四香飲。

有鼽嚏不出之人。服冷劑愈失聲。乃是腎經虛寒。投附子之劑數枚方可。此不可不識。

下虛上盛。致口舌生瘡。若用鎮墜之藥。以降陽湯。宜臨水下發正丹。或黑錫丹。仍於臨臥。熱湯洗足。炒探

鹽湯下發正丹二十三十粒。

若不便於過涼之劑。則不必用洗肝散。宜以三錢黑神散。一錢消風散。

若亦服久而不愈。用諸眼藥皆無效。早起則以蘇子降氣湯下黑錫丹。臨睡則以消風散。下三黃圓。日中別以酒調黑神散。此數藥不獨治久赤諸眼疾皆治之。

若眼常生花。則屬肝虛。當於虛損門監証證求藥。或正坐他病以致病花。合就其所得之病。隨証施治。

又有氣眼。羞怒氣則亦痛。宜服酒調復元通氣散。

又有頭風眼。偏正頭痛。眼不可開。多淚羞明。宜決明散。

耳

耳爲腎竅。耳病皆屬於腎。腎虛故耳中或如潮聲蟬聲。或蚊蚋無聞。宜鳴蚋故。或蟬蟲用酒下。及黃臘粥食之。

腎經久虛。耳中潮聲蟬聲。無休止時。妨害聽聞者。當隆氣補腎正元飲。嚥黑錫丹。間進安腎圓。

風毒攻耳。致生膿者。名停耳。先以綿枝子撚出膿。令淨。次用桃花散吹入。或以多年陳皮去白。麻油燈上燒存性。碾末。入麝香少許。加桃花散。法加用乾臙脂白蠟。

淨吳茱萸小撮拭足了．使以炒熱致足心．用片紙之．男左女右．

貧有舌上病瘡．久鍋成穴．累服涼劑不效．後來有教服黑錫丹．遂得瘥．此亦下虛故上盛也．

外有舌乾腫脹．名曰重舌．一味真蒲黃末摻之．

又有舌無故常自痹者．不可作風治．由心血不足．理中湯加熟附半錢．當歸錢半．

齒

齒痛見諸痛門．齒痛證．其他齒患不一．自有口齒專科．牙齦見齦門．

秘傳證治要訣卷之十一

瘡毒門

雞疽癰毒附發背

發散諸般毒多礬白芙蓉葉入草烏葉少許．蜜調傅．重者加入南星末．凡諸毒用膏藥．欲散．達入麝香．欲潰．摻入雄黃．

一應毒證．已作渴．或膿過多．防其爲渴．宜於千金內補散之外．兼進八味圓．用五味者佳．

又一方治毒並不喜食．於不換金正氣散加白茯苓半夏等分．入參木香減半．亦名正氣散．

發熱惡寒．狀如傷寒．而痛者．其痛處欲爲癰疽．癰屬腑．故生淺．皮薄而腫高．疽屬臆．故生深．皮厚而腫堅．

又有輕於癰疽者．名曰癤．癤．節也．言氣血壅滯阻節也．並威靈仙飲微利之．或五香連翹散．佐以復元通氣散．若膿血結成．不可發散．已潰未潰．宜小托裏散．或千金內補散．加木香光活白芍藥烏藥等分．渴加括蔞根．此數藥皆治陽證．若陰證宜於千金內補散．減防風桔梗之半．倍加白朮．未效更加熟附．與諸藥煎服尤佳．

外有服金石以助欲至精氣既衰．藥毒偏勝．金石與肺同類．肺附於腎．所以多成發背之疾．又有好察爲醫．亦至發背．蓋察之陽氣皆聚於上甲．所以上甲可入藥也．治法同前．若毒發於陰．而又未可用附桂．

癰疽癤．此毒總名．亦舉其大槩耳．其他證狀不一．名稱亦異．未潰之際．壅塞壯熱．狂言妄語．如見鬼神．服去已多而大熱不休者．似爲難治．蓋毒之得膿．猶傷塞病證之得汗．汗已而反大熱．則爲壞傷塞矣．若淋洗貼傅．自腦外科．雖疽發背已潰．出膿過多．而羸瘦者．芎歸湯．凡所服藥並不可用白朮．能生膿故也．未潰與初發陰證用之卻可．

若其人瞤不喜食．不可用千金內補散．滯其脾．恐挾外邪．未潰者二陳湯加芎．或不換金正氣散．已潰者穀神加禾飲．

病消渴之人多生毒．此乃津液已耗．虛陽外發．內外俱虛．此爲極病．凡消渴愈後生毒．毒愈後消渴．皆非可治之病也．

癰疽癤．此毒總名．亦舉其大槩耳．其他證狀不一．名稱亦異．未潰之際．壅塞壯熱．狂言妄語．如見鬼神．服去已多而大熱不休者．似爲難治．蓋毒之得膿．猶傷塞病證之得汗．汗已而反大熱．則爲壞傷塞矣．若淋洗貼傅．自腦外科．雖疽發背已潰．出膿過多．而羸瘦者．芎歸湯．凡所服藥並不可用白朮．能生膿故也．未潰與初發陰證用之卻可．

若其人瞤不喜食．不可用千金內補散．滯其脾．恐挾外邪．未潰者二陳湯加芎．或不換金正氣散．已潰者穀神加禾飲．

病消渴之人多生毒．此乃津液已耗．虛陽外發．內外俱虛．此爲極病．凡消渴愈後生毒．毒愈後消渴．皆非可治之病也．

癰疽癤．此毒總名．亦舉其大槩耳．其他證狀不一．名稱亦異．未潰之際．壅塞壯熱．狂言妄語．如見鬼神．服去已多而大熱不休者．似爲難治．蓋毒之得膿．猶傷塞病證之得汗．汗已而反大熱．則爲壞傷塞矣．若淋洗貼傅．自腦外科．雖疽發背已潰．出膿過多．而羸瘦者．芎歸湯．凡所服藥並不可用白朮．能生膿故也．未潰與初發陰證用之卻可．

若其人瞤不喜食．不可用千金內補散．滯其脾．恐挾外邪．未潰者二陳湯加芎．或不換金正氣散．已潰者穀神加禾飲．

病消渴之人多生毒．此乃津液已耗．虛陽外發．內外俱虛．此爲極病．凡消渴愈後生毒．毒愈後消渴．皆非可治之病也．

瘡如牛皮模樣。痒甚不可忍者。又疹用黃連木香黃柏皮杉木節二箇。明礬少許。以上各等分。研末用好真油調傅。又效。

火帶瘡。遶腰生者。一味剪紅羅或花或葉。細末蜜調傅。立效。或小紙貼在上亦可。

丁瘡。近年病此而死者甚多。以其毒氣寇襲。不可以常瘡藥視之。得之倉卒。立至危殆。宜一味雄黃末。酒調多服。外以蓖耳或葉或子或根或莖。但取一件燒爲灰。醋調如泥。塗上乾卽根出。

痈

痈。素問謂之癰腫。香撲粉入朴硝末。如常撲使。更入少許枯白礬末。

疽疥

自潰已前。方書初無疽疥。至拓拔魏時始有之。膚病初得之。憎寒發熱。身體疼痛。傷寒撫爲。或有發如瘡者。但鼻冷驗爲疽疥。最忌以藥瀉之。致毒氣攻裏。難起。醫子陳文仲方甚詳。或疽疥出三日四日後。徧身稠密。以成水泡。大便自固。別無所犯。瘡忽蝕陷。凹作小孔。如韋巨腳。此非病於不發。蓋瘡出既多。血氣尙少。不足以發之。宜以藥滋養其血。血氣既復。瘡不患不起。宜千金內補散。去防風桔梗。

瘭瘰

瘭瘰之病。皆血氣壅結。根在臟腑。多結於項頸之間。纍纍大小無定。發作寒熱。膿血潰漏。或此沒而彼起。

瘭風瘭下附瘡

瘭風。固精未調。外爲風濕所襲。從陰蝕濕汗作痒。起流注四肢手爻白色。悉生瘡癤。俗謂之腎臟風。四生疽。

每服五六十圓。鹽酒空心下。又用花蛇散和消風散。酒調服。或升麻和氣飲。嚥烏蛇煮鹽丸。及烏荊丸。或花蛇圓。若瘭瘡濕痒。欲得淋洗。則以蛇床子一味。煎湯用之。

下附瘡用眼藥珍珠粉乾摻。又方用水銀膏貼令水出。卻以火中白煆研末。別煆楓丹等分。和勻入麝香少許摻之。瘭風痒不可忍者。薑汁入香油一二滴。提勻塗之。

攧撲附刀傷

仆踣不知曰攧。兩下相□曰撲。其爲損一也。因攧撲而迷悶者。酒調蘇合香丸。或雞鳴散。或和氣飲。加大黃入醋少許煎。或薑便調黑神散。不用童便。用蘇木煎酒調亦得。攧撲傷疼。酒調琥珀散極佳。再有烏藥順氣散。用以治之。風腰疼尤宜。有攧撲人服藥并薰洗搽藥皆不效自若。或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙乳香沒藥各等分。爲細末。和勻。酒調服之。隨卽痛減其半。

刀傷血不止。一味白勻藥散。白酒調服。卽以散摻傷處。或其血出不透。致惡血壅滯。傷處赤腫。或攻四肢頭面並雞鳴散。或煎紅花調黑神散。其有血出不止。勢難遏者。用龍骨乳香等分。研末。窒患處。蛇魚草搽塞尤妙。非特可治刀傷。撲血不止亦可。

惡蟲蛇傷

爲惡蟲蛇所傷。用白芷細嚼傅患處。仍以酒調芷末服。蜈蚣用雞屎塗。蠍傷用蔴其芒燒灰。香油調傅。犬傷用虎骨末傅。貓傷用薄荷搗。蜂蠆傷用人參嚼而傅之。或用諸盤殼燒存性研末。蜜調傅。凡諸惡物傷

急於傷處灼艾數壯亦佳。

發丹

發丹色狀不一。痒痛亦異。大槩皆因血熱肌虛。風邪所搏而發。然色赤者多以赤故謂之丹。宜消風散。入燒楓樹子存性爲末。酒調服。有發面色白者。謂之冷痰。宜消風散雜黑神散。酒調。此病多緣肌肉疎。爲風邪所襲而成。風熱則赤。風冷則白。則今人呼赤爲丹。白爲瘡。所以用酒調士硃服之。而愈者。亦以脾主肌肉。士能入脾。各從其類。若方一名爲癮疹。非特分寒熱。亦兼備四氣。近世方論呼爲白蟄瘡。赤爲血風。赤白二證。並可用烏藥順氣散和消風散。酒調服。白者多用順氣散。赤者多用消風散。有人一生不可食雞肉及獐魚動風等物。纔食則丹隨發。以此見得係是脾風。脾主一身之肌

祕傳證治要訣卷之十二

婦人門

經事不調

婦人每月經水應期而下，不使有餘，猶太陰之缺也。其有或先或後，或少或多，或欲來先病，或過來而斷，皆謂之不調。和氣飲加香附子半錢，兼嗜獨附丸，經事來而腹痛者，經事不來而腹亦痛者，皆血之不調故也。欲調其血，先調其氣，四物湯加吳茱萸半錢，香附子一錢，和氣飲加茱萸半錢，亦可用。痛甚者，玄胡索湯，若審知氣海虛冷而痛者，宜小溫經湯。若只痛不痛，常如肚餓，此乃血虛，胃中枯燥生熱，宜益胃湯，加蘇木紅花乾漆各半錢，性最動血，和氣飲須用桂枝者，性最動血。和氣飲加蘇木紅花乾漆各半錢，有經候失期，或過二三月，纔生諸證者，和氣飲須用桂枝者，性最動血。和氣飲加蘇木紅花乾漆各半錢，挑仁一錢，或酷或酒煎去查，入麝香少許，仍以酷湯調黑神散，因血節而腹內有塊者，四物湯去地黃加官桂白朮各半錢，

因經候不調，血不循故道，從後冀出，腹或疼或不疼，不可作尋常便血治，宜順其經，四物湯去地黃加阿膠香附子各一錢，仍以黑神散和調氣散，白湯點服。

氣疼附血證

男子謂之小腸氣，婦人謂之脾血疼，多因血虛後感冷，致血氣凝滯小腸，疼痛牽引腰脇，宿有病根，不關月事通閉，宜和氣飲，或玄胡索湯，失笑散，間進艾附丸，或以鹽一捻，沸鐵匙上，火燒研碎，酒調下，異攻散，大便通利愈，若審知氣海虛冷而疼，宜小溫經湯，若只痛不痛，常如肚餓，此乃血虛，胃中枯燥生熱，宜益胃湯，加蘇木紅花乾漆各半錢，性最動血，和氣飲須用桂枝者，性最動血。和氣飲加蘇木紅花乾漆各半錢，血藥泄之，可用四物湯，久不治則成消中。

血虛

血虛者，心頭痛痛，四物湯去地黃加香附子如數。

有病後血虛者，有本體血虛者，其人往來寒熱，或五心發熱，言語無力，面色痿黃，頭目昏暈，變生諸疾，宜歸脾湯加羊肉少許，或十全大補湯，四物湯、養榮湯服之，血虛而氣旺，宜抑氣湯，即香附末。

血虛而腹疼者四物湯

婦人血虛，怒氣用心者，如顛狀，又如心風，或笑歌，或妄語，月事來及違中，多有此證，四物湯半貼，去厚朴亦異，甚則頭目昏暈，四肢厥冷，並宜勝艾湯，嚥震靈丹，佐以三灰散，或以童子小便煎理中湯，或以沉香降氣湯加入百草霜，米飲調下，血崩甚而腹痛，人多疑惡血未盡，又見血色猝黑，愈信惡血之說，不敢止截，大凡血之爲患，欲出未出之際，停在腹內，卽成瘀色，難盡以瘀爲惡，又焉知瘀之不爲虛冷乎，若必待見瘀血之後截之，恐併與人蓐之類，此腹痛更有說，積而腹痛，血通而痛止，崩而腹痛，血住則止，止宜芎歸湯加乾姜炙附一錢，止其血而痛自定，仍以刺花綉拭黑片燒灰研末，米飲下，亦有以早黃麻根燒灰爲末，米飲下。

崩中

崩有血熱而成者，有氣虛而成者，血大至曰崩，中或清或濁，或純下瘀血，或膿勢不可止，證狀非一，所感亦異，甚則頭目昏暈，四肢厥冷，並宜勝艾湯，嚥震靈丹，佐以三灰散，或以童子小便煎理中湯，或以沉香降氣湯加入百草霜，米飲調下，血崩甚而腹痛，人多疑惡血未盡，又見血色猝黑，愈信惡血之說，不敢止截，大凡血之爲患，欲出未出之際，停在腹內，卽成瘀色，難盡以瘀爲惡，又焉知瘀之不爲虛冷乎，若必待見瘀血之後截之，恐併與人蓐之類，此腹痛更有說，積而腹痛，血通而痛止，崩而腹痛，血住則止，止宜芎歸湯加乾姜炙附一錢，止其血而痛自定，仍以刺花綉拭黑片燒灰研末，米飲調下，一方以毛蟹殼燒存性，米飲下，亦有以早黃麻根燒灰爲末，米飲下。

赤白帶

赤白帶下，皆因七情內傷，或下元虛冷，或非一端，大率下白帶多間有下赤者，並宜順氣散，吞震靈丹，仍佐芡附閒，或米飲調沙參末，帶下不止，成痼疾者，四物湯加煅牡蠣粉半錢，吞固陽圓，多服取效。

有帶疾愈後一二月，或再發，半年一發，先血而後下帶，來不可遏，停蓄未幾，又復傾瀉，此名漏帶，最難治。下截之血，小腹主之，有因血虛而虛熱陷入小腸，致小便澁痛，色白如泔，或成沙粒，皆不可作淋治，用冷劑，宜以四物湯五苓飲各半貼和煎。

胎前產後

胎前惡阻，見食嘔吐，惡噎酸物，多臥少起，俗謂之病鬼，蓋其人宿有痰飲，血虛過而不行，故飲隨氣上，停於胸膈，

滯汗經脈之味酸則必辛咳酸物金尅木以辛勝之小半夏茯苓湯或二陳湯若嘔吐不食心虛煩悶宜橘薷飲加竹茹指大有服熱藥致胸悶熱成疾宜葡萄散荷葉散轉胞之說諸論有之以胎漸長且近下逼近於胞胞為所逼而側令人數洩故名轉胞胞即膀胱也然子淋與轉胞相類但小便頻數點滴而痛為子淋頻數出少而不痛為轉胞間有微痛終是與淋不同並宜生料五苓散加阿膠一錢獨活寄生湯更加車前子一味煅灰湯尤妙

有胎轉胞用搐鼻藥多打噴嚏或用拳打腳心知痛令病人仰身掇起則臟腑搖動而胞自反上

產後諸病有作寒作熱而亦有獨熱然獨熱亦有三惡血未下者腹痛而發熱咸外邪者必有頭痛惡風而發熱惟血虛即但發熱而無餘證名曰蒸勞宜於前血虛證求藥

產後血虛而煩羸黃隔紙炒東流水調下產後順移惡血不止諸藥不效宜膏歸湯加五味薑脂玄胡索煎

妊婦子死或不死胎動決安水酒宜合煎芎歸未死即安已死即下藏腹雖舉骨經用萬不失一

將產腳赤腫俗名皺腳香蘇散加木香一錢

將產豐肉氣瘦胎便臨期易產宜瘦胎飲加縮砂少許

產者用羊血半盞烏雞雞子清并水與香油等打勻冷進一服脂衣不下赤小豆小麥等分煎服仍以卓麻去殼研七粒塗兩足心衣下即洗去

產後血入肺面黑發喘宜以參一兩為末別剉蘇木二兩水二碗煎七分調參末名參蘇飲

產後去血大便不潤而祕宜橘杏圓麻仁圓應失血艱結者皆可用

產後發熱迷悶俗謂之發熱血新瓦上炒荊芥不拘多少半炒半生為末溫熱水調下一錢名獨行散或疑豆淋酒太熱用童便調尤宜若剉散便煎亦得荊芥乃產後要藥角弓反張豆酒調極妙癍經失喜迷悶不發熱者便調無不效

產後以手摸肚遂痛俗呼為嫁母痛童便調白芷末破血用歸身補血用歸身與頭即是官桂肉收汗枝發汗之義

四物湯婦人要藥於內加吳茱萸半錢或一錢應血氣病無不治

婦人有一生只破腹而虛者既不破腹何緣有虛大抵婦人以血為主血衰氣旺定無兒正因血虛所以不育婦人懷子服固胎藥太多或正產或半產胎雖下而惡血不即去或經二三月而惡露猶滴此非敗血之比正緣當來有固經藥在內致血滯而不化藥宜順血通氣不宜苦血閉氣

彌月俗名滿肚多有忍意食物致傷食發熱有類傷寒食復之證宜先用紅圓子一二服卻進小柴胡湯此論蓋有所本

婦人之藥大率皆甜不利於脾芎歸猶滯況於地黃乎脾胃實者服之固見有功若素有痰飲及有甜人諸血藥中半夏陳皮自不可少

金匱鉤元

金匱鉤玄目錄

卷第一

中風 六鬱 痫 寒
傷寒 暑 注夏 暑風
濕 內傷 火 傷風
發斑 疹 温病 瘧
咳嗽 痰 喘 哮
痢 禁口痢 泄瀉 脾泄
霍亂 乾霍亂 嘔吐 惡心
翻胃 傷食
吞酸 噦雜
水腫 蛊脹
吃逆 頭風
眩暈 眉痛

卷第二

心痛 腰疼
痛風 勞瘵
咯血 衄血
腸風 夢遺
淋 小便不通
癇 健忘
痓 血塊
疝 脚氣
陽虛惡寒 手心熱
厥 面寒面熱
咽喉生瘡 口瘡
肺痿 天疱瘡
腸癰 結核
痞 食噎
五疸 消渴泄瀉
自汗 盜汗
頭痛 頭眩
耳聾

卷第三

婦人科

經水 血崩
白帶并痛風
胎動 惡阻
胎漏 子腫
產後 血暈
泄 惡露不盡
中風 發熱惡寒
痞 噯氣

小兒科

吐瀉黃疸 急慢驚風
腹脹 夜啼
脫肛 木舌
喫泥 痢疾食積
口瘡 風疳病
鼻赤 瘡瘍
癇頭 解顱 齲齒 赤瘤

金匱鉤玄卷一　江陰朱氏校刊本

元　丹溪朱震亨著　門人戴元禮錄

中風

大率主血虛有痰以治痰爲先或虛挾火與濕亦有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從痰治順氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡因脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰有熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鍛汁皂角重用藜蘆半錢或三分加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁

血虛宜四物湯俱用薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝

又法以猪牙皂角白礬等分爲末薑湯調下名稀涎散

血虛者四物湯補之　挾痰者亦用薑汁竹瀝

脈訣內言諸不治證見則不可治筋枯者不治舉動則筋痛者是筋枯以其無血滋潤故也

治痰氣實能食用荊瀝　氣虛少食用竹瀝

此二味用開經絡行血氣入四物湯中必用薑汁助之

肥白人多濕少用附子烏頭行經

初昏倒急掐人中至醒然後用去痰藥二陳湯四君子等湯加減用

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化也此爲傳化失當六鬱之病見矣氣鬱者胸脇痛脈沉澁濕鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脈沉細痰鬱者動則自喘寸口脈沉滑熱鬱者督小便赤脈沉數血鬱者四肢無力能食便紅脈沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脈平和氣口脈緊盛者是也

氣血中和萬病不生一有怫鬱諸病生焉

氣鬱　香附子　蒼朮　川芎

濕　蒼朮　川芎　白芷

痰　海石　香附　南星

熱　青黛　香附　蒼朮　瓜蔞

血　桃仁　紅花　青黛　川芎

食　蒼朮　香附　鍼沙炒黑　山查神麯炒

春加芎　夏加苦參　秋冬加吳茱萸

越鞠丸　解諸鬱　又名芎朮丸

蒼朮　香附　撫芎　神麯　梔子各等分

爲末水丸如菜豆大

凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降餘皆倣此

頰

大風病是受得天地間殺物之氣古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡物陳蓐於溲道中出取出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經治此證者須知此意看其先痛癢與痛上先見者上發多者在上也下先見者下愈多者在上復在下也陽明胃經與大腸無物不受此風之人人也氣受之則在上多血受之則在下多血氣俱受之者上下俱多也自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫從上從下以漸而來者皆可治人見其病勢之緩多忽之雖按法施治病已痊可若不能忌口絕色皆不免再發發則終於不能救也余曾治五人中間惟一婦人不再發以其貧甚而且寡無物可喫也餘四人三四年後皆再發孫眞人云吾嘗治四五十人終無一人免於死非眞人不能治蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病裏外又服百餘貼加減四物湯半年之上方得經行十分安愈

治法　在上者醉仙散在下者通天再造散後用通神散及三稜鍼於委中出血但不能忌口絕房者不治

醉仙散

胡麻仁　牛蒡子　蔓荊子　枸杞子各半　兩炒褐色　白殭蠶　苦參　瓜蔞根　防風各半兩

右八味爲細末每一兩半入輕粉三錢拌勻大人一錢空心日午臨睡各一服淡茶調下五七日間必於齒縫中出臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下惡臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急者須以再造散下之候補養得遠復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒炙等物止可淡粥及淡煮熟時菜食之茄尚不可食惟有烏稍蛇菜花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散

鬱金半兩生用　大黃一兩炮　皂角刺一兩黑者大者　白犁牛頭末六錢半炒半生用之

右爲末五錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄出蟲如蟲口黑色乃是多年蟲口如赤色是近者三數日又進一服直候無蟲即絕根也

寒　主乎溫散

有卒中天地之寒氣有口傷生冷之物

戴云此傷寒謂身受殘殺之氣口食冰水瓜果冷物之類病者必脈沉細手足冷息微身倦雖身熱亦不渴倦言語或遇熱病誤用此法輕者至重重者至死凡脈數者或飲水者或煩燥動搖者皆是熱病寒熱二證若水火也不可得而同治誤即殺人學者愼之

傷寒

傷寒必須身犯寒氣口食寒物者從補中益氣湯中加發散藥扁內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之證出入加減氣虛熱甚者少用附子以行參芪之劑如果氣虛者方可用此法　已上傷寒治法可用於南方不宜北

暑

戴云暑乃夏月炎暑也盛熱之氣著人也有員有傷有中三者有輕重之分虛實之辯或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲益黃連退暑熱香薷消畜水或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此爲熱傷在分肉也當以解毒白虎湯加柴胡氣如虛者加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脈數者熱在肺經用清肺湯柴胡天水散之類急治則可遲則不可治矣或火乘金也此爲中暑凡治病須要明白辯別愼勿混同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方爲妙

黃連香薷飲　挾痰加半夏　乘虛加人參

或清暑益氣湯加減用之

注夏　屬陰虛元氣不足

戴云秋初夏末頭痛腳軟食少體熱者是也補中益氣湯去柴胡升麻加炒黃柏挾痰止用南星半夏陳皮之類或生脈散出千金方

暑風

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎烁所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而動激痰飲壅礙心之竅道則手足不知動蹈而卒倒也此二者皆可吐內經曰火鬱則發之挾火挾痰實者可用吐法吐卽發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

濕

戴云濕有自外入者有自內出者必審其方土之致病源東南地下多陰雨地濕凡受必從外入多自下起以重腿腳氣者多治當汗散久者宜疎通滲泄西北地高人多食生冷濕麪或飲酒後寒氣怫鬱濕不能越作腹皮脹痛甚則水皷脹滿或通身浮腫如泥按之不起此皆自內而出也辯其元氣多少而通利其二便賁其根在內也此方土內外亦互相有之但多少不同須對證施治不可執一

本草蒼朮治濕上下俱可用

二陳湯加酒芩羌活蒼朮散風之藥行濕最妙

內傷

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺家可用參苓甘草少許蘆汁冷服或茶匙挑蘆汁與之虛者可用人參湯世之病此者爲多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱於內而發者皆以補元氣爲主看其所挾之病而兼用藥

火

有可發者二　風寒外來者可發　鬱者可發

陰虛火動難治　火鬱當發看何經　輕者可降重則從其性升之　實火可瀉　小便降火極速　凡氣有餘便是火

火急甚重者必緩之生甘草

兼瀉兼緩人參白朮亦可

人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝水水飲之虛火盛狂者可用生黃湯與之若投以冰水正治立死有補陰卽火自降者炒黃柏地黃之類

山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下行降火人所不知

凡火盛者不可驟用涼藥必用溫散
又方左金丸治肝火
黃連六兩 茱萸一兩半
水爲丸白湯下五十丸

傷風

或云新咳嗽鼻塞聲重者是也
屬肺者多 散宜辛溫或辛涼之劑

發癍 屬風熱

或云癍有色黑而無頭粒者是如有頭粒即疹也風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散消息當以微汗而散之下非理也
內傷癍者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降之發癍似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之下之非理也

疹

或云疹浮小有頭粒者是隨出即收收則又出者是也非若癍之無頭粒也當明辯之
屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者

溫病

眾人病一般者是也又謂之天行時疫有三法宜補宜降宜散

又方

大黃 黃芩 黃連 人參
桔梗 防風 蒼朮 滑石
香附 人中黃

右爲末神麯爲丸每服五七十丸分氣血痰作湯使

氣虛四君子湯血虛四物湯痰多二陳湯送下
如熱甚者可用童子小便送下
大頭天行病東垣有方

羌活 酒芩 大黃酒蒸

冬溫爲病非其時而有其氣者冬時君子當閉藏而反發泄於外專用補藥增表
又方以竹筒兩頭留節中作一竅納甘草於中仍以竹木釘閉竅於大糞缸中浸一月取出晒乾專治

瘧毒

有風有暑有食老瘧瘧母痰病
老瘧病此係風暑入陰分在臟用血藥川芎撫芎紅花當歸加蒼朮白朮白芷黃柏甘草煎露一宿次早服之無汗要有汗要無汗正氣爲主帶散有瘧母者用丸藥消導酷羌鱉甲爲君三稜蓬朮香附隨證加減
三日一發者受病一年間發者受病半年一日一發者受病一月遲二日者氣血俱受病一日間一日者補氣帶表藥後用瘧丹截之在陰分者用藥徹起在陽分方可截之

又方

草果 知母 檳榔 烏梅
常山 甘草炙 川山甲炮

用水酒一大碗煎至半碗露一宿臨發日前二時溫服如吐則順之

截瘧青蒿丸

青蒿一兩 冬青葉一兩 馬鞭草二兩 官桂二兩

右三葉皆晒乾秤爲末法丸如胡椒子大每兩作四

服於當發前一時服盡
大法暑風必當發汗夏月多在風涼處歇逢閉其汗而不泄因食者從食上治
瘧而虛者須先用參朮一二貼托住其氣不使下陷後用他藥治內傷挾外邪者同法內必主痰必以汗解二陳湯加常山柴胡黃芩草果
瘧而甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水自汗可與參朮芩連梔子川芎蒼朮半夏等治
久病瘧二陳湯加川芎蒼朮柴胡葛根白朮一補一瀉

咳嗽

風寒 火主降火 勞 肺脹

或云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大概耳亦當明其是否也

風寒行痰開腠理二陳湯加麻黃杏仁桔梗
火降火清金化痰
勞四物湯加竹瀝薑汁必以補陰爲主
肺脹而嗽者用訶子青黛杏仁訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿取其味酸苦有收斂降火之功佐以海蛤粉香附瓜蔞青黛半夏麵
食積痰作嗽發熱者半夏南星爲君瓜蔞萊菔子爲臣青黛石鹼爲使
火鬱嗽者訶子海石瓜蔞青黛半夏香附
咳嗽聲勞者此血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調服久嗽風入肺用鵝管石雄黃鬱金款冬花碾末和艾中

以生薑一片留舌上炙之以煙入喉中爲度乾咳嗽者難治此係火鬱之證乃痰鬱火邪在中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞倒倉好此證不得志者有之

嗽而脇痛宜疎肝氣用青皮等方在後二陳湯內加南星香附青黛薑汁

治嗽藥大概多用生薑者以其辛散也

上半日嗽多者屬胃中有火貝母石膏能降胃火午後嗽多者此屬陰虛必用四物湯加知母黃栢先降其火

方頁嗽多者此胃中有食積至此時候流入肺金知母地骨皮降肺火

火氣浮於肺者不宜用涼藥用五味五倍斂而降之

有痰因火逆上者先治火後治其痰也

肺虛甚者用參膏此好色腎虛有之以生薑陳皮佐之大概有痰者可加痰藥治之

治嗽多用聚殼不必疑但要先去病根此乃收後之藥也　師云陰分嗽者多屬陰虛治之也

有嗽而肺脹塞過不得眠者難治

治嗽煙筒

佛耳草　款冬花　鷰管石

右爲末用紙捲燒其煙薰之或白湯調亦得

治嗽有痰天突肺腧二穴灸治嗽泄火熱大瀉肺氣

三椎骨下橫過各一寸半是穴

嗽春是春升之氣用清藥二陳加薄荷之類夏是火炎上最重苓連秋是濕熱傷肺冬是風寒外來用藥發散之後以半夏必逐去痰庶不再來

又方治嗽却藥

五味子半兩　五倍子一錢　甘草二錢半　風化硝一錢

右爲末以蜜爲丸嚥化之

痰　脈浮當吐

凡治痰用利藥過多致胸氣下虛則痰反易生多濕痰　用蒼朮

老痰　海石　半夏　瓜蔞子　香附　五倍子

熱痰　用青黛　黃連

食積痰　神麯　麥蘗　山查子

痰在腸胃間者可下而愈痰在經絡中者非吐不可出吐法中就有發散之義也

膈上之痰必用吐之瀉亦不能去也

氣實痰熱結在上者則止吐難得出或成塊或吐咯不出氣滯兼鬱者此則難治矣

膠固者必用吐之

吐法兼用牙茶藍水藍汁醋少許瓜蔞散少許加防風桔梗皆升動其氣便吐也

吐法　用附子尖　桔梗蘆　人參蘆　瓜蒂　黎蘆　艾葉　末茶

右藥此皆自吐不用手探但藥但湯皆可吐

吐法先以布搭膊勒腰於不通風處行此法

藠蔔子半升擂細以漿水一碗濾去粗入少油與蜜旋至半溫服後以蓋倒探吐凡用藠倒須以桐油浸却以皂角水洗去肥晒乾用之

又法用蝦蚓殼半斤入醬蘆薈等料物煮汁先喫蝦後飲汁以翎勾引吐必須繁勒肚腹

二陳湯一身之痰都能管如在下加下引藥如在上加上引藥

凡人身上中下有塊者多是痰也問其平日好食何物吐下後用藥

許學士用蒼朮治痰飲成窠囊一邊行極効痰挾瘀血蓄成窠囊

痰之清者屬寒用二陳湯之類

內傷挾痰必用人參黃芪白朮之屬多用薑汁傳送

或用半夏之屬虛甚者宜加竹瀝

痰熱者多挾風外證爲多

濕者多軟如身倦而重之類熱者清之食積者必兼攻之瘀氣虛者用補氣藥補之

因火盛逆上者治火爲先白朮黃芩石膏之類中氣不足則加人參白朮痰之爲物隨氣升降無處不到脾虛者清中氣二陳加白朮之類兼用提藥

中焦有痰與食積胃氣賴其所養卒不便虛若攻之盡則虛矣

眩暈嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩蓮類噫氣吞酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩爲君南星半夏爲臣橘紅佐之熱多者加青黛

痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外者非薑汁竹瀝不可達

痰在膈間使人顛狂健忘宜用竹瀝風痰亦服竹瀝

又能養血痰在四肢非竹瀝不開

痰結核在咽喉燥不能出入化痰藥加軟堅鹹藥

杏仁　海石　桔梗　連翹

瓜蔞仁

少佐樸硝以薑汁蜜調丸嚥化之

海粉卽海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子末子不可入煎藥

黃芩治熱痰假以降其熱也

竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡也

枳實瀉痰能衝堅壁　五倍子能治老痰

小胃丹　治腑上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛然能損胃氣食積痰實者用之不宜多

青礞石丸　去濕痰重在風化硝

潤下丸　降痰最妙

陳皮半斤去白以水化鹽半兩拌陳皮令得所煮候乾炒燥一方不去白甘草一兩炙

右爲末蒸餅丸菜豆大每服三十五丸溫水下

油炒半夏大治濕痰又治喘止心痛粥丸蓋湯下三十丸

痰方

黃芩空心　香附　半夏薑製　貝母

已上治濕痰加瓜蔞仁　青黛　作丸子治熱痰

中和丸治濕痰氣熱

蒼朮　黃芩　香附　半夏各等分

右爲末粥丸

療濕痰方亦治白濁因痰者

南星一兩　半夏一兩　蛤粉二兩　青黛降衣

右爲末神麴糊丸

痰嗽方

黃芩一兩半酒浸洗滑石半兩　貝母一兩　南星一兩

風化硝二錢　白芥子半兩去殼

右爲末湯浸蒸餅爲丸

導痰湯

半夏四兩　南星

赤茯苓一兩　甘草半兩

用生薑煎服之

千緡湯

半夏七枚泡製四片破之　皂角去皮炙一寸二分

甘草炙一寸　生薑如指大

煎服之治喘

南星　半夏

巴豆三十粒　滑石　輕粉各二錢

右用皂角仁浸濃汁丸如梧桐子大每服五十丸

黃連化痰丸

黃連一兩　陳皮五錢　枳殼

右爲末入桃仁二十四箇研如泥和勻神麴糊丸如豌豆大每服百丸薑湯送下

消痰方

益元散七錢　吳茱萸二錢

治鬱痰方

白殭蠶　杏仁　瓜蔞　訶子　貝母

喘

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有退得食則減食已則喘大概胃中有實火膈上有稠痰得食咽壅下稍痰喘卽止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以涼熱之藥者以火濟火也昔葉都督患此諸醫作胃虛治

之不效後以導水丸利五六次而安矣

凡久喘未發以扶正氣爲要已發以攻邪爲主

有氣虛短氣而喘　有痰亦短氣而喘

有陰虛自小腹下火起而上者

喘急有風痰者婦人大全方千緡湯

陰虛有痰喘急者補陰降火四物湯加枳殼半夏

氣虛者人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類

大概喘急之病甚不可用苦藥涼藥火氣盛故也可用導痰湯加千緡湯治之

諸喘不止者用却藥一二貼則止之却藥之後因痰調下止之

又法用雞蘇子蒸熟爲君皂角燒灰等分爲末以生薑汁煉蜜爲丸小桐子大每服五七十丸嚼化下之

治痰因火治火椒目碾極細末用一二錢以生薑湯煮豆大每服百丸薑湯送下

效

哮　專主於痰宜吐法

治哮必用薄滋味不可純用涼藥必帶表散

治哮方　用雞子畧敲殼損膜不損漫於尿缸內三四日夜取出煮熟食之効蓋雞子能去風痰

痫　身熱　後重　腹痛　下血

戴云痫雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治但分新舊耳新者元氣用藥與赤白帶同

身熱挾外感

不惡寒小柴胡湯去人參

惡寒發熱爲表證宜微汗和解

蒼朮　川芎　陳皮　甘草生薑煎服

芍藥

後重積與氣鬱墜下兼升兼消
或氣行血和積少但虛坐努力此爲亡血倍用歸身
足却以生芍藥生地黃桃仁佐之復以陳皮和之
或下痢而大孔痛者此因熱流於下也用木香檳榔
黃芩黃連炒乾薑
或纔退減十之七八積已盡糟粕未實當炒若糞炒
白朮炙甘草陳皮茯苓湯下固腸丸三十粒然固腸
丸性燥有去濕實腸之功恐滯氣未盡者不可遽用
此藥只宜單服此湯可也
或痢後糟粕未實或食稍多或饑甚方食腹中作痛
者切勿驚恐以白朮陳皮各半蓋煎服和之則安
或久痢後體虛氣弱滑瀉不止又當以訶子肉豆蔻
白朮半夏之類擇用以澀之甚則加牡蠣然須以陳
皮爲佐若太澀亦能作痛又甚者炙大楓氣海
古方用厚樸爲瀉燒滯之氣然樸太温而散氣久服
大能虛人滯氣稍行卽去之餘滯未盡以炒枳殼陳
皮然枳殼亦能耗氣比之厚樸少緩比陳皮亦重滯
退一半當去之只用陳皮以和諸藥陳皮去白有補
瀉之兼才若爲參朮之佐亦能補也
凡痢疾腹痛必以白芍藥甘草爲君當歸白朮爲佐
惡寒痛者加桂寒熱痛者加黃柏達者更能殺以感
氣時令用藥則萬舉萬全豈在乎執方哉

諸不治證

下痢純血者必死　下痢如塵腐色者死
下痢如屋漏者死　下痢如竹筒注者不可治
下痢如魚腦者半生半死
噤口痢　開口熱甚故也

黃連多加人參煮湯終日呷之如吐了再喫開以降
之人不知此多用温藥甘味此以火濟火以滯益滯
哀哉

一方膚中用田螺　引下其熱
亦有誤服熱藥濕藥之毒犯胃者當明審以祛其毒

痢方亦作丸

大黃　黃連　黃芩
枳殼　當歸　白芍藥
甘草　桃仁　滑石　黃柏
白朮各等分

右爲末神麯糊丸
孫郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶
蒼朮　白朮　厚樸
滑石
右煎下保和丸
小兒八歲下痢純血以食積治
蒼朮　白朮　黃芩
滑石　茯苓　白芍
炒麵　陳皮
右煎下保和丸
又下痢法熱不止者屬陰虛用寒涼藥升藥熱藥
泄瀉　濕　氣虛　火　痰　食積
戴云凡瀉水腹不痛者是濕也飲食入胃不住或完
穀不化者是氣虛也腹痛瀉水腹鳴痛一陣瀉一陣
是火也或瀉時或不瀉或多或少是痰也腹痛而
瀉瀉後痛減者是食積也
濕　燥濕兼滲泄之四苓散加蒼朮白朮甚者二朮
炒氣虛人參白朮芍藥炒升麻

火　宜伐火利小水黃芩木通入四苓散
痰積　宜豁之海石青黛貝母神麯蛤粉或用吐法
食積　宜消導疎滌之神麯大黃
已上諸藥皆作丸子服之
凡泄瀉水多者仍用五苓散治之而虛者或可行之
世俗類用澁藥治痢與瀉若積久而虛者或可行之
而初得之者恐必變他疾爲禍不小矣殊不知多因
於濕惟分利小水最爲上策
正瀉方

肉豆蔻五錢　滑石春冬一兩二錢半夏二兩半秋二兩
又方薏麵丸
陳麵六兩炒　陳麥亦可　茴香五錢　生薑一兩
右炒白朮炒麵炒芍藥或丸或散或湯作丸妙
脾泄
治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄
之疾
白朮二兩炒　白芍藥一兩酒拌炒　神麯一兩
山查一兩半炒　半夏一兩洗　黃芩五錢炒
右爲末荷葉包飯煨爲丸
治一老人年七十面白脈弦數獨胃脈沉滑因飲白
酒作痢下血淡水腹後腹痛小便不利裏急後重參
朮爲君甘草滑石檳榔木香蒼朮最少下保和丸二
十五丸第二日前證俱減獨小便不利以益元散服
之

霍亂

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者
謂之乾霍亂也

轉筋不住男子以手捉其陰女子以手牽其乳近前
候邊此乃千金妙法也
內有所積外有所感湯不升陰不降乖隔而成矣切
勿以米湯與之立死 脈多伏為絕
兒成吐瀉還用吐提其氣起
大法生薑理中湯最好 有可吐者 有可下者
吐用二陳湯加減亦可 或梓樹木煎湯吐亦可

乾霍亂

此病最難治死在須臾升降不通故也
此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐法者則乘
發散之義也
吐提其氣極是良法 世多用鹽湯
有用溫藥解散者 其法解散不用涼藥
二陳湯加和解散 川芎防風蒼朮白芷

嘔吐

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦
有痰膈中焦食不得下者 有氣逆者
有寒氣鬱於胃口者 胃中有痰有熱者
然胃中有火與痰而致嘔吐者多矣
朱奉議以半夏生薑橘皮為主
孫眞人誤以噦為咳逆
劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳
胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子黃連生薑
久病嘔者胃虛不納穀也以生薑人參黃芪白术香
附

惡心 有熱 有痰 有虛

藏云惡心者無聲無物但心中欲吐不吐欲嘔不嘔
愛氣 胃中有火有痰

雖曰惡心非心經之病其病皆在胃口上宜用生薑
蓋能開胃豁痰也 時用生薑隨證用藥
翻胃 即膈噎 膈噎乃翻胃之漸 發揮備言

藏云翻胃有四血虛氣虛有熱有痰血虛者脈必數
而無力氣虛者脈必緩而無力氣血俱虛者則口中
多出沫俱見沫大出者必死有熱者脈數而有力有
痰者脈滑數二者可治血虛者四物為主氣虛者四
君子為主熱以解毒為主痰以二陳為主大約有四
血虛 氣虛 有熱 有痰兼病

必用童便竹瀝薑汁牛羊乳

糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也

痰用二陳湯為主寸關脈沉或伏而大
有氣滯結者通氣之藥皆可用也寸關脈沉而滑
虛四君子湯為主血虛四物湯為主左手脈無力大
不可用香燥之藥服之必死宜薄滋味
馬剝兒燒灰存性一錢重好棗肉平胃散二錢溫酒
調服食即可下然後隨病源調理神効

陳皮 三斤 三兩 厚樸 二斤 二兩 甘草 三十 兩 蒼朮 五斤

傷食

戴云惡食者胸中有物導痰補脾
二陳湯加 白朮 山查 川芎 蒼朮
痞 食積兼濕 東垣有法有方

又痞滿方

吳茱萸 三兩 黃連 八兩

粥為丸

軟石膏 半夏 或湯或丸

吞酸

戴云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱過其食不
得傳化故作酸也如穀肉在器濕熱則易酸也必用
茱萸順其性而折之反佐茱萸黃連

嘈雜 只是痰因火動

戴云此即俗謂之心嘈也

梔子薑炒黃連不可無 梔子黃芩為君

南星 半夏 橘皮

熱多加青黛

肥人嘈雜二陳湯加撫芎用蒼朮白朮炒梔子

五痘

不用分五同是濕熱如食鹽麵相似

戴云五痘者遍身皮膚并眼如梔子水染因食積黃
者最其虛實下其食積其餘但利小便為先小便利
白黃即自退

輕者小溫中丸 重者大溫中丸

熱多者加黃連 濕多者茵蔯五苓散加食積藥

消渴泄瀉

先用白朮白芍藥炒為末調服後却服消渴藥

消渴 養肺 降火 生血為主 分上中下治

黃連末 天花粉末 人乳 生藕汁
生地黃汁

右二物汁為膏入上藥搜和佐以薑汁和蜜湯為膏
徐徐留於舌上以白湯少許送下
能食加石膏 瓜蔞根治消渴神藥

水腫

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水利小便進飲食元氣實者可下

此因脾虛不能制水水漬炙行當以參朮補脾氣得實則自能健運自能升降運動其樞機則水自行非五苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下二陳湯加白朮人參爲主佐以蒼朮炒梔子黃芩參門冬制肝木若腹脹少佐厚樸氣不運加木香木通

氣若陷下升麻柴胡提之隨證加減必須補中

產後必用大補氣血爲主少佐以蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾壅滿用半夏陳皮香附監之

有熱當清肺麥門冬黃芩之屬

一方用山梔子去皮取仁炒搥碎米飲送下若胃脘熱病在上者帶皮用

皺腹　又名單皺　其詳在格致論中

大補中氣行濕此乃脾虛之甚須必遠音樂斷厚味以大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之類

有血虛　當以四物湯行血

脈實兼人壯盛者或可用攻藥便用收拾白朮爲主厚樸治腹脹因味辛以散其氣在中焦故也

自汗　屬氣虛　濕熱　陽虛

東垣有法有方

人參　黃芪　少佐桂枝

陽虛附子亦可用

撲法

牡蠣　麩皮　藥水　糯米

防風　白芷　麻黃根

爲末週身撲之

火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼隔散主之

痰證亦有汗者

盜汗　血虛　陰虛

戴云盜汗者睡則汗自出覺則無矣非若自汗而自出也　小兒不須治

東垣有法有方當歸大黃湯

盜汗方

白朮四兩一兩用黃芪同炒一兩用石斛同炒一兩用牡蠣末同炒一兩用麥皮同炒各微黃色餘藥不用只用白朮

右爲細末每服三錢用粟米湯調下盡四兩効

呃逆　有痰　氣虛　陰火　視其有餘不足治之

戴云呃逆因痰與熱胃火者極多

不足者人參白朮湯下大補丸

有餘并痰者吐之人參蘆之屬

頭風　有痰者多

左屬風　荊芥　薄荷

屬血虛　川芎　當歸　芍藥

右屬痰　蒼朮　半夏

屬熱　黃芩

搐藥有用葦撥猪膽

頭痛　多主於痰

痛甚者火多　亦有可吐者　亦有可下者

清空膏治諸般頭痛除血虛頭痛不治

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯

古方有追涎藥　出東垣試効

羌活　防風　黃連各炒一兩　柴胡七錢

川芎二錢　甘草炙一兩半　黃芩三兩刮去黃色剉碎一半酒炒一半

右爲末每服二錢七熟盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用湯送下臨卧服之

頭眩

痰挾氣虛火治痰爲主　挾補氣藥并降火藥

屬痰　無痰則不能作眩

屬火　痰因火動　又有濕痰者　有火多者

左手脈數熱多　脈滑有死血

右手脈實痰積　脈大必是久病

頭暈　火動其痰

二陳湯加黃芩蒼朮羌活散風行濕或用防風行濕之劑可也

昔有一老婦患赤白帶一年半是頭眩坐立不久睡之則安　專用治赤白帶除之其眩自安矣

肩稜痛

風熱痰　作風痰治類痛風

白朮酒黃芩末茶調服

又方川烏頭草烏二味爲君童便浸洗炒去毒細辛黃芩羌活甘草佐之

耳聾

少陽厥陰熱多　皆屬於熱耳鳴者是

戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

草麻子四十九粒　棗肉十箇

右入人乳搗成膏子石頭上曬乾便丸如桐子大以綿裹塞於耳中

又方用鼠膽入耳中尤好　仍開痰散風熱

大病後須用四物湯降火

有陰虛火動干嘔者亦如上法

金匱鉤玄卷一終

元　丹溪朱震亨著　門人戴元禮編錄

心痛　胸門脘痛

心痛由痰多不喫飲食不死若痛方止便喫還痛
必須三五服藥後方可喫物
大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒
物而病於初得之時當以温散或温利之藥若曰病
得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱熱則久必生火原病
式中備言之矣若欲用温散竈無助火添病耶由是
古方中多以山梔爲熱藥之向導則邪伏而病易退
正易復而病易安雖然病安之後若縱恣口味不攻
前非病復作時必難治之也
山梔炒去皮每十五箇濃煎湯一呷入生薑汁令辣
再煎小沸服或入芎一錢尤妙山梔大者用七箇或
九箇大概胃口有熱而作痛非山梔子不可佐以諸
葯或半夏橘紅各五錢芩三錢一
用二陳湯加蒼芎倍加炒梔痛甚者加炒乾薑從之
反治之法心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石膏川
芎蒼朮梔子必炒去皮用作丸服之
凡治病必須先問平日起居如何假如心痛有因平
日喜食熱物以致血流於胃口作痛用桃仁承氣湯
下之切記輕者用韭汁桔梗能開提氣血藥中兼用
之
以物按痛則止者挾虛也以二陳湯加炒乾薑和
之有證痛者面上白斑唇紅能食屬蟲治苦練根錫
厥之類脈堅實不大便者下之
痛甚者脈必伏多用温藥不用參朮可用附子
痛下忽大痛者人中如黑色者多死難治也

諸痛不可用補氣藥
客寒犯胃草荳蔻丸用之熱亦可用止用二三服
草豆蔻一錢四分裹燒熟去皮　吳茱萸湯泡洗去梗焙
益智仁　白殭蠶　橘皮
黃芪各八分　生甘草　歸身
桂皮各六分　麪末　神麯各一錢半
半夏洗一錢　麥芽炒黃　澤瀉減半用之
柴胡四分　詳脇下痛多爲用之

右一十八味除桃仁另研如泥外餘極細末同桃仁
研勻用湯泡蒸餅爲丸如梧子大每服三十九食遠
用熱白湯送下加生薑酌多少用之
又方用黃連子炒焦爲末米飲調服亦治白帶
又方脾痛用海蛤粉佐以香附末用川芎山梔生薑
煎辣湯調服爲佳
又方單用牡粉酒調下二三錢氣實不可用
腹疼　濕熱　腎虛　瘀血
濕熱暖疼者過天陰或坐久而發者是腎虛者疼之
不已者是也瘀血者日輕夜重者是也
脈大者腎虛用杜仲龜板黃栢知母枸杞五味之類
用猪脊髓丸
脈澁者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花
濕熱者用蒼朮杜仲黃栢川芎
瘀者用酒
凡諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用温散之藥
諸痛不可用人參蓋人參補氣不通而痛愈甚
矣

人面上忽有紅點者多死

脇痛

肝火盛　木氣實　有死血　肝急　有痰流注

木氣實　川芎　蒼朮　青皮　當歸

龍會丸瀉火要藥

死血　桃仁　紅花　川芎

痰流注　二陳湯加　南星　蒼朮　川芎

肝苦急食辛以散之用撫芎蒼朮血病入血藥中

行血脇痛甚者用薑汁下龍會丸肝火盛故也

咳嗽脇痛二陳湯加南星多香附青皮青黛薑汁

腹痛　有寒　積熱　死血　食積　濕痰

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者是

熱也死血痛者每痛有處不行移者是也食積者拒

欲大便利後痛減者是濕痰者凡痛必小便不利

梔子

凡心腹痛必用溫散此是鬱結不散阻氣不運故病

在下者多屬食宜溫散之

一老人腹痛年高不禁下者用

川芎　蒼朮　香附　白芷

乾薑　茯苓　滑石

痛風

四肢百節走痛　風熱　風濕　血虛　有痰

大法主方

蒼朮　南星　川芎　白芷

當歸　酒黃芩

在上者加羌活　桂枝　桔梗　威靈仙

在下者加牛膝　防己　木通　黃柏

血虛者多用川芎　當歸　佐以桃仁　紅花

薄桂治痛風無味而薄者獨此能橫行手臂傾而星

蒼朮等治之

上中下痛風方

威靈仙三錢　南星二兩　苦芎一兩　桃仁五錢

白芷五錢　桂枝三錢　防己半兩　蒼朮二兩

黃柏酒浸炒　紅花一錢半　羌活三錢

草龍膽五分

婁子元氣血虛有痰濁陰火痛風

人參一兩　白朮二兩　黃柏二兩黑色　山藥一兩

海石一兩　瓊陽五錢　乾薑五錢炒灰　南星一兩

敗龜板二兩酒炙　熟地黃二兩

粥爲丸

治臂痛

半夏一錢　陳皮五分　茯苓五分

酒芩一錢　威靈仙三分　白朮一錢

南星一錢　香附一錢

勞瘵　其主在乎陰虛　痰與血病

青嵩一斗五升童便三斗文武火熬約童便減二斗

去嵩熬至一斗入猪膵汁七箇再熬數沸甘草末收

之

虛勞身瘦屬火因火燒爍

勞病四物湯加人尿薑汁

咳血　痰盛　身熱多是血虛

戴云咳血者咯出痰內有血者是嘔血者嘔全血者

是咯血者每咯出血皆是血疾痞衄血者鼻中出血

出濁血小便出血也下血者大便出血也雖有名色

分六俱是熱證但有虛實新舊之不同或宜其寒

者清之

薔薇　訶子　山梔　海石

石爲末薑汁蜜調嚥化嗽甚者加杏仁後以八物湯

加減調理

身熱多是血虛四物湯加減

嘔血　火載血上錯經妄行

脈大發熱喉中痛者是氣虛用人參黃芪蜜炙黃柏

荊芥并當歸生地黃用之

嘔血用韭汁童便薑汁磨鬱金同飲之其血自消火

載血上錯經妄行四物湯加炒梔子童便薑汁

山茶花童便薑汁酒調

鬱金末治吐血大薑汁童便

痰帶血絲出者童便薑汁竹瀝

又方用韭汁童便二物相合用鬱金細研入在二物

之內同飲其血自消

又方治衄血以鬱金如無鬱金以茶薑汁童便和研

酒調服卽止之

咯血

薔汁童便青黛入血藥中用之加四物湯與黃芩

咳膏之類

齦血

涼血行血爲主　犀角地黃湯入鬱金同用

經血逆行或血腥或唾血吐血用韭葉汁立効

溺血　屬熱

山梔子炒水煎服　或用小薊琥珀

有血虛者四物湯加牛膝膏

下血

不可純用寒涼藥必於寒涼藥中用辛味并濕如酒浸炒涼藥酒炙黃連之類

有熱四物湯加炒梔子升麻秦艽阿膠珠

下血屬虛當歸散四物湯加炮乾薑升麻

又方用白芷五倍子丸

凡用血藥不可單行單止

有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝生血故也有濕傷血宜行濕消熱可也

內經謂身熱卽死寒則生此亦是大概言之必兼證詳之則可今豈無身熱生寒而死者

脈沉小流連或微者易治

脈浮大洪數者難愈宜滑不宜弦

仲景治痢可溫者五法可清者十法或解表或利小便或待其自已區分易治難治極密但與瀉同立法不分學者當辨之

大孔痛一曰溫之一曰清之

久病身冷自汗脈沉小者宜溫

暴病身熱脈浮洪者宜清

有可吐者　有可下者　有可汗者

初得時原氣未虛必推蕩之此通用之法稍久氣虛則不可

先水泄後腹血此脾傳腎賊邪難愈

先膿血後水泄此腎傳脾微邪易愈

如豆汁醬濕也蓋脾胃爲水穀之海無物不受常兼四藏故如五色之相雜當先通利此迴而奪之之義

如風者亦宜審之

因熱而作不可用巴豆等藥如傷冷物者或可用亦宜謹之

又有時疫作痢一方一家之內上下傳染相似明邪氣之勝復以治之

腸風　獨在胃與大腸出

黃芩　秦艽　槐角　升麻

青黛

夢遺　專主熱　脫精

戴云因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而自泄精者謂之精滑皆相火所動久則有虛而無寒者也

帶下與夢遺同法治

青黛　海石　黃柏　卽椿樹根丸

內傷氣血不能固守當補以八物湯加減吞椿樹根丸思想成病其病在心安神帶補熱則流通

知母　黃柏　蛤粉

精泄　專主濕熱

戴云滑者小便精滑下也俱是膀胱濕熱難有赤白之異終無寒熱之別河間云天氣熱則水渾濁寒則澄徹清冷由此觀之濁之爲病濕熱明矣

黃柏　知母　牡蠣

又方

萇蓳三錢　芍藥二錢　黃柏二錢燒存性　粉甘草皮白皮一兩

石爲末糊爲丸每服三十丸

濁

濕熱　有痰　有虛　赤濁屬血　白濁屬氣

寒則堅凝　熱則流通

大率皆是濕熱流注宜燥中宮之濕用二陳湯加芩朮白朮燥去濕赤者乃是濕傷血加白芍藥仍用珍珠粉丸加椿樹根皮滑石青黛等作丸

虛勞者用補陰藥大概不利熱藥

肥白人必多痰以二陳湯去其熱胃弱者兼用人參以柴胡升麻升胃中之氣丸藥用

青黛　黃柏炒褐色　乾薑炒微黑色　海石

蛤粉

胃中濁氣下流爲赤白濁者用柴胡升麻茯苓朮白朮二陳湯丸藥用樗根炒薑炒黃柏

專主胃中之濁氣下流滲入膀胱用青黛蛤粉

肝脈弦者用青黛以瀉肝

又方

黃柏一兩炒黑　生柏二錢半作三兩　海石二兩

神麴五錢

爲末水丸

有熱者　黃柏　滑石　青黛之類

燥濕痰　南星　半夏　蛤粉

右神麴爲丸青黛爲衣或用海石代麴

張子元氣血兩虛有痰痛風時作陰火間起小便白濁或帶下赤白方在前痛風中

一人便濁常有半年或時夢遺形瘦作心虛主治珍珠粉丸和勻定志丸服

一婦人年近六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁即是濕痰也

或云斷用二陳湯去痰加升麻柴胡升胃中之清氣加蒼朮去濕白朮補胃全在活法服四貼後濁減大半覺胸滿因柴胡升麻升動其氣痰阻滿閉用二陳湯加炒麴白朮素無痰者升動胃氣不滿

丸藥方

青黛　椿皮　蛤粉　滑石　乾薑炒　黃栢炒

右為末炒神麴糊丸仍用前燥濕痰丸亦能治帶

又方

滑石利竅　黃栢治濕熱　青黛解鬱結　蛤粉醎寒入腎

炒乾薑味苦斂肺氣下降使陰血生乾薑臨制之

淋

皆屬於痰熱

淋者小便淋瀝欲去不去不去又來皆屬於熱也

解熱利小便山梔子之類用苦　甘草煎服諸藥中皆加牛膝

老人亦有氣虛者人參白朮中帶木通山梔

亦有死血作淋者以牛膝作膏此證亦能損胃不食小便不通

氣虛　血虛　痰　風閉　實熱

吐之以提其氣氣升則水自下之蓋氣承載其水也

氣虛用人參黃芪升麻等先服後吐或參芪藥中探吐

吐

血虛四物湯先服後吐芎歸湯吐亦可痰多二陳湯先服後吐

有虛便動屬虛　時作時止痰因火動

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

瘦人多是血少　肥人屬痰尋常者多是痰

眞覺心跳者是血少用四物安神之類

驚悸　血虛　用硃砂安神丸

痃

大率與癥病相似

多是血虛有火兼痰人參竹瀝之類不用兼風藥

血塊　一名積瘕

塊在中為痰飲　在右為食積　在左為血積

氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血此理曉然醋煮海石三稜莪朮桃仁紅花五靈脂香附之類

白朮湯吞下瓦龍子能消血塊次消痰

治塊當降火消食積食積即痰也

行死血塊去須大補石斛一物有痰積有血塊可用洗滌垢膩又消食積

吐蟲

以黑錫炒成灰檳榔末米飲調下

癥瘕

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或左或右者是瘕

用芫花葵根煎湯煎入參白朮陳皮青皮甘草枳牛膝成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱飲一服可見塊下

病重補接之後加減再行

消塊丸即千金大硝石丸止可磨塊不令入口須虛實而用可也

硝石六兩　大黃八兩　人參　大甘草各三兩

右爲末以三年苦酒三斗置銅器中以竹片作準每入一升作一刻注器中熬先納大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如雞子中黃大每服一丸米飲下如不能大丸則作小丸如梧子大每服三十丸後下如雞肝如米泔赤黑等色下後忌風冷淡軟粥將理

又三聖膏

末化石灰半斤爲末瓦器中炒令淡紅色提出火外候熱少減次下大黃末炒人大黃一兩爲末就鹽炒伺熱減入下桂心末　桂心半兩爲末醋熬成膏藥厚攤貼患處

貼積聚塊

大黃　樸硝各一兩

右爲末用大蒜搗膏和勻貼之

痞塊在皮裏膜外須用補氣香附開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味

茶癖　石膏　黃芩　升麻

右爲末砂糖水調服

癭氣　先須斷厚味

海藻一兩　黃藥二兩

右爲末以少許置於掌中時時舐之津嚥下如消三分之二須止後藥服

貪積一方乃在婦人門貪積條下

痂

濕熱痰積流下作痂大概因寒鬱而作也即是痰飲食積并死血

戴云痂木屬厥陰肝之一經余嘗見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

子和云痂本肝經宜通勿塞只此見治之法專主肝經與腎絕無干不宜下癇濕多痂氣炎大敦穴食積與瘀血成痛者

梔子　桃仁　山查　吳茱萸

右爲末生薑汁順流水作湯調服

按之不定必用桂枝屬虛

桂枝　山梔炒　烏頭細切炒

右爲末薑汁爲丸每服三十丸却痛

治痂方定痛速効　濕勝者加荔枝

枳殼十五箇　山梔炒　糖毬炒

又方守丸治癇裂藥不疼者

蒼朮　商星　白芷

川芎　半夏　枳實

爲末神麴作丸

治陽明受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腹連毛際結核悶痛不可忍

山梔炒　枳殼炒　桃仁炒

右研細砂鉢內入生薑汁用水一盞煎令沸熱服之治諸痂發時用海石香附二味爲末以生薑汁湯調服亦能治心痛

治痂方

梔子　桃仁　橘核　茱萸

川烏

右碾煎服却藥用烏頭細切炒梔子橘核散單止痛

腳氣

蒼朮酸炒　白朮　陳皮　檳榔

川芎　犀角　甘草　木通

黃連　生地黃酒炒　黃柏

有熱加　黃芩　黃連

有痰加　竹瀝　薑汁

大熱及時令熱加石膏大便實加桃仁小便澀加牛膝

有食積流注

蒼朮　黃柏　防己　南星

川芎　白芷　犀角　檳榔

血虛加牛膝龜板

如常腳者專主乎濕熱朱先生有方肥人加痰藥

戴云有腳氣衝心宜四物加炒柏再宜湧泉穴用附子津拌貼以艾灸泄引其熱

健步丸

歸尾　芍藥　陳皮　蒼朮各一兩

生地黃一兩半　大腹子三箇　生牛膝　南星

黃芩半兩　桂枝二錢　牛膝

右爲末蒸餅爲丸每服百丸白朮通草煎湯食前下一婦人足腫

黃柏　蒼朮　南星　紅花酒洗

草龍膽　川芎　生牛膝酒洗　生地黃

筋動於足大指動上來至大腿近腰結奏養厚因風寒作四物湯加酒芩紅花蒼朮南星

筋轉皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花

大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生則陰生故也不可用附子可用參多服

瘧
斷不可作風治而用風藥
濕熱 痰 無血而虛 氣弱 瘀血
濕熱東垣健步方中加燥濕降陰火藥芩柏蒼朮之類
濕痰二陳湯中加蒼朮黃芩黃柏白朮之類入竹瀝
氣虛四君子湯加蒼朮黃芩黃柏之類
血虛四物湯中蒼朮黃柏下補陰丸
亦有食積妨礙不得降者 亦有死血者

健步丸方
羌活 柴胡 滑石 甘草炙
天花粉酒製各半兩 防己 防風
澤瀉各三錢 肉桂半錢 川烏 苦參酒製各一錢

石爲末酒糊丸如桐子大每服七十丸煎愈風湯以空心下

發熱 陰虛難治
戴云凡脈數而無力者便是陰虛也
陰虛發熱用四物湯加黃柏兼氣虛加參芪白朮蓋四物湯加黃柏是降火補陰之妙藥
又云陰虛發熱用四物湯甚者加龜板炒黃柏
喫酒人發熱者難治
不飲酒之人若因酒而發熱者亦難治
一男子年三十歲因酒發熱用青黛瓜蔞仁薑汁每日以數貼入口中三日而愈

陽虛惡寒
戴云凡背惡寒甚者脈浮大而無力者是陽虛也用人參黃芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣
一女子惡寒用苦參一錢赤小豆一錢爲末釀水吐用川芎蒼朮南星黃芩酒麴丸

手心熱
梔子 香附 蒼朮
川芎 半夏生用 白芷
爲末麴糊丸

手麻
此是氣虛也

手木
東垣云麻木氣不行也補肺中之氣是濕痰死血十指麻是胃中有濕痰死血

厥 因痰 用白朮 竹瀝
厥者手足冷也熱厥逆也非寒證因氣虛血虛熱系氣湯外感解散加薑汁酒

面寒面熱
火起 寒戰熱 面寒 退胃熱

喉痺
大概多是痰熱也只以桐油吐之 或用麝干逆流水吐

又方用李實根皮一片噙口內更用李實根碾水傳項上一遭立効新採園中者

纏喉風
戴云屬痰熱纏喉風者謂其咽喉裏外皆腫者是也用桐油以鵝翎探吐 又法用燈油脚探吐之
又方用遠志去心水調傅項上一遭立効新採園中者

喉咽生瘡并痛
多屬虛血熱遊行無制客於咽喉人參黃芪甘草炙黃柏荊芥

虛 人參 竹瀝 無實火
熱 黃連 荊芥 薄荷 硝石
石爲細末用蜜薑汁調噙

口瘡
服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上無制用理中湯甚者加附子 或噙官桂亦可

口瘡
血虛 四物湯中加竹瀝

酒皰鼻 血熱入肺
四物湯加陳皮紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就炒五靈脂末服効 又用桐油入黃連以天弔藤燒油熱傅之

肺癰
已破入風者不治
收斂瘡口止有合懽樹皮白斂煎湯飲之

肺痿
專主養肺養血養氣清金

天疱瘡
通聖散及蚯蚓泥晒炒蜜調傅之妙
從肚皮上起者裏熱發外還服通聖散可也

漏瘡
須先服補藥以生氣血即參芪朮歸芎爲主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚以艾炷灸之漏大艾炷亦大漏小艾炷亦小但灸令微熱不可令痛乾

則易之乾研爲末再和再灸如困則止來日如前法再灸直至內平爲効亦有用附片灸仍前氣血藥作膏藥貼之

痔漏

用五倍子樸硝桑寄生蓮房煎湯先薰後洗腫者用木鱉子五倍子研細末調傅

漏專以涼藥爲主

痔漏方

人參 黃芪 當歸 川芎
升麻 枳殼 條芩 槐角

腸癰

作濕熱食積治 大風難治

治漏外寒藥 蘆甘石小便煆 牡蠣粉

結核

或在頸在項在身在臂如腫毒者多挾注作核不散

治耳後項門各一塊

經驗炒 青黛 膽星 酒大黃

石爲末蜜丸漸化之

頸頷下生痰核

二陳湯加炒大黃 連翹 枯梗 柴胡

治臂核作痛

連翹 防風 川芎 酒芩
蒼朮 皂角刺

治遷跳穴痛防生附骨癰方

以蒼朮佐黃栢之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子黃芩體虛者加土牛膝以生甘草爲使大料煎入生薑汁帶熱食前飲之病甚者加黃栢桂枝十數貼發不動少加大黃一兩貼仍不動者恐癰將成矣急驟地成坑以火煆紅沃以小便赤體坐其上以被蓋圍抱下體伏熱氣蒸蒸勝理開血氣暢而愈

脫肛

氣熱 氣虛

氣虛補氣用人參 當歸 黃芪 川芎 升麻

血虛者四物湯

血熱者涼血四物湯加黃栢炒

元 丹溪朱震亨 著 門人戴元禮 錄

婦人科

經水經候過期而作疼者乃虛中有熱所以作疼

經水不及期血熱也四物湯加黃連

經候將來而作疼者血實

桃仁 香附 黃連

過期乃血少也

川芎 當歸 帶人參白朮與疼藥

過期紫黑色有塊血熱也必作痛

四物湯加 黃連 香附

淡色過期者乃痰多也

二陳湯加 川芎 當歸

紫色成塊者乃是熱也四物湯加黃連之類

痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏肥人如此

南星 蒼朮 香附 川芎

作丸服

肥人不及日數而多者痰多血虛有熱前方加黃連白朮若血枯經閉者四物湯加桃仁紅花

軀肥脂滿經閉者導痰湯加芎連不可服地黃泥膈故也如用以生薑汁炒

血崩

崩之爲病乃血之大下豈可爲寒但血去後其人必虛當大補氣血

東垣有治法但不言熱其主於寒學者宜再思之

急則治其標白芷湯調百草霜

甚者棕櫚皮灰後用四物湯加乾薑調理
因勞者用參芪帶升補藥
因寒者加乾薑
因熱者加黃芩參芪
崩過多者先服五靈脂末一服當分寒熱五靈脂能行能止婦人血崩用白芷香附爲丸
白帶用椒目末又用白芷末
一方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服之
又方用五靈脂半生半熟爲末以酒調服
氣虛血虛者皆於四物湯加人參黃芪
漏下乃熟而虛者四物湯加黃連
帶下赤白 赤屬血 白屬氣 主治燥濕爲先
帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱宜升無人知此
肥人多是濕痰
海石 半夏 南星 蒼朮
川芎 椿皮 黃柏
瘦人帶病少如有帶病者是熱也
黃柏 滑石 川芎 椿皮
海石
甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼朮白朮
仍用丸子（一本作丸諸子）
又云赤白帶皆屬於熱出於大腸小腸之分
一方黃荊子炒焦爲末米飲湯下治白帶亦治心痛
羅先生治法或十棗湯或神祐丸或玉燭散皆可用
不可峻攻實者可用此法虛則不宜
血虛者加減四物湯
氣虛者以參朮陳皮間與之

濕甚者用固腸丸
相火動者於諸藥中少加炒黃柏
滑者加龍骨赤石脂
帶者加葵花性燥者加黃連
寒月少入薑附臨機應變必須斷厚味
良薑 芍藥 黃柏二錢炙焦名（一本作人椿樹皮）
右爲末粥爲丸每服三四十丸
痰氣帶下者
蒼朮 香附 滑石
半夏 茯苓 蛤粉
婦人上有頭風鼻涕下有白帶
南星 蒼朮 黃柏炒焦
半夏 川芎 辛夷
茯苓
白帶兼痛風
半夏 茯苓 川芎
甘草 蒼朮炒 南星
黃柏酒浸晒乾炒 陳皮
牛膝
子嗣
肥盛婦人不能孕育者以其身中脂膜閉塞子宮而致經事不能行可用導痰湯之類
瘦怯婦人不能孕育者以子宮無血精氣不聚故也
可用四物湯養血養陰等藥
產前胎動
孕婦人因火動胎逆上作喘者急用條黃芩香附之類將條芩更於水中沉取重者用之
不可峻攻實者可用此法虛則不宜
血虛者加減四物湯
氣虛者以參朮陳皮間與之

固胎
地黃（半錢） 人參 白芍各一錢
川芎 歸身尾一錢 陳皮一錢 甘草二錢
糯米（十四粒） 黃連（些小） 黃柏（些小）
桑上羊兒藤七葉（完者）
石吹咀煎湯服之
血虛不安者用阿膠 痛者縮砂行氣故也
一切病不可忘
惡阻 從痰治
戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也
肥者有痰瘦者有熱多用二陳湯
或白朮爲末水丸隨所好或湯或水下
婦人懷胎愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其肝氣止能生胎無餘物也
血塊死血食積痰飲成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止
黃連（一兩一半用茱萸炒去茱萸一半益智炒去益智） 山梔（半兩炒） 蘿蔔子（一兩半炒） 山查（一兩） 神麯（各半兩） 莪朮（半兩用米醋煮） 白芥子（一兩半炒） 瓦龍子（煅）
三稜 青皮（醋煮） 神麯（各半兩） 莪朮（半兩用米醋煮） 白芥子（一兩半炒） 瓦龍子（煅）
右爲末作丸子服之
婦人血塊如盤有孕難服峻劑
香附（四兩醋煮） 桃仁（一兩去皮尖） 海石（一兩醋煮） 白朮（一兩）
右爲末神麯爲丸
束胎
束胎丸第八箇月服

黃芩酒炒夏用一兩秋用七錢冬用半兩　茯苓半兩　陳皮二兩忌火　白朮二兩

右爲末粥爲丸

束胎散即達生散

八參半錢　陳皮半錢　白朮　歸身尾各一錢　甘草二錢炙　紫蘇半錢　白芍　大腹皮三錢

或加枳殼砂仁作一貼入青蔥五葉黃楊木葉梢十箇煎待於八九箇月服十數貼甚得力或夏加黃芩冬不必加春加川芎或有別證以意消息

第九箇月服

黃芩一兩酒炒宜燥葉不宜涼鑿法弱人減半　白朮一兩　滑石七錢半臨月十日前小便多時減此一味

右爲末粥爲丸如梧桐子大每服三十丸空心熱湯下不可多恐損元氣

安胎

白朮　黃芩　炒　麪　枳殼七錢炒

右爲末粥爲丸

黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行縮砂安胎治痛行氣故也

益母草即茺蔚子治產前產後諸病能行血養血難產作膏　地黃膏　牛膝膏

胎漏　氣虛　血虛　血熱

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下也

子腫　濕多

戴云子腫者謂孕婦手足或頭面通身浮腫者是也

用山梔炒一合米飲湯吞下　三因方中有鯉魚湯

難產

難產之由亦是八九箇月內不謹者氣血虛故亦有氣血凝滯而不能轉運者

催生方

白芷灰　滑石　百草霜

右爲末芎歸湯或薑汁調服之

治胎衣不下

婦人大全方別有治法

產後　血暈一虛火載血漸漸暈來

用鹿角燒灰出火毒研爲極細末以好酒調灌下卽醒行血極快也

又方用韭葉細切盛於有嘴瓶中以熱醋沃之急封其口以嘴塞產鼻中可愈眩暈

產後補虛

人參　白朮各二錢　黃芩　陳皮川芎各半錢　歸身尾半錢　甘草一錢炙　有熱加　生薑三錢　茯苓一錢

必用大補氣血雖有雜證以末治之

富濟熱補血氣

消血塊

滑石二錢　沒藥一錢　麒麟竭一錢　無則用　牡丹皮　陳皮

右爲末醋糊作丸

五龍子能消血塊

泄

川芎　黃芩　白朮　乾薑　滑石　白芍炒　茯苓　陳皮

咬咀煎湯服

惡露不盡

謂產後敗血所去不盡在小腹作痛

五靈脂　香附末　蛤粉

右醋丸甚者入桃仁不去夾

如惡血不下以五靈脂爲末神麴糊丸白朮陳皮湯下

中風

不可作風治切不可以小續命湯服之必大補氣血然後治痰當以左右手脈分其氣血多少而治

口眼喎斜不可服小續命湯

發熱惡寒

大發熱必用乾薑輕用茯苓淡滲其熱一應苦寒發表藥皆不可用也

纔見身熱便不可表發熱惡寒皆是氣血

左手脈不足補血藥多於補氣藥

右手脈不足補氣藥多於補血藥

惡寒發熱腹滿者當去惡血脈滿者不是腹痛者是產後不可下白芍以其酸寒伐生發之氣故也

產後一切病皆不可發散

小兒科

小兒食積疾熱傷乳爲病大概肝與脾病多小兒肝病多及大人亦然肝只是有餘腎只是不足

吐瀉黃疸

三稜　莪朮　陳皮　青皮

神麴　麥芽　甘草

茯苓　黃連　白朮

右爲末水調服

傷乳吐瀉者加山查　時氣吐瀉者加滑石　發熱者加薄荷

吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用

急慢驚風

發熱　口瘡　手心伏熱　痰熱　痰喘　痰嗽　並用通法重則用瓜蒂散輕則用苦參赤小豆末須酸醋汁調服吐之後用通聖散蜜丸服之

驚有二證一者熱痰主急驚當直瀉之一者脾虛乃爲慢驚所主多死當養脾

東垣云慢驚者先實脾土後散風邪

急者只用降火下痰養血

慢者只用硃砂安神丸更於血藥中求之

黑龍丸

牛膽南星　礬石各一兩焙硝等分煅　天竺黃　青黛各半兩　麝香二兩半　硃砂三錢　殭蠶五分　蜈蚣二錢半燒存性

右爲細末煎甘草湯膏丸如雞頭大每服一丸或二丸急驚薄荷湯下慢驚桔梗白朮湯下

神聖牛黃奪命散

檳榔半兩　木香三錢　大黃二兩麪裹煨熟爲末　白牽牛一兩一半炒一半生用　黑牽牛用粗末一半生一半炒用

右爲一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜漿水調下不拘時候微利爲度

疳病

胡黃連丸

胡黃連半錢去蘆　阿魏一錢半醋煮去肉稍　麝香四粒　神麯二錢半炒　黃連二錢半炒去食積

右爲末猪膽汁丸如黍米大每服二十丸白朮湯下

小兒疳病腹大胡黃連丸二十丸白朮湯下

痘瘡　分氣虛血虛補之

氣虛用人參白朮加解毒藥

但見紅點便品升麻葛根湯發得表虛也

吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲實

裏實而補則結癰腫

陷伏倒靨灰白爲表虛或用燒人屎黑陷甚者燒人屎紅活綻凸爲表實而復用表藥則要潰爛不結痂

二者俱見爲表裏俱虛

痘瘡或初出或未出時人有愚者宜預服此藥多者合少重者合輕方用絲瓜近蒂三寸連瓜子皮燒灰存性爲末砂糖拌喫入硃砂末亦可

解痘瘡毒藥

絲瓜　升麻　酒芍藥　糖毬　黑豆　犀角

解痘瘡法已出未出皆可用硃砂爲末以蜜水調服多者可減少者可無

腹脹

蘿蔔子蒸　紫蘇梗　陳皮　甘草減半　乾薑各等分

食減者加白朮煎服

夜啼

人參一錢半　黃連一錢半薑汁炒　甘草半錢　竹葉二十片

作二服加薑一片煎服之

口糜

鼓云謂滿口生瘡者便是　江茶粉草傳之

又方苦參黃丹五倍子青黛各等分傅之

脫囊腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說

木通　甘草　黃連　當歸　黃芩

煎服

脫囊紫蘇葉爲末水調傅上荷葉裹之

脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

東北方陳壁上土湯泡先薰後洗亦可用脫囊藥服之

木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又言重舌者亦是此類二者蓋是熱病用

百草霜　滑石　芒硝

爲末酒調敷

癮疹　黑斑　紅斑　瘡癤

用通聖散調服

咯紅

戴云咯紅者卽唾內有血非吐血與咳血

黑豆　甘草　陳皮

煎服

喫泥　胃熱故也

軟石膏　甘草　黃芩　陳皮　茯苓　白朮

煎服

痢疾　食積

黃芩　黃連　陳皮　甘草
煎服
赤痢加紅花桃仁　白痢加滑石末
食積痢
炒麴　蒼朮　滑石　芍藥
黃芩　白朮　甘草　陳皮
茯苓
右咬咀煎下保和丸
解顱
乃是母氣虛與熱多耳
戴云卽初生小兒頭上骨未合而開者右以四君子湯四物湯有熱加酒芩炒黃連生甘草煎服外以帛束縈用白蘞末敷之
蚘虫
楝樹根爲君佐以二陳湯煎服
口噤
鬱金　黎蘆　瓜蒂
爲末搐鼻
風痰
南星半兩　白礬半兩　白附子一兩
右爲末每服一錢水一盞薑十片煎至八分去滓放冷用飛白麪爲丸如雞頭大每服一丸或二丸薑蜜薄荷湯化下服之
癲頭
用紅炭煤長流水令熱洗之又服酒製通聖散除大黃酒炒外以胡荽子伏龍肝熙龍尾黃連白礬爲末調敷
又方
松樹厚皮燒灰　白礬半兩
一兩　火飛
黃丹一兩　軟石膏一兩　黃連半兩
大黃五錢　輕粉四錢
右極細末熬熟油調敷瘡上須先洗了瘡口敷乃佳
赤瘤
生地黃　木通
苦藥帶表之類用巴蕉油塗患處
鼻赤
雄黃　黃丹
同敷
一小兒好喫粽成腹痛
黃連　白酒藥
爲末調服乃愈

火豈君相五志俱有論

火之爲病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消爍於物莫能禦之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也性不妄動能不違道於常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火龍火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移他經事非細故動之極也病則死矣經所以謂一水不勝二火之勝也經所謂一水不勝五火之火出自人爲又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱瞀瘈皆屬於火諸躁擾狂越皆屬於火諸驚駭皆屬於火而河間又廣其說火之致病者甚多深契內經之意曰喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大跋之有聲癰疽瘍瘡痛氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閉身熱寒戰慄濈濈惑悲笑謾妄瞤瞲血污之病皆少陰君火之火乃真心小腸之氣所爲也若瞀瘈暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭附腫疫癘疼痛氣逆上衝禁慄如喪神守嘔噦瘍瘍喉痺耳鳴及聾嘔湧溢食不下目昧不明暴注瞤瘈暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所爲也是皆火之變見於諸病也謂爲脈虛則浮大宜則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以濕折之從其性而伏之惟黃栢之屬可以降之嘔瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之如黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽盛相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲火虛之病以甘寒之劑除之如當歸地黃之屬若心火亢極變熱內實爲陽盛之病以戲冷之劑折之如大黃樸硝之屬若腎水受傷其陰失守無根之火爲虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如

附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻乾葛柴胡防風之屬不明諸此之類而求火之爲病施治何所依據故於諸經集略其說畧備處方之用庶免實實虛虛之禍也

氣屬陽動作火論

捍衛冲和不息之謂氣擾亂妄動變常之謂火當其和平之時外護其表復行於裏周流一身循環無端出入升降繼而有常源出中焦總統於肺氣昜嘗病於人也及其七情之交攻五志之間發乖戾失常清者遠變爲濁行者抑遏而反止表失衛護而不和內失健悍而少降營運漸遠肺失主持妄動不已五志厥陽之火起焉上播于肺氣乃病焉何者氣本屬陽反勝則爲火矣河間曰五志過極則爲火也何後世不本此議而一概類聚香辛燥熱之劑氣作寒治所據何理且言七氣湯製作其用青皮陳皮三稜蓬朮益智官桂甘草遂以爲平和可常用通治七情所傷混同一意未喻其藥以治眞氣以下諸氣尤有甚焉者茲不復敘況所居之情各不同且夫經言九氣之變未嘗畧而不詳如怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者温之結者散之喜者以恐升之悲者以喜勝之九氣之治各有分別何嘗混作寒治論而類聚香熱之藥通言而治諸氣豈理之謂歟若香辛燥熱之劑但可刼滯氣衝快於一時以其氣久抑滯借此暫行開發之意藥中無佐使制伏所起之氣服之甚則增熾鬱火蒸薰氣液而成積滋長而成痰一飲下膈氣乃氤氳清虛之象若霧露之著物雖滯易散內挾痰積開而復結服之日久安有虛實而不動氣動而不散者乎此皆人所受誤之由習俗已久相沿而化卒莫能救升發太過香辛散氣燥熱傷氣與氣耗散濁氣上騰猶曰腎虛不能攝氣歸原遂與蘇子降氣湯四磨湯下黑鉛丹養氣丹鎮墜上升之氣且硫黃黑錫佐以香熱又無補養之性豬此果能生氣而補腎乎請熟詳之夫濕痰盛甚者亦或當未嘗增變由其喜墜而愈進形質弱者何以收救不悟肺受火炎子氣亦弱降令不行火無以制相扇而動本勢空虛命絕如纔積而至深丹壽濟火一旦火氣狂散喘息奔急而死所以有形丹石丸藥重墜無形之氣將何抵受隨而降之乎譬以石投水水罔未嘗沉也豈不死歟丹溪有曰上升之氣自肝而出中挾熱愈甚自覺無冷非眞冷也火熱似水積熱之甚陰微故有此證認假作眞似是之禍可勝言哉內經雖云百病皆生於氣以正氣受邪之不一也今七情鬱結不舒痛悶壅塞發爲諸病當詳所起之因滯於何經有上下部分臟氣之不同隨經用藥有寒熱温涼之異若枳殼利肺氣多服損眞氣與夫水香之行中下焦氣香附之快滯氣多服損眞氣與夫木香之行中焦氣香上行胃氣紫蘇之散表氣陳皮之泄氣藿香之馨香上行胃氣紫蘇之散表氣厚朴之瀉衛氣檳榔之瀉至高之氣沉香之升降其氣腦麝之散眞氣若此之類氣質可宜其中有行散者有損泄者其過劑乎用之能扶氣之標而不能治氣之本豈可又佐以燥熱之藥以火濟火混同謂治諸氣使之爲冷痺畜之在上則人喜忘畜之在下則爲喜狂隨恐跌撲則癖惡內凝若分部位身半已上同天之陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之證者治血必血屬之二氣作火論治與病情相得丹溪發揮論云冷生氣者出於高陽生之謬言也自非身受寒氣口食寒物而足論寒者吾恐十之無一二也

血屬陰難成易虧論

內經曰榮者水穀之精也和調五藏洒陳於六腑乃能入於脈也源源而來生化於脾總統於心藏於脾肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步藏得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脈少則濇充則實常以飲食日滋故能陽生陰長液汗變化而赤爲血也生化旺則諸經持此而長養衰耗竭則百脈由此而空虛可不謹養哉故曰血者神氣也持之則存失之則亡是知血盛則形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內而無陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易而調治也難以其比陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陽道常饒陰道常不足以人之生也年至十四而經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧如此陰氣一虧傷所變之證妄行於上則吐衄衄於外則虛勞妄返於下則便紅稍血熱則膀胱癰閉溺血滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中漏蒸熱瘀則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水血色紫黑熱盛於陰發於瘡瘍濕滯於血則爲痛瘡瘍疹皮膚則爲冷痺畜之在上則人喜忘畜之在下則爲喜狂隨恐跌撲則癖惡內凝若分部位身半已上同天之陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之證者治血必血屬之

藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證補佐謂之六合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中之氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥通腎經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血氣腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨經損益損其一二味之所宜爲主治可也此特論血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷爲氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇子血竭牡丹皮者血滯所宜滿黃阿膠地榆百草霜棚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蓬蒁瑪陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾薑桂者血寒所宜生地黃苦參血熱所宜此特取其正治之大畧耳以其觸類而長可謂無窮之應變矣

滯下辯論

滯下之病嘗見世方以赤白而分寒熱妄用兜澁燥劑止之或言積滯而用巴硇丸藥攻之或指濕熱而與淡滲之劑利之一偏之誤可不明辨乎讀拔原病式所論赤白同於一理反復陳喻但不熟察耳果腸胃積滯不行法當辛苦寒涼藥推陳致新蕩滌而去不宜巴硇毒熱下之否則鬱結轉甚而病變危者有之矣若濕痢不分兩證混言濕熱不利小便非其治也夫泄者水穀之象滯下者垢瘀之物同於濕熱而成治分兩岐而藥亦異若淡滲之劑功能散利水道濁流得快使泄自止

此有無之形豈可與滯下混同論治而用導滯行積可乎其下痢出於大腸傳送之道了不干於腎氣所下有形之物或如魚腦或下如豆汁或便白膿或下純血或赤或白或赤白相雜若此者豈可與瀉混同論治而用淡滲利之可乎嘗原其本皆由腸胃日受飲食之積餘不盡行留滯於內濕蒸熱瘀鬱結日深伏而不作時逢炎暑不行相火司令又調攝失宜復感酷熱之毒至秋陽氣始收火氣下降蒸發畜積而滯下之證作矣以其積滯之滯行故名之曰滯下其濕熱瘀積干於血分則赤干於氣分則白赤白兼下氣血俱受邪矣久而不愈氣血不運脾積不磨陳積脫滑下凝猶若魚腦矣甚則腸胃空虛關司失守濁液并流色非一類錯雜混出狀如豆汁矣若脾氣下陷虛坐努責便出色如白膿矣其熱傷血深濕毒相瘀粘結紫色則紫黑矣各異其名燥熱之疾一也三消之熱本濕寒之陰氣衰燥熱之陽氣大甚皆因乎飲食之餌失節腸胃乾涸而氣液不得宣平或耗亂精神過違其度或因大積而欲出氣滯而不與之出所以下迫窘痛後重裹急至圊而不能便總行頻併亦少乍止乍起而不安此皆大腸經有所壅遏窒礙氣液不得宣通故也衆言雖處何法則可求之長沙論云利之可下者悉用大黃之類何嘗以巴硇熱毒下之緊澁重可溫者悉用薑附之類何嘗以巴硇熱毒下之緊澁藥兜之又觀河間立言後重則宜下腹痛則宜和身重則宜溫脈弦則去風膿血粘稠以重藥竭之身冷自汗以重藥溫之風邪內束宜汗之鶩溏爲痢當溫之在表者汗之在裏者下之在上者涌之在下者竭之各有所宜而不飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消此三消者其燥熱同也故治疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟一身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣豈不以滋潤之劑養陰以制燥滋水而充液哉何故泄漏消渴多者不知其書謂因下部腎水虛不能制其上焦心火使

痢病七方未有詳論者以內經大法推之內格嘔逆火起炎上之象究乎此則胃虛木火乘之是土敗木賊也見此多成危候

三消之疾燥熱勝陰

寧謨劉河間先生三消之論始言天地六氣五味以配養人身六味五藏而究乎萬物之源終引內經論渴諸證以辨乎世方熟藥之悞此比物立象反復詳明非深達陰陽造化之機者孰能如是邪請陳其畧大經中有言心肺氣厥而渴者有腎熱而渴者有言脾痺而渴者有因小腸痺熱而渴者有因傷飽肥甘而食渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇天熱而渴者有因傷寒胃乾而渴者有因腎熱而渴者有因病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱變甚或因久嗜醎物恣食炙煿飲食過度亦有年少服金石丸散積久實熱結於下焦虛熱血氣不能制實熱燥甚於腎故渴而不飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消此三消者其燥熱同也故治疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟一身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣豈不以滋潤之劑養陰以制燥滋水而充液哉何故泄漏消渴多而丹溪又謂大虛大寒者其治驗備載局方發揮觀此治法豈可膠柱而調瑟又有胃弱而閉不食此名禁口

上實熱而多煩渴下虛冷而多小便若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則自然渴止小便如常而病愈也吁若此未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則爲熱心火屬陽而本熱虛則爲寒若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱矣以彼人言但見消渴數溲妄言爲下部寒爾豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也且夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎水既不能勝心火則上下俱熱奈何以熱養腎水欲令勝心火故不閉哉彼不謂水氣實者必能制火虛則不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多此又不知消渴小便多者蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外以養乎百骸故腑胃之外燥熱甚雖多飲水入於腸胃之內終不能浸潤於外故渴不止而小便多水液既不能滲泄浸潤於外則陰燥竭而無以自養故久而多變爲聾盲瘂瘍痤痈之類而危殆其爲燥熱傷陰也明矣

泄瀉從濕治有多法

泄瀉者水瀉所爲也由濕本土土乃脾胃之氣也得此濕者或因於內傷或感於外邪皆能動乎脾濕脾病則升舉之氣下陷濕變注并出大腸之道以胃與大腸同乎陽明一經也云濕可成泄垂教治濕大意而言後世方論泥云治濕不利小便非其治也故凡泄瀉之藥多用淡滲之劑利之下久不止不分所得之因遽以爲寒而用緊澁熟藥兜之夫泄有五殊泄者水穀不化而完出濕兼風也溏泄者所下汁積粘垢濕兼熱也鶩泄者所下澄徹清冷小便清白濕兼寒也滲泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也若此有寒熱虛實之不同舉治不可執一而言謹書數法於後夫泄有宜汗解者經言春傷於風夏必飧泄又云久風爲飧泄若保命集云用蒼朮麻黃防風之屬是也有宜下而保安者若長沙言下痢脈滑而數者有宿食也當下之下利已差至其時復發者此爲下更下之安悉用大承氣湯加減之劑有宜化而得安者格致餘論夏月患泄百方不効視之久病而神亦弊小便少而赤脈滑而頗弦格悶食減因悟此久積所爲積濕成痰留於肺中宜大腸之不固也清其源則流自清以茶黃等作湯溫服一碗許探喉中一吐痰涎減半大早晨飲吐半升而利止有以補養而愈者若試効方言胃中濕脾弱不能運行食下則爲泄助甲騰風勝以克之以升陽之藥羌活獨活升麻防風炙甘草之屬有宜燥濕而後除者若脾胃論言上濕有餘脈緩怠惰嗜卧四肢不收大便泄瀉從平胃散有宜寒涼而愈者若長沙言協熱自利者黃芩湯主之舉其濕熱之相宜者若長沙言下利脈遲緊痛未欲止當溫之下利心痛急當救裏下利清白水液澄澈可與理中四逆湯參究其利小便之相宜者河間言濕勝則濡泄小便不利者可與五苓散益元散分導之以其收斂之相宜者東垣言寒消氣泄不固

製訶子散澁之以上諸法各有所主宜獨利小便而濕動也豈獨病因寒必待龍骨石脂鍾乳燥毒之屬澁之治者又當審擇其說一概取利約而不博可乎

上池雜說

明　雲間馮時可元成著

人以陽氣爲主陰常有餘陽常不足近世醫工迺倡爲補陰之說其方以黃柏爲君以知母地黃諸寒藥爲佐合服升斗以爲可以保生噫左矣人之虛勞不足怠惰嗜臥眩運痺塞諸厥上逆滿悶痞隔誰則使之陽氣虧損之所致也迺助其陰而耗其陽乎人之一身飲食男女居處運動皆由陽氣若陰氣則隨陽運動而主持諸血者也故人之陽損但當補之溫之補既行則陽氣長盛而百疾除焉

醫之用術惟吐利汗下與解表攻裏之法耳不能一病而自爲一法也今人遇病立方動輒二十餘品少亦不下數品豈知仲景諸名醫之心法哉吾觀古人率用成方加減不過一二味非有違戾未嘗輒易正謂宜汗宜吐宜下宜解表裏者病情有限故攻病之法亦有限也豈得動用己見隨意立方耶藥性有刚反忌宜慮味既多莫誰其性爲害不少故余欲世人須

洞識病情修遵古制而後可

藥能中物何所不可用貴當病情耳今醫工見藥味平緩者肆意增損呼爲醫中王道人亦利其無患而樂就之若稍涉性氣猛利之藥則束手不敢用稍用之利人爭指爲狼虎不之近嘻工師斷木尚取耆者至於用藥則取其鈍而舍其利何哉以此知不敢用猛烈之藥皆不深脈理不明病情者也

邵堯夫曰百病起於情情輕病亦輕諸病執非起於情耶蓋人生以氣爲主情過喜則氣散怒則氣升哀則氣消勞則氣耗驚則氣亂思則氣結欲則氣傾寒則氣收炙則氣泄病由之作矣識破知節病亦少損若著物不止豈不爲有生患哉故君子貴保性而不任情斯養氣延年之術也

病者去而復來已而復作者陽衰而不能制疾故耳今不能養陽而屢事攻擊有疾者疾利則易生矣有寒者寒去則襄虛矣有積者積下則胃寒矣其病至復作也奚疑故凡病情一去之後卽當頤神養性放下萬緣調息百日以生陽氣迨於陽氣旣盛則陰邪不能干而舊疾無自作矣若病情少閒卽事酬應嗽傲如常至於復作則危期將至矣

先大夫有訓云元氣與脾氣原無二致人之元氣充足則脾氣自然磨運而元氣愈充若元氣虛少則脾不能運而脹滿痞氣之疾作矣不肖素稟衰弱年來脾胃時作因有感於先君至教謹識於此

余幼抱脾胃飲食下輒作脹滿患之未得其原嘗讀東垣論云氣聚於脾中不得散故時作脹滿誠中病情矣但未解治之之方也後讀醫學拾遺治痞論云熱既在上則內中寒凝而氣不下行故當用熱藥以溫

中焦而下引其熱使熱得降也又產後論云非由血能搶心乃藥衝不充中焦不治氣失所依而上奔於心耳夫氣聚則爲熱散則爲虛新產之婦陰陽俱散夫氣熱則行寒則凝行則病散凝則病生邪氣乘虛不在瘀血之有無故乾薑爲產後要藥辛熱故也但當溫煖正氣以致和平則百病無由生也以此互觀則東垣氣聚脾中之旨昭昭明矣

閻子大黃醫者俱長而不用然往往有因而得力者嘗問許北門云昔患脾泄經年不愈請教於鄉潛泉令用薤附丸附子用童便煮制經日末之薤肉煉爲丸依服神驗近學院謝幷峰每日進枳殼大黃丸二三服神機清爽都憲袁盧山止之弗聽而謝體質愈充藥性之宜於人非庸醫所能識也

今之治目者大都用涼藥點治不知目者血之華血得熱則行得寒則凝古人點目以冰片乾薑所以散其邪於外也故精明之府不可一毫楂滓當外傅熱藥以散其邪則睛膜舒轉內用溫藥以和其血則血脈通利目未有不可治者但外用熱藥若甚痛不可忍然拔去邪毒所謂一勞永佚者此醫學拾遺之論揭之

目得血而能視血冷則凝此理易明也而醫則罕知之鄰有曾連霎之酒昏目患沿眶紅爛數年愈甚百計治之不能療爲延吳御醫診之曰吾得之矣爲治大熱之劑數服其病如脫目復明問之曰此不難知也北女人進涼藥多矣用大熱劑則凝血復散前藥皆得奏功此可爲治眼之良法矣忘其名專用附子人呼爲吳附子云

高安姚姓年三十時患弱氣息僅屬亦涉醫書欲取附子服之初皆疑弗與後病將殆不得已聽之服至一斤許疾遂愈生三子今近七旬常疑其或作附毒覓無他雖老猶開服之不輟

顧色泉老醫年六十有五因盛怒疽發於背大如盂四圍色黑召瘍醫治之用冷藥敷貼敷已覺涼約曰七八日後爲用刀去瘀肉顧俟其去日四圍色黑乃血滯更加冷藥非其治也乃更治熱敷藥去舊藥敷之頃甚痒終夜明日色鮮紅掀腫亦消惟中起數十孔如蜂房一日許又覺惡心作嘔視一人頭如兩人頭自脅曰此虛極證也用參附大劑進二服視已正矣不數日竟愈終無刀鍼之苦嘻用藥係人生死若此諺危如累卵稍一誤投難乎哉

顧色泉云凡瘡毒屬陰者必用熱藥如天雄附子之類皆生用庶可起死回生余聞其證曰如對口陰發伏疽潰不知痛疽不起泡四圍如墨黑者是老人虛弱之人尤宜用之嘗以爲瘡之陰陽一時難辨瘍醫遇此率用寒涼殺人多矣熱藥回生其功甚巨稍涉遲疑生死反掌

丹溪之治吐衄率用黃柏一味或并用苓蓮生地門冬等味名曰滋陰降火近有議其後者曰元氣虧損之人有何火降乃虛證耳復令脾胃冰寒陽氣衰敗何以自全此所以沈困累年而後已也余以爲丹溪之見未可全非而議者之意良是今當前證應以丹溪之法降其上升浮遊之火俟炎火稍退然後逐其淤血而以補助元陽溫和血氣之藥收功不亦可乎

家僕名貴者之金陵路遘寒證餌藥少瘥故好酒即飲

酒一二甌及水飯一盂病迺大作氣喘急吐痰竟夕不寐連三日余曰病且急矣柰何請醫與商推以瓜蒂散吐之遂吐痰幾半桶後吐一塊如豬腦血食相裹不二三日遂起

婦女病患牽多心腹疼痛痞滿諸疾大都由於氣血凝聚致然庸醫妄投藥餌補之則益患氣治之當有法先大夫宦長沙張碧泉夫人病血蠱腹痛甚已死先大夫令用鹽葱磨香與血竭慰其臍經行而病愈一婦人患血痞服藥多方未效張小泉用通利行氣之藥爲餅貼其臍半日頻氣洩而散可見病在下者湯飲未易効須以意揣量治之使消散於下可也

瘡疹之發根於骨髓臟腑與諸瘡瘍不同骨有人年十五歲而出者問之云極痛不可忍渾身如列鐵釘殆不能展側沈虛明善幼科一貴公止一子將之官與之市操極重者三枚別沈囑之曰出痘切莫用藥則須藥扶持然未必得人則不如不藥之爲愈也既而貴公之任其子出痘不藥而愈竟如沈言

家妹年七歲下痢純血時丁倭亂徙避吳中醫者已辭莫救矣先憲副公語不肖當可救否曰痢疾起於氣滯兒欲飲以萬病解毒丹下之疏通其氣庶幾可治乃磨服一錠未可因再磨服一錠厥明大下即進粥兩瓯其病遂愈以此知解毒丹之效神妙莫比一名紫金錠子具載方書

王典者徽人寓京師通籍太醫院徐南湖爲侍御時寓識之且屢驗其方藥每記憶之晚歸鄉忠腸癖下血

諸醫治弗愈且殆南湖曰吾思用王典醫爲致書召之王至胗其病曰非腸癖也連進黃硝之劑大下之復胗曰病未盡也再進前劑復下痰積桶餘曰可以治矣調理而愈所下穢更無血積腸癖遂除以此見腹爲熱滯不能通血腸胃逼窄而血下耳眾醫皆以血治故不效也南湖自此更十年患他病殂

昔憶某醫書論倒倉一法非丹溪心印迺云傳自西域異人者恐門人妄記也夫虛羸之人雖有積聚止宜養正積除豈宜傾瀉倉廩以損正氣此可戒也其言良是南都一醫者最稱知名士又善導引術偶苦壅滯因用前法大瀉不能起於厠遂殞余問其年則六十餘矣夫六十餘者豈宜行大吐下之法哉以是知醫者不貴知法又貴知理此醫豈能明於盈虛消息之理哉

一富室患中寒陰證名醫盈座最後延吳御醫至胗之曰非附子莫救但忘攜來令人之市揀極重者三枚生切爲一劑計重三兩投之眾醫吐舌潛裁其半以兩半爲劑進之病遂已吳復胗曰何減吾成藥也問之知減其半曰噫留吾投三枚將令活三年也今止活半耳後年餘復病而卒脈藥之神如此

張鶴儔名醫也其醫效有足采者張嘉興人少孤始攜藥裹入吾郡未知名也一日郁溫州水軒患陽證傷寒稟氣又薄舉醫束手不敢下曰脈已絕矣下之則死張胗其足脈獨大曰可治遂投大承氣湯一劑而愈名遂振後有巡院楊裁庵者按松證如前郁薦之復愈甘是吳之稱明醫者首鶴儔召視者滿吳下終其身取效無慮數百多以大黃之功俗遂稱張大黃

云自己常進大黃丸子合許曰此瀉南方補北方人
弗知也年九十卒
錢漸川幼攻文勤苦久之抱鬱成疾上焦苦咽閉中焦
苦隔噎煩悶下焦則苦遺溺極而嘔血幾殆眾醫治
之罔效偶值常熟顧愛杏至以疾叩請詢眾治按曰
諸君治法未嘗誤也而弗效者證雜而藥淆也今請
分治之上焦用藥清火解毒食飽服之中焦用藥開
鬱除煩食後服之下焦用藥升降水火空心服之品
不過三四劑不過五六俱奏驗病若失錢後強健如
故登仕版此明醫不失治法之效爽
因病服藥喻如因漏船船久木朽則油料無所用矣
是知舟之載以木非以船人之生以氣非以藥今人
竭精神以逐外物疲有用以事無用曰吾有藥焉是
何異鑿舟沈舸而恃船哉先輩沈東老性潛泊五旬
餘合服人乳藥丸子久不輟年入十五卒卒之前生
哉藥不能進矣
製附子須大熟不爾則有糙疽之禍耳閭中附子毒而
發瘍者如武林董南恒是已董年五十好長生術交
與多方士有進熱藥以助陽者董信之中有附子金
劑丹丸僅進四十五丸疽發於腦竟卒詢知附子性
毒多上升故中其毒者未嘗不發毒腦背多至不救
藥不可不慎也雖然董所進藥當不止附子應是舉
諸熱藥爲劑故其禍極烈耳
世人相傳灸不著抵吃藥遂比屋不拘何病一槩火攻
至有因灸反甚荏苒年月以亡者可惜也不知藏寒
而病滿與體厚而形充者於法宜灸安有病弱之人
肢體羸瘦而顧繫施火攻焉也火攻爲病百端而耗
血爲尤甚不可不知或問其目曰虛者不灸實者
灸脈浮者不灸脉微數者不灸溼家身疼煩者不灸
若不審其直而槩加灸焉其不至於危殆者幾希
俗傳花香不宜嗅嗅之易生瘡瘵余嘗於之晨起見夜
合花其時含苞將放窺其中有細黑絲縱橫不計其
數少頃花大開復窺其中無有矣其花傍生亦未見
有一絲飛出候忽之間何以始終而蓦無以此見嗅
花得香非得香也得絲也香盛則成絲其理有不可
測者

明馮時可撰時可有左氏釋已著錄此乃其雜論
醫學之書大意主於溫補伸東垣而抑丹溪亦偏



醫經溯洄集目錄

神農嘗百草論
元和害承酒制論
四氣所傷論
張仲景傷寒立法考
傷寒溫病熱病說
傷寒三陰病或寒或熱辨
陽虛陰盛陽盛陰虛論
傷寒三百九十七法辨
傷寒四逆厥辨
嘔吐乾嘔噦敎逆辨
中風辨
中暑中熱辨
積熱沉寒論
淮南方補北方論
五藏論
二陽病論
煎厥論
八味丸用澤瀉論
小便原委論
內傷陰證
外傷內傷所受經旨義同論

醫經溯洄集

明　魏博王　履著

神農嘗百草論

淮南子云神農嘗百草一日七十毒予嘗誦其書每至于此未始不歎夫神農立極之大聖也因生民之不能以無疾故察夫物性之可以愈疾者以始後人固不待乎物物必嘗而始知也苟待乎物物必嘗而始知則不足謂之生知之聖也以生知之聖言之則雖不嘗亦可知也設使其所知果有待乎必嘗則愈疾之功非疾不能以知之其神農兼俱備而歷試之乎況汚穢之藥不可嘗者其亦嘗乎且味固可以嘗而知其氣其性其行經主治及畏惡反忌之類亦可以嘗而知乎苟嘗其所可嘗而不嘗其所不可嘗不可嘗者既可知而可嘗者亦不必待乎嘗之而後知矣謂其悉嘗亦不可也謂其悉嘗亦不可也然經於諸藥名下不著氣性等字獨以味字冠之者由藥入口惟味爲先故也又藥中雖有玉石蟲獸之類其至衆者惟草爲然故遂曰嘗百草耳豈獨嘗草哉夫物之有毒嘗而毒焉有矣豈中毒者日必七十乎設以其七十毒偶見於一日而記之則毒之小也固不死而可解毒之大也則死矣孰能解之亦孰能復生之乎先正謂淮南之書多寓言夫豈不信

元和害承酒制論

予讀內經六微旨論至于亢則害承乘制喟然嘆曰至矣哉其造化之機緘乎王太僕發之於前劉河間之於後聖人之蘊殆靡遺矣然學者倘不能釋然得不猶有未悉之旨也歟謹按內經帝曰願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之帝曰何也岐伯曰亢則害承乘制制生則化外列盛衰害則敗亂生化大病脊覩夫陰陽五行之在天地間也高者抑之下者舉之強者折之弱者濟之蓋莫或使然而自不能不然也不如是則高者愈高下者愈下強者愈強弱者愈弱而乖亂之政日以極矣天地其能位乎雖然高也下也弱與強也亦莫或使然而自不能不然也故易也者造化之不可常也惟其不可常故神化莫能以測莫測故不息也可常則息矣亢則害承乘制者其莫或使然而自不能不然者歟夫太僕河間已發揮者茲不贅及其未悉之旨請推而陳之夫自顯明之右止君火治之十五句言六節所治之位也自相火之下止陰精承之十二句言地理之應乎歲氣也亢則害承乘制二句言抑其過也制生則化止生化大病四句言有制之常與無制之變也承猶隨也然不言隨而曰承者以下言之則有上奉之象故曰承雖謂之承而有防之之義存焉然所承也其不亢則隨之而已故雖承而不見既亢則克勝以乎之承斯見矣然而迎之不知其所來迹之不知其所止固若有不可必者然可必者常存乎查冥恍惚之中而莫之或欺也河間曰已亢過極則反似勝已之化似也者其可以形質求哉故後篇厥陰所至爲風生終爲濕少陰所至爲熱生終爲寒之類其爲風生爲熱生者亢也其爲濕爲寒者制也又水發而爲雹雪土發而飄驟之類其水發土發者亢也其雹雪飄驟者制也若然者蓋造化之常不能以無亢亦不能以無制焉耳夫前後二篇所主雖有歲氣運氣之殊然亢則害承乘制之道蓋無往而不然也惟其無往而不然故求之於人則五臟更相平也一臟不平所不勝平之非既亢而克勝之乎姑以心火而言其不亢則腎水雖心火之所畏亦不過防之而已一或有亢即起而克勝之矣餘臟皆然制生則化當作制則生化蓋傳寫之誤而釋之謂之者不覺來之不通遂併遺四句而弗取殊不知上二句止言亢而害害而制耳此四句乃害與制之外之餘意也苟或遺之則無以見經旨之周悉矣制則生化正與下文害則敗亂相對辭理俱順不勞曲說而自通制則生化者言有所制則六氣不至於亢而爲平平則萬物生生而變化無窮矣化爲生之盛故生先於化也外列盛衰者言六氣分布主治迭爲盛衰昭然可見故曰外列害則敗亂生化大病者言既亢爲害而無所制則敗壞乖亂之政行矣敗壞乖亂之政行則其變極矣其災甚矣萬物其有不病者乎生化指所生所化者言謂萬物也以變極而災甚故曰大病上生化以造化之用言下生化以萬物言以人論之制則生化猶元氣周流滋營一身凡五臟六腑四肢百骸九竅皆藉焉以爲動靜云爲之主生化大病猶邪氣恣橫正氣耗散凡五臟六腑四肢百骸九竅俱不能遂其運用之常也或以害爲亢害或以承爲承襲或以生

爲自無而有化爲自有而無或以二生化爲一意或以大病爲喻造化之機緘乎此數者皆非也且夫人之氣也固亦有亢而自制者苟亢而不能自制則湯液鍼石導引之法以爲之助若天地之氣其亢而自制者固復於平亢而不制者其孰助哉雖然造化之道苟變至於極則亦終必自反而復其常矣學者能本之太僕河間而參之此論則造化機緘之詳亦庶矣乎然張戒入治法心要則曰假令水爲君木爲子當春旺之時冬令猶在卽水亢也水亢極則木令不至矣木者繼冬而承水也水既亢則害其所承矣所以木無權也木無權則無以制土土既旺則水乃受制也土者繼長夏之令也水受土制熱克其寒也變而爲濕此其權也又如火爲母土爲子當長夏之時暄令猶在卽火亢也火既亢極則濕令不至矣濕者繼冬之令也火受水制寒克其熱也變而爲土濕土斯得其權也斯言也推之愈詳而蓮經愈遠矣或曰心

四氣所傷論

素問生氣通天論篇曰春傷於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲痎瘧秋傷於濕冬生欬嗽其發爲痓厥冬傷於寒春必病溫春傷於風夏生飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬生欬嗽王啓玄註云風中於表則內應於肝肝氣乘脾故洞泄或飧泄夏暑已甚秋熱復收冬令不至春氣適旺風雖入之不能卽發至夏肝氣以陽氣外盛風不能外發至冬肺內攻於臟腑則欬逆外散於筋脉則痿弱也厥謂逆氣也冬寒且凝春陽氣發寒不爲釋陽怫乎中寒怫相持故爲溫病傷寒論引素問後篇八句成無已註云當春之時風氣大行春傷於風風氣通於肝肝以春適旺風雖入之不能卽發至夏肝氣以陽氣外盛風不能外發至冬肺以秋適旺濕雖入之不能卽發至冬肺內攻內而爲飧泄當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干於肺肺以秋適旺濕雖入之不能卽發至冬腎氣運氣之殊然亢則害承乘制之道蓋無往而不然也惟其無往而不然故求之於人則五臟更相平也一臟不平所不勝平之非不亢而防之乎一臟不平所不勝平之非既亢而克勝之乎姑以心火而言其不亢則腎水雖心火之所畏亦不過防之而已一或有亢即起而克勝之矣餘臟皆然制生則化當作制則生化蓋傳寫之誤而釋之謂之者不覺來之不通遂併遺四句而弗取殊不知上二句止言亢而害害而制耳此四句乃害與制之外之餘意也苟或遺之則無以見經旨之周悉矣制則生化正與下文害則敗亂相對辭理俱順不勞曲說而自通制則生化者言有所制則六氣不至於亢而爲平平則萬物生生而變化無窮矣化爲生之盛故生先於化也外列盛衰者言六氣分布主治迭爲盛衰昭然可見故曰外列害則敗亂生化大病者言既亢爲害而無所制則敗壞乖亂之政行矣敗壞乖亂之政行則其變極矣其災甚矣萬物其有不病者乎生化指所生所化者言謂萬物也以變極而災甚故曰大病上生化以造化之用言下生化以萬物言以人論之制則生化猶元氣周流滋營一身凡五臟六腑四肢百骸九竅皆藉焉以爲動靜云爲之主生化大病猶邪氣恣橫正氣耗散凡五臟六腑四肢百骸九竅俱不能遂其運用之常也或以害爲亢害或以承爲承襲或以生

濕熱在酉之分，方得其權故也。秋者、清潤之氣，收斂下行之體也，爲濕所傷，是長夏之氣不與秋令也。秋令不及，所勝妄行，故火得以炎上而克金，心火既刑於肺，故肺氣逆而爲欬。所不勝者侮之，木氣上行，與火同德，動而不息者也。所生者受病，故腎水腐也。長夏已亢，三焦之氣盛也，命門者、三焦之合也，故逆腎水上行，與脾土濕熱相合，爲疾，因欬而動于脾之濕，是以欬嗽有痰，有涎，不發于秋，而發于冬者，以其六陰之極，而殺始得其氣故也。冬傷於寒者，是冬行春令也，當塞而溫，火勝而水腐矣，水既已腐，則所勝妄行，土有餘也，所生受病，木不足也，所不勝者侮之，火太過也，火土合德，濕熱相助，故爲溫病，不病于冬，而病于春者，以其寒水居卯之分，方得其權，大寒之令，復行于春，腠理開泄，少陰不藏，房室勞傷，辛苦之人，陽氣泄于外，腎水腐于內，當春之月，時雖木長，無以滋生化之原，故爲溫病耳。夫春傷于風，夏傷于暑，多傷于寒，靡埋皆順時字傷令字也，獨秋傷于濕，說作令字傷時字，誠者不可疑也，此四說皆毋所亢，而害其所承之子也，若說秋字傷濕字，其文與上三句相通，其理與法不得相通矣，大抵遷與法，遁不必拘於文也，或謂春傷於風，是人爲風所傷，非也，若是則止當頭痛惡風，自汗，何以言夏爲飧泄哉，今言春傷于風，即是時傷令也，明矣，愚按此四傷，諸家註釋皆不得經旨者，蓋由推求太過故也，孟子曰，道在邇而求諸遠，事在易而求諸難，此之謂與，但只輕輕平易說去，則經旨自明，而無穿鑿之患矣，何以言之，夫風暑濕寒者，天地之四氣也，其傷於人，人豈能於未發病之前，預知其客於何經絡、何藏腑、何部分，而成何病乎，及其既發病，然後可以診候，始知其客於某經絡、某藏腑、某部分，成某病耳，註釋者，苟僥倖病始知病原之理，則於此四傷，不勞餘力，自迎刃而解矣，夫洞泄也，痎瘧也，欬與痿厥也，溫病也，皆是因其發動之時，形診昭著，乃逆推之，而知其昔日致病之原，爲傷風傷暑傷濕傷寒耳，非是初受傷之時，能預定其今日必爲此病也，且夫傷於四氣，有當時發病者，有過時發病者，有久而後發病者，有過時之久，自消散而不成病者，何哉，蓋由邪氣之傳變乘散不常，及正氣之虛實不等故也，且以傷風言之，其當時而發，則爲惡風發熱頭疼，自汗欬嗽喘促等病，其過時與久而發，則爲獨風熱中寒中偏枯五臟之風等病，是則洞泄殞泄者，乃過時而發之中之一病耳，因洞泄殞泄之病生，以形診推之，則知其爲春傷風，藏蓄不散而致此也，苟洞泄殞泄之病未生，孰能知其已傷風於前，將發病於後邪，假如過時之久，自消散而不成病者，人亦能知乎，世有太素脈法，雖或預知死亡之期，然亦是因診之昭著而始能知耳，夏傷暑爲痎瘧，冬傷寒爲溫病，蓋亦類此，但秋傷濕，上逆爲欬嗽，爲痎瘧，其因病知原，則與三者同，其令行於時，則與三者異，夫春之風，及之暑，冬之寒，皆是本時之令也，濕乃長夏之令，故其令亦各就其本時而行也，若長夏則寄旺於六月之一月耳，秋雖亦有三月，然長夏之濕令，每侵過於秋而行，故曰秋傷於濕，其不及則爲溫所勝，其太過則固於火化，時而發於夏也，且夏火司權，毋能濕子，何故不發於土衰極之時，而反發於近於夏，爲木衰邪勁，論風既通肝，則正當木旺之時，木極盛土極衰矣，現宜於春不宜反間余曰，運氣七篇所言，燥之爲病，並多何故余曰，運氣七篇，自是兩書，作於二人之手，其立意各有所主，不可混言，王冰以爲七篇參入素問之中，本非素問元文也，余今所推之義，乃是素問本旨，豈自作一論陳四氣所傷所病之義，夫風者、春之令也，暑者、夏之令也，夏感之，偶不即發，而至秋，又傷於風與寒，故爲痎瘧也，寒者、冬之令也，冬感之，偶不即發，而至春，其身中之陽，雖始爲寒邪所鬱，不得順其漸升之性，然亦必欲應時而出，故發爲溫病也，若夫秋傷濕，其令行於時之義，上文已論之矣，前篇所謂上逆而欬，發爲痎厥，不言過時，似是當時即發者，但既與風暑寒三者並言，則此豈得獨爲即發者乎，然經無明文，終亦不敢比同後篇，便斷然以爲冬發病也，雖然濕本長夏之令，侵過於秋耳，縱使即發，亦近於過時而發者矣，此當只以秋發病爲論，濕從下受，故干肺爲欬，謂之上逆，夫肺爲諸氣之主，令既有病，則氣不外運，又濕滯經絡，故四肢痿弱無力，而或厥冷也，後篇所謂冬生欬嗽，既言過時，則與前篇之義，頗不同矣，夫濕氣久客不散，至冬而寒氣大行，肺惡寒而或受傷，故濕氣得以乘虛上侵於肺，發爲欬嗽也，觀者以此意求之，經旨其或著乎，或者見素問經論，則推求過極，欲異於人，殊不知反穿鑿繳繞，乖悖經旨，有不可勝言者，此先儒所謂如大軍游騎出大遠而無所歸矣，姑撫成無已王海藏之說，辨其甚者一二，夫無已謂風淫末疾，則當發於四肢，兩踝腕疾，皆富貴人也，新沐中風，則爲首風，如此之類，豈一一皆然哉，讀者當活法勿拘執也，夫王啓玄之註，雖未免泥於必字，及未得經旨，然卻不至太遠也，若成無已之說，則似太遠矣，然猶未至於甚也，至王海藏立

寒等語。其時傷令歟。令傷時歟。吾固知其不能不屈於此也。且暑爲夏令。孰不知之。今以暑爲季夏令。以暑爲春溫病乎。其謂大寒之令復行於春。溫病乎。況今之春爲溫病者。比比皆是。未嘗見其必由大寒復行乎春而後成也。經曰。亢則害承乃制。其義謂已亢極。則勝己者來制。如火亢極則水來制之。經所謂相火之下。水氣承之。水位之下。土氣承之之類。皆是。勝己者爲承。今以亢爲母。承爲子。將求勝於經歟。抑未達歟。又如以制物者爲所勝。受制者爲所不勝。與經所謂氣有餘。則制己所勝而侮所不勝。及傳之於其所勝死於其所不勝之旨全反矣。余如因時傷令。令傷時之說。委曲衍說者。固不暇悉辨也。嗚呼。予非好斥前人之非。蓋爲其有害大義。晦蝕經旨。以誤後人。故不敢默默而嘿嘿耳。然而僭逾之罪。固已自知其不得辭矣。但未知觀者以爲何如。

張仲景傷寒立法論

讀仲景之書。當求其所以立法之意。則知其書足以爲萬世法。而後人莫能加損。能外矣。苟不得其所以立法之意。則疑信相雜。未免通此而礙彼也。嗚呼。自仲景以來。發明其書者。不可以數計。然其所以立法之意。竟未聞有表章而示人者。豈求之而不得之歟。將相循習而不求歟。抑有之而余未之見歟。余竊不敏。僭請陳之。夫傷於寒。有即病者焉。即病者發於所感之時。不即病者。過時而發於春夏也。即病謂之傷寒。不即病謂之溫與暑。夫傷寒溫暑。其類雖殊。其所受之原則一。故曰陰毒耳。後之論者。遂以爲陰寒極甚之證。稱爲陰毒。乃引仲景所敘之證。固亦可名爲陰毒。然終非仲景所以立名之本意。觀後人所敘陰毒。與仲景所敘陰毒。自是兩般。豈可混論。後人所敘陰毒。亦只是內傷冷物。或不正暴寒所中。或過服寒藥所變。或內外俱傷於寒而成耳。非天地惡毒異氣所中者也。朱奉議作活人書。累數萬言。於仲景傷寒論。多有發明。其傷寒即入陰經爲寒證者。諸家不識。而奉議識之。但惜其亦不知仲景專爲即病者立法。故其書中每每以傷寒溫暑混雜議論。竟無所別。況又視傷寒論爲全書。遂將傷井敗伯益失火怒鬼人矣。夫仲景法之祖也。後人雖移易編次。終莫能越其矩度。由莫能越而觀之。則其法其方。果可委屬太牢哉。雖然。立言垂訓之士。猶不免失於此。彼碌碌者。固無足論矣。夫惟立言垂訓之士。有形乎著述之間。其碌碌者。當趨趨翹預之餘。得不勝然從令。爭先快觀而趨簡略之地乎。夫其法其方委屬太牢而不知返。日惟簡便是趨。此民生之所以無辜而仲景之心之所以不能剖白矣。嗚呼。法也。方也。仲景專爲即病之傷寒設。不兼爲不即病之溫暑設也。後人能知仲景之書。本爲即病者設。不爲不即病者設。則尚依其法散落所存不多。而莫能擧矣。粗工妄治之萬變。果可悼煩而或廢之乎。是知委屬太牢而不覺其非者。由乎不能得其所以立法之意故也。今人雖以治傷寒法治溫暑。亦不過借用耳。非仲景立法之本意也。猶六書假借。雖移易編次。終非造字之初意。夫仲景立法。天下後世之權衡也。故可借焉以爲他病用。雖然。豈特可借以治溫暑而已。凡雜病之治。莫不可借也。今人因傷寒治法可借以治溫暑。遂謂其法通爲傷寒溫暑設。吁。此非識流而昧源者歟。苟不余信。請以證之。夫仲景之書。三陰經證居熟。證什之七八。彼不即病之溫暑。但一於熱耳。何由而爲寒哉。就三陰寒證而詳味之。然後知余言之不妄。或者乃謂三陰寒證。本是雜病。爲王叔和增入其中。又或謂其證之寒。蓋由寒藥誤治而致。若

此者皆非也。夫叔和之增入者。辨脈平脈與可汗可下等諸篇而已。其六經病篇。必非叔和所能曾辭也。但脈陰經中下利嘔噦諸條。卻是叔和因其有厥逆而附。遂併無厥逆而同類者亦附之耳。竟若以藥誤治而成變證。則惟太陽爲多。縱使三陰證亦或有寒藥誤治而變寒者。然豈應如是之衆乎。夫惟後人以仲景書通爲傷寒溫暑設。遂致諸溫劑皆疑焉而不敢用。韓祇和雖曾桂枝湯之難用。但謂今昔之地不同。然未悟仲景本爲即病之傷寒設也。且其著微旨一書。又純以溫暑作傷寒立論。而即病之傷寒反不言及。此已是捨本徇末。全不能窺仲景藩籬。又以夏至前胸膈滿悶、嘔逆氣塞腸鳴腹痛、身體拘急、手足逆冷等證。視爲溫暑。謂與仲景三陰寒證。脈理同。而證不同。遂別立溫中法以治。夫仲景所敘三陰寒證。求對於春夏溫暑之病。不亦悖乎。雖然。乃是冬時即病之傷寒。故有此證。今欲以仲景所敘三陰寒證。求對於春夏溫暑之病。不亦悖乎。雖然。其胸膈滿悶、嘔逆氣塞等證。若非內傷冷物。則不正暴寒所中。或過服寒藥所變。或內外俱傷於寒之病也。且祇和未悟仲景立法本旨。而又適當溫暑病作之際。其爲惑也固宜。以余觀之。其胸膈滿悶、嘔逆氣塞等證。乃是冬時即病之傷寒。故有此證。今欲以仲景所敘三陰寒證。求對於春夏溫暑之病。不亦悖乎。雖然。豈特可惜以治溫暑而已。凡雜病之治。莫不可借也。今人因傷寒治法可借以治溫暑。遂謂其法通爲傷寒溫暑設。吁。此非識流而昧源者歟。苟不余信。請以證之。夫仲景之書。三陰經證居熟。證什之七八。彼不即病之溫暑。但一於熱耳。何由而爲寒哉。就三陰寒證而詳味之。然後知余言之不妄。或者乃謂三陰寒證。本是雜病。爲王叔和增入其中。又或謂其證之寒。蓋由寒藥誤治而致。若

此者皆非也。夫叔和之增入者。辨脈平脈與可汗可下等諸篇而已。其六經病篇。必非叔和所能曾辭也。但厥陰經中下利嘔噦諸條。卻是叔和因其有厥逆而附。遂併無厥逆而同類者亦附之耳。竟若以藥誤治而成變證。則惟太陽爲多。縱使三陰證亦或有寒藥誤治而變寒者。然豈應如是之衆乎。夫惟後人以仲景書通爲傷寒溫暑設。遂致諸溫劑皆疑焉而不敢用。韓祇和雖曾桂枝湯之難用。但謂今昔之地不同。然未悟仲景本爲即病之傷寒設也。且其著微旨一書。又純以溫暑作傷寒立論。而即病之傷寒反不言及。此已是捨本徇末。全不能窺仲景藩籬。又以夏至前胸膈滿悶、嘔逆氣塞腸鳴腹痛、身體拘急、手足逆冷等證。視爲溫暑。謂與仲景三陰寒證。脈理同。而證不同。遂別立溫中法以治。夫仲景所敘三陰寒證。求對於春夏溫暑之病。不亦悖乎。雖然。其胸膈滿悶、嘔逆氣塞等證。乃是冬時即病之傷寒。故有此證。今欲以仲景所敘三陰寒證。求對於春夏溫暑之病。不亦悖乎。雖然。豈特可惜以治溫暑而已。凡雜病之治。莫不可借也。今人因傷寒治法可借以治溫暑。遂謂其法通爲傷寒溫暑設。吁。此非識流而昧源者歟。苟不余信。請以證之。夫仲景之書。三陰經證居熟。證什之七八。彼不即病之溫暑。但一於熱耳。何由而爲寒哉。就三陰寒證而詳味之。然後知余言之不妄。或者乃謂三陰寒證。本是雜病。爲王叔和增入其中。又或謂其證之寒。蓋由寒藥誤治而致。若

固。然邪既客表。則表之正氣受傷。而不能流通。故亦發熱也。必以辛甘溫之藥發其邪。則邪去而腠理自密矣。此桂枝湯之所由立也。其所以不加寒藥者。蓋由風寒在表。又當天令寒冷之時。而無所避故也。後人不知仲景立法之意。故有感於麻黃桂枝之熱。有犯於春夏之司氣而不敢用。於是有須加寒藥之論。又次之。姜後病又次之診察治法禁治誤病解未解等又次之。其雜脈雜病與傷寒有所關者。采以附焉。其與傷寒無相關者。皆刪去。如此。庶幾法度純一。而玉石有分。主客不亂矣。然有志未暇。姑敘此以俟他日。

傷寒溫病熱病說

有病因。有病名。有病形。辨其因。正其名。察其形。三者俱當。始可以言治矣。一或未明。而曰不誤於人。吾未之信也。且如傷寒。此以病因而爲病名者也。溫病、熱病。此以天時與病形而爲病名者也。由三者皆起於感寒。或者通以傷寒稱之。夫通稱傷寒者。原其因之同耳。至於用藥。則不可一例而施也。何也。夫傷寒、蓋感於霜降後春分前。然不即發。鬱熱而發於春夏者也。傷寒即發於天令寒冷之時。而寒邪在表。固其腠理。故非辛甘溫之劑。不足以散之。此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也。溫病、熱病。後發於天令暄熱之時。佛熱自內而達於外。鬱其腠理。無寒在表。故非辛涼或苦寒或酸苦之劑。不足以解之。此仲景桂枝麻黃等湯。獨治外者之所以不可用。而後人所處水解散、大黃湯、千金湯、防風通聖散之類。兼治內外者之所以可用也。夫即病之傷寒。有惡風惡寒之證者。風寒在表。而表氣受傷。故惡寒之證著。重有風寒新中。而表氣亦受傷故也。若無新中之風寒。即無惡風惡寒之證。故仲景曰。太陽病發熱而渴。不惡寒者爲溫病。溫病如此。則知熱病亦如此。是則不渴而惡寒者。非溫熱病矣。然或有不因新中風寒。亦見惡風惡寒之證者。蓋病人表氣本虛。熱達於表。又重傷表氣。故不禁風寒。非傷風惡風。傷寒惡寒也。但衛虛則惡風。榮虛則惡寒耳。且溫病熱病。亦有先見表證。而後傳裏者。蓋怫熱自內達外。熱鬱腠理。不得外泄。遂復還裏而成可攻之證。非如傷寒從表而始也。或者不悟此理。乃於春夏溫病熱病而來浮緊之脈。不亦疏乎。殊不知緊爲寒脈。有寒邪則見之。無寒邪則不見也。其溫病熱病。或見脈緊者。乃重感不正之暴寒。與內傷過度之冷食也。豈其本然哉。又或者不識脈形。但見弦便呼爲緊。斷爲寒。夫溫病熱病之脈。多在肌肉之分。而不甚浮。且右手反盛於左手者。誠由怫熱在內故也。其或左手盛或浮者。必有重感之風寒。否則非溫病熱病。自是暴感風寒之病耳。凡溫病熱病。若無重感。表證雖間見。而裏病爲多。故少有不渴者。斯時也。法當治裏熱爲主。而解表藥之。亦有治裏而表自解者。余每見世人治溫熱病。雖誤攻其裏。亦無大害。誤發其表。變不可言。此足以明其熱之自內達外矣。其間有誤攻裏而致大害者。乃春夏暴寒所中之疫證。邪純在表。未入於裏故也。不可與溫病熱病同論。夫惟世以溫病熱病。混稱傷寒。故每執寒字以求浮緊之脈。以用溫熱之藥。若此者。因名亂實。而戕人之生。名其可不正乎。又嘗方多言四時傷寒。故以春夏之溫病熱病。與秋冬之傷寒。一類視之。而無所別。夫秋冬之傷寒。眞傷寒也。春夏之傷寒。是兩淦。豈可同治。吁。此弊之來。非一日矣。歷考方書。並無救弊之論。每每雷同。良可痛哉。雖然。傷寒與溫

已證。明告其名。則不致惑於後人。而累仲景矣。昔漢儲收拾殘編。斷簡於秦火之餘。加以傳註。後之論者。謂其功過相等。叔和其亦未免於後人之議歟。余嘗欲編類其書。以傷寒例居前。而六經病次之。相類病又次之。差後病又次之。診察治法禁治誤病解未解等又次之。其雜脈雜病與傷寒有所關者。采以附焉。其與傷寒無相關者。皆刪去。如此。庶幾法度純一。而玉石有分。主客不亂矣。然有志未暇。姑敘此以俟他日。

傷寒溫病熱病說

有病因。有病名。有病形。辨其因。正其名。察其形。三者俱當。始可以言治矣。一或未明。而曰不誤於人。吾未之信也。且如傷寒。此以病因而爲病名者也。由三者皆起於感寒。或者通以傷寒稱之。夫通稱傷寒者。原其因之同耳。至於用藥。則不可一例而施也。何也。夫傷寒、蓋感於霜降後春分前。然不即發。鬱熱而發於春夏者也。傷寒即發於天令寒冷之時。而寒邪在表。固其腠理。故非辛甘溫之劑。不足以散之。此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也。溫病、熱病。後發於天令暄熱之時。佛熱自內而達於外。鬱其腠理。無寒在表。故非辛涼或苦寒或酸苦之劑。不足以解之。此仲景桂枝麻黃等湯。獨治外者之所以不可用。而後人所處水解散、大黃湯、千金湯、防風通聖散之類。兼治內外者之所以可用也。夫即病之傷寒。有惡風惡寒之證者。風寒在表。而表氣受傷。故惡寒之證著。重有風寒新中。而表氣亦受傷故也。若無新中之風寒。即無惡風惡寒之證。故仲景曰。太陽病發熱而渴。不惡寒者爲溫病。溫病如此。則知熱病亦如此。是則不渴而惡寒者。非溫熱病矣。然或有不因新中風寒。亦見惡風惡寒之證者。蓋病人表氣本虛。熱達於表。又重傷表氣。故不禁風寒。非傷風惡風。傷寒惡寒也。但衛虛則惡風。榮虛則惡寒耳。且溫病熱病。亦有先見表證。而後傳裏者。蓋怫熱自內達外。熱鬱腠理。不得外泄。遂復還裏而成可攻之證。非如傷寒從表而始也。或者不悟此理。乃於春夏溫病熱病而來浮緊之脈。不亦疏乎。殊不知緊爲寒脈。有寒邪則見之。無寒邪則不見也。其溫病熱病。或見脈緊者。乃重感不正之暴寒。與內傷過度之冷食也。豈其本然哉。又或者不識脈形。但見弦便呼爲緊。斷爲寒。夫溫病熱病之脈。多在肌肉之分。而不甚浮。且右手反盛於左手者。誠由怫熱在內故也。其或左手盛或浮者。必有重感之風寒。否則非溫病熱病。自是暴感風寒之病耳。凡溫病熱病。若無重感。表證雖間見。而裏病爲多。故少有不渴者。斯時也。法當治裏熱爲主。而解表藥之。亦有治裏而表自解者。余每見世人治溫熱病。雖誤攻其裏。亦無大害。誤發其表。變不可言。此足以明其熱之自內達外矣。其間有誤攻裏而致大害者。乃春夏暴寒所中之疫證。邪純在表。未入於裏故也。不可與溫病熱病同論。夫惟世以溫病熱病。混稱傷寒。故每執寒字以求浮緊之脈。以用溫熱之藥。若此者。因名亂實。而戕人之生。名其可不正乎。又嘗方多言四時傷寒。故以春夏之溫病熱病。與秋冬之傷寒。一類視之。而無所別。夫秋冬之傷寒。眞傷寒也。春夏之傷寒。是兩淦。豈可同治。吁。此弊之來。非一日矣。歷考方書。並無救弊之論。每每雷同。良可痛哉。雖然。傷寒與溫

病熱病。其攻裏之法。若果是以寒除熱。固不必求異。其發表之法。斷不可不異也。況傷寒之直傷陰經。與太陽雖傷。不及營熱。即傳陰經爲寒證。而營温者。又與温病熱病大不同。其可妄治乎。或者知一不知二。故謂仲景發表藥。今不可用。而攻裏之藥乃可用。嗚呼。其可用不可用之理。果何在哉。若能辨其因正其名。察其形。治法其有不當者乎。彼時行不正之氣所作。及重感異氣而變者。則又當觀其何時何氣。參酌傷寒温熱病之法。損益而治之。尤不可例以仲景即病傷寒藥通治也。

傷寒三陰病或寒或熱辨

喜謂張仲景傷寒論。於太陰有曰自利不渴者屬太陰。以其臟有寒故也。當温之。宜服四逆輩。於少陰有曰少陰病得之一二日口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。少陰病下利。白通湯主之。少陰病下利。脈微者。與白通湯。利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加豬膽汁湯主之。少陰下利。清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絶。身反不强。其人面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脈不出者。通脈四逆湯主之。少陰病脈沉者。急温之。宜四逆湯。於厥陰有曰手足厥寒。脈細欲絶者。當歸四逆湯主之。大汗若大下利而厥冷者。四逆湯主之。仲景此論。則傷寒三陰必有寒證。而宜用温熱之劑也。及讀劉守真之書。有曰傷寒邪熱在表。腑病爲陽。邪熱在裏。臟病爲陰。俗妄謂有寒熱陰陽異證。誤人久矣。寒病有矣。非汗病之謂也。寒病止爲雜病。終莫能爲汗病。且造化汗液之氣者。乃陽熱之氣。非陰寒之所能也。雖仲景有四逆湯證。是治表熱裏和。誤以寒藥下之太早。表熱入裏。下利不止。及或表熱裏寒自利。急以四逆温裏利止。裏和。急解其表也。故仲景四逆湯證復有承氣湯下之者。由是傷寒汗病。經直言熱病而不言寒也。經言二陰證者。邪熱在臟。在裏。以臟與裏爲陰。當下熱者也。嘉閻論傷寒熱病有二篇。名曰熱。竟無寒理。寒者

不夭人天年者幾希矣.

陽虛陰盛陽盛陰虛論

難經曰.傷寒陽虛陰盛.汗出而愈.下之卽死.陽盛陰虛.汗出而死.下之而愈.嗚乎.其傷寒汗下之樞機乎.夫邪之傷於人也.有淺深焉.淺則居表.深則入裏.居表則閉腠理.發怫熱.見惡寒惡風頭痛等證.於斯時也.惟辛溫解散而可愈.入裏則爲燥屎.作潮熱.形狂言譫語.大渴等證.於斯時也.惟鹹寒攻下而可平.夫寒邪外客.非陰盛而陽虛乎.熱邪內熾.非陽盛而陰虛乎.汗下一差.生死反掌.吁.是言也.謂之傷寒汗下之樞機.其不然歟.惜乎釋者旁求厥義.滋蹈外臺祕要曰.此陰陽指身之表裏言.病者爲盛.不病者爲虛.不病者爲盛.表病裏和.是陽虛陰盛也.表和裏病.是陽盛陰虛也.縱意陰陽之在人.均則寧.偏則病.無過不及之謂均.過與不及之謂偏.盛則過矣.虛則不及矣.其可以盛爲和乎.故內經云.邪氣盛則實.精氣奪則虛.且謂陽虛當汗.陰虛當下.乃證邪氣而反指正氣.爲言得無晦乎.傷寒微旨曰.此陰陽指脈之尺寸言.尺脈短小.名陰盛陽虛.可汗.寸脈實大.尺脈短小.名陽盛陰虛.可下.苟汗證已具.而脈未應.必待尺脈力過於寸而後行.下證已具.而脈未應.必待寸脈力過於尺而後用.竊意越人設難.以病不以脈.其所答也.何反以脈不以病乎.且脈固以候病也.倘汗下之證已急.不可稍緩.待脈應而未應.欲不待則惑於心.欲待之則虛其變.二者之間.將從病歟.將從脈歟.吾不得無疑於此也.或詰予曰.仲景傷寒論引此.而繼以桂枝下咽.陽盛則斃.承氣入胃.陰盛以亡之語.夫桂枝表藥.承氣裏藥.反則爲害.是固然矣.然麻黃湯亦表藥也.其不言之何歟.且子以陰盛爲寒邪.寒邪固宜用麻黃也.今反棄桂枝.又何歟.予曰.何不味仲景之言乎.其曰凡傷寒之病.多從風寒得之.又曰.脈浮而緊.浮則爲風.緊則爲寒.又桂枝湯條.而曰嘗嘗惡寒.淅淅惡風.麻黃湯條.而曰惡風.夫風寒分言.則風陽而寒陰.風苟行於天地.嚴凝凍冽之時.其得謂之陽乎.是則風寒常相因耳.故桂枝麻黃皆溫劑也.以溫劑爲治.足以見風寒之俱爲陰邪矣.但傷衛則桂枝.傷榮則麻黃.榮衛雖殊.其爲表則一耳.仲景此言.但以戒汗下之誤爲主.不爲榮衛設也.桂枝則麻黃在其中矣.所謂陽盛卽斃者.是言表證已罷.而裏證既全.可攻而不可汗.所謂陰盛以亡者.是言裏證未形.而表證獨具.可汗而不可攻.由是觀之.則越人仲景之本旨.庶乎暢然于其中矣.

傷寒三百九十七法辨

余自童時習聞此言.以爲傷寒治法如是之詳且備也.及考之成無己註本.則所謂三百九十七法者.茫然不知所在.於是詢諸醫流.亦不過熟誦此句而已.欲其條分縷析.以實其數.則未遑其人.遂乃反覆而推尋之.以有論有方.諸條數之.則不及其數.以有論有方.有論無方諸條數之.則過其數.除辨脈法.平脈法.并傷寒例.及可汗不可汗.可吐不可吐.可下不可下諸篇外.止以六經病篇中有論有方.有論無方諸條數之.則亦不及其數.以六經病篇及痙濕暍.霍亂.陰陽易.差後勞復病篇中有論有方.有論無方諸條數之.則亦過其數.至以六經病.痙濕暍.霍亂.陰陽易.差後勞復篇.有論有方諸條數之.則又太少矣.竟不能決.欲以此句.視爲後人無據之言而不從.則疑其或有所據而或出仲景叔和而弗敢廢.欲姑信而必從之.則又多方求合而莫之遂.宋林億等校正傷寒論.其序曰.今校定張仲景傷寒論十卷.總二十篇.證外合三百九十七法.余於是就其十卷二十二篇而求之.其六經篇、痙濕暍篇、陰陽易、差後勞復篇中有方治諸條.以數爲計.又重載於各篇之前.又謂疾病至急.倉卒難尋.復重集諸可與不可方治.分爲八篇.亦以數爲計.繼於陰陽易、差後勞復篇之後.其太陽上篇.註曰.一十六法.太陽中篇.註曰三十九法.陽明篇.註曰四十四法.少陽篇.註曰二十三法.厥陰篇.註曰六法.不可發汗篇.註曰.一法.可發汗篇.註曰四十一法.發汗後篇.註曰二十五法.可吐篇.註曰二法.不可下篇.註曰四法.可下篇.註曰四十四法.汗吐下後篇.註曰四十八法.以其所註之數通計之.得三百八十七法.然少陽篇有小柴胡湯一法.其不言者.恐脫之也.又可吐篇卻有五法.其止言二法者.恐誤也.併此脫誤四法.於三百九十七法之中.亦僅得三百九十一法耳.較之序文之說.猶欠六法.乃參之脈經.其可汗可吐等篇外.比傷寒論.又多可溫、可灸、可刺、可水、可火、不可刺、不可灸、不可水、不可火諸篇.欲以此補其所欠.則又甚多而不可用.元泰定間.程德齋又作傷寒鈐法.其自序曰.若能精究是編.則知六經傳變三百九十七法.在於指掌矣.又曰.六經二百一十一法.霍亂六法.陰陽易、差後勞復六法.痙濕暍九法.不可汗二十六法.宜汗四十一法.不可吐五法.不可下五法.可汗五法.可吐五法.餘亦以其說通計之卻止得三百一十八法.於三百九十七法中.尙欠七十八法.觀其序文乃如彼.考其所計乃如此.則知其猶未能灼然以得其實數而無疑也.故下文細數中.止重載六經、霍亂、痙濕、暍、陰陽易、差後勞復諸法而已.彼可汗不可汗等諸法.再不重載也.近批點傷寒論者.何不考其非.乃一宗其所鈐字號而不敢少易乎.余由是屏去其說.但卽論之本文.疑食與俱.以細繹之.一旦豁然.始悟其所計之數.於理不通.而非仲景叔和之說矣.夫傷寒論.仲景之所作也.至叔和時.已多散落.雖叔和搜采成帙.終不能復其舊.然則今之所傳者.非全書也明矣.後之昧者.乃不察此.必欲以全書視之.爲鈐爲括.斷之曰.某經幾證.某經幾證.以謂傷寒治法.略無餘蘊矣.殊不知其間有論無方者甚多.至若前篇引內經所敘六經病證.除太陽少陰證爲後篇所有外.其陽明篇無日邪.少陽篇言胸脅滿而不言痛.太陰篇無嘔.乾、厥陰篇無消渴.氣上撞心.心中疼熱.飢而不欲食.食則吐蛔.下之利不止.若此者.非皆本無也.必有之而脫之耳.雖然爲鈐括者.膠柱調瑟.但知叔和之重載.而莫知其所以重載之意也.矣叔和既撰次於搜采之餘.復重載各篇方治.非諸可與不可方治者.不過虛人感於紛亂.故示之以簡便而已.林億乃非解其意.遂不問重與不重.一概通數之.以立總目.何不觀重載八篇之中.其方治者.止有一十五條.爲六經篇之所無.其餘一百五十三條.皆六經篇已數過者.安有一法而當兩數之理乎.雖程德齋去取與林億頗異.然亦五十步笑百步耳.其不重數發汗後并吐汗下後諸法.固爲是矣.至於宜汗四十一法.卻又俱是一法.當兩數者.與林億所計何以異哉.推原其意.似亦不見林億所計細數.止聞三百九十七法之目.遂自就論中毎而數之.欲以實其總數.然而卒不能實.故爲此含糊之說.以欺後人.反又不遑林億所言也.竊嘗思之.縱使三百九十七法之言.不出於林億等.而出於億之前.亦不足用.此言既出.則後之聞者.必當疑其是非.以歸於正.而乃遵守聽從.以爲千載不易之定論.悲夫.

余今於三百九十七法內除去重複者，與無方治者，止以有方治而不重複者計之，得二百三十八條，註以治字易法字，而曰二百三十八治，如此則庶或可通也。若以法言，則仲景一書無非法也，豈獨有方者然後爲法哉？且如論證論脈，其實諄諄教戒，而使人按之以爲準則，固切之法乎？其不可謂之法乎？雖然，六經之外諸條，其三家去取不同，固不必辨，然其於六經之中，尤有條理而不通者，姑陳一二。如太陽病三日已發汗，若吐，若下，若溫鍼，仍不解者，此爲壞病，桂枝不中與也，觀其脈證，知犯何逆，隨證治之，桂枝本爲解肌，若其人脈浮緊，發熱，汗不出者，不可與之也，當須識此，勿令誤也，若酒客病，不可與桂枝湯，得之則嘔，以酒客不喜甘故也，嘔家作桂枝湯，加厚朴杏子佳，凡服桂枝湯吐者，其後必吐膿血也，林億所校本，則自太陽病止勿令誤也爲一法，自若酒客病止杏子佳爲一法，自凡服桂枝湯吐者，其後必吐膿血也，則爲證不爲法，程德齋鈐法，則自太陽病止隨證治之爲一法，自桂枝本爲解肌止必吐膿血也爲一法，又林億本於病者下素有痔，連在髃臀，旁引少腹入陰筋者，此名臟結死一條，則數爲一法，於其餘死不治者，則皆不數，程德齋鈐法，於陽明病下血讝語者，此爲熱入血室，但頭汗出者，刺期門，隨其實而瀉之，濈然汗出愈一條，則不數，而太陽刺肝俞，肺俞，期門諸條，卻又數之而弗遺，餘如兩條同類，一云當汗而無方，一云當汗而有方，則取其有方者而略其無方者，又如當取而不取，不當取而取者，蓋亦甚多，不可悉舉，若此者，怪理不通，二家皆所不免，所謂楚固失矣，齊亦未爲得也，苟熟玩論之本文，以較其言，則罅漏出矣。

傷寒四逆厥辨

成無己註傷寒論有云，四逆者，四肢不溫也，厥者，手足自溫，至少陰，則邪熱漸深，故四肢逆而不溫，及至厥陰，則手足或厥，或不厥，或小便不利，或腹中痛，或泄痢下重者，四逆散主之，方用柴胡、枳實、芍藥、甘草，四者皆寒冷之物，而專主四逆之疾，是知四逆非虛寒之證也，四逆與厥相近而非，經曰，諸四逆厥者，不可下，是四逆與厥有異也，吁，斯言也，所謂彌近理而大亂眞者歟，竊嘗考之，仲景言四逆與厥者非一，或曰四逆，或曰厥，或曰厥逆，或曰厥冷，或曰厥寒，或曰手足厥冷，或曰手足厥逆冷，細詳其義，但是言寒冷耳，故厥逆二字，每每互言，未嘗分逆爲不溫，厥爲冷也，然四肢與手足御有所分，其以四字加於逆字之上者，是通指手足言也，其以手足二字加於厥逆厥冷等之上，及無手足二字者，是獨指手足言也，既曰不溫，卽爲冷矣，尙何異乎，仲景所謂諸四逆厥者，不可下，蓋以四逆爲四肢通冷，厥爲手足獨冷，而臂與脛以上不冷耳，不謂逆厥有不溫與冷之別也，故又曰厥者，手足逆冷是也，以逆冷二字釋厥字，足見逆卽厥，厥卽逆也，故字書曰，厥者逆也，雖然，逆厥雖俱爲寒冷，而卻有陰陽之殊爲義，將出未出而頓有所覺之辭也，夫將出未出而頓覺者，惟有形之物，將出乎胸脇之間，雖未出而亦可以漸知，若無形之聲，則不知也，嘔與吐，主有形之物言，故可謂之欲，乾嘔與噦，主無形之聲言，故不可謂之欲，成氏引食復欲嘔，欲食入口卽吐二句，而謂嘔吐有輕重，其意蓋以嘔言欲而爲輕，吐言卽而爲重，安知言欲不言欲者，本爲仲景以四逆散治四逆一條，此陽極似陰之四逆也，其無四逆湯熱藥治四逆之條者，安知其非本有而失之乎，且四逆湯之名，由四肢之冷而立也，今以四逆湯治手足厥冷，豈非逆厥之不異乎，既以

有形無形。不爲輕重。是也。果如其說。則得湯則嘔。得食而嘔。心中溫溫欲吐。氣逆欲吐之語。不出於仲景乎。又引俗謂之噯一句以證嘔。夫噯與噦。蓋字異而音義俱同者也。以之證嘔。亦疏矣。雖然。以嘔與吐較之。吐輕於嘔。以吐與乾嘔較之。乾嘔輕於吐。然三者。亦各自有輕重。不可定拘也。但以嘔吐乾嘔與噦較之。則噦之爲重。必非三者之比矣。故太素曰。木陳者。其聚落病深者。其聲噦。夫噦雖亦有輕而可治。重而不可治者。然病至於噦。則其治也終不易矣。且夫欬逆。俗以吃逆與吃忒呼之。然欬逆二字。惟見傷寒論首辨脈平脈法中。其六經病篇。及汗下可否諸篇。皆無所有。其所有者。噦也。後人因見六經病篇。及汗下可否諸篇。但有噦而無欬逆。遂謂噦卽欬逆。而曰欬逆者。噦之名。吁斯言也。孫眞人倡於前。朱丹溪和於後。由是噦與欬逆之名。噦瘵奏矣。金匱要略曰。病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徬心中憒憒然。無奈者。生薑半夏湯主之。乾嘔噦。若手足厥者。橘皮竹茹湯主之。觀此則仲景所謂噦逆。但指欬逆言乎。欬逆噦逆不同。欬逆言其聲之繼發而遽止。雖發止相續。有至數十聲者。然而短促不長。有若欬嗽之欬然。故曰欬逆。噦逆則言其似欲嘔物以出而無所出。但聲之濁惡長而有力。直至氣盡而後止。非如乾嘔之輕而不甚。故曰噦逆。二者皆由氣之逆上而作。故俱以逆言之。孫眞人乃以噦逆當欬逆何邪。彼言傷寒者。雖以辨何半脈法之欬逆。與欬逆上氣覈之。一切之義。豈無所辨乎。辨之爲火氣濕。則從昔人以治。辨之爲火氣濕。則從三子以治。如此應乎析理明而用法嚴矣。惟其以因火因氣因濕之證。強因風而合論之。所以眞僞不分。而名實相紊。若以因火因氣因濕證。而皆作風治。雖然。噦逆吃忒。以一藥同治則可。以一體同視則不可。

李東垣、朱彥脩三子者出。所論始與昔人異矣。河間曰。中風瘫瘓者。非謂肝木之風實甚。而卒倒無所知也。多因喜怒悲恐五志有所過極而卒中者。由五志過極。皆爲熱甚故也。洛云風者。言外中於風。由乎將息失宜。心火暴甚。腎水虛衰。不能制之。則陰虛陽實。而熱氣怫鬱。心神昏冒。筋骨不用。末而忘其本也。東垣曰。中風者。非外來風邪。乃本氣病也。凡人年過四旬。氣衰之際。或因憂喜忿怒傷其氣者。多有此疾。壯歲之時。無有也。若肥盛則間有之。亦是形盛氣衰而如此。彥修曰。西北氣寒。爲風所中。誠有之矣。東南氣溫而地多濕。有風病者。非風也。皆濕土生痰。痰生熱。熱生風也。三子之論。河間主乎火。東垣主乎氣。彥脩主乎濕。反以風爲虛象。而大異於昔人矣。吁。昔人也。三子也。果孰是歟。果孰非歟。以三子爲是。昔人爲非。則三子未出之前。固有從昔人而治愈者矣。以昔人爲是。三子爲非。則三子已出之後。亦有從三子而治愈者矣。故不善讀其書者。往往致亂。以予觀之。昔人三子之論。皆不可偏廢。但三子以相類中風之病。視爲中風而立論。故使後人狐疑而不能決。殊不知因于風者。眞中風也。因于火、因于氣、因于濕者。類中風也。三子所論者。自是因火因氣因濕而爲暴病暴死之證。與風何相干哉。如內經所謂三陰三陽發病。爲偏枯痿易。四肢不舉。亦未嘗必因於風而後能也。夫風火氣濕之殊。望聞問切之異。豈無所辨乎。辨之爲風。則從昔人以治。辨之爲火氣濕。則從三子以治。如此應乎析理明而用法嚴矣。惟其以因火因氣因濕之證。強因風而合論之。所以眞僞不分。而名實相紊。若以因火因氣因濕證。而皆作風治。雖然。噦逆吃忒。以一藥同治則可。以一體同視則不可。

中風辨

人有卒暴僵仆。或偏枯。或四肢不舉。或不知人。或死或不死者。世以中風呼之。而方書亦以中風治之。余嘗考諸內經。則曰風者。百病之始也。至其變化。乃爲他病。無常方。又曰。風者。善行而數變。又曰。風之傷人也。或爲寒熱中。或爲瘧風。或爲偏枯。或爲風也。其辜暴僵仆。不知人。四肢不舉者。並無所論。止有偏枯一語而已。及觀千金方。則引岐伯曰。中風大法有四。一曰偏枯。二曰風痱。三曰風懿。四曰風痹。解之者曰。偏枯者。半身不隨。風痱者。身無痛。四肢不收。風懿者。奄忽不知人。風痹者。諸痹類風狀。舍脫要略中風篇曰。寸口脈浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浸淫骨解。入於腸胃。或入於腑。卽不識人。邪入於腑。卽不能言。口吐涎沫。由是觀之。知卒暴僵仆。不知人。偏枯。痱。懿。痹。皆經火炒熱。又肉桂而非桂枝。蓋溫中藥也。內有杏仁。不過取其能下氣耳。若以此藥治靜而得之。血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反縱。正氣卽急。正氣引邪。喎僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。卽重不勝。邪入於腑。卽不識人。邪入於臟。若卽

所見之證而用之。然後合理。若夫所謂靜而得之之證。雖當暑月。卽非暑病。宜分出之。勿使後人有似同而異之惑。

積熱沉寒論

人之所賴以生者。氣也。氣者何。陰陽是也。夫陰與陽。可以和而平。可以乖而否。奚擇與否。吉因於是乎歧之。夫惟攝之不能以皆善也。故有寒偏熱之病。始莫辨於乖否之餘矣。雖然。寒也熱也。苟未至於甚。粗工常道也。人皆知之。今肝實脾虛。乃不瀉肝而瀉心。此則太亦知之。至於不補脾而補腎。此則人不能知。惟越人知之耳。夫子能令母實。母能令子虛。以常情觀之。則曰心火實。致肝木亦實。此子能令母實也。脾土虛。致肺金亦虛。此母能令子虛也。心火實。固由自旺。脾土虛。乃由肝木制之。法當瀉心補脾。則肝肺皆平矣。越人則不然。其子能令母實。子謂火。母謂木。固與常情無異。其母能令子虛。母謂水。子謂木。則與常情不同矣。故曰。水者。木之母也。子能令母實一句。言病因也。母能令子虛一句。言治法。其意蓋曰。火爲木之子。子助其母。使之過分而爲病矣。今將何以處之。惟有補水瀉火之治而已。夫補水者。何謂也。蓋水爲木之母。若補水之虛。使力可勝火。火勢退而木勢亦退。此則母能令子之義。所謂不治之治也。此處字。與補氣字。義則異。此處之虛。不同。彼處之虛。耗其眞而虛。卽其虛之也。若曰不然。則母能令子虛一句。將歸之於脾肺乎。旣歸於脾肺乎。今何不補脾乎。夫五行之道。其所畏者。畏所克耳。今火大旺。水大虧。火何畏乎。惟其無畏。何愈旺而莫能制。苟非滋水以來勝之。孰能勝也。水勝火三字。此越人寫意處。當細觀之。勿輕忽也。雖瀉火補水並言。然其要又在於補水耳。後人乃曰。獨瀉火而不用補水。又曰瀉火卽是補水。得不大違越人與經之意乎。若果不補水。縱必不言補北方。越人必不言補水矣。雖然。水不虛而火獨暴旺者。固不必補水。亦可也。若先因用補水。而致火旺者。不補水。可乎。水虛火旺。而不補水。則藥至而暫息。藥過而復作。將積年累月。無有窮已。其免者。固千百之一二。而積熱沉寒。亦恐未至於斃。見也。然而數見者。得非粗工不知來蘇之道。不能防微杜漸。遂致滋蔓難圖。以成之歟。夫寒之而熱者。徒知以寒治熱。而不知寒之不衰者。由乎眞火之不足。以爲萬世法。後人紛紛之論。其可憑乎。夫實則瀉之。虛則補之。此常道也。實則瀉其子。虛則補其母。亦常道也。人皆知之。今肝實脾虛。乃不瀉肝而瀉心。此則太亦知之。至於不補脾而補腎。此則人不能知。惟越人知之耳。夫子能令母實。母能令子虛。以常情觀之。則曰心火實。致肝木亦實。此子能令母實也。脾土虛。致肺金亦虛。此母能令子虛也。心火實。固由自旺。脾土虛。乃由肝木制之。法當瀉心補脾。則肝肺皆平矣。越人則不然。其子能令母實。子謂火。母謂木。固與常情無異。其母能令子虛。母謂水。子謂木。則與常情不同矣。故曰。水者。木之母也。子能令母實一句。言病因也。母能令子虛一句。言治法。其意蓋曰。火爲木之子。子助其母。使之過分而爲病矣。今將何以處之。惟有補水瀉火之治而已。夫補水者。何謂也。蓋水爲木之母。若補水之虛。使力可勝火。火勢退而木勢亦退。此則母能令子之義。所謂不治之治也。此處字。與補氣字。義則異。此處之虛。不同。彼處之虛。耗其眞而虛。卽其虛之也。若曰不然。則母能令子虛一句。將歸之於脾肺乎。旣歸於脾肺乎。今何不補脾乎。夫五行之道。其所畏者。畏所克耳。今火大旺。水大虧。火何畏乎。惟其無畏。何愈旺而莫能制。苟非滋水以來勝之。孰能勝也。水勝火三字。此越人寫意處。當細觀之。勿輕忽也。雖瀉火補水並言。然其要又在於補水耳。後人乃曰。獨瀉火而不用補水。又曰瀉火卽是補水。得不大違越人與經之意乎。若果不補水。縱必不言補北方。越人必不言補水矣。雖然。水不虛而火獨暴旺者。固不必補水。亦可也。若先因用補水。而致火旺者。不補水。可乎。水虛火旺。而不補水。則藥至而暫息。藥過而復作。將積年累月。無有窮已。其免者。固千百之一二。而積熱沉寒。亦恐未至於斃。見也。然而數見者。得非粗工不知來蘇之道。不能防微杜漸。遂致滋蔓難圖。以成之歟。夫寒之而熱者。徒知以寒治熱。而不知寒之不衰者。由乎眞火之不足。以爲萬世法。後人紛紛之論。其可憑乎。夫實則瀉之。虛則補之。此

治五鬱之法。管開之王太僕矣。北穉內經曰。木鬱達之。謂吐之令其條達也。火鬱發之。謂汗之令其疏散也。土鬱奪之。謂下之令無壅塞也。金鬱泄之。謂滲泄解表利小便也。水鬱折之。謂抑之制其衝逆也。太僕此說之後。雖不宗之。然思則未能快然于中。焉得細觀之。似猶有可言。且折之一句。較之上四句。尤爲難曉。內有反復經文以求其旨。按內經帝曰。鬱之甚者。治之奈何。岐伯曰。木鬱達之。火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。然調其氣。過者折之。以其畏也。所謂泄之。總十三句。通爲一章。當分三節。自帝曰止水不敢犯。則滲道達而後愈。或病勢既旺。非上法所能遽制。則用泄水之藥以伐而挫之。或去遠陳基。開鬼門。潔淨府。三治備舉。迭用以漸平之。王氏所謂抑之制其衝逆。正欲折挫其汎濫之勢也。夫實土者。守也。泄水者。攻也。雖三治者。廣略而決勝也。守也。攻也。廣略也。雖俱爲治水之法。然不審病者之虛實。久近淺深。雖高而安施治之。其不值鬱者寡矣。且夫五鬱之病。固有法以治之矣。然邪氣久客。正氣必損。今邪氣雖去。正氣豈能遽平哉。苟不平調正氣。使各安其位。復其常於治鬱之餘。則猶未足以盡治法之妙。故又曰。然調其氣。苟調之而其氣猶或過而未服。則當益其所不勝以制之。如木過者當益金。金能制木。則木斯服矣。所不勝者。所畏者也。故曰過者折之。以其畏也。夫制物者。物之所欲也。制於物者。物之所不欲也。順其欲則喜。逆其欲則惡。今逆之以所惡。故曰所謂瀉之。王氏以鹹瀉腎酸瀉肝之類爲說。未盡厥旨。雖然。自調其氣以下。蓋經之本旨。故余推其義如此。若擴充爲應變之用。則不必盡然也。

二陽病論

經曰。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。釋之者謂男子則脾受之而味不化。女子則心受之而血不流。故不月。分心脾爲男女各受立說。竊獨謂不然。夫二陽陽明也。胃與大腸之脈也。腸胃有病。心脾受之。發心脾。猶言延及於心脾也。雖然。脾胃爲合。胃病而及脾。理固宜矣。大腸與心本非合也。今大腸而及心。何哉。蓋胃倉受納之府。大腸爲傳化之府。食入於胃。濁氣歸心。飲入於胃。輸精於脾者。以胃之

若煎迫然而氣逆上也。火炎氣逆。故曰盲耳閉而無所用。此陽極欲絕。故其精敗神去。不可復生。若陰陽之崩壞。而所儲之水穀散潰流溢。莫能以遏之矣。夫病至於此。是壞之極矣。王氏乃因不曉都字之義。遂略去此字而謂之若壞。其可乎哉。又以此病純爲房患。以張爲筋脈腹脹。以汩汩爲煩悶。皆非是。

八味丸用澤瀉論

張仲景八味丸用澤瀉。蓋宗陶本草衍義云。不過接引桂附等歸就腎經。別無他益。而王海藏極之。恐謂八味丸以地黃爲君。而以餘藥佐之。非止爲補血之劑。蓋兼補氣也。氣者血之母。東垣所謂陽旺則能生陰血者此也。若果專爲補腎而入腎經。則地黃、山茱萸、白茯苓、牡丹皮皆腎經之藥。固不待夫澤瀉之接引桂附後至也。其附子、官桂。雖非足少陰經本藥。然附子乃右腎命門之藥也。易老亦曰補腎用肉桂。然則桂附亦不待夫諸經引用。澤瀉能補下焦熱火不足。是亦右腎命門藥也。易老亦曰補腎用肉桂。然則桂附亦不待夫澤瀉之接引而後至矣。唯乾山藥雖獨入乎太陰經。然其功亦能強陰。且手太陰爲足少陰之上原。原氣之位。故內熱以及於胸中也。又曰內經有云。勞者溫之。損者溫之。惟宜溫藥以補元氣而瀉火邪。內經曰。有盛流。豈無益。夫其用地黃爲君者。大補血虛不足與補腎也。用諸藥佐之者。山藥之甘陰益氣。山茱萸之強陰益精。而北元氣。白茯苓之補陽長陰而益氣。牡丹皮之瀉陰火而治神志不足。澤瀉之養五臟益氣力。起陰氣而利虛損五勞。桂附之補下焦火也。由此觀之。則余之所謂兼補氣者。非臆說也。且澤瀉也。雖曰鹹以瀉腎。乃瀉腎邪。非瀉腎之本也。故五苓散用澤瀉者。正非瀉腎邪乎。白茯苓亦代腎邪。即所以養五臟益氣力。起陰氣。補虛損五勞之功而已。寇氏何疑其瀉腎而爲接引桂附等之說乎。且澤瀉固能瀉腎。然從於諸補藥羣衆之中。雖欲瀉之而力莫能施矣。故當歸能於參蔗。則能補血。從於大黃、柔牛。則能破血。從於桂、附、桑、莫則熱。從於大黃、芒硝則寒。此非無定性也。蓋於羣衆之勢而不得不然也。雖然。或者又謂八味丸以附子爲少陰之向導。其補自是地黃爲主。蓋取其健脾走下之性。以行地黃之滯。可致遠耳。竊意如此。則地黃之滯。非附子不能及下矣。然錢仲陽六味地黃丸。豈有附子乎。夫八味丸、蓋兼陰火不足者設。六味地黃丸。則惟陰虛者用之也。

小便原委論

或問余曰。靈樞經曰。水穀者。常并居胃中。成糟粕而俱下于大腸。而成下焦。滲而俱下。濟泌別汁。循下焦而滲入膀胱焉。王冰曰。水液自回腸泌別汁。滲入膀胱之中。胞氣化之而爲溲以泄出也。楊介云。水穀自小腸盛受於闌門。以分別也。其水則滲灌入於膀胱上口而爲溲便。詳已上三說。則小便卽泌別之水液。滲入膀胱以出者也。素問則曰。飲入千胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。則小便又似水飲精微之氣。上升脾肺。運化而後成者也。彼此不同。將何所憑乎。余曰。憑夫理耳。且夫溲溺者。果何物耶。水而已矣。水之下流。其性則然也。故飲入于胃。其精氣雖上升。其飲之本。固不能上升。譬如君火不能爲病。而在欲純歸之於陰火乎。至眞要大論云。勞者溫之。損者益之。夫勞則動之太過。而神不寧矣。故溫之。溫也者。養也。溫之者。所以調其食飲。適其起居。澄心息慮。從容以待其眞氣之復常也。醫記又謂小便純由泌別。不由運化。蓋不明此理故也。雖然。膀胱固曰津液之府。至於受盛津液。則又有胞而

居膀胱之中焉。故素問曰。胞移熱於膀胱。癃閉。靈樞經曰。膀胱之胞薄以濡。類纂曰。膀胱也。有上口而無下口。津液既盛於胞。無由自出。必因乎氣化。而後能瀉之。蓋上焦爲霧以出於前陰也。素問所謂膀胱津液藏焉者。蓋舉膀胱以該胞也。若曰胞下無竅。則入溺急時。奚能卽出乎。夫惟積滿胞下。空處而不可再容。故急急。念則至腦卽出矣。或言胞上下皆有口。或言胞有小竅而爲注泄之路。不亦妄歟。

內傷雜論

竊觀夫東垣李氏所著內外傷辨。有曰外傷風寒客邪有餘之病。當瀉不當補。內傷飲食勞役不足之病。當補不當瀉。自此論一出。而天下後世始知內外之傷有所別。而仲景之法不可例用矣。其惠也不其大哉。雖然。夷考其言。猶或有可疑者。不敢課俊僭用。謹之。如曰夫飲食勞倦傷而內熱者。乃陰火亢其神土之位。故內熱以及於胸中也。又曰內經有云。勞者溫之。損者溫之。惟宜溫藥以補元氣而瀉火邪。內經曰。溫能除大熱。故治之必溫藥乃可耳。又曰。飲者無形之氣。傷之則宜發汗。神小便。使上下分消其濕。此說消也。食者有形之物。傷之則宜損其穀。其次莫如消導。若此者。皆不能使人無疑者也。謹按素問調經論篇云。帝曰。陰虛生內熱。奈何。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣熏胸中。故內熱。嗟夫。此內傷之說之原乎。請釋其義如左。夫人身之陰陽。有以表裏言者。有以上下之分言者。有以氣血言者。有以身前身後言者。有以臟腑言者。有以升降呼吸之氣言者。甚多。不必悉舉。此所謂陰虛之陰。其所指與數者皆不同。蓋勞動之過。則陽和之氣皆亢極而化爲火矣。況水穀之味又少入。是故陽愈盛而陰愈衰也。此陰虛之陰。蓋指身中之陰氣。與水穀之味耳。或以下焦陰分爲言。或以腎水爲陰爲言。皆非也。夫有所勞役者。過動扇火也。形氣衰少者。勞傷元氣。則少食而氣衰也。上焦不行者。清陽不升也。下脘不通者。濁陰不降也。夫胃受水穀。故清陽升而濁陰降。以傳化出入。滋榮一身也。今胃不能納而穀氣衰少。則清無升而濁無降矣。故曰。上焦不行。下脘不通。然非謂絕不行不通也。但比之平常無病時。則謂之不行不通耳。上少火皆成壯火。而胃居上焦下脘兩者之間。故胃氣熱熱。則上炎。故熏胸中而爲內熱也。東垣所謂勞役形體。所謂飲食失節而致熱者。此言正與調經論篇之旨相合。固宜引此援經文於內外傷辨以爲之主。而乃反不引此。卻謂陰火乘七位。故內熱及胸中。此不能無疑者也。夫陰火二字。素問、靈樞、難經、未嘗言。而東垣每每言之。素問止有七節之勝。中有小心二句。而劉守眞推其爲命門火。不屬水。引仙經心爲君火。腎爲相火之說以爲之證。然亦不以陰火名之。是則名爲陰火者。其東垣始歟。竊謂內熱之作。非皆陰火也。但氣有鬱則成熱耳。雖曰心爲君火。看不主令。然素問所發諸病之屬熱者甚衆。皆君火病也。豈君火不能爲病。而在欲純歸之於陰火乎。至眞要大論云。勞者溫之。損者益之。夫勞則動之太過。而神不寧矣。故溫之。溫也者。養也。溫之者。所以調其食飲。適其起居。澄心息慮。從容以待其眞氣之復常也。醫記所謂柔色以溫之。此溫字正與此同。或以藥扶助之。亦養也。今東垣乃以溫爲溫涼之溫。固宜溫藥以補

元氣而瀉火邪又易損者益之爲損者溫之又以溫能除大熱爲內經所云而偏考內經並無此語此亦不能無疑者也然溫藥之補元氣瀉火邪者亦惟氣溫而味甘者斯可矣蓋溫能益氣甘能助脾而緩火故元氣復而火邪退也夫宜用溫藥以爲勞者溫之之註則不可陰陽應象論所謂形不足者溫之以氣其溫字亦是滋養之義非指溫藥也夫形不足乃陽虛而不充也氣者藥之氣也藥有氣與氣薄味厚味薄味厚者屬陰而滋精氣厚者屬陽而滋形今以藥之氣厚者滋陽不兼形乎故曰形不足者溫之以氣雖以藥溫養之亦未嘗不兼乎滿食欲適起居與澄心息慮也溫字固其二意然終不可視爲溫涼之溫苟以補之除之排之舉之散之等語比類而觀焉則其義自著矣夫金木水火土運於天地也則無形質之可觀其屬於地則有形質者也火者有形而質不實者也酒性雖熱體同於水今東垣乃謂飲者無形之氣此亦不能無疑者也既待發汗利小便以去之其可謂之無形之氣乎且勞倦傷飲食傷二者雖俱爲內傷然不可混而爲一難經所謂飲食勞倦則傷脾者蓋謂脾主飲食而四肢亦屬脾故飲食失節勞役四肢皆能傷于脾耳非謂二者同類而無辨也夫勞倦傷飲食傷雖與風寒暑濕有餘之病不同然飲食傷又與勞倦傷不同勞倦傷滅不足也飲食傷元當於不足之中分其有餘不足也何也蓋飢餓不飲食與飲食太過雖皆是失節然必明其有兩者之分方盡其理節也者何無不及無太過之中道也夫飢餓不飲食者胃氣空虛此爲不足固失節也飲食自倍而停滯者胃氣受傷此不足之中兼有餘亦失節也以受傷言則不足以停滯言則有餘矣惟其不足故補益惟其有餘故消導亦有物暫滯而氣不甚傷宜消導獨行不須補益者亦有既停滯不復自化不須消導但當補益或亦不須補益者潔古枳朮丸東垣橘皮枳朮丸木香檳朮丸之類雖曰消導固有補益之意存乎其間其他如木香分氣丸導氣枳實丸大枳殼丸之類雖無補益然施之於物暫滯氣不甚傷者豈不可哉但不宜視爲通行之藥耳且所滯之物非枳朮丸之力所能去者亦安可泥於消導而不知變乎故備急丸炙黃丸感應丸瓜蒂散等之推逐者潔古東垣亦未嘗委之而弗用也故善將兵者攻亦當守善守者亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其敗也非兵之罪用兵者之罪耳觀乎此則知消導補益推逐之理矣若夫勞倦傷則純乎補益固不待議雖東垣丁寧告戒然世人猶往往以苦寒之劑望除勞倦傷之熱及其不愈而反甚自甚而至危但曰病勢已極藥不能勝耳醫者病者主病者一委之天命皆惜然不悟其爲妄治之失也嗚呼仁人君子能不痛心也哉夫東垣先哲之出類者也奚敢輕議但恨其白璧微瑕而或貽後人差謬毫釐千里之患故不得不僭論耳知我者其鑒之

外傷內傷所受經言異同論

客或難予曰素問陰陽應象論云天之邪氣感則害人五藏水穀之寒熱感則害人六腑太陰陽明論云犯賊風虛邪者陽受之陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五藏兩說正相反願聞其解余復之曰此所謂似反而不反者也夫感天之邪氣犯賊風虛邪外傷有餘之病也感水穀寒熱飲食飲不節內傷不足之病也二者之傷腑藏皆得受之但隨其所從所發之處而爲病耳不可以此兩說之異而致疑蓋並行不相悖也讀者當合而觀之其旨斯盡若曰不然請以諸處所論證之金匱真言論曰風觸五藏邪氣發病八正神明論曰夫八正之虛邪以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則五藏傷靈樞經曰五藏之中風又曰東風傷人內舍於肝南風傷人內舍於心西南風傷人內舍於脾西風傷人內舍於肺北風傷人內舍於腎觀乎此則天之邪氣同傷五藏矣靈樞又曰邪之中人也無有常中乎陰則溜于腑又曰虛邪之中人也始從皮膚以入其傳自絡脈而經而輸而伏衝之脈以至於腸胃又曰東北風傷人內舍於大腸西北風傷人內舍於小腸東南風傷人內舍於胃觀乎此則天之邪氣豈不傷六腑乎素問曰飲食自倍腸胃乃傷觀乎此則水穀寒熱同傷六腑矣靈樞又曰形寒寒飲則傷肺難經曰飲食勞倦則傷脾觀乎此則水穀寒熱豈不傷五藏乎至於地之濕氣亦未必專害藏腑而不能害皮肉筋脈也但以邪氣無形腠理精氣故以類相從而多傷藏水穀有形腑主傳化物故因其所有而多傷腑濕氣浸潤其性緩慢其入人也以漸其始也自足故從下而上從淺而深而多傷於皮肉筋脈耳孰謂濕氣全無及於藏腑之理哉至若起居不時一語蓋勞役所傷之病不系上文異同之義故不之及也

醫先

王文祿撰

醫先卷一

上醫治未病不治已病治未病易而無迹治已病勞而固功是故未病者多忽而已病者始求諸醫醫雖良其如病成何嘗言之諭惜也自秦以前墳典完備學出于一養德養生無二術云秦以後坑焚燼漸幸素問猶傳學者棄而不講目爲僞僞不知多參贊生言非聖弗能也矧天子以至庶人修身爲本豈有遺身而能用世邪是在辨之早焉已矣于是作醫先蓋先未病而醫之不施餌劑砭針同躋仁壽之域覽者庶以監予之心豈曰不爲良相當作良醫云爾嘉靖庚戌夏五既望海鹽沂陽生王文祿

沂陽生曰養德養生二而無全學也矧天地大德曰生今以養德屬儒曰正道養生屬仙曰異端誤矣身存仁致中和孟子曰養氣持志集義勿忘勿助是故立教以醫世酌人情而制方周末文雕則僞故存仁戰國氣暴則蝕故集義存仁完心也志定而氣從集義順心也氣生而志固致中和也勿忘助也疾安由作故曰養德養生一也無二術也

岐伯曰陽爲氣陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精歸化化生精精生氣氣生神黃帝曰予知百病皆生于氣何餘都氣也正氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不動何病之生沂陽生曰養生寡養氣養心寡寡慾欲以保元氣則形強而神不罷若形壞則神不存神離則形不固形譬燈缸盛油神譬燈油燃火搖翻燈缸則燈油瀉炙乾燈油則燈缸裂必形與神俱即莫覺足榮衛調夫榮血也衛氣也血以榮氣岐伯曰根于中者命曰神機神去則機息根于外者命曰氣立氣止則化絕沂陽生曰甚矣精之本也是以精枯則病精竭則死夫勞極則精離飲食少則精減房欲頻則精耗試觀樹木撥皮宵腊則萎枯矣夫人曷可妄用其精不妄用則氣不散氣不散則神不移又曰息不可用意不可動意動則神移神移則氣散氣散則精竭故授宋丹溪以清金降火之法乃禪德經曰致虛極守靜篤谷神不死是謂玄牝黃帝曰地爲之下谷乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也曰馮乎曰大氣舉之也沂陽生曰勝邪子天地自相依附之說夫地即血天即氣天包地氣載血地也今人骨肉臟腑皆血也魄也神靈運用皆氣也神機息根于外者命曰氣立氣止則化絕沂陽生曰甚矣精爲至精之寶也故岐伯云精者身之本也是以精枯則病精竭則死夫勞極則精離飲食少則精減房欲頻則精耗試觀樹木撥皮宵腊則萎枯矣夫人曷可妄用其精不妄用則氣不散氣不散則神不移又曰息不可用意不可動意動則神移神移則氣散氣散則精竭故授宋丹溪以清金降火之法乃禪德經曰致虛極守靜篤谷神不死是謂玄牝黃帝曰地爲之下谷乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也曰馮乎曰大氣舉之也沂陽生曰勝邪子天地自相依附之說夫地即血天即氣天包地氣載血地也今人骨肉臟腑皆血也魄也神靈運用皆氣也神機息根于外者命曰氣立氣止則化絕沂陽生曰甚矣精爲至精之寶也故岐伯云精者身之本也是以精枯則病精竭則死夫勞極則精離飲食少則精減房欲頻則精耗試觀樹木撥皮宵腊則萎枯矣夫人曷可妄用其精不妄用則氣不散氣不散則神不移又曰息不可用意不可動意動則神移神移則氣散氣散則精竭故授宋丹溪以清金降火之法乃禪德經曰致虛極守靜篤谷神不死是謂玄牝黃帝曰地爲之下谷乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也曰馮乎曰大氣舉之也沂陽生曰勝邪子天地自相依附之說夫地即血天即氣天包地氣載血地也今人骨肉臟腑皆血也魄也神靈運用皆氣也神機息根于外者命曰氣立氣止則化絕沂陽生曰甚矣精爲至精之寶也故岐伯云精者身之本也是以精枯則病精竭則死夫勞極則精離飲食少則精減房欲頻則精耗試觀樹木撥皮宵腊則萎枯矣夫人曷可妄用其精不妄用則氣不散氣不散則神不移又曰息不可用意不可動意動則神移神移則氣散氣散則精竭故授宋丹溪以清金降火之法乃禪德經曰致虛極守靜篤谷神不死是謂玄牝黃帝曰地爲之下谷乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也曰馮乎曰大氣舉之也沂陽生曰勝邪子天地自相依附之說夫地即血天即氣天包地氣載血地也今人骨肉臟腑皆血也魄也神靈運用皆氣也神機息根于外者命曰氣立氣止則化絕沂陽生曰甚矣精爲至精之寶也故岐伯云精者身

沂陽生曰養神之術去牽引而已矣牽如牽縴之牽引如引弓之引毋欲疾必牽行之急矣欲出必引滿之審纔斷則毋住矣矢釋則弓舒矣欲寡則神凝矣大雅曰無然畔援無然歆羨誕先登于岸

沂陽生曰一切病皆生于心心神安泰病從何生不觀農夫冒暑耘耨無暑病相習忘之也凡心動即火起外邪斯入矣是以聖忘外

內經曰喜怒傷氣寒暑傷形沂陽生曰愼喜戒怒氣調矣禦寒避暑形固矣心生之也苟能雖喜忘喜不累于喜雖怒忘怒不累于怒雖寒忘寒不累于寒雖暑忘暑不累于暑形氣像仝何傷之有非至人曷足語此

或問髮白何也沂陽生曰省慾慮則心血不耗髮不易白矣益髮猶血也問髮白何也曰逸色慾則心血耗髮不易白矣益髮猶血也問髮白何也曰逸色慾則心血耗何也曰心為形役有耗無益是以易老若能一切忘之則幷且忘矣況年乎故曰天若有情天亦老天之蒼蒼者不變則人之形容髮亦可以無變也司馬子徵坐忘論欲法太虛云爾

沂陽生曰心火不炎則無瘡瘍諸疾成暴怒則無中氣諸疾夏至陰生絕慾至秋分則無中暑瘧疫諸疾冬至陽生絕慾至春分則無傷寒瘟疫諸疾此謂順天時法陰陽以自固求子則子壽養生則生怡

褚澄曰脾以養氣肺以通氣腎以泄氣心以役氣則氣常生心虛氣入為湯肺虛氣入為喘肝虛氣入則目昏腎虛氣入腰疼脾獨不與受食不化氣將日微安能有餘以入虛沂陽生曰脾之繫于生人大矣思慮積久損多矣以原憲之薄為壽之修短也

參元朱子曰精字氣字從米是精氣皆資于米沂陽生曰人以穀氣為主是以得穀者昌絕穀者亡參元朱子曰痘字從丙丙火也百病皆生于火沂陽

一生沂陽生曰血雖陰類運之者其和陽乎褚氏聖醫也故表出之以為醫者法

沂陽生曰卓哉褚氏之見道也悟五運六氣之非且曰大抵甲子皆志歲月日時建所耳配以五行位以五方皆人為也譬有此人過來備矣

久情濃積久精厚陽盛必男也得胎後不可再交不動慾火必無殘瘀之毒靜養則它日德性聰慧沂陽生曰觀獸交有時當積精全神以豫養親壽仝之足徵

猫犬麋鹿必春時牝牡相遇一年祇之一旦未見有不育者況周禮仲春令會男女亦乘發生之氣耳沂陽生曰人求嗣者男女無病十月陰盡陽生時違房室絕嗜慾以待來年春仲交會得之必男也得胎後不可再交不動慾火必無殘瘀之毒靜養則它日德性聰慧沂陽生曰觀獸交有時當積精全神以豫養親壽仝之足徵

甚矣胗脈之難也王叔和脈經左手寸心小腸關肝膽尺腎腸胱右手寸肺大腸關脾胃尺命門三焦五臟六腑脈之定位也重按為臟臟者藏也輕取為腑腑者附也一指間重按分浮中沉數息且分至數何徵乎褚澄尊生經之法血聚精成男褚澄曰陰血先至陽精隨中以血聚精成男沂陽生曰成胎者氣也精生氣氣生神精足則氣足氣足則神足

殆盡則神不能留非時時靜養之烏能延生當念夜氣滋息而愼之以保命為要可也

沂陽生曰六氣不侵七情無擾清虛恬靜之日日如之則病安從生不變不動而能忘之則忘日忘年壽與天地等而不老矣形安能槁奈何王易而人不肯為日自戕其生理也蓋慾火炙烈每日暗損一分不覺積久損多矣以原憲之薄為壽之修短也

參元朱子曰精字氣字從米是精氣皆資于米沂陽生曰人以穀氣為主是以得穀者昌絕穀者亡參元朱子曰痘字從丙丙火也百病皆生于火沂陽

醫先 一四



慎疾芻言引

余弱冠時，家多疾病，先世所藏醫書頗多，因隨時繙閱，不過欲稍識方藥而已。循習漸久，乃上追靈素根源，下沿漢唐支派，如是者十餘年，乃注難經，又十餘年而注本草，又十餘年而作醫學源流論，又五年而著傷寒類方，五十年中，批閱之書約千餘卷，泛濫之書約萬餘卷，每過幾時，必悔從前疎漏，盡學以年進也，乃世之醫者，全廢古書，隨心自造，以致人多枉死，目擊心傷，數年前曾作芻言一册，欲以醒世，而鮮克聽從，竊思生長聖朝，毫無益於此世，而半生攻苦，雖有著述幾種，皆統談醫學，無當心動魄之語，足令人恪然開悟，因復摳心挖肾，即芻言原本，更加痛快剖析，質因悲憫填胸，不能自已，願覽者諒其苦心，虛懷體察，以之治人，則敬慎可以寡過，以之治己，則明哲可以保身，望遇信從之有人，庶緜斯道於一綫。

乾隆丁亥秋七月巧日，洄溪徐靈胎識。

清 吳江徐靈胎洄溪著

學問之道，必由淺入深，從未有淺近不知，而專求怪僻者，況醫所謂淺近者，如傷風則防風荊芥，感寒則蘇葉葱頭，欬嗽則蘇子杏仁，傷食則山查神麴，傷暑則香薷藿薄，痰疾則柴胡湯加減，痢疾則黃芩湯加減，婦人則四物湯加減，小兒則異功散加減，此皆歷聖相傳之定法，千古不能易也，至於危險疑難之症，則非此等藥所能愈，必博考群方，深明經絡，實指此症何名，古人以何方主治，而隨症加減，今則以古賢之法爲東鄰不足道，又不能指出病名，惟以陰虛陽虛肝氣腎弱等套語概之，專用溫補，以致外邪入裏，嘔至不救，間有稍馴謹之人，起病時仍用切近之藥一二帖，未即有效，即輒而改用溫補，不思病之中人，愈必有漸，不可因無速效而即換方也，況所服之方，或未盡善，不思即於前方損益，萬分而遽求變法，又不肯先用輕淡之劑，探測病情，專取性雄力厚之品，大反前轍，必至害不旋踵，總由胸無定見之故，當思人之有病，不外風寒暑濕燥火爲外因，喜怒憂思悲驚恐爲內因，此十三因，試問何因是當補者，大凡人非老死即病死，其無病而虛死者，千不得一，況病去則虛者亦生，病留則實者亦死，若果元氣欲脫，雖沒其身於參附之中，亦何所用，乃醫畢內經曰，邪之所湊，其氣必

虛氣虛固當補矣所凌之邪不當去耶蓋邪氣補住則永不復出重則即死輕則遷延變病或有幸而愈者乃病輕而元氣漸復非藥之功也余少時見問疾者聞醫家已用補藥則相戞病者已愈今則病勢方張正翠然議進參附熟地豈不可駭其始也醫者先以虛脫嚇人而後以補藥媚人浙江則六味八味湯加人參麥冬等藥江南則理中湯加附桂熟地鹿茸腎腦帶等藥於是人人習聞以爲我等不怕病死只怕虛死所以服補而死猶恨補之不早補之不重並自恨服人參無力以致不救醫者虛脫之言眞有先見之明毫無疑悔若服他藥而死則親戚朋友舉詬病家之重則不重命死者亦曰不能瞑醫者之罪豈不勝誅矣所以病人向醫者逃病必白謂極虛而旁人代爲逃病亦共指爲極虛惟恐醫者稍用攻削之劑以致不起或有稍識病之醫即欲對症擬方迫於此等危言亦戰戰兢兢擇至補之藥以順其意既可取容更可免謗勢使然也此風之起不過三十餘年今則更甚不知何時而可挽回也

用藥

醫道起於神農之著本草以一藥治一病但一病有數症（統名爲病如瘧痢之類分名爲症如嘔吐頭疼痛而寒熱脹痛之類）後之聖人取藥之對症者合幾味而成方故治病必先有藥而後有方方成之後再審其配合之法與古何方相似則云以某方加減若非醫者先有一六味八味理中等湯橫於胸中而硬派人服之也至其辨症用藥之法如有人風寒痰食合而成病必審其風居幾分寒居幾分痰食居幾分而藥則隨其邪之多寡以爲增減或一方不能兼治則先治其最急者所以無一味虛設之藥無一分不對的之分兩也況醫之爲道全在日考如服我之藥而病情不減或反增重則必深自痛懲啟求必效之法而後已則學問自能日進若不論何病總以幾味溫補投之愈則以爲己功死則以爲病本不治毫無轉計此則誤盡天下而終身不自知也又其所名陳方者用柴胡一味即名柴胡湯用大黃一味即名承氣湯於古人制方之義全然不知隨其口之所指而已其醫案則數幾句陰陽虛實五行生剋籠統套語以爲用溫補之地而文人學士又最易欺見有陰陽五行等說即以爲有本之學深信不疑其人亦自謂爲得醫學之捷徑將千古聖人窮思極想所製對症之方數千首皆不必問而已稱名醫矣夫醫者欲道之行相習成風猶無足怪獨是開居涉獵之人亦俱蹈襲此等謬說與醫者同聲合氣親知家有病即往幫助醫者用危言擊住本家使之不得不用溫補貨重之藥以明關切因而致死死則以爲用此等藥原未嘗云病者服之必效不過如此門第之家於理不該服價賤之藥耳若已生疾又有人亦以此法斃之眞屬可憫數十年前亦有涉獵醫學者頗能辨別藥性博覽經方今乃和率而入於魔道其始起於趙養撥張景岳淵全不知古聖製方之義師心自用著書成家彼亦不知流弊至於此極也我知天心仁愛其轉移必不久矣

中風

中風北人多屬寒宜散寒南人多屬火宜清火而祛風消痰則南北盡同古方白仲景侯氏黑散風引湯而外則紫命湯爲主方統命湯共有數首不外驅風其隨症加減皆有精義從未有純用溫熱滋補不放風寒痰火一毫外出以致重病必死輕病則使之不死不生惟日服人參以破其家而戀其命最可傷也

中暑

暑字之名義與寒字相反乃天行熱毒之病也其症脈微少氣煩渴燥熱甚則手足反冷若其人汗出不止用人參白虎湯主之如或身熱腹痛腹滿嘔吐瀉痢厥冷則名熱霍亂人參散不可用當用香薷飲藿香正氣散主之皆治暑之正法也若傷寒論中又有寒霍亂一症此乃寒邪入陰用理中湯主之此治寒霍亂之法也與暑熱之霍亂絕不相干乃後之醫書於熱霍亂門中附入寒霍亂一方名大順散用肉桂乾薑即理中湯之變法其方下亦注明治夏月傷冷飲之症其說甚明乃昏昧之人耳聞有此方竟以之治暑熱之霍亂以示奇異其死也宛轉呼號肝焦日裂七竅見血熱歸於內則手足反冷而脈微欲絕所謂熱深厥亦深也（手足冷即厥厥者逆也）乃病者醫者不知此理以爲服熱藥而更冷其爲陰症無疑故曰覩其慘

死而無所悔。以後復治他人。熱藥更加重矣。與治暑熱痢者之用四逆湯。其害正同。舉世蔑以爲必當如此。雖言不信也。

痢疾

痢有數種。誤治則生死立判。凡脾氣不實。飮食不化。晝夜無度。無紅白積者。此爲脾瀉。其方不一。當隨症施治。若傷寒傳入陰經。下利清穀。脈微厥冷。此爲純陰之危症。非參附乾薑不治。患此者絕少。若夫夏秋之月。暑邪入腑。腦血無度。此名滯下。全屬暑熱之痢。蒸腸爛胃。與陰寒之痢。判若水火。仲景以黃芩湯爲主。而因症加減。此千古不易之法。今乃以暑毒熱痢。俱用附桂薑茸。始則目赤舌焦。號痛欲絕。其色或變紫黑。如豆汁。或如敗肝。熱深厥深。手足逆冷。不知其爲熱極。反信爲眞寒。益加薑附。以至胃爛腸裂。哀號宛轉。如受炮烙之刑而死。我見甚多。惟有對之流涕。更有用六味湯及參苓等補藥者。於久痢虛乏之人。或有倖中。若邪氣未淸。非成痢疾。卽至不救。蓋治痢之方甚多。博考古書。自能窮其變化。何得以不入痢症之藥每投必誤也。

陰症

六淫之邪。不但暑燥火固屬乎熱。卽風寒濕亦變爲熱。經云。熱病者。皆傷寒之類也。又云。人之傷於寒也。則爲病熱。故外感總以散熱爲治。惟直中陰經之傷寒。必現脈緊便青畏寒蜷臥。不喜飮。舌無胎。種種寒象。當用溫散。此千不得一者也。何近日之醫。舉天下寒熱雜感病勢稍重者。皆指爲陰症。卽用參附薑桂。服後而熱更甚。竝不疑爲熱藥之故。卽用熱地麥冬等。以爲補陰配陽之法。竟忘其爲外感矣。要知陰症無發熱之理。間有寒極似陽。而外現熱症者。其內症必現種種寒象。然亦當驅散其寒。如麻黃附子細辛湯之類。亦於無補寒之法也。乃以溫熱之邪。便派作陰症。而全用溫補。眞千古之奇聞也。又有以夢洩房勞之後。而得外感者。爲陰症更屬笑談。夫邪果入陰經。卽無房勞等事。亦屬陰症。如邪不入陰經。則自有本症治法。與陰何干。若云外邪乘虛入腎。則尤當急驅腎中之邪。豈可留邪燥腎。又有用熱藥之後。其熱勢益增。忽轉而改用大寒。乃是以藥試病矣。要知一病有一病之方。豈無對病和平之藥。乃始投之火。卽轉而投之水。何也。然其死也。病家不咎熱藥之誤。而咎寒藥之誤。何也。蓋人之死也。必漸冷。服熱藥而反冷。則信以爲非藥之故。若服寒藥而冷。則明明以藥使之冷矣。故熱藥之殺人不覺。而寒藥之殺人顯然。所以醫者寧可用補用熱。雖死而納可免咎也。

老人

能長年者。必有獨盛之處。陽獨盛者。當補其陰。陰獨盛者。當益其陽。然陰盛者十之一二。陽盛者十之八九。而陽之太盛者。不獨當補陰。幷宜淸火以保其陰。故老人無不頭熱耳聾面赤便燥。現種種陽症。乃醫者爲老人立方。不論有病無病。總以補陽爲主。熱盛生風。必生類中等病。是召疾也。若偶有風寒痰濕等因。尤當急逐其邪。蓋老年氣血不甚流利。豈堪補住其邪。以與氣血爲難。故治老人之有外感者。總與壯年一例。或實見其有虛弱之處。則用輕淡之品。而盡爲補托。若無病而調養。則當審其陰陽之偏勝。而損有此病耶。此亦一害。故幷及之。

婦人

婦人挾孕。胞中一點眞陽。日吸升血以養。故陽日旺而陰日衰。凡半產滑胎。皆火盛陰衰。不能全其形體故也。近人有胎前宜涼之說。頗爲近理。至於產後。則陰血盡脫。孤陽獨立。藏腑如焚。經脈如沸。故仲景專以養血消瘀爲主。而石膏竹茹亦不禁用。余每遵之。無不立效。乃近人造爲產後宜溫之邪說。以薑桂爲主。藥下果陰陽俱脫。脈遲畏寒。血水淋漓。血暈舌白。薑桂亦有用時。乃血乾火燥。純現熱症。亦用熱藥。則經枯脈絕。頃刻而斃。我見以百計。更有惡露未淨。身熱氣塞。煩躁不寐。心煩腹痛。胥由敗血爲患。亦用薑桂助其火而壓其瘀。重則卽死。輕則變成虛勞。世之所謂女科名家。一例如此。蓋胎產乃天地生育之機。絕少死症。其死皆藥誤也。造爲此等邪說者。九死不足以蔽其辜。又胎產藥中。不用生地而用熟地。亦全失用藥之理。不可不思也。

小兒

小兒之疾。熱與痰二端而已。蓋純陽之體。日抱懷中。衣服加煖。又襁褓之類。皆用火烘。內外俱熱。熱則生風。風火相煽。乳食不歇。則必生痰。痰得火煉。則堅如膠漆。而乳仍不斷。則新舊之痰日積。必至腹間雷鳴。又強之食乳以止其啼。從此胸高氣塞。目瞪手搐。卽指爲驚風。其實非驚。乃飽脹欲死耳。此時告其父母。令減衣停乳。則必大慍。謂虛贏若此。反令其凍餒。無不睡罵。醫者亦不明此理。非用剛燥之藥。卽用參苓滋補。至痰結氣凝之後。則無可救療。余見極多。教之適其寒溫。停其乳食。以淸來飮養其胃氣。稍用消痰順氣之藥調之。能愈者十愈八九。其有不明此理。反日爲狂言者。百無一生。至於痘科。尤屬怪誕。痘爲小兒之所必不免。非惡疾也。當天氣溫和之時。死者絕少。若大寒大暑。其元氣虛而稠密者。間有不治。其始欲透發。其後欲漿滿。皆賴精血爲之。乃未發以前。卽用大黃石膏數兩。以遏其生發之機。而敗其元氣。既而卽用蚯蚓數十。蟅螂數個。及一切大寒大毒之品。如蜈蚣蝎子雞頭豬尾之類。又將地丁銀花等粗惡之品數兩。煎汁而灌之。增其毒而倒其胃。此等惡物。卽令醫者自服之。亦必胃絕腸裂而死。況後提乎。凡用此等藥者。必致決此兒死於何日。十不失一。其父母翻盛稱其眼力不爽。孰知其卽死於彼所用之藥也。或有元氣充實。幸而不死者。遂以爲非此等大藥不能挽回。而人人傳布。奉爲神方矣。更可異者。強壯之年。醫者黃芩麥芽。俱不敢用。以爲蛙伐。後提之子。則有膏大黃。咸兩咸斤。毫不顧慮。忍心害理。至此而極。無奈呼天搶地以告人。而人不信也。又有造爲蝗蠅子之說者。割開頤內。取出血痰。此法起於明末海濱妖婦騙財之法。惟蘇松二處盛行。割死者甚衆。蓋小兒有痰火者。喉氣數日。必有一二日阻脈飮食。名曰娘乳。用薄荷朴硝爲末。搽一二次。卽愈。卽不治亦愈。至所割出之痰塊。或大或小。人因信之。不知頤內空虛之處。人人有此。割則復生。竝非病也。不然。何以普天下之小兒。從未有患蝗蠅子而死者。獨蘇松

外科

治外症。始起欲其不大。將成欲其不痛。大則傷肌爛筋。腐骨穿筋。難於收口。痛則沖心犯胃。耗血亡津。是症最生矣。故始起之時。最重閉藥。束其根盤。截其餘毒。則頂自高而膿易成。纖則護心托毒。治其內。化脂提膿。治其外。自然轉危爲安。乃始則不能束毒使小。又無證心定痛之方。惟外用五灰三品內服附桂熱毒等藥。必至腐腸潰肉。更輕用刀針。割肉斷筋。以致呼號昏亂。神散魂飛。宛轉求死。仁人之所不忍見也。況癰疽用刀太早。最難生肌收口。凡毒藥刀針。只宜施於頑肉老皮。餘者自有提頭呼膿之法。莖於惡肉。自有消腐化水之方。故能使患者絕無痛苦。收功速而精神易復。乃此等良法。一切不問。豈傳授之不眞。抑或別有他念也。更可駭者。瘡瘍之症。最重忌口。一切鮮毒。毫不可犯。無害不載。乃近人反令病者專服毒物。以爲以毒攻毒。夫解毒尙恐無效。豈可反增其毒。種種謬誤。不可殫述。間有患外症之人。若用安穩治法。全不以爲妙。用毒藥刀針者。血肉淋漓。痛死復活。反以爲手段高強。佩服深墊。而遍爲薦引。因知疾痛生死。皆有定數。非人所能自主。而醫者與病人以苦楚。亦病者有以召之也。

治法

凡病祇服煎藥而愈者。惟外感之症爲然。其餘諸症。則必用丸散膏丹、針灸砭鑱、浸洗熨薰、蒸提按壓等法。因病施治。乃今之醫者。既乏資本。又憚工夫。右方不考。手法無傳。寫一通治煎方。其技已竭。而病家不辭遠涉。不惜重聘。亦祇求得一煎方。已大滿其願。古昔聖人窮思極想。製造治病諸法。全不一問。如此而欲愈大症痼疾。無是理也。所以今人患輕淺之病。雖有服煎藥而愈者。若久病大症。不過遲延歲月。必無愈理也。故爲醫者。必廣求治法。以應病者之求。至當用之藥。一時不能即合者。亦當預爲修製。以待急用。所謂工欲善其事。必先利其器。奈何欲施救人之術。而全無救人之具也。

制劑

古時權量甚輕。古一兩今二錢零。古一升今二合。古一劑今之三服。又古之醫者皆自採鮮藥。如生地半夏之類。其重比乾者數倍。故古方雖重。其實無過今之一兩左右者。惟乎金外桑間有重劑。此乃治強實大症。亦不輕用也。若宋元以來。每服一劑。方下必注云。每服或三錢。或五錢。亦無過一兩外者。此煎劑之方也。末藥則用一錢匕。丸藥則如桐子大者十丸。加至二三十丸。試將古方細細考之。有如今日二三兩至七八兩之煎劑乎。皆由醫者不明古制。以爲權量與今無異。又自疑爲太重。爲之說曰。今人氣薄。當略爲減輕。不知已重於古方數倍矣。所以藥價日貴。而受害愈速也。又有方中熟地用三四兩。餘藥只用一二錢者。亦祇無此輕重懸殊之法。要知藥氣入胃。不過借此調和氣血。非藥入口即變爲氣血。所以不在多也。又有病人粒米不入。反用膩膈酸苦腥臭之藥。大碗濃煎灌之。即使中病。尙難運化。況與病相反之藥。填塞胃中。即不藥死。亦必濕死。小兒尤甚。又不論人之貧富。人參總爲不就之品。人情無不貪生。必竭蹶措處。孰知反以此而喪身。甚貧者送終無具。妻子飄零。是殺其身而幷破其家也。吾少時見前輩老醫。必審貧富而後用藥。尤見居心長厚。況是時參價猶賤於今日二十倍。尙如此謹愼。即此等存心。今人

已不逮昔人遠矣。

煎藥服藥法

煎藥之法各殊。有先煎主藥一味。後入餘藥者。有先煎兼味。後煎一味者。分煎後併煎者。有宜多煎者。補藥皆然。有宜少煎者。故藥皆然。有宜水多者。有宜水少者。有不煎而泡漬者。有煎而露一宿者。有宜用猛火者。有宜用微火者。各有妙義。不可移易。今則不論何藥。惟知猛火多煎。將芳香之氣散盡。僅存濃厚之質。如煎燒酒者。將和久養。則酒氣全無矣。豈能和營達衛乎。須將古人所定煎法。細細推究。而各當其宜。則取效尤捷。其服藥亦有法。右方一劑。必分三服。一日服三次。并有日服三次。夜服一次者。蓋藥味入口。即行於經絡。驅邪查正。性過即已。豈容間斷。今人則每日服一次。病久藥暫。此一暴十寒之道也。又有寒熱不得其宜。早暮不合其時。或與飲食相雜。或服藥時。即勞動冒風。不避無益。反能有害。至於傷寒及外症疙症。病勢一日數變。今早用一劑。中間隔兩晝一夜。經絡已傳。病勢益增矣。又發散之劑。必煖覆令汗出。使邪從汗散。若不使出汗。則外邪豈能內消。此皆淺易之理。醫家病家皆所宜知也。又惡毒之藥。不宜輕用。昔神農遍嘗諸藥。而成本草。故能深知其性。今之醫者。於不常用之藥。亦宜細辨其氣味。方不至於誤用。若耳聞有此藥。竟求一嘗。又不細審古人用法。而輒以大劑灌之。病者服之。苦楚萬狀。幷有因而死者。而己亦茫然不知其何故。若能每味親嘗。斷不敢冒昧試人矣。

延醫

疾病爲生死相關。一或有誤。追悔無及。故延醫治病。乃以性命相託也。何可之人。寧可不服藥以待命。乃世人獨忽於此。惟以耳爲目。不考其實學何如。治效何若。聞人稱說。即延請施治。服藥無效。毫不轉念。甚而日重一日。惟咎己病之難療。不咎醫者之始誤。孰知藥集中病。即不能速愈。必無不見效之理。不但服後奏功。當服時已有可徵者。如熱病服涼藥。寒病服熱藥之類。謂其氣已罄香可愛。入於口即和順安適。如不中病之藥。則聞其氣必厭惡。入於腹必懊憹。內經云。臨病人間所便。此眞訣也。今人則信任一人。即至死不悔。其故莫解。想必冥冥之中有定數也。又有與此相反者。偶聽人言。即求一試。藥未盡劑。又易一醫。或一日而請數人。各自立說。莫無主張。此時即有高明之人。豈能達衆力爭以招謗忌。亦惟隨人唯諾而已。要知病之傳變。各有定期。方之更換。各有次第。藥石亂投。終歸不治。二者事異而害同。惟能不務虛名。專求實效。審察精詳。見機明決。庶幾不以性命爲兒戲矣。

秘方

古聖設立方藥。專以治病。凡中病而效者。即爲秘方。並非別有奇藥也。若無病而服藥。久則必有偏勝之害。或有氣血衰弱。藉藥滋補。亦必擇和平純粹之品。審體氣之所偏。而稍爲資助。如世所謂純陽大熱大補之劑。乃昔人所造以欺人者。若其方偶與其人相合。或有小效。終歸大害。其不相合者。無不傷生。更有一等怪方。乃富貴人陋醫所造者。余曾遇一貴公子。向余求長生方。余應之曰。公試覓一長生之人

示我。我乃能造長生之方。若長生者無一人。則天下無長生之方矣。其人有慍色。是時適有老醫在其家。因復向老醫求得之。乃憾余曰。長生方某先生已與我矣。公何猶客也。余視其方。乃聚天下血肉溫補之藥。故難其製法。使耳目一新者。余私謂老醫曰。先生之長生方。從何傳授。老醫曰。予無見哂。子非入世行道之人耳。凡富貴之人。何求不得。惟憾不能長生。縱慾耳。故每遇名醫。必求此方。若長生方不知。何以得行其道。我非有意欺彼。其如欲應酬於世。自不得不然耳。後果得厚酬。余因知天下所傳祕方。皆此類也。此即文成五利之餘術。萬勿以爲真。可以長生也。速死則有之耳。識此以醒世之求長生而覓祕方者。

詭誕

醫藥爲人命所關。較他事尤宜敬愼。今乃眩奇立異。竟視爲兒戲矣。其創始之人。不過欲賊愚人之耳目。繼而互相效尤。竟以爲行道之捷徑。而病家則以爲名醫異人之處在此。將古人精思妙法。反全然不考。其弊何所底止。今略舉數端於左。

人中黃　腸胃熱蒸。偶有用入丸散者。今入煎藥。亦有用入煎藥。又古方以溫人而倒其胃矣。

人中白　乘淨入末藥。若館服。鹿茸糜茸。偶入丸藥。外症症以溫人而倒其胃矣。

人中白。是以溫人而倒其胃矣。

河車膠　治血寒久病。今人以治熱證時病。腸胃不堪。又必用數味中以羊腸絕腸代之。蛙水。是治陽明熱證。今人用一二錢。

蜈蚣、蠐螬、鼠婦、蜣螂　此一切雜病之祖方。其證大症。已無不備。能通其理。天下無難治之病矣。

金匱　此一切雜病之祖方。其證大症。已無不備。能通其理。天下無難治之病矣。

神農本草　神農本草經止三百六十種。自陶宏景以後。藥味日增。用法益廣。至明李時珍綱目而大備。其書以本經爲主。而以諸家之說附之。讀者字字考驗。則能知古人製方之妙義。而用之不窮矣。

外科祕要

千金方　二書匯集唐以前之經方祕方。及婦科、兒科、外科。無所不備。博大深微。必明乎素仲景之書。方能知所審擇。不至泛濫而無所適從矣。

婦科

兒科

婦人除經帶胎產之外。與男子同。小兒除慧痘疹疽而外。與老壯同。所以古人立無專科。後人不能通貫醫理。只習經產慧痘等方藥。乃有專科。若讀前所列之書。則已無所不能。更取後世所案婦人良方幼幼新書等參觀可也。

外科

其方亦具千金外臺。後世方愈多而法愈備。如竇氏全書。瘍科選粹。俱可採取。惟惡毒之藥。及輕用刀針。斷宜切戒。

御纂醫宗金鑑　源本靈素。推崇傷寒論。金匱要略。以爲宗旨。後乃博採衆論。嚴其去取。不尚新奇。全無偏執。又無科不備。眞能闡明聖學。垂訓後人。足徵聖朝仁民之術。無所不周。習醫者即不能全讀古書。祇研究此書。足以名世。何乃不此崇信。而反從事於近世杜撰無稽之說也。

靈樞經　此明經絡臟腑之所以生成。疾病之所由侵犯。針灸家不可不詳考。方脈家略明大義可也。

其短矣。

紱曾少承庭訓。物究醫經。靡次是邦。目閱三載。側聞嶺外水土惡劣。瘴癘洪多。調劑之方。攸關仁政。爰日耳目所周。市醫故智。靡足苛責。通人彙拔。絕少新傳。非命夭殤。心焉忉怛。行篋奉有洞溪徐先生愼疾芻言。持論醫牌。足發蒙瞽。稽諸粵俗。良堪補苴。今方伯姚公。慈祥愷惻。重鐫部爽。既獲是書。而付剞劂。嘉以揅醫林之蕤穢。躋編氓於太蘇。則此鐫爲嚆矢云。用是歡喜無量而書其後。

光緒七年夏五。歸安凌紱曾跋於五羊城。

秦越人撰
王九思等註解

集註難經序

黃帝八十一難經者蓋乃勃海秦越人之所作也越人受桑君之祕術遂洞明醫道至能徹視藏府刳腸剔心以其與軒轅時扁鵲相類乃號之爲扁鵲（引此文乃作仍又家於盧國因命之曰盧醫世或以盧扁爲二人者斯實謬矣按黃帝有內經二帙帙各九卷而其義幽賾殆難窮覽越人乃採摘英華抄撮精要二部經內凡八十一章勒成卷軸伸演其道（按史記正義原本誤作皆依滑氏本改引此文改）探微索隱傳示後昆名爲八十一難以其理趣深遠非卒易了故也既宏暢聖言故首稱黃帝斯乃醫經之心髓救疾之樞機所謂脫牙肉於象犀收羽毛於翡翠者矣遂子吳太醫令呂廣爲之注解亦會合元宗足可垂訓而所釋未半餘皆見闕余性好醫方問道無倦斯經章句特承師授既而就研無數十載于茲雖未達其本源蓋亦稟其綱目此軼所興多歷年代非唯文句舛錯抑亦事緒參差後人傳覽良難領會輒係賢編次使類例相從凡爲一十三篇仍舊八十一首呂氏未解今並註釋別之並別爲音義以彰厥旨昔皇甫元晏綴集甲乙之科近世華陽陶貞白廣附後爲百一之製皆所以啓情梳慮濟育羣生者矣余今所演蓋亦遠慕高仁邇遵盛德但恨庸識有量聖旨無涯綆促汲深元致難盡前紙卅州紙縣尉楊元操序

集註難經目錄

第一　經脈診候　凡二十四首
第二　經絡大數　凡二首
第三　奇經八脈　凡三首
第四　榮衛三焦　凡二首
第五　藏府配像　凡六首
第六　藏府度數　凡十首
第七　虛實邪正　凡五首
第八　藏府傳病　凡二首
第九　藏府積聚　凡二首
第十　五泄傷寒　凡四首
第十一　神聖工巧　凡一首
第十二　藏府井俞　凡七首
第十三　用鍼補瀉　凡十三首

明　王九思石友譔
王暐集王惟一輯

金山錢熙祚錫之校

經脈診候第一　凡二十四首

一難曰十二經皆有動脈者是也曰是手足經十二脈也　丁曰十二經皆有動脈者是也曰是手足經十二脈也以應天地各有三陰三陽之經也以應天地各有三陰三人兩手足各有三陰三陽之氣也所謂天地三陰三陽各有所主其時自春分節後冬至之後秋陽之氣也所謂天地三陰三陽所主也夏至之後秋後到夏至之前九十日爲天之三陰所主也秋分節前九十日爲天之三陰所主也冬至之後春分節前九十日地分之前九十日天之三陰所主也凡左右上下各有此三陰三陽之氣合爲十日是地之三陰所主也凡左右上下各有此三陰三陽之氣合爲之三陽所主也冬至之後春分節前九十日地之三陰所主也凡左右上下各有此三陰三陽之氣合爲十二故人亦有十二經也所主左右上下之分也又人腸以上者手三陰三陽所主也即通於天氣腸以下足三陰三陽所主也即通於地氣其通天氣者爲氣爲脈其通地氣者爲血也又經者徑也言十二經通陰陽行氣血也又經者徑也遍相灌溉無所不通所以黃帝云十二經處百病決死生不可不通也其言十二經皆有動脈者即在兩手三部各有會動之脈也即左手寸部心與小腸動脈所出也心脈曰手少陰（按原本此下有心包絡脈曰手心主八字據下文心包之脈法于右尺不應自相手之脈故脈之）小腸脈曰手太陽其應東南方君火在巽是也左手關部肝膽動脈所出也肝脈曰足厥陰膽脈曰足少陽其應東方木在震是也左手尺部腎與膀胱動脈所出也腎脈曰足少陰膀胱脈曰足太陽其應北方水在坎是也右手寸部肺與大腸動脈所出也肺脈曰手太陰大腸脈曰手陽明其應西方金在兌是也右手關部脾胃動脈所出也脾脈曰足太陰胃脈曰足陽明其應中央土在坤是也右手尺部心包絡與三焦動脈所出也心包絡曰手厥陰三焦脈曰手少陽其應南方相火在離是也此三部動脈所出故經言皆有動脈也　楊曰凡人兩手足各有三陰脈三陽脈合十二經脈肝脈曰足厥陰膽脈曰足太陰腎脈曰足少陰膀胱脈曰足少陽胃脈曰足陽明膀胱脈曰手太陰心脈曰手少陰（按原本此下誤衍心包

絡脈曰手心主入字與上注同今刪之　大腸脈曰手陽明小腸脈曰手太陽皆雙行故有大包絡脈曰手厥陰三焦脈曰手少陽凡脈皆雙行故有大陰六陽也　呂曰足太陽動委中足少陽動耳前　楊曰衝陽下關穴也又動緜緜　呂曰足陽明動趺上穴也在足跌上故以爲名又動頭人迎又動大迎　呂曰手少陽動目外眥　楊曰瞳子髎穴也　呂曰手陽明動口邊　楊曰客主人　楊曰又動聽會　呂曰手陽明動口邊　楊曰地倉穴也　呂曰又動陽谿足厥陰動人迎　楊曰按人迎乃足陽明脈非足厥陰也呂曰厥陰動人迎誤矣人迎通候五藏之氣非獨因厥陰而動也按厥陰脈動於回曾焉　呂曰足少陰動內踝下　楊曰太谿穴也按此動脈非少陰脈也斯乃衝脈動耳衝脈與少陰並行因謂少陰脈動其實非也亦呂氏之謬焉少陰乃動內踝上五寸間也經曰彈之以候死生是也　呂曰足太陰動脾上　楊曰極泉穴也又曰箕門穴也　呂曰手少陰動掖下　楊曰極泉穴也又動靈道少海　呂曰手心主動勞宮手太陰脈動大淵楊曰又動尺澤俠白天府也　虞曰呂楊二注惟各取其實冷熱之證謂一經之中有一表一裏來者爲陽去者爲陰兩手合六部六部合之爲十二經其理明矣察陰陽者知死生之期故曰十二經皆有動脈也

獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也

丁曰夫獨取寸口診法者其一指指下各有上下左右長短浮沈滑濇數見病吉凶也此法是黃帝脈中之旨也越人引此一篇以爲冢篇之首也昔黃帝問曰診法何如岐伯對曰常以平旦陰氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂乃可診有過之脈切脈動靜視精明察五色視五藏有餘不足形之盛衰參伍決死生之分也此者是獨取寸口之法也　楊曰自難曰至此是越人引經設問從然字以下是解釋其義會悉如此例可知也

然寸口者脈之大會手太陰之脈動也　呂曰太陰者肺之脈也肺爲諸藏上蓋主通陰陽故十二經皆會手太陰寸口所以決吉凶者十二經有病皆見寸口故曰大會也　虞曰五味入胃化生五氣五味者甘辛鹹苦酸五氣者膻腥香焦腐乃五行之氣味也其味化氣上傳手太陰太陰主氣得五氣以溉灌五藏若胃失中和則不化氣手太陰無所受故寸口以浮沈長短滑濇春秋逆順知其死生也　丁曰其手太陰者是右手寸部也爲肺主其氣爲五藏六府之華蓋凡五藏六府有病皆見於氣口故曰大會手太陰寸口所以決吉凶者十二經皆會手太陰寸口也所以何經之動浮沈滑濇春秋逆順知其死生也　丁曰按舊經注其脈息以爲八百一十丈即當水下二刻得周身一度如此則行陽五十度行陰亦五十度此乃甚與經意不同也經言行陽二十五度共得五十度而復會也所謂行陽行陰各二十五度者謂一歲陰陽始於立春交相復會於立春故其行五十度也日之曉昏人之寤寐皆在於平旦日行二十四時復會於是人氣始自中焦注手太陰行其經絡計二十四丈內有穴太淵是脈之大會始終故各計二十五所以言寸口者脈之大要會也五藏別論曰五藏者藏精氣而不瀉也故實而不能滿以蓋五藏氣本經曰人受氣於穀五穀入胃乃能至手太陰陰陽應象論曰味歸形形歸氣氣歸精精歸化夫如是則知人之氣自味而化上傳手太陰行陰陽分晝夜是故行陽二十五度行陰二十五度也

人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行五十度周於身漏水下百刻

呂曰十二經十五絡二十七氣皆候於寸口故人一呼脈上行三寸吸脈下行三寸呼吸定息脈行六寸二十七氣皆隨上下行以灌行於身寐行於藏晝夜流行無有休息時　丁曰言人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸者即是天地陰陽升降定息也即是周於六甲而又日月曉昏人呼吸上下以大氣周身故乃法定息六寸也

人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度一周於身榮衛還周會於手太陰周天度一萬三千五百息榮衛始於手太陰注手陽明陽明注足陽明太陰注手太陰太陰注手少陰少陰注手心主心主注手少陽少陽注足少陽厥陰復還注手太陰天度二十五度復會於手太陰寸口者五藏六府之所終始故法取於寸口也

呂曰人一息脈行六寸十息脈行六丈千息六十丈萬息六百丈一萬三千五百息合爲八百一十丈爲一周陽脈出行二十五度陰脈入行二十五度合爲五十度周於身漏水下百刻榮衛行陰陽呼吸漏水下二刻得周身一度如此則行陽五十度行陰亦五十度此乃甚與經意不同也經言行陽二十五度共得五十度而復會也所謂行陽行陰各二十五度者謂一歲陰陽始於立春交相復會於立春故其行五十度也日之曉昏人之寤寐皆在於平旦日行二十四時復會於是人氣始自中焦注手太陰行其經絡計二十四丈內有穴太淵是脈之大會始終故各計二十五所以言寸口者脈之大要會也五藏別論曰五藏者藏精氣而不瀉也故實而不能滿以蓋五藏氣本經曰人受氣於穀五穀入胃乃能至手太陰陰陽應象論曰味歸形形歸氣氣歸精精歸化夫如是則知人之氣自味而化上傳手太陰行陰陽分晝夜是故行陽二十五度行陰二十五度也

漏水下百刻圖

一歲陰陽升降會於立春一日陰陽曉昏會於艮時一身榮衛還周會於手太陰周天度一萬三千五百息榮衛始於手太陰陽明陽明注足陽明太陰注手太陰太陰注手少陰少陰注手心主心主注手少陽少陽注足少陽厥陰復還注手太陰天度二十五度復會於手太陰寸口者五藏六府之所終始故法取於寸口也　呂曰人一息脈行六寸十息脈行六丈千息六十丈萬息六百丈一萬三千五百息合爲八百一十丈爲一周陽脈出行二十五度陰脈入行二十五度合爲五十度周於身漏水下百刻榮衛行陰陽呼吸漏水下二刻得周身一度如此則行陽五十度行陰亦五十度此乃甚與經意不同也經言行陽二十五度共得五十度而復會也所謂行陽行陰各二十五度者謂一歲陰陽始於立春交相復會於立春故其行五十度也日之曉昏人之寤寐皆在於平旦日行二十四時復會於是人氣始自中焦注手太陰行其經絡計二十四丈內有穴太淵是脈之大會始終故各計二十五所以言寸口者脈之大要會也五藏別論曰五藏者藏精氣而不瀉也故實而不能滿以蓋五藏氣本經曰人受氣於穀五穀入胃乃能至手太陰陰陽應象論曰味歸形形歸氣氣歸精精歸化夫如是則知人之氣自味而化上傳手太陰行陰陽分晝夜是故行陽二十五度行陰二十五度也

水下四刻卷一經復還於手太陰共得百刻漏水下百刻圖



二難曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大要會也

呂曰諸十二經脈三部九候有病者皆見於尺寸故言脈之大要會也　丁曰舊經注此說為五藏六府之法者非也大要會者謂尺寸陰陽往復各有要會也

從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸內陽之所治也

呂曰至尺者言從尺至關其脈見一寸而言尺者是其根本寸口長一寸而脈見九分陽數奇陰數偶也故分寸為尺分尺為寸

丁曰分寸為尺者人從關至尺澤穴當一尺也於其尺內分一寸以代一尺之法是故分寸為尺分尺為寸也故陰得尺內一寸

丁曰陰數偶也

陽得寸內九分

丁曰陽數奇也

尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

丁曰尺寸之法舊經有注言諸家所傳撰不同執引三寸九分之理其一寸九分之法者蓋為尺寸之位各有陰陽始終也陽氣者生於尺而動於寸陰氣者生於寸而動於尺是以法陽氣始生於立春上至芒種之節其數九三陽王於前法寸內九分而浮夏至之節其氣下行至立冬而終

（○按以下注說之輒相去一寸以備三寸並不見一寸此寸字當作部）

其數十即三陰王於後法尺內一寸而沈故知尺寸各有始終也此是越人引其陽中陰陽始終者陰氣復從立秋而生下至冬至之節其數九此者天地陰陽始之後隨少陽上行至立夏之節其數十冬至終故法尺寸陰陽各有始終也天地要會之門在於四立謂之天門地戶人門鬼門人之氣口人迎左右神門亦法也　楊曰寸關尺三位諸家所撰多不能同故備而論之以顯其正按皇甫士安脈訣以掌後三指為三部一指之下為六分三部凡一寸八分華佗脈訣云三部之位輒相去一寸合為三寸諸經如此差異則後之學者疑惑彌深然脈法始於黃帝難經起自扁鵲此之二部俱祖宗諸家諸論益并枝葉爾正可務本遺末不容逐末忘本今的舉指歸用明人要宜依黃帝正經以掌後三寸為三部則寸與關尺各得一寸備三才之義也此法永定不可移改其王叔和可謂得之矣凡診脈者先明三部九候之本位五藏六府之所出然後可以察其善惡以別浮沈如其本位尚迷則病源莫辨欲其愈疾亦難矣哉三部者寸關尺也九候者天地人也一部之中則有天地人三部之中合為九候以候五藏之氣也其五藏六府所出者左手寸口者心與肺脾胃與肺脈之所出也關上者肝與膽脈之所出也尺中者腎與胞脈之所出也關前一分者人迎之位也關後一分者神門之位也凡五藏六府之所出然後可以察其善惡以別浮沈如其本位尚迷則病源莫辨欲其愈疾亦難矣哉三部者寸關尺也九候者天地人也一部之中則有天地人三部之中合為九候以候五藏之氣也其五藏六府所出者左手寸口者心與肺脾胃與肺脈之所出也關上者肝與膽脈之所出也尺中者腎與胞脈之所出也關前一分者人迎之位也關後一分者神門之位也右手寸口者肺與胃脈之所出也尺中者命門三焦脈之所出也關上分神門之位也右手寸口者肺與胃脈之所出也尺中者命門三焦脈之所出也關前一分者氣口之位也關後一分者神門之位也凡五藏之脈並為陰陰脈皆沈六府之脈並為陽陽脈皆浮假令左手寸口脈浮者小腸脈也沈者心之脈也餘皆倣此斯乃脈位之綱維診候之法式也

尺長短部分互有不同令後人難為依據庶今明之以示後學華佗之說乃如脈經言果不謬矣王叔和以三寸為式義有隱微此乃黃帝正經之說豈有誤也況上古以一寸為指為四寸王叔和必取其廣指之三寸與今之一寸九分短長相近也何休注公羊傳云側手為廣按指為寸即

其義也況越人生於周採靈樞素問作此難經今之寸尺度量乃周之制也故越人取一寸九分為定式乃天九地十之義也

二難畫圖（此二難以下諸圖皆下注陽地）

凡此以下畫圖內黑白道以分陰陽終始其天門地戶人門鬼門是陰陽昇降關格門戶其氣口人迎左右神門是呼吸上下尺寸關格門戶。（原脫尺字非李駉某園可脫補）

陰氣始於立秋　陽氣始於立冬

陰氣終於立夏　陽氣終於立春

天地陰陽昇降始終之圖



手足陰陽流注始終之圖



尺寸陰陽隨呼吸出入上下始終圖



陰為裏隨呼至寸內
陽為表隨吸至尺外





此圖明其人迎氣口左右神門寸尺關前關後一分案素問云人迎氣口在頸法象天地要會始終之門戶

三難曰脈有大過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動（下條疑衍之當是）脈當見九分而浮過者法曰大過減者法曰不及遂上魚為溢為外關內格此陰乘之脈也

呂曰過者謂脈過九分出一寸名曰大過減者脈不及之脈也遂上魚者出一分至八分七分八分也此為不及之脈也遂上魚際也一名溢脈一名外關之脈一名內格之脈一名陰乘之脈一脈有四名也　丁曰大過者寸脈本浮又加實大是為陽大過也上魚者陰陽溢（按陰字疑當作為）浮而損小者是陽不及也陽不及則陰出乘之又名陰溢此者是外關內格　虞曰氣有餘脈乃大過氣不足脈乃不及外關則內脈不得出故曰不及亦曰陰乘脈內格則外脈不得入故曰大過亦曰溢脈下文關後之義反此言之也

關以後者陰之動也脈當見一寸而沈過者法曰大過減者法曰不及遂入尺為覆覆脈者脈從關至尺澤脈見一寸其餘伏行不見也今從關見至尺澤故言覆行也一名覆脈一名內關一名外格一名陽乘之脈也　丁曰大過呂曰過者謂脈出過一寸至一分二分三分四分五分此大過之脈也減者謂不滿一寸脈見八分七分或六分五分此為不及之脈遂入尺以言覆覆脈者脈從關至尺澤脈見一寸其餘伏行不見也今從關見至尺澤故言覆行也一名覆脈一名內關一名外格一名陽乘之脈也　丁曰大過者為尺脈本沈又加實大名曰陰太過沈之損小者是謂不及陰不及則陽入乘之此為陽覆又名內關外格也故曰覆溢是其真藏之脈人不病而死也

呂曰脈來見如此者此皆諸病相乘剋之脈非謂外邪中風傷寒之類脈已見人雖未病病即死不可治也　丁曰此者是自有追損使陰陽不守本位有此覆溢故形不病而死也　虞曰陰陽不相紊脈乃上魚入尺故曰覆溢之脈脈既覆溢此由關格所致本經曰關格者不得盡其命而死也不病亦死

三難畫圖

凡診脈於等後約文當拼三指頭指半指之前為寸外陽中之陽半指之後為寸內陽中之陰第二指半指前為關上陽半指後關下陰（按關本此下有半指之前尺外陽半指之後尺內陰十四字乃因下文而誤衍之當是）第三指半指之前為尺外陽陰寸外陽浮散寸內陰浮大關上陽弦長關下陰弦緊尺外陽沈滑尺內陰沈濇此左手脈之陰陽察其脈狀明其覆溢

夫夏至之後陰出二分故曰天關冬至之後陽入三分故曰地軸所以人之脈陰出陽入名曰關也其立夏陰氣乃終名曰地戶立冬陽氣乃終名曰天門其關格門戶是陰陽始終之要其過於本位應見而不見名曰不及不應見處而見名曰覆溢其關格覆溢是陰陽相勝皆當不病而死也







四難曰脈有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脈在中

呂曰心肺在膈上藏中之陽故呼其氣出腎肝在膈下藏中之陰故吸其氣入脾者中州主養四藏故曰呼吸以受穀氣　丁曰經言呼出者非氣自心肺而出也為腎肝在膈下主內因呼而出至心至肺故呼出心與肺也又心肺者在膈上主外故吸即隨陰而入至腎至肝故經曰呼者因陽出吸者隨陰入其呼吸陰陽相隨上下經歷五藏之間乃脾受穀味也又脾者主中州故言其脈在中也

浮者陽也

丁曰謂脈循行皮膚血脈之間在肌肉之上則名曰浮也　楊曰按之有餘舉之上故曰浮　虞曰陽象火而炎

沈者陰也

丁曰謂脈循行帖節輔骨名曰沈　楊曰按之有餘舉之不足故曰沈　虞曰陰象水而潤下故曰沈

故曰陰陽也心肺俱浮何以別之然浮而大散肺屬金其位居高短濇者肺也

丁曰心者南方火也故脈來浮而大散其大者是藏散者是府也肺者西方金也金主燥其脈浮濇而短短者藏也濇者府也　楊曰細而遲來往難且散或一止名曰濇也

虞曰心象火明蜀於外故浮大而散肺屬金其位居高故浮短而濇故曰心肺俱浮

腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也

丁曰肝者東方木也其脈牢而長牢者藏也長者府也

楊曰按之但覺堅極故曰牢　虞曰肝脈木根本生於地牢義可知枝葉長於天長理出此也

按之濇舉指來實者腎也

丁曰腎者北方木也主寒其性濡沈濡者藏也大而長微強按之乃濡水也　楊曰按之不足舉之有餘謂之濇之應指搖搖然者謂之實　虞曰火性外柔按之性內剛舉指來實則其義也

脾者中州故其脈在中

丁曰脾者中央土也能成養四傍故隨四時而見所以經不言脈之象也　楊曰脾王於季夏主養四藏其脈來大小浮沈故依四時王脈俱至四季一十八日即變竟緩是脾之王氣也上有心肺下有腎肝故曰在中也　虞曰上支言呼吸之間脾受穀味此言脾者中州其脈在中穀者肺部也如六菽之重與皮毛相得者心部也

各以其經所在名病逆順也

楊曰隨春夏秋冬觀其六脈之變則知病之逆順也

一陽三陰者謂脈來沈濇而短時一浮也

丁曰若有陽部見之此謂陰伏陽也

一陽二陰者謂脈來長而沈濇也

丁曰即乏血氣皆濇也

一陽二陰者謂脈來長而沈濇也

丁曰即乏血氣皆濇也

一陰二陽者謂脈來沈滑而長也

此脈見於陰部即是陽下乘於陰也

一陰三陽者謂脈來浮滑而長時一沈也

此者是陽伏於陰也

所言一陽一陰者謂脈來浮而濇也

丁曰浮濇者肺脈當見右手寸口即是本部之陰陽即順也若在左關病即是逆也

一陽一陰者謂脈來浮濇而短也

丁曰即是本部之陰陽即順也若在左尺而見此是腎與膀胱表裏順也若在左寸口即為病脈逆也

一陰一陽者謂脈來沈滑而長也

此脈見於陰部即是陽下乘於陰也

一陰三陽者謂脈來浮滑而長時一沈也

此者是陽伏於陰也

丁曰其脈若在左尺而見此是腎與膀胱表裏順也若在左寸口即為病脈逆也

皆依之故曰輕重也

六難曰脈有陰盛陽虛陽盛陰虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛實意也

呂曰陽脈是寸口本浮而實今輕手浮而得之更損減而小故曰陽虛重手按之沈反更實大沈者陰故言陰實也

丁曰陽脈本浮輕手而按其脈損至而小此是陽虛不足也陰脈本沈而濡今重手而按之損至而小是陰不足也陽脈本浮更加實大此是陽盛陰虛也素問曰諸浮者腎不足也　虞曰人之所稟者陰陽也陰陽平權衡等則無更虛更實之證今言盛與虛則為病之脈脈要精微論曰陰盛則夢涉大水恐懼陽盛則夢大火燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷夫如是可驗陰陽虛實之意也

七難曰經言少陽之至乍小乍大乍短乍長陽明之至浮大而短太陽之至洪大而長太陰之至緊大而長少陰之至緊細而微厥陰之至沈短而敦此六者是平脈耶將病脈耶然皆主脈也其氣以何月各主幾日然冬至之後得甲子少陰主復得甲子陽明主復得甲子太陽主復得甲子少陰主復得甲子厥陰主主各六十日六六三百六十日以成一歲此三陽三陰之主時日大要也

呂曰少陽主正月二月其氣尚微少故其脈來進退無常陽明主三月四月其氣始萌未盛故其脈來浮大而短也太陽主五月六月其氣太盛故其脈來洪大而長太陰主七月八月乘夏餘陽陰氣未盛故其脈來緊大而長少陰主九月十月陽氣衰而陰氣盛故其脈來緊細而微也厥陰主十一月十二月陰氣盛極故言厥陰其脈來沈短而敦敦者沈重也四時經一陰一陽八主此難經三陰三陽在前其主所以不同者其移各異也難經謂從正月至六月春夏半歲浮陽用事故言三陽主在前從七月至十二月秋冬半歲沈陰用事故言三陰在後謂四時陰陽夫婦之主也　丁曰夫三陰三陽之氣主隨六甲以言之此法是按黃帝六節藏象論云天以六六之節成一歲其甲子或在小寒之初或在大寒之後所以少陽之氣未出陰分故其脈乍大乍小乍短乍長也復得甲子陽明主其陽明之至浮大而短為二之氣其後始暄其氣未盛是故陽坎卦坎主子位所以元氣起於子也腎者水也黃庭經云是水之精坎之氣今言兩腎之間即人之原氣也備土云氣盛陽之分故太陽之至洪大而長也太陰之至緊大而長復得甲子為四之氣暑濕之分秋氣始生乘夏餘陽故太陰之至緊大而長也少陰之至緊細而微復得甲子為五之氣清切之分故少陰之至緊細而微也（按此兩字原本誤在下文水疑二字下今移正）厥陰之至沈短而敦復得甲子為終之氣盛陰之分水疑如石故厥陰之至沈短而敦也此三陰三陽之脈主隨六甲之日數故有此六脈之狀是謂平脈也

八難曰寸口脈平而死者何謂也然諸十二經脈者皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六府之本十二經之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神故氣者人之根也今寸口傳受穀氣其脈平而死者生氣獨絕於內也　呂曰寸口脈平而死者非應四時脈其脈狀若平和也又曰十二經脈者人之根本也今寸口傳受穀氣其脈憑此而生乃曰十二經之根也但平和柔人之生氣之原已絕於兩腎之間則十二經無所相依據雖寸脈平和人當死矣所以喻木之無根本也腎者足少陰之經也左為腎右曰命門命門有穴在背十四椎節下又有志室二穴在十四椎節下兩傍各三寸有神守於命門不令邪入志室邪入志室人則死矣

九難曰何以別知藏府之病耶然數者府也遲者藏也楊曰去來急促一息過五至名數也呼吸三至去來極遲故曰遲也

數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒故以別知藏府之病也

呂曰府者陽故其脈數藏者陰故其脈來遲　楊曰陽脈行疾故病乃數陰脈行遲故病乃遲此直云病在藏府不顯其名則病莫知雅的若數而弦者病在膽遲而弦者病在肝餘藏府悉依本狀而遲數皆倣此也　虞曰陽氣亂則數陰氣虛則遲則知藏府有寒熱之證也　丁曰脈者計於漏刻其春秋二分晝夜五十刻則陰陽俱等故得平和冬夏二至晝夜不等夏至之前晝六十刻故六十為數（按六十數疑作六至）故數則為熱冬至之前夜加六十刻故陰多陽少是為寒矣陰陽漏刻可定人自有損益故遲數有加所以經云諸陽為熱諸陰為寒

十難曰一脈為十變者何謂也然五邪剛柔相逢之意也假令心脈急甚者肝邪干心也

呂曰夏心主脈見浮大而散今反弦弦者肝脈來干心也人之坊受父母之原氣也腎者北方子之正位故聖人云元氣起於子子者坎之方位坎者即父母之元氣也謂敢為天為父坤為地　丁今坎之初六六三乃坤之初六六三也坎之九二乾之九二也謂乾坤交於六三九二而成坎卦坎主子位所以元氣起於子也腎者水也黃庭經云是水之精坎之氣今言兩腎之間即人之原氣也備土云腎間曰丹田亦曰隱海中有神龜呼吸原氣故曰呼吸之門也人之三焦法天地三元之氣故曰三焦之原十二經脈憑此而生乃曰十二經之根也但平和柔人之生氣之原已絕於兩腎之間則十二經無所相依據雖寸脈平和人當死矣所以喻木之無根本也腎者足少陰之經也左為腎右曰命門命門有穴在背十四椎節下兩傍各三寸有神守於命門不令邪入志室人則死矣

虞曰陽干於陽陰干於陰同氣相求也

心脈大甚者心邪自干心也

呂曰心脈雖洪大當以胃氣爲本今無胃甚（按甚字當作氣）故其脈大甚也此爲心自病故言自干心也　虞曰此失時脈也

心脈微大者小腸邪自干小腸也

呂曰小腸心之府微大者其脈小爲小腸自病故言自干也　虞曰小腸太陽脈也王於五六月其脈洪大而長今得之微大是知小腸之邪自干小腸也此曰正經自病法曰正邪故云自干也

心脈緩甚者脾邪干心也

呂曰緩者脾脈乘心故令心脈緩也　虞曰心脈見緩甚此曰子之乘母法曰實邪

心脈微緩者胃邪干小腸也

呂曰胃脈小緩見於心部小腸心府故言干之　虞曰於心部中輕手得之小緩是也

心脈濇甚者肺邪干心也

呂曰濇肺脈故言干心也　虞曰金反凌火此曰微邪脈也

心脈微濇者大腸邪干小腸也

呂曰微濇大腸脈小腸心府故曰干也

心脈沈甚者腎邪干心也

呂曰沉者腎脈故言干也　虞曰心火炎上其脈本浮今見沉形水來剋火法曰賊邪也

心脈微沉者膀胱邪干小腸也

呂曰微沈者膀胱脈也小腸心府故言干也

五藏各有剛柔邪故令一脈輒變爲十也

呂曰此皆夏王之時心脈見如此者爲失時脈　楊曰剛柔陰陽也邪者不正之名非有身王氣而水來干身爲病者通謂之邪也　虞曰推此十變之候乃五行勝復相加故聖人謂之五邪也五藏各有表裏更相乘之一脈成十故十變也有陽有陰故曰剛柔也於本位見他脈故曰相逢干也聖人乃以心一藏爲例其餘皆可知也　丁曰其言肝邪干心膽邪干小腸者此皆虛邪干心也心邪自干心小腸邪自干小腸者此皆正邪也脾邪干心胃邪干小腸者此皆虛邪干心大腸邪干小腸者此皆賊邪也所謂剛柔相逢者則十雜也其十雜者甲與己合甲爲剛己爲柔戊與癸合戊爲剛癸爲柔丁與壬合丁爲剛壬爲柔丙與辛合丙爲剛辛爲柔乙與庚合乙爲剛庚爲柔凡剛柔相逢爲病者剛甚則爲病重柔甚則爲病微柔逢剛謂從所勝於柔故爲病微不勝於剛故爲病甚也剛逢柔謂從所勝於柔故爲病微也其一脈十變之法是師引此一部之中二經說此五邪相干爲之十變凡兩手三部各有二經六部之中二經六部之內各有五邪十變也故從其首計其數六部十變是也故曰十一難曰經言脈不滿五十動而一止呂曰經言一藏五十動五藏二百五十動謂之平脈不滿五十動者無有五十動也是以一藏無氣者何藏也然人吸者懸陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肝而還故知一藏無氣者腎氣先盡也

楊曰按經言持其脈口數其至也五十動而一代者五藏皆受氣是爲平和無病之人矣四十動而一代者四藏無氣四歲死三十動而一代者二藏無氣二歲死十動而一代者三藏無氣二歲死十動而一代者五藏無氣也七日死難經言止本經言代按止者按之覺於指下而中止名止代者還尺中停久方來名曰代也止代雖兩經不同據其脈狀亦不殊別故兩存之　虞曰此與第八難生氣獨絕之義略相似八難言父母生氣源已絕於兩腎之間故云死也此言一藏無氣言呼吸之間肺行穀氣腎間父母之原氣亦無穀氣所養原氣漸耗乃知四歲必死故云腎氣先盡也

丁曰五十動者是天地陰陽以漏刻爲制度人之脈息爲自有損益故無常數其益過於大十心肺有餘也心肺有餘則腎肝不足也其損者不及四十之數則心肺不足乃謂吸不能至腎至肝而還此是陽不榮於下故腎氣先絕也絕則止也此法又與生氣獨絕於內同法也

十二難曰經言五藏脈已絕於內用鍼者反實其外五藏脈已絕於外用鍼者反實其內內外之絕何以別之然五藏脈已絕於內者腎肝氣已絕於內也而醫反補其心肺五藏脈已絕於外者其心肺脈已絕於外也（別本無其字與上文一例）而醫反補其腎肝陽絕陰陰絕補陽是謂實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳

呂曰心肺所以在外者其藏在隔上上氣外爲榮衛浮行皮膚血脈之中故言絕於外也腎肝所以在內者其藏在隔下氣內養筋骨故言絕於內也　丁曰夫五藏內外者爲心肺在隔上通於天氣也心主於脈肺主於氣外華榮於皮膚故言外也腎肝在下通於地氣以藏精血最於骨髓心肺外絕則皮槁毛落腎肝內絕則骨痿筋緩診其脈孚者不能明於內外虛實致使鍼藥誤投所以實虛虛損不足益有餘如此死者是醫殺之耳

釋音

一難　榮衛上于平聲　二難際音祭者也畫祓畫　乘食陵切也　滿孔充切下同　三難覆芳福切反復也　四難別之丁滅切反　五難栽音災　六難沈持林反　七難敦都昆反厚也　八難堂音衡　九難數色角切　十難緩音換

十三難曰經言見其色而不得其脈反得相勝之脈者即死得相生之脈者病即自已色之與脈當參相應為之柰何然五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脈當弦而急

呂曰色青肝也弦急者肝脈是謂相應也　虞曰色青脈弦中外相應也素問曰肝部在目下於此視色以參脈證

色赤其脈浮大而散

呂曰色赤心也浮大而散心脈也是謂相應　虞曰色赤脈大色脈相應也素問曰心部在口視色合脈

色黃其脈中緩而大

呂曰色黃者脾也中緩而大脾脈也　虞曰此色脈相應也素問曰脾部在脣色見於其中以應脈狀

色白其脈浮濇而短

呂曰白者肺也浮濇而短肺脈也　虞曰肺部見於鼻兩眉上也

色黑其脈沈濇而滑

呂曰色黑者腎色也腎主水水性沈腎亦在五藏之下故其脈沈濇而滑　虞曰腎色之見於肌皮在面取其地閣此所謂五色之與脈當參相應也

呂曰此正經自病不中他邪故也　虞曰謂應本經虛實之證也　丁曰經言色青脈弦而急色赤脈浮而散色黃脈中緩而大色白脈浮濇而短色黑脈沈濇而滑此是五藏色脈相則所以言當參相應也

脈滑尺之皮膚亦滑

丁曰腎主水其脈滑所以臂內皮膚亦滑也此五者皮膚滑濇急緩數又與色脈參同也　呂曰此謂陰陽藏府浮沈滑濇相應也

五藏各有聲色臭味當與寸口尺內相應

丁曰其言相應者脈數色赤皮膚熱此是心之一藏色脈皮膚參相應也脈急色青皮膚經絡堅急而青此是肝之一藏色脈皮膚參相應也脈緩色黃皮膚緩此是脾之一藏色脈皮膚參相應也脈濇色白皮膚濇此是肺之一藏色脈皮膚參相應也脈滑色黑皮膚滑此是腎之一藏色脈皮膚參相應也凡診脈者先須循臂之內外然後診脈視色也　虞曰肝脈弦其色青其聲呼其臭臊其味酸心脈洪其色赤其聲笑其臭焦其味苦脾脈緩其色黃其聲歌其臭香其味甘肺脈濇其色白其聲哭其臭腥其味辛腎脈沈其色黑其聲呻其臭腐其味鹹此謂相應也

其不相應者病也

虞曰相應謂正經自病也假令肝病脈弦色青多呼好搐喜酸此自病也不相應者乃如下說假令肝病脈濇色白多哭好腥喜辛此曰相反聲色臭味皆見肺之證候金之賊木此曰賊邪不相應必死也

假令色青其脈浮濇而短若大而緩為相勝浮大而散若小而滑為相生也

呂曰色青者肝也浮濇而短者肺也肺勝肝為賊邪若大而緩為脾脈也肝勝脾故言相勝也浮大而散心脈也心為肝之子若小而滑腎脈也腎為肝之母肝為腎之子子母相生故為相生也　丁曰經引肝之一藏其脈當弦急其色當青即為順也色青脈濇者逆也脈若大而緩是肝勝於脾也其病甚故云相勝若脈浮大而散若小而滑是為相生也

經言知一為下工知二為中工知三為上工上工者十全九中工者十全八下工者十全六此之謂也

呂曰五藏一病輒有五今經載庶家一藏為例耳解一藏

爲下工解二藏爲中工（按史記並兼三解五藏爲上工引此文二作三）丁曰上工者謂全知色脈皮膚三法相生相勝本始故治病十全其九中工知二謂不能全收故治病可十全得六也下工知一謂不解明於全法一心治已病故十全得六也虞曰工者萬學爲醫者窮雜經察脈之浮沈藏府虛實通素問知經脈往來針之補瀉窮本草識藥之寒溫氣味所歸全此三家然後治病可曰知三爲上工也醫不三世不服其藥謂非工也素問曰五藏之氣可以類推五藏相錯可以意識此可曰工也

十四難曰脈有損至何謂也然至之脈一呼再至曰平呂曰平者謂平調之脈也丁曰平者無過之脈也虞曰經言一呼再曰人之呼吸曰陰陽也一呼一吸謂之一息經言一呼再至一吸再至謂之平脈也人呼吸法陰陽一息法一年一息脈動四至四至法四時一呼脈行三寸一吸脈行三寸法三陰故曰平也

三至曰離經

呂曰經言再至曰平三至曰離經不如經言也其人必病丁曰謂加於陰之二倍故曰離經　虞曰經者常也謂脈離常經之所細而言之人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸一日一夜一萬三千五百息脈行八百一十丈乃爲一周復從始起之經再行今一呼脈三至脈行四寸半一息脈行九寸二半脈不在所起之經再起故曰離經也率一例以擬之如人一日周行百里都從初行之處再行曰平今一日却一百五十里過於五十里不在周而復始之處再行故曰離經也

四至曰奪精

呂曰其人病困奪精者臭自髀口精候色奪診見也　丁曰謂加於陰四倍故曰奪精　虞曰經者常也謂脈行三寸一呼脈行三寸一吸脈行三寸一息脈行九寸二日一夜息數乃行兩奪精之脈一息行一尺二寸此乃一日一夜脈度數尺寸脈諸夫爲數脈者陽氣亂況陽爲病頗亦狂言顏色恍懼（按懼呂氏言臭自髀口精候色奪者非也夫人納五味味歸形形歸氣氣歸精精化爲血以榮五藏六府也榮於五藏六府乃復出行於陰陽與天地同流精神魂魄不離守位因而和之是謂天道氣亂故脈數數則氣耗耗則精無所歸猶如奪去故曰奪精如人一日行一百里今一日行二百里氣疲乏則耗也）

五至曰死

呂曰其人病證候已見脈復加一至定當死也　虞曰此比平脈一倍過半四至已是奪精五至其死明矣　丁曰爲加於陰六倍故曰死也

六至曰命絕此死之脈

呂曰不出日死　虞曰五至死之漸也六至令死矣此言死之脈也（按脈本此下誤衍必是言至之脈也七字今刪之）必是言至之脈恐寫之誤可合下文（似有脫字）何謂損一呼一至曰離經

丁曰爲陰加於陽四倍也　虞曰前之至脈離經謂脈行過半此之損脈離經謂脈行減半以下吸養於呼也

二呼一至曰奪精

丁曰謂陰加於陽六倍也　虞曰平人脈一日一夜五十周身今二呼而脈一至一日一夜不及一十三周身脈只行及二百二丈五尺其人氣耗血枯神慘色夭精華猶如奪去

三呼一至曰死

虞曰平人之脈三呼脈六至一日一夜八百一十丈無危今三呼脈一至脈只行一寸半一日一夜只行及六十七丈五尺不及五周身（按此數誤當云行一百丈不及九周身）氣血已虛藏敗神去故命絕也

四呼一至曰命絕此謂損之脈也

虞曰四呼當八至今四呼脈一至一日一夜不及四周身（按當云不及七周身）如此之候至脈從下上損脈從上下也

呂曰至脈從下上者謂脈動稍增上至寸口脈從上下者謂脈動稍減至一呼多而至少也

損脈之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落

虞曰一損損肺肺主皮毛故皮聚而毛落也

二損損於血脈血脈虛少不能榮於五藏六府也（按藏府無也字）

虞曰二損損血脈是知心受之心主血今則心血枯不能榮於五藏六府也

三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不爲肌膚

虞曰脈之三損損於脾脾者受納五味以化生五氣藏府以長肌膚今既損故味不化則肌肉消瘦也

四損損於筋筋緩不能自收持

虞曰四損損肝病乃如是素問曰其有傷筋縱若其不容容不收持也

五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至於收病也

虞曰今之五損損於腎腎主骨故骨痿不能起於牀素問曰腎熱則腰脊不舉骨枯髓減發爲骨痿痿不能起於牀者無力也

呂曰收者取也經但載損家病不載至家病至家者諸陽六府病六府病苦頭痛身熱忽特不利與損家病異今反載損家病證故損脈於此受病非是至家病也

從上下者骨痿不能起於牀者死

呂曰從肺損至骨五藏俱盡故死肺在上也　虞曰至此推窮損家病證一損肺二損心三損脾四損肝五損腎乃如第五難脈輕重菽數下損之腎也

從下上者皮聚而毛落者死

呂曰從腎損之肺亦復五藏俱盡故死也此是損家病證非至家病證故在下也

治損之法奈何然損其肺者益其氣

呂曰肺主氣今損故當以鍼藥益其氣也　丁曰肺者主其氣故損即補之以鍼藥益其氣也

辛味佐不足即是益其氣也

損其心者調其榮衛

呂曰心者榮衛之本今損當以鍼藥調之　丁曰心者主榮衛故損即補之以針補其手少陰經中井手厥陰經中井是其母手少衝手中衝亦是其母以苦味佐之此調其榮衛之現也　虞曰心主血血爲憂愁思慮傷於心因茲致損凡人血流據氣氣動依血宣調榮衛節憂愁思慮以治之

損其脾者調其飲食適寒溫○按本遞下有其字與上句一例
呂曰脾主飲食今其氣衰損穀不消化故當調適寒溫也
丁曰脾損則調其飲食適其寒溫調脾生意思故順其意思飲食適其寒溫也　虞曰脾化水穀以生氣血今見脾損飲食不為肌肉宜調節飲食無令傷脾也適其寒溫者啟玄子謂春涼食夏兮食秋溫食冬熱食也本經曰飲食勞倦傷脾也

損其肝者緩其中
呂曰肝主怒其氣急故以緩藥以緩其中　丁曰肝主怒以甘緩其中以土味和其肝當補足厥陰合曲泉穴是也　虞曰怒則氣逆脈乃強急以憑方術以緩其中素問曰肝苦急急食甘以緩之又曰宜食甘粳米生肉棗葵味皆甘甘性緩也

損其腎者益其精此治損之法也
呂曰腎主精今損故以針藥補益其精氣　丁曰益其精者以鹹味補之當補足少陰經中復溜穴是其母也　虞曰極大陽大盛必滅極小陰水弱必竭故曰難治
曰耗周過多○按周字當作用而致損腎宜憑鹹味以補精華

脈有一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至為適得病
至一吸四至有一呼五至一吸五至有一呼六至一吸六至有呼吸再至
虞曰此重明前之至脈病證乃如後說

有一呼一至一吸一至有再呼一至再吸一至有呼吸再至○按此五字疑衍
虞曰此重明損脈輕重生死當如後說

脈來如此何以別知其病也然脈來一呼再至一呼三至一呼四至有一呼五至一呼六至為死脈
虞曰脈三至曰離經反於常經知病始得

前大後小卽頭痛目眩
虞曰病在三陽

前小後大卽胸滿短氣
丁曰前大者為寸外大也後小者寸內小也寸前大則頭痛目眩寸後大者胸滿短氣經言寸部法天主胸以上至頭有疾故也　虞曰病在三陰
一呼四至一吸四至病欲甚

虞曰脈病反常經法曰奪精之脈脈大法曰渾渾革至如
涌泉者病進欲甚之理明也

脈洪大者苦煩滿
虞曰病在三陽陽盛煩滿

沈細者腹中痛
虞曰病在三陰陰主於內故腹中病也

滑者傷熱
虞曰脈動如徐前却流利替替然熱盛於氣其脈滑也

滑者中霧露
虞曰滿脈狀如刀刮竹寒盛於血故脈乃滿也

一呼五至一吸五至其人當困
虞曰脈一息十至氣血勞走不困受為生死如下說

沈細夜加浮大晝加
虞曰陰脈細沉夜加可驗陽脈浮大晝甚可加○按此加字當作卻

不大不小雖困可治其有大小者為難治
虞曰極大陽大盛必滅極小陰水弱必竭故曰難治

一呼六至一吸六至為死脈也
虞曰三倍於常陽氣亂極故曰死也

沉細夜死
虞曰陰絕使然

浮大晝死
虞曰陽絕如是

一呼一至一吸一至名曰損
虞曰此損至雖經之脈證

人雖能行猶當著床所以然者血氣皆不足故也再呼一至呼吸再至○按此句當云再吸一至名曰無魂無魂者當死也人雖能行名曰行尸
虞曰尊此至數與前表相違亦熱錯簡也魂屬陽陽主生

上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無能為害也所以然者譬如人之有尺樹之有根○按二字當在有尺下枝葉雖枯橫根本將自生脈有根本人有元氣故知不死

丁曰經言脈有從上下者是謂五藏之氣不相榮養致令有此損至也五藏之氣隨呼吸上下遞相榮養其心肺主氣脈則隨呼而榮其腎肝其吸不能至腎至肝者蓋腎先損則病骨痿也其腎肝不榮於上故先病其肺病則皮毛落也其損甚者皆死一呼再至曰平一呼三至卽是陽加於陰二倍也適得病也其脈洪大曰離經前大者謂寸外大也後大者寸內大也前大後小則頭痛目眩前小後大卽胸滿短氣經曰上部法天以候胸以上至頭素問曰寸外以前主頭角耳目寸內以後主胸中膈以上主膈下脇傍膈內以後主腹中尺外以前主臍下尺內以後主足下凡左右有此大小雖部言之一呼四至謂陽氣加陰四倍故曰奪精也

二呼一至者是陰加於陽四倍亦曰奪精其浮大者陽病甚苦煩滿也加於滑者傷於熱極也其沉細者陰病甚所以腹中痛也加於濇者中霧露所作也一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至為死脈也其沉細者陰病甚至沈細則夜甚浮大則晝甚其有內外大小者遊魂也此不可療其數至愈增愈減者死上部有脈下部無脈其人自當發吐其不吐是氣獨絕於內也上部無脈下部有脈雖困無能為害者謂神不守也○按不字當作卻神昏如魚掉尾者死　楊曰上部寸口下部尺中也

丈母之元氣也

十五難曰經言春脈弦夏脈鉤秋脈毛冬脈石是王脈耶將病脈也然弦鉤毛石者四時之脈也春脈弦者肝東方木也萬物始生未有枝葉故其脈之來濡弱而長故曰弦

呂曰春萬物始生未有枝葉形狀正直如弦弦法之也

丁曰春脈弦者微弦曰平平者謂有胃氣胃土也能成於四方間於四旁故四時脈見弦鉤毛石皆當微見卽是有胃氣也但獨見四時之脈者皆無胃氣也

夏脈鉤者心南方火也萬物之所盛垂枝布葉皆下曲如鉤故其脈之來疾去遲故曰鉤

呂曰心脈法火曲如鉤又陽盛其脈來疾陰虛脈去遲也脈從下上至寸口疾還尺中遲寸口滑不洩故令其脈環曲如鉤

秋脈毛者肺西方金也萬物之所終草木華葉皆秋而落其枝獨在若毫毛也故其脈之來輕虛以浮故曰毛
呂曰肺浮在上其氣主皮毛故令其脈浮如毛也
冬脈石者腎北方水也萬物之所藏也盛冬之時水凝如石故其脈之來沉濡而滑故曰石
呂曰腎脈法水水疑如石又伏行溫於骨體故其脈實牢如石也
此四時之脈也如有變奈何然春脈弦反者為病何謂反
丁曰反者為見秋脈如毛是謂肝病
然其氣來實強是謂太過病在外
呂曰實強者陽氣盛也少陽當微弱今更實強謂太過陽主表故令其病在外也　丁曰病在外者是少陽其脈微弦今實強者是膽有餘面青好怒是肝木之外證也
氣來虛微是謂不及病在內
呂曰厥陰之氣養於筋其脈弦今更虛微故曰不及陰處中故令其病在內　丁曰病在內者肝不足也肝含血養筋不足則筋緩溲便難是肝之內證也　虞曰太過之脈謂不至而至不及之脈謂脈息虛微太過眩冒頭疾其不及則令人胸痛引背下則兩脇脹滿也
氣來厥厥辟辟如循榆葉曰平
呂曰春少陰厥陰俱合主其脈之來如春風吹榆葉濡弱而調故曰平脈也
益實而滑如循長竿曰病
呂曰此謂弦多胃氣少也　丁曰長而不軟故為病也
急而勁益強如新張弓弦曰死
呂曰此謂但弦無胃氣也　丁曰謂強急而緊細故曰如新張弓弦也
春脈微弦曰平弦多胃氣少曰病但弦無胃氣曰死春以胃氣為本
呂曰胃主水穀故人稟胃氣　丁曰胃者水穀之海五藏皆受氣於穀胃者主稟四方故以胃氣而為本也（○按而字疑衍）

丁曰謂脈來石滑如冬之脈故曰反
然其氣來實強是謂太過病在外
呂曰實強者太陽受氣盛也太陽者浮散今反實強故曰太過也　丁曰其外者太陽小腸為府故病在外其面赤喜笑是心火之外證也
氣來虛微是謂不及病在內
呂曰手少陰主血脈其氣尚平實今反見虛微故曰不及也　丁曰少陰心夏盛王今反虛微是謂不及不及則病在內喜笑其神不守　虞曰少陰心脈本平實今反虛微故曰不及也太陽小腸脈本浮大今反實強曰太過也其病太過不及之證乃如下說玉機真藏論曰夏脈太過令人身熱而膚痛為浸淫其不及者令人煩心上見咳噦下為氣洩也
其脈來累累如環如循琅玕曰平
呂曰心滿實累累如人指循琅玕者是金銀鋼鈿之物勁也此皆實之類也故云平　丁曰言心脈滿實累累如連珠其言循琅玕者謂琅玕是玉與珠類實如環之象也
來而益數如雞舉足者曰病
呂曰心脈但當浮散不當數也雞舉足者喻其數也　丁曰心脈但當浮散今又加其至數即病故喻其脈如雞舉足走也
前曲後居如操帶鉤曰死
呂曰後居謂之後頓如人革帶之鉤前曲無胃氣　丁曰操者執也如手執革帶前鉤曲後居居而不動動有故曰死也
夏脈微鉤曰平鉤多胃氣少曰病但鉤無胃氣曰死夏以胃氣為本
呂曰胃者中州主養於四藏也
秋脈微毛反者為病何謂反然氣來實強是謂太過病在外　丁曰外者肺脉者當微毛今更實強故曰病在外也
呂曰肺脉者當微毛今更實強故曰病在外　丁曰外者謂手陽明太陰也故外證面白善嚏悲愁不樂皮毛乾燥氣來虛微是謂不及病在內
呂曰上大者足太陽下兌者足少陰陰陽得所為胃氣強

故謂之平雀啄謂本大末兌也　丁曰腎脈本性濡滑今診之應手而大去而小故曰上大下兌喻如雀啄是謂平也

啄啄連屬其中微曲曰病

呂曰啄啄者不息故謂之連屬其中微曲是脾來乘腎脈緩而曲故病　丁曰啄啄謂如雀啄啄連連時止腎衰之病也

來如解索去如彈石曰死

呂曰解索謂虛緩無根本也來連去疾故曰彈石是腎死曰診之應手如脫解之索無力也去疾而如彈石之堅也

本脈微石曰平石多胃氣少曰病但石無胃氣曰死冬以胃氣爲本胃者水穀之海也主稟四時故皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會也

虞曰胃屬土土者五也萬物歸之故曰水穀之海一年王辰戌丑未故曰主稟四時謂弦鉤毛石四時之經皆得胃氣爲本若胃氣少則人病若無胃氣則人死故曰四時變病死生之要會也萬物非土孕育則形質不成也易曰坤厚載物德合無疆

脾者中州也其平和不可得見衰乃見耳來如雀之啄如水之下漏是脾之衰見也

呂曰脾寄王四季故不言王言平和脈不見其衰病見其脈見如屋之漏如雀之啄如水之下漏皆腎來乘脾故使衰病肝乘脾則死腎不勝脾故但病也　丁曰脾者成於四方故平常不見衰乃見如雀之啄如水之漏　虞曰如水之漏乃是脾脈太過如雀之啄是謂脾脈不及太過則令人四支不舉不及則令人九竅不通故平和不可得見衰乃見也

十六難曰脈有三部九候

呂曰三部者寸關尺也九候者上部三候中部三候下部三候也是一難之所演也　丁曰三部者寸關尺也九候者浮中沉也是一難之所演也　虞曰三部法三才故有天地人三部之中亦各有天地人因而成九上部天以候頭角上部之人以候耳目上部之地以候口齒中部之天以候胸中部之人以候心中部之地以候胸中之氣下部之天以候肝下部之人以候脾胃下部之地以候腎故曰三部九候也

有陰陽

呂曰寸口者陽脈見九分而浮尺部者陰脈見一寸而沉

丁曰陰陽者是二難尺寸皆陰陽前後上下之法也

虞曰三部之中各有一陰一陽來者爲陽去者爲陰察陽者知病之所有察陰者知死生之期也

有輕重

呂曰肺如三菽之重是謂輕腎脈按之至骨如十五菽之重是謂重也　丁曰輕重者是五難言輕重之法也　虞曰凡切陽脈乃輕手取謂陽脈浮也切陰脈乃重手取謂陰脈沉也故曰輕重也

有六十首

呂曰首頭首也益三部從頭者脈亂有六十首者是十難經一脈變爲四時是也謂春脈弦夏脈鉤秋脈毛冬脈石季夏及四季脈緩逐四時之休王一脈變爲五十二經內成六十首也

脈變爲四時

呂曰是手太陰之動以決四時逆順吉凶之法也　丁曰是十五難是言四時以胃氣爲本況經脈十二經謂脈隨四時之變換非手太陰也　虞曰凡切脈始起於六脈謂浮沈長短滑濇也乃三陰三陽之脈也六脈趨四時之變故有二十四脈形焉今六十首乃備言手足三陰三陽之脈變爲十二脈隨弦鉤毛石變之爲時經合之爲六十脈故曰一脈變爲四時

離聖久遠各自是其法何以別之

呂曰言三部是一法九候是一法陰陽是一法六十首是一法言法象無多難可分別故言之此難也　丁曰離聖人久遠者爲越人時去聖逾遠也各自是其法者爲前所演其法也故曰各自是其法也

然是其病有內外證

呂曰法象無多或變爲四時難可分別故以名之難也　丁曰是字當作視物之視上文言視病之法不與診法同故云別也然字者是越人自答之語也言使人視其精明五色循按察之左右即知內外之證故是字當作視物字用此是字傳寫之錯誤也　虞曰一藏一府乃一表一裏府之病主於外故有外證藏之病主於內故有內證也

其病爲之奈何然假令得肝脈

虞曰肝脈弦軟而長

其外證善潔面青善怒

足少陽屬膽府也故有病則見於外也又膽爲清淨之府故善潔也主於外見面青也又膽爲中正之官主決斷故善怒也

其內證奈左有動氣按之牢若痛

虞曰五積之候肝之積名曰肥氣在齊之左也

其病四肢滿閉

虞曰肝木脾土脾主四肢木病則土無所長故四肢閉滿

玉機真藏論曰脾太過令人四肢不舉

其內證奈左有動氣按之牢若痛

丁曰肝者東方木也其治在左應震齊左有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉者謂支節攣蹙也淋溲便難者足厥陰上係舌本下環於陰器故淋溲便難也其轉筋者謂肝含血以養筋故病即轉筋也有此內外證即肝也非也　虞曰癃溲謂小府溢也便難大府所注難也謂肝脈循於陰器故癃溲也肝腎主下部肝病則氣逆不行於下故便難也肝屬木也木曰曲直筋乃象之今肝病故轉筋也　呂曰外證者府之候膽者清淨之府故面青善潔若衣被飲食不潔者其人便欲怒膽色青故面青怒也（此怒字貝旁）　其內證者肝之證肝者東方爲青龍在左方故肝之證在齊左

假令得心脈其外證面赤口乾喜笑

丁曰外證者手太陽之脈爲外經故有病即見於外其應

火故病即外熱口乾喜笑是其外證也　虞曰心脈浮大而散心屬火火性炎上故面赤口乾也心在聲為笑也

其內證齊上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而唾有是者心也無是者非也

丁曰心者南方火也其位在離故齊上有動氣其病煩心心痛掌中熱而唾者心病即煩痛故唾譬內掌中熱而唾者是其內證也有其證者心之病無其證者即非也　虞曰心之積名曰伏梁在齊上火之生熱心為五藏之君四藏有病心主知之尚有痛狀何況本經自病耶常痛乃心包脈也正心不受病病則旦占夕死重明受病則心包絡乃手厥陰之脈出兩手中指之端不入掌心屈名指取之穴名勞宮穴心包病則掌中熱而唾心外證者小腸手太陽脈為熱故令口乾陽主驚故喜笑也其內證者心心在前為朱雀故證在齊上也

假令得脾脈

虞曰脾脈中緩而大

其外證面黃善噫

丁曰其外證面黃陽明為胃之經故見色黃外之證也

虞曰脾土也在經動為噫

善思

虞曰脾者在志為思也

善味

虞曰脾主甘受味故善味

其內證當齊有動氣按之牢若痛

虞曰脾之積名曰痞氣當齊之中

其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也

丁曰內證者足太陰脾也當齊有動氣者脾主中州也其病腹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收皆為土土靜故有此證前注言外證面黃而不解餘說者為善噫善味者是脾也今腹脹滿食不消即是胃也胃為水穀之海病即食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收皆是見外證也今卻言內證也此經所說文至不明未敢妄注其說以俟後賢　虞曰濕氣勝則令人彭脹陽氣在下食乃不消得主內病則如是脾屬土土性安靜故知是土主四肢病乃四肢不收　呂曰外證足陽明胃脈之證胃氣實穀氣消即多所思欲飲食胃氣虛食不消氣力虛贏其人感思慮內證者脾也脾在中央故證當齊齊者又陰陽之中故其脈在脾也

假令得肺脈

其外證面白善噫悲愁不樂欲哭

丁曰其外證者手陽明之經大腸為肺之府也故善噫悲愁不樂欲哭此外之證也　虞曰肺脈浮短而澀面白乃金之色也肺主皮毛皮毛外感寒內合於肺故噫也悲者肺之志也脾土肺金脾為肺母脾主歌乎病母憂故不樂在聲為哭

其內證齊右有動氣按之牢若痛其病喘欬洒淅寒熱有是者肺也無是者非也

丁曰其言內證者手太陰之經應西方金在兌故言齊右有動氣也其為喘欬洒淅寒熱者故知內證也　虞曰肺之積名曰息賁在右脇下肺主皮毛今寒氣外感於皮毛肺虛內合於肺則氣道澀故喘而欬肺主氣外候於皮毛肺虛則洒淅寒肺實則熱而悶故云寒熱也

腸脈也乃手陽明之脈為肺之府氣通於鼻故善噫肺主秋秋愁也故其病悲哭內證者肺之證洒淅欬噫肺在西方為白虎主右方故證在齊右

假令得腎脈其外證面黑喜恐欠

丁曰其外證者太陽膀胱之經故為外經也故有病則色黑面黑喜恐欠也　虞曰沉濡而滑腎之脈也黑色腎之色也在志曰恐巨陽虛則欠

其內證齊下有動氣按之牢若痛

虞曰腎之積名曰賁豚在齊下故云在齊下

其病逆氣少腹急痛泄如下重足脛寒而逆有是者腎也無是者非也

丁曰其內證者腎王於冬應北方故在齊之下也其病逆氣少腹急痛泄如下重其泄者為大痕泄而裏急後重也此內之證也　虞曰腎氣不足傷於衝脈故氣逆腎者足少陰之脈循少腹與足厥陰足太陰三陰交於齊下令病故少腹急痛也五泄之候腎為後重泄腎者胃之關令氣虛故為下重泄謂食畢思急圊足內踝上五寸間乃足少陰之動脈故足脛寒而逆逆訖虛實論曰氣逆者足寒也

呂曰外證足太陽膀胱脈也其人善欠者其人善惡寒若腿寒身體漉漉而寒故其善欠（楊注其宜作宜）腎與手少陽俱主候心故善恐其內證者取其形見於外也呂氏所注多不該經旨

假令得肝脈

其內證齊右有動氣按之牢若痛其病喘欬洒淅寒熱有是者肝也無是者非也

丁曰其言內證者手太陰之經應西方金在兌故言齊右有動氣也其為喘欬洒淅寒熱者故知內證也　虞曰肺之積名曰息賁在右脇下肺主皮毛今寒氣外感於皮毛肺虛內合於肺則氣道澀故喘而欬肺主氣外候於皮毛肺虛則洒淅寒肺實則熱而悶故云寒熱也

肺脈也乃手陽明之脈為肺之府氣通於鼻故善噫肺主秋秋愁也故其病悲哭內證者肺之證洒淅欬噫肺在西方為白虎主右方故證在齊右

假令得腎脈其外證面黑喜恐欠

丁曰其外證者太陽膀胱之經故為外經也故有病則色黑面黑喜恐欠也　虞曰沉濡而滑腎之脈也黑色腎之色也在志曰恐巨陽虛則欠

其內證齊下有動氣按之牢若痛

虞曰腎之積名曰賁豚在齊下故云在齊下

其病逆氣少腹急痛泄如下重足脛寒而逆有是者腎也無是者非也

丁曰其內證者腎王於冬應北方故在齊之下也其病逆氣少腹急痛泄如下重其泄者為大痕泄而裏急後重也此內之證也　虞曰腎氣不足傷於衝脈故氣逆腎者足少陰之脈循少腹與足厥陰足太陰三陰交於齊下令病故少腹急痛也五泄之候腎為後重泄腎者胃之關令氣虛故為下重泄謂食畢思急圊足內踝上五寸間乃足少陰之動脈故足脛寒而逆逆訖虛實論曰氣逆者足寒也

呂曰外證足太陽膀胱脈也其人善欠者其人善惡寒若腿寒身體漉漉而寒故其善欠（楊注其宜作宜）腎與手少陽俱主候心故善恐其內證者取其形見於外也呂氏所注多不該經旨

十七難曰經言病或有死或有不治自愈或連年月不已其死生存亡可切脈而知之耶然可盡知也診病若閉目不欲見人者脈當得肝脈強急而長

丁曰此是肝之病證故脈強急而長　楊曰強急猶弦緊之證也越人言其外證者取其形見於外也呂氏所注多不該經旨

虞曰肝木之脈弦軟而長今見強急病乃如是而反得肺脈浮短而澀者死也

丁曰浮短澀者是肺脈此者金當勝木故知死也　楊曰肝為木肺為金肝病得肺脈俱鬼來剋金勝木故必死也病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沉濡而微者死也

丁曰心之病證今反見腎脈心火腎水水來剋火故知死也　楊曰心病得腎脈水勝火故死也按之短實而數有似切繩謂之緊也按之短小不動搖若有若無輕手乃得重手不得謂之微也　虞曰病開目而渴心下牢脈又緊實而數此曰陽病得陽脈脈不相反今見沉濡而微謂陽病得陰脈故曰死也

病若吐血復鼽衄者脈當沈細而反浮大而牢者死也

丁曰此者肺脈之病證今反見心脈心火來勝金故知死也　虞曰血屬陰吐血衄血脈得沈細此謂脈與

病相應今反浮大而牢與病相反故死也
病若譫言妄語身當有熱脈當洪大而手足厥逆脈沈細而微者死也
丁曰此病是心病之證今反手足厥逆脈沈細而欲者是水勝火卽知死也　楊曰按之運但小謂之細　虞曰肺主聲心主言今脈洪大是知熱乘於心肺邪受之故譫言妄語肺主皮毛今邪客於衛氣不得宣通乃身熱夫如是病與脈相應今手足厥逆脈沉細而微陽病得陰脈故云必死也
病若大腹而洩者脈當微細而濇反緊大而滑者死也
丁曰此病脾土之證候緊大滑者是肝木來勝土故知死也此經不言腎水之證闕此一藏也　楊曰凡此五者病脈相反故爲必死經云五逆者死此之謂也　虞曰濕氣勝則脹脾不禁故洩脈微細濇病脈相承緊大而滑此曰相反如此之候其死明矣

十八難曰脈有三部部有四經手有太陰陽明足有太陽少陰爲上下部何謂也然手太陰陽明金也足少陰太陽水也金生水水流下行而不能上故在下部
丁曰夫脈有三部者寸關尺也若合兩手言之卽六部也每部之內各有二經六部之內合爲十二經今此云四經者是謂手太陽陽明與足太陽少陰此四經者法水火之性各有綱紀而不能變通上下餘八經在手生足在足生手所以經言部有四也是右手寸口肺與大腸應金生左尺水也足太陽少陰水其性潤下故不能上生於手而生左足厥陰少陽木此二部皆是足之經紀所以言在下部也是左尺水生左關木　楊曰手太陰肺脈也肺爲諸藏上蓋其治在右方故在右手上部也手陽明大腸脈是肺之府故隨肺居上部焉足少陰腎脈腎爲水肺之子水流趣於腎又最居於下故爲左手下部也足太陽膀胱爲腎之府故隨腎居下部焉經言脈有三部部有四經者謂總兩手而言之也兩手各有三部部各有二經兩手上部合四也中下二部亦復如此三四十二則十二經也肺金居上而下生腎水故肺腎在左右手上下部也

足厥陰少陽木也生手太陽少陰火火炎上行而不能下故爲上部
丁曰手太陽少陰應左寸君火上（按此上字疑當作炎）炎上不能下生足而生手心主少陽火是生右尺相火也　楊曰足厥陰肝脈也肝治在左方故爲左手之下部足少陽膽也手太陽小腸脈爲心之府者爲肝之府故隨肝居下部也手心主少陽火生足太陰陽明土土主中宮故在中部也
丁曰是相火應其厥火也中部者右關也生右寸金也
楊曰手心主包絡脈也手少陽三焦脈也故合爲右手中部此中部足太陰脾脈也足陽明胃脈也故合爲左手中部經作如此分別者依脈經配二部又與此不同也　虞曰經言手心主少陽火生足太陰陽明土土主中宮故在右手中部惟只言火生土之意不言手心主少陽在左手中部惟只言火生土之意不言手心主少陽火生足太陰陽明土土主中宮故在右部惟只取其相生言之也今明三部相生之意如此右手尺中少陽火生關上陽明土關上陽明土生左手尺中少陰水左手尺中少陰水金寸口太陰金卻生左手尺中少陰水左手尺中少陰水火卻又別心主火故心主生足太陰何以居於左右兩手關相生之意耳又足厥陰與足太陰陽明土也此乃五行部中胃脾太陰脾脈居於中州乃在右手關上也又足厥陰木者根生於地枝葉長於天亦陰陽其焉故亦右左

中部也
此皆五行子母更相生養者也
丁曰言此皆五行更相生養者足謂右寸金生左尺水水生左關木木生左寸君火君火生右尺相火相火生右關土土而後生右寸金故言子母更相生養者也
脈有三部九候各何所主之然三部者寸關尺也九候者浮中沉也
丁曰前順五行而言之生養卽逆三部而反到所以辨別問各何所主也　楊曰寸口陽也關中部也尺中陰也此三部各有浮中沉三候三三九候也故曰九浮爲陽沉爲陰中者胃氣也　虞曰一部之中有三候浮者爲府沉者爲藏中者乃是中焦之脈也假令寸口浮爲府沉爲藏中爲中焦皆倣此用之

上部法天主胸以上至頭之有疾也
丁曰兩手寸口皆爲上部卽寸外主頭寸內主胸中是頭皆一指下前後言病左右同法也　楊曰所謂自膈以上爲上焦也

中部法人主膈以下至齊之有疾也
丁曰言左右兩關也第二指半指以前言膈下半指之後主齊上左右同　楊曰所謂自膈以下至足之有疾也
下部法地主齊以下至足之有疾也
丁曰下部左右兩尺第三指半指之前主齊下有疾半指之後以候至足之有疾　楊曰所謂自齊以下至足爲下焦也

審而刺之者也
丁曰刺字當作灸第之次此是審三部各有內外主從頭至足之有疾也故知刺字傳文誤也　楊曰用針者必當審詳三部九候病之所在然后各依其源而刺之也

人病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診在右脇有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則氣微診不得肺脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手脈當沈伏
丁曰病久積聚可切脈而知之者五藏六府皆有積聚今云右脇有積氣當肺脈見如是脈不見亦沈伏詳經之意脈浮行於肉上（按原本於此下有者字今改正）而無常數而止者名曰結也其沈行於筋下時行於肉上而無常數而止者名曰伏也伏者藏病積聚也浮結者府病聚也兩手三部各有內外主從頭至足之有疾也故知刺字傳文誤也　楊曰用針者必當審詳三部九候病之所在然后各依其源而刺之也

曰結也伏者脈行筋下也浮者脈在肉上行也左右表裏法皆如此假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無痼疾有積聚脈不結伏有痼疾脈不浮結爲脈不應病病不應脈是爲死病也

丁曰人心有所思慕脈亦結心無所思內外無病其脈伏結此者形不病而脈病故知死矣　楊曰脈與病不相應爲逆者難治故曰是死病也

舊經注云手心主心包絡脈也手少陽三焦脈也故合爲左手中部足太陰脾脈也足陽明胃脈也故合爲右手中部此經作如此分別若依脈經配三部又與此不同夫此法楊氏不同也楊氏曰手心主少陽部之脈法也下經中又備引其文疑衍於此甚爲無謂始依原本存之舊經有此前注脈體具列此圖以正其文楊氏曰手心主心包絡脈手少陽三焦脈也故合爲左手上部足太陰脾脈也足陽明胃脈也故合爲右手中部此經作如此分別若依脈經配三部又與此不同夫此法楊氏不同也故合爲左手上部足太陰脾脈也足陽明胃脈也故合爲右手中部此經作如此分別若依脈經配三部又與此不同夫此法楊氏不同也

十九難曰經言脈有逆順男女有常而反者何謂也然男子生於寅寅爲木陽也女子生於申申爲金陰也十月而生男楊曰元氣起於子人之所生也男從子左行三十之巳右行女從子右行二十俱至於巳爲夫婦懷雄也古者此二字疑衍

男子三十女年二十然後行嫁娶法於此也十月而生男從巳至寅左行爲十月故男行年起於丙寅女從巳右行至申爲十月故女行年起於壬申所以男子生於寅女子生於申　虞曰經言男子生於寅女子生於申謂其父母之年會合於巳上男左行十月至寅而生女右行十月至申而生也小進人言男一歲起於丙寅女一歲起於壬申難經不言起而言生謂生下已爲一歲矣丙壬二干水火也水火爲萬物之父母寅申二支金木也爲生物成實之終始木胞在申金胞在寅二氣自胞相配故用寅申也金生於巳巳與申合故女子取申木生於亥亥與寅合故男子取寅所以男年十六天癸至左行至巳巳者申之生氣女年十四天癸至右行亦在巳四字旁注按此說推之女年十六句讀巳也此句讀未不在巳也此句讀巳也此句讀本宮生氣之位陰陽相配乃成夫婦之道故有男女也上古天眞論曰男二八而天癸至精氣溢瀉陰陽和故能有子楊氏言男三十行年在巳方娶於此非也女二七天癸至任脈通衝脈盛月事以時下故能有子楊氏言女二十行年在巳方嫁於此義非矣楊氏之言但合古禮行夫婦之法又與本經天癸之數相違也況聖人於此十九難中論男女配合之道陰陽交會之所言天癸之至數知脈盛於上下推之強弱診其有餘不及若止言三十而娶二十而嫁何依據

故男脈在關上女脈在關下是以男子尺脈恆弱女子尺脈恆盛是其常也

丁曰其言男子女人尺脈者是陰陽之根本也逆順者爲陽抱陰生陰抱陽生也三陽始生於立春建寅故曰男生於寅木陽也三陰生於立秋七月建申故言女生於申金陰也男子之氣始於少陽極於太陽所以男子尺脈極弱而寸脈陽也按此陽字疑當作強　女子之氣始於太

女子尺脈浮而寸脈沉故云男脈在關上女脈在關下此是男女逆順有常而反也

女子陰氣盛故尺脈強此是其常性　楊曰男子陽氣盛故尺脈弱反者男得女脈女得男脈也其爲病何如然男得女脈爲不足病在內左得之病則在左右得之病則在右隨脈言之也

女得男脈爲太過病在四肢左得之病則在左右隨脈言之此之謂也

丁曰男得女脈言不足者是陰不足即陽入乘之故陽不見於寸口而反見尺內陰氣主內不足故知病即在內女得男脈爲太過病在四肢者女子尺脈本浮更加見於寸是謂太過陽主外故病在四肢隨其脈左右言之左得之病在左右得之病在左右也　楊曰男得女脈爲陰氣盛陰主內故病在內女得男脈爲陽氣盛陽主四肢故病在四肢也　虞曰寸口曰陽男以陽用事今見陰脈反於天常故病發於內女以陰用事今寸口却見陽脈亦是反於天常故病在四肢素問曰四支爲諸陽之本也

十九難圖　○此圖本附十九難後今移置此





王翰林集註黃帝八十一難經卷之二

音釋

十三難臭尺救切 棄苦老切 操七刀切 喙許穢切 十六難別彼列切 噫烏介切 浙音息 鰓女六切鼻中出血也 十八難脇虛業切胸脇也 痼音固久也

十四難尊徂活切 十五難厭益涉切 藹於蓋切 啄呼角切口呼字誤 渫所鴈切 嘔丁計切 脛形定切 諺之閏切多語也 十七難歟音求與寒而清涕出也 洩音薛 十九難蛔面怠切

二十難曰經言脈有伏匿伏匿於何藏而言伏匿耶然謂陰陽更相乘更相伏也脈居陰部而反陽脈見者爲陽乘陰也若以前後言之即寸丁曰其部非獨言寸爲陽尺爲陰也若以上下言之曰脈內上爲陽部肌肉下爲陰部今陰虛不足陽入乘之故陰部見陽脈其脈乘時見沉濇而短 字疑衍 此是陽中伏陰也 楊曰尺中已中浮滑而長

脈雖時沉濇而短此謂陽中伏陰也

浮滑而長又時時沉濇而短故曰陽中伏陰寸口陽中沉短而濇也

丁曰寸口之內肌肉之上時見沉濇短也 楊曰尺中已

丁曰寸口之內肌肉之下脈時見浮滑而長加於真數所以狂言大事

陽也 楊曰寸關已沉短而濇而中伏陽也

重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

丁曰重陽者狂謂脈浮滑而長加於真數所以狂言大事自高自賢狂越乘衣其脫陰者目盲視物牽失故言盲也盲猶荒也重陰者癲癲者藏也其脫陽者視其暗中見鬼是故經言重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲也 虞曰寸口曰陽又今重見陽脈三倍以上故曰重陽其病狂惑自高賢智登高而歌棄衣而走罵詈不避親疎故曰狂尺中曰陰而只脈重見陰故曰重陰其爲病也名曰癲疾謂僊仆於地閉目不醒陰極陽復良久却醒故曰癲也今天弔之類是也人之所稟者陰陽平則攝衛等今陰氣已脫陽氣獨盛五藏屬陰五藏行氣血既潛上榮於目今陰氣已脫五藏之氣不榮於目故目盲無所見故曰脫陰者目盲也 楊曰重陽者陽氣并於上也謂重陰者陽氣獨盛也重陰者無陽氣謂尺中微細甚也陰者精氣脫故盲盲脫之言失也謂亡失陰陽之氣也

二十一難曰經言人形病脈不病曰生脈病形不病曰死何謂也

丁曰此者五藏各有所主也肺主氣心主脈脾主肌肉肝主筋腎主骨其心肺主息脈爲通天氣邪不可中邪中則害其形其脈不病者皆生形脈皆病者不可治此是五藏各主其形脈故言大法也

然人形病脈不病非有不病者也謂息數不應脈數也此大法

呂曰形病者謂五藏損形憔瘁氣微脈反遲與息不相應其脈不相應爲形病也脈病者謂數諸至脈已病人雖未頭痛寒熱方病不久病病則死 虞曰人形病脈不病者謂形苦而志樂或勞形於事以致肌體瘦羸脈息俱呼吸大小雖合常經息數必違此大法故曰形病脈不病也脈病人不病者其人必外多眷慕內結想思脈病形安形樂志苦以致傷脈息反常不及有餘不死爰爲故曰脈病人不病也

二十二難曰經言脈有是動

虞曰言反常之動也

有所生病

虞曰脈動反常故云有所生病

二脈覆爲二病者何也然經言是動者氣也所生病者血也

虞曰氣病傳血此乃一脈變爲二病

邪在氣氣爲是動

虞曰脈動反常邪在氣也

邪在血血爲所生病

虞曰氣受邪傳之與血故血爲所生病

氣主呴之

虞曰呴之氣流行之貌也

血主濡之

丁曰氣主呴之呴呴謂吹噓往來之象血主濡之濡謂濡軟也氣行則血行氣止則血止　虞曰濡者濡潤之貌言人身所稟者氣血也氣血通行泪潤人身其為病也乃如下說也

氣留而不行者為氣先病也血壅而不濡者為血後病也故先為是動後所生病也

丁曰人一身經脈通行氣血或居一經脈中氣留不行故血壅不濡其氣先病名曰是動血壅不濡後病名曰所生此是一脈翻變為二病也　虞曰上文言脈有是動動為陽謂氣先受熱熱亦傳於血氣血皆受熱則津液妄行是知脈有是動此言留而不行謂氣血津液妄行賊風薄之故不行也氣傳之與血故血壅而不濡潤復受賊風故血亦住而病也　楊曰經言手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口屬肺出腋下循臑內行少陰心主之前下肘內上骨下廉入寸口上循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而舉是為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘渴心煩胸滿臑臂內前廉痛厥掌中熱氣有餘則肩背痛也（楊背作脊汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺白數此一經為例餘經皆可知也凡人所以得主命者氣與血也氣為陽陽為衛血為陰陰為榮二氣常流所以無病也邪中於陽陽為氣故氣先病陽氣在外故也若在陽不治則入於陰中陰為血故為血後病血在內故也氣實則熱氣虛則寒血實則為寒血虛則為熱陰陽之道理其然也凡一藏之病有虛有實有寒有熱有內有外皆須知藏府之所在識經絡之流行隨其本原以求其疾則病形可辨而針藥無失矣如其不爾斯道（爾作若則字則雖命藥投針病難愈也故黃帝曰夫十二經脈者所以調虛實處百病決生死不可不通誠此之謂也　虞曰凡人血流氣氣動依血凝留而不行壅而不滿是知為病也

二十三難曰手足三陰三陽脈之度數可聞以不然手三陽之脈從手至頭長五尺五合三寸

楊曰一手有三陽兩手合為六陽故曰五六合三寸也

虞曰手太陽之脈自兩手小指之端循臂上行之耳珠子前長五尺兩手合一寸手陽明之脈起於兩手大指次指之側上循臂絡於鼻左之右右之左長五尺兩手合一寸手少陽之脈起於兩手小指次指之端上臂終於耳前長五尺兩手合一寸故曰五六合三寸也

手三陰之脈從手至胸中長三尺五寸三六一寸八尺五六三尺合二寸一尺

楊曰兩手各有三陰合為六陰故曰三六一寸八尺　虞曰手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口屬肺出腋下下肘入寸口上魚際出乎大指之端長三尺五寸兩手合七尺手少陰之脈起於心中出屬心系下絡小腸上肺出腋下循臑出手小指之後上內踝之上直上循臂內後廉入淵腋下出小指次指之端長三尺五寸兩手合長七尺故曰二丈一尺

足三陽之脈從足至頭長八尺六八四丈八尺

楊曰兩足各有三陽故曰八尺也　虞曰足太陽之脈起於目內眥上額交巔中循背上頭下入之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而舉是為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘渴心煩胸滿臑臂內前廉厥掌中熱氣有餘則肩背痛也（楊背作脊汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺白數色變之脈起於兩足小指之側上循脛交巔中循背上頭下入目內眥長八尺兩足上行合一丈六尺足陽明之脈起於鼻交頞中旁納太陽之脈下循鼻外入上齒中還出挾口環唇下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱長八尺兩足上行合一丈六尺足少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上交出足大指之間循足跗上入中指內廉出其端長八尺兩足上行合一丈六尺足厥陰之脈起於足大指叢毛之上循足跗上廉去內踝八寸交出足太陰之後循股入陰毛中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽循脅裏上貫膈布胸脇循喉嚨之後上入頏顙連目系出額長六尺五寸兩行合長一丈三尺足少陰之脈起於足小指之下斜趣足心上踹股內貫脊屬腎絡膀胱貫肝入肺循喉嚨挾舌本長六尺五寸合長一丈三尺故云三丈九尺

入兩足蹻脈從足至目長七尺五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺

楊曰人長七尺五寸而蹻脈從踝至目不得有七尺五寸也今經言七尺五寸者是腳脈上於頭而行焉言至目者舉其綱維也　虞曰人有陰蹻陽蹻二脈兩足合四脈陽蹻者起於踝中循外踝上於眼陰蹻者亦起於眼中循外踝乃足少陰之別絡也自然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰循腹（按原本誤作腹依上文改正）上胸裏入缺盆上出人迎之前入頏內廉（按原本誤作腹依上文改正）合太陽脈目內眥合太陽脈兩足陰蹻脈也故經言從足至目長七尺五寸以合一丈五尺是也

督脈任脈各長四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺凡脈長一十六丈二尺此所謂十二經脈長短之數也

丁曰此篇云十二經脈長短又言陰蹻陽蹻亦起於眼中循外踝上於眼中循外踝上入風池亦長一丈五尺言之則據經文尺有剩不言有此闕漏頭侯後賢其脈上云八尺者其中腦之人以省尺言之皆得四尺今尺者非素尺也皆以同身寸之為尺大小言之皆八尺　楊曰督脈起於肾腦上於頭下於面至口齒縫計此不止長四尺五寸今言四尺五寸者當取其上極於風府而言之也手足各十二脈（按史記正義作為二十四脈并督任兩蹻四部合為二十八脈以應二十八宿凡長一十六丈二尺榮衛行周此數則為一度也故曰長短之數也　虞曰經言督脈起於下極之命并於脊裏上至風府入腦於腦長四尺五寸任脈者起於中極之下以上毛際循腹上關元至咽喉長四尺五寸督任計之長合九尺五寸兩行合長一丈一尺

尺也以上十二經合二十四脈合長一十三丈八尺兼之督任陰蹻三脈合長二丈四尺共二十七脈合長一十六丈二尺以法三九之數應漏水下二刻楊氏言二十八脈乃陽蹻亦係其數推之二蹻四行則尺寸有餘也楊氏言二十八脈誤矣

經脈十二絡脈十五何始何窮也然經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰別絡十五皆因其原如環無端轉相灌溉朝於寸口人迎以處百病而決死生也

丁曰此者天地陰陽一歲終始於二十四氣日月晝夜終始於二十四時人之榮衛行經絡二十四條故復會於寸口人迎其言寸口者手太陰脈口也其穴名曰太淵故脈會於太淵其十二經十五絡皆輔三焦而生故始從中焦注手太陰陽明所以處百病決死生也　楊曰行手太陽明輸轉而行餘皆因其原如環無端轉相灌溉朝於寸口人迎以處百病而決死生也

丁曰此者天地陰陽一歲終始於二十四氣日月晝夜終始於二十四時人之榮衛行經絡二十四條故復會於寸口人迎其言寸口者手太陰脈口也其穴名曰太淵故脈會於太淵其十二經十五絡皆輔三焦而生故始從中焦注手太陰陽明所以處百病決死生也　楊曰行手太陽明輸轉而行餘皆因其原如環無端轉相灌溉朝於寸口人迎以處百病而決死生也　虞曰陰陽有少陰絕之形也　楊曰足少陰腎脈也腎主冬脈故有三陰三陽以通氣血以養人身是故三陰三陽合太陰為開脈陰為闔少陰為樞闔者司動靜之基闔者主閉藏之權樞者主動轉之微三經不得相失今足少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則色澤去矣故曰死也診要經終論曰少陰終者面黑齒長而垢腹滿閉上下不通而終矣此之謂也

足太陰氣絕則脈不榮其口唇口唇者肌肉之本也脈不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

丁曰足太陰經者脾之脈也屬土王季夏其氣內養肌肉外華衛於口唇其氣既絕則唇反肉滿故甲日篤而乙日死也此是足太陰絕之形也　楊曰足太陰脾脈也脾主肌肉其氣既絕故肌肉鑿鑿而唇反甲乙木也脾土故云甲日篤乙日死也　虞曰口唇肉之本也脾之華今唇反色青木賊土也故曰死矣陰陽之氣通於朝使如環無端故曰始也太陰為開調司動靜之基今脈已絕則動靜存故曰死也素問曰太陰終者腹脹閉不得息善嘔嘔則逆逆則面赤也

足厥陰氣絕即筋縮引卵與舌卷厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脈不榮則筋急急即引卵與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死

二十四難曰手足三陰三陽氣已絕何以為候可知其吉凶不然足少陰氣絕即骨枯少陰者冬脈也伏行而溫於骨髓故骨髓不溫即肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤者骨先死戊日篤已日死

丁曰足少陰之經腎脈也屬水王冬內榮於骨髓外華於髮其氣絕則齒本長骨枯髮無潤澤故戊日篤而已日死也此足少陰絕之形也　楊曰足少陰腎脈也腎主冬脈也腎主冬故云伏行而溫於骨髓骨髓不溫即肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤者骨先死戊日篤已日死也

丁曰足少陰之經腎脈也屬水王冬內榮於骨髓外華於髮其氣絕則齒本長骨枯髮無潤澤故戊日篤而已日死也　楊曰足少陰腎脈也腎主冬脈也腎主冬故云伏行而溫於骨髓骨髓不溫即肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤者骨先死戊日篤已日死也

主筋其氣既絕故筋縮急而舌卷卵縮庚日篤而辛日死也　楊曰足少陰腎脈也腎主冬脈也腎主冬故云伏行而溫於骨髓骨髓不溫即肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤者骨先死戊日篤已日死也

丁曰足少陰之經腎脈也屬水王冬內榮於骨髓外華於髮其氣絕則齒本長骨枯髮無潤澤故戊日篤而已日死也　楊曰足少陰腎脈也腎主冬脈也腎主冬故云伏行而溫於骨髓骨髓不溫即肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤者骨先死戊日篤已日死也

主筋其氣既絕故筋縮急而舌卷卵縮庚日篤而辛日死也　楊曰足厥陰肝脈也肝主筋其氣既絕故筋縮急而舌卷卵縮庚日篤而辛日死也

丁曰足厥陰經者肝之脈也屬木王春氣內養於筋外則上係舌本下環於陰器其氣絕則舌卷卵縮故庚日篤而辛日死也此足厥陰絕之形

精與志足厥陰肝也肝藏魂通於目故絕則失志而亂魂去目眩也　楊曰三陰者是手足三陰脈也此五藏之脈也五藏者人之根本也故三陰俱絕則目瞑瞑閉也言目亂不識人也腎藏精與志精氣已竭故曰失志也三陰五藏之脈皆得一日半死也　虞曰五藏之脈皆屬三陰五會於目今三陰俱絕故目眩目瞑也人之五志皆屬於陰謂肝志怒心志喜脾志思肺志憂腎志恐今三陰已絕五藏皆失其志故無喜怒憂思恐五志俱亡故曰失志也楊氏言失志乃止言腎一藏也本經曰陰陽相離則悵然失志此之謂也

六陽氣俱絕者則陰與陽相離陰陽相離則腠理泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流即氣先死旦占夕死夕占旦死

丁曰所言六陽是手足三陽也後言陰與陽相離者謂手三陽通天氣故曰陽也足三陽通地氣故云陰也天地陰陽否隔所以言陰陽相離也是故腠理泄絕汗乃出大如貫珠故其死不移旦夕也　楊曰此六陽氣絕不出日死六陽氣絕之狀今略條之經云太陽脈絕者其絕也故眼反折瘛瘲其色白絕汗乃出出則終矣少陽脈絕者其絕也耳聾百節盡縱目慧絕系絕系一日半死其色青者乃死陽明脈絕者其絕也口耳張善驚妄言色黃其上下經盛而不仁則終矣此是三陽絕之狀也前云六陽氣絕此是三陽絕者手足諸陽脈絕其絕狀並同所以不別出陰與陽相離者陰陽隔絕不相朝使也腠理泄者陽氣已下毛孔皆開所以然也絕汗乃汗出如珠言身體汗出著肉如綴珠而不流散故曰貫珠也旦占夕死者正得半日也惟少陽絕得一日半矣　虞曰陰陽隔絕腠理開疎汗乃大出夫如是則六陽皆絕其死明矣況三陽之脈亦有離合太陽為開陽明為闔少陽為樞開闔樞者司動靜之基闔者執禁固之權樞者主轉動之微三經不得相失今六陽已絕失其動靜之司弛其禁固之樞此其動轉之徵三經相失故曰死也六陽者素問曰上下經乃成六也

經絡大數第二凡二首

二十五難曰有十二經五藏六府十一耳其一經者何等經也然一經者手少陰與心主別脈也心主與三焦為表裏俱有名而無形故言經有十二也

丁曰言少陰與心主別脈者謂心與小腸為表裏心主與三焦為表裏也少陰是真心脈為君火心主者共三焦相火故別也相行君命故有心名無位也心脈也手心主心包絡脈也二脈俱是心脈而少陰與小陽合心主與三焦脈合三焦有位而無形心主有名而無藏故二經為表裏也五藏六府各一脈為十一脈心有兩主者手厥陰脈也三焦者手少陽脈也二經合為表裏乃有陰蹻有衝有督有任有帶之脈凡此脈合成十二經焉據此而言六府亦止五府耳　虞曰心主者手厥陰脈也三焦者手少陽脈也二經合為表裏乃足內者為經足外者為絡故有陰陽蹻二絡也經云男子數其陽女子數其陰當數者為有二絡也凡經脈為裏絡為表絡之別者為孫也

奇經八脈第三　凡三首

二十七難曰脈有奇經八脈者不拘於十二經何謂也然有陽維有陰維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶之脈凡此八脈者皆不拘於經故曰奇經八脈也經有十二氣相隨上下流通氣血凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不然天雨降下溝渠溢滿當此之時霖潦深至聖人不能復圖也此絡脈滿溢諸經不能復拘也

丁曰前言十二經十五絡二十七氣相隨上下流通氣血相維絡於三焦歸於少陰之經配手厥陰者出於手小指次指之端上出次指之間循手表腕出譬如足少陽之後入缺盆布膺中散絡心包下膈循屬三焦滿溢諸經不能復拘於經以此可驗矣楊氏言奇異之義非也

二十八難曰其奇經八脈者既不拘於十二經皆何起何繫也然督脈者起於下極之俞並於脊裏上至風府入於腦。

丁曰督脈起於下極之俞並於脊裏上至風府入於腦。

絡會之所並於脊裏上至風府穴在髮上一寸督脈陽維所會奇經之一脈也

督之為言都也是人陽脈之都綱八脈氏於水故呂氏曰陽脈之海此為奇經之一脈也下極者長強也　虞曰經足外踝此者是陰蹻陽蹻之絡也楊氏曰諸陽之海也楊氏言督脈起於下極上入腦於腦呂氏曰諸陽之海也楊氏

曰陽脈之都綱據其督脈流行起自會陰穴循奇中上行至大椎穴與手足三陽之脈交會上至瘖門穴與陽維會其所上至百會穴與太陽交會下至於鼻柱下水溝穴與手陽明交會準此推之實謂為諸陽之海陽脈之都綱也任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉

丁曰中極者穴名也在齊下四寸其中極之下者曲骨穴也是任脈所起其循腹裏上關元至咽喉者天突穴也是任脈之所會奇經之二脈也　楊曰任者姙也此是人之生養之本故曰位中極之下長強之上此奇經之二脈也

虞曰據鍼經推尋任脈起於會陰穴上毛際者乃是曲骨穴在少腹下毛際與足厥陰會於此上至關元乃齊下二寸也至咽喉與陰維脈會也素問曰女子二七天癸至任脈通衝脈盛月事以時下故能有子也故楊氏曰生養之本良由此也

衝脈者起於氣衝並足陽明之經夾齊上行至胸中而散也

呂曰衝脈者陰脈之海　丁曰衝脈起於氣衝并足陽明之內俠任脈之外上行至胸中而散皆起於氣衝者此之謂也　楊三焦行氣之府也故呂氏云一本曰衝者此之謂也

曰經云衝脈者十二經之海也如此則不獨為陰脈之海恐呂氏誤焉衝者通也言此脈下至於足上至於頭通受十二經之氣血故曰衝焉此奇經之三脈也　虞曰素問

曰衝脈起於氣街雖經曰起於氣衝又針經穴中兩存其名衝街之義俱且通也素問曰並足少陰之經俠齊左右各五分陽明之經並足陽明之經況少陰之經俠齊左右各五分陽明之經又是陽明脈氣所發如此推之則衝脈自氣衝起在陽明少陰二經之內俠齊上行其理明矣大體督脈任脈衝脈此三脈皆自會陰穴會合而起一脈分為三岐行於陰陽部分不同故名各異也

帶脈者起於季脇迴身一周

丁曰季脇下一寸八分是其帶脈之穴也迴身一周是奇經之四脈也　楊曰帶之為言束也言總束諸脈使得調柔也季脇在肋下下接於髀骨之間是也迴周猶如束帶焉此奇經之四脈也

陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池

丁曰陽蹻脈起於跟中循外踝者中衝穴也上入風池穴者項後髮際陷中是奇經之五脈也　楊曰蹻捷疾也言此脈是人行走之機要動足之所由故曰蹻脈焉此奇經之五脈也

陰蹻脈者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈

丁曰陰蹻脈亦起跟中循內踝者照海穴也上行至咽喉交貫衝脈其又至目下承泣穴是陰蹻脈之所會也此奇經之六脈也　楊曰其義與陽蹻同也此奇經之六脈也

虞曰陰蹻者起於足然骨之後上內踝之上循陰股入陰而循腹上胸裏入缺盆出人迎之前入頏內廉屬目內眥合於太陽陽蹻而上行

陽維陰維者維絡于身溢畜不能環流灌溉諸經者也故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也

丁曰陽維者維絡諸陽故曰陽維起於諸陽會也陰維者維絡諸陰故曰陰維起於諸陰交也　楊曰維者維持之義也此脈為諸脈之綱維故曰維脈也此有陰陽二脈為奇經之六脈也

比干聖人圖設溝渠溝渠流子深湖故聖人不能拘通也而人脈隆盛入於八脈而不環周故十二經亦不能拘之其受邪氣畜則腫熱砭射之也

丁曰凡八脈為病皆砭射取之　楊曰九州之內有十二經脈以應之亦所以流灌身經水以流泄地氣人有十二形之血氣以奉生身故比之於溝渠也　虞曰任脈當少腹上行故其盛入於八脈而不環周邪在八脈腫熱蓄積故以砭石射刺之故曰砭射之也

一十九難曰奇經之為病何如然陽維維於陽陰維維於陰陽不能自相維則悵然失志溶溶若坐水中

呂曰悵然者其人驚驚郎維脈緩故令人身不能收持驚則失志善忘恍惚也　丁曰陽維陰維者是陽不能主之綱維也而主持陰陽之脈今不能相維者是陽不能主持諸陽陰不能主持諸陰故言悵然失志也溶溶者緩慢也

陰蹻為病陽緩而陰急陽蹻為病陰緩而陽急

呂曰陰蹻在內踝上病則其脈從內踝以上急外踝以上緩也陽蹻在外踝上病則其脈從外踝以上急內踝以上緩也　丁曰奇經八脈者而聖人圖設溝渠之理（一本而字作乃）以備通水道焉非自生其病盡諸經隆盛而散入也乃砭射取之諸陽脈盛散入陰蹻則陽緩急者即陰蹻為病耳其陰陽緩急者即陰蹻則陰緩病故陰蹻陽蹻是虛實之義陰蹻為病則陽緩而陰急即病陰厥足勁直而五絡不通陽蹻為病則陰緩而陽急即狂走不臥死脈者即病陽緩而陰急即病陰厥足勁直而五絡不通陽蹻為病則陰緩而陽急即狂走不臥死脈者即

衝之為病逆氣而裏急

丁曰逆氣腹逆也裏急腹痛也　呂曰衝脈從關元上至咽喉故其脈為病逆氣而裏急　虞曰衝脈並足少陰之經俠齊上行病故逆氣裏急矣巢氏病源曰腎氣不足傷於衝脈逆氣而裏急

督之為病脊強而厥

呂曰督脈在脊病則其脈急故令其脊強也　丁曰督脈起於下極之俞行脊裏上入風池病則脊強

任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚

呂曰任脈起於胞門子戶故其脈結為七疝瘕聚之病　丁曰任脈起於胞門子戶循腹裏上關元至咽喉病則男子內結為七疝女子為瘕聚　虞曰任脈當少腹上行故其內苦結男子病七疝者謂厥疝癩疝寒疝瘕疝附疝狐疝氣疝此七病由氣血虛弱寒溫不調致之也女子病為瘕聚瘕有八瘕謂青瘕黃瘕赤瘕白瘕黑瘕肉瘕血瘕狐瘕蛇瘕蠶瘕脂瘕寒瘕者謂假於物形是也

帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中

呂曰帶脈者囘帶人之身體病則其腹緩故令腰溶溶也　丁曰帶脈者迴帶人之身病則腰溶溶也

陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛

呂曰陽為衛故寒熱陰維為榮榮為血血者心故心痛也　丁曰陽維主於諸陽之經病則苦寒熱陰維主於諸陰之所以不能收持也

此奇經八脈之為病也

楊曰一本云衛脈者起於鼻頭額上交頞中循腹裏直上于咽喉中任脈者起於胞門子戶俠齊上行至胸中二本雖不同亦俱有所據并可依用故并載之呂氏注與經不同者由此故也　虞曰據素問言衛脈起氣街俠齊上行至胸中任脈起於中極謂當臍心上行也以上呂楊氏所舉皆非也

榮衛三焦第四　凡二首

三十難曰榮氣之行常與衛氣相隨不然經言人受氣於穀穀入於胃乃傳與五藏六府皆受於氣其清者為榮濁者為衛榮行脈中衛行脈外榮周不息五十而復大會陰陽相貫如環之無端故知榮衛相隨也　虞曰丁曰夫人之生稟天真之氣後飲水穀食入胃傳於五藏六府化為精血其精血各有清濁其精中清者歸肺以助天真其濁者堅強骨髓故血中之清者歸心榮養於神血中之濁者外華於肌肉而清者行於脈內濁者行於脈外榮周不息五十而復大會陰陽相貫如環之無端故知榮衛相隨也榮者榮華之義也營者經營也言人百骸九竅所以得榮華者由此血氣也營者經營也言十二經脈常行不已經紀人身所以得長生也二義皆通焉衛者護也此是人之慓悍之氣行於經脈之外晝行於陽夜行於藏衛護人身故曰衛氣凡人陰陽二氣皆會於頭手足流轉無窮故曰如環之無端也心榮血肺衛氣血流據氣氣動依血相遷而行故知榮衛相隨也　虞曰經言人受氣於穀穀入胃乃傳與五藏六府者謂水穀入口下至於胃胃化穀為氣上傳與肺肺乃主氣氣乃為衛胃化水上傳與心心乃生血血乃為榮榮氣為表行於脈外血為裏行於脈內二者相依而行故一日一夜五十周於身復會於手太陰如環之無端轉相灌溉經言清氣為榮濁氣為衛詳此清濁之義倒言之為正恐傳寫誤也陰陽應象論曰清陽實四支濁陰歸六府即其義也

三十一難曰三焦者何氣何生何始何終其治常在何許可識以不然三焦者水穀之道路氣之所終始也

楊曰焦元也天有三元之氣以生成萬物人法天地所以亦有三元之氣以養人身形三焦皆有其位而無正藏

也　虞曰天有三元以統五運人有三焦以統五藏也今依黃庭經配八卦屬五藏法三焦以明人之三焦法象三元也心肺在上部心法離卦肺法兌卦乾卦主上焦乾為天所以肺行天氣脾胃在中部脾胃屬土統坤卦艮亦屬土艮為通氣主治中焦脾胃在中部肝在下部腎法坎卦肝法震卦巽卦主下焦主通地氣行水道夫如是乃知坎離震兌坤以法五藏乾艮巽乃法三焦以合八卦變用乃如下說

上焦者在心下下膈在胃上口主內而不出其治在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是

楊曰自膈以上名曰上焦主出陽氣溫於皮膚分肉之間若霧露之溉蒸腠理泄於皮毛者也

虞曰氣街者氣之道路也三焦者水穀之道路也布氣於胸中故治在膻中故曰膻中者穴名也直兩乳中是穴在鳩尾下二寸五分也　虞曰經言人百骸九竅所以得榮華者由此血氣也營者經營也言十二經脈常行不已經紀人身所以得長生也二義皆通焉衛者護也此是人之慓悍之氣行於經脈之外晝行於陽夜行於藏衛護人身故曰衛氣凡人陰陽二氣皆會於頭手足流轉無窮故曰如環之無端也心榮血肺衛氣血流據氣氣動依血相遷而行故知榮衛相隨也　虞曰經言人受氣於穀穀入胃乃傳與五藏六府者謂水穀入口下至於胃胃化穀為氣上傳與肺肺乃主氣氣乃為衛胃化水上傳與心心乃生血血乃為榮榮氣為表行於脈外血為裏行於脈內二者相依而行故一日一夜五十周於身復會於手太陰如環之無端轉相灌溉經言清氣為榮濁氣為衛詳此清濁之義倒言之為正恐傳寫誤也陰陽應象論曰清陽實四支濁陰歸六府即其義也

楊曰焦元也天有三元之氣所以生成萬物人法天地所以亦有三元之氣以養人身形三焦皆有其位而無正藏

丁曰靈樞秘典論曰三焦者決瀆之官引導陰陽水穀故名曰三焦其水穀之道路也布氣於胸中故治在膻中穴也

爲純木也陰陽交錯故也木生於亥而王於卯故云行陰道多東方甲乙木艮西方庚辛金故釋其妹乙嫁庚爲婦故曰庚之柔柔陰也乙帶金氣以歸故令肝得水而浮也

虞曰乙與庚合從夫之性故得水而沉也

肺者并爲純金也辛商也丙之柔大言陰與陽小言夫與婦釋其微陰婚而就火其意樂火又行陽道多故令肺得水而浮也

丁曰肺白象金金性本沉今肺反浮謂辛納火性又正月受氣七月臨官行其陽道多是故肺得水而浮也　楊曰金生於巳王於酉故云行陽道多西方庚辛金長南方丙丁火故釋其妹辛嫁丙爲婦故曰丙之柔辛帶火氣以歸故令肺得水而浮也　虞曰丙與辛合隨夫之性炎上而浮故云也

肺熟而復沉肝熟而復浮者何也故知辛當歸庚乙當歸甲也

丁曰皆歸本性也　楊曰肝生沉而熟浮肺生浮而熟沈此是死則歸本之義熟喻死矣如人夫婦有死亡者未有子息各歸其本極陰變陽寒盛生熱蘊久成通聚而必散故其然也義之反覆故浮沉改變也

三十四難曰五藏各有聲色臭味可曉知以不然十變言所

色青

虞曰五色之變在于木也五藏五色由肝木之氣更相灌故各從其類見其色黃庭經云肝者水之精震之氣其色青位居東方

其臭臊

虞曰得火之變故其臭則臊也

其味酸

虞曰土受木味則酸洪範曰曲直作酸酸取其收斂也

其聲呼

虞曰金木杅配發聲爲呼呼亦嘯也

其液泣

虞曰泣則言混也此乃水行氣灑灌於子故生泣也

心色赤

虞曰木之布色在火乃赤也

其臭焦

虞曰五臭之變在于火五藏五臭火盛則焦苦出焉故曰其臭焦也

其味苦

虞曰火性炎上故生焦苦故洪範云炎上作苦木經云脾主甘受味火由土受之則味苦取其燥濕也

其聲言

虞曰金火相當夫婦相見發聲爲言素問云笑

其液汗

虞曰水火交泰蒸而成汗

脾色黃

虞曰脾土在中央其色黃此乃木之布色在土乃黃也

其臭香

虞曰火之化土其臭則香也

其味甘

虞曰脾土味甘甘能受味以取寬緩行五味以養五藏各從其數以配其味在本性則甘故洪範云稼穡作甘也

其聲歌

虞曰金土相生母子相見發聲爲歌

其液涎

虞曰水之行液在脾成涎

肺色白

虞曰木之布色在肺乃白也

其臭腥

虞曰火之變在金則腥也

其味辛

虞曰土之受味在肺爲辛辛取其散潤也

其聲哭

虞曰凡五音之發在于金金發五音以出五藏各從其類以發其聲金在本性爲哭者謂肺屬金金商也商傷也主於秋秋愁也故在志則悲哭此之謂也

其液涕

腎色黑

虞曰水之布色在腎乃黑淮南子云水者積陰之氣而成水也取其積陰故其色乃黑

其臭腐

虞曰火主臭在水爲腐臭也啓玄子云因木變爲腐也

其味鹹

虞曰土之受味在水作鹹鹹取其堅耎也

其聲呻

虞曰子之見母乃發嫣呻之聲也

其液唾

虞曰凡五液皆出於水水行五液分灌五藏故諸藏各有液也在本宮則爲唾也

是五藏聲色臭味也

丁曰其言五聲五色五味五音五液此者是五藏遞相榮養過此則病也　楊曰五藏相通各有五五五合爲二十五以相生養也

五藏有七神各何所藏耶然藏者人之魂神氣所舍藏也故肝藏魂肺藏魄心藏神脾藏意與智

虞曰心有所憶謂之意水從其夫故有智也

腎藏精與志也

丁曰五藏七神者宣明五氣篇注云心藏神精氣之化成也肺藏魄精氣之匡輔也靈樞經云並精而出入者謂之魄肝藏魂神氣之輔弼也靈樞經曰隨神而往來者謂之魂脾藏意與智意主所思智主其記腎藏精與志專意而不移者也靈樞經曰意之所在謂之志又云守其精者謂之志也　虞曰氣之所化謂之精意之所存謂之志　楊曰肝心肺各一神脾腎各二神五藏合有七神

三十五難曰五藏各有所府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何謂也經言心業肺衛通行陽氣故居在上大腸小腸傳陰氣而下故居在下所以相去而遠也又諸府者皆陽也清淨之處今大腸小腸胃與膀胱皆受不淨其意何也然諸府者謂是非也

丁曰經言諸府皆陽清淨之處者爲手足三陽爲行氣之府故言清淨之處也今大腸小腸胃膀胱爲傳化之府各別其所傳化此爲是言非也　楊曰謂是非者言諸府各別其所傳化此爲是也小腸爲府此爲非也何爲如此然小腸者雖配心爲表其治則別其氣則通其氣雖通其所主又異所以雖曰心病而無心別位故曰非也

經言小腸者受盛之府也大腸者傳瀉行道之府也膀者津液之府也圂者水穀之府也膀胱者津液之府也　楊曰此各有此傳也

一府猶無兩名故知非也小腸者心之府大腸者肺之府胃者脾之府膽者肝之府膀胱者腎之府也　楊曰此是小腸與心通氣也餘並同矣

小腸謂赤腸大腸謂白腸膽者謂青腸胃者謂黃腸膀胱者謂黑腸下焦所治也

丁曰皆謂陰五藏之色相配而言也　楊曰腸者取其積貯熱治之義也故以名之然六府五藏之正色也

三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也其左者爲腎右者爲命門命門者諸神精之所舍原氣之所繫也故男子以藏精女子以繫胞故知腎有一也

丁曰命門者諸神精之所舍原氣之所繫也故男子藏精女子係胞也是知腎有一也其言命門者非右尺也爲人之主命之門也腎屬水故知以其右尺爲相火行君火之命今亦名命門即非腎之命門也蓋同名而異義也　楊曰腎雖有兩而一非腎故脈經曰左手尺中爲腎脈右手尺中爲命門亦命門也　虞曰經云

四十難曰經言肝主色
虞曰肝木也木之華萼敷布五色故主色也
心主臭
虞曰心火也火之化物五臭出焉是故五臭心獨主之也
脾主味
虞曰脾土也土甘甘受味故主味此義也
肺主聲
虞曰肺金也金擊之有聲故五音皆出於肺也
腎主液
虞曰腎水也水流濕主液也
鼻者肺之候而反知香臭耳者腎之候而反聞聲其意何也
然肺者西方金也金生於巳巳者南方火也火者心心主臭
故令鼻知香臭腎者北方水也水生於申申者西方金金者
肺肺主聲故令耳聞聲
楊曰五行有相因成事有當體成事者至如肺腎二藏相
因成也其餘三藏自成之也
四十一難曰肝獨有兩葉以何應也然肝者東方木也木者
春也
虞曰在五常木法春應仁故云木者春也人之仁發用也
萬物始生其尚幼小
虞曰肝木足厥陰配膽木足少陽少陽之至乍大乍小乍
短乍長故云幼少
意無所親
虞曰木者應春法仁施恩無求報不以親而施化育故曰
意無所親
去太陰尚近
虞曰十二經相注足厥陰還復注手太陰故曰去太陰尚
近也
雖太陽不遠
虞曰本經言足厥陰少陽木生手太陽少陰火故云雖太
陽不遠則此義也
猶有兩心

虞曰猶如也如有兩心者謂注於太陰有異金之心生於
太陽有生火之心故云猶有兩心
故有兩葉亦應木葉也
楊曰肝者據大葉言之則是兩葉也若據小葉言之則多
葉矣解在後章　丁曰經言肝者東方木也應春萬物之
所生其尚幼小然始生者非長生也謂木初受氣是言幼
少也意無所親者謂以失其父未識其母故曰意無所親
也去太陰尚近太陰是七月木始受氣離太陽不遠也太
陽是六月故言離太陽不遠也猶有兩心者為離太陽繇
太陰有此離戀故言兩心也所以肝有兩葉以應木葉也
四十二難曰人腸胃長短受水穀多少各幾何然胃大一尺
五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中當留
穀二斗水一斗五升
楊曰凡人食入於口而聚於胃故經云胃者水穀之海胃
中穀熟則傳入小腸也
小腸大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺受穀二斗四
升水六升三合合之太半
楊曰小腸受胃之穀而傳入於大腸分穀三分有二為太
半有一為少半
迴腸大四寸徑一寸半長二丈一尺受穀一斗水七升半
楊曰迴腸者大腸也受小腸之穀而傳入於廣腸焉　虞
曰水穀自胃有三斗五升傳入小腸則穀剩四升水少八
升六合合之少半又傳入大腸水穀之數比之在胃各減
一半至此則水分入膀胱穀傳入肛門也
廣腸大八寸徑二寸半○按下文云徑一寸半之其數正合此處數大字長
二尺八寸受穀九升三合八分合之一
楊曰廣腸者直腸也一名肛門受大腸之穀而傳出
故腸胃凡長五丈八尺四寸合受水穀八斗七升六合八分
合之一○按此數與上文計之當云九斗二升一合又二十四分合之十九　此腸胃長短受
木穀之數也
楊曰據甲乙經言腸胃凡長六丈四寸四分所以與此不
同者甲乙經從口至腸而數之故長此經從胃至腸而
數之故短亦所以互相發明非有謬也

肝重四斤四兩○按別本並作二斤四兩據史記正義引作四斤四兩與此合左三葉右四葉凡七葉

虞曰肝足厥陰配足少陽少陽之天數於七故有七葉

主藏魂

虞曰魂者神氣之輔弼也　楊曰肝者幹也於五行爲木故其體狀有枝幹也○按原本其下衍於字依史記正義引此文刪肝神七人老子名曰明堂宮闕臺府從官三千六百人又云肝神六童子三女人又肝神名蓋藍

心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主藏神

楊曰心繼也○按原本繼誤作藏依史記正義引此文改下同言所識繼微○按原本微誤作徵依史記正義引此文改下同所下衍以字依史記正義引此文刪無物不貫也又云心爲帝王身之主其神九人太尉公名絳宮大始南極老人元先之身○按史記正義引此文其從官三千六百人又曰心爲帝王身之主其神二人元梁也心神又名呴呴　虞曰神者精氣之化成也

脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五藏主藏意

楊曰脾裨也○按原本裨誤作俾依史記正義引此文改下同在胃之下裨助胃氣主化水穀也其神五人玄光玉女子母其從官三千六百人其脾神又名俾俾

肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉

虞曰肺者金之精兌之氣位居於酉酉是八門八葉之靡法於此也

主藏魂

楊曰肺勃也言其氣勃鬱○按史記正義引此下有故字二字也其神八人大和君名曰玉堂宮尚書府其從官三千六百人又云肺神十四童子七女子母其從官三千六百人又曰魄者精氣之匡輔也

腎有兩枚重一斤一兩主藏志

楊曰腎引也腎屬水主引水氣灌注諸脈也其神六人司徒司宮司命○按史記正義引此下有故字二字又名倜儻　虞曰專意不移者志

膽在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁三合

楊曰膽敢也言其人有膽氣果敢也○按史記正義引此下有故字二字其神五人太一道君居紫房宮中其從官三千六百人賜神又名灌灌　虞曰膽者中正之官決斷出焉

胃重二斤二兩○按史記正義引此下有故字二字紆曲屈伸長二尺六寸大一尺五寸徑一寸半

腸胃大小不同其言胃大一尺五寸徑一寸也小腸徑八分大二寸四分則是也今言二寸半卽分之少半過腸徑一寸半卽大四寸五分今言大四寸卽少五分也廣腸徑二寸半卽大七寸五分今言八寸卽有剩五分也其升斗寸尺者先立其尺然後造其升斗秤兩皆以同身寸之爲法以尺造斗斗面闊一尺底闊七寸高四寸俱厚三分可容十升凡以木此四十三難曰人不食飲七日而死者何也然人胃中常有留指節者方一寸爲兩十六兩爲斤此制同身寸尺升斗之度爲人之腸胃斤重長短之法也

大腸重二斤十二兩長二丈一尺○按史記正義引此下有故字二字廻曲盤疊積十六曲盛穀二斗水一斗五升

小腸重二斤十四兩長三丈二尺○按史記正義引此句前與前文合半左迴輻積十六曲盛穀二斗四升水六升升三合合之太半

楊曰腸暢也言通暢胃氣去滓穢也其神二人元梁使者

小腸神又名溉潔　虞曰小腸者中正之官化物出焉

大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸半○按原本脫半字

楊曰胃圍也言圍受食物也其神十二人五元之氣諫議

大夫其胃神名且且　虞曰胃爲倉廩之官也

楊曰大腸卽迴腸也以其迴曲因以名之其神二人元梁

小腸神名涸涸　虞曰大腸者傳導之官變化出焉

膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合

楊曰膀橫也胱廣也言其體短而橫廣又名胞胞鞄也鞄者空也以備承水液焉○按原本脫液字依史記正義引此文補與前文合

州都之官津液藏焉

口廣二寸半脣至齒長九分齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半

楊曰舌者泄也言可舒泄言語也○按原本舒泄下有於字依史記正義刪

虞曰脣者金之門戶之扇舌者脣之機

咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸

楊曰咽嗌也言可以嗌物也又謂之呿言氣之流通貫要之處也咽爲胃之系也故經曰咽主地氣胃爲土故云主

喉嚨重十二兩廣二寸長一尺二寸九節

楊曰喉嚨空虛也言其中空虛可以通氣息焉卽肺之系也也呼吸之道路故經云喉主天氣肺應天故云主天氣也

喉嚨與咽並行其實兩異而人多惑之○按原本兩作無據史記正義引此文改正

肛門重十二兩大八寸徑二寸半長二尺八寸受穀九升

三合八分合之一

楊曰肛缸也言其處似車缸形故曰肛門卽廣腸也又言名灌灌　虞曰膿者中正之官決斷出焉

隨腸　丁曰前腸胃徑圍大小不同其言胃大一尺五寸徑一尺五寸圍三徑一也小腸徑八分大二寸四分則是也今言二寸半卽分之少半過腸徑一寸半卽大四寸五分今言大四寸卽少五分也廣腸徑二寸半卽大七寸五分今言八寸卽有剩五分也其升斗寸尺者先立其尺然後造其升斗秤兩皆以同身寸之爲法以尺造斗斗面闊一尺底闊七寸高四寸俱厚三分可容十升凡以木此四十三難曰人不食飲七日而死者何也然人胃中常有留指節者方一寸爲兩十六兩爲斤此制同身寸尺升斗之度爲人之腸胃斤重長短之法也

大腸重二斤十二兩長二丈一尺○按史記正義引此句前與前文合

楊曰大腸卽迴腸也以其迴曲因以名之其神二人元梁

小腸神名涸涸　虞曰大腸者傳導之官變化出焉

膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合

楊曰膀橫也胱廣也言其體短而橫廣又名胞胞鞄也鞄者空也以備承水液焉○按史記正義引此文改下同

州都之官津液藏焉

口廣二寸半脣至齒長九分齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半

楊曰舌者泄也言可舒泄言語也○按原本舒泄下有於字依史記正義刪

虞曰脣者金之門戶之扇舌者脣之機

咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸

楊曰咽嗌也言可以嗌物也又謂之呿言氣之流通貫要之處也咽爲胃之系也故經曰咽主地氣胃爲土故云主

喉嚨重十二兩廣二寸長一尺二寸九節

楊曰喉嚨空虛也言其中空虛可以通氣息焉卽肺之系也也呼吸之道路故經云喉主天氣肺應天故云主天氣也

喉嚨與咽並行其實兩異而人多惑之○按原本兩作無據史記正義引此文改正

肛門重十二兩大八寸徑二寸半長二尺八寸受穀九升

於內也故爲戶門者口齒心氣之所出也在心爲志出口爲言故齒爲心之門戶亦取摧伏五穀傳入於口也會厭爲吸門也會厭爲五藏音聲之門戶故云會厭爲吸門胃爲賁門賁者腐也胃氣之所出也胃出穀氣以傳於肺肺在膈上故以胃爲賁門也大倉下口爲幽門者腎氣之所出也太倉者胃也胃之下口在齊上三寸既幽隱之處故曰幽門大腸小腸會爲闌門闌門者遮失之義也言大小二腸皆輸瀉於廣腸廣腸既受傳而出之是遮失之意也故曰闌門下極爲魄門魄門者下極肛門也肺氣上通喉嚨下通於肛門是肺氣之所出也肺藏魄故曰魄門焉衝者通也出也言藏府之氣通出之所也

四十五難曰經言八會者何也然府會大倉

丁曰府會太倉者胃也其穴者中脘是也　虞曰太倉在心前鴈尾下四寸是也足陽明胃脈手太陽小腸脈手少陽三焦脈任脈之會本名中脘此云太倉也即胃之募也胃化氣養大府故云會

藏會季脇

丁曰藏會季脇軟肋之名其端有穴直臍章門穴是脾之募足厥陰少陽所會故曰藏會季脇也　虞曰是章門穴乃脾之募也直臍季脇端側臥屈上足伸下足齊脅取之乃足厥陰少陽之會也

筋會陽陵泉

丁曰陽陵泉穴名也在膝下一寸外廉是也　虞曰陽陵泉穴在膝下宛宛中足少陽膽脈氣所發也

髓會絕骨

丁曰髓會絕骨是骭名也其穴在外踝上四寸陽輔穴是也　虞曰絕骨乃陽輔穴也亦足少陽之脈氣所出也

而會扃俞

丁曰血會扃俞穴名也在第七椎下兩傍同身寸各一寸五分是也　虞曰扃俞二穴在脊骨第七椎下兩傍各一寸五分足太陽膀胱脈氣所發也

骨會大杼脈會太淵

丁曰骨會大杼穴名也在項後第一椎兩傍相去同身寸一寸五分陰陽脈氣始於寸口上行至頭耳故令面耐寒也

丁曰天地陰陽升降各有始終陽氣始於立春終於立冬陰氣始於立秋終於立夏其小滿芒種夏至小暑大暑此五節故以法象於頭故面獨能耐寒其小雪大雪冬至小寒太寒此五節法象人之足亦不耐其寒此之謂也　楊曰拔諸陰脈皆至頭面者少故以言之耳經云三百六十五脈悉會於頭面諸陰至頭面者少故以言之耳經云三百六十五脈悉會於頭面諸陽脈皆上

其痛按之而止者虛按之而其痛甚者實內外同法也
四十九難曰有正經自病有五邪所傷何以別之然經言憂
愁思慮則傷心
丁曰心主脈憂愁思慮即心脈不得宣行故傷心也　呂
曰心爲神五藏之君聰明才智皆由心出憂勞之甚則傷
其心心傷神弱也　虞曰任治於物滿箏栖靈曰心令憂
愁思慮不息故傷心也
形寒飲冷則傷肺
丁曰肺主皮毛惡其寒所以形寒飲寒則令傷其肺也
呂曰肺主皮毛形寒者皮毛寒也飲冷者傷肺也肺主受
水漿水漿不可冷飲肺又惡寒故曰傷也
恚怒氣逆上而不下則傷肝
丁曰肝主謀慮膽主勇斷故怒極即傷其肝也　虞曰素問云經
與膽爲藏府其氣勇故主怒怒則傷也
則血菀積於上焦名曰逆厥又曰怒甚嘔血氣逆使然故
傷也
飲食勞倦則傷脾
丁曰脾主味飲食味美而過食之無度勞動其力倦局其
足故傷脾也　呂曰飲食飽胃氣滿脾絡偃急或走馬跳
躍或以房勞脈絡裂故傷脾也　虞曰脾爲倉廩之官五
味出焉謂納其五味化生五氣以養人身今飲食勞倦而
致自傷是故聖人謹和五味骨正筋柔謹道如法長有尺
命安致自傷養生之道可不戒哉
久坐濕地強力入水則傷腎
丁曰腎主腰屬者腎之府久坐則腎氣不得宣行故損也
腎穴在足心底名曰涌泉居處濕地入水故有損也強力
者務快其心強合陰陽故傷其腎也　呂曰久坐濕地謂
遭憂喪強力者謂舉重引弩入水者謂復溺於水或婦人
經水未過強合陰陽也　虞曰土主濕自然之理也今久
坐濕地則外濕內感於腎合之風寒發爲瘡病強力過用
必致自飲也經脈別論曰持重遠行必傷於腎生氣通天
論曰因而強力腎氣乃傷高骨乃壞經脈別論曰度水跌
仆喘出於腎與門也

是正經之自病也
丁曰此五者皆正經自病非謂他邪也　呂曰此皆從其
藏內自發病不從外來也
病不從外來其義非也只如形寒飲冷傷肺者謂外寒感
於皮毛內合於肺此從外來也又飲冷入口內傷於肺亦
從外來也餘悉如此聖人大意言正經虛則腠理開腠理
開則外感於內故曰正經自病也
何謂五邪然有中風
丁曰中者傷也言中風者謂肝應風主色邪散於五藏爲
之五色也　呂曰肝主風木又聲木爲風
肝爲心邪故知當赤色也
呂曰肝主中風心主傷暑者今心病中風故知肝邪往傷
心也
其病身熱脇下滿痛
呂曰身熱者心滿痛者肝二藏之病證也　虞曰心主傷
暑病則身熱肝布兩脇故脇滿肝之乘心也
其脈浮大而弦
呂曰浮大者心弦者肝二藏脈見應也
何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心主臭
虞曰心火也火之化物五臭出焉
白入爲焦臭
虞曰火性炎上則生焦臭此曰正經自病也
入脾爲香臭
虞曰火之化土其臭乃香
入肝爲臊臭
虞曰火之化木其臭乃臊
入腎爲腐臭
虞曰火之化水其臭乃腐
入肺爲腥臭
虞曰火之化金其臭乃腥
故知心病傷暑得之也
熱而煩心痛其脈浮大而散
呂曰心主暑今傷暑此正經自病不中他邪
白入爲青
虞曰木經自病也
入心爲赤
虞曰肝邪入心其色乃赤
入脾爲黃
虞曰肝邪入脾其色黃也
入肺爲白
虞曰肝邪入肺故其色白
入腎爲黑
虞曰肝邪在腎其色黑
肝爲心邪故知當赤色也
呂曰肝主中風心主傷暑者今心病中風故知肝邪往傷

何以知飲食勞倦得之然當喜苦味也虞為不欲食實為欲食何以言之脾主味

入肝為酸

虞曰稼穡作甘證云甘受和故主味也

虞曰脾主味為邪乘肝病者乃喜酸味也

入心為苦

虞曰脾主味為邪干心病者乃喜苦味也

入肺為辛

虞曰脾主味為邪干肺病者乃喜辛味也

入腎為鹹

虞曰脾主味為邪干腎病者乃喜鹹味也

自入為甘

虞曰土為稼穡本經自病乃喜甘味也

故知脾邪入心為喜苦味也

呂曰心主傷熱脾主勞倦今心病以飲食勞倦得之故知脾邪入心也

其病身熱而體重嗜臥四肢不收

呂曰身熱者心也體重者脾也此二藏病證也

其脈浮大而緩

呂曰浮大者心脈緩者脾脈也

何以知傷寒得之然當譫言妄語何以言之肺主聲

虞曰五金擊之有聲故五音出於肺也

入肝為呼

虞曰木之畏金故呼啓之子云呼亦當嘯

入心為言

虞曰此云言素問云笑謂金火相當夫婦相見故言笑

入脾為歌

虞曰土母金子母子相見故有歌義

入腎為呻

虞曰金母水子子之見母發嫗呻聲也

自入為哭

虞曰肺主於秋秋者愁也其音商商傷也故知肺邪入心為譫言妄語也

呂曰心主暑肺主寒。按依前後注例此下得之之下當今心病以傷寒六字邪入心以為病也

其病身熱洒洒惡寒甚則喘咳

呂曰身熱者心惡寒者肺此二藏病證也

其脈浮大而濇

呂曰浮大者心脈濇者肺脈也

何以知中濕得之然當喜汗出不可止何以言之腎主濕

丁曰腎主水水化五液也　虞曰腎主水水流濕故五濕皆出於腎

入肝為泣

虞曰悲哀動中則傷魂魂傷則感而淚下謂肺主悲悲則金有餘木乃畏之水者木之母母憂子故肝為泣也

入心為汗

虞曰水火交泰蒸之為汗

入脾為液

虞曰土夫水妻妻從夫則生涎也

入肺為涕

虞曰北方生寒寒生腎今寒感皮毛內合於肺肺寒則涕是知入肺為涕

自入為唾

虞曰腎之脈上絡於舌故生唾也離中六二爻是也此則正經自病

故知腎邪入心為汗出不可止也

呂曰心主暑腎主濕今心病以傷濕得之故知腎邪入心也

其病身熱而小腹痛足脛寒而逆

呂曰身熱者心小腹痛者腎腎邪干心此二藏病證也

其脈沉濡而大

呂曰大者心脈沉濡者腎脈也

此五邪之法也

五十難曰病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪何以別之然從後來者為虛邪

丁曰假令心病得肝脈來乘是為虛邪肝是母心是子子能令母虛故云從後來者為虛邪　呂曰心王之時脈當洪大而長反得弦小而急是肝往乘心故言從後來也肝為心之母母之乘子是為虛邪也

從前來者為實邪

丁曰脾脈來乘是為實邪心是母脾是子而母能令子實故云從前來者為實邪也　呂曰謂心王得脾脈心王旺當傳脾今心王未旺是脾來逆奪其王故言從前來也脾者心之子子之乘母是為實邪

從所不勝來者為賊邪

丁曰火所不勝於水心病腎脈來乘故為賊邪　呂曰心王得腎脈水勝火故是為賊邪也

金有餘木乃畏之水者木之母母憂子故肝為泣也

從所勝來者為微邪

丁曰火所勝於金心病肺脈來乘故云微邪　呂曰心王反得肺脈火勝金故為微邪也

何以言之假令心病中風得之為虛邪傷暑得之為正邪

呂曰心主暑今心自病傷暑故為正邪也

飲食勞倦得之為實邪

呂曰從前來者脾乘心也脾主勞倦故為實邪

傷寒得之為微邪

呂曰從所勝來者肺乘心也肺主寒又畏心故為微邪也

中濕得之為賊邪

呂曰從所不勝來者腎乘心也腎主濕水剋火故為賊邪也　丁曰夫在天之寒在地為水在人為腎腎主水與寒在天之風在地為木在人為肝肝主風在天之暄暑在地為火在人為心心主暑在天之燥在地為金在人為肺肺主燥在天之濕在地為土在人為脾脾主濕此是天地人三才相通也今經以寒合肺以濕合腎以飲食勞倦合脾之然從後來者為虛邪

丁曰假令心病得肝脈來乘是為虛邪肝是母心是子子能令母實故云從後來者為虛邪也

五十一難曰病有欲得溫者有欲得寒者有欲得見人者有

不欲得見人者而各不同病在何藏府也然病欲得寒而欲見人者病在藏也何以言之府者陽也陽病欲得寒又欲見人藏者陰也陰病欲得温而不欲見人也諸以言之府者陽也陽病欲得寒也然陽者得温又欲閉戸獨處悪聞人聲故以別知藏府之病也

丁曰手三陰三陽應天主暗暑燥病即欲得寒明也是以欲得見人陽為府故言病在府也足三陰三陽應地主風寒濕故病即欲得温陰主藏故不欲見人也諸浮躁者病在手諸靜不躁者病在足

五十二難曰府藏發病根本等也其不等奈何然藏病者止而不移其病不離其處

丁曰藏病為陰陰主靜故止而不移　呂曰藏者陰決於地（一本決字作法）故不移動也

府病者彷彿賁衝上下行流居處無常

丁曰府病為陽主動故上下行流居處無常　呂曰府陽也陽者法天天有迴旋不休故病流轉居無常處也

故以此知藏府根本不同也

藏府傳病第八（凡二首）

五十三難曰經言七傳者死間藏者生何謂也然七傳者何以言之肝傳脾脾傳腎腎傳心心傳肺肺傳肝此其所勝也間藏者傳其子也何以言之假令心病傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一藏不再傷故言七傳者死也間藏者傳其所生也

丁曰經云前七傳者死後言間藏者生其言七傳者是五藏為陰傳其所勝間藏者是六府為陽故傳其所生亦五藏六府並應五行傳其所生者生傳其所勝者死其言傳肺肺死而不傳故一藏不再傷也　呂曰七當為次字之誤也此下有間字即知上當為次又有五藏心獨再傷為有六傳耳此蓋次傳其所勝藏故其病死也　虞曰七傳者死七字明也呂氏以七為次深為誤矣又聲音不相近也今明之以示後學謂五行相生而數之數終於五又却再數至二成七向上之五來傳於七七之被剋故云死也今舉一例以發明之假令相生之數數木火土金水木火第五水字隔第六木字來剋第七火字火被水剋故曰七傳下文云間藏者是第五水字下傳與第六木字見相生故曰間藏者生也呂氏言次者次正成間藏也

假令心病傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是母子相傳而復始如環之無端故言生也

丁曰其言心傳脾脾得生氣再傳於肺是母子相傳故言生也　呂曰間藏者間其所勝之藏而相傳也心勝肺脾間之肝勝脾心間之脾勝腎肺間之肺勝肝腎間之腎勝心肝間之此謂傳其所生也

五十四難曰藏病難治府病易治何謂也然藏病所以難治者傳其所勝也府病易治者傳其子也與七傳間藏同法也

丁曰藏者陰也病難治者謂言傳其勝也○按謂言二字當衍其一脾勝腎腎勝心心勝肺肺勝肝故難治也府者陽也病易治者謂言傳其子者即是木病傳火火病傳土土病傳金金病傳水水木遞相生即府病易治也是故與七傳間藏法同也　楊曰與前章略同也

藏府積聚第九（凡二首）

五十五難曰病有積有聚何以別之然積者陰氣也故陰沈而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣也積者陰氣也聚者陽氣也聚故積者五藏所生聚者六府所成也積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五藏所生聚者六府所成也積者陰氣也聚者陽氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也

丁曰積者陰氣所積是五藏傳其所勝當王時不受邪故留結為積所以止而不移也聚者六府之為病陽也所傳其子以迴轉不定又陽主動故無常處

楊曰息積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發咳逆寒熱連歲不已以季夏丙丁日得之何以言之肺病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎復欲還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏丙丁日得之此是五積之要法也

丁曰人之五藏本和謂态慾五情所以有增損故藏積生也榮氣常行不失節度謂之平人平人者不病也一藏受病則榮氣壅塞故病焉然五藏受病者則傳其所勝所勝適王則不肯受傳既不肯受則反傳所勝所勝復不為納於是則留結成積漸以長大病因成矣肥氣者肥盛也言肥氣聚於左脇之下如覆杯突出如肉肥盛之狀也小兒多有此病接前章有積有聚此章唯出五積之名狀不言諸聚聚者六府之病亦相傳行還如五藏以勝相加故不重言從省約也

心之積名曰伏梁起齊上大如臂上至心下久久不愈令人病煩心以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之

楊曰伏梁者言積自齊上至心下其大如臂狀似屋舍棟梁也

脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之

楊曰痞否也言否結成積也脾氣虛則胃中熱而引食焉脾病不能通氣行津液故雖食多而羸瘦也

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久久不已令人洒淅寒熱喘咳發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結為積故知息賁以春甲乙日得之

楊曰息長也賁奔也言肺在膈上其氣不行漸長而逼於膈故曰息賁一曰賁聚也言其漸長而聚菁肺為上蓋藏病難治所以證病上下左右無常處者此所謂陽證難治本末不死也故當經歷月故經言府病易治也

中陽也陽氣盛故令人發肺壅也

腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受故留結為積故知賁豚以夏丙丁日得之此是五積之要法也

丁曰人之五藏本和謂态慾五情所以有增損故藏積生

其病也故有積有聚積病為陰聚病為陽王時卽安失時卽病也舊經文注皆明矣　楊曰此病狀似豚而上衝心又有奔豚之氣非此積病也名同而疾異焉

五泄傷寒第十凡四首

五十七難曰泄凡有幾皆有名不然泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重胃泄者飲食不化色黃

楊曰泄利也胃屬土故其利色黃而飲食不化焉化變也消也言所食之物皆完出不消變也　虞曰此乃風入於腸上重於胃故使食不消化風論曰久風入中則為腸風飧泄飧泄為食不消化也

脾泄者腹脹滿泄注食卽嘔吐逆

楊曰注者無節度也言利下猶如注水不可禁止焉脾病不能化穀故食卽吐逆　虞曰中央生濕濕生土土生脾脾惡濕濕氣之勝故腹脹而泄注土性主信又主味今土病於味無信故食則吐逆陰陽應象論曰濕勝則濡瀉謂濕氣內攻脾胃則水穀不分故泄注

大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛

楊曰窘迫急也食訖卽欲利迫急不可止也白者從肺色焉腸鳴切痛者冷也切者言痛如刀切其腸之狀也　虞曰濕溫之病謂病人頭多汗出何以言之寸口脈陽脈見濡弱此水之乘火也本經曰腎主液入心成汗曰大腸氣虛所以食畢而急思厠虛則邪傷於內與邪相擊故切痛也

小腸泄者溲而便膿血少腹痛

楊曰小腸屬心心主血脈故便膿血小腸處在少腹故少腹痛也

大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便竝中痛此五泄之法也

楊曰瘕結也少腹有結而又下利者是也一名後重言大便處疼重也數欲利至所卽不利又痛引陰竝中此是腎泄也按諸方家利有二十餘種而此惟見五種者蓋舉其宗維耳　虞曰腎開竅於二陰氣虛故數思圊後重而不能便竝中痛腎氣不足傷於衝脈故裏急也靈樞病總曰凡五泄者春傷於風寒邪留連乃為洞泄

凡五泄者何經所主各隨其經所在而取之

丁曰肺者金主氣散行諸經不知何經虛而傳受此邪故隨其所在取其病邪也　楊曰兼鬼魘之氣散行諸經故不可預知臨病人而診之知其何經之動卽為治也

五十八難曰傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽浮而滑陰濡而弱

丁曰肌肉之上陽脈所行輕手按之狀若太過謂之滑肌肉之下陰脈所行重手按之不足謂之弱此者是按之不足舉之有餘故知中風也　楊曰自霜降至春分傷於風冷卽病者謂之傷寒其冬時受得寒氣至春又中春風而病者謂之溫病其至夏發者多熱病病而多汗者謂之濕溫其傷於八節之虛邪者謂之中風據此經言溫病則是疫癘之病非春病也疫癘者謂一年之中或一州一縣若大若小俱病者是也按之乃從往來如有舉之如無者謂之弱也卽以前浮滑尺中濡弱者也

濕溫之脈陽濡而弱陰小而急

丁曰陽濡而弱者肌肉之上陽脈所行濡弱者是濕氣所勝火也肌肉之下陰脈所行小急者是土濕之不勝木故見小急所以言陽濡而弱陰小而急也　楊曰濕溫之病謂病人頭多汗出何以言之寸口陽脈見濡弱此水之乘火也本經曰腎主液入心成汗此之謂也

傷寒之脈陰陽俱盛而緊滑

丁曰陰陽俱盛者極也謂寸尺脈俱盛極而緊滑此者中寒露之寒也水得風寒而凝結故知腎得寒而有此脈見也　虞曰如切繩狀曰緊如刀剖竹曰滑皮毛大腸為表裏藏病卽寒府病卽熱故病卽不欲臥近席也毛髮焦鼻槁不得汗者謂下有心火燥熱之為病不得汗之汗之卽死下之卽愈謂肺主燥故熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沉之而澀是心傷熱脈也　楊曰輕手按之卽浮重手按之卽沉浮者名浮沉之而滑者輕手按之而散澀者沉手按者名浮重手按之而滑是津液虛少也　楊曰輕手按者名沉也

溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之

丁曰脾候身之肌肉胃為表裏藏病卽體寒府病卽體熱肌寒熱者皮膚痛層舌槁無汗

故言肌寒熱也皮膚痛層舌槁脾者應土土主濕故皮膚津液出體重其津液外泄卽唇舌槁病名濕燥無以汗之汗之卽腸胃瀉不通下之卽泄注此者是濕氣之為病當

溫中調氣也

胃寒熱者病無所安汗注不休齒本槁痛

丁曰胃主胃與膀胱爲表裏病在陽即身熱體重惡寒在陰即寒病無所安腎主水汗注不休齒本槁痛汗即愈下即死陰盛陽虛故死　楊曰五藏六府皆有寒熱此經惟出三狀餘皆閏也

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂之始發少臥而不饑自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也丁曰狂病者病在手三陽而反汗故陽盛即發狂也病在足三陰而反下故陰盛即發癲也　楊曰狂病之候觀其人初發之時不欲眠臥又不肯飲食自言賢智尊貴歌笑行走不休皆陽氣盛所爲故經言重陽者狂此之謂也今人以爲癲疾謬矣

癲疾始發意不樂直視倜仆其脈三部陰陽俱盛是也

丁曰經言重陽者狂重陰者癲今三部陰陽俱盛是陽尺爲陰寸尺俱盛極而沈也　楊曰癲也發則僵仆也今焉故有癲厥之言也陰氣大盛故不得行立而側仆也今人以爲癎病誤矣

六十難曰頭心之病有厥痛有眞痛何謂也然手三陽之脈受風寒伏留而不去者則名厥頭痛入連在腦者名眞頭痛丁曰手三陽者陽中之陽今受風寒伏留不去即是三陽逆於上故名曰厥頭痛入連在腦者名曰眞頭痛也言手三陽海風寒入即死矣　楊曰去者行也厥者逆也言手三陽之脈伏留而不行則壅逆而衝於頭故名厥頭痛陽留壅亦作頭痛今經不言之從省久故也（甚久字當作文）歲曰風冷之氣入於三陽之經故頭厥痛也其痛立已眞頭痛者謂風冷之氣入於泥丸宮則爲髓海耶入則曰眞頭痛其痛甚氣入深故也風寒之氣循風府入於腦故云入連腦也

其五藏氣相干名厥心痛

楊曰諸經絡皆屬於心若一經有病其脈逆行逆則乘心乘心則心痛故曰厥心痛是五藏氣衝逆致痛非心家自痛也

其痛甚但在心手足青者即名眞心痛其眞心痛者旦發夕死夕發旦死

丁曰眞心不病外經受五邪相干名曰厥心痛也　楊曰心者手足青而冷神門穴絕者死病名眞心痛也五藏六府之主法不受病病即神去氣場故手足爲之青冷也心痛手足冷者爲眞心痛手足溫者爲厥心痛也頭痛亦然從今日平旦至明日平旦爲一日今云旦發夕死夕發旦死是正得半日而死也

神聖工巧第十一　凡一首

六十一難曰經言望而知之謂之神聞而知之謂之工切脈而知之謂之巧何謂也然望而知之者望見其五色以知其病

楊曰望色者假令肝部見青色者肝自病見赤色者心病見黃色者脾病見白色者肺病見黑色者腎病是也

聞而知之者聞其五音以別其病

楊曰五音者謂宮商角徵羽也以配五藏假令病人好哭者肺病也好歌者脾病也故云聞其音知其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

楊曰問病人云好辛味者則知肺病也好食冷者則知內熱故云知所起所在

切脈而知之者診其寸口視其虛實以知其病病在何藏府也

丁曰視當作持字爲以手循持其寸口也

謂按寸口之脈若弦多者肝病也洪多者心病也浮數則病在府沉細則病在藏故云在何藏也（但殿本作府字）

經言以外知之曰聖以內知之曰神此之謂也

丁曰夫脈合五色色合五味味合五音故有此望聞問切之法經內前篇具說習之者能知此乃是神聖工巧之良醫也　楊曰視色聽聲切脈皆在外而知內之病也

藏府井俞第十二　凡七首

六十二難曰藏井榮有五府獨有六者何謂也然府者陽也三焦行於諸陽故置一俞名曰原府有六者亦與三焦共一氣也

丁曰三焦者臣使之官位應相火宣行君火命令使行於諸陽經中故置一俞名曰原所以府有六亦是三焦之一氣故三焦共一氣也　楊曰五藏之脈皆以所出爲井所流爲榮所注爲俞所行爲經所入爲合是謂五俞以應金木水火土也六府亦並以所出爲井所流爲榮所注爲俞所行爲經所入爲合其俞亦應五行惟原獨不應所以六府有六俞亦以應六合於乾道也然五藏亦有原則以第三穴爲原所以不別立穴者五藏法地地卑故三焦之氣經過而已所以無別穴六府既是陽三焦亦是陽故云共一氣也

上六氣者風寒暑燥濕火也五行者金木水火土也十一之氣相因而成人應之乃六府法六氣五藏法五行亦十一之氣相因而成也天得六謂天屬陽以陰數配之地得五謂地屬陰以陽數配之而成陰陽也人府藏亦然六府配六氣者謂膽木配風膀胱水配寒小腸火配暑大腸金配燥胃土配濕三焦少陽配火三焦爲原氣在六府陽脈中自立一爲原也五藏配五行者肝木心火脾土肺金腎水五藏法陰無原一穴者謂五行陰脈穴中原氣暗主之故原井俞同一穴也（原井俞爲原此井字疑衍）故曰三焦共一氣其理明矣詳此經義前後問荅文理有闕

六十三難曰十變言五藏六府榮合皆以井爲始者何也然井者東方春也

虞曰經言井者東方春也春者施化育無求其報春者仁也在五常仁乃法水水之有仁者井水也井水濟人亦無求報故經云井者東方春也易曰井養而不窮可象春仁也

萬物之始生

虞曰萬物始生由春氣之化育也

諸蚊行喘息蜎飛蠕動當生之物莫不以春而生

虞曰井有仁焉故聖人涉春育物以象於井也夫蚊灰方飛蟄蟲始振所以蚊蟲行喘蟲息蜎蟲飛蠕蟲動皆因春氣也

故歲數始於春
虞曰春木也下文甲亦木井有仁仁亦木也今以井為始者謂甲木在歲春為首在經脈井為首在日甲為首在經脈井為首故也
日數始於甲故以井為始也
楊曰凡藏府皆以井為始井者主出之義也泉水既生留停於近縈迂未成大流故名之曰滎滎者小水之狀也留停既深便有注射輸文之處故名之曰俞俞者委積迅流行經歷而成渠徑經經者徑也亦經歷之義也此是水行流轉行既達合會於海故名之曰合合者會也
之義人之經脈亦法於此故取名焉所以井為始春者以其所生之義也歲數始於春者正月為歲首故也
於甲者謂東方甲乙也正月與甲乙皆屬於春也
十二經氣穴三百六十五穴皆以井為始各有其終矣

王翰林集註黃帝八十一難經卷之四

難經集註卷之五
六十四難曰十變又言陰井木陽井金陰滎火陽滎木陰俞土陽俞木陰經金陽經火陰合水陽合土陰陽皆不同其意何也然是剛柔之事也陰井乙木陽井庚金陽井庚庚者乙之剛也陰井乙乙者庚之柔也乙為木故言陽井金也餘皆倣此
丁曰經言剛柔者謂陰井木陽井金陰滎火陽滎木俞為木經為火合為土陰滎火陽滎水王水為剛丁火為柔陰俞土陽俞木甲木為剛己土為柔陰經金陽經火丙火為剛辛金為柔陰合水陽合土戊土為剛癸水為柔　楊曰五藏皆為陰陰井木榮為木榮為火俞為土經為金合為水六府為陽陽井為金榮為水俞為木經為火合為土以陰井木配陽井金是陰陽夫婦之義故云乙為庚之柔庚為乙之剛餘並如此也
虞曰所剋者為妻謂孤陽不生孤陰不長故井榮亦名夫婦剛柔相因而成也
六十五難曰經言所出為井所入為合其法奈何
楊曰奈何猶如何也
然所出為井井者東方春也萬物之始生故言所出為井也所入為合合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也
丁曰人之陽氣隨四時而出入故春氣在井夏在滎秋在俞冬在合其所取氣穴皆隨四時而制之也　楊曰春夏主生養故陽氣在外秋冬主收藏故陽氣在內人亦法之
六十六難曰經言肺之原出于大淵
丁曰在右手掌後魚際下是脈之大會故云肺之原出于太淵　楊曰穴在掌後是也
原原與俞共一穴所出難經又言五藏有俞無原所出乃亦針經中俞穴也兩義皆通也
心之原出于大陵
丁曰在掌後兩筋間陷中此是心包絡之原也　虞曰在掌後兩骨間
肝之原出于太衝
虞曰在足大指本節後二寸是也
或一寸半是也
脾之原出于大白
丁曰在足內側核骨下
腎之原出于太谿
丁曰在足內踝後跟骨間是也
少陰之原出于兌骨
丁曰神門穴是也此是真心之脈也　楊曰此皆五藏俞也所以五藏皆以俞為原少陰真心脈也亦有原在掌後兌骨端陷者中一名神門一名中都前云心之原出于大陵者是心胞絡脈也凡云心病者皆在心胞絡脈矣真心不病故無俞今有原者外經之病不治內藏也
膀之原出于鳩墟
丁曰在足外踝下微前是也　楊曰足內踝後微前也
胃之原出于衝陽
丁曰在足跗上五寸骨間動脈是也
三焦之原出于陽池
丁曰在手小指次指本節後陷中是也　楊曰手表腕上陷中是也
膀胱之原出于京骨
丁楊曰在足外側大骨下赤白肉際
大腸之原出于合谷
丁曰在大指次指間虎口內　楊曰手大指岐骨間
小腸之原出于腕骨
丁曰在小指腕骨內　楊曰在手腕陷中指腕者誤也
虞曰以上十二經皆配之五行其五行行勝之年於于前先瀉其原不足之年先補其原即此原也
十二經皆以俞為原者何也然五藏俞者三焦之所行氣之所留止也三焦所行之俞為原者何也然膀下腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原三焦者原氣之別使也主通行三氣經歷於五藏六府原者三焦之尊號也故所止輒為原五藏六府之有病者取其原也
楊曰臍下腎間動氣者丹田也丹田者人之根本也精神之所藏五氣之根元太子之府也男子以藏精女子主月水以生養子息合和陰陽之門戶也在臍下三寸方圓四

寸附著脊服兩腎之根其中央黃左青右白上赤下黑三
寸法三才四寸法四時五色法五行兩腎之間名曰大海
一名溺水中有神龜呼吸元氣流行則為風雨通氣四肢
無所不至也腎者分為日月之精虛無之氣入之根本也
齊者人之命也分為一名太中極一名太淵一名鬼當一
名持樞一名五城五城有真人即五帝也五城之外有八
使者即八卦神也八使者并太一為九卿八卦之外有十
二樓樓有十二子也并三焦神為二十七大夫又并四支
神為八十一元士齊中央名太一君之侯王王天大將軍
特進侯主人身中萬二千神也郊在頭上腦戶中廟在項
後頂上社在脾左端稷在大腸穀風伯在八門八門在膀
胱兩師在小腸窮四瀆雲氣在胃窌雨水在胞中所以備
言此者欲明腎為人生之本焉故知丹田者性命之本也
道士思神比邱坐禪皆行心氣於臍下者良為此也故云
原者三焦之尊號也三焦合氣於腎故也　虞曰在天則
三元五運相因而成在人則三焦五藏相因而成也素問
曰其氣三其生五此之謂也磨玄子曰人之所存秉五行
之運用徵其本始從三氣以生成此則天地之原氣也故
五藏六府有病皆取其原也　丁曰三焦者是十二經根
本是生氣之原也為臣使之官宣行榮衛所以在陽經輒
有其原也



手厥陰心包絡之經起於中衝穴在手中指之端去爪
甲角如韭葉是也終於天池穴在乳後一寸著脇
肋間是也



手太陽小腸之經起於少澤穴在手小指之端去爪甲
下一分是也終於聽宮穴在耳內珠子上是也

手陽明大腸之經起於商陽穴在手大指次指之側去
爪甲角如韭葉是也終於迎香穴在鼻孔傍禾髎上是
也

手少陽三焦之經起於關沖穴在手小指次指之側去
爪甲角如韭葉是也終於耳門穴在耳前起肉缺者是
也



手太陰肺之經起於少商穴在手大指內側去爪甲角
如韭葉是也終於中府穴在雲門下一寸乳上三肋間
是也



手少陰心之經起於少沖穴在手小指內側去爪甲
角如韭葉是也終於極泉穴在腋下筋間動脈是也



靈樞經曰少陰獨無俞者不病乎言外經病而藏不病
也是治外不治內也故少陰貞心應君火之位故不治
內而治外也

足厥陰肝之經起於大敦穴在足大指之端去爪甲角
如韭葉是也終於期門穴在不容傍一寸五分二肋端
是也

足陽明胃之經起於鼻兌穴在足大指次指之端去爪甲角如韭葉是也終於頭維穴在面五行頭角髮際本神傍一寸五分是也



足太陽膀胱之經起於睛明穴在目內眥淚孔邊是也終於至陰穴在足小指外側去爪甲角如韭葉是也



足少陰腎之經起於湧泉穴在足心陷中屈足卷指宛宛中是也終於俞府穴在璇璣傍二寸巨骨下是也



足少陽膽之經起於瞳子髎穴在足小指次指之端去爪甲角如韭葉是也終於曉干髎穴在目外皆五分是也



足太陰脾之經起於隱白穴在足大指內側之間去爪甲肉如韭葉是也終於大包穴在淵腋下三寸九助間是也

丁曰人背爲陽腹爲陰是言五藏俞皆在陽者肺俞二穴在第三椎下兩傍相去同身寸之一寸五分也心俞二穴在第五椎下兩傍相去同身寸之一寸五分是也肝俞二穴在第九椎下兩傍相去同身寸之一寸五分是也脾俞二穴在第十一椎下兩傍相去同身寸之一寸五分是也腎俞二穴在第十四椎下兩傍相去同身寸之一寸五分是也肺之募中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間是也心之募巨闕一穴在鳩尾下一寸是也脾之募章門二穴在季脇下直齊是也肝之募期門二穴在不容兩傍一寸五分是也腎之募京門二穴在腰中季脇本是也　楊曰腹爲陰五藏之募皆在腹故云募皆在陰背爲陽五藏之俞皆在背故云俞皆在陽內藏有病則出行於陽陽俞在背也外體有病則入行於陰陰募在腹也故鍼法云從陽引陰從陰引陽此之謂也

呂曰井者木木者肝肝主滿也　虞曰井法木以應肝脾位在心下心下滿令治之於井不令木乘土也

榮主身熱

呂曰榮者火火者心心主身熱也　虞曰榮爲火以法心肺屬金外主皮毛令心火灼於肺金故身熱謂邪在心也故治之於榮不令火乘金則身熱必愈也

俞主體重節痛

呂曰俞者土土者脾脾主體重也　虞曰俞者法土應脾令邪在土土必刑水水者腎腎主骨故病則節痛邪在土土自病則體重宜治於俞穴

經主喘咳寒熱

呂曰經者金金主肺肺主寒熱也　虞曰經法金應肺令邪在經則肺爲病得寒則咳得熱則喘今邪在金金必刑木木者肝肝在志爲怒怒則氣逆乘肺故喘何以然謂肝之支別從肝別貫膈上注肺脈要精微論曰血在脇下令人喘逆此之謂也治之於經則金不刑於木矣

合主逆氣而泄

呂曰合者水水主腎腎主泄也　虞曰合法水應腎腎不足傷於衝脈則氣逆而裏急腎主開竅於二陰腎氣不禁故泄泄在水水必乘火火者心法不受病肝木爲心火之母爲腎水之子一要母受邪二要子被刑肝在志爲怒怒則怒怒則氣逆故也此五行更相乘剋故病有異同今治之於合不令水乘火火則肝木不受邪故氣逆止邪不在腎則無注泄以上井榮俞經合法五行應五藏邪淺其中

故主病如是善診者當審而行之則知自病或相乘虛則補之實則瀉之

此五藏六府其井榮俞經合所主病也

丁曰此是五藏井榮俞經合也經言井主心下滿者為肝病即逆滿當取其諸井以主其心下滿也榮主身熱者榮火也故身熱當取其諸榮以主其熱也俞主體重節痛者土也故令體重節痛當取其諸俞以主其體重節痛也經主喘咳寒熱者金也故喘咳而發寒熱當取其諸經以主其喘咳寒熱也合主逆氣而泄合為水水主泄當取其諸合以主逆氣而泄也　虞曰以上井榮俞經合之生病各依四時而調治之謂四時之邪各滙榮俞中留止也

用鍼補瀉第十三　凡十三首

六十九難曰經言虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之何謂也然虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之不虛以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之

丁曰此經先立井榮俞經合配象五行即以十二經中各有子母遞相生養然後言用鍼補瀉之法也假令足厥陰肝之絡中虛即補其足厥陰經合是母也實即瀉足厥陰經榮是子也如無他邪即當自取其經故言以經取之

楊曰春得腎脈為虛邪是腎虛不能傳氣於肝故補腎有病則傳之於肝肝為腎子故曰補其母也春得心脈為實邪是心氣盛實逆來乘肝故瀉心心平則肝氣通肝為心母故曰瀉其子也不實不虛是諸藏不相乘也春得弦多及但弦者皆是肝藏自病也則自於足厥陰少陽之經而補瀉焉當經有金木水火土隨時而取之也

七十難曰經言春夏刺淺秋冬刺深者何謂也然春夏者陽氣在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣在下故當深取之

丁曰春夏刺淺秋冬刺深者經言春夏刺井榮從肌肉淺薄之處秋冬刺經合從肌肉深厚之處此是因時隨所在刺之也　楊曰經言春氣在毫毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨此四時之氣也其四時受病亦各隨正氣之深淺故用針者治病各依四時氣之深淺而取之也

春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也然春夏溫必致一陰秋冬寒必致一陽者初下針沈之至腎肝之部得氣引持之陰也

病即逆滿當取其諸井以主其心下滿也榮主身熱者榮火也故身熱當取其諸榮以主其熱也俞主體重節痛者土也故令體重節痛當取其諸俞以主其體重節痛也經主喘咳寒熱者金也故喘咳而發寒熱當取其諸經以主其喘咳寒熱也合主逆氣而泄合為水水主泄當取其諸合以主逆氣而泄也　虞曰以上井榮俞經合之生病各依四時而調治之謂四時之邪各滙榮俞中留止也

用針之道常瀉其多也

七十二難曰經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必在陰陽何謂也然所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來也隨其逆順而取之故曰迎隨調氣之方必在陰陽者知其內外表裏隨其陰陽而調之故曰調氣之方必在陰陽

丁曰夫榮衛通流散行十二經之內即有始有終其始自中焦注手太陰一經一絡然後手陽明注一經一絡其經絡有二十四日有二十四時皆相合此凡氣始至而用針取之名曰迎而奪之其氣流注終而內針出而將其穴名曰隨而濟之又補其母亦名曰隨而補之瀉其子亦名曰迎隨也此者是調陰陽之法故曰必在陰陽也　楊曰榮氣者晝行於身體夜行於藏府迎者逆也隨者順也謂衛氣逆行榮氣順行病在陽必候榮衛行至于陽分而刺之病在陰必候榮衛行至於陰分而刺之是迎隨之意也又迎者瀉也隨者補也故經曰迎而奪之安得無虛言瀉之則實也隨而濟之安得無實言補之則虛也調氣之方必在陰陽者陰虛陽實則補陰瀉陽陽虛陰實則補陽瀉陰或陰陽并於陽陰并於陽或陰陽俱虛或陰陽俱實皆隨病所往而調其陰陽則病無不已　虞曰迎取也乃五行六氣各有勝復假令木氣有餘之年於王前先瀉其化源玄珠密語曰木之行勝也蒼埃先見於林木木乃有聲宮音失調傀儡不滋濕雨失合先於十二月瀉其化源故曰迎也不足之年補於化源故曰隨也調氣之方必在陰陽者言引外至內引內至外也謂月生無瀉月滿無補定人之呼吸觀日之寒溫從陽引陰從陰引陽春夏致一陰秋冬致一陽故曰調氣之方必在陰陽也知其內外表裏者謂察脈之浮沈識病之虛實以外知內視表如裡故曰知其內外表裏也隨其陰陽而調之者謂各隨病在何陰陽脈中而調治之也

七十三難曰諸井者肌肉淺薄氣少不足使也刺之奈何然

諸井者木也榮者火也火者木之子當刺井者以榮瀉之故經言補者不可以爲瀉瀉者不可以爲補此之謂也

丁曰諸井在手足指梢故言肌肉淺薄也井爲木是火之母榮爲火是木之子故肝木實瀉其榮肝木氣虛不足補其合瀉之復不能補故言不可以爲補也　楊曰冬病在藏取之應井刺井者則瀉其榮以去其病故經曰冬陰氣繁陽氣伏故取井以下陰氣逆取榮以通陽氣也

虞曰不至而至故春乃瀉榮也

七十四難曰經言春刺井夏刺榮季夏刺俞秋刺經冬刺合何謂也然春刺井者邪在肝夏刺榮者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎

丁曰其言春刺井者謂邪在肝無令肝木邪害於脾土故刺諸井也夏刺榮者謂邪在心無令心火邪害於肺金故刺諸榮也季夏刺俞者謂邪在脾無使脾土邪害於腎水故刺諸俞也秋刺經者謂邪在肺無令肺金邪害於心火故刺諸經也冬刺合者謂邪在腎無令腎水邪害於肝木故刺諸合也此是斷五邪之原法也　楊曰用針微妙法無窮若不深達變通難以救疾者矣至如此說則是變通之義也經云冬刺井春刺榮此乃云春刺井夏刺榮理極精奇特宜留思不可固守以一槩之法也　虞曰春刺井夏刺榮季夏刺俞秋刺經冬刺合乃經之大法也七十三難以言春刺於榮此乃休王未畢火奪木王法曰實邪故瀉之於榮所以經言瀉者不可以爲補也

其肝心脾肺腎而繫於春夏秋冬者何也然五藏一五也假令肝病色青者肝也臊臭者肝也喜酸者肝也喜泣者肝也其病衆多不可盡言也四時有數而並繫於春夏秋冬者也鍼之要妙在於秋毫者也

丁曰人之五藏繫於四時五藏一病輒有五者謂五聲五色五味五液五香○按此二字疑衍五臭若持鍼者皆能斷其五邪令中病源故知鍼之要妙在於秋毫不可不通也　楊曰五藏六府病各有形證今略舉肝家一藏以爲法爾雖言春刺井夏刺榮若一藏有病脈亦隨之診而取之假令肝自病實則取肝中火瀉之虛則取肝中木補之餘皆倣此即秋毫微細之意也言用針微細若秋毫矣　虞曰五藏各有聲色臭味液以爲形證以合四時井榮俞經合而行補瀉之法也微妙之理若秋毫之在目也

七十五難曰經言東方實西方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火土當更相平東方木也西方金也木欲實火當平之水金木水火土當更相平東方木也西方金也木欲實金當平之火欲實水當平之上欲實木當平之金欲實土當平之東方肝也則知肝實西方肺虛瀉南方補北方水水者木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水水者木之子也北方水火者木之子也北方水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水也經曰不能平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂也

丁曰四方者五行之正位也其王應四時即春應東方木夏應南方火秋應西方金冬應北方水長夏應中央王南方火實勝西方金即北方水來復勝火水且待爭反害於肺今當先瀉南方火實即還北方水肺金得平也平者謂不能傳氣與金金乃虛故曰母能令子實子能令母虛也

四方虛實之法也　楊曰五行以勝相加故木木肝也金肺也肺氣虛弱肝氣強實木反侮伏欲來平木金木若戰二藏則傷故用針者診知其候則須瀉心心氣既通肝氣則復又補於腎腎家得氣傳而後肝肝氣已定則肺不復來平肝然後卻補脾母氣傳子子便安定故曰不能治其虛何問其餘此之謂也一本說楊氏曰金剋木今據肝家一條以例五藏假令東方木肝實西方金肺虛肝木實陵肺金虛金本剋木木伏金肝欲制肺肺乃不伏二藏爭勝反害於火宜瀉其心心屬火火者木之子子氣既通肝虛則伏肝氣既復則肺不復來然後補其脾脾是肺母母氣授子子氣便實故言母能令子實子能令母虛不能治其虛何問其餘　虞曰五藏五行更相平伏宜瀉補瀉以調治之素問曰邪氣盛則實眞氣奪則虛以下凡有虛實皆準此也經言木實金虛瀉火補水也夫木實者謂木有餘則二遥畏之土畏之則金無所養而今金虛也若不瀉火火心盛而燥金金乃仇讎於木金木相勝而致雨相刑剋故瀉火子合母氣木亦不實火亦不平金土亦無所畏乃行氣養火火不平金衰於金也金虛者乃補水禦火補水養木禦火火不平金衰木木亦安復故曰子能令母實也木有餘則土乃畏木土不能傳氣與金金乃虛故曰母能令子虛也

行補瀉之法也微妙之理若秋毫之在目也

七十六難曰何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣然當補之時從衛取氣

虞曰肺行五氣流灌五藏通注六經歸於百脈凡取氣須以補之故曰當補之時從衛取氣此之謂也

白衛取氣得氣乃推內鍼於所虛之經脈淺深分部之所

以補之故曰當補之時從衛取氣

當瀉之時從榮置氣

虞曰邪在榮分故內鍼於所實之經待氣引針而瀉之故曰當瀉之時從榮置氣置者取也迎也

其陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰

虞曰假令膽不足肝有餘先補足少陽而後瀉足厥陰也

陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽

虞曰反於上法

榮衛通行此其要也

楊曰此是陰陽更虛更實之變須通榮衛病則愈也　丁曰其當補之時從榮置氣榮者陰也當瀉之時從衛取氣衛者陽也故從榮置氣置榮而後瀉之陰陽有餘不足當先補其不足然後瀉其有餘故得榮衛通行即是持鍼之要妙故言其要也

七十七難曰經言上工治未病中工治已病者何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之與脾故先實其脾氣無令得受肝之邪故曰治未病中工治已病者見肝之病不曉相傳但一心治肝故曰治已病也

丁曰素問曰春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春此四時五行相勝之理也人之五藏有餘者行勝不足者受邪上工先補不足無令受邪而後瀉有餘此是治未病也中工持針即便瀉有餘故言治已病也　楊曰五藏得病皆傳其所勝肝病傳脾脾傳肺之類是也若當其王時則不受傳即不須行此方也假令肝病當傳脾脾以季夏王正王則不受邪故不須實脾氣也若非季夏則受肝邪便當預令實脾氣勿令得受肝邪也如此者謂之上工工猶妙也言妙達病源者也其中工未能全解故止守一藏而已

七十八難曰針有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出內針也

楊曰補者呼則出針瀉者吸則內鍼故曰呼吸出內鍼也

虞曰謂用鍼補瀉之法呼吸取生成之數爲之然知爲鍼者信其左不知爲鍼者信其右當刺之時必先以左手厥按所鍼榮俞之處彈而努之爪而下之其氣之來如動脈之狀順鍼而刺之得氣因推而內之是謂補動而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死不治也

楊曰凡欲下鍼之法先知穴處便以左手按之乃以右手彈其所按之處脈動應在左手之下仍即以左手指按之然後循鍼而刺之得氣應於針下因推入榮中此是補也若得氣便搖轉而出之此是瀉也若久留針而待氣如則於衛中留鍼待氣久不得又內入於榮中久留其三處候氣不應於鍼者謂陰陽俱盡不可復針如此之候十人十死故云十死不治衛爲陽陽爲外故云男外榮爲陰陰爲內故云女內也

虞曰自衛得氣推之以所虛之分開穴出針曰補也自衛取氣引針開穴出針曰瀉也候吸內鍼呼盡出鍼曰先補後瀉反此行之則曰先瀉後補也玄珠密語稱其補瀉法云按之得氣內於天部天部得氣推之至地部天地氣相接則出針曰瀉反此行之曰補與此義相反

丁曰知爲鍼者信其左謂左手先按所刺之穴以其氣來如動脈而應其手即內其針亦是迎而奪之爲之瀉氣過而順鍼而刺之是爲隨而濟之也其男子陽氣行於外女人陰氣行於內男子則輕手按其穴女子則重手按其穴過時而氣不至不應其左手者皆不可刺之也刺之則無功謂氣絕故十死不治也何待留鍼而候氣也

七十九難曰經言迎而奪之安得無虛隨而濟之安得無實虛之與實若得若失實之與虛若有若無何謂也然迎而奪之者瀉其子也隨而濟之者補其母也假令心病瀉手心主俞

虞曰心病邪瀉手心主俞心者法不受病受病者心包絡也包絡中俞者土也心火也土之母也上是火子乃瀉其俞此乃瀉子也是謂迎而奪之者也

虞曰迎謂取氣奪謂瀉氣也

補手心主井是謂隨而濟之者也

虞曰心火井木今補心主之井謂補母也木者火之母也隨謂自衛取氣濟謂補不足之經所謂實之與虛者牢濡之意也

虞曰牢濡虛實之意也

氣來牢實者爲得濡虛者爲失故曰若得若失也

楊曰此是當藏自病而行斯法非五藏相乘也

藏虛即補其母是謂隨而濟之實則瀉其子是謂迎而奪之況欲行其補瀉即先候其五藏之脈及所刺穴中如氣來牢實者可瀉之虛濡者可補之若持針不能明其牢濡者故者得若失也

八十難曰經言有見如入有見如出者何謂也然所謂有見如入者（○附氏本鍼云有見如入下當欠有見如出四字）謂左手見氣來至乃內鍼入見氣盡乃出針是謂有見如入有見如出也

丁曰欲刺人脈先以左手候其穴中之氣其氣來至候氣盡乃出其鍼者非迎隨瀉補之穴也謂不虛不實自取其經施此法也

楊曰此還與彈而努之爪而下之相類也

八十一難曰經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脈也謂病自有虛實耶其損益奈何然是病非謂寸口脈病自有虛實也假令肝實而肺虛肝者木也肺者金也金木當更相平當知金平木假令肺實而肝虛微少氣用鍼不瀉其肝而反重實其肺故曰實實虛虛損不足而益有餘此者中工之要害也

丁曰中者傷也謂昧學之工不能明其五藏之剛柔而鍼藥誤投所以反增其害十人全八能知二藏也令肝虛肺實二藏之病全六反增其害也

楊曰上工治未病知其虛實之原故補瀉而得其宜中工未審傳病之本所治反增其害也

音釋

六十七難鼻音畀　六十八難厭益涉切

錄攷之耳因質諸醫官多紀廉夫廉夫云近代醫書絕無援引久疑散佚廉夫於醫家雅稱賅洽而其言如此則知其果失傳也夫方伎一家固有其人其存其佚何干我事然小道可觀至理存焉則竟非可棄也癸亥花朝天瀑識

先秦醫書之存于今者素問靈樞並爲後人竄亂惟難經尚係原本吳呂廣唐楊元操並有註釋之爲難經本義二卷元滑伯仁採諸家之說而以已意折衷之爲難經本義然所採甚略惟明王九思等集註備錄諸說不下一語深得古人撰述之體今去明李儲二百載而諸家之註亡佚殆盡獨此書以流入日本佚而復存若有神物呵護今爲校正刊入叢書是書存而呂楊丁虞五家之註具存於以考其異同而究其得失亦醫家所當盡心者也首載楊元操序稱難經爲秦越人作壹唐以前已有此說故醫家重之惟其以右腎爲命門以兩寸候大小腸與內經不合遂起後人難端今按素問三部九候論以頭面諸動脈爲上三部兩手動脈爲中三部兩足動脈爲下三部而難經以寸關尺爲三部尺爲三部浮中沈爲九候則二書診法本自不同不得以彼難此諸家疑大小腸在下焦不當候之兩寸不知兩手六部皆非藏府定位不過借手太陰一經動脈以候五藏六府之有餘不足吳草廬李濱湖已有定論即難經所言脈位乃是因五行之氣而推十八難云金生水水流下行而不能上故爲下部本生火火炎上行而不能下故爲上部土主中宮故爲中部觀靈樞十二經脈雖各有起止各有支別而實一氣貫注如環無端故兩手六部亦展轉相生今謂二腸之氣不得隨經而至於肓寸豈其然乎命門二字並不見於內經素問刺禁論七節之旁中有小心揚上善以爲腎焉元臺以爲心包亦無命門之說後人謂命門在兩腎中間形如胡桃此真無稽之談而俗醫靡然從之難經之意不過以腎爲一身之根本人身左血右氣血爲陰氣爲陽兩腎之中以右腎爲九重故名之曰命門自古命門治法亦惟溫補腎陽而謂兩腎外別有命門豈非欲求勝於古人而不顧其心之所安者乎近世周省吾謂不有越人何從有命門之說旨哉斯言如呼越人而使之疑矣大率宋元以來說經者好爲脫解而餘波所漸乃併及於醫事此醫所以鄭諸家之註未必盡是然前賢之言可喜可喜之談由是以溝求蘊奧俾古人之意晦而復明而玩味古人者亦得以闚其口而奪之氣詎不足重也與庚子春

阮元撰

難經集注五卷

周秦越人撰越人即扁鵲事迹具史記本傳明王九思等集注九思字敬夫鄠縣人宏治十才子之一內辰進士由庶吉士授檢討調吏部主事遷郎中坐劉瑾黨降壽州同知尋致仕事迹附明史李夢陽傳餘則未詳難經雖不見于漢藝文志而隋唐志已著錄凡八十一章編次爲十三類理趣深遠非易了然九思因集吳呂廣唐楊元操宋丁德用虞庶楊康侯名家之說彙爲一書以便觀者案宋晁公武讀書志云德用以楊元操所演甚失大義因改正之經文隱奧者繙爲俚以明之然則書中針灸補瀉用所爲足編日本人用活字板擺印呂楊各注今皆未見傳本亦藉此以存矣

難經本義

滑壽注

難經本義序

素問靈樞醫之大經大法在焉後世諸方書皆本於此然其言簡古淵涵未易通曉故秦越人發為八十一難所以推明其義也然越人去古未遠其言亦深一文一字莫不周密故為之註釋者亦數十家但各以臆見而卒無歸一之論或得此而失彼或舉前而遺後非惟自誤又以誤人識者病焉許昌滑君伯仁篤實詳敬博極羣書工於醫者三十四年起廢愈痼不可勝紀遂晝惟夕思旁推遠索作難經本義二卷析其精微採其隱賾鉤其玄要疑者辨之誤者正之諸家之善者取之於是難經之書辭達理明條分縷解而素問靈樞之奧亦由是而得矣夫人之生死係於醫醫之本原出於經經之旨不明其害可勝言哉然則伯仁之功豈小補者耶

至正二十六年二月工部郎中揭汯序

難經本經序

醫之為道聖矣自神農氏其神本金石可濟夫天死札瘥悉列諸經而八十一難自秦越人推本軒岐鬼臾區之書發難析疑論辯精詣鬼神無遁情為萬世法其道與天地並立功豈小補也哉且夫人以七尺之軀五臟百骸受病六氣之診乃繫於三指點按之下一呼一吸之間無有形影特切其洪細滿伏若一疑苟或謬誤則厥生而藥死之矣而可輕以諶醫而可易以習哉耶寓鄞滑伯仁故家許許去東垣近蚤為李氏之學遂名于醫子雅聞之未識也今年秋來遺所誤難經一帙閱之使人起敬有是哉君之精意於醫也條釋圖陳脈絡尺寸部候虛實簡而通決而明予雖未嘗學而忍亦過半矣嗚呼醫之道生道也道行則生意充宇宙澤流無窮人以瘝死是則往聖之心也世之學者能各置一通於側而深求力討之不為良醫也者幾希烏乎越人我師也伯仁不為我而刊諸梓與天下之人共之是則伯仁之心也故舉其大指為序

至正七十五年龍蛇甲辰十月既望翰林學士承旨榮祿大夫知制誥兼修國史張翥序

難經本義卷上

周　盧國扁鵲秦越人撰
元　許昌滑壽伯仁本義

一難曰十二經皆有動脈獨取寸口以決五臟六腑死生吉凶之法何謂也

十二經謂手足三陰三陽合爲十二經也手經則太陰肺陽明大腸少陰心太陽小腸厥陰心包少陽三焦也足經則太陰脾陽明胃少陰腎太陽膀胱厥陰肝少陽膽也皆有動脈者如手太陰脈動中府雲門天府俠白手陽明脈動合谷陽谿手少陰脈動極泉手太陽脈動天窓手厥陰脈動勞宮手少陽脈動衝陽大迎人窮足太陰脈動箕門衝門足陽明脈動迎氣衝足少陰脈動太谿陰谷足太陽脈動下關聽會之厥陰脈動太衝五里陰廉足少陽脈動下廉聽會之類也謂之經者以榮衛之流行經常不息者而言也故經者徑也之脈者以血理之分表行體者而言也脈者陌也越人之意蓋謂凡此十二經經皆有動脈之處陌度人之寸口以決藏府死生吉凶何耶

然寸口者脈之大會手太陰之脈動也爲諸脈此一篇之大指下文乃詳言之寸口謂氣口也居手太陰魚際卻行一寸之分氣口之下曰關曰尺云者皆手太陰所歷之處而手太陰又爲百脈流注朝會之始也五藏別論帝曰氣口何以獨爲五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味入口藏於胃以養五藏氣而變見於氣口也靈樞第一篇云脈會太淵五脈論云行奇恒之法自太陰始注謂先以氣口太陰之脈定四時之正氣然後度量奇恒之氣也經脈別論云氣口成寸以決死生合數論而觀之信知寸口當手太陰之部而爲脈之大會明矣此越人立問之意所以獨取夫寸口而後世宗之爲不易之法著之篇首乃開卷第一義也學者詳之

人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也故五十度復會於手太陰寸口者五藏六腑之所終始故法取於寸口也

一難曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大要會也

尺說文云尺度名十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺規矩事也古者寸尺只尋常仞諸度量皆以人之體爲法故从尸从乙象布指之狀三十分也人手卻一寸動脈謂之寸口从又从一〇象如說文所紀尤可見人體中脈之尺寸也尺陰分寸陽分也人之一身經絡奚衛五藏六腑莫不由於陰陽而或過與不及於尺見焉故爲脈之大要會也一難言寸口爲脈之大會以肺朝百脈而言也此言尺寸爲脈之大要會以陰陽對待而言也大抵手太陰之脈由中焦出行一路直至兩手大指之端其魚際卻行一寸九分通謂之寸而關在其中矣

從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口陽之所治也

關者掌後高骨之分寸後尺前兩境之間陰陽之界限也從關至尺澤謂之尺尺之內陰所治也從關至魚際是寸口之內陽所治也故孫思邈云從肘腕中橫文至掌魚際後文卻而十分之而入取九分時九十六刻計一萬二千九百六十息刻之餘分得五百四十息合一萬三千五百息也一息脈行六寸每二刻二百七十息脈行一十六丈二尺每時八刻脈行六十四丈八尺榮衛四周於身十二時計九十六刻脈行七百七十七丈六尺爲四十八周身刻之餘分行二周身得三十二丈四尺總之爲五十度周身脈得八百一十丈也此呼吸之息脈行之數周身之度合晝夜百刻之詳也行陽行陰謂行晝行夜也

二難曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大要會也

尺說文云尺度名十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺規矩事也古者寸尺只尋常仞諸度量皆以人之體爲法故从尸从乙象布指之狀三十分也人手卻一寸動脈謂之寸口从又从一〇象如說文所紀尤可見人體中脈之尺寸也尺陰分寸陽分也人之一身經絡奚衛五藏六腑莫不由於陰陽而或過與不及於尺見焉故爲脈之大要會也一難言寸口爲脈之大會以肺朝百脈而言也此言尺寸爲脈之大要會以陰陽對待而言也大抵手太陰之脈由中焦出行一路直至兩手大指之端其魚際卻行一寸九分通謂之寸而關在其中矣

從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口陽之所治也

關者掌後高骨之分寸後尺前兩境之間陰陽之界限也從關至尺澤謂之尺尺之內陰所治也從關至魚際是寸口之內陽所治也故孫思邈云從肘腕中橫文至掌魚際後文卻而十分之而入取九分

是爲尺此九分者自肘腕入至魚際爲一尺十分之寸取第九分之一寸中爲脈之尺位也更之一寸爲十寸取第九分之一寸中爲脈之寸位也從魚際後文卻還度取十分之一則是寸此寸字非寸關尺之寸乃從肘腕橫文至魚際卻而取十分中之一是一寸也以此一寸之中取九分爲脈之寸口故下文云寸十分之而入取九分之中則寸口也

故分寸爲尺分尺爲寸

寸爲陽尺爲陰陽上而陰下寸之下尺也尺之上寸也關居其中以爲限也分寸爲尺分尺爲寸此之謂也

數分猶別也

故陰得尺內一寸陽得寸內九分

老陰之數終於十故陰得尺內之一寸此尺字指魚際至尺澤通計十寸者而言老陽之數極於九故陽得寸內之九分此寸字指魚際後一寸而言

尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

寸爲尺之始尺爲寸之終云尺寸者以終始對待而言其實則寸得九分尺得一寸皆陰陽之盈數也蘊安常云越人取手太陰之行度魚際後一寸九分以配陰陽之數蓋謂此也

三難曰脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也

太過不及病脈也關格覆溢死脈也關格之說素問六節藏象論及靈樞第九篇第四十九篇皆主氣口也今越人迎以陽經取決於人迎陰經取決於氣口也今越人迎脈謂無胃氣以和之也凡人得此脈雖不病猶死也

人乃以關前關後言者以寸爲陽而尺爲陰也

然關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及

關前爲陽寸脈所動之位脈見九分而浮九陽數寸之位浮陽脈是其常也過謂過於本位過於本脈之浮也

及謂不及本位不及常脈是皆病脈也

遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也

遂者徑也徑行而直前也謝氏謂遂者直上直下殊無迴旋之生意有旨哉經曰陰氣太盛則陽氣不得相營也以陽氣不得營於陰陰遂上出而溢於魚際之分爲外關內格也外關內格謂陽外閉而不下陰從而外出以格拒之此陰乘陽位之脈也

關之後者陰之動也脈當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及

關後爲陰尺脈所動之位脈見一寸而沈一寸陰數尺之位沈陰脈是其常也過謂過於本位過於常脈不及謂不及本位不及常脈皆病脈也

遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈也

經曰陽氣太盛則陰氣不得相營也以陰不得營於陽陽遂下陷而覆於尺之分爲內關外格也內關外格謂陰內閉而不上陽從而內入以格拒之此陽乘陰位之脈也

故曰覆溢

覆如物之覆由上而頓於下也溢如水之溢由內而出乎外也

是其眞藏之脈人不病而死也

覆溢之脈乃孤陰獨陽上下相離之診故曰眞藏之脈謂無胃氣以和之也凡人得此脈雖不病猶死也

○此篇言陰陽之太過不及也爲病脈猶未至危殆若遂上魚入尺而爲覆溢則死脈也此遂字最爲切緊蓋承上起下之要言不然則太過不及陰陽相乘覆溢渾爲一意漫無輕重矣或問此篇之陰陽相乘與二十難之說同異曰此篇乃陰陽相乘之極而爲覆溢二十難則陰陽更相乘而伏匿也更之一字與此篇遂字大有遷庭更者更互之更遂者直遂之遂而覆溢與伏匿又不能無辨蓋覆溢爲死脈伏匿爲病脈故不可同日語也（此書首三篇乃越人開卷第一義也一難言寸口統陰陽關尺而言二難言尺寸以陰陽始終對待而言關亦在其中矣三難之覆溢以陰陽關格而言尤見關爲津要之所合而觀之三部之義備矣一二難言陰陽之常三難言陰陽之變

四難曰脈有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脈在中

呼出爲陽吸入爲陰心肺爲陽腎肝爲陰各以部位之高下而應之也一呼再動心肺主之一吸再動腎肝主之呼吸定息脈五動閏以太息脾之候也故曰呼吸之間脾受穀味也其脈在中在中者在陰陽呼吸之中何則以脾受穀味灌溉諸藏諸藏皆受氣於脾土主中宮之義也

浮者陽也沈者陰也故曰陰陽也

浮爲陽沈爲陰此承上文而起下文之義

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濇者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之濡舉指來實者腎也脾者中州故其脈在中是陰陽之法也

心肺俱浮而有別也心爲陽中之陽故其脈浮而大散肺爲陽中之陰故其脈浮而短濇肝腎俱沈而有別也肝爲陰中之陽故其脈牢而長腎爲陰中之陰故其脈按之濡舉指來實古益袁氏謂腎屬水脈按

之濡舉指來實外柔內剛水之象也脾說見前

脈有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰二陰一陽三陰如此之言寸口有六脈俱動邪然此言者非有六脈俱動也謂浮沈長短滑濇也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也短者陰也濇者陰也所謂一陰一陽者謂脈來沈而滑也一陰二陽者謂脈來沈滑而長也一陰三陽者謂脈來浮滑而長時一沈也所謂一陽一陰者謂脈來浮而濇也一陽二陰者謂脈來長而沈濇也一陽三陰者謂脈來沈濇而短時一浮也各以其經所在名病逆順也

又設問答以明陰陽脈見於三部者不單至也惟其不單至故有此六脈相兼而見浮者輕手得之長者遍度本位滑者往來流利皆陽脈也沈者重手得之短者不及本位濇者往來凝滯皆陰脈也惟其相兼故有一陰一陽又一陽一陰如是之不一也夫脈之所至病之所在也以脈與病及經絡藏府參之某爲宜某爲不宜四時相應不相應以名病之逆順也

五難曰脈有輕重何謂也然初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺部也如六菽之重與血脈相得者心部也如九菽之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也故曰輕重也

肺最居上主候皮毛故其脈如三菽之重心在肺下主血脈故其脈如六菽之重肝在脾下主筋故其脈如十二菽之重腎在肝下主骨故其脈按之至骨舉指來實腎不言菽以類推之當如十五菽之重今案此法以輕重

言之部浮中沈之意也然於權素無所見將古脈法而有所授受邪抑越人自得之見邪脈歟謝氏曰此寸關尺所主藏府各有分位而一部之中脈又自有輕重因舉陵陽虞氏說云假令左手寸口如三菽之重得之乃知肺氣之至如六菽之重得之知本經之至餘以類求之夫如是乃知五藏之氣更相滅灌六脈因並亦有準繩可以定吉凶言疾病矣關尺皆然如十難中十變脈例而消息之也

六難曰脈有陰盛陽虛陽盛陰虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛浮沈以下指輕重言盛虛以陰陽盈虧言輕手取之而見減小重手取之而見實大知其爲陰盛陽虛也重手取之而見損小輕手取之而見實大知其爲陽盛陰虛也不拘何部率以是推之

七難曰經言少陽之至乍大乍小乍短乍長陽明之至浮大而短太陽之至洪大而長太陰之至緊大而長少陰之至緊細而微厥陰之至沈短而敦此六者是平脈邪將病脈邪然皆王脈也

六者之王說見下文

其氣以何月各王幾日然冬至之後得甲子少陽王復得甲子陽明王復得甲子太陽王復得甲子少陰王復得甲子厥陰王王各六十日六六三百六十日以成一歲此三陽三陰之王時日大要也

上文言三陽三陰之王脈此言三陽三陰之王時當其時則見其脈也歷家之說以上古十一月甲子合朔冬至爲歷元蓋取夫氣朔之分齊也然天度之運與日月之行遲速不一歲各有差越人所謂冬至之後得甲子亦以此歟是故氣朔之不齊節候之早晚不能常也故丁氏注謂冬至之後得甲子或在大寒之後少陽之至始於此餘經各以次繼之紀氏亦謂自冬至之日一陽始生於冬至之後得甲子少陽脈王也若原其本始以十一月甲子合朔冬至常例推之則少陽之王便當從此日始至正月中餘經各以次繼之少陽之至陽氣尚微故其脈乍大乍小乍短乍長陽明之至猶有陰也故其脈洪大而長陽大而短太陽之至陽盛而極也故其脈洪大而長盛極則變而之陰矣故夏至後爲三陰用事之始而太陰之至陰氣尚微故其脈緊大而長少陰之至陰漸盛也故其脈緊細而微厥陰之至陰盛而極也故其脈沈短而敦陰盛極則變而之陽復三陽用事之始也此則三陽三陰之王脈所以周六甲而循四時率皆從微以至於著自漸而趨於極各有其序也

袁氏曰春温而夏暑秋涼而冬寒故人六經之脈亦隨四時陰陽消長迭運而至也○劉温舒曰至真要大論云厥陰之至其脈弦少陰之至其脈鈞大陰之至其脈沈少陽之至大而浮陽明之至短而濇太陽之至大而長亦隨天地之氣卷舒也如春弦夏洪秋毛冬石之類則五運六氣四時亦皆應之而見於脈爾若平人氣象論太陽脈至洪大而長少陽脈至乍數乍疎乍短乍長陽明脈至浮大而短難經引之以論三陰三陽之脈者以陰陽始生之淺深而言之也○

篇首稱經言二字攷之樞素無所見平人氣象論雖

略有其說而不詳豈越人之時別有所謂上古文字耶將內經有之而後世脫簡耶是不可知也後凡言經言而無所攷者義皆倣此

八難曰寸口脈平而死者何謂也然諸十二經脈者皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動氣也此五臟六腑之本十二經脈之根呼吸繫則莖葉枯矣寸口脈平而死者生氣獨絕於內也

腎間動氣人所得於天以生之氣也腎爲子水位乎坎北方卦也乃天一之數而火木金土之先也所以爲生氣之原諸經之根本又爲守邪之神也原氣勝則邪不能侵原氣絕則死如木根絕而莖葉枯矣故寸口脈平而死者以生氣獨絕于內也○此篇與第一難之說義若相悖然各有所指也一難以寸口爲脈之大會而穀氣之變見也此篇以原氣言也人之原氣盛則生原氣絕則寸口脈雖平猶死也原氣言其體穀氣言其用也

九難曰何以別知藏府之病耶然數者府也遲者藏也數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒故以別知藏府之病也

凡人之脈一呼一吸爲一息一息之間脈四至問以太息脈五至命曰平人平人者不病之脈也其有增減則爲病焉故一息三至曰遲不足之脈也一息五至曰數有餘之脈也一息六至曰大過之脈也藏爲陰府爲陽脈數者屬府爲陽爲熱脈遲者屬藏爲陰爲寒不特是也諸陽脈皆爲熱諸陰脈皆爲寒藏府之病由是別之

十難曰一脈爲十變者何謂也然五邪剛柔相逢之意也假令心脈急甚者膽邪干心也心脈微緩者小腸也心脈緩甚者脾邪干心也心脈微緩者胃邪干小腸也心脈濇甚者肺邪干心也心脈微濇者大腸邪干小腸也心脈沈甚者腎邪干心也心脈微沈者膀胱邪干小腸也五藏各有剛柔邪故令一脈輒變爲十也

五邪者謂五藏六府之氣失其正而爲邪者也剛柔者陽爲剛陰爲柔也剛柔相逢謂藏府互相傷也五藏五府各有五邪以脈之來甚者屬藏微者屬府特以心藏發其例餘可類推故云一脈輒變爲十也

十一難曰經言脈不滿五十動而一止一藏無氣者何藏也然人吸者隨陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肝而還故知一藏無氣者腎氣先盡也

靈樞第五篇曰人一日一夜五十營以營五藏之精不應數者名曰狂生所謂五十營者五藏皆受氣其脈口數其至也五十動不一代者五藏皆受氣四十動一代者三藏無氣十動一代者二藏無氣不滿十動一代者一藏無氣三十動一代者一藏無氣二十動一代者三藏無氣十動一代者四藏無氣十動一代者五藏無氣予之短期按五藏皆受氣持吸氣最遠若五十動不滿而一止者知腎無所資氣當先盡盡猶衰竭也衰竭則不能踏諸藏氣而上矣

十二難曰經言五藏脈已絕於內用鍼者反實其外之絕何以別之然五藏脈已絕於內者腎肝氣已絕於內也而醫反補其腎肝陽絕補陰陰絕補陽是謂實實虛虛損其心肺五藏脈已絕於外者其心肺脈已絕於外也而醫反瀉其心肺是謂虛虛實實損不足益有餘如此死者醫殺之耳

靈樞第四篇黃帝曰色脈已定別之奈何岐伯曰調其脈之緩急大小滑濇肉之堅脆而病變定矣黃帝曰調之奈何岐伯答曰脈急尺之皮膚亦急脈緩尺之皮膚亦緩脈小尺之皮膚亦減而少氣脈大尺之皮膚亦賁而起脈滑尺之皮膚亦滑脈濇尺之皮膚亦濇凡此變者有微有甚故善調尺者不待於寸善調脈者不待於色能參合而行之者可以爲上工上工十全九行二者爲中工中工十全八行一者爲下工下工十全六〇此通上文所爲色脈形肉不相失也

五藏各有聲色臭味當與寸口尺內相應其不應者病也假令色青其脈浮濇而短若大而緩爲相勝浮大而散若小而滑爲相生也

若之爲言或也舉色青爲例以明相勝相生也青者肝之色浮濇而短肺脈也爲金尅木大而緩脾脈也爲木尅土此相勝也浮大而散心脈也爲木生火小而滑腎脈也爲水生木此相生也此所謂得相勝之脈即死得相生之脈病即自已也

經言知一爲下工知二爲中工知三爲上工上工者十全九中工者十全八下工者十全六此之謂也

說見前三謂色脈皮膚三者也〇此篇問答凡五節第一節爲問辭第二第三節言色脈形肉不得相失第四節言五藏各有聲色臭味當與寸尺相應然假令以下但言色脈相參不言聲臭味殆闕文歟揜色之著于外者將切於參驗歟第五節則以所知之多寡爲工之上下也

十四難曰脈有損至何謂也然至之脈一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一至曰離經再呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脈也至脈從下上損脈從上下也

平人之脈一呼再至一吸再至呼吸定息脈四至加之則爲過滅之則不及過與不及所以爲至爲損焉離經者離其經常之度也奪精精氣衰奪也至脈從下而逆上由腎而之肺也損脈從上而行下由肺而之腎也謝氏曰平人一呼再至脈行三寸今一呼三至則脈行四寸半一息之間行九寸二十息之間一百八十丈比平人行遠過六十丈此至脈之離經也平人一呼脈再至行三寸今一呼一至只得一寸半二十息之間脈遲行六十丈此損脈之離經也若夫至脈之奪精一呼四至則一息之間行三寸其病又甚損脈之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五藏六府三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於床反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚而毛落者死

至於收病也當作至脈之病也於收二字誤肺主皮毛心主血脈脾主肌肉肝主筋腎主骨各以所主而見其所損也反此爲至脈之病者損脈從上下至脈之著于外者將切於參驗歟第五節則以所知之多寡爲工之上下也

寡爲工之上下也

十四難曰脈有損至何謂也然至之脈一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一至曰離經再呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脈也至脈從下上損脈從上下也

平人之脈一呼再至一吸再至呼吸定息脈四至加之則爲過滅之則不及過與不及所以爲至爲損焉離經者離其經常之度也奪精精氣衰奪也至脈從下而逆上由腎而之肺也損脈從上而行下由肺而之腎也謝氏曰平人一呼再至脈行三寸今一呼三至則脈行四寸半一息之間行九寸二十息之間一百八十丈比平人行遠過六十丈此至脈之離經也平人一呼脈再至行三寸今一呼一至只得一寸半二十息之間脈遲行六十丈此損脈之離經也若夫至脈之奪精一呼四至則一息之間行三寸其病又甚損脈之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五藏六府三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於床反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚而毛落者死

至於收病也當作至脈之病也於收二字誤肺主皮毛心主血脈脾主肌肉肝主筋腎主骨各以所主而見其所損也反此爲至脈之病者損脈從上下至脈之著于外者將切於參驗歟第五節則以所知之多寡爲工之上下也

寡爲工之上下也

十四難曰脈有損至何謂也然至之脈一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一至曰離經再呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脈也至脈從下上損脈從上下也

平人之脈一呼再至一吸再至呼吸定息脈四至加之則爲過滅之則不及過與不及所以爲至爲損焉離經者離其經常之度也奪精精氣衰奪也至脈從下而逆上由腎而之肺也損脈從上而行下由肺而之腎也謝氏曰平人一呼再至脈行三寸今一呼三至則脈行四寸半一息之間行九寸二十息之間一百八十丈比平人行遠過六十丈此至脈之離經也平人一呼脈再至行三寸今一呼一至只得一寸半二十息之間脈遲行六十丈此損脈之離經也若夫至脈之奪精一呼四至則一息之間行三寸其病又甚損脈之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五藏六府三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於床反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚而毛落者死

衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法也

肺主氣心主血脈腎主精各以其所損而調治之榮衛者血脈之所資也脾主受穀味故損其脾者調其飲食適其寒溫如春夏食涼食冷秋冬食溫食熱及衣服起居各當其時是也肝主血血虛則中不足一云肝主怒怒能傷肝故損其肝者緩其中經曰肝苦急急食甘以緩之緩者和也

脈有一呼再至一吸再至有一呼三至一吸三至有一呼四至一吸四至有一呼五至一吸五至有一呼六至一吸六至有一呼一至一吸一至有再呼一至再吸一至有呼吸再至脈來如此何以別知其病也

此再舉損至之脈爲問答也蓋前之損至以五藏自病得之於內者而言此則以經絡血氣爲邪所中之微甚自外得之者而言也其曰呼吸再至即一呼一至一吸一至之謂疑衍文也

然脈來一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至爲遠得病前大後小即胸滿短氣一呼四至一吸四至病欲甚脈洪大者苦頭滿沈細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露一呼五至一吸五至其人當困沈細夜加浮大晝加不大不小雖困可治其有小大者爲難治一呼六至一吸六至爲死脈也沈細夜死浮大晝死一呼一至一吸一至名曰損人雖能行猶當著床所以然者血氣皆不足故也再呼一至再吸一至呼吸再至此四字即前衍文名曰無魂無魂者當死也人雖能行名曰行尸

一息四至是爲平脈一呼三至一吸三至是一息之

問脈六至比之平人多二至故曰逆得病未甚也然又以前大後小前小後大而言病能也前後非言寸尺猶十五難前曲後居之前後以始末言也一呼四至一吸四至病欲甚矣故脈洪大者苦煩滿病在肓也沈細者腹中痛病在下也各以其脈言之滑爲傷熱者熱傷氣而不傷血血自有餘故脈滑也濇爲中霧露者霧露之寒傷人榮血血受寒故脈濇也一呼五至一吸五至其人困矣若脈更見浮大沈細則各隨晝夜而加劇以浮大順晝陽也沈細順夜陰也若不見二者之脈人雖困猶可治小大即沈細浮大也一呼六至一吸六至增之極也故爲死脈沈細夜死浮大晝死陰遇陰陽遇陽也一呼一至一吸一至名曰損以血氣皆不足也再呼一至再吸一至謂兩息之間脈再動減之極也經曰形氣有餘脈氣不足者死故曰無魂而當死也

上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無能爲害所以然者譬如人之有尺樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脈有根本人有元氣故知不死譬如二字當在人之有尺下

此又以脈之有無明上下部之病也紀氏曰上部脈下部無脈是邪實并於上卽當吐也若無吐證爲上無邪而下氣竭故云當死東垣李氏曰下部無脈此木鬱也飲食過飽填塞于胸中太陰之分而春陽之令不得上行故也是爲木鬱木鬱則達之謂吐之是也謝氏曰上部無脈下部有脈者陰氣盛而陽氣微故雖困無能爲害上部無脈如樹枝之槁下部有脈如樹之有根惟其有根可以望其生也○四明陳氏曰至進也陽獨盛而至數多也損減也陰獨盛而至數少也至脈從下上謂無陰而陽獨行至于上則陽亦絕而死矣損脈從上下謂無陽而陰獨行至于下則陰亦盡而死矣○一難言寸口以決藏府死生吉凶謂氣口爲五藏主也四難言脾受穀味其脈在中是五藏皆以胃爲主其脈則主關上也此難言人之有尺譬如樹之有根脈有根本人有元氣故知不死則以尺爲主也此越人所以錯綜其義散見諸篇以見寸關尺各有所歸重云

十五難曰經言春脈弦夏脈鉤秋脈毛冬脈石是王脈耶將病脈也然弦鉤毛石者四時之脈也春脈弦者肝東方木也萬物始生未有枝葉故其脈之來濡弱而長故曰弦夏脈鉤者心南方火也萬物之所茂垂枝布葉故曰鉤秋脈毛者肺西方金也萬物之所終草木堇葉皆秋而落其枝獨在若毫毛也故其脈之來輕虛以浮故曰毛冬脈石者腎北方水也萬物之所藏也盛冬之時水凝如石故其脈之來沈濇而滑故曰石此四時之脈也

此內經平人氣象玉機眞藏論參錯其文而爲篇也

春脈弦者肝主筋應筋之象夏脈鉤者心主血脈應血脈來去之象秋脈毛者肺主皮毛冬脈石者腎主骨冬應其象兼以時物之象取義也來疾去遲劉立之曰來者自骨肉之分而出於皮膚之際氣之升而上也去者自皮膚之際而還於骨肉之分氣之降而下也

如有變奈何

脈逆四時之謂變

秋脈毛反者爲病何謂反然其氣來實強是爲太過病在外氣來虛微是謂不及病在內氣來厭厭聶聶如循榆莢曰平益實而滑如循長竿曰病急而勁益強如新張弓弦曰死春脈微弦曰平弦多胃氣少曰病但弦無胃氣曰死春以胃氣爲本夏脈鉤反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脈來累累如環珩曰平來而益數如雞舉足者曰病前曲後居如操帶鉤曰死夏脈微鉤曰平鉤多胃氣少曰病但鉤無胃氣曰死夏以胃氣爲本秋脈毛反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脈來厭厭聶聶如落葉曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋脈微毛曰死秋脈微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋以胃氣爲本冬脈石反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在內其脈來發發如彈石曰平發多胃氣少曰病但石無胃氣曰死冬以胃氣爲本

春脈太過則令人善忘忽忽眩冒癲疾不及則令人胸痛引背下則兩脇胠滿夏脈太過則令人身熱而肩痛爲浸淫不及則令人煩心上見欬唾下爲氣泄秋脈太過則令人逆氣而背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下閙病音冬脈太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如飢狀中清脊中痛少腹滿小便變此岐伯之言也

越人之意蓋本諸此變脈言氣者脈不自動氣使之然且主胃氣而言也循據也按也春脈脈聲聲如

循榆莢弦而和也蓋實而滑如循長竿弦多也急而勁蓋強如新張弓弦但弦也夏脈累累如連珠如循琅玕鈎而和也如雞舉足鈎多而有力也前曲後居謂按之堅而搏尋之實而偪但鈎也秋脈溝溝如車蓋按之蓋大微毛也不上不下如循雞羽毛多也按之蘧索如風吹毛但毛也冬脈上大下兌大小遲均石而和也上下與來去同義見前篇啄啄連屬其中微曲石多也來如解索去如彈石但石也大抵四時之脈皆以胃氣爲本故有胃氣則生胃氣少則病無胃氣則死於弦鈎毛石中每有和緩之體爲胃氣也此篇與內經中互有異同馮氏曰越人欲使脈之易曉重立其義爾按內經第二卷平人氣象論篇云平肝脈來軟弱招招如揭長竿末梢平肺脈來厭厭聶聶如落榆莢平腎脈來喘喘累累如鈎按之而堅病腎脈來如引葛按之益堅死腎脈來發如奪索辟辟如彈石此爲異也

胃者水穀之海主禀四時皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會也

胃屬土土之數五也萬物歸之故云水穀之海而水火金木無不待是以生故云主禀四時禀供也給也脾者中州也其平和不可得見衰乃見耳來如雀之啄如水之下漏是脾衰之見也

脾者中州謂呼吸之間脾受穀味其脈在中也其平和不得見蓋脾寄王於四季不得獨主於四時四藏之脈平和則脾脈在中矣衰乃見者雀啄屋漏異乎常也雀啄者脈至堅銳而斷續不定也屋漏者脈至緩散動而復止也

十六難曰脈有三部九候有陰陽有輕重有六十首一脈變爲四時離聖久遠各自是其法何以別之

謝氏曰此篇問三部九候以下共六件而本經並不答所問似有缺文今詳三部九候則十八難中第三章言之當屬此篇錯簡在彼陰陽見四難輕重見五難一脈變爲四時即十五難春弦夏鈎秋毛冬石也六十首按內經方盛衰篇曰聖人持診之道先後陰陽而持之奇恆之勢乃六十首王註謂奇恆六十首今世不存則失其傳者由來遠矣

然是其病有內外證

此蓋答辭然與前問不相蒙當別有問辭也

其病爲之奈何

問內外證之詳也

然假令得肝脈其外證善潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者肝也無是者非也

得肝脈診得弦脈也肝與膽合爲清淨之府故善潔面青肝之色也此外證之色脈情好也臍左肝之部也按之牢若痛謂其動氣按之堅牢而不移或痛也馮氏曰肝氣盛則四支滿閉傳曰風淫末疾是也厥陰脈循陰器肝病故溲便難轉筋者肝主筋也此內證之部屬及所主病也

假令得心脈其外證面赤口乾喜笑其內證齊上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而惋有是者心也無是者非也

掌中手心主脈所過之處蓋眞心不受邪受邪者手心主荷惋乾嘔也心病則火盛故惋經曰諸逆衝上皆屬於火諸嘔吐酸皆屬於熱

假令得脾脈其外證面黃善噫善思善味其內證當齊有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛息塞喘臥四支不收有是者脾也無是者非也

靈樞口問篇曰噫者寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故爲噫經曰脾主四肢

假令得脾脈其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內證齊右有動氣按之牢若痛其病喘欬洒淅寒熱有是者肺也無是者非也

皮伯曰陽氣和利滿于心出于鼻故爲嚏洒淅寒熱

肺主皮毛也

假令得腎脈其外證面黑善恐欠其內證齊下有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者腎也無是者非也

腎氣不足則爲恐陰陽相引則爲欠泄而下重少陰動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者肝也無是者非也

泄也如瀆爲而

十七難曰經言病或有死或有不治自愈或遠年月不已其死生存亡可切脈而知之耶然可盡知也

此篇所問者三答云可盡知也而止答病之死證餘無所見當有闕漏

診病若閉目不欲見人者脈當得肝脈強急而長而反得肺脈浮短而濇者死也

肝開竅於目閉目不欲見人肝病也肝病見肺脈金剋木也

病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沈濇而微者死也

病實而脈虛也

病若吐血復鼽衄血者脈當沈細而反浮大而牢者死也

脫血脈實相反也

病若譫言妄語身當有熱脈當洪大而皮手足厥逆脈沈細而微者死也

陽病見陰脈相反也

病若大腹而洩者脈當微細而滿反緊大而滑者死也

洩而脈大相反也大腹脹也

十八難曰脈有三部每部之中有四經手有太陰陽明足有太陽少陰爲上下部何謂也

此篇立問之意請人十二經脈凡有三部九候各何主之然三部者寸關尺也九候者有四經今手有太陰陽明足有太陽少陰爲上下部法天主胸以上至頭之有疾也中部法地主胸以下至足何也盍三部者以寸關尺分上中下也四經者寸關之有疾也審而刺之紀氏曰審而刺之刺者言人主高以下至齊之有疾也下部法地主齊以下至足之有疾也審而刺之者也

謝氏曰此一節當是十六難中答辭錯簡在此而剩出脈有三部九候各何主之十字審而刺之紀氏曰欲診脈動而中病不可不審故曰審而刺之刺者言其動而中也陳萬年傳曰刺候謂中其候與此義全或曰刺鍼刺也謂審其部而鍼刺之

人病有沈滯久積聚可切脈而知之耶

此下問答亦未詳所屬或曰當是十七難中或逈年月不已答辭

然診在右脇有積氣得肺脈結脈結甚則積甚則積微則氣微

結爲積聚之脈肺脈見結知右脇有積氣右脇肺部也積氣有微甚脈從而應之

診不得肺脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手當沈伏

肺脈雖不見結右手脈當見沈伏沈伏亦積聚脈右手所以候裏也

者也此蓋因手太陰陽明足太陽少陰爲上下部而推廣五行相生之義越人亦以五藏生成之後因其部分之高下而推言之非謂未生之前必待如是而後生成也而又演爲三部之說即四難所謂心肺俱浮腎肝俱沈脾者中州之意但彼直以藏言此以經言而藏府兼之以上問答明經此下二節俱不相蒙疑他經錯簡

脈有三部九候各何主之然三部者寸關尺也九候者浮中沈也上部法天主胸以上至頭之有疾也中部法人主高以下至齊之有疾也下部法地主齊以下至足之有疾也審而刺之者也

謝氏曰此一節當是十六難中答辭錯簡在此而剩出脈有三部九候各何主之十字審而刺之紀氏曰欲診脈動而中病不可不審故曰審而刺之刺者言其動而中也陳萬年傳曰刺候謂中其候與此義全或曰刺鍼刺也謂審其部而鍼刺之

人病有沈滯久積聚可切脈而知之耶

此下問答亦未詳所屬或曰當是十七難中或逈年月不已答辭

然診在右脇有積氣得肺脈結脈結甚則積甚則積微則氣微

結爲積聚之脈肺脈見結知右脇有積氣右脇肺部也積氣有微甚脈從而應之

診不得肺脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手當沈伏

肺脈雖不見結右手脈當見沈伏沈伏亦積聚脈右手所以候裏也

陽明土主居中部復生肺金此五行子母更相生養者也

手太陰陽明金下生足太陽少陰水水性下故居下部足少陰太陽水生足厥陰少陽木木生手少陰太陽火及手心主火火炎上行是爲上部火生足太陰少陽火火炎上行而不能下故爲上部手心主少陽火生足少陰陽明土土主中宮故在中部也此皆五行子母更相生養者也

手太陰陽明金下生足太陽少陰水水性下故居下部足少陰太陽水生足厥陰少陽木木生手少陰太陽火及手心主火火炎上行是爲上部火生足太陰少陽火火炎上行而不能下故爲上部手心主少陽火生足少陰陽明土土主中宮故在中部也此皆五行子母更相生養者也

其外痼疾同法耶將異也

此承上文復問外之痼疾與內之積聚法將同異

然結者脈來去時一止無常數名曰結也伏者脈行筋下也浮者脈在肉上行也左右表裏法皆如此

結爲積聚伏脈行筋下主表浮脈行肉上主表所以異也前舉右脇爲例故此云左右同法

假令脈結伏者內無積聚浮結者外無痼疾有積聚脈不結伏有痼疾脈不浮結爲脈不應病病不應脈是爲死病也

有是脈無是病有是病無是脈脈病不相應故爲死病也

十九難曰經言脈有逆順男女有恆而反者何謂也

恆常也脈有逆順據男女相比而言也男脈在關上女脈在關下男子尺脈恆弱女子尺脈恆盛此男女之別也逆順云者男之順女之逆也女之順男不同也雖然在男女則各有常矣反謂反其常也

然男子生於寅寅爲木陽也女子生於申申爲金陰也故男脈在關上女脈在關下是以男子尺脈恆弱女子尺脈恆盛是其常也

此推本生物之初而言男女陰陽也紀氏曰生物之初其木原皆始於子子者萬物之所以始也自子推之男左旋三十而至於巳是以男子生於寅而性炎上故男女婚嫁之數也自巳而懷娠男左旋十月而生於寅寅爲木陽也女右旋十月而生於申申爲金陰也

謝氏曰寅爲木木生火又火生在寅而性炎上故男脈在關上申爲金金生水又水生於申而性流下故女脈在關下愚謂陽之體輕清而升天道也故男脈

在關上陰之體重濁而降地道也故女脈在關下此男女之常也

反者男得女脈女得男脈也

男女異常是之謂反

其爲病何如

問反之爲病也

然男得女脈爲不足病在內左得之病在左右得之病在右隨脈言之也女得男脈爲太過病在四肢左得之病在左右得之病在右隨脈言之此之謂也

其反常故太過不及在內在外之病見焉

二十難曰經言脈有伏匿伏匿於何藏而言伏匿邪然謂陰陽更相乘更相伏也脈居陰部而反陽脈見者爲陽乘陰也脈雖時沈濇而短此謂陽中伏陰也脈居陽部而反陰脈見者爲陰乘陽也脈雖時浮滑而長此謂陰中伏陽也

居猶在也當也陰部尺陽部寸也乘猶乘車之乘出於其上也伏猶伏兵之伏隱於其中也匿藏也丁氏曰此非特言寸爲陽尺爲陰以上下言則肌肉之上爲陽部肌肉之下爲陰部亦通

重陽者狂重陰者癡脫陽者見鬼脫陰者目盲

此五十九難之文錯簡在此

二十一難曰經言人形病脈不病曰生脈病形不病曰死何謂也然人形病脈不病非有不病者也謂息數不應脈數也此大法

周仲立曰形體之中覺見惙惙精神昏憒食不快美而脈得四時之從無過不及之偏是人病脈不病也形體安和而脈息乍大乍小或至或損弦緊浮滑沈濇不一殘賊沖和之氣是皆脈息不與形相應乃脈病人不病也仲景云人病脈不病名曰內虛以無穀神雖困無苦脈病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人短命則死謝氏曰按本經各文詞意不屬似有脫誤

二十二難曰經言脈有是動有所生病一脈變爲二病者何也然經言是動者氣也所生病者血也邪在氣爲是動邪在血血爲所生病氣主呴之血主濡之氣留而不行者爲氣先病也血壅而不濡者爲血後病也故先爲是動後所生也呴音訏濡平聲

呴照也氣主呴之謂氣煦噓往來熏蒸於皮膚分肉之間也血主濡之謂血滿濶筋骨滑利關節榮養藏府也此脈字非尺寸之脈乃十二經隧之脈也此謂十二經脈之氣血盡以有在氣在血之分也邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病氣留而不行者爲氣病血壅而不濡者爲血病也然經脈者行血氣通營陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明此脈字非尺寸之脈乃十二經隧之脈也此謂十二經脈之氣血盡以有在氣在血之分也邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病氣留而不行者爲氣病血壅而不濡者爲血病也然經脈者行血氣通營陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰別絡十五皆因其原如環無端轉相灌溉朝於寸口人迎以處百病而決死生也

因者隨也原者始也朝猶朝會之朝以用也因上文經脈之尺度而推言經絡之行度也直行者謂之經旁出者謂之絡十二經有十二絡兼陽絡陰絡脾之大絡爲十五絡也謝氏曰始從中焦者蓋謂飲食入口藏于胃其精微之化注手太陰陽明以次相傳至足厥陰厥陰復返注手太陰也絡脈十五皆隨十二經脈之所始轉相灌溉如環之無端朝于寸口人迎以之處百病而決死生也寸口人迎古法以候喉面旁動脈爲人迎至晉王叔和直以左手關前一分爲人迎右手關前一分爲氣口後世宗之愚謂昔人所以取人迎氣口者蓋人迎爲足陽明胃經受穀氣而

養五藏者也氣口爲手太陰肺經朝百脈而平權衡者也

經云明知終始陰陽定矣何謂也然終始者脈之紀也寸口人迎陰陽之氣通於朝使如環無端故曰始也終者三陰三陽之脈絕則死死各有形故曰終也

謝氏曰靈樞經第九篇曰凡刺之道畢于終始明知終始五藏爲紀陰陽定矣又曰不病者脈口人迎應四時也少氣者脈口人迎俱少而不稱尺寸也此一節因上文寸口人迎處百病決死生而推言之謂欲曉知終始於陰陽爲能定之蓋以陽經取決於人迎陰經取決於氣口也朝使者朝謂氣血如水潮應時而灌溉使謂陰陽相爲用也始如生物之始終如生物之窮欲知生死脈以候之陰陽之氣通於朝使如環無端則不病一或不相朝使則病矣況三陰三陽之脈絕乎絕必死矣其死之形狀具如下篇尤宜參看

二十四難曰手足三陰三陽氣已絕何以爲候可知其吉凶不然足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而遠於骨髓故骨髓不温即肉不著骨骨肉不相親即肉滿而卻肉滿而卻故茵長而枯髮無潤澤無潤澤者骨先死戊日篤己日死

此下六節與靈樞第十篇文皆大同小異滿謂爲輸腎其華在髮其充在骨腎絕則不能充於骨肉滿而卻謂骨肉不相著而肉滿縮也戊己土也土勝水故以其所勝之日篤而死矣

足太陰氣絕則脈不營其口唇口唇者肌肉之本也脈不營則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

脾其華在唇四白其充在肌脾絕則肉滿謂肌肉不滑澤而緊急胭脈也

足厥陰氣絕卽筋縮引卵與舌卷厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脈不營則筋縮急筋縮急卽引卵與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死

肝者脈之合其華在爪其充在筋筋者聚於陰器而絡於舌本肝絕則筋縮引卵與舌也王充論衡云甲乙病者生死之期常在庚辛

手太陰氣絕卽皮毛焦太陰者肺也行氣温於皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去卽皮節傷皮節傷則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日篤丁日死

肺者氣之本其華在毛其充在皮肺絕則皮毛焦而津液去皮節傷以諸液皆會於節也

手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則色澤去故面色黑如炲此血先死壬日篤癸日死

心之合脈也其榮色也其華在面其充在血脈心絕則脈不通血不流色澤去也

三陰氣俱絕者則目眩轉目瞑目瞑者爲失志失志者則志先死死卽目瞑也

三陰通手足經而言也靈樞十篇作五陰氣俱絕則以手厥陰手少陰同屬心經也目眩轉目瞑者卽所謂脫陰者目盲此又其甚者也故云目瞑者失志而志先死也四明陳氏曰五藏陰氣俱絕則其志喪于內故精氣不注於目不見人而死

六陽氣俱絕者則陰與陽相離陰陽相離則腠理泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流卽氣先死旦占夕死夕占旦死

汗出而不流者陽絕故也陳氏曰六府陽氣俱絕則氣敗于外故津液脫而死

二十五難曰有十二經五藏六府十一耳其一經者何等經也然一經者手少陰與心主別脈也心主與三焦爲表裏俱有名而無形故言經有十二也

此篇問答謂五藏六府配手足之陰陽但十一經耳其一經者則以手少陰與心主各別爲一脈心主與三焦爲表裏俱有名而無形以此一經并五藏六府之經脈所始所終三十六難言手少陰心主與三焦經脈所始所終三十六難言腎之有兩左曰腎右曰命門初不以左右腎分也氣弗營則皮毛焦太陰者肺也行氣温於皮毛者原氣之別主持諸氣兩手尺脈三十八難言三焦者原氣之別主持諸氣復申言其有名無形三十九難言命門者精神之所舍男子藏精女子繫胞其氣與腎通又云六府止有五府三焦亦是一府八難六十二六十三篇言腎間動氣者人之生命十二經之根本也其名曰原三焦則原氣之別使也通此篇參互觀之可見三焦列爲六府之義唯其有名無形故得與手心主合心主爲手厥陰其經始于起胸中終于循小指之內出其端若手少陰則始于心中終于循小指之內出其端此手少陰與心主各別爲一脈也○或問手厥陰經謂脫陰者目盲此又其甚者也故云目瞑者失志而志先死也四明陳氏曰五藏陰氣俱絕則其志喪于內故精氣不注於目不見人而死

日心主又曰心包絡何也曰君火以名相火以位手厥陰代君火行事以用而言故曰手心主以體而言則曰心包絡一經而二名實相火也○虞庶云諸家

言命門爲相火與三焦相表裏按難經止言手心主與三焦爲表裏無命門三焦表裏之說夫左寸火右寸金左關木右關土左尺水右尺火職之部位其義灼然於乎如虞氏此說則手心主與三焦相爲表裏而攝行君火明矣三十六難謂命門其氣與腎通則亦不離乎腎也其習坎之謂歟手心主爲火之閏位命門則水之同氣歟命門不得爲相火三焦不與命門配亦明矣虞氏之說良有旨哉諸家所以紛紛不決者蓋有惑于金匱眞言篇王注引正理論謂三焦者有名無形上合手心主下合右腎遂有命門三焦表裏之說夫人之藏府一陰一陽自有定耦豈有一經兩配之理哉夫所謂上合手心主者正言其爲表裏下合右腎者則以三焦爲原氣之別使而言之爾知此則知命門與腎通三焦無兩配兩諸家之言可不辨而自明矣若夫診脈部位則手厥陰相火居右尺之分而三焦同之命門既與腎通只當居左尺而謝氏據脈經謂手厥陰與手少陰心脈同部二焦脈上見寸口中見於關下焦與腎同也前既云初不以左右腎分兩手尺脈矣今如脈經所云則右尺當何所候耶

二十六難曰經有十二絡有十五餘三絡者是何等絡也然有陽絡有陰絡有脾之大絡陽蹻之絡陰絡者陰蹻之絡也故絡有十五焉

直行者謂之經傍出者謂之絡經猶江漢之正流絡則沱潛之支派每經皆有絡十二經有十二絡如手太陰屬肺絡大腸手陽明屬大腸絡肺之類今云絡有十五者以其有陽蹻之絡陰蹻之絡及脾之大絡也陽蹻陰蹻見二十八難謂之絡者蓋奇經既不拘於十二經直謂之絡亦可也脾之大絡名曰大包出淵腋三寸布胸脇其動應衣宗氣也四明陳氏曰陽蹻之絡統諸陽絡陰蹻之絡統諸陰絡脾之大絡又總統陰陽諸絡由脾之能滋養五藏也

二十七難曰脈有奇經八脈者不拘於十二經何也然有陽維有陰維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶之脈凡此八脈者皆不拘於經故曰奇經八脈也

脈有奇常十二經者常脈也奇經八脈則不拘於十二經故曰奇經對正而言猶兵家之云奇正也虞氏曰奇者奇零之奇不偶之義謂此八脈不係正經陰陽無表裏配合別道奇行故曰奇經也此八脈者與手足三陽脈之交會上至頭門與陽維會玉百會督脈督於後任脈任於前衝脈爲諸陽之海陰陽維起於諸陰交也比于聖人圖設溝渠溝渠滿溢流于深潮故聖人不能拘通也而八脈隆盛入於八脈而不環周故十二經亦不能拘之其受邪氣皆則腫熱砭射之也（維脈也作繫）

督之爲言都也爲陽脈之海所以都綱乎陽脈也其脈起下極之俞由會陰歷長強循脊中行至大椎穴與手足三陽脈之交會上至頭門與陽維會玉百會循額中行入腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎貫脊屬腎上至鼻柱入中與陽明交會任脈起於中極之下曲骨穴任者妊也爲人生養之本衝脈起於氣衝穴玉胸中而散爲陰脈之海內經作並足少陰之經按衝脈行乎幽門通谷而上皆少陰也當從內經此督任衝三脈皆起於會陰蹇一源而分三岐也帶脈起季脇下一寸八分回身一周猶束帶然陽蹻脈起於足跟中申脈穴循外踝而行陰蹻脈亦於跟中照海穴循內踝而行蹻者捷也以二脈皆起於足故取蹻捷超越之義陽維陰維維絡于身爲陰陽之綱維也陽維所發別于金門以陽交爲郤與手足太陰及蹻脈會于臑俞與手足少陽會于天髎及會肩井與足少陽會于陽白上本神臨泣正營腦空下至風池與督脈會于風府瘂門此陽維之起于諸陽之會也陰維之郤曰築賓與足太陰會于腹哀大橫

又與足太陰厥陰會于府舍期門又與任脈會于天突廉泉此陰維起于諸陰之交也溢畜不能環流灌溉諸經者也十二字當在十二經亦不能拘之下則於此無所間而於彼得相從矣其受邪氣畜云云十二字剳氏則以爲於本文上下當有缺文然脈經無此疑衍文也或云當在三十七難關格不得盡其命而死矣之下因邪在六府而言也

二十九難曰奇經之爲病何如然陽維維于陽陰維維于陰陰陽不能自相維則悵然失志溶溶若坐水中陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛陰蹻爲病陽緩而陰急陽蹻爲病陰緩而陽急衝之爲病逆氣而裏急督之爲病脊強而厥任之爲病其內苦結男子爲七疝女子爲瘕聚帶之爲病腹滿腰溶溶若坐水中此奇經八脈之爲病也（陽維爲病五云十四字說見缺盆缺總類）

此言奇經之病也陰不能維于陰則悵然失志陽不能維于陽則溶溶不能自收持陽維行諸陽而主衛衛爲氣氣居表故苦寒熱陰維行諸陰而主榮榮爲血血屬心故苦心痛兩蹻脈病在陽則陽急在陰則陰急受病者急不病者自和緩也衝脈從腳元至咽喉故逆氣裏急督脈行背故脊強而厥任脈起胞門行腹故病苦內結男爲七疝女爲瘕聚也帶脈回身一周故病狀如是溶溶無力貌此各以其經脈所過而言之自二十七難至此義實相因最宜通玩

三十難曰榮氣之行常與衛氣相隨不然經言人受氣於穀穀入於胃乃傳於五藏六府五藏六府皆受於氣其清者爲榮濁者爲衛榮行脈中衛行脈外榮周不息五十而復大會陰陽相貫如環之無端故知榮衛相隨也

此篇與靈樞第十八篇岐伯之言同但穀入於胃乃傳與五藏六府皆受於氣靈樞作穀入於胃以傳與肺五藏六府皆以受氣爲少殊爾皆受於氣之氣指水穀之氣而言五十而復大會說見一難中四明陳氏曰榮陰也其行本速衛陽也其行本遲然而清者清利濁者滯悍皆非漫溢之體故凡衛行于外榮即從行於中是知其行常得相隨共周其度溥南王氏曰清者體之上也陽也火也離中之一陰降故午後一陰生即心之生血也故曰清氣爲榮（清不降天之濁能降爲六陰數而使之下也云清氣者總離之體言之）濁者體之下也陰也水也坎中之一陽升故子後一陽生即腎之生氣也故曰濁氣爲衛（地之濁不升地之清能升爲陽象而使之上也云濁坎之體言之）經云地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣此之謂也愚謂以用而言則清氣爲榮者濁中之清者也濁氣爲衛者清中之濁者也以體而言則清之用不離乎濁之體濁之用不離乎清之體故調清氣爲榮濁氣爲衛亦可也謂榮污衛清亦可也紀氏亦云素問曰榮者水穀之精氣則清衛者水穀之悍氣則濁精氣入於脈中則濁悍氣行於脈外則清或問三十二難云血爲榮氣爲衛此則榮衛皆以氣言者何也曰經云榮者水穀之精氣衛者水穀之悍氣又云清氣爲榮濁氣爲衛蓋就而言之則榮皆水穀之氣所爲故悉以氣言可也析而言之則榮爲血而衛爲氣固自有分矣是故榮行脈中衛行脈外猶水澤之於川滄風雲之於太虛也

周　盧國扁鵲秦越人撰
元　許昌滑壽伯仁本義

三十一難曰三焦者何禀何生何始何終其治常在何許可曉以不然三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦者在心下下鬲在胃上口主內而不出其治在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀其治在臍傍下焦者當臍上一寸主分別清濁主出而不內以傳道也其治在臍下一寸故名曰三焦其府在氣街（一本作衝）

人身之府藏有形有狀有禀有生如肝禀氣於木生於水心禀氣於火生於木之類莫不皆然唯三焦既無形狀而所禀所生則元氣與胃氣而已故云水穀之道路氣之所終始也上焦其治在膻中中焦其治在脘中者何也然心在膈傍天樞穴下焦其治在臍下一寸陰交穴治猶司也猶郡縣治之治謂三焦處所也或云治作平聲讀謂三焦有病當各治其處蓋刺法也三焦相火也火能腐熟萬物焦從火亦腐物之氣命名取義或有在於此歟靈樞第十八篇曰上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胸中走腋循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與營衛俱行於陽二十五度行於陰亦二十五度一周也故五十度而復大會於手太陰矣中焦亦傍胃口出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脈乃化而為血以養生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰營氣下焦者別回腸注於膀胱而滲入焉故水液者皆歸於腎而下焦亦傍胃口出上焦之後主出而不內以傳道也其治在臍下一

三十二難曰五藏俱等而心肺獨在膈上者何也然心者血肺者氣血為榮氣為衛相隨上下謂之榮衛經絡營周於外故令心肺在高上也

心榮肺衛通行經絡營周於外猶天道之運行於上下者何也然心肺獨在膈上者必合陽庚辛之陰陽本自為配合而乙與庚通剛柔之道辛乃合庚之陰而反為別使也是故雖無其形倚內外之形而得名雖無其實合內外之實而為位者也愚按其府在氣街一句疑錯簡或衍三焦自屬諸府其經為手少陽與手心主配且各有治所不應又有府也

三十三難曰肝青象木肺白象金肝得水而浮肺得水而浮金得水而沈木得水而沈也肺者非為純金也辛商也丙之柔一大言陰與陽小言夫與婦耳若言其小則乙庚丙辛夫婦之道也及其榮火又行陽道多故令肺得水而浮也陳熟而復浮者何也故知辛當蹄庚乙當蹄甲也

四明陳氏曰肝屬甲乙木應角音而重濁析而言之則甲為木之陽乙為木之陰合而言之則皆陽也以其屬少陽而位于人身之陰分故為陰中之陽夫陽者必合陰甲乙之陰陽本自為配合而乙與庚通剛柔之道乙乃合甲之微陽而反榮金故吸受庚金微陰之氣為之夫婦木之性本浮以其受金之氣而居陰道故得水而沈也及熟之則所受金之氣去乙復歸之甲而木之本體自然還浮也肺屬庚辛金應商音而輕清析而言之則庚為金之陽辛為金之陰合而言之則皆陰也以其屬太陰而位于人身之陽分故為陽中之陰夫陰者必合陽庚辛之陰陽本自為配合而辛與丙通則柔之道辛乃合庚之微陰而反榮夫火故就丙火之陽為之夫婦金之性本沈以其受火之氣炎上則居陽道故得水而浮也及熟之則所受火之氣乃去辛復歸之庚而金之本體自然還沈也古益袁氏曰肝為陰木乙也肺為陰金辛也角商各其音也乙與庚合丙與辛合猶夫婦也故皆言拾其本性而隨夫之氣習以見陰陽相感之義焉況之尊亦自然居于上矣內經曰商言上上謂下陰所行之道性隨而分肝位高下肺居高上上謂下陰所行之道性隨而分故木浮而反肖金之沈金沈而反肖火之上行而浮也凡物極則反及其經制化變革則歸根復命焉是以肝肺熟而各肖其本金之本性矣紀氏曰肝為陰中之陽陰性尚多不隨於木故得水而沈也肺為陽中之陰陽性尚多不隨於金故得水而浮也此乃言其大者耳若言其小則乙庚丙辛夫婦之道也及其熟而沈浮反者各歸所屬是其本性故也周氏曰肝藥火又行陽道多故令肺得水而浮也陳熟而復浮者何也故知辛當蹄庚乙當蹄甲也多血少氣體凝中空雖有脈絡內經非

玲瓏空虛之比故得水而沈也及其熟也濇而澗者轉爲乾燥凝而窒者變爲逕虛宜其浮也肺主氣氣陽也多氣少血體四垂而輕泛孔竅玲瓏脈絡旁達故得水而浮也熟則體皆斂孔竅窒實輕鈍者沈也斯物理之當然與五行造化獸相而緊縮宜其沈也

符合耳謝氏曰此因物之性而推其理也愚謂肝爲陽陰中之陽也陰性尙多故曰微陽其居在下行陰道也肺爲陰陽中之陰也陽性尙多故曰微陰其居在上行陽道也熟則無所棄而反其本矣何也物熟而相交之氣也

三十四難曰五藏各有聲色臭味皆可曉知以不然十變言肝色青其臭臊其味酸其聲呼其液泣心色赤其臭焦其味苦其聲言其液汗肝色黃其臭香其味甘其聲歌其液涎肺色白其臭腥其味辛其聲哭其液涕腎色黑其臭腐其味醎其聲呻其液唾是五藏聲色臭味也

此五藏之用也聲色臭味下欠液字肝色青臭臊木化也呼出木也味酸曲直作酸也液泣通乎目也心色赤臭焦火化也言揚火也味苦炎上作苦也液汗心主血汗爲血之屬也脾色黃臭香土化也歌緩土也一云脾神好樂故其聲主歌味甘稼穡作甘也液涎通乎口也肺色白臭腥金化也哭慘金也味辛從革作辛也液涕通乎鼻也腎色黑臭腐水化也呻吟誦也象水之聲味醎潤下作醎也液唾水之屬也四藏各有受任則非腸之清淨矣各爲五藏之府固明陳氏曰腎位遠非呻之則氣不得及於息故聲之呻者自腎出也然肺主聲肝主色心主臭脾主味腎主液五藏錯綜互相有之故云十變也

五藏有七神各何所藏耶然藏者人之神氣所舍藏也故肝藏魂肺藏魄心藏神脾藏意與智腎藏精與志也藏者藏也人之神氣藏於內焉魂者神明之輔弼也隨神往來謂之魂魄者精氣之匡佐也並精而出入者謂之魄神者精氣之化成也兩精相薄謂之神脾主思故藏意與智腎者作強之官伎巧出焉故藏精與志也此因五藏之用而言五藏之神是故五用者於外七神蘊於內也

三十五難曰五藏各有所[句]府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何也然經言心榮肺衛通行陽氣故居在上大腸小腸傳陰氣而下故居在下所以相去而遠也心榮肺衛行陽氣而居上大腸小腸傳陰氣而居下於外七神蘊於內也

三十五難曰五藏各有所[句]府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何也然經言心榮肺衛通行陽氣故居在上大腸小腸傳陰氣而下故居在下所以相去而遠也心榮肺衛行陽氣而居上大腸小腸傳陰氣而居下於外七神蘊於內也

三十五難曰五藏各有所[句]府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何也然經言心榮肺衛通行陽氣故居在上大腸小腸傳陰氣而下故居在下所以相去而遠也心榮肺衛行陽氣而居上大腸小腸傳陰氣而居下於外七神蘊於內也

又諸府者皆陽也清淨之處今大腸小腸胃與膀胱皆受不淨其意何也

又問諸府既皆陽也則當爲清淨之處何故大腸小腸胃與膀胱皆受不淨耶

然諸府者謂是非也經言小腸者受盛之府也胃者水穀之府也傳寫行道之府也膽者清淨之府也膀胱者津液之府也一府猶無兩名故知非也小腸者心之府大腸者肺之府胃者脾之府膀胱者腎之府

謂諸府爲清淨之處者其說非也今大腸小腸胃與膀胱各有受任則非腸之清淨矣各爲五藏之府固不得而兩名也蓋諸府體爲陽而用則陰經所謂濁陰歸六府是也云諸府皆陽清淨之處唯膽足以當之

小腸謂赤腸大腸謂白腸膽者謂青腸胃者謂黃腸膀胱者謂黑腸下焦之所治也

此以五藏之色分別五府而皆以腸名之也下焦所治主分別清濁也

治一句屬膀胱謂膀胱當下焦所治主分別清濁也

三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也其左者爲腎右者爲命門命門者謂精神之所舍原氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞故知腎有一也

腎之有兩者以左者爲腎右者爲命門也男子於此而藏精受五藏六府之精而藏之也女子於此而繫胞是得精而能施化胞則受胎之所也原氣謂齊下腎間動氣人之生命十二經之根本也此篇言非皆腎也三十九難亦言左爲腎右爲命門而又云其氣與腎通是腎之兩者其實則一耳故項氏家說引沙隨程可久曰北方常配二物故惟坎加習於物爲蛇於方爲朔爲北於太玄爲閉爲冥難經曰藏有一而腎獨兩此之謂也此通三十八三十九難諸篇前後參攷其義乃盡

三十七難曰五藏之氣於何發起通於何許可曉以不然五藏者常上關於九竅也故肺氣通於鼻鼻和則知香臭矣肝氣通於目目和則知黑白矣脾氣通於口口和則知穀味矣心氣通於舌舌和則知五味矣腎氣通於耳耳和則知五音矣

謝氏曰本篇問五藏之氣於何發起通於何許答文止言五藏通九竅之義而不及五藏之發起恐有缺文愚按五藏發起當如二十三難流注之說上關九竅靈樞作七竅者是下同

五藏不和則九竅不通六府不和則留結爲癰

此二句結上起下之辭五藏陰也陰不和則病於內六府陽也陽不和則病於外

邪在六府則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則陽脈盛矣邪在五藏則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰脈盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營也故曰格陽氣太盛則陰氣不得相營也故曰關格關格者不得盡其命而死矣

不得相營也故曰關格關格者不得盡其命而死矣

此與靈樞十七篇文大同小異○或云二十八難其受邪氣畜則腫熱砭射之也十二字當爲此章之結語蓋陰陽之氣太盛而至於關格者必死若但受邪氣畜則宜砭射之其者指物之辭因上文六府不和及邪在六府而言之也

經言氣獨行於五藏不營於六府者何也然夫氣之所行也如水之流不得息也故陰脈營於五藏陽脈營於六府如環無端莫知其紀終而復始而不覆溢人氣內温於藏府外濡於腠理

此因上章營字之義而推及之也亦與靈樞十七篇文大同小異所謂氣獨行於五藏不營於六府者非不營於六府也蓋在陰經則營於五藏在陽經則營於六府脈氣周流如環無端則無關格覆溢之患而人之氣內得以温於藏府外得以濡於腠理矣○四明陳氏曰府有邪則陽脈盛藏有邪則陰脈盛者陰氣鬭於下陽脈盛者陽氣格於上然而未至於死陰陽俱盛則既鬭且格則吐而食不下鬭則二陰閉不得大小便而死矣藏府氣和而相營陰不獨陽不和則病於內

三十八難曰藏唯有五府獨有六者何也然所以府有六者謂三焦也有原氣之別焉主持諸氣有名而無形其經屬手少陽此外府也故言府有六焉

三焦主持諸氣爲原氣別使者以原氣賴其導引潛行默運於一身之中無或間斷也外府指其經爲手少陽而言蓋三焦外有經而內無形故云詳見六十六難

三十九難曰經言府有五藏有六者何也然六府者止有五府也五藏亦有六藏者謂腎有兩藏也其左爲腎右爲命門命門者精神之所舍也男子以藏精女子以繫胞其氣與腎通故言藏有六也府有五者何也然五藏各有一府三焦亦是一府然不屬於五藏故言府有五焉

前篇言藏有五府有六此言府有五藏有六者何也然五藏之有兩也腎之兩雖有左右命門之分其氣相通實皆腎而已府有五者以三焦配合手心主也合諸篇而觀之謂五藏六府可也五藏五府亦可也六藏六府亦可也

四十難曰經言肝主色心主臭脾主味肺主聲腎主液鼻者肺之候而反知香臭耳者腎之候而反聞聲其意何也然肺者西方金也金生於巳巳者南方火火者心也心主臭故令鼻知香臭腎者北方水也水生於申申者西方金金者肺主聲故令耳聞聲

四明陳氏曰臭者心所主鼻者肺之竅心之脈上肺故令鼻能知香臭也耳者腎之竅聲者肺所主腎之脈上肺故令耳能聞聲也愚按越人此說蓋以五行相生之理而言且見其相因而爲用也

四十一難曰肝獨有兩葉以何應也然肝者東方木也木者春也萬物始生其尚幼小意無所親去太陰尚近離太陽不遠猶有兩心故有兩葉亦應木葉也

四明陳氏曰五藏之相生母子之道也故腎爲肝之母屬陰中之太陰心爲肝之子屬陽中之太陽肝之位切近乎腎亦不遠乎心也愚謂肝有兩葉應東方之木木者春也萬物始生艸木甲拆兩葉之義也越人偶有見於此而立爲論說不必然不必不然也其日太陰太陽固不必指藏氣及月令而言曰陰冬爲陰之極首夏爲陽之盛謂之太陰太陽無不可也凡讀書要須融活不可滯泥先儒所謂以意逆志是謂得之信矣後篇謂肝左三葉右四葉此云兩葉總其大者爾

四十二難曰人腸胃長短受水穀多少各幾何然胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中常留穀二斗水一斗五升小腸大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺受穀二斗四升水六升三合合之大半回腸大四寸徑一寸半長二丈一尺受穀一斗水七升半廣腸大八寸徑二寸半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一故腸胃凡長五丈八尺四寸合受水穀八斗七升六合八分合之一此腸胃長短受水穀之數也

回腸卽大腸廣腸肛門之總稱也

肝重二斤四兩左三葉右四葉凡七葉主藏魂心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主藏神脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血温五藏主藏意肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉主藏魄腎有兩枚

重一斤一兩主藏志屬在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁三合胃重二斤一兩紆曲屈伸長二尺六寸大一尺五寸徑五寸盛穀二斗水一斗五升小腸重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半左回疊積十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之太半大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸當齊右迴十六曲盛穀一斗水七升半脃胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合口廣二寸半徑八分分之少半以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十二兩廣二寸半至胃長一尺六寸大小二腸會一寸半回疊十二兩廣二寸長一尺二寸九節肛門重十二兩大八寸徑二寸太半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一

此篇之義靈樞三十一三十二篇皆有之越人併爲一篇而後段增入五藏輕重所盛所藏雖覺前後重復不害其爲丁寧也但其間受盛之數各不相同然非大義之所關姑闕之以俟知者

四十三難曰人不食飲七日而死者何也然人胃中當有留穀二斗水一斗五升故平人日再至圊一行二升半日中五升七日五七三斗五升而水穀盡矣故平人不食飲七日而死者水穀津液俱盡即死矣

此篇與靈樞三十篇文大同小異平人胃滿則腸虛腸滿則胃虛更虛更滿故氣得上下五藏安定血脈和利神乃居故神者水穀之精氣也平人不食飲七日而死者水穀津液皆盡也故曰水去則精消則衛亡榮散衛亡神無所依此之謂也

四十四難曰七衛門何在然長爲蔽門齒爲戶門會厭爲咽門大腸小腸會爲闌門下極爲魄門故曰七衛門也

衛衛要之衛會厭爲咽嗌會合也厭猶掩也謂當咽物時合掩喉嚨不使食物候入以阻其氣之蠲吸出入也貫與奔同言物之所奔觸也太倉下口胃之下口也在臍上二寸下脘之分大腸小腸會在臍上一寸水分穴下極肛門也云魄門亦取幽陰之義

四十五難曰經言八會者何也然府會太倉藏會季脇筋會陽陵泉髓會絕骨血會鬲俞骨會大杼脈會太淵氣會三焦外一筋直兩乳內也熱病在內者取其會之氣穴也

太倉一名中脘在臍上四寸六府取稟於胃故府會太倉藏會季脇章門穴也在大橫外直齊季肋端爲脾之募五藏取稟於脾故爲藏會足少陽之筋結於膝外廉陽陵泉也在膝下一寸外廉陷中又膽與肝爲配肝者筋之合故爲筋會絕骨一名陽輔在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分諸髓皆屬於骨故爲髓會鬲俞在背第七椎下去脊兩旁各一寸半足太陽脈氣所發也太陽多血又血乃水之象故爲血會大杼在項後第一椎下去脊兩旁各一寸半太淵在掌後陷中動脈即所謂寸口者脈之大會也氣會三焦外一筋直兩乳內即膻中爲氣海者也在玉堂下一寸六分熱病在內者各視其所屬而取之會也謝氏曰三焦當作上焦四明陳氏曰髓會絕骨髓屬於腎主骨於足少陽無所關腦爲髓海腦有枕骨穴則當會枕骨絕骨誤也血會鬲俞者心所統肝所藏血者爲榮散衛亡神無所依此之謂也

鬲俞在七椎下兩旁上則心俞下則肝俞故爲血會

骨會大杼骨者髓所養隨自腦下注於大杼大杼據入脊心下貫尾骶滲諸骨節故骨之氣皆會於此亦通古蓋袁氏曰人能健步以隨會絕骨也肩能任重以骨會大杼也

四十六難曰老人臥而不寐少壯寐而不寤者何也然經言少壯者血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失於常故晝日精夜不寤也老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道澁故晝日不能精夜不得寐也故知老人不得寐也老人之有餘不足也與盛極之時同

四十七難曰人面獨能耐寒者何也然人頭者諸陽之會也諸陰脈皆至頸胸中而還獨諸陽脈皆上至頭耳故令面耐寒也

靈樞第四篇曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌水其卒寒或手足懈惰然而其面不衣何也岐伯曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走唇口而爲味其氣之津液皆上熏于面而皮又厚其肉堅故大熱甚寒不能勝之也愚按手之三陽從手上走至頭足之三陽從頭下走至足外一筋直兩乳內即膻中爲氣海者也在玉堂下一寸六分熱病在內者各視其所屬而取之之會也謝氏以諸陰脈皆至頸胸中而還獨諸陽脈皆上至頭耳

四十八難曰人有三虛三實何謂也然有脈之虛實有病之虛實有診之虛實也脈之虛實者濇者爲虛滑者爲實病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不

言者爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者滿者爲虛牢者爲實癢者爲虛痛者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

滿者爲虛緊牢者爲實此脈之虛實也出者爲虛是五藏自病由內而之外東垣家所謂內傷是也入者爲實是五邪所傷由外而之內東垣家所謂外傷是也言者爲虛以五藏自病不由外邪故惺惺而不妨於言也不言者爲實以人之邪氣內擾故昏亂而不言也緩者爲虛緩不急也言內之出者徐徐而遲非一朝一夕之病也急者爲實言外邪所中風寒溫熱等病死生在五六日之間也此病之虛實也診按也候也按其外而知之非診脈之診也滿者爲實脈經無此二句謝氏以爲衍文楊氏謂按之皮肉柔滿者爲虛牢強者爲實然則有亦無害矣按病者之處所知痛者爲實則知不痛而瘦者非實矣又知外痛內快爲邪盛之在外內痛外快爲邪盛之在內矣大抵邪氣盛則實精氣奪則虛此診之虛實也

四十九難曰有正經自病有五邪所傷何以別之然憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺恚怒氣逆上而不下則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地強力入水則傷腎凡此五者是正經之自病也

心主思慮君主之官也故憂愁思慮則傷心肺主皮毛而在上是爲蓋藏故形寒飲冷則傷肺肝主怒怒則傷肝脾主飲食及四肢故飲食勞倦則傷脾腎主骨而屬水故用力作強坐濕入水則傷腎凡此蓋憂思恚怒飲食動作之過而致然也夫憂思恚怒飲食動作人之所不能無者發而中節烏能爲害過則傷

人必矣故善養生者去泰去甚遵其中而已味者拘焉乃欲一切拒絕之豈理也哉○此與靈樞第四篇文大同小異但傷脾一節作若醉入房汗出當風則傷脾不同爾謝氏曰飲食勞倦自是二事飲食得者飢飽失時勞倦者勞形力而致倦意也此本經自病者也或曰坐濕入水亦從外得之也何爲正經自病曰此非天之六淫也

何謂五邪然有中風有傷暑有飲食勞倦有傷寒有中濕此之謂五邪

風木也喜傷肝暑火也喜傷心土爰稼穡脾主四肢故飲食勞倦喜傷脾寒金氣也喜傷肺左氏傳狐突云金寒是也濕水也喜傷腎霧雨蒸氣之類也此五者邪由外至所謂外傷者也或曰坐濕得之勞倦五邪之傷得之飲食

假令心病何以知中風得之然其色當赤何以言之肝主色自入爲青入心爲赤入脾爲黃入肺爲白入腎爲黑肝爲心邪故知當赤色其病身熱脇下滿痛其脈浮大而弦

此以心經一部設假令而發其例也肝主色肝爲心邪故色赤身熱脈浮大心也脇痛脈弦肝也

何以知傷暑得之言當惡臭何以言之心主臭自入爲焦臭入脾爲香臭入肝爲腐臭入腎爲腐臭故知心病傷暑得之當惡臭其病身熱而煩心痛其脈浮大而散

心主臭心傷暑而自病故惡臭而證狀脈診皆屬乎心也

何以知飲食勞倦得之然當喜苦味也虛爲不欲食實爲欲食何以言之脾主味入肝爲酸入心爲苦入肺爲辛入腎爲鹹白入爲甘故知脾邪入心爲喜苦味也其病身熱而體重嗜卧四肢不收其脈浮大而緩

脾主味脾爲心邪故喜苦味身熱脈浮大心也體重嗜卧四支不收脈緩脾也虛爲不欲食實爲欲食二者病由內作非外邪之干所謂內傷者也此本經自病

句於上下文無所發疑錯簡衍文也

何以知傷寒得之然當譫言妄語何以言之肺主聲入肝爲呼入心爲言入脾爲歌入腎爲呻自入爲哭故知肺邪入心爲譫言妄語也其病身熱洒洒惡寒甚則喘咳其脈浮大而滿

肺主聲肺爲心邪故譫言妄語身熱脈浮大心也惡寒喘咳脈滿肺也

何以知中濕得之然當喜汗出不可止何以言之腎主濕入肝爲泣入心爲汗入脾爲涎入肺爲涕自入爲唾故知腎邪入心爲汗出不可止也其病身熱而小腹痛足脛寒而逆其脈沈濡而大此五邪之法也

腎主濕濕化五液腎爲心邪故汗出不可止身熱脈大心也小腹痛足脛寒脈沈濡腎也○凡陰陽府藏經絡之偏虛正則爲邪矣此篇越人蓋言陰陽藏府經絡之偏虛偏實者也由偏實也故內邪得而生由偏虛也故外邪得而入

五十難曰病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪何以別之然從後來者爲虛邪從前來者爲實邪從所不勝來者爲賊邪從所勝來者爲微邪自病者爲正邪

五行之道生我者體其氣虛也居吾之後而來爲邪

故曰虛邪賊生者相氣方實也居吾之前而來爲邪
故曰實邪正邪則本經自病者也
何以言之假令心病中風得之爲虛邪傷暑得之爲微邪中濕得之爲
邪飲食勞倦得之爲實邪傷寒得之爲微邪從所勝而來
爲賊邪
假心爲例以發明上文之義中風爲虛邪從後而來
火前水後也傷暑爲正邪火自病也飲食勞倦爲實
邪從前而來土前火後也傷寒爲微邪從所勝而來
火勝金也中濕爲賊邪從所不勝而來水剋火也與
上篇互相發宜通攷之
五十一難曰病有欲得温者有欲得寒者有欲得見人
者有不欲得見人者前後不同病在何藏府也然病欲
得寒而欲見人者病在府也病欲得温而不欲見人者
病在藏也何以言之府者陽也陽病欲得寒又欲見人
藏者陰也陰病欲得温又欲閉戸獨處惡聞人聲故以
別知藏府之病也
紀氏曰府爲陽陽病則熱有餘而寒不足故飲食衣
服居處皆欲就寒也陽主動而應乎外故欲得見人
藏爲陰陰病則寒有餘而熱不足故飲食衣服居處
皆欲就温也陰主靜而應乎内故欲閉戸獨處而惡
聞人聲也
五十二難曰府藏發病根本等不然不等也其不等奈
何然藏病者止而不移其病不離其處府病者彷彿賁
豚上下行流居處無常故以此知藏府根本不同也
丁氏曰藏爲陰陰主靜故止而不移府爲陽陽主動
故上下流行居處無常也與五十五難文義互相發
五十三難曰經言七傳者死間藏者生何謂也然七傳
者傳其所勝也間藏者傳其子也何以言之假令心病
傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一藏不再傷故言
七傳者死也
紀氏曰心火傳肺金肺金傳肝木肝木傳脾土脾土
傳腎水腎水傳心火心火受水之傳一也肺金復受
火之傳再也自心而始以夫相得至肺之再是七傳
也故七傳死者一藏不受再傷也
假令心病傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是子母
相傳竟而復始如環無端故曰生也
呂氏曰間藏者間其所勝之藏而相傳也心肺脾
間之脾腎肺間之肺腎肝間之腎肝心間之肝心脾
肝勝脾心間之此謂傳其所勝之藏所生聚者六府所成也積
傳論曰謹察間甚以意調之間者并行甚者獨行蓋
并者並也相並而傳傳其所間如呂氏之說是也獨
者特也特傳其所勝如紀氏之說是也越人之義蓋
本諸此詳見本篇及靈樞四十二篇但二經之義則
以五藏與胃腸光七者相傳發其例而其篇題皆以
病傳爲名今越人則以七傳間藏之目推明二經假
心爲例以見病之相傳若傳所勝主一藏再傷則死
若間其所勝是子母相傳則生也尤簡而明
五十四難曰藏病難治府病易治何謂也然藏病所以
難治者傳其所勝也府病易治者傳其子也與七傳間
藏同法也
四明陳氏曰五藏者七神內守則邪之微者不易傳
若大氣之入則神亦失守而病深故病難治亦或主
於死矣六府爲轉輸傳化者其氣常通況膽又清淨
之處雖邪入之終難深留故府病易治也愚按以越

人之意推之則藏病難治者以傳其所勝也府病易
治者以傳其所生也雖然此特各舉其一偏而言爾
若藏病傳其所生亦易治府病傳其所勝亦難治也
故扁鵲安常云世之醫書惟扁鵲之言爲深所謂難經
者也越人寓術於其書而言之有不詳者使後人自
求之歟今以此篇詳之扁氏可謂得越人之心者矣
五十五難曰病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚
者陽氣也故陰沈而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣
之所聚名曰聚故積者五藏所生聚者六府所成也積
者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終
始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無
所留止其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也
積者五藏所生五藏屬陰陰主靜故其病沈伏而不
離其處聚者六府所成六府屬陽陽主動故其病浮
動而無所留止也楊氏曰積蓄也言血脈不行蓄積
而成病也周仲立曰陰沈而伏初亦未覺漸以滋長
日積月累是也聚者病之所在與血氣偶然邂逅故
無常處與五十二難意同
五十六難曰五藏之積各有名乎以何月何日得之然
肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令
人發咳逆瘧連歲不已以季夏戊巳日得之何以言
之肺病傳於肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝
復欲還肺肺不肯受故留結爲積故知肥氣以季夏戊
巳日得之
肥之言盛也有頭足者有大小本末也欬逆也足厥
陰之別貫膈上注肺肝病故胸中欬而逆也二日一
發爲瘧瘧內經五藏皆有瘧此在肝爲風瘧也抑以

瘧爲寒熱病多屬少陽肝與之爲表裏故云左脇肝之部也

心之積名曰伏梁起齊上大如臂上至心下久不愈令人病煩心以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結爲積故知伏梁以秋庚辛日得之

伏梁伏而不動如梁木然

脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結爲積故知痞氣以冬壬癸日得之

痞氣痞塞而不通也疸病發黃也濕熱爲疸

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱喘欬發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結爲積故以息賁以春甲乙日得之

息賁或息或賁迫右脇肺之部肺主皮毛故洒淅寒熱或謂藏病止而不移今肺積或息或賁何也然或息或賁非居處無常如府病也特以肺主氣故其病有時而動息爾腎亦主氣故賁脉亦然

腎之積名曰賁脉發於少腹上至心下若脉狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受故留結爲積故知賁脉以夏丙丁日得之此五結之要法也

賁脉言若脉之賁突不常定也脉性燥故以名之令

人喘逆者足少陰之支從肺出絡心注胸中故也○此難但言藏病而不言府病者紀氏謂以其發無常處也楊氏謂六府亦相傳行如五藏之傳也○或問天下之物理有感有傳感者情也傳者氣也有情斯有氣斯有傳今夫五藏之積特以氣之所勝傳及欲還所勝所勝不納而留結爲積則是有情而爲所不勝云爾至於王者不受邪是固然也若不受者感矣且五藏在人身中各爲一物猶耳司聽目司視各有所職而不能思非若人之感物則心爲之主而乘氣機者也然則五藏果各能有情而感乎曰越人之意蓋以五行之道推其理勢之所有者演而成文耳初不必論其情感亦不必論其還與其必然否也讀者但以所勝傳不勝及王者不受邪遂留結爲積觀之則不以辭害志而思過半矣○或又問子言情感氣傳先儒之言則曰形交氣感是又氣能感矣於吾子之言何如曰先儒之說雖曰氣感猶形交也形指人身而言所以感之主也

五十七難曰泄凡有幾皆有名不乎泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重

此五泄之目下文詳之

胃泄者飲食不化色黃

胃受病故食不化胃屬土故色黃

脾泄者腹脹滿注食即嘔吐逆

有聲無物爲嘔有聲有物爲吐脾受病故腹脹泄注食即嘔吐而上逆也

大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛

食方已即窘迫欲利也白者金之色謝氏曰此腸寒之證也

小腸泄者溲而便膿血少腹痛

溲小利也便指大便而言溲而便膿血謂小便不閉大便不爽急後重也

大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛此五泄之要法也

瘕結也謂因有凝結而成者裏急謂腹內急迫後重謂肛門下墜惟其裏急後重故數至圊而不能便莖中痛者小便亦不利也○謝氏謂小腸大瘕二泄今所謂痢疾也內經曰腸澼故下利赤白者炙小腸俞是也穴在第十六椎下兩旁各一寸五分案驗○四明陳氏曰胃泄即飧泄也脾泄即滑泄也大腸泄即泏泄也小腸泄謂凡泄則小便先下而便血即血泄也大瘕泄即腸癖也大瘕泄即後重

五十八難曰傷寒有變其脉有變否然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同

變當作辨謂分別其脉也○紀氏曰汗出惡風者謂之傷風無汗惡寒者謂之傷寒一身盡疼不可轉側者謂之濕溫冬傷於寒至夏而發者謂之熱病非其時而有其氣一歲之中病多相似者謂之溫病

中風之脉陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脉陽浮而弱陰小而急傷寒之脉陰陽俱盛而緊滑熱病之脉陰陽俱浮浮之而滑沈之散滴溫病之脉行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之

上文言傷寒之目此言其脉之辨也陰陽字皆指尺寸而言楊氏曰溫病乃是疫癘之氣非冬感於寒至

春變爲溫病者散行諸經故不可預知臨病人而診之知在何經之動乃隨而治之○謝氏曰仲景傷寒例云冬時嚴寒萬類收藏君子周密則不傷於寒觸冒者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極而重於溫也又曰陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變爲風溫今按仲景例風溫與難經中風脈同而無濕濕之說又曰難經言溫病即仲景傷寒例中所言溫癉風溫溫毒溫疫四溫病也越人言其概而未詳仲景則發其秘而條其脈可謂詳矣麗安常傷寒總論云難經載五種傷寒言溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之據難經溫病又是四種傷寒感異氣而變成者也所以王叔和云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變成風溫陽脈洪數陰脈實大更遇濕熱變爲溫毒溫毒爲病最重也陽脈濡弱陰脈弦緊更遇濕氣變爲濕溫脈陰陽俱盛重感於寒變爲溫癉斯乃同病異名同脈異經者也所謂隨其經所在而取之者此也麗氏出而死下之卽愈

受病爲虛不受病者爲盛唯其虛也是以邪湊之唯其盛也是以邪不入卽外臺所謂表病裏和裏病表和之謂指傷寒傳變者而言之也表病裏和汗之可也而反下之表邪不除裏氣復奪矣裏病表和下之可也而反汗之裏邪不退表氣復奪矣故云死所以然者汗能亡陽下能損陰也此陰陽字指表裏言之

經曰誅伐無過命曰大惑此之謂歟

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近肩毛髮目者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極而重於溫也又曰陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變爲風溫今按仲景例風溫與難經中風脈同而無濕濕之說又曰難經言溫病即仲景傷寒例中所言溫癉風溫溫毒溫疫四溫病也越人言其概而未詳仲景則發其秘而條其脈可謂詳矣麗安常傷寒總論云難經載五種傷寒言溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之據難經溫病又是四種傷寒感異氣而變成者也所以王叔和云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變成風溫陽脈洪數陰脈實大更遇濕熱變爲溫毒溫毒爲病最重也陽脈濡弱陰脈弦緊更遇濕氣變爲濕溫脈陰陽俱盛重感於寒變爲溫癉斯乃同病異名同脈異經者也所謂隨其經所在而取之者此也麗氏出而死下之卽愈

此說雖不與難經同然亦自一義例

傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之卽死陽盛陰虛汗

裏紅生於肝欲如以縞裹紺生於脾欲如以縞裹栝蔞實生於腎欲如以縞裹紫此五藏生色之外榮也

靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病之所起所在也袁氏曰問其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也靈樞四十九篇曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖小痛必卒死黑色出於庭者（庭者顖也）大如拇指必不病而卒死七十四篇曰診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多黑多赤多青皆見者爲寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又如驗產婦面赤舌青毋活子死面青舌赤未出毋死子活唇口俱青子毋俱死之類也袁氏曰五藏之色見於面者各有部分以應相生相尅之候察之以知其病也

聞而知之者聞其五音以別其病

四明陳氏曰五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病祉亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沈而深音聲相應則無病羽亂則病在腎袁氏曰聞五藏五聲以應五音之清濁或五相勝負或其音嘶嗄之類別其病也○此一節當於素問陰陽應象論金匱真言諸篇言五藏聲音及三十四難云求之則問其聲足以別其病也

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

靈樞六十三篇曰五味入口各有所走各有所病酸走筋多食之令人癎鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心辛與氣俱行故辛入心而與汗俱出苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悅心慌者（慌者悶也）甚此則知聞其所欲五味以知其病所起所在也袁氏曰聞其所欲五味以知病之所起所在也

所入爲合者北方冬也陽氣入藏故言所入爲合也

此以經穴流注之始終言也

六十六難曰經言肺之原出於太淵心之原出於太陵肝之原出於太衝脾之原出於太白腎之原出於太谿少陰之原出於兌骨神門之又也膻之原出於巨虛胃之原出於衝陽三焦之原出於陽池膀胱之原出於京骨大腸之原出於合谷小腸之原出於腕骨

肺之原太淵主腎之原太谿見靈樞第一篇其第二篇曰肺之俞太淵心之俞太陵肝之俞太衝脾之俞太白腎之俞太谿心之俞太陵肝之俞太衝脾之俞太白腎之俞太谿膀胱之俞束骨過於京骨爲原膽之俞臨泣過於丘墟爲原胃之俞陷谷過於衝陽爲原三焦之俞中渚過於陽池爲原小腸之俞後谿過於腕骨爲原大腸之俞三間過於合谷爲原蓋五藏六府之俞仍別有原或曰陰經止以俞爲原六府陽經既有俞復以原爲靈樞以太陵爲心之原難經亦然而又別以兌骨爲少陰之原諸家針灸書並以太陵爲手厥陰心主之俞以神門在掌後兌骨之端者爲心經所注之俞似此不同者何也按靈樞七十一篇曰少陰無輸心不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端也其餘脈出入屈折其行之疾徐皆如手少陰心主之脈行也又第二篇曰心出於中衝溜於勞宮注於太陵行於間使入於曲澤手少陰也按中衝以下並手心主經俞靈樞直指爲手少陰而手少陰經俞不別載也又素問繆刺篇曰刺手心主少陰兌骨之端各一痏立已又氣穴篇曰藏俞五十穴王氏注五藏俞惟有心包經井俞之穴而亦無心經井俞穴又七十九難曰假令心病寫手心主俞補手心主井詳此前後各經文義則知手

少陰與心主同治也

十二經皆以俞爲原者何也然五藏俞者三焦之所行氣之所留止也三焦所行之俞爲原者何也然齊下腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原三焦者原氣之別使也主通行三氣經歷於五藏六府原者三焦之尊號也故所止輒爲原五藏六府之有病也皆取其原也

十二經皆以俞爲原者以十二經之俞皆係三焦所行氣所留止之處也三焦所行之俞爲原者以齊下腎間動氣乃人之生命十二經之根本三焦則爲原氣之別使主通行上中下之三氣經歷於五藏六府原而注乃爲俞也由俞而經過於此乃謂之經由經而入於所合謂之合合者會也靈樞第一篇曰五藏五俞二十五俞六府六俞六六三十六俞此俞字皆空穴之總名凡諸空穴皆可以言俞經脈十二絡脈十五凡二十七氣所行皆井榮俞經合之所係而所主病各不同井主心下滿肝木病也足厥陰之支從肝別貫膈上注肺故井主心下滿榮主身熱心火病也俞主體重節痛脾土病也經主喘咳寒熱肺金病也合主逆氣而泄腎水病也故令十一病各一端爲例餘病可以類推而互取也不言六府者舉藏足以該之

六十九難曰經言虛者補之實者瀉之不虛不實以經取之何謂也然實者瀉其子當先補之然後瀉之不虛不實以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之

靈樞第十篇載十二經皆有盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之虛者補其母實者瀉其子子能令母實母能令子虛也假令肝病虛卽補厥陰之合曲

在十一椎下腎俞在十四椎下皆俠脊兩旁各一寸五分陰病行陽陽病行陰者陰陽經絡氣相交貫藏府腹背氣相通應所以陰病有時而行陽陽病有時而行陰也針法曰從陽引陰從陰引陽

六十八難曰五藏六府皆有井榮俞經合皆何所主然者三焦之尊號也故所止輒爲原五藏六府之有病也皆取其原也

經言所出爲井所流爲榮所注爲俞所行爲經所入爲合井主心下滿榮主身熱俞主體重節痛經主喘咳寒熱合主逆氣而泄此五藏六府井榮俞經合所主病也

主主治也井谷井之井水源之所出也榮俞輸也注也自榮井之源本微故所流尙小而爲榮俞輸也注也自榮而注乃爲俞也由俞而經過於此乃謂之經由經而入於所合謂之合合者會也靈樞第一篇曰五藏五俞二十五俞六六三十六俞此俞字皆空穴之總名凡諸空穴皆可以言俞經脈十二絡脈十五凡二十七氣所行皆井榮俞經合之所係而所主病各不同井主心下滿肝木病也足厥陰之支從肝別貫膈上注肺故井主心下滿榮主身熱心火病也俞主體重節痛脾土病也經主喘咳寒熱肺金病也合主逆氣而泄腎水病也故令主逆氣而泄腎水病也謝氏曰此舉五藏之病各一端爲例餘病可以類推而互取也不言六府者舉藏足以該之

六十九難曰經言虛者補之實者瀉之不虛不實以經取之何謂也然實者瀉其子當先補之然後瀉之不虛不實以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之

靈樞第十篇載十二經皆有盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之虛者補其母實者瀉其子子能令母實母能令子虛也假令肝病虛卽補厥陰之合曲

泉是也實則瀉厥陰之榮行間是也先補後瀉即後篇陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰之意然於此義不屬非闕誤即衍文也不實不虛以經取之者即四十九難憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺云云者蓋正經之自病者也楊氏曰不實不虛是諸藏不相乘也故云自取其經

七十難曰春夏刺淺秋冬刺深者何謂也然春夏者陽氣在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下故當深取之

春夏之時陽氣浮而上人之氣亦然故刺之當淺欲其無太過也秋冬之時陽氣沈而下人氣亦然故刺之當深欲其無不及也經曰必先歲氣無伐天和此之謂也四明陳氏曰春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在骨髓是淺深之應也

春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也然春夏致一陰者初下針沈之至腎肝之部得氣引持之陰也致一陰者初下針沈之至腎肝之部得氣引持之陰也秋冬寒必致一陽者初內針淺而浮之至心肺之部得氣推內之陽也是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽致取也春夏氣溫必致一陰者春夏養陽之義也初下針即沈之至腎肝之部候其得氣乃引針而提之以至於心肺之分所謂致一陰也秋冬氣寒必致一陽者秋冬養陰之義也初內針淺而浮之當心肺之部候其得氣推針而內之以達於腎肝之分所謂致一陽也○此篇致陰致陽之說越人特推其理有如是相拘也然諸井者木也榮者火也火者木之子當刺井者以瀉之故經言補者不可以爲瀉瀉者不可以爲補此之謂也

七十二難曰經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必在陰陽何謂迎隨然謂迎隨之法補瀉之道也迎者迎而奪之隨者隨而濟之然必知榮衛之流行經脈之往來其義一也知之而後可以視夫病之所當而爲補瀉也○四明陳氏曰迎者逆其氣之方往而未盛也以瀉之隨者隨其氣之方往而未虛也以補之愚按迎隨有二有虛實迎隨有子母迎隨陳氏之說虛實迎隨也若七十九難所載子母迎隨也調氣之方必在陰陽者知其內外表裏陰陽之氣者如從之故曰調氣之方必在陰陽

在察也內爲陰外爲陽表爲陽裏爲陰察其病之在陰在陽而調之也楊氏曰調氣之方必在陰陽者陰虛陽實則補陰瀉陽陽虛陰實則補陽瀉陰或陽并於陰陰并於陽或陰陽俱虛俱實皆隨其所見而調之謝氏曰男外女內表陽裏陰調陰陽引陰從陰引陽從陽病治陰陰病治陽之類

七十三難曰諸井者肌肉淺薄氣少不足使也刺之奈何然諸井者木也榮者火也火者木之子當刺井者以榮瀉之故經言補者不可以爲瀉瀉者不可以爲補此之謂也

七十四難曰經言春刺井夏刺榮季夏刺俞秋刺經冬刺合者何謂也然春刺井者邪在肝夏刺榮者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎

榮俞之聚四時者以其邪各有所在也

七十五難曰經言東方實西方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火土當更相平東方土也西方金也木欲實金當平之火欲實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之東方肝也則知肝實西方肺也則知肺虛瀉南方火補北方水南方火火者木之子也北方水水者木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水欲令金不得平木也經曰不能

治其虛何問其餘此之謂也

金不得平木不字疑衍○東方實西方虛為南方補北方者木金火水欲更相平也木火土金水之欲實五行之實勝而務權也金水木火土之相平以五行所勝而制其貪也經曰一藏不平所勝平之東方肝也西方肺也東方實則知西方虛矣若西方不虛則東方安得而過於實耶或瀉或補要亦抑其甚而濟其不足損過就中之道也水能勝火子能令母實母能令子虛瀉南方火者奪子之氣使貪母之有餘補北方水者益子之氣使不貪於母也如此則過者退而抑者進金得平其木而東西二方無復偏勝偏虧之患矣越人之意大抵謂東方過於實而西方之氣不足故瀉火以抑其太補水以濟其金是乃使金得與木相停故曰欲令金不得平木也若曰欲令金不得平木則前後文義窒礙竟說不通使肝木不過肺不虛復瀉火補水不幾於實實虛虛耶八十一難文義正與此互相發明九峰蔡氏謂水火金木土殺惟修取相勝以洩其過其意亦同故結句云不能治其虛何問其餘蓋為知常而不知變者之戒也此篇大意在肝實肺虛瀉火補水上○或問子能令母實母能令子虛當瀉火補土為是蓋子有餘則不貪母之氣母不足則不能蔭其子瀉南方火乃奪子之氣使母之有餘補中央土則益母之氣使得以蔭其子也今乃瀉火補水何歟曰此越人之妙一舉而兩得之者也其瀉火一則以奪木之氣一則以去金之克補水一則以益金之氣一則以制火之光若補土則一於助金而已不可施於兩用此所以不補土而補水也或又問母能令子實子能令母虛五行之道也今惡人乃謂子能令母實母能令子虛何哉曰是各有其說也母能令子實子能令母虛者五行之生化子能令母實母能令子虛者五行之勝固不相悖也○四明陳氏曰仲景云木行乘金名曰橫內經曰氣有餘則制己所勝而侮所不勝木實金虛是木橫而侵金侮所不勝也木實本以金平之然以其氣正強而橫金平之則兩不相伏而戰戰則實者亦傷虛者亦敗金虛本資氣於土然其時土亦受制未足以資之故取水為金之子又為木之母於是瀉火補水使木勝火則火餒而取氣於木木乃減而不復賈水為木母此母能令子虛也木既不賈其氣乃平平則金免木侵而不復虛水為金子此子能令母實也所謂金不得平木不得徑以金平其木必瀉火補水而旁治之使木金之氣自然兩平耳今按陳氏此說亦自有理但為不之一字所纏未免牽強費解不若直以不字為衍文觀八十一篇中當知金平木一語可見矣

七十六難曰何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣然當補之時從衛取氣當瀉之時從榮置氣其陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽榮衛通行此其要也

靈樞五十二篇曰浮氣之不循經者為衛氣其精氣之行于經者為榮氣蓋補則取浮氣之不循經者以補虛虛瀉則從榮置其氣而不用也置猶弃置之置然人之病虛實不一補瀉之道亦非一也是以陽氣

不足而陰氣有餘則先補陽而後瀉陰以和之陰氣不足而陽氣有餘則先補陰而後瀉陽以和之如此則榮衛自然通行矣補瀉法見下篇

七十七難曰經言上工治未病中工治已病者何謂也○四明陳氏曰仲景云木行乘金名曰橫內經曰氣有餘則制己所勝而侮所不勝木實金虛是木橫而侵金侮所不勝也木實本以金平之然以其氣正強而橫金平之則兩不相伏而戰戰則實者亦傷虛者亦敗金虛本資氣於土然其時土亦受制未足以資之故取水為金之子又為木之母於是瀉火補水使木勝火則火餒而取氣於木木乃減而不復賈水為木母此母能令子虛也木既不賈其氣乃平平則金免木侵而不復虛水為金子此子能令母實也所謂金不得平木不得徑以金平其木必瀉火補水而旁治之使木金之氣自然兩平耳今按陳氏此說亦自有理但為不之一字所纏未免牽強費解不若直以不字為衍文觀八十一篇中當知金平木一語可見矣

七十八難曰鍼有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出內針也知為針者信其左不知為針者信其右當刺之時先以左手厭按所針榮俞之處彈而努之爪下之其氣之來如動脈之狀順針而刺之得氣因推而內之是謂補動而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死不治也

彈而努之鼓勇之也努讓若怒爪而下之掐之稍重皆欲致其氣之至也氣至指下如動脈之狀乃乘其至而刺之順猶循也乘也停針待氣氣至針動是得氣也因推針而內之是謂補動針而伸之是謂瀉此越人心法非呼吸出內者也是固然也若停針候氣久而不至乃與男子則淺其針而候之衛氣之分女子則深其針而候之榮氣之分如此而又不得氣是

謂其病於不可治也篇中前後二氣字不同不可不辨前言氣之來如動脈狀未刺之前左手所候之氣也後言得氣不得氣針下所候之氣也此自兩節周仲立乃云凡候氣左手宜略重之候之不得乃與男則少輕其手於衛氣之分以候之女則重其手於榮氣之分以候之如此則既無前後之分又昧停針待氣之道尙何所据爲補寫耶

七十九難曰經言迎而奪之安得無虛隨而濟之安得無實虛之與實若得若失實之與虛若有若無何謂也

出靈樞第一篇得求而獲也失縱也道也其第二篇曰言實與虛若有若無者謂實者有氣虛者無氣也言虛與實若得若失者謂補者佹然若有得也瀉者怳然若有失也卽第一篇之義

然迎而奪之者寫其子也隨而濟之者補其母也假令心病心火也土爲火之子手心主之俞大陵也實則寫之是迎而奪之也木者火之母手心主之井中衝也虛則補之是隨而濟之也迎者迎於前隨者隨其後此假心病寫手心主俞是謂迎而奪之者也補手心主井是謂隨而濟之者也

迎而奪之者寫也隨而濟之者補也假令心病心火也土爲火之子手心主之俞大陵也實則寫之是迎而奪之也木者火之母手心主之井中衝也虛則補之是隨而濟之也迎者迎於前隨者隨其後此假心病寫手心主俞是謂迎而奪之者也補手心主井是謂隨而濟之者也

八十難曰經言有見如入有見如出者何謂也然所謂有見如入者謂左手見氣來至乃內針針入見氣盡乃出針是謂有見如入有見如出者也

所謂有見如入下當欠有見如出四字如讀若而盂子書望道而未之見而讀若如蓋通用也○有見而入出者謂左手按穴待氣來至乃下針針入候其氣

八十一難曰經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脈耶將病自有虛實耶其損益奈何然是病非謂寸口脈也謂病自有虛實也假令肝實而肺虛肝者木也肺者金也金木當平木如七十五難之說若肺實肝虛則當抑金而扶木也用針者乃是病二字非誤卽衛肝實肺虛金當平木假令肺實而肝虛損不足而益有餘此者中工之所害也

不補其肝而反重實其肺此所謂實其實而虛其虛損不足而益有餘殺人必矣中工中常之工猶云粗工也○按難經八十一篇蓋辭甚簡然而榮衛度數尺寸位置陰陽王相藏府內外脈法病能經絡流注針刺穴俞莫不該盡而此篇尤創艾切切蓋不獨爲用針者之戒凡爲治者皆所當戒又納爭之微意也於乎越人當先秦戰國時與內經靈樞之出不遠必有得於口授面命傳聞睥睨者故其見之明而言之詳不但如史家所載長桑君之遇也邵氏乃謂經之當難者未必止此八十一條隱猶有望於後人歟

脈經

王叔和撰
林億等類

脈經目錄

卷一

脈形狀指下祕訣第一
平脈早晏法第二
分別三關境界脈候所主第三
辨尺寸陰陽榮衛度數第四
平脈視人大小長短男女逆順法第五
持脈輕重法第六
兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順第七
辨腑藏病脈陰陽大法第八
辨脈陰陽大法第九
平虛實第十
從橫逆順伏匿脈第十一
辨災怪恐怖雜脈第十二
遲疾短長雜脈第十三
平人得病所起脈第十四
診病將差難已脈第十五

卷二

平三關陰陽二十四氣脈第一
平人迎神門氣口前後脈第二
平三關病候并治宜第三
平奇經八脈病第四 八脈爲病不在十二經故以本諸本並作十一 繫此卷之末案十二從泰定

卷三

肝膽部第一
心小腸部第二
脾胃部第三
肺大腸部第四
腎膀胱部第五

卷四

辨三部九候脈證第一
平雜病脈第二
診五藏六腑氣絕證候第三
診四時相反脈第四
診損至脈第五
診脈動止投數疏數死期年月第六
診百病死生訣第七
診三部脈虛實決死生第八

卷五

張仲景論脈第一
扁鵲陰陽脈法第二
扁鵲脈法第三
扁鵲華佗察聲色要訣第四
扁鵲診諸反逆死脈要訣第五

卷六

肝足厥陰經病證第一
膽足少陽經病證第二
心手少陰經病證第三
小腸手太陽經病證第四
脾足太陰經病證第五
胃足陽明經病證第六
肺手太陰經病證第七
大腸手陽明經病證第八
腎足少陰經病證第九
膀胱足太陽經病證第十
三焦手少陽經病證第十一

卷七

病不可發汗證第一
病可發汗證第二
病發汗以後證第三
病不可吐證第四
病可吐證第五
病不可下證第六
病可下證第七
病發汗吐下以後證第八
病可溫證第九
病不可灸證第十
病可灸證第十一
病不可刺證第十二
病可刺證第十三
病不可水證第十四
病可水證第十五

病不可火證第十六
病可火證第十七
熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八
重實重虛陰陽相附生死證第十九
熱病生死期日證第二十
熱病十逆死日證第二十一
熱病五藏氣絕死日證第二十二
熱病至厥死日證第二十三
熱病損脈死日證第二十四
卷八
平卒尸厥脈證第一
平痙濕暍脈證第二
平陽毒陰毒百合狐惑脈證第三
平癲飜轉筋脈證第四
平中風歷節脈證第五
平血痺虛勞脈證第六
平消渴小便利淋脈證第七
平水氣黃汗氣分脈證第八
平黃疸寒熱瘧脈證第九
平胸痺心痛短氣貫脈脈證第十
平腹滿寒疝宿食脈證第十一
平五藏積聚脈證第十二
平嘔吐下血胸滿瘀血脈證第十三
平喉嚨下利脈證第十四
平肺癰咳逆上氣淡飲脈證第十五
平癰腸癰金瘡浸淫脈證第十六
卷九
平妊娠分別男女將產諸證第一
平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證第二
平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證第三
平帶下絕產無子亡血居經證第四
平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證第五
平咽中如有炙臠喜悲熱入血室腹滿證第六
平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七
平婦人病生死證第八
平小兒雜病證第九
卷十
手檢圖二十一部

脈形狀指下祕訣第一
平脈早晏法第二
分別三關境界脈候所主第三
辨尺寸陰陽榮衛度數第四
平脈視人大小長短男女逆順法第五
持脈輕重法第六
兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順第七
辨腑藏病脈陰陽大法第八
辨脈陰陽大法第九
平虛實第十
縱橫逆順伏匿脈第十一
辨災怪恐怖雜脈第十二
遲疾短長雜脈第十三
平人得病所起脈第十四
診病將差難已脈第十五
脈形狀指下祕訣第一 二十四種
浮脈舉之有餘按之不足 浮於手下
芤脈浮大而軟按之中央空兩邊實 一曰手下無兩傍有
洪脈極大在指下一曰浮而大
滑脈往來前卻流利展轉替替然與數相似 一曰浮中一曰流利如欲脫
數脈去來促急 一曰一息六七至一曰故者進之名
促脈來去數時一止復來
弦脈舉之無有按之如弓弦狀 一曰不移又曰浮緊為弦
緊脈數如切繩狀 一曰如轉索之無常
沈脈舉之不足按之有餘 一曰重按之乃得

伏脈極重指按之著骨乃得一曰手下我動一曰按之不足舉之無有一曰關上獨不出名曰伏

革脈有似沈伏實大而長微弦千金翼以革爲牢

實脈大而長微強按之隱指幅幅然一曰沈浮皆得

微脈極細而軟或欲絕若有若無一曰小也一曰手下按之如欲盡

濇脈細而遲往來難且散或一止復來一曰浮而短一曰短而止或如散也

細脈小大於微常有但細耳

軟脈極軟而浮細一曰按之無有舉之有餘一曰小而軟軟亦作濡曰濡者如帛衣在水中著手相得

弱脈極軟而沈細按之欲絕指下一曰按之乃得舉之無有

虛脈遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脈大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脈去來亦遲小緩於遲一曰浮大而軟除脈與陽同等

遲脈呼吸三至去來極遲一曰舉之不足按之盡牢

結脈往來緩時一止復來按之來緩時一止者名結陽初來動止更來小數不能自還舉之則動名結陰

代脈來數中止不能自還因而復動脈結者生代者死

動脈見於關上無頭尾大如豆厭厭然動搖傷寒論云陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒動脈見於關上上下無頭尾如豆大厭厭動搖者名曰動

浮與芤相類與洪相類弦與緊相類革與實相類千金翼云牢與實相類

滑與數相類沈與伏相類微與濇相類軟與弱相類緩與遲相類軟與遲相類

平脈早晏法第二

黃帝問曰夫診脈常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均血氣未亂故乃可診過此非也千金同素問太素云有過之脈切脈動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脈候所主第三

從魚際至高骨其骨自高卻行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腹及腰尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脈之大會手太陰之脈也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周晝夜凡行五十周復會於手太陰太陰者寸口也寸口五藏六腑之所終始故取法於寸口

脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大會要也從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺內一寸陽得尺外一寸而沈過者法曰太過滅者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也關之後者陰之動也脈當見一寸而浮過者法曰太過滅者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈也關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過滅者法曰不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過滅者法曰不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然尺寸何謂也然尺寸者脈之大會要也從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺內一寸陽得尺外一寸而沈過者法曰太過滅者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也關之後者陰之動也脈當見一寸而浮過者法曰太過滅者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈也關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過滅者法曰不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過滅者法曰不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然尺寸何謂也然尺寸者脈之大會要也從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺內一寸陽得尺外一寸而沈過者法曰太過滅者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也關之後者陰之動也脈當見一寸而浮過者法曰太過滅者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈也關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過滅者法曰不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然

持脈輕重法第六

脈有輕重何謂也然初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺部也菽者小豆言脈輕如三小豆之重呂氏作大豆浮之在皮毛之間者肺氣所行故言肺部也如六菽之重與血脈相得者心部也心主血脈次於肺在中央主肌肉也如九菽之重與肌肉相得者脾部也脾在六菽之下故次心如九豆之重如十二菽之重與筋平者肝部也肝主筋又在脾下故次之按之至骨舉之來疾者腎部也腎主骨其脈沈至骨故曰輕重也

持脈輕重次第法第七

兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順脈法讀云肝心在左脾肺出右腎與命門俱出尺部魂魄藏神皆見寸口左主司官右主司府左大順男右大順女關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門訣斷兩在關後人無二脈病死不愈諸經損滅各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三陰三陽誰先誰後府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太陽爲表裏以小腸合爲府合於上焦名曰神庭在鼻尾下五分一作鳩尾

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽爲表裏以膽合爲府合於中焦名曰胞門一作少陽在太倉左右三

寸。腎部在左手關後尺中是也。足少陰經也。與足太陽爲表裏。以膀胱合爲府。合於下焦在關元左。肺部在右手關前寸口是也。手太陰經也。與手陽明爲表裏。以大腸合爲府。合於上焦。名呼吸之府。在雲門。脾部在右手關上是也。足太陰經也。與足陽明爲表裏。以胃合爲府。合於中焦。脾胃之間名曰章門。在季肋前一寸半

腎部在右手關後尺中是也。足少陰經也。與足太陽爲表裏。以膀胱合爲府。合於下焦。在關元右。左扁腎右爲子戶。名曰三焦

辨藏腑病脈陰陽大法第八

脈何以知藏腑之病也。然數者腑也。遲者藏也。數即有熱。遲即生寒。諸陽爲熱。諸陰爲寒。故別知藏腑之病也

腑者陽故其脈數藏者陰故其脈遲陽行遲病則數陰行疾病則遲

脈來浮大者此爲肺脈也。脈來沈滑堅如石（案堅字從袁校本泰定本空一字脈本無）腎脈也。脈來如弓弦者肝脈也。脈來疾去遲心脈也。脈來當見而不見爲病病有淺深。但當知如何受邪

辨脈陰陽大法第九

脈有陰陽之法。何謂也。然呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味也。其脈在中。浮者陽也。沈者陰也。故曰陰陽

心肺俱浮。何以別之。然浮而大散者心也。浮而短濇者肺也。腎肝俱沈。何以別之。然牢而長者肝也。按之耎弱指來實者腎也。脾者中州。故其脈在中（千金翼云遲緩而長者脾也）是陰陽之脈也

脈經 卷一 九

脈有陽盛陰虛。陰盛陽虛。何謂也。然浮之損小。沈之實大。故曰陽盛陰虛。沈之損小。浮之實大。故曰陰盛陽虛。沈之損小。浮之實大。故曰陽盛陰虛。是陰陽虛實之意也。（陽脈見寸口浮而實大今輕手浮之反更實大而沈故曰陰盛）

經言脈有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰。如此言之。寸口有六脈俱動耶。然經言如此者。非有六脈俱動也。謂浮沈長短滑濇也。浮者陽也。滑者陽也。長者陽也。沈者陰也。濇者陰也。短者陰也。所以言一陰一陽者。謂脈來沈而滑也。一陰二陽者。謂脈來浮滑而長（案浮泰定本作滑難經作）而濇也。一陽二陰者。謂脈來長而沈濇也。一陽三陰者。謂脈來沈濇而短時一浮也。各以其經所在名病之逆順也。

凡脈大爲陽浮爲陽數爲陽動爲陽長爲陽滑爲陽沈爲陰濇爲陰弱爲陰微爲陰是爲三陰三陽也。陽病見陰脈者反也。主死。陰病見陽脈者順也。主生。關前爲陽關後爲陰陽數則吐血陰微則下利陽弦則頭痛陰弦則腹痛陽微則發汗陰微則自下陽數陰數加微必惡寒而煩撓不得眠也。陰附陽則口生瘡陰附陽則癲得陽屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則狂陽附陰則癲得陽屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則噫陽微則不能呼陰微則不能吸呼吸不足胸中短氣依此陰陽以察病也

寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱寸口脈沈細者名曰陰中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉尺脈沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立

脈經 卷一 十

陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然尺脈牢而長關上無有此爲陰干陽其人苦兩脛重少腹引臍痛

寸口脈壯大尺中無有此爲陽干陰其人苦腰背痛陰中傷足脛寒

夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在陽胃之間以藥和之若在經脈之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也。然有脈之虛實有病之虛實有診之虛實脈之虛實者脈來耎者爲虛牢者爲實病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者聲者爲虛實者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂重實者言大熱病氣熱脈滿是謂重實

問曰經絡俱實如何以治之答曰經絡皆實是寸脈急而尺緩也當俱治之故曰滑則順濇則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

辨橫逆順伏匿脈第十一

問曰脈有相乘有從有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火金行乘木名曰從火行乘金火行乘木名曰橫水行乘火金行乘水木行乘金名曰逆金行乘火木行乘水名曰順經言脈有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰陽更相乘更相伏也脈居陰部反見陽脈者爲陽乘陰也脈雖時沈濇而短此陽中伏陰也脈居陽部反見陰脈

脈經 卷一 十一

者爲陰乘陽也脈雖時浮滑而長此爲陰中伏陽也重陰者癲重陽者狂脫陽者見鬼脫陰者目盲

辨災怪恐怖雜脈第十二

問曰脈有殘賊何謂師曰脈有弦有緊有滑有浮有沈此六脈爲殘賊能與諸經作病

問曰脈爲人所難緊脈何所從而來師曰假令亡汗若吐脈中寒故令緊假令咳者坐飲冷水故令緊假令下利者以胃中虛冷故令緊也

問曰翕奄沈名曰滑何謂師曰沈爲純陰翕爲正陽陰陽和合故脈滑也

問曰脈有災怪何謂師曰假令人病脈得太陽脈與病形證相應因爲作湯此還送湯之時病者因大吐若下利而腹中痛因問言我前來脈時不見此證今反變異者是名爲災怪因問何緣作此吐利答曰或有先服藥今發作故爲災怪也

問曰人病恐怖其脈何類師曰脈形如循繩累累然其面白脫色

問曰人愧者其脈何等類師曰其脈自浮而弱面形乍白乍赤

問曰人不飲其脈何類師曰其脈自弦案弦泰定本居散本竝作滑而脣口乾燥也

言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表濕也坐而伏者短氣也坐而下一睞者必腰痛裏實讝謼如懊卿者必心痛

師持脈病人欠者無病也脈之因伸案伸袁校一作呻趙無病也一云呻者病也假令向壁卧聞師到不驚起而目盼視反面仰者三言三止脈之咽唾此爲菲病假令脈自和處言

此病太重當須服吐下藥針灸數十百處乃愈案袁校云疑有闕文

遲疾短長雜脈法第十三

黃帝問曰余聞胃氣手少陽三焦四時五行脈法夫子言脈有三陰三陽知病存亡脈外以知內尺寸大小廣狹之要皆見寸口之中外別浮沈前後左右虛實死生聞之或伯曰寸口之中外別浮沈前後左右虛實死生之要皆見寸口之中脈從前來者爲實邪從後來者爲虛邪從所不勝來者爲賊邪從所勝來者爲微邪自病一作得者爲正邪外結者病癰腫內結者病痂瘕也問來而急者病正在心癥氣也脈來疾者爲風也脈來滑者爲病食也脈來澀者病有熱也脈來澀者爲病寒濕也脈逆順之道不與衆謀

師曰呼吸者脈之頭也初持脈來疾去遲此爲出疾入遲爲內虛外實初持脈來遲去疾此爲出遲入疾爲內實外虛也

脈數則在府遲則在藏脈長而弦病在肝扁鵲云病出於肝脈下堅上虛病在脾胃扁鵲云病出於脾胃脈大而堅病在腎扁鵲云病出於腎脈滑者多血少氣脈澀者少血多氣脈大者血氣俱多又云脈來大而堅者血氣俱實脈小而疾者血氣俱少又云脈來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱遲緊者寒又云洪數滑疾爲熱清遲沈細爲寒案此十四字泰定本作正文脈盛滑緊者病在外熱脈小實而緊者病在內冷脈小弱而滑緊者病在外熱脈小實而緊者病在內冷脈洪大緊急病滴謂之久病脈滑浮而疾者謂之新病脈浮滑其人外熱風走刺有飲難治脈沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下脈沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重脈浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便脈洪大緊急病

連進在外苦頭發熱癰腫脈細小緊急病遲進在中寒爲痂瘕積聚腹中刺痛脈沈重而直前絕者病血在腸間脈沈重而中散者因寒食成瘕脈直前而中散絕者病消渴一云病便溏痛脈沈重前不至寸口排徊絕者病在肌肉遲尸脈左轉而沈重者氣癰陽在胸中脈右轉出不至寸口者內有肉癰脈累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏匿不去脈累累中止不至寸口輭者粘熱在小腸膜中伏匿不去脈直前左右彈者病在血脈中脈血也脈後而左右彈者病在筋胥中也脈前大後小卻頭病曰吃脈前小後大卻胸滿短氣上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無所苦夫脈者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脈代則氣至細則氣少太素細作滑濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊絕絳其去如弦絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而弦急者病在內浮而洪大者病在外在內脈虛者病在外在上爲表在下爲裏浮爲在表沈爲在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脈也無心脈夏得病無肺脈秋得病無腎脈冬得病無脾脈四季之月得病假令肝病者西行若食雞肉得之當以秋時發得病以庚辛日也家有腥死女子見之以明要爲災不者若感金銀物得之案袁校云明要二字疑誤假令脾病東行若食雞兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也假令心病北行若食脈魚得之不者當以冬時發得病

以壬癸日也
假令肺病南行若食馬肉及臛鹿肉得之不者當以夏
時發得病以丙丁日也
假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以
是夏時發得病以戊己日也
假令得王脈當於縣官家得之
假令得相脈當於嫁娶家得之或相慶賀者得之
假令得胎脈當於產乳家得之
假令得囚脈當於囚徒家得之
假令得休脈其人素有宿病不治自愈
假令得死脈當於死喪家感傷得之
何以知人露卧得病陽中有陰也
何以知人夏月得病諸陽入陰也
何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但有
陰脈來疾去疾此相爲水氣之毒也脈遲者食乾物得
之

卅 診病將差難已脈第十五

問曰假令病人欲差脈而知愈何以別之師曰寸關尺
大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脈陰陽爲平
復當自愈
人病其寸口之脈與人迎之脈大小及浮沈等者病難
已

平三關陰陽二十四氣脈第一
平人迎神門氣口前後脈第二
平三關病後并治宜第三
平三關病第四 八脈爲疾不在十二經故以繫此卷之末
平奇經八脈病第五
平三關陰陽二十四氣脈第一
左手關前寸口陽絕者無小腸脈也苦臍痺小腹中有
瘕瘕狂月即爻上搶心刺手心主經治陰心主在掌後
橫理中 即太陵穴也
左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痺一作急痛小
腹有熱小便赤黃刺手太陽經治陽一作手少太陽在手小指外側本節陷中 即後谿穴也
左手關前寸口陰絕者無心脈也苦心下毒痛掌中熱
時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽
左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂懣發
之刺手心主經治陰
左手關上陽絕者無膽脈也苦膝疼口中苦燥目善悲
如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陽在足大指間穴也或刺三毛中
左手關上陽實者膽實也苦腹中實不安身羅習習也
刺足少陽經治陽在足上第二寒二寒定本衰校本並作一指本節後一寸第二指當云小指次指間穴也案居敬本與此同泰定本衰校本第二本二字並作一無火指二字次足少陽膽經在足第四指端從竅至臨泣穴則小指次指爲是作第一者非二字
左手關上陰絕者無肝脈也苦癰遺溺難言脅下有邪
氣善吐刺足少陽經治陽
左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足

陰經治陰

左手關後尺中陽絕者無膀胱脈也苦逆冷婦人月使不調壬月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰

左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷脊下有邪氣在足內踝下動脈（即太谿穴也）

相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中（即刺骨穴也）

左手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眩眩（案宇典靈樞經脈篇目眩眩如無所見耳聾悵悵善鳴計腎虛則瞳神昏眩俗本謂作眩非）刺足少陰經治陰

右手關前寸口陽絕者無大腸脈也苦少氣心下有水氣立秋節即刺刺手太陰經治陰在魚際間（即太淵穴也）

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中（即陽谿穴也）

右手關前寸口陰絕者無肺脈也苦短氣欬逆喉中寒隱逆刺手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿彭彭與肩相引刺手太陰經治陰

右手關上陽絕者此無胃脈也苦吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰經治陰在足大指本節後一寸（即公孫穴也）

右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏一作不思食物得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脈（即衝陽穴也）

右手關上陰絕者無脾脈也苦少氣下利腹滿身重四肢不欲動善嘔刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難

刺足太陰經治陰

右手關後尺中陽絕者無子戶脈也苦下無子陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上抬胸痛夢入水見鬼善厭寐黑色物來掩人上刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰實者肝實也苦骨疼腰脊痛內寒熱刺足少陰經治陰

平人迎神門氣口前後脈第二

右陰陽二十四氣脈證

心實

左手寸口人迎以前脈陰實者手厥陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脈刺三里

心虛

左手寸口人迎以前脈陰虛者手厥陰與少陽經俱虛也病苦胸中氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦寒少氣四肢厥腸澼洞泄

肝實

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脇痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦脇下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥憂足指不能指壁坐不能起饘仆目黃失精眩眩

肝膽俱實

左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脈嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人若見少氣不能言時時自驚

小腸實

左手寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身熱熱來去汗出一作汗而煩心中滿身重口中生瘡

小腸虛

左手寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經也病苦顛際偏頭痛耳頰痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與太陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以言

氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦寒少氣四肢厥腸澼洞泄

肝實

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脇痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦脇下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥憂足指不能指壁坐不能起饘仆目黃失精眩眩

肝膽俱實

左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脈嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人若見少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦勝胕脹閉少腹與腰脊相引痛

腎虛

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以言

腹心煩嗌乾胃脇時痛喘咳汗出小腹脹滿腰背強多
體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾

腎虛

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心中
悶下重足腫不可以按地

膀胱實

左手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦逆滿
腰中痛不可俛仰勞也

膀胱虛

左手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦腘中
筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外
踝後痛

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經
俱實也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明惕惕中不樂或如恐
怖

脾實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經
俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲（一作倦）（居敬本作腫）臂腫不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經
俱虛也病苦胸中痛上衝肺肝動五藏並喘鳴多驚身熱汗不出喉痺
喘鳴腸鳴虛渴胃口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經
俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲（一作倦）（居敬本作腫）臂腫不收
喘鳴腸鳴虛渴胃口乾目急善驚泄白

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經
俱虛也病苦胸中痛上衝肺肝動五藏並喘鳴多驚身熱汗不出喉痺
善噦欬面赤身熱咽喉中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中
痛上衝肺肝動五藏並喘鳴多驚身熱汗不出喉痺
喘鳴腸鳴虛渴胃口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經
俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲（一作倦）（居敬本作腫）臂腫不收

寒中泄腎心俱痛一作云腎有左右腸胃無二今甲乙以左腎合膀胱右腎合三焦

平三關病候并治宜第三

寸口脈浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府向火灸身摩治風膏覆令汗出

寸口脈緊苦頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝顳顬摩治傷寒膏

寸口脈微苦寒爲劇宜服五味子湯摩桑萸膏令汗出

寸口脈數即爲吐以有熱在胃脘熏胸中宜服藥吐之

及針胃脘服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱在胸中煩滿渴者宜服知母湯

寸口脈緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄

熨之摩以風膏灸諸治風穴

寸口脈弦心下愊愊微頭痛心下有水氣宜服甘遂丸

寸口脈滑陽實胸中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕瀉之

針期門瀉之

寸口脈弱陽虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補散適飲食消息勿極勞針胃管穗之

寸口脈澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針三里補之三里一作胃管

寸口脈北吐血微北者即血空虛血去故也宜服竹皮湯黃耆湯灸臍中

寸口脈伏胸中逆氣噎塞不通是胃中冷氣上衝心胸宜服前胡湯大三建丸針巨闕上管灸臍中

寸口脈沈遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以煖之

寸口脈實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛即生寒在脾胃食不消化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒即宜服茱萸丸生薑湯

寸口脈細發熱吸吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯灸中府

寸口脈洪大胸脇滿宜服生薑湯白薇丸亦可紫苑湯下之針上管期門章門

右上部寸口十七條

關脈浮腹滿不欲食浮爲虛滿宜服平胃丸茯苓湯生薑前胡湯針胃脘先瀉後補之

關脈緊心下苦滿急痛脈緊者爲實宜服茱萸當歸湯又大黃湯兩治之更針巨闕下管瀉之千金云當歸湯又加大黃二兩佳

關脈微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子丸針巨闕補之

關脈數胃中有客熱宜服知母丸除熱湯針巨闕上管瀉之

關脈緩其人不欲食此胃氣不調脾氣不足宜服平胃丸補脾湯針章門補之

關脈滑胃中有熱消爲熱實以氣滿故不欲食食即吐逆宜服紫菀湯下之大平胃丸針胃管瀉之于金云宜服朴消麻黃湯

關脈弦胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故爾宜服茱萸湯針胃脘補之

關脈弱胃氣虛胃中有熱不可大攻之熱去則寒起止宜服竹葉湯針胃脘補之

關脈滿血氣逆冷脈澀爲血虛以中焦有微熱宜服乾地黃湯內補散針足太衝上補之

關脈伏中焦有水氣清泄宜服水銀丸針關元利小便

關脈沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓丸附子湯生薑前胡湯針胃脘先瀉後補之

關脈濇苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎丸針關元補之

關脈遲胃中寒宜服桂枝丸茱萸湯針胃脘補之

關脈實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭丸針胃脘補之

關脈牢脾胃氣盛熱即腹滿譽譽宜服紫菀丸瀉脾丸針灸胃脘瀉之

關脈細脾胃虛腹滿宜服生薑茱萸瑪椒湯白薇丸針灸三管

關脈洪胃中熱必煩滿宜服平胃丸針胃脘先瀉後補之

右中部關脈十八條

尺脈浮下熱風小便難宜服橘麥湯滑石散針橫骨關元瀉之

尺脈緊腸下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脈微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯一本更有

順針氣海湯

尺脈數惡寒脾下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針樞骨瀉之

尺脈緩腳弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石散瞿麥湯針横骨瀉之

尺脈滑血氣實婦人經脈不利男子溺血宜服朴硝煎大黃湯下去經血針關元瀉之

尺脈弦小腹痠小腹及腳中拘急宜服建中湯當歸湯針氣海瀉之

尺脈踠陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯扶芎湯針關元補之

尺脈濇足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足太衝補之

尺脈芤下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯灸丹田關元亦針補之

尺脈伏小腹痛瘕疝水穀不化宜服大平胃丸桔梗丸針關元補之 桔梗丸一云結腸丸

尺脈沈腰背痛宜服腎氣丸針京門補之

尺脈濇苦小便難 千金云腳不收風痺宜服瞿麥湯白魚散針關元瀉之

尺脈遲下焦有寒宜服桂枝丸針氣海關元補之

尺脈實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩以利大便針關元補之止小便

尺脈牢腹滿陰中急宜服葶藶子茱萸丸針丹田關元中極

右下部尺脈十六條

平奇經八脈病第四

脈有奇經八脈者何謂也然有陽維陰維有陽蹻陰蹻有衝有督有任有帶之脈凡此八脈者皆不拘於經故曰奇經八脈也經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不虞天雨降下溝渠溢滿霖霪妄行當此之時聖人不能復圖也此絡脈流溢諸經不能復拘也

奇經八脈者既不拘於十二經皆何起何繫也然陽維者起於諸陽之會陰維者起於諸陰之交陽維陰維絡于身溢畜不能環流灌諸經者也陽蹻者起于跟中循外踝而上行入風池陰蹻者亦起於跟中循內踝而上行至咽喉交貫衝脈衝脈者起於關元循腹裏直上至咽喉中 一云衝脈者起於氣衝並陽明之經夾臍上行至胸中而散也督脈者起於下極之俞並於脊裏循背上至風府衝脈者陰脈之海也督脈者陽脈之海也任脈者起於胞門子戶夾脣上行至胸中 一云衝脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉帶脈者起於季肋迴身一周此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脈者也

奇經之爲病何如然陽維維於陽陰維維於陰陽蹻陰蹻能相維悵然失志容容不能自收持 悵然者其人驚卽令身不能自收持卽失志善忘恍惚也 陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛陽維爲衛衛爲寒熱陰維爲榮爲血血者主心故心痛也 陰蹻爲病陽蹻爲病陽緩而陰急陰蹻在內踝病卽其脈急當從內踝以上急外踝以上緩在外踝病卽其脈急其人當從外踝以上急內踝以上緩衝之爲病逆氣而裏急 督之爲病脊彊而厥 督脈在脊令脊重也任之爲病其內苦結男子爲七疝女子爲瘕聚 任脈起於胞門于戶故其病結爲七疝瘕聚 帶之爲病苦腹滿腰容容若坐水中狀 帶脈者迴帶人之身體狀卽其脈緩故令腰容容也此奇經八脈之爲病也

診得陽維脈浮者壅起目眩陽盛實苦眉息洒洒如寒

診得陰維脈沈大而實者苦胸中痛徧下支滿心痛

診得陰維如貫珠者男子雨脇實腰中痛女子陰中痛如有瘕狀

診得帶脈左右遶臍腹腰脊痛衝陰股也

雨手脈浮之俱有陽沈之俱有陰陰陽皆實盛者此爲衝督之脈也衝督之脈者十二經之道路也衝督用事則十二經不復朝於寸口其人皆苦恍惚狂癡不者必當由臍有兩心也

兩手陽脈浮而細微綿綿不可知俱有陰脈亦復細綿此爲陰蹻陽蹻之脈也此家曾有病鬼魅風死苦恍惚亡人爲祟也 案袁校云此家以下十七字疑衍一本無

診得陽蹻病拘急陰蹻病緩

尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰背彊痛不得俛仰大人癲病小兒風癎疾

脈來中央浮直上下痛者督脈也動苦腰背脊寒大人癲小兒癎也炎頂上三丸

尺寸脈俱牢 一作直上直下此爲衝脈也動苦少腹痛上搶心脈來中央堅實徑至關者衝脈也動苦少腹痛上搶心有痕疝絕孕遺失溺腸支滿煩也

橫寸口違丸丸此爲任脈苦腹中有氣如指上搶心不得俛仰拘急

脈來緊細實長至關者任脈也動苦少腹繞臍下引控骨陰中切痛取臍下三寸

脈經卷三

肝膽部第一

心小腸部第二

脾胃部第三

肺大腸部第四

腎膀胱部第五

肝膽部第一

肝象木肝於五行象木與膽合爲府膽爲清淨之府其經足厥陰厥陰肝脈也藏陰弦肝脈之與足少陽爲表裏少陽膽脈也藏陽故爲表裏其脈弦弦肝脈之形也大

其相冬三月廢夏三月廢夏火王木相冬水王木相王春三月木王夏六月季夏土王木囚死秋三月秋金王木死其王日甲乙王時季夏土木也其死日旦日出也其困日戊己困時食時日昳也其死日庚辛死時晡時日入也其神魂肝之所藏者魂其主色其養筋肝氣所養者筋其候目肝候出目故肝實則目赤其聲呼其色青其臭臊肝其味酸其宜苦苦火味也其惡辛辛金味也其液泣泣出肝其時春其日甲乙其數八其音角其畜牛其穀麻其蟲毛其星歲星其臭臊其液泣

爲苦嘔微緩爲水瘕痺大甚爲內癰善嘔鉅微大爲肝痺縮案甚疑肝痺陰縮此脫陰字 款引少腹小甚爲多飲微小爲消癉消甚爲煩痂微滑爲遺溺濇甚爲淡飲微濇爲痿癉

掣筋

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本故脈弗榮則筋縮急筋縮急則引舌與卵故脣青舌卷卵縮則筋先死

庚篇辛死金勝木也

肝死藏浮之脈弱按之中如索不來或曲如蛇行者死

石素問鍼經張仲景

心小腸部第二

心象火與小腸合爲府小腸爲受盛之府也其經手少陰手少陰心脈也

與手太陽爲表裏手太陽小腸脈也 其脈洪洪心脈之大死其相春三月木王火相王夏三月庸季夏六月四秋三月金王火囚死冬三月水王火死其王日丙丁王時禺中日中其困日庚辛困時庸時日入其死日壬癸死時人定夜半其藏神心之所藏者神也 其主臭其養血心氣所養者血其候舌其聲言言由心出故主言 其色赤其臭焦其液汗其味苦其宜甘甘脾味也其惡鹹鹹當心也

心俞在背第五椎或云第七椎 募在巨闕一寸 小腸俞在背第十八椎募在關元臍下三寸

石新撰

心者南方火心主血其色赤故以夏王于南方應火行萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如鉤故名曰鉤心王之時太陽用事故亭木茂盛枝葉布散皆下垂曲故謂之鉤心脈洪大而長洪則衛氣實實則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長榮者血也萌當爲明字之誤耳血王故明且大也榮明衛實當須實動通其津液也長洪相得即引水漿洗灌經絡津液皮膚夏熱陽氣盛故其人引水漿洗灌肌膚以

養皮毛猶草木須雨澤以長枝葉 太陽洪大皆是母軀幸得戊己用牢根株太陽夏火春木爲其母陽得春始生名曰少陽到夏洪盛名曰太陽漢言是母軀也戊己土也土爲火子火王即土相故用牢根株也 陽氣上出汗見於頭五月枯葬胞中空虛醫反下之此爲重虛重月當爲丙葬當爲乾枯燥也皆字誤耳丙字似月由來遠矣遂以傳焉人頭者諸陽之會及時飲水漿上出爲汗先從頭漬於身舉以實其表是以五內乾枯燥則胞中空虛津液少也胞者膀胱府也愚醫不曉故反下之令重虛也 脈浮有表無裏陽無所使陽盛脈浮宜發其汗而反下之損於陰氣陽爲陰使陰爲陽守相須而行脈浮故無裏也治之錯道故令陰陽離別不能復相薄使不但傷身并中其母之不但傷心并役中肝

石四時經

黃帝問曰夏脈如鉤何如而鉤岐伯曰夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在中黃帝曰夏脈太過與不及其病皆何如岐伯曰太過則令人身熱而膚痛爲浸淫不及則令人煩心上見欬唾下爲氣泄帝曰善

心脈來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣爲本心脈來喘喘甲乙作累累 連屬其中微曲曰心病心脈來前曲後居如操帶鉤曰心死案居倨通

眞心脈至堅而搏如循薏苡子累累然其色赤黑不澤毛折乃死

夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死有胃而石曰冬病石甚曰今病

心藏脈脈舍神怵惕思慮則傷神傷則恐懼自失破䐃窄字與言寒素問注䐃肘膝後肉成塊者也脫肉毛悴色夭死於冬

夏心火王其脈洪千金作浮大而散名曰平脈反得沈濇而滑者是治一本云日月年數至二息王癸反得大而緩者是脾之乘心子之扶母爲實邪雖病自愈反得弦細而長者是肝之乘心母之爲虛邪雖病易治反得浮千金浮作微濇而短者是肺之乘心金之陵火爲微邪雖病即差

心脈來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手少陰脈也

心脈急甚爲痹瘛微急爲心痛引背食不下緩甚爲狂笑微緩爲伏梁在心下上下行時唾血大甚爲喉介微大爲心痺引背脊源出小甚爲善噦微小爲消癉滑甚爲蛔厥微滑爲心疝引臍小腹鳴濇甚爲瘖微濇爲血溢維厥耳鳴癲疾

手少陰氣絕則脈不通少陰者心脈也心脈不通則血不流血不流則髮色不澤故其面黑如漆柴柴作柴以意改之也內經作柴

柴案漆柴者黑而無光澤也居敬本

死水勝火也

心死藏浮之脈實如豆麻擊手按之盈滿疾者死

石素問鍼經張仲景

脾胃部第三

脾象土與胃合爲府胃爲水穀之府其經足太陰太陰之脈也與足陽明爲表裏陽明胃脈其脈緩緩脾脈之大形也 其相夏三月火王土相也

王季夏六月庸秋三月冬三月死春三月其王日戊己王時食時日昳困日王癸困時人定夜半其死日甲乙死時平旦日出並本時也其神意其主味甘其宜辛其惡酸

其聲歌其色黃其臭香其液涎其味甘其宜辛其惡酸

脾俞在背第十一椎募在章門季肋端是胃俞在背第十二

右新撰

脾者土也敦而福敦者厚也萬物歛色不同脾主水穀不化脾爲土行王於季夏土性敦厚有養萬物當此之時草木備具枝葉茂盛種類多或青蒼赤白黑色各不同也故名曰得福者廣土生養萬物當此之時脾則同稟諸藏故其德爲廣大恩惠根住莖草木之類也其次則蝡蚑蜚蠉之屬因陰陽氣變化而生者也喘息有血脈之類也言普天之下草木昆蟲無不被稟土之恩福也稟受定居敦本故作蝡德則爲緩恩則爲遲故令太陰脈緩而遲尺寸不同太陰脾也言脾王之時脈緩而遲尺寸不同者尺遲緩也酸鹹苦辛大一作沙一作涉一作沙一作妙素此與下注土中各本互異今從泰定本而生互行其時而以各行皆不羣行盡可常服肝酸腎肺辛脾皆四藏之味也脾主調和五味以養四藏四藏皆受味於脾脾王之時其脈沙一作沙一作妙達於肌肉之中互行人身體乃復各行隨其四支使其氣周匝榮衛以養皮毛皆不羣行至一處也故言盡可常服也土寒則凍土熱則涼冬陽氣在下土中寒涼脾氣亦然土氣在下土中溫涼脾氣亦然有一子名之曰金懷抶抱之不離其身金乃畏火神閉門塞戶內外不通此謂冬時也陽氣在中陽爲火行金性畏火故卷熏之金歸水中水爲母子相得益盛閉塞不通者言水氣充實金在水中此爲强固火無復得往尅之者神密之類也冬時也句袁校本亦小字此從泰定本疑衰校改是土亡其子其氣衰微水爲洋溢浸漬爲池一作其地走擊皮膚面目浮腫歸於四肢此脾之衰損土以防水今土弱而水强故水得陵之而妄行案說文四肢从肉通作支肢愚醫見水直往下之虛脾空胃水遂居之肺爲喘浮脾胃已病宜扶養其氣通利水道愚醫不曉而往下之此爲重傷水氣逢更陵之下侵腎中肺得水而浮故言喘浮肝反長肺故下沈沒肺金肝木此爲相尅肺浮則實下有荊棘恐傷必復尅肝故長之沈沒於下荊棘木之狼藉下則爲荊棘其生喻也恐傷其身避在一邊以爲水流荊棘木之狼藉下則爲荊棘其生喻也恐傷其身避在一邊以爲水流避在下一邊避木也水流木也土土長木是以避在下一邊避木也水流木也土土本尅水而今微弱又復遇木無復制水故行心衰則伏肝微則沈故令脈伏而沈心火肝木火則水木而今微弱又復遇木無復制水故行心衰則伏肝微則沈故令脈伏而沈心火肝木火則生水柏得其氣則實尅於肝心是水而太長反得其氣則實尅於肝心是故令脈衰微脈爲沈伏也工醫來占因轉孔穴利

其溲便遂通水道甘液下流亭其陰陽喘息則微汗出正流肝著其根心氣因起霑行四肢肺氣亭亭喘息則安轉孔穴者諸藏之榮衛轉治使順甘液脾之津液亭其陰陽得復其常所故榮衛調通水氣消除肝得還賢爲安聲其味著其根株肝心爲母子肝著則心氣得起肺氣平調故言亭亭喘好之意也腎爲鹹肺主聲腎爲其子助於爲鹹肺故言安聲鹹音味也倚坐母敗涕而歸水中此爲母往從子腑氣反虛五藏由此而相尅賊倚倒致敗則涕矣而腫故云然也土得其子則成爲山金得其母名曰琅玕

右四時經

黃帝問曰四時之序逆順之變異也然脾脈獨何主岐伯曰脾者土也孤藏以灌四旁者也曰然則脾善惡可得見乎曰善者不可得見惡者可見曰惡者何如曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉其不及則令人九竅壅塞不通名曰重强

脾脈來而和柔相離如雞足躁地曰平長夏以胃氣爲本脾脈來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脈來而堅實如鳥之喙如鳥之距如屋之漏如水之滴案居敬曰脾死此句疑有誤至弱而乍疎乍散一作數色青黃不澤毛折乃死

長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但弱無胃曰死濡弱有石曰冬病石甚曰今病

脾藏榮榮舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色天死於春

六月季夏建未坤未之間土之位脾王之時其脈大阿阿而緩名曰平脈反得弦細而長者是肝之乘脾木之克土爲賊邪大逆十死不治反得浮千金作營而濇者是肺之乘脾子之扶母爲實邪雖病自愈反得洪大而散者千金作浮是心之乘脾母之歸子爲虛邪雖病易

治反得沈濇而滑者腎之乘脾水之陵土爲微邪雖病即差

脾脈蔓蔓而弱千金蔓蔓作長長來乘去數再至日平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脈也

脾脈急甚爲瘕中滿食飲入而還出後沃沫稅甚爲痿厥微急爲脈痛發痼微緩爲風痿周痺不用心懸然若無病大甚爲擊仆微大爲痞氣業業猶作惕大腸血在腸胃之外業業當作惕業猶作惕小甚爲寒熱微小爲消癉滑癉微濇爲內潰多下膿血也甚爲癰疽癰微濇滑爲蟲毒蚘腸鳴熱業猶作惕蚘蝗腹熱濇甚爲腸足太陰氣絕則脈不營其口脣口脣者肌肉之本也脈不營則肌肉濡業猶作軟肌肉濡則人中滿業猶作軟人中溝上有舌蓑二字人中滿則脣反脣反肉先死甲篤乙死木勝土也

脾死藏浮之脈大緩一作堅按之中如覆杯絜絜狀如搖者死一作業業狀如多肉

右素問鍼經張仲景

肺大腸部第四

肺象金與大腸合爲腑大腸爲傳導之府也其經手太陰肺脈也與手陽明爲表裏手陽明大腸脈也夏六月季夏土王金相其王秋三月夏火王金死其王日庚辛王時晡時日入其困日甲乙三月夏火王金相其王秋三月廢冬三月四春三月死夏困時平旦日出其死日丙丁死時禺中日中其神魄其主聲其養皮毛其候鼻其聲哭其色白其臭腥其液涕其味辛其宜鹹其惡苦肺俞在背第三椎或云第五椎也募在中府直兩乳上一胸間大腸俞在背第十六椎募在天樞俠臍旁各一寸

右新撰

肺者西方金萬物之所終金性剛故王西方割斷萬物萬物是以皆終於秋也宿葉落柯要萋枝條其机然獨在其脈爲微浮毛衛氣遲萋萋者零落之貌也言草木宿葉得秋隨風而落但有枝條机然獨在此時陽氣則遲脈爲虛微如毛也榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛諸陽脈數諸陰脈遲榮爲陰不應數而在反言榮氣數陰得秋節而升轉在陽位故一時數而上也此時陰始用事陽即下藏其氣反遲是以肺脈數散如毛也陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲邪所中陰陽交易則不以時定二氣盛衰故爲風寒所中　陽中邪則捲陰中邪則緊捲則寒緊則爲傷寒悸相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出捲者其人拘捲也緊者脈緊也此謂初中風寒之時脈緊其人則寒寒止而熱更微弱弱則其人發熱熱止則脈浮者瘧解也　巨中巨緊暮中幕發言瘧發皆陰其初中風邪之時也　藏有遲疾思有度數行有漏刻藏謂人五藏肝心肺腎也心脾在胸上浮肺腎在胸下浮爲陽其脈疾陰肝在胸下浮爲陰其脈遲疾遲浮者是藏氣出入是爲遵守度數謂經脈長短周身行者榮衛之行也行陰陽各二十五度爲一周也以應漏下百刻也　藏有數在下傷下焦中焦有虛則見有善則匿秋脈陽氣教其陰氣教其在下數當在上隨節變動言傷毛采也人之皮毛肺氣所行下焦在臍下陰之所治也其脈隱遲今反數故言傷下焦中焦脾也其平善之時脈常伺不見妄乃見耳故云有惡則見也　陽氣下陷陰氣自溫言陽氣下陷　溫養諸藏　陽反在下陰反在巔故名曰長而且留陰陽交代各順時節人血氣和平言可長留竟一時

右四時經

黃帝問曰秋脈如浮何如而浮岐伯對曰秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮其氣來急去散故曰浮反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛而中央堅兩旁虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中黃帝曰秋脈太過與不及其病何如岐伯曰太過則令人氣逆而背痛溫溫然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下閉病音

肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本

曰厭厭聶聶如循榆莢曰春平羸肺脈來不上不下如循琴弦曰秋平脈來不上如車蓋按之益大曰秋平脈來如風吹毛曰秋肺病　集源無肺字　肺脈來如物之浮如風吹毛曰肺病

肺死

冀肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色赤白不澤毛折乃死

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色天死於夏

秋金肺王其脈浮千金浮作微　擭而短曰平脈反得洪大而散者千金作浮　是心之乘肺火之克金爲賊邪乘其虛來入是爲遠至脈爲陰其脈遲疾陰脈在下長短周身行者榮衛之行也行陰陽各二十五度爲一周也以應漏下百刻也　藏有數在下傷下焦中焦有虛則見有善則匿秋脈陽氣教其陰氣教其在下數當在上隨節變動言傷毛采也人之皮毛肺氣所行下焦在臍下陰之所治也其脈隱遲今反數故言傷下焦中焦脾也其平善之時脈常伺不見妄乃見耳故云有惡則見也　陽氣下陷陰氣自溫言陽氣下陷　溫養諸藏　陽反在下陰反在巔故名曰長而且留陰陽交代各順時節人血氣和平言可長留竟一時

右四時經

黃帝問曰秋脈如浮何如而浮岐伯對曰秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮其氣來急去散故曰浮反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛而中央堅兩旁虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中黃帝曰秋脈太過與不及其病何如岐伯曰太過則令人氣逆而背痛溫溫然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下閉病音

則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下閉病音

肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本

肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死

右素問甑經張仲景

腎脈第五

腎藏水與膀胱合爲府膀胱爲津液之府　其經足少陰　足少陰腎脈也

腎藏水與膀胱合爲府膀胱爲津液之府　其經足少陰　足少陰腎脈也

與足太陽爲表裏　裏足太陽膀胱脈也　其脈沈沈腎脈之大形也　其相秋

三月秋金王水相　其王冬三月庶春三月因夏三月其死季夏大月其王日壬癸王時人定夜半其困日丙丁困時禹中日中其死日戊己死時食時日哺其神志腎之所藏者志也其主被其養背其候耳其聲呻其色黑其臭腐其液唾其味鹹其宜酸其惡甘腎俞在背第十四椎募在京門膀胱俞在第十九椎募在中極　橫骨上一寸在臍下五寸前陰者中

右新撰

腎者北方水萬物之所藏　也萬物春生夏長秋收冬藏　百蟲伏蟄冬則北方用事王在三時之後腎在四藏之下故王北方蟲不食之言有百種也　陽氣下陷陰氣上升陽氣烈爲霜遂不上升化爲雪霜猛獸伏蟄蝮蟲匿藏陽氣下陷者謂降於十中也其知乾而出不能自致因而化作霜雪或謂陽氣在上寒薄陽氣雖升則霜降蝮獸伏蟄者蓋謂龍蛇冬時而潛處蝮蟲蟄毒在如此遇冰霜自温養也　其脈爲沈沈爲陰在裏不可發汗發則螺蟲出見其霜雪陽氣在下故冬脈沈温養於藏府此爲裏實而表虛復從外發其汗此爲逆治非其法也猶百蟲伏蟄之時而反出土見於冰霜必死不疑逆治者死此之謂也　陰氣在表陽氣在藏慎不可下下之者傷脾脾土弱脈急甚爲癲疾微急爲肺寒熱怠情欬唾血引胸背起胸苦鼻息肉不通緩甚爲多汗微緩爲痿偏風一作漏風頭以下汗出不可止大甚爲腫微大爲肺癰引胸背起脛肉小甚爲殘泄微小爲消癉滑甚爲息賁上氣微澁則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下閉病音　無持客勢令相薄是爲逆也氣上熏胃中故令喘息　無持客勢令傷者則爪枯毛折毛折者則氣先死丙爲丁死庚勝金

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣弗榮則皮節傷皮節傷則皮毛焦則津液去津液去則皮毛焦皮毛焦則爪枯毛折毛折者則氣先死丙爲丁死庚勝金

營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則爪枯毛折毛折者則氣先死丙爲丁死庚勝金

傷者則爪枯毛折毛折者則氣先死丙爲丁死庚勝金

也

血散不通正陽遂厥陰不往從血行脈中氣行脈外五
竭也血爲陰氣爲陽相須而行發其汗使陰陽離則脈
爲解散血不得通脈者遂也謂陽氣通而不復相得使
治病失所故陰陽錯亂外證雖愈錯遂可不愼耶　客熱狂入內爲結胃陰陽錯亂外證
也脾氣遂弱病復痢遂勝主水穀其氣像弱水穀不化
出而反清澼者是
痢下痢至痢也

右四時經

黃帝問曰冬脈如營何如而營岐伯對曰冬脈腎也北
方水也萬物之所以含藏（葉素問作合藏）故其脈來沈而搏（甲乙作濡葉素問作
其氣來沈以搏）故曰營反此者病黃帝曰何如而反岐
伯曰其氣來如彈石者此爲太過病在外其去如數者
此謂不及病在中黃帝曰冬脈太過與不及其病皆如
何岐伯曰太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言不
及則令人心懸如病飢肋（葉素問注俠香兩傍空軟處
名肋寫本作腓非也腓太又
作肋）小腹中滿小便黃赤（葉素問作
小便變）
腎脈來喘喘累累如鈎按之而堅曰腎平冬以胃氣爲
本腎脈來如引葛按之益堅曰腎病腎脈來發如奪索
辟辟如彈石曰腎死
冀腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然其色黑赤（葉素問作
黃）不澤毛折乃死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而
有鈎曰夏病鈎甚曰今病（凡人以水穀爲本故人絕水
漿則死脈無胃氣亦死所謂
無胃氣者但得真藏脈不得胃氣也所謂脈又得
胃氣者謂但弦心但鈎胃但痛肺但毛腎但石也）
腎氣精精舍志盛怒而不止則傷志傷則善忘其前
言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏
冬腎水王其脈沈濡而滑曰平脈反得大而緩者是脾
之乘腎土之克水爲賊邪大逆十死不治（一本云日月
死已反得弦細而長者是肝之乘腎子之扶母爲實邪雖

右素問鍼經張仲景

辨三部九候脈證第一
平雜病脈第二
診五藏六腑氣絕證候第三
診四時相反脈第四
診損至脈第五
診脈動止投數死期年月第六
診百病死生訣第七
診三部虛實決死生第八

辨三部九候脈證第一

經言所謂三部者寸關尺也九候者每部中有天地人
也上部主候從胸以上至頭中部主候從膈以下至氣
街下部主候從氣街以下至足浮沈牢滑遲疾滑濇各
自異名分理察之勿怠觀變所以別三部九候知病之
所起審而明之針灸亦然也故先候寸脈中（寸中一作
寸中於九）
（葉先候寸脈十中於九也責浮在皮膚沈細在裏昭
校本注集寸中二字疑明）
天道可得長久上部之候牢萯沈滑有積氣在膀胱微
細而弱队引裏急頭痛欬嘔逆氣上下心膈上有熱者
口乾渴煩病從寸口邪入上者名曰解脈來至狀如琴
絃苦少腹痛女子經月不利孔竅生瘡男子病持左右
脇下有搶上部不通者苦少腹痛腸鳴寸口中虛窮者
隻氣氣不足大如桃李實苦痺也寸口直上者逆虛也
如呼虛者泄利也中部脈結者膜中積聚若在膀胱兩
脇下有熱脈浮而大風從胃管入水脈乾嘔心下滿欲
如有桃李核胃中有寒時苦煩病不食食則心痛胃脈
支滿脇上積脇下有熱時寒熱淋露脈橫出上者脇氣
在膀胱病劇著右橫關入寸口中者腸中不通喉中咽

難刺關元入少陰下部脈者其脈來至浮大者脾也與風集合時主頭痛引腰背小滑者厥也足下熱煩滿逆上搶心上至喉中狀如惡肉脾傷也病少腹下在脈諸骨節閒寒清不可屈伸脈急如弦者筋急足攣結者四肢重從尺邪入陽明者寒熱也大案此從秦定本風邪諸本俱作太入少陰。女子漏白下赤。男子溺血陰痿不起。引少腹疼。人有三百六十脈法。三百六十日。三部者寸關尺也。尺脈爲陰。陰脈常沈而遲。寸關爲陽。陽脈俱浮而速。氣出爲動。入爲息。故陽脈六息七息十三投。陰脈八息七息十五投。此其常也。二十八脈相逐上下一脈不來知疾所苦。尺勝治下。寸勝治上。尺寸俱平治中央。臍以上陽也法於天。臍以下陰也法於地。臍爲中關。頭爲天。足爲地。有表無裏邪之所止。得鬼病何謂有表無裏寸尺爲表。關爲裏。兩頭有脈。關中絕。不至也。尺脈上不至關爲陰絕。寸脈下不至關爲陽絕。陰絕而陽微死不治。三部脈或至或不至。冷氣在胃中故令脈不通也。上部有脈。雖下部無脈。其人當吐不吐者死。上部無脈。下部有脈。雖困無所苦。所以然者譬如人之有足。樹之有根。雖枝葉枯槁。根本將自生。木有根本。卽自有氣。故知不死也。寸口脈平而死者何也。然諸十二經脈者皆係於生氣之原。所謂生氣之原者非謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經之根。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。主故氣者。人根本也。根絕則莖枯矣。寸口脈平而死者。生氣獨絕於內也。腎間動氣謂左爲腎右爲命門命門者精神之所舍。原氣之所係也。一名守邪之神。以命門之神。固守邪氣。不得妄入。入卽死矣。此腎氣先絕於內。其人便死。其脈不復反。得動氣也。業反得動氣之氣。寥定居據本俱作病疑誤岐伯曰。形盛脈細。少氣不足以息者死。形瘦脈大胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調。與衆藏相失者死。中部之候相滅者死。目內陷者死。黃帝曰。冬陰夏陽奈何。岐伯曰。九候之脈皆沈細懸絕者爲陰主冬。故以夜半死。盛躁喘數者爲陽主夏。故以日中死。是故寒熱者平旦死。熱中及熱病者日中死。病風者以日夕死。病水者以夜半死。其脈乍數乍疎。乍遲乍速。乍大乍小。乍浮乍沈。乍實乍虛。病進而脈反。治之不治。脈從病反。雖治之不愈。其脈乍弦乍緩。乍短乍長。乍澁乍滑

寸口脈濈濈如羹上肥陽氣微運運如蜘蛛絲陰氣衰
寸口脈偏絕則脅偏不遂其人兩手俱絕者不可治
兩手前部陽絕者苦心下寒毒噎中熱
關上脈浮而大風在胃中張口肩息心下滯滯食欲嘔
關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心悸忘
關上脈滑而小大不勻千金云必吐逆是爲病方欲還不出一
二日復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不
止者死
關上脈緊而滑者蚘動
關上脈澀而堅大而實按之不滅有力爲中焦實有伏
結在脾肺氣塞實熱在胃中袁氏云澀脈與有力反今
責故言有力也
關上脈稍稍大而尺寸細者其人必心腹冷積瘕瘕結
聚欲熱飲食
關上脈時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱氣
劣不欲飲食如瘧狀
尺脈浮者客陽在下焦
尺脈細微沸泄下冷利
尺脈弱寸強胃絡脈傷
尺脈虛小者足脛寒痠痺腳疼
尺脈澀下血下案秦定居敬本作不利多汗脈滑謂之多汗
尺脈滑而疾爲血虛
尺脈沈而滑者寸白蟲
尺脈細而急者筋攣痺不能行
尺脈麤常熱者謂之熱中腰膀疼小便赤熱
尺脈偏滑疾面赤如醉外熱爲病

平雜病脈第二

滑伏實從下叉爲陽氣衰數爲虛爲熱浮爲風爲虛動
爲痛爲驚
沈爲水爲實又爲鬼疰弱爲虛爲悸
遲則爲寒滑則少血澁則爲虛洪則爲氣一作熱
緊則爲寒弦數爲癉
瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒微則爲虛代散則死弦
爲痛痺一作浮爲風疰偏弦爲飲雙弦則脇下拘急而痛其人
濇濇惡寒
脈大寒熱在中
伏者瞤亂
安臥脈盛謂之脫血
凡亡汗肺中寒飲冷水欬下利胃中虛冷此等其脈
並緊
浮而大者風
浮而大者中風頭重鼻塞
浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉
濇而浮散者癬瘕風
滑者鬼疰
遲而緊痺病
浮洪大長者風眩癲疾
大堅疾者癲病
弦而鉤腸下如刀刺狀如蓋尸至困不死
緊而急者遘尸
洪大者傷寒熱病
浮洪大者傷寒秋吉春成病
浮而滑者宿食
浮滑而疾者食不消脾不磨
短疾而滑酒病
浮而細滑傷飲
遲而濇中寒有癥結
緊而緊積聚有聲痛
弦急疝瘕小腹痛又爲癉病一作脾病案脾泰定袁校本並作痺
遲而滑者脹
盛而緊者脹
弦小者寒癖
沈而弦者懸飲內痛
弦數有表候冬夏難治
緊而滑者吐逆
小弱而滑胃反
遲而緩者有寒
微而緊者有寒
沈而遲腹藏有冷病
微弱者有寒少氣
實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治一作時時嘔蓄設進治
滑數心中結熱盛
懵疾胃中有熱
緩而滑曰熱中
沈一作洗而急病傷寒暴發虛熱
浮而絕者氣急
脾大而滑中有短氣
浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當殿也
浮而數中水冬不治自愈
短而數心痛心煩
弦而緊腸痛藏寒瘀血一作有寒血

沈而滑爲下重亦爲背膂痛
脈來細而滑按之能虛因急持直者僵仆從高墮下病在內
微浮秋吉冬成病
微數雖甚不成病不可勞
浮滑疾緊者以合百病久易愈
陽邪來見浮洪
陰邪來見沈細
水穀來見堅實
脈來乍大乍小乍長乍短者爲祟
脈來洪大嫋嫋者祟
脈來沈沈澤澤四肢不仁而重土祟
脈與肌肉相得久持（案黎泰定本作待）之至者可下之
弦小緊者可下之
緊而數寒熱俱發必下乃愈
弦遲者宜溫藥
緊數者可發其汗

診五藏六府氣絕證候第三

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗一作出如水不止一日二日死
病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹澈（一日亭歷）九日死
病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆一日（一日脾腸平）九日死
病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便赤（一日足腫）九日死
病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還鼻口（一日虛張短氣）
病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死
病人腎絕四日死何以知之齒焦枯面爲正黑目中
黃色腰中欲折自汗出如流水（一日人中平）七日死
病人骨絕齒黃落十日死
諸浮脈無根者皆死

診四時相反脈證第四

春三月木王肝脈治當先至心脈次之肺脈次之腎脈次之此爲四時王相順脈也到六月土王脾脈當先至而反不至反得腎脈此爲腎反脾也七十日死何謂腎反脾夏火王心脈當先至肺脈次之而反得腎脈是謂腎反脾期五月六月忌丙丁
脾反肝三十日死何謂脾反肝春肝脈當先至而反不至脾脈先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙
腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脈當先至而反不至腎脈先至是謂腎反肝也期七月八月忌庚辛
腎反心二歲死何謂腎反心夏心脈當先至而反不至腎脈先至是謂腎反心也期六月忌戊己
病人心絕一日死何以知之肩息回視立死（一日目亭亭）
病人腸一日絕六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸自汗不止
病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹澈

診損至脈第五

脈有損至何謂也然至之脈一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脈也至脈從下上損脈從上下也損脈之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五藏六府當三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至之爲（案之爲從宛本當有據病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精氣此治損之法也
脈有一呼再至一吸再至一呼再至曰平三至曰離經四至一吸四至一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至一呼一至一吸一至再呼一至再吸一至呼吸再至脈來如此何以別知其病也然脈來一呼再至一吸再至一呼三至一吸三至爲適得其病前大不大小曰平一呼三至一吸三至一呼四至一吸四至爲離經後小卽頭病目眩前小後大卽胸滿短氣一呼四至一吸四至病適欲甚脈洪大者苦煩滿沈細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至其人當困沈細卽夜加浮大卽晝加不大小雖困可治其有大小者爲難治一呼六至一吸六至爲十死脈也沈細夜死浮大晝死一呼一至一吸一至名曰損人雖能行猶當作（一本末案舊經作猶當）著牀所以然者血氣皆不足故也再呼一至再吸一至名曰無魂無魂者當死也人雖能行名曰行尸

扁鵲曰脈一出一入曰平再出一入少陰三出一入太陰四出一入厥陰再入一出少陽三入一出陽明四入一出太陽脈出者爲陽入者爲陰故入一呼而脈再動氣行三寸一吸而脈再動氣行三寸呼吸定息脈五動一呼一吸爲一息氣行六寸人十息脈五十動氣行六尺二十息脈百動爲一備之氣以應四時天有三百六十五日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻一備之氣脈行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行者則周徧於身與天道相合故曰平平者無病也一陰一陽是也脈再動爲一至再至而緊即奪氣一刻百三十五息十刻千三百五十息百刻萬三千五百息二刻爲一度一度氣行一周身晝夜五十度脈三至者離經一呼而脈三動氣行四寸半人一息脈七動氣行尺寸十息脈七十動氣行九尺一備之氣脈百四十動氣行一丈八尺一周於身氣過百八十度故曰離經離經者病一陰二陽是也三至而緊則奪血脈四至則奪精一呼而脈四動氣行六寸人一息脈九動氣行尺二寸人十息脈九十動氣行一丈二尺一備之氣脈百八十動氣行二丈四尺一周於身氣過三百六十度再徧於身不及五節一時之氣而重至諸脈汗濟者五藏無精難治一陰三陽是也四至而緊則奪形脈五至者死一呼而脈五動氣行六寸半當行七寸半人一息脈十一動行尺三寸當行尺五寸人十息脈百一十動氣行丈三尺當行丈一備之氣脈二百二十動氣行二丈六尺當行三丈一備之氣脈二百二十動氣行二丈六尺不及五節一時之氣而重至諸脈汗濟者五藏無精難治一陰三陽是也四至而緊則奪形脈五至者死一呼而脈五動氣行三寸一吸而脈再動氣行三寸呼吸定息脈五動一呼一吸爲一息氣行六寸人十息脈五十動氣行六尺二十息脈百動爲一備之氣以應四時天有三百六十五日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻一備之氣脈行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行者則周徧於身與天道相合故曰平平者無病也一陰一陽是也脈再動爲一至再至而緊即奪氣一刻百三十五息十刻千三百五十息百刻萬三千五百息二刻爲一度一度氣行一周身晝夜五十度脈三至者離經一呼而脈三動氣行四寸半人一息脈七動氣行尺寸十息脈七十動氣行九尺一備之氣脈百四十動氣行一丈八尺一周於身氣過百八十度故曰離經離經者病一陰二陽是也三至而緊則奪血脈四至則奪精一呼而脈四動氣行六寸人一息脈九動氣行尺二寸人十息脈九十動氣行一丈二尺一備之氣脈百八十動氣行二丈四尺一周於身氣過三百六十度再徧於身不及五節一時之氣而重至諸脈汗濟者五藏無精難治一陰三陽是也四至而緊則奪形脈五至者死一呼而脈五動氣行六寸一備之氣脈八動氣行尺二寸不及周身三百二十度故曰絕絕者氣急不下牀口氣寒脈俱絕死

則死三陰一作二陰三陽是也難五猶末如之何也

脈一損一乘者人一呼而脈一動人一息而脈再動氣行三寸一吸爲一息氣行六寸人十息脈五十動氣行六尺二十息脈百動爲一備之氣以應四時天有三百六十五日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻一備之氣脈行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行者則周徧於身與天道相合故曰平平者無病也一陰一陽是也脈再動爲一至再至而緊即奪氣一刻百三十五息十刻千三百五十息百刻萬三千五百息二刻爲一度一度氣行一周身晝夜五十度脈三至者離經一呼而脈三動氣行四寸半人一息脈七動氣行尺寸十息脈七十動氣行九尺一備之氣脈百四十動氣行一丈八尺一周於身氣過百八十度故曰離經離經者病一陰二陽是也三至而緊則奪血脈四至則奪精一呼而脈四動氣行六寸人一息脈九動氣行尺二寸人十息脈九十動氣行一丈二尺一備之氣脈百八十動氣行二丈四尺一周於身氣過三百六十度再徧於身不及五節一時之氣而重至諸脈汗濟者五藏無精難治一陰三陽是也四至而緊則奪形脈五至者死一呼而脈五動氣行六寸一備之氣脈八動氣行尺二寸不及周身三百二十度故曰絕絕者氣急不下牀口氣寒脈俱絕死

脈四損者再息而脈一動人十息脈五動氣行七寸半一備之氣脈十動氣行尺五寸當行尺五寸五分一備之氣脈二十動氣行二尺不及周身三百一十五度一備之氣脈二十動氣行二尺不及周身三百一十五度相與俱微氣閉賁則胸滿藏枯而爭於中其氣不朝血凝於中死矣

脈五損者人再息復一呼而脈一動人十息脈四動氣行六寸一備之氣脈八動氣行尺二寸不及周身三百二十度故曰絕絕者爲損至之脈也損俱盡五藏失神其死明矣

脈二百二十動氣行二丈六尺當行三丈一備之氣脈二百二十動氣行二丈六尺不及五節一時之氣而重至諸脈汗濟者五藏無精難治一陰三陽是也四至而緊則奪形脈五至者死一呼而脈五動氣行三丈一備之氣

陰陽數同榮衛出入經脈流通晝夜百刻五德相生脈來四十投而一止者一藏氣卻後四藏春生而死脈來三十投而一止者二藏無氣卻後三藏夏熱而死脈來二十投而一止者三藏無氣卻後二藏秋赤而死脈來十投而一止者四藏無氣藏中死得節不動出滿四日死遠不出發而死矣脈來五動而一止者五藏無氣卻後五日而死

脈一來而久住者宿病在心主中治脈二來而久住者病在肝支中治脈三來而久住者病在脾下中治脈四來而久住者病在腎間中治脈五來而久住者病在肺支中治五脈病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診百病死生訣第七

診傷寒熱盛脈浮大者生沈小者死

傷寒已得汗脈沈小者生浮大者死

溫病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不治

溫病穰穰大熱其脈細小者死千金穰穰唯時行

溫病下利腹中痛甚者死不治

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗出脈堅強急者生虛緩者死

溫病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脈直而疾者八日死四五日頭痛腹滿而吐脈來細強十二日死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脈來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死

熱病七八日脈不軟一作不散一作者當瘖瘖後三日溫汗不出者死

熱病七八日其脈微細小便不利加暴口燥脈代舌焦乾黑者死

熱病未得汗脈盛躁疾得汗者生不得汗者難療

熱病已衰汗脈靜安者生脈躁者難治

熱病已得汗常大熱不去者亦死大一作增

熱病已得汗熱未去脈微躁者慎不得刺治

熱病發熱熱甚者其脈陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利

診人被風不仁痿躄其脈虛者生緊急疾者死

診癇病虛則可治實則死

癇疾脈實堅者生脈沈細小者死

癇疾脈搏大滑者久久自已其脈沈小急實不可治堅急亦不可療

診頭痛目痛久視無所見者死久視一作幸視

診人心腹積聚其脈堅強急者生虛弱者死又實強者生沈者死其脈大腹大腹四肢逆冷其人脈形長者死

腹脹滿便血脈大時絕極下血脈小疾者死

心腹痛不得息脈細小遲者生堅大疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脈沈則生浮則死

腸澼下膿血脈懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身熱脈不應絕滑大者生懸滿者死以菽坋之

腸澼下膿血脈沈小流連者生數疾且大有熱者死

腸澼節拳其脈小細安靜者生浮大緊者死

化不得留下膿血脈微小遲者生緊急者死渴漱食不入水病腹大如鼓脈實者生虛者死

卒中惡吐血數升脈沈數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脈大而緩者生緊大而浮者死緊細而微者亦生

病瘡腰有強急瘓瘛者皆不可治

寒熱瘓瘛其脈代絕者死

金瘡血出太多其脈虛細者生數實大者死
金瘡出血脈沈小者生浮大者死
斫瘡出血一二石脈來大二十日死
斫刺俱有病多少血出不自止斷者其脈案袁校本作血止脈來大者七日死滑細者生
從高顛仆內有血腹脹滿其脈堅強者生小弱者死
人爲百藥所中傷脈浮澁而疾者生微細者死洪大而遲者生千金遂作遲
人病甚而脈不調者難差
人病甚而脈洪者易差
人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死
人病甚而脈虛其人長病得之死虛而滑長病得之生卒病得之死
三部脈調而和者生
三部脈廢者死
三部脈虛實而大長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死
三部脈實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病可治得之死實而緩亦生實而緊急癲病可治
三部脈弦而緊亦生緊急癲病可治
三部脈強非病其人病便死
三部脈急非病其人脈一作得之死
三部脈緊如轉索無常者死
三部脈如雀啄長病七日死
三部脈如屋漏長病十日死千金云十四日死
三部脈如水流者長病不治自愈治之反死一云如水流者長病三十日死如水不流者長病不治自愈案三十日居敬本作七十日
三部脈如水淹然流長病不治自愈治之反死一云如水流者長病三十日死如水不流者長病不治自愈案三十日居敬本作七十日
三部脈累累如貫珠長病得之死
三部脈如弓弦長病得之死
三部脈如霹靂長病得之死三十日死
三部脈如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生
三部脈如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中得夜半死
三部脈急切腹間病及案居敬本作又婉轉腹痛針上下差
乍疎遲遲相因不與息數相應其人雖食穀猶不食藥草生而死
左手尺部脈四十動而一止止而復來來遲如循薤葉如循刀刃如彈弓弦緊緊然如兩人共引一索至立冬死千金作至立春而死

診三部脈虛實決死生第八

三部脈調而和者生
三部脈廢者死
三部脈虛其人長病得之死虛而滑長病得之生卒病得之死
亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死
三部脈實而大長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死
得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病可治
三部脈強非病其人病便死
三部脈急非其人脈一作得之死
三部脈牢長病得之死卒病得之生
三部脈細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生案袁校本作死
三部脈大而數長病得之生卒病得之死
三部脈復而伏長病得之死
三部脈軟濇一作長病得之不治自愈治之死卒病得之生
三部脈浮而粘長病得之死浮而滑長病亦死浮而數長病風得之生卒病得之死
三部脈扎長病得之生卒病得之死
三部脈弦而數長病得之生卒病得之死
三部脈革長病得之死卒病得之生
三部脈堅而數如銀釵股蠱毒病必死數而軟蠱毒病

脈經卷五

張仲景論脈第一

扁鵲陰陽脈法第二

扁鵲脈法第三

扁鵲華佗察聲色要訣第四

扁鵲診諸反逆死脈要訣第五

張仲景論脈第一

問曰脈有三部陰陽相乘榮衛氣血在人體躬千金作而行人軀呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作傚象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願爲經陳令得分明

師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關榮衛流行不失衡銓腎沈心洪肺浮肝弦此自經常不失錄分出入升降滿刻周旋水下二刻脈一周身旋復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則緊弦沈潛水濇支飲急弦動弦爲痛數洪熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸審察表裏三焦別分知邪所舍消息診看料度腑藏獨見若神爲子條記傳與聖人

扁鵲陰陽脈法第二

扁鵲曰太陽日中日陽明晡時日少陽黃昏日少陰人年旦日太陰鷄鳴曰厥陰是三陰三陽時也

少陽之脈乍小乍大乍長乍短動搖八分王十一月甲子王

太陽之脈洪大以長其來浮於筋上動搖九分三月四月陽明之脈浮大以短動搖三分大前小後狀如科斗其至跳五月六月甲子王

少陰之脈緊細動搖六分王五月甲子日中七月八月甲子王

厥陰之脈沈短以緊動搖三分十一月甲子王

厥陰之脈急弦動搖至六分以上病瘕寒少腹痛引腰形喘者死脈緩者可治刺足厥陰入五分（袁校云遲脈二字疑衍）

少陽之脈乍短乍長乍小乍大動搖至六分以上病瘕痛腸下滿嘔可治擾卽死（一作偏可治偏卽死）刺兩季肋端足少陽也入七分

陽明之脈洪大以浮其來濇而跳大前細後狀如科斗動搖至三分以與病駭頭痛腹滿痛嘔可治擾卽死刺臍上四寸臍下三寸各六分

從二月至八月陽脈在表從八月至正月陽脈在裏附陽脈強附陰脈弱至卽驚實則痓痓細而沈（案泰定本作流不極五至病有六七至也（袁校云疑有闕文）

扁鵲曰平和之氣不緩不急不濇不存不亡不短不長不俛不仰不縱不橫此謂平脈（一作此謂平脈皆一系）

扁鵲曰脈氣弦急病在肝少食多厥裏急多言頭眩目脈浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣也脈洪大者又兩乳房胡（案居敬本作陽）脈復數加有寒熱此陽寒病相疾之法視色聽聲觀病之所在候脈要訣豈不微乎

扁鵲陰陽脈法第二

扁鵲曰太陽日中日陽明晡時日少陽黃昏日少陰人年旦日太陰鷄鳴曰厥陰是三陰三陽時也

少陽之脈乍小乍大乍長乍短動搖八分王十一月甲子王

太陽之脈洪大以長其來浮於筋上動搖九分三月四月陽明之脈浮大以短動搖三分大前小後狀如科斗其至跳五月六月甲子王

少陰之脈緊細動搖六分王五月甲子日中七月八月甲子王

厥陰之脈沈短以緊動搖三分十一月甲子王

厥陰之脈急弦動搖至六分以上病瘕寒少腹痛引腰形喘者死脈緩者可治刺足厥陰入五分（袁校云遲脈二字疑衍）

少陽之脈乍短乍長乍小乍大動搖至六分以上病瘕痛腸下滿嘔可治擾卽死（一作偏可治偏卽死）刺兩季肋端足少陽也入七分

陽明之脈洪大以浮其來濇而跳大前細後狀如科斗動搖至三分以與病駭頭痛腹滿痛嘔可治擾卽死刺臍上四寸臍下三寸各六分

從二月至八月陽脈在表從八月至正月陽脈在裏附陽脈強附陰脈弱至卽驚實則痓痓細而沈（案泰定本作流不極五至病有六七至也（袁校云疑有闕文）

扁鵲曰平和之氣不緩不急不濇不存不亡不短不長不俛不仰不縱不橫此謂平脈（一作此謂平脈皆一系）

扁鵲曰脈氣弦急病在肝少食多厥裏急多言頭眩目脈浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣也脈洪大者又兩乳房胡（案居敬本作陽）脈復數加有寒熱此陽寒病

扁鵲曰人一息脈二至謂平脈體形無苦人一息脈三至謂病脈一息四至謂痺者脫脈氣其眼睛青者死人一息脈五至以上死不可治也都（一作卻）息病脈來動取身無苦也（後凡字疑衍）

扁鵲曰脈氣弦急病在肝少食多厥裏急多言頭眩目脈浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣也脈洪大者又兩乳房胡（案居敬本作陽）脈復數加有寒熱此陽寒病相疾之法視色聽聲觀病之所在候脈要訣豈不微乎

也若羸長病如厭浮擅寸口復有微熱此莊氣病也如
復發又多熱乍劇乍差難治也又療氣劇者易差不救
者易治也袁校云疑有闕文

扁鵲華佗察聲色要訣第四

病人五藏已絕神明不守聲斷者死
病人耳目及顏赬赤者死在五日中
病人循衣縫謂言者不可治
病人陰陽俱絕聲衣撮空妄言者死
病人妄言錯亂及不能語者不治熱病者可治
病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死
病人兩目皆有黃色起者其病方愈
病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中
病人面黃目青者不死青如草滋死
病人面黃目赤者不死赤如鮫血死
病人面黃目白者不死白如枯骨死
病人面黃目黑者不死黑如炲死
病人面目俱等者不死
病人面黑目青者不死
病人面青目白者死
病人面黑目白者不死
病人面赤目青者六日死
病人面黃目皆者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入
胃經膚氣妄泄目則爲青雖有天救不可復生
病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣內索面色反
好急求棺槨
病人面白目黑者死此謂榮華已去血脈空索
病人面黑目白者八日死胃氣內傷病因留積
病人面青目黃者五日死
病人者淋心痛短氣脾竭內傷百日復愈能起衇裡因
坐於地其立倚牀能治此者可謂神良
病人面無精光若土色不受飲食者四日死在三日中
病人目黑精光及牙齒黑色者不治
病人耳目鼻口有黑色起入於口者必死
病人耳目及顏赬赤者死在五日中
病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩額上者亦死在
五日中
病人黑氣出天中下至年上額上者死千金翼云天中當鼻直上至髮際年上在鼻上兩目間
病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中
病人面忽變黑者十三日死
病人舌卷卵縮者必死
病人汗出不流舌卷黑者死
病人髮直者十五日死
病人髮如乾麻善忘者死
病人髮與眉衝起者死
病人足趺腫嘔吐頭重者死
病人頭目久痛卒視無所見者死
病人陰結陽絕月精脫恍惚者死
病人陰陽絕踽目睢陷者死
病人目系傾者七日死
病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死
病人口張者三日死
病人唇青人中反者三日死
病人脣反人中滿者死
病人脣口忽乾者不治
病人爪甲青者死
病人爪甲白者不治
病人手足爪甲下肉黑者八日死
病人榮衛竭絕面浮腫者死
病人卒腫其面蒼黑者死
病人手掌腫無文者死
病人膕腫反出者死
病人陰囊莖俱腫者死
病人派絕口張足腫者五日死
病人肝腫面焦者死
病人陰陽俱竭其齒如熟小豆其脈缺者死千金方缺作躁
病人齒忽變黑者十三日死
病人舌卷卵縮者必死
病人面黑目直視懸風者死
病人面黑者死
病人髮直者十五日死
病人髮如乾麻善忘者死
病人髮與眉衝起者死
病人足趺腫嘔吐頭重者死
病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死
病人臥遺尿不覺者死
病人尸臭者不可治
肝病皮白肺之日庚辛死
心病目黑腎之日壬癸死
脾病脣青肝之日甲乙死
肺病頰赤目腫心之日丙丁死
腎病面脣黃脾之日戊己死
青欲如蒼璧之澤不欲如藍赤欲如鴨冠之赤不欲如
赭白欲如鵝羽不欲如鹽黑欲如重漆不欲如炭
黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

目色赤者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃色不可名者病在胸中

診曰病見赤脈從上下者太陽病也從下上者陽明病也從外入內者少陽病也

診寒熱瘧脈日中有赤脈從上下至瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈一歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死

診齲齒痛按其陽明之脈來有過者獨熱在右右熱在左左熱在上上熱在下下熱

診血脈者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多赤多黑多青皆見者寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也安臥少黃赤脈小而滑者不嗜食

扁鵲診諸反逆死脈要訣第五

扁鵲曰夫相死脈之氣如翠鳥之眾一馬之驟系水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可知也疑有闕文

脈病人不病脈來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既絕而止時時復起而不相連屬也雀啄者脈來甚數而疾絕止復頓來也又經言得病七八日脈如屋漏雀啄者死脈聲人手如漆米也脈來如彈石去如解索者死彈石者解急也解索者動數而隨散亂無復次緒也脈困病人脈如蝦之游如魚之翔者死蝦游者薄薄而起輕復退沒不知所在人乃復起起輒遲而役去速者是也魚翔者似魚不行而但掉尾動頭身搖而久住者是也脈如懸薄卷索者死脈如轉豆者死脈如倮刀者死脈湧湧不去者死脈忽去忽來暫止復來者死脈中侈者死脈分絕者死上下分散也

脈有表無裏者死經名曰結云卽死何謂結脈在指下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也

脈五來一止不復增減者死經名曰代何謂代脈五來一止也脈七來是人一息半時不復增減亦名曰代正死不疑

經曰病或有死或有不治自愈或有連年月而不已其死生存亡可切脈而知之耶然可具知也設病者閉目不欲見人者脈當得肝脈弦急而長反得肺脈浮短而滑者死也病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沈滑而微者死病若吐血復鼽衄者脈當得沈細而反浮大牢者死病若譫言妄語身當有熱脈當洪大而反手足四逆脈反沈細微者死病若大腹而泄脈當細微而澀反得緊大而滑者死此之謂也

經言形脈與病相反者死奈何然病若頭痛目痛脈反短澁者死

病若腹痛脈反浮大而長者死

病若腹滿而喘脈反滑利而沈者死

病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

病若耳聾脈反浮大而濇者死千金翼云脈大者生沈澁細者難治

病若目晾晾脈反大而緩者死

左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此爲逆逆者死不可治

脈來沈之絕濇浮之不止推手者半日一作半日死

脈來微細而絕者人病當死

人病脈不病者生脈病人不病者死

人病尸厥呼之不應脈絕者死

脈當大反小者死

肥人脈細小如絲欲絕者死

羸人得躁脈者死

人身羸而脈來往滑者死

人身肖而脈來往濇者死

人身小而脈來往大者死

人身短而脈來往長者死

人身長而脈來往短者死

人身大而脈來往小者死

尺脈不應寸時如馳半日死千金云尺脈上應寸口太遲者半日死

肝脾俱至則穀不化肝多卽死

肺肝俱至則癰疽四肢重肺多卽死

心肺俱至則痺消渴懣怠心多卽死

腎心俱至則難以言九竅不通四肢不舉腎多卽死

脾腎俱至則五藏敗壞脾多卽死

肝心俱至則熱甚痫瘛汗不出妄見邪

肝腎俱至則疝瘕少腹痛婦人月使不來

肝滿腎滿肺滿皆實則爲腫肺之雍喘而兩胠滿肝雍兩胠案秦定本作胸滿臥則驚不得小便腎雍腳下至少腹滿脛有大小脾胞大破易偏枯袁校云雍與壅通

心脈滿大痫癎筋攣

肝脈小急痫癎筋攣

肝脈驚業有所驚駭脈不至若瘤不治自已

腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆爲瘕

腎肝并沈爲石水并浮爲風水并虛爲死并小實案秦校本作微欲濇

腎脈大急沈肝脈大急沈皆爲疝

心脈搏滑爲肺疝

脾脈外鼓沈爲腸澼久自已

肝脈小緩爲腸澼易治

腎脈小搏沈爲腸澼下血溫身熱者死心肝澼亦下血

二藏同病者可治其脈小沈濇者爲腸澼其身熱者死
熱見七日死
胃脈沈鼓濇胃外鼓大心脈小腎急背膈偏枯男子發
左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其順者瘖三歲
起年不滿二十者三歲死
脈至而搏血卹身有熱者死
脈來如懸鈎浮爲熱
脈至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言素問甲乙作暴厥
脈至如鼓使人暴驚三四日自已
脈至浮合浮合如鼓一息十至十至以上是爲經氣予
不足也微見九十日死
脈至如火新然是心精之予奪也草乾而死
脈至如散葉是肝氣予虛也木葉落而死太素落作衰華
脈至如省客省客者脈塞而鼓是腎氣予不足也懸去
棄華而死
脈至如泥先是胃精予不足也榆莢落而死素問莢作葉
脈至如橫格是膈氣予不足也禾熟而死
脈至如弦縷是胞精予不足也病善言下霜而死不言
可治
脈至如交漆交漆者左右旁至也微見四十日死甲乙作交
脈至如涌泉浮鼓肌中是太陽氣予不足也少氣味非
英而死
脈至如委土素問作頹土之狀按之不得是肌氣予不足也
五色先見黑白壓一作發死
脈至如懸雍懸雍者浮揣切之益大是十二俞之予不
足也水凝而死

脈至如偃刀偃刀者浮之小急而按之堅大急五藏菀
熱寒熱獨併於腎也如此其人不得坐立春而死袁校云菀
變通
脈至如丸滑不直手不直手者按之不可得也是大腸
氣予不足也棄葉生而死
脈至如春者令人善恐不欲坐臥行立常驚是小腸氣
予不足也季秋而死
問曰常以春二月中脈一病人其脈反沈師記言到秋
常死其病反愈到七月復病因往脈之其脈積沈復記
言至冬死問曰二月中得沈脈何以故處之至秋死也
師曰二月之時其脈自當濡弱而弦得沈脈到秋自沈
脈見浮卽死故知到秋當死也七月之時脈復得沈何
以處之至冬當死師曰沈脈屬腎眞藏脈也非時妄見
經言王相四死冬脈本王脈不再見故知至冬當死盛
後至冬復病正以冬至日死故知爲諦華佗倣此

脈經卷六

肝足厥陰經病證第一 案秦定居敬本無足厥陰經四字下無經名並同
膽足少陽經病證第二
心手少陰經病證第三
小腸手太陽經病證第四
脾足太陰經病證第五
胃足陽明經病證第六
肺手太陰經病證第七
大腸手陽明經病證第八
腎足少陰經病證第九
膀胱足太陽經病證第十
三焦手少陽經病證第十一

肝足厥陰經病證第一

肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園苑生草得其時
則夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢
山林樹木
病在肝平旦慧下晡甚夜半靜
病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通
身痛體重二日之胃而腹脹三日之腎少腹腰脊痛脛
痠十日不已死冬日入夏早食
肝脈搏堅而長色不青當病墜墮若搏因血在脇下令
人喘逆若耎而散其色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多
飲而溢一作入肌皮腸胃之外也肝脈沈之而急浮之
亦然若脇下痛有氣支滿引少腹而痛時小便難苦目
眩頭痛腰背痛足爲逆寒時癰女人月信不來時無時
有得之少時有所墜墮
青脈之至也長而左右彈診曰有積氣在心下支胠名

曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

肝中風者頭目瞤兩脇痛行常偃令人嗜甘如阻婦狀

肝中寒者其人洗洗惡寒爪爪發熱而爪然赤黍黍有汗胸中煩熱肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作燥善大息有

太息胸中痛不得轉側時時盜汗欬食已吐其汁

肝主胸中喘怒罵其脈沈胃中必窒欲令人推按之有熱臭窒

凡有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不能下積於左脇下則傷肝肝傷者其人脫肉又臥口欲得張時時手足青目瞑嘻人痛此爲肝藏傷所致也

肝腹者脇下滿而痛引少腹肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通

肺乘肝卽爲癰腫心乘肝必吐利

肝著者其病人常欲踞其胃上先未苦時但欲飲熱湯云疑有闕文

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆盃有頭足如龜鼈狀久久不愈發欬逆痺癰連歲月不已以季夏戊己日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結爲積故知肥氣以季夏得之

肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其脈弦長此爲可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郄皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯

肝病者必兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目晾晾無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聽頰腫取血者

袁校云血者謂有血之穴

邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內脇善痓節時泰定本作別考千金方肝脈論作時腫取之行間以引脇下補三里以温胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其痓

足厥陰之脈起於大指叢毛之際上循足趺上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上腘內廉循股陰入毛中環陰氣案舊作器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上出額與督脈會於巔其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛不可俛仰丈夫癪疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡滿去內踝上五寸別走少陽其別者循經上睪結於莖其病氣逆則睪腫卒疝實則挺長熱虛則暴癢取之所別

肝病胸滿脇脹善恚怒叫呼身體有熱面復寒四肢不舉面目白身體滑其脈當弦長而急今反短濇其色當青而反白者此是金之尅木爲大逆十死不治

膽足少陽經病證第二

膽病者善大息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之嗌中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之陷下者灸之其實熱刺陽陵泉善嘔有苦汁長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽溢案居敬本作液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽郤謂其虛實以去其邪也

膽脹者脇下痛脹口苦太息

厥氣客於膽則夢鬬訟

足少陽之脈起於目兌皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之脈前至肩上卻交手少陽之後入缺盆其支者別兌皆上從耳後入耳中出走耳前至兌皆下加頰車下頸大迎合手少陽於頭一本云別兌皆上下加頰車下頸迎手少陽於巔合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街遶毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸中過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足趺上出小指次指之端其支者趺上入大指之間循大指歧內出其端還貫人爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脇痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛角案袁校本作頭角痛額痛目兌皆痛缺盆中腫痛厥下廉痛馬刀挾瘿汗出振寒瘧胸中脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

心手少陰經病證第三

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火傷物得其時則夢歌笑及恐畏厥氣客於心則夢兵案兵泰定本作邱千金作邱山烟火病在心日中慧夜半甚平旦靜

病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脇痛支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其爽而散者當病消渴自已心脈沈之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之

憂思
赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之
心脈急名曰心痛小腹當有形其以心爲牡藏小腸爲之使故小腹當有形
邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人即畏一作衰合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者即爲癲陽氣衰者即爲狂五藏者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛也即邪神居之神靈所使鬼而下之脈短而微其藏不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液即爲涕泣肺氣衰者即爲泣出肝氣衰者魂不安肝主善怒其聲呼
心中風者翕翕發熱不能起心中飢而欲食食則嘔心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心前痛背背痛徹心如蟲注其脈浮者自吐乃愈
悲憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛徹背自發煩熱案千金方作自發煩熱手其脈弦此爲心藏傷所致也
心脈者煩心短氣臥不安
心水者其人身體重腫一作而少氣不得臥煩冶躁其陰大腫
陰衰心必癉
氣心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死
心腹痛懊憹發作腫聚往來上下行痛者依作心腹中

大針刺之久持之蟲不動乃出針腸中有蟲蛇咬皆不可取以小針
心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久久不愈病煩心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結爲積故知伏梁以秋得之
心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脈實大而數此爲可治春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉
肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱盛者則寸口大一倍於人迎虛則寸口反小於人迎也
手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則爲煩心取之兩筋間
心病煩悶少氣大熱熱上盛心嘔吐逆狂語汗出如珠身常厥冷其脈當浮今反沈濇而滑其色當赤而反黑者此是水之剋火爲大逆十死不治

小腸手太陽經病證第四

小腸病者小腹痛腰背控睾而痛時窘乏復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脈陷者此其候也
小腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於肓結於厥一作齊案千金方作臍故取之肓原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之
小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔小腸有宿食常暮發熱明日復止小腸脹者小腹膜脹引腹而痛
厥氣客於小腸則夢聚邑街衢
手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩甲交肩上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目兌皆卻入耳中其支者別頰上頗抵鼻至目內皆斜絡於顴是動則病頰痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者

耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

脾足太陰經病證第五

脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹涇溲不利脾氣虛則夢飲食不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉厥氣客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨

病在脾目瞑慧平旦甚日中持下晡靜

病先發於脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之腎小腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背脽筋痛小便閉十日不已死冬人定夏宴食

脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其實而散色不澤者當病足骭腫若水狀

脾脈沈之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食而不化大便難四肢苦痺時不仁得之房內月使不來來而頻併

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

寸口脈弦而滑弦則爲痛滑則爲實痛即爲急實即爲踊痛踊相搏即胸脇搶急

跌陽脈浮而澀浮即胃氣澀即脾氣衰微衰相搏即呼吸不得此爲脾家失度

寸口脈雙緊即爲入其氣不出無表有裏心下痞堅

跌陽脈微而濇微即無胃氣澀即傷脾寒在於腸而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已白噫寒在胸膈上虛下實穀氣不通爲祕寒之病

寸口脈緩而遲緩則爲陽衛氣長遲則爲陰榮氣促榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強

跌陽脈滑而緊滑即胃氣有餘腹滿而者此脾不治也能食而腹不滿此爲胃氣傷得食而不消不能食心下如飢此爲胃氣不足心氣虛也得食而滿者此爲脾家不治

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤瞤而短氣也

凡有所擊朴若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生

脾氣弱病利下白賜垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑

病人鼻下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治脅黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治脾先絡（一作挾絡挾字之誤）

脾脈濡而緊濡即小便數浮濇相搏大便則堅其脾爲約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

凡人病脈已解而反暮微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久久不愈病四肢不收黃瘅食飲不爲飢虛以冬壬癸日得之何也肝病傳脾脾當傳腎腎適以冬王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受因留結爲積故知痞氣以冬得之

脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大便不利其脈微緩而長此爲可治宜服平胃丸瀉脾丸茱萸丸附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商邱皆補之又當灸章門五十壯背第十一椎百壯

脾病者必身重苦飢足痿不收（素問作善飢肉痿足不收胕善痿脚下痛）虛則腹脹腸鳴溏泄食不化取其經足太陰陽明少陰血者

邪在脾則飢肉痛腸氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調其三里

足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨內循胫骨後交出厥陰之前上循脽股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔（一作胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然而食）（楊注本素問作身體皆重是主脾有生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏瘕泄水閉黃疸好臥不能食肉脛青強立股膝內痛厥足大指不用盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腹中切痛虛則鼓脹取之所別

脾病其色黃體青失液而視臂反張爪甲青飲食吐逆體重節痛四肢不舉其脈當浮大而緩今反弦急其色當黃今反青此是木之剋土爲大逆十死不治

胃足陽明經病證第六

胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食

不下取三里
飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上脘則抑而刺之在下脘則散而去之
胃脈搏堅而長其色赤當病折髀其耎而散者當病食癉病胃中有癉食冷物者痛不能食食熱則能食胃脘者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難
診得胃脈病形何如曰胃實則脹虛則洩
病先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背脽筋痛小便痛五日上之脾閉塞不通身體重亟瘈之心六日不已死冬夜半後夏日昳六日一作三日
脈浮而芤浮則爲陽芤則爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕

跌陽脈浮者胃氣虛也跌陽脈浮大者此胃家微虛煩悶必口再行乳而有胃氣者脈浮之大而耎微按之芤故知乳而有胃氣也跌陽脈數者胃中有熱即消穀引食跌陽脈牆者胃中有寒水穀不化跌陽脈蠶蠶而浮者其病難治跌陽脈浮遲者故久病跌陽脈虛則遺溺

寶則失氣
動作頭痛重熱氣朝者屬胃
厥氣客於胃則夢飲食
足陽明之脈起於鼻交頞中旁約太陽之脈下循鼻外入上齒中還出挾口環唇下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏菟下入膝中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端是動則病悒悒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是爲骭厥是主血血一作胃所生病者狂瘧一作瘧温淫汗出鼽衄口喎唇緊頸腫喉痺大腹水腫膝腸脛痛循膺乳街股伏菟髀外廉足跗上者痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則腹滿盛者則人迎大三倍於寸口盛者則人迎反小於寸口也

肺手太陰經病證第七

肺氣虛則鼻息利鼻塞梔作鼻塞不利少氣實則喘喝喘喝者氣促聲粗也胸憑胸盈介賓緊梔作胸盈介賓胸盈者脹滿也仰息肺氣盛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰肺氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則飛揚見金鐵之器奇物
病在肺下晡慧日中甚夜半靜
病先發於肺喘咳三日之肝腸痛支滿一日之脾即塞不通身體痛重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出
肺脈搏堅而長當病吐血其濡而散者當病漏汗漏一作瀉至今不復散發袁校云大字疑衍肺脈沈之而數浮之而喘袁校云疑作滿苦洗洗寒熱腹滿腸中熱袁校云肺以大腸爲腑小便赤肩背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風白脈之至也喘疑作滿而浮大上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之因醉而使內也
肺中風者口燥而喘身運而重冒案泰定本作胃千金方作胃而腫腹肺中寒者其人吐濁涕

形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺傷者其人勞倦則欬唾血其脈細緊浮數皆吐血此爲操案操當爲躁操瞋怒得之肺脹者虛而滿喘欬逆倚息目如脫狀其脈浮
肺水者其人身體重而小便難時時大便鴨溏
肝乘肺必作虛滿
脈耎而弱弱反在關耎反在顛浮反在上弱反在下浮則爲陽弱則血不足必弱爲虛浮脫自別浮則目出弱則爲入浮則爲出不入此爲有表無裏弱則爲入不出中寒則腹滿盛者則人迎大三倍於寸口盛者則人迎反小於寸口也此爲無表有裏無裏弱則爲入浮則爲出不入此爲有表無裏陽出極汗齊腰而還此爲無表有裏故名曰厥陽在當汗出不汗出
跌陽案千金方肺藏脈論作太陽脈浮緩少陽微緊微爲血虛緊爲寒此爲虛乳其病屬肺
肺之積名曰息賁在右脇下覆大如盂久久不愈病酒洒寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復欲還心心不肯受因留結爲積故知息賁以春得之
肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脈微遲爲可治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸胸中百壯背第三椎二十五壯
肺病者必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝髀腨脛足皆病虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經千太陰足太陽之外厥陰內少陰血者
邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動肩背取之兩中外輸背第三椎之傍以手痛案痛當作重按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺
從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下循臂
內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者
從腕後直次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而
喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀是主肺所
生病者欬上氣喘喝煩心胸滿臑臂內前廉痛掌中熱
氣盛有餘則肩背痛風汗出小便數而欠氣虛則肩背
痛寒少氣不足以息溺色變卒遺失案當爲失之譌無度盛者
則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手太陰之別名曰列缺起於腕下一云腕上案手太陰之絡名列缺在腕後
一寸分間案上側分內間別走陽明其別者並太陰之經直入
掌中散入於魚際其實案靈樞云病實則手銳掌起虛
則欠欬案張介賓景岳經脈篇注云欠欬張口伸腰也體倦則中志倦則欬居散本作欬誤小便
遺數取之去腕一寸半

肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脈當短濇今反
浮大其色當白而反赤者此是火之剋金爲大逆十死
不治

大腸手陽明經病證第八

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則泄當
臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷鳴氣
上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三
里

大腸有寒鶩溏有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有
時如瘧狀大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

厥氣客於大腸則夢田野

手陽明之脈起於大指次指之端外側循指上廉出合
谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循
臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下人
缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直上頸貫頰
入下同纔中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻
孔是動則病齒痛頸腫是主津所生病者口乾鼽
衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脈
所過者熱腫虛則寒慄不復盛者則人迎大三倍於
口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰經病證第九

腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑腎氣虛則夢涉大水恐懼
船漏人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊
兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中
病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜

病先發於腎小腹腰脊痛脛痠三日之膀胱
小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不已死
冬大食案食爲晨字之譌夏晏晡

腎脈搏堅而長其色黃而赤當病折腰其頗背脈痛
病少血腎脈沈之大而堅浮之大而緊苦手足骨腫厥
而陰不與腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹閉時泄得
之浴水中身冰冷而合房內及勞倦發之

黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺
得之沐浴清水而臥

凡有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷
腎腹者腹滿引背央央然腰髀痛腎水者其人腹大臍
腫重痛不得溺陰下濕如牛鼻頭汗其足逆寒大便
反堅

腎著之爲病從腰以下冷腰重如帶五千錢腎著之病
其人身體重腰中冷如冰狀一作如水洗狀一作如坐水中形如水狀反不

熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛炎則張食而生害作一病緩帶被髮大杖重履而步盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟却走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別

腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩痛小腹結痛氣衝於心其脈當沈細而滑今反浮大其色當黑面反黃此是土之剋水爲大逆十死不治

膀胱足太陽經病證第十

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得屑上熱若脈陷足小指外側及脛踝後皆熱若脈陷者取委中

膀胱脹者小腹滿而氣癃

病先發於膀胱者背脽筋痛小便閉五日之腎小腹腰脊痛脛痠一日之小腸脹一日之脾閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏下晡一云日昳

厥氣客於膀胱則夢遊行

足太陽之脈起於目內眥上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入腘中其支者從髆內左右別下貫髀入膕中以下肿寧子金方作肿足做本作脹誤過髀樞循髀外後廉下合腘中以下貫踹內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲腘如結腘如裂是爲踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭腦頂痛目黃淚出鼽衄項背腰尻腘腨脚皆痛小指不用盛者則入迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

三焦手少陽經病證第十一

三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則爲水留則爲脹俠在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見於脈取委陽少腹病腫不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脈與厥陰小絡結而血者腫上及胃脘熱在上焦因於肺痿熱在中焦因腹堅熱在下焦因溺血

手少陽之脈起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈偏屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額頰一作至頗其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目兌背是動則病耳聾煇煇作渾渾不明焞焞咽腫喉痺是主氣所生病者汗出目兌背痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用也

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八

重實重虛陰陽相附生死證第十九

熱病生死期日證第二十

熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病至脈死日證第二十三

熱病損脈死日證第二十四

熱病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可溫證第九

病不可灸證第十

病可灸證第十一

病不可刺證第十二

病可刺證第十三

病不可水證第十四

病可水證第十五

病不可火證第十六

病可火證第十七

少陰病脈細沈數病爲在裏不可發其汗
脈浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脈遲者不可發其汗何以故然此爲榮氣不足血微少故也
少陰病脈微一作濇而微弱不可發其汗無陽故也
脈濇而弱弱反在關濇反在顛微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩
動氣在右不可發汗發汗則喘而渴心苦煩飲即吐水
動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤
動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端
動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼
冬時發其汗必吐利口中煩生瘡
下利清穀不可攻其表汗出必腹滿
欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則厥逆冷汗出多堅一云堅當作極發其汗亦堅
傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其汗
口傷燭亦
病人脈數數爲有熱當消穀引食反吐者醫發其汗
微腸氣虛脈則爲數數爲客陽不能消穀胃中虛冷故令吐也
傷寒四五日其脈沈煩而喘滿脈沈者病爲在裏反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語
傷寒頭痛鼽鼽發熱形象中風常微汗出又自嘔者之爲煩心佛佛如飢發汗則致痙身強難以屈伸熏之
則發黃不得小便久則發欬唾
太陽病發其汗因致痙
傷寒脈弦細頭痛而反發熱此屬少陽少陽不可發其汗
太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多寒少其人不嘔清便續一云定本同素問病本作病定本作病自下一云定本同素問病本作病定本作病一日再三發其脈微而惡寒此爲陰陽俱虛不可復發汗也

汗
太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞堅者不可發其汗
少陰病欲吐而下利譫語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗
少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是爲下厥上竭爲難治
傷寒有五皆熱病之類也其形相象根本異源同病異名同脈異經病雖俱傷於風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱風熱相薄則發風溫四肢不收頭痛發熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫語語獨語語內煩躁接不得臥善驚目眴無精治之復發其汗如此者醫殺之也
傷寒溫溫其人常傷於溫因而中暍溫熱相薄則發溫病苦雨脾逆冷腹鞕又胸頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此者醫殺之也石二首出醫律

病可發汗證第二

大法春夏宜發汗
凡發汗欲令手足皆周至熱熱一時間益佳但不欲如水流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也
凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也
凡云可發汗而無湯者丸散亦可用要以汗出爲解然不如湯瘥證良
太陽病外證未解其脈浮弱當以汗解宜桂枝湯
太陽病脈浮而數者可發其汗屬桂枝湯

陽明病脈遲汗出多微惡寒表爲未解可發其汗屬桂枝湯

夫病脈浮大問病者言便堅即設利者爲虛大逆堅爲實汗出而解何以故脈浮當以汗解

傷寒脈不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脈浮者解之當汗出愈

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脈浮虛者當發其汗屬桂枝湯

病常自汗出此爲榮氣和榮氣和而外不解此衞不和也榮行脈中爲陰主內衞行脈外爲陽主外復發其汗衞和則愈屬桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衞氣不和也先其時發汗則愈屬桂枝湯

脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衞寒則傷榮榮衞俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血必自下下者即愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚樸杏子湯

傷寒病脈浮緊不發其汗因衄屬麻黃湯

陽明病脈浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯

太陽病脈浮者可發其汗屬桂枝湯

太陽病脈浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解表候續在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯

脈浮者病在表可發其汗屬桂枝湯一云麻黃湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青龍湯發之

一作小便清此爲不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄屬桂枝湯

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯

太陽中風陽浮而陰濇弱浮者熱自發濇弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯

太陽病發熱汗出此爲榮弱衞強故使汗出欲救邪風屬桂枝湯

太陽病下之氣上撞可與桂枝湯不撞不可與之

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池風府卻與桂枝湯則愈

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貲脈氣從少腹上撞心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不嘔屬葛根湯

太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脈促者表未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘屬麻黃湯

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下也屬麻黃湯

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛屬大青龍湯脈微熱汗出惡風不可服之服之則厥筋惕肉瞤此爲逆也

傷寒脈浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利小腹滿或微喘屬小青龍湯

傷寒心下有水氣而微喘發熱不渴服湯已而渴者此寒去爲欲解屬小青龍湯

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通一作按鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小瘥外不解病過十日脈續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不差腹滿加噦不治

太陽病十日以去脈浮細嗜臥此爲外解設胸滿脇痛與小柴胡湯脈浮者屬麻黃湯

中風往來寒熱傷寒五六日以後胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或腹中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬者屬小柴胡湯

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴屬小柴胡湯

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者屬小柴胡湯

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

脈浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗

病發汗以後證第三

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲逆如此者可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹不足言陽氣怫

鬱不得越當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐汗出而不徹故也更發其汗即愈何以知其汗不徹脈澀故以知之

未持脈時病人叉手自冒心師因教試令欬而不即欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆若更發其汗必吐下不止

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已瘥其人微煩不了了此大便堅也以亡津液胃中乾燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今為小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

發汗多又復發其汗此為亡陽若譫語脈短者死脈自和者不死

傷寒發其汗身目為黃所以然者寒食（案食居疑本作濕）相搏在裏不解故也

病人有寒復發其汗胃中冷必吐蚘

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水急難以屈伸屬桂枝加附子湯

服桂枝湯大汗出若脈但洪大與桂枝湯若其形如瘧一再三發汗出便解屬桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脈洪大屬白虎湯

傷寒脈浮自汗出小便數煩復微惡寒而腳攣急反與桂枝湯欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其厥乃復加附子湯與之其汗復出復惡寒脚即伸而胃氣不和譫語可與承氣湯重發其汗復燒針者屬四逆湯

傷寒發汗以解半日許復煩其脈浮數可復發其汗屬桂枝湯

發汗後身體疼痛其脈沈遲屬桂枝加芍藥生薑人參湯

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以麻黃杏子甘草石膏湯

發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲得按之屬桂枝甘草湯

發汗後其人臍下悸欲作賁豚屬茯苓（案茯苓二字各本無從傷寒論增）桂枝甘草大棗湯

發汗後腹脹滿屬厚樸生薑半夏甘草人參湯發其汗不解而反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

發汗已脈浮而數復煩渴者屬五苓散

傷寒汗出而渴屬五苓散不渴屬茯苓甘草湯

太陽病發其汗汗出不解其人發熱心下悸頭眩身瞤而動振振欲擗地屬真武湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噎食臭脇下有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅嘔而下利屬大柴胡湯

太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也屬承氣湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆而惡寒屬四逆湯

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

病不可吐證第四

太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細而數此醫吐之過也若得病一日二日吐之膜中飢口不能食三日四日吐之不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐此醫吐之所致也此為小逆

太陽病吐之者但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲此胸中實不可下若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

病可吐證第五

太法春宜吐

凡服湯吐中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭不痛其項不強寸口脈微浮胸中痞堅氣上撞咽喉不得息此為胸有寒當吐之

病胸上諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噎食臭脇下有水氣腹中雷鳴而利日十餘行其脈反遲寸口微滑此可吐之

利即止

少陰病飲食入即吐心中溫溫欲吐復不能吐當遂吐之

宿食在上脘當吐之

病者手足厥冷脈乍緊邪結在胸中心下滿而煩飲不能食病在胸中當吐之

病不可下證第六

脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澀反在下微則陽氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩經則無血厥而且寒陽微不可下下則心下痞堅

動氣在右不可下下則津液內竭喉燥鼻乾頭眩心悸動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動氣反劇

身雖有熱臥反欲蜷

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身浮冷熱汗自泄欲水自離

動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅

咽中閉塞不可下下之則上轄下重水漿不下臥則欲蜷身體急痛復下利日十數行

諸外實不可下下之則發微熱亡脈則厥當膀發案發各本作撥

諸虛不可下下之則揭引水者易盒惡水者劇

脈濡而弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽邪寒上實下虛意欲得温微弦為虛虛者不可下微則為痺痺下之緩則止而利不休

胸中如盡醋噦人則出小便不利兩脇拘急喘息為難頸項柔項居敬本作背相牽臂則不仁極寒反出汗躯冷若冰眼睛不慧語言不休穀氣多入則為除中口雖欲言舌不得前

脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下浮為陽虛數為無血浮則為虛數則生熱浮則為虛自汗而惡寒數則為痛振而寒慄微弱在關胸下為急喘滿汗流不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏其形如瘧脾反下之令脈急數發熱狂走見鬼心下為痞小便

淋澀少腹甚堅小便血出

脈濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微噫心內煩醫以為大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚脹快不得眠不知胃氣冷緊寒在關元動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動氣反劇

技巧無所施汲水灌其身容熱應時罷慄慄而振寒被而穫之汗出而冒巔體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不容間噦變反腸出頓倒不得安手足為微逆身冷而內煩邊欲從後救安可復追遑

脈浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰氣實為孤陽當小便難胞中虛今反小便利而大汗出狀如風微今反更實津液四射榮竭血耗虛煩不眠血薄內消而成暴癉醫以棄攻其胃此為重虛客陽去有期必下如汗泥而死

跌陽脈遲而緩胃氣如經也跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也

榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便堅氣噫而除何以言之脾脈本緩今數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便堅氣噫而除今脈反浮其數故微邪氣獨留心中則飢邪熱案居敬本此下有不字殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數知法病者則飢數脈不時則生惡瘡袁校云疑有脫誤

脈數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣卻結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脈數者不可下下之必煩利不止

少陰病脈微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱遲者復不可下之

脈浮大應發其汗醫反下之此為大逆

脈浮而大心下反堅有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便堅汗多則熱愈汗少則便難

脈遲尚未可攻

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明欲自汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之為逆

結胸證其脈浮大不可下下之則死

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下之

太陽與少陽併病心下痞堅頸項強而眩勿下之

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

病欲吐者不可下之

太陽病有外證未解不可下下之為逆

病發於陽而反下之熱入因作結胸發於陰而反下之因作痞

病脈浮緊而下之緊反入裏因作痞

夫病陽多者案居敬本作有熱下之則堅

本虛攻其熱必噦

無陽陰強而堅下之必清穀而腹滿

太陰之為病腹滿而吐食不下下之益甚腹時自痛胸下結堅

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚者則欲吐下之不肯止

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲此胸中實不可下也

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人熏之則喘不得小便心腹滿下之則短氣而腹滿小便難頭痛背強加溫針則必衄

傷寒其脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來大漸漸小更來漸大是其候也惡寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤晴不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多清穀熱多便膿血熏之則發黃熨之則咽燥小便利者可救難者必危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手足溫者下之案此下之二字寒下重便膿血頭痛目黃者下之目閉貪水者下之其脈必厥其聲嚶咽喉塞發其汗則戰慄陰陽俱虛惡水者下之裏冷不嗜食大便完穀出發其汗口中傷舌上胎滑煩躁脈數實不大便六七日後必便血復發其汗小便必白利

得病二三日脈弱無太陽柴胡證而煩躁心下鞕至四五案五字各本無日雖能食以承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯一升不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後溏未定成堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之

藏結無陽證寒而不熱傷寒論云不其人反靜舌上胎滑者不可攻也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅不可與若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可少與小承氣湯腹中轉失氣者此為有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者即

熱者此為實急下之屬大柴胡湯承氣湯

傷寒六七日目中不了了睛不和無表證大便難微

太陽病未解其脈陰陽俱停必先振汗出解但陽微者先汗之而解但陰微者先下之而解屬大柴胡湯陰微一作尺實

脈雙弦遲心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之屬承氣湯

結胸者項亦強如柔痓狀下之即和

病者無表裏證發熱七八日雖脈浮數可下之屬大柴胡湯

太陽病六七日表證續在其脈微沈反不結胸其人發狂此熱在少焦少腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯

太陽病身黃其脈沈結少腹堅小便不利為無血小便自利其人如狂者血證諸屬抵當湯

傷寒有熱而少腹滿應小便不利而反利者此為血當下之屬抵當丸

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃但頭汗出其身無有齊頸而還小便不利渴飲水漿此為瘀熱在裏身必發黃屬茵陳蒿湯

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖堅大便必黑屬抵當湯

汗出而譫語者有燥屎在胃中此風也過經乃可下之下之若早語言亂以表虛裏實故也下之則愈屬大柴胡湯承氣湯

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明脈實者當下之屬大柴胡湯承氣湯

陽明病譫語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚

若能食者但堅耳屬承氣湯

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脇下痛嘔而短氣汗出不惡寒此爲表解裏未和屬十棗湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者即愈其外未解尚未可攻當先解其外外解小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯

傷寒七八日身黃如橘小便不利少腹微滿屬茵陳蒿湯

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡湯

但結胸無大熱此爲水結在胸脇頭微汗出與大陷胸湯

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅堅者必譫語屬承氣湯

陽明病不吐下而心煩者可與承氣湯

陽明病其脈遲雖汗出而不惡寒其體必重短氣腹滿而喘有潮熱如此者其外爲解可攻其裏若手足濈然汗出者此大便已堅屬承氣湯其熱不潮未可與承氣湯若腹滿大而不大便者屬小承氣湯微和胃氣勿令至大下

陽明病譫語發潮熱其脈滑疾如此者陽承氣湯屬承氣湯一升腹中轉失氣者復與一升如不轉失氣者勿更與之明日又不大便脈反微澁者此爲裏虛屬旋洽不可更與承氣湯

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語者下之愈屬承氣湯

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘不能臥胃有燥屎也屬承氣湯

脈證第八

病發汗吐下以後證第八

師曰病人脈微而澁者此爲醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒而欲蓄複衣冬月盛寒而欲裸其體所以然者陽微即惡寒陰弱即發熱醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲蓄複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱反陰氣內弱不能勝熱故欲裸其體又陰脈遲證故知亡血

太陽病三日已發其汗吐下溫針而不解此爲壞病桂枝復不中與也觀其脈證知犯何逆逆證而治之

脈浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脈微以裏虛須表裏俱津液和即自汗出愈

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必愈

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自愈

下以後復發其汗必振寒又其脈微細所以然者內外俱虛故也

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和然後下之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能多食一作食其人脇下滿面目及身黃頸項強小便難與柴胡湯後必下重大渴欲水而嘔柴胡湯不復中與也

食穀者噦

太陽病二三日終不能臥但欲起者心下必結其脈微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸未止者四五日復重下之此挾熱利也

太陽病下之其脈促不結胸者此爲欲解其脈浮者必結胸其脈緊者必咽痛其脈弦者必兩脇拘急其脈細而數者頭痛未止其脈沈而緊者必欲嘔其脈沈而滑者必下血

脈浮熱利其脈浮而滑者必下之成結胸心下堅下利不復止

太陽少陽併病而反下之水漿不肯下其人必心煩

脈浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下痞堅脇下痛氣上衝咽喉眩目經脈動惕者久而成痿

陽明病不能食下之不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

陽明病脈遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下其腹滿如故耳所以然者脈遲故也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此爲醫下之也

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷也

吐下發汗後其人脈平而小煩者以新虛不勝穀氣故也

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩而色青黃膚瞤如此者爲難治面色微黃手足溫者易

愈

服桂枝湯下之頭項强痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利屬桂枝去桂加茯苓朮湯

太陽病先發其汗不解而下之其脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故在外當解其外則愈屬桂枝湯

下以後復發其汗者則譫日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴而無表證其脈沈微身無大熱屬乾薑附子湯

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胸起卽頭眩其脈沈緊發汗卽動經身爲振搖屬茯苓桂枝朮甘草湯

發汗吐下以後不解煩躁屬茯苓四逆湯

傷寒發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子湯若少氣梔子甘草湯若嘔梔子生薑湯若腹滿梔子厚樸湯

發汗若下之煩熱胸中塞者屬梔子湯

太陽病經過十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者與承氣湯不屬者不可與欲嘔胸中痛微溏此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胸湯

傷寒五六日其人已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此爲未解屬柴胡桂枝乾薑湯

傷寒汗出若吐下解後心下痞堅噫氣不除者屬旋覆代赭湯

大下以後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可與麻黃杏子甘草石膏湯

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃攻其痞解表屬桂枝湯攻痞屬大黃黃連瀉心湯

傷寒吐下後七八日不結熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升屬白虎湯

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發則不識人循衣妄撮怵惕不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語屬承氣湯若下者勿復服

三陽合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺溺發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷自汗屬白虎湯

陽明病其脈浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反倚息熱其身體重發其汗卽躁心憒憒而反譫語加温針必怵惕又煩躁不得眠下之卽胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者屬梔子湯

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹苦(案本定居敬作者)飢不能食但頭汗出屬梔子湯

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後溏者不可下之有燥屎者屬承氣湯

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便因堅可與小承氣湯和之則愈

大汗若大下而厥冷者屬四逆湯

太陽病下之其脈促胸滿者屬桂枝去芍藥湯若微寒者屬桂枝去芍藥加附子湯

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者未欲解也屬梔子湯

傷寒下後煩而腹滿卧起不安屬梔子厚樸湯

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩屬梔子乾薑湯

傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救裏身體疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證續在先與小柴胡湯嘔止小安(嘔止小安一云嘔不止心下急)其人鬱鬱微煩者爲未解與大柴胡湯下則愈

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加芒硝湯

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脈調和者知醫以丸藥下之非其治也自利者其脈當微厥今反和者此爲內實屬承氣湯

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯

火逆下之因燒針煩躁屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解醫反下之動數則遲頭痛卽眩一云隔內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷心下因堅則爲結胸屬大陷胸湯若不結胸但頭汗出其餘無有齊頸而還小

便不利身必發黃屬柴胡梔子湯案此句泰定居敬本皆無從袁校本

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在復與柴胡湯此雖已下不爲逆也必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而堅痛者此爲結胸屬大陷胸湯若但滿而不痛者此爲痞柴胡復不中與也屬半夏瀉心湯本以下之故心下痞與之瀉心其痞不解其人渴而口燥小便不利者屬五苓散一本言忍之一日乃愈

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安醫見心下痞爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但胃中虛客氣上逆故使之堅屬甘草瀉心湯

傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理案此與上理字泰定袁校本俱作治中理中焦此利在下焦屬赤石脂禹餘糧湯若不止者當利其小便

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止心下痞堅表裏不解屬桂枝人參湯

傷寒吐後腹滿者與承氣湯

病者無表裏證發熱七八日脈雖浮數者可下之假令下已脈數不解今熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血屬抵當湯若脈數不解下之止必協熱便膿血太陽病醫反下之因腹滿時痛爲屬桂枝加芍藥湯大黃痛屬桂枝加大黃湯

傷寒六七日其人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止爲難治屬麻黃升麻湯

傷寒本自寒醫反吐之寒格更逆吐食入即出屬乾薑黃芩黃連人參湯

病可溫證第九

大法冬宜溫熱藥及灸

師曰病發熱頭痛脈反沈若不瘥身體更疼痛當救其裏宜溫藥四逆湯

下利腹滿身體疼痛先溫其裏宜四逆輩

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當溫之宜四逆湯

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲若胸上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯

少陰病脈沈者急當溫之宜四逆湯

下利欲食者就當溫之

下利脈遲緊爲痛未欲止當溫之得冷者滿而便腸垢下利其脈浮大此爲虛以强下之故也設脈浮革因虛腸鳴當溫之宜當歸四逆湯

少陰病下利脈微澀者卽吐案居敬本作嘔行者案居敬本作汗出必數更衣反少當溫之以四逆湯

病不可灸證第十

微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐貿血

散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脈浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從腰以下必當重而痺此爲火逆若欲自解當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脈浮故知汗出當解

傷寒本自寒屬醫反吐之寒格更逆吐食入卽出屬乾薑黃芩黃連人參湯

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貴脈氣從少腹上撞者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

少陰病其人吐利手足不利反發熱不死脈不足者灸其少陰七壯

少陰病下利脈微澀者卽嘔行者必數更衣反少當溫其上灸之一云灸厥陰五十壯

諸下利皆可灸足大都五壯一云七壯商邱陰陵泉皆三壯

下利手足厥無脈灸之不溫反微喘者死少陰負跌陽者爲順也

傷寒六七日其脈微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

病不可刺證第十二

大怒無刺大一作新已刺無怒已字泰定居敬本無

勞無刺大一作新已刺無勞大醉無刺已刺無飽大飢無刺已刺無飢大渴無刺已刺無渴大驚無刺熇熇之熱無刺漉漉之汗無刺渾渾之脈身熱甚陰陽皆爭者勿刺也其可刺者急取之不汗則洩所謂勿刺者有死徵也無刺病與脈相逆者上工刺未生其次刺未盛其次刺已衰蠱工逆此謂之伐形也案此三字袁校本無

病可刺證第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者當針足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府

乃卻與桂枝湯則愈

傷寒腹滿而譫語寸口脈浮而緊者此爲肝乘脾名縱

當刺期門

傷寒發熱薔薔惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必滿

而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫當刺

期門

陽明病下血而譫語此爲熱入血室但頭汗出者當刺

期門隨其實而瀉之濈然汗出者則愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲

身涼胸脇下滿如結胸狀其人譫語此爲熱入血室當

刺期門隨其虛實而取之平病云熱入血室無犯胃氣及上三焦與此相反當詳藥

禾爲針耶案九卷平病三焦作二焦注云二字疑上二焦或指上焦中焦言作三焦當誤

太陽與少陽併病頭痛頸項強而眩時如結胸心下痞

堅當刺大杼一間案一間上脫數本有第字肺輸肝輸慎不可發汗

發汗則譫語譫語則脈弦譫語五日不止當刺期門

少陰病下利便膿血者可刺

婦人傷寒懷身腹滿不得小便如從腰以下重如有水

氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮

及關元小便利則愈

傷寒喉痺刺手少陰少陰在腕當小指後動脈是也針

入三分補之

問曰病有汗出而身熱煩滿不爲汗解者何對曰

汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰

風厥也太陽主氣故先受邪少陰與爲表裏也得熱則

上從之從之則厥治之案之袁校本作從表裏刺之欲之湯

熱病二日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以瀉

其熱而出其汗實其陰以補其不足所謂五十九刺者

兩手外內側各三凡十二痏五指間各一凡八痏足亦

如是頭入髮一寸傍三分各三凡六痏更入髮三寸邊

各五凡十痏耳前後口下項中各一凡六痏鼻上一

熱病先膚痛窒鼻充面取之皮以第一針五十九荷圍

爲軫荷一云鼻索皮於肺不得索之火火心也

熱病頭乾多飲善驚臥不能安取之肩肉以第六針五

十九目眥赤索肉於脾不得索之木木肝也

熱病而胸脇痛手足躁取之筋間以第四針針於四達

作筋辟目浸索筋於肝不得索之金金肺也

熱病數驚癎瘈而強取之脈以第四針急瀉有餘者補

疾毛髮去索血一作於心不得索之水水腎也

熱病身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四針急瀉有

骨病時齘牙齒耳痛索骨於腎不得索之土土脾也

熱病先身濇倦傍教傍教太素作倚煩悶乾膚嗌取之以第一針

五十九膺腹口乾寒汗

熱病頭痛攝攝一作顳顬目脈緊善卧厥熱也取之以第三

針視有餘不足寒熱病

熱病體重腸中熱取之以第四針於其輸及下諸指間

索氣於胃絡得氣止

熱病俠脊痛急胸脇支滿取之涌泉與太陰陽明一云陰陵

泉以第四針針嗌裏

熱病而汗且出反脈順可汗者取之魚際太淵太都太

白溜之則熱去補之則汗出而煩滿不解者厥也病名曰

風厥也太陽主氣故先受邪少陰與爲表裏也得熱則

上從之從之則厥治之案之袁校本作從表裏刺之欲之湯

熱病七八日脈口動喘面脈者急刺之汗出自出淺刺

手大指間

熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補手太陰病甚爲五

十九刺

熱病先手臂痛刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於頭手案泰定本作首者刺項太陽而汗出止

熱病先身重骨痛耳聾目瞑刺足少陰病甚爲五十九

刺少陽

熱病先眩冒而熱胸脇滿刺足少陰少陽

熱病始足脛者先取足陽明而汗出止

病不可水藥第十四

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與

之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若不大便

六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中不

轉失氣者此爲但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不

能食欲飲水者即噦

陽明病若胃中虛冷其人不能食欲飲水即噦

下利其脈浮大此爲虛以下強之故也設脈浮革因爾

腸鳴當溫之與水即噦

病在陽身以汗解而反以水噀之若灑之其熱卻不得

去益煩皮上粟起意欲飲水反不欲飲案而寫本作熱病宜文而熱疑當作不渴宜文

蛤散若不瘥與五苓散

若寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可身

熱皮粟不解欲引衣自覆若以水噀之洗之益令熱卻

不得出當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥

三兩如上法

寸口脈浮大醫反下之此爲大逆浮即無血大即爲寒

寒氣相搏即爲腸鳴胃乃不知而反飲水令汗大出水

得寒氣冷必相拘其人即鴟(宋本作鴞)案本作鴞音義同噎正字通云字彙引(宋本作經)鴟不得息謂作鴞

寸口脈濇而弱濇即惡寒弱即發熱濇弱相搏戴氣衰微胸中苦煩此非結熱而反薄居水漬布冷飲結之陽氣遂微諸府無所依陰脈遲聚結在心下而不背移胃中虛冷水穀不化小便纔通復不能多微則可救聚寒心下當柔何也

病可水證第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者與飲之即愈

太陽病寸口緩關上小浮尺下弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此為醫下之也若不下其人復不惡寒而渴者為轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也欲飲水者但與之當以法救之宜五苓散

寸口脈洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣實榮長則陽盛憒憒不得出身胃實則堅難大便則乾燥三焦閉塞津液不通腎發其汗陽盛不周復重下之胃燥熱奇大便遂搐小便不利榮衛相搏心煩發熱兩眼如火與乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病針藥所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒溫衣覆汗出表虛通然其病即除形脈多不同此愈非法治但腎脈所當妄犯傷榮衛

擾亂面頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水屬五苓散嘔吐而病在膈上後必思水者急與豬苓散飲之水亦得也

病不可火證第十六

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流洗失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿而微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚則至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可治

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃肩喘如此者為難治面色微黃手足溫者愈

傷寒加溫針必驚

陽脈浮陰脈弱則血虛血虛則筋惕其脈沈者榮氣微也榮氣微加燒針

也其脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮衛俱微血留不行更發熱而燥煩也

傷寒脈浮而緊以火迫劫之亡陽驚狂起臥不安屬桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

問曰得病十五十六日身體黃下利狂欲走師脈之言何以知之師曰寸口脈洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣實榮長則陽盛憒憒不得出身胃實則堅難大便則乾燥當下清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脈陽浮陰濇弱陽浮則為風陰濇弱為少血浮虛受風少血發熱惡寒酒淅項強頭眩醫加火熏擊令汗出惡寒遂甚客熱因火而發佛鬱蒸肌膚身目為黃小便微難短氣從鼻出血而復下之胃無津液泄利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如腫若去目明心了此皆醫所為妄通然其病即除形脈多不同此愈非法治但腎脈所當

血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病其脈浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反偏惡熱其身體重發其汗則躁心憒憒而反譫語加溫針必怵惕又煩躁不得眠

少陰病欬而下利譫語是為被火氣劫故也小便必難為強責少陰汗也

太陰病二日而燒瓦熨其背大汗出火氣入胃胃中竭躁必發譫語十餘日振而汗反出者此為欲解其汗從腰以下不得汗其人欲小便反不得嘔欲失溲足下惡風大便堅者小便當數而反不數及多便已其頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰脈逆陰陽竭盡生死證第十八

問曰溫病汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何對曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪卻而精盛精盛則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精也今汗出而輒復熱者邪勝也不能食者精無裨也汗出而熱留者壽可立而傾也夫汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不能勝其病也狂言者是失志失志者死此有三死不見一生雖愈必死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陽脈之極也死其得汗而脈靜者生也

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必有清

熱病脈尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈躁盛得汗出者生也

熱病已得汗而脈尚躁喘且復熱勿盧刺喘甚者死

熱病陰陽交者死

熱病煩已而汗脈當靜

太陽病脈反躁盛者是陰陽交死得汗脈靜者生

熱病陰陽交者熱煩身躁太陰寸口脈兩衝尚躁盛是陰陽交死得汗脈靜者生

熱病陽進陰退頭獨汗出死陰進陽退腰以下至足汗出亦死陰陽俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱退汗出已寒慄不止鼻口氣冷亦死

右熱病陰陽交部

熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并陰故治

熱病所謂并陽者熱病已得汗脈尚躁盛大熱汗出雖不汗出者猶是謂并陽故治

右熱病并陰陽部

少陰病惡寒踡而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自冒者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踡其脈不至其人不煩而躁者死

少陰病六七日其人息高者死

少陰病脈微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐五六日自利復煩躁不得卧寐者死

少陰病下利若利止惡寒而踡手足温者可治

少陰病惡寒而踡時時自煩欲去其衣被者可治

少陰病下利不止厥逆無脈乾嘔煩服湯藥其脈暴出者死微續者生

右少陰部

傷寒六七日其脈微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

傷寒下利厥逆躁不能卧者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒厥逆六七日不利便發熱而利者生其大汗出利不止者死但有陰無陽故也

傷寒五六日不結胸腹滿脈虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱而厥七日下利者為難治

右厥逆部

熱病不知所痛不能自收口乾陽熱甚陰脈在髓死不治

熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲不止腹而脹尚不厥飲目無精光死不治

脾傷即中風陰陽氣別離陰不從陽故以三分候其死生

傷寒汗逆上氣其脈散者死謂其人形損故也

傷寒下利日十餘行其人脈反實者死

病者脇下素有痞而不滿（案不滿敬本作下）在臍傍痛引少腹入陰使陰筋此為藏結死

夫實則語語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視語喘滿者死若下利者亦死

結胸證悉具而煩躁者死

吐舌下卷者死唾如膠者難解舌頭四邊徐有津液此為欲解病者至經上唇有色脈自和為欲解色急者未

解

右陰陽竭盡部

重實重虛陰陽相附生死證第十九

問曰何謂虛實對曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實者問曰何謂重虛對曰經絡皆實是寸脈急而尺內緩也皆當俱治故曰滑則順滑則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑（案則居敬本作利）可以長久寒氣暴上脈滿實實而滑順則生實而滿逆則死形盡滿脈急大堅尺滿而不應順則生逆則死所謂順者手足温所謂逆者手足寒也

問曰何謂重虛對曰脈虛氣虛尺虛是謂重虛所謂氣虛者言無常也尺虛者行步乏（案泰定居敬本皆作匡）然也脈虛者不象陰也如此者滑則生濇則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死餘藏皆如此也

脈實滿手足寒頭熱者春秋則生冬又則死脈浮而濇而脹尚不厥飲目無精光死不治

冬為逆春秋為順經虛絡滿者尺熱滿而脈寒濇春又死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽

問曰秋冬無極陰春夏無極陽何謂也對曰無極陽者春夏無數虛陽明陽明虛則狂撫極陰者秋冬無數虛太陰太陰虛則死

右重實重虛部

熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下爭逆心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陽氣上爭逆得汗者生

右陰陽相附部

熱病生死期日證第二十

太陽之脈色榮顴骨熱病也榮未和曰今且得汗待時自已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病氣內連腎少陽之脈色榮頰前熱病也榮未和曰今且得汗待時自已與少陰脈爭見者死期不過三日（和一作天）熱病七八日脈微小病者溏血口中乾一日半而死脈代者一日死

熱病七八日脈不躁喘不數後三日中有汗三日不汗四日死未曾汗勿厝刺厝一作廚

熱病三四日脈不喘其動均者身雖炕熱今自得汗生傳曰始府入藏終陰復還故得

熱病七八日脈不喘其動均者生微熱在陽不入陰今自汗也

熱病七八日脈不喘動數均者病當瘥期三日不得汗四日死

熱病身面盡黃而腫心熱口乾舌卷焦黃黑身脈臭伏壞傷脈中脾者死

熱病熨癡狂言不得汗癡癡不已伏毒傷肝中膽者死

熱病汗不出出不至足嘔膽吐血善鼽不得臥伏毒在肝腑足少陽者死

熱病十逆死證第二十一

熱病腹滿脹脹身熱者不得大小便脈牆小疾一逆見死

熱病腸鳴腹滿四肢清泄注脈浮大而洪不已二逆見死

熱病大吸不止腹中痛脈浮大絕喘而短氣三逆見死

熱病嘔且便血奪形肉身熱甚脈絕動疾四逆見死

熱病欬喘悸眩身熱脈小疾奪形肉五逆見死

熱病腹大而脹四肢清奪形肉短氣六逆見一旬內死

熱病腹脹便血脈大時時小絕汗出而喘口乾舌焦視不見人七逆見一旬死

熱病身熱甚脈轉小咳而便血目脈陷妄言手循衣縫口乾躁擾不得臥八逆見一時死

熱病癡惡狂走不能食腹滿胸痛引臍脅背嘔血九逆見一時死

熱病嘔血喘咳癉滿身黃其腹鼓脹泄不止脈絕十逆見一時死

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病肺氣絕喘逆欬唾血手足腫面黃振慄不能言語死魄與皮毛俱去故肺先死丙日篤丁日死

熱病脾氣絕頭痛嘔宿汁不能食嘔逆吐血水凝不得入狂言譫語腹大滿四肢不收遺不禁死與肉氣俱去故脾先死甲日篤乙日死

熱病心主氣絕煩滿骨痛一作癢噫腫不可喚欲飲不能欬哭而笑死神與緊脈俱去故心先死壬日篤癸日死

熱病肝氣絕僵仆足不安地嘔血恐懼洒淅惡寒血妄出遺屎溺死魂與筋血俱去故肝先死庚日篤辛日死

熱病腎氣絕喘悖吐逆癰疽尻臚目視不明骨痛短氣喘滿汗出如珠死精與骨髓俱去故腎先死戊日篤己日死

外見瞳子青小爪甲枯髮墮身澀齒挺而垢又皮面厚塵黑咳而吐血渴欲數飲腹大滿此五藏絕表病也

熱病至脈死日證第二十三

熱病脈四至三日死脈四至者平人一至病人脈四至也

熱病脈五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者死

熱病脈六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病損脈死日證第二十四

熱病脈四損三日死所謂四損者平人四至病人脈一至名曰四損

熱病脈五損一日死所謂五死者平人五至病人脈一至名曰五損

熱病脈六損一時死所謂六損者平人六至病人脈一至名曰六損若絕不至或久乃至立死

平卒尸厥脈證第一
平痙溼暍脈證第二
平陽毒陰毒百合狐惑脈證第三
平霍亂轉筋脈證第四
平中風歷節脈證第五
平血痺虛勞脈證第六
平消渴小便利淋脈證第七
平水氣黃汗氣分脈證第八
平黃疸寒熱瘧脈證第九
平胸痺心痛短氣貫脈脈證第十
平腹滿寒疝宿食脈證第十一
平五藏積聚脈證第十二
平驚悸卟吐下血胸滿瘀血脈證第十三
平嘔噦下痢脈證第十四
平肺痿肺癰欬逆上氣淡飲脈證第十五
平癰腫腸癰金瘡腐溼脈證第十六
平卒尸厥脈證第一

寸口沈大而滑沈則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入於藏即死人於腑者即愈此爲卒厥不知人脈尚身冷爲人戴即死如身温和汗自出爲人啼而復自愈

平痙溼暍脈證第二 亦一作濕

大陽病發熱無汗而反惡寒者名剛痙

太陽病發熱汗出而不惡寒者名柔痙 一作惡寒

太陽病發熱其脈沈而細者爲痙

太陽病發熱其汗因致痙 一云發其汗太多因致痙

病者身熱足寒頸項强急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨

夫風病下之則痙復發其汗必拘急

太陽病其證備身體强几几然脈沈遲此爲痙栝蔞桂枝湯主之

痙病有灸瘡難療

痙家雖身疼痛不可發其汗汗出則痙

太陽病關節疼煩脈沈而緩者爲中溼 一云中溼爲溼痺溼之候其人小便不利大便反快但當利其小便

病者一身盡疼 一云發熱日晡即劇此爲風溼汗出當風或久傷取冷所致也

溼家之爲病一身盡疼發熱而身色似熏黃也

溼家之爲病其人但頭汗出而背强欲得被覆向火若下之蚤則吐 一云不利案袁校本作嘔或胸滿小便利 一云不利一云下利誤 舌上如胎此爲丹田有熱胸上有寒渴欲飲而不能飲則口燥也

溼家下之額上汗出微喘小便利 一云不利者死若下利不止者亦死

問曰風溼相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨不止師云此可發汗而其病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去溼氣續在是故不愈若治風溼者發其汗微微似欲出汗者則風溼俱去也

溼家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗爲宜慎不可以火攻之

風溼脈浮身重汗出惡風者防己湯主之

病人喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒溼故鼻塞內藥鼻中即愈 一云溼家病身疼痛發熱面黃 喘頭痛鼻塞而煩

傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者桂枝附子湯主之若其人大便鞕小便自利者去附子湯主之

風溼相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也白虎湯主之

太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮府中所致也瓜蒂湯主之

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足厥冷小有勞身熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加温鍼則發熱益甚數下之淋復甚

平陽毒陰毒百合狐惑脈證第三

陽毒爲病身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脈浮大數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治至七日不可治也有傷寒一二日便成陽毒升麻湯主之

陰毒爲病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆臀青面黑四肢厥冷其脈沈細緊數身如被打五六日可治至七日不可治也或傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒甘草湯主之

百合之爲病其狀常默默欲臥復不能臥或如強健人欲得出行而復不能行意欲得食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如寒無寒如熱無熱朝至日苦小便赤黃身形如和其脈微數百脈一宗悉病各隨證治之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復蝕其汗此爲逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦爲逆其病難治（千金方云見在於陰面攻陽則陰不得解也復發其汗爲逆也見在於陽面攻其陰則陽不得解也復下之其病不愈）

狐惑爲病其狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐狐惑之病並不欲飲食閒食臭其面目乍赤乍白乍黑其毒蝕上部則聲嗚其毒蝕於下部者則咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於下部者雄黃熏之（嗚一作廈）

參湯淹洗之蝕於肛者雄黃熏之

其人脈數無熱微煩默默欲臥汗出初得三四日目如鳩眼得之七八日目四眥黃黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上爲肺痿汗出當風所致也

寸口脈沈而弱沈則主骨弱則主筋沈則爲腎弱則爲肝（案此下居薇本有汗出入水中如水傷心脈痿汗出故曰脈絕十九字疑錯簡）

傷筋筋傷則緩名曰泄瘧則傷骨骨傷則痿名曰枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四肢斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便爲脛節也病脛節疼痛不可屈伸此皆飲酒

爲霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其脈微澀本是霍亂今是傷寒卻四五日至陰經上轉入陰必吐利

轉筋爲病其人臂腳直脈上下行微弦轉筋入腹雜屎白汲主之

平中風歷節脈證第五

夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痺脈微而數中風便然

頭痛脈滑者中風風脈虛弱也

寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪喎僻不遂邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人邪入於藏舌即難言口吐涎

寸口脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛虛寒相搏邪在於絡肌膚不仁邪入於腑則不識人邪入於藏舌即難言口吐涎

跌陽脈浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出

少陰脈浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏則疼痛如掣

虛人脈滿小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致也

寸口脈沈而弱沈則主骨弱則主筋沈則爲腎弱則爲肝（案此下居薇本有汗出入水中如水傷心脈痿汗出故曰脈絕十九字疑錯簡）

傷筋筋傷則緩名曰泄瘧則傷骨骨傷則痿名曰枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四肢斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便爲脛節也病脛節疼痛不可屈伸烏頭湯主之

諸肢節疼病身體羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐桂枝芍藥知母湯主之

平血痺虛勞脈證第六

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出起臥不時動搖如案（一作加）被微風遂得之形如風狀（一云其狀如被微風所吹）但其脈自微滿在寸口關上小緊宜針引陽氣令脈和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀黃者桂枝五物湯主之

男子平人脈大爲勞極虛亦爲勞

男子勞之爲病其脈浮大手足煩熱春夏劇秋冬差陰寒精自出足酸削不能行少腹滿

人年五十六十其病脈大者痺使背行苦腰痛馬刀俠瘿者皆爲勞得之

男子平人脈虛弱微細者喜監汗出也

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸其脈浮者裏虛故也

男子脈虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利而色白時目瞑其人喜欠少腹滿此爲勞使之然

男子脈微弱而澀爲無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩痛（一云髮落脈極虛目眩）

亡精家也

平寒亂轉筋脈證第四

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此爲霍亂霍亂問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何病師曰當

脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精

平消渴小便利淋脈證第七

師曰厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食食卽吐下之不肯止

寸口脈浮而遲浮則爲虛遲則爲勞虛則衛氣不足遲則榮氣竭

趺陽脈浮而數浮則消氣數則消穀而堅（要略堅作大堅氣盛則渴數澁數則緊（要略作堅）緊數相搏則爲消渴男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之

師曰熱在一作下焦則溺血亦令人淋閉不通淋之爲病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中

寸口脈細而數數則爲熱細則爲寒數爲強吐

趺陽脈數胃中有熱則消穀引食大便必堅小便則數

少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣淋淋家不可發汗發汗則必便血

平水氣黃汗氣分脈證第八

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脈亦浮外證附腫按之沒指不惡風其腹如鼓（如鼓一作如故）不滿不渴當發其汗正水其脈沈遲外證自喘石水其脈自沈外證腹滿不喘黃汗其脈沈遲身體發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

脈浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風強則爲隱疹身體爲瘙瘙爲泄風久爲痼痺氣強則爲水雖以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此爲風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此爲黃汗

寸口脈沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水漚人之目窩上微擁如新臥起狀其頭脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛而反不痛身體反重而酸其人不渴汗出卽愈此爲風水惡寒者此爲極虛發汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不眠此爲黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此爲脾脹其形如腫發汗卽愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脈浮浮爲在表其人能食頭痛汗出表無他病病者言但下重故從腰以上爲和腰以下當腫及陰難以屈伸防己黃耆湯主之（一云風水脈浮身重汗出惡風者防己黃耆湯主之）

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出而無大熱者越婢湯主之

師曰裏水者一身面目洪腫其脈沈小便不利故令病水假如小便自利亡津液故令渴也越婢加朮湯主之（一云風水脈沈頭面浮腫小便不利故令病水假如小便自利亡津液故令渴也）

皮水之爲病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防已茯苓湯主之

趺陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之下之則胸滿短氣

趺陽脈當伏今反數本自有熱消穀一作消渴小便數今反不利此欲作水

寸口脈浮而遲浮脈熱遲脈潛熱潛相搏名曰伏沈伏相搏名曰水沈則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚則爲水矣

寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒水不沾流走在腸間

少陰脈緊而沈緊則爲痛沈則爲水小便卽難

師曰脈得諸沈者當責有水身體腫重水病脈出者死

夫水病人目下有臥蠶面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沈絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿陰腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈

水之爲病其脈沈小屬少陰浮者爲風無水虛脈者爲氣水發其汗卽已沈者與附子麻黃湯浮者與杏子湯

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其陰大腫

肝水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液微生小便續通

肺水者其身腫小便難時時鴨溏

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下怪如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦（一云大便反堅）

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈

師曰寸口脈沈而遲沈則爲水遲則爲寒寒水相搏趺陽脈伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陰脈革少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血血不利則爲水名曰血分

問曰病者若水面目身體四肢皆腫小便不利師脈之不言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈沈而緊沈爲水緊爲寒沈緊相搏結在關元始時尚微年盛不覺陽衰之後榮

衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脇下急痛醫以爲留飲而大下之氣繫不去其病不除復重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如小差食飲過度脹復如前胸脇苦痛象若奔豚其水陽溢則浮欸喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欸欸止其喘自差先治新病病當在後言當先治本病也如治新病則病繫已

黃汗之病身體洪腫一作發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁其脈自沈

問曰黃汗之病從何得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之黃耆芍藥桂枝苦酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗出者此榮衛本作勞氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤則胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰脚弛紫弛袁校本刊改作馳病如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此爲黃汗桂枝加黃耆湯主之

寸口脈遲而澁遲則爲寒澁則爲血不足跌陽脈微而遲遲則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽氣前通則惡寒陰氣前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分去芍藥加麻黃細辛附子湯主之或枳實尤湯主之案居敬本無或字別列一條心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實尤湯主之此蓋袁氏所刪併依盤與旋杯文異刪併非是

平黃疸寒熱瘧脈證第九

凡黃候其寸口脈近掌無脈曰鼻冷並不可治

脈微微則傷精陰氣寒冷少陰不足穀氣反強飽則煩滿滿則發熱客熱消穀發已腹飢熱則腹滿微則傷精穀強則瘦名曰穀寒熱

陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩案居敬本煩作煩疑是頭眩若必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

師曰寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢若煩脾色必黃瘀熱以行

師曰黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上爲差反劇爲難治

又曰疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也

師曰諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝加黃耆湯又男子黃小便自利當與小建中湯

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之用大黃黃蘗梔子芒硝湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也

心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸

酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沈弦者先下之

酒疸心中熱欲吐者吐之即愈

酒疸黃色心下結實而煩

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之

寸口脈微而澁呕朝發暮屏暮發朝解名曰溫瘧白虎加桂枝湯主之

瘧多寒者牡瘧也蜀漆散主之

平胸痺心痛短氣黃脈脈證第十

師曰夫脈當取太過與不及陽微陰弦則胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽盛知在上焦所以胸痺心痛者以其脈陰弦故也

胸痺之病喘息欬唾胸痺案袁校本刊改背痛短氣寸口脈沈而遲關上小緊數者栝蔞薤白白酒湯主之

平人無寒熱短氣不足以息者實也

實胸病者從小腹起上衝咽喉發作時欲死復止皆徘徊欲得其氣上衝胸腹痛及往來寒熱實胸湯主之

師曰病有實胸有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之

平腹滿寒疝宿食脈證第十一

跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必下部閉塞大便難雨脛一云疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃白去腹滿時減復如故此為寒當與溫藥

跌陽脈緊而浮緊則為痛浮則為虛虛則腸鳴緊則堅滿

脈雙弦而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰也可下之

病腹中滿痛為實當下之

腹滿不減減不足言當下之

病腹滿發熱十數日脈浮而數飲食如故厚樸三物湯主之厚樸七物湯主之

病腹滿痛厚樸七物湯主之

寸口脈遲而緊遲則為寒緊則為氣氣寒相搏轉絞而痛

寸口脈遲而澀遲為寒澀為無血

夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏中寒其人不案居敬本作下疑是利以裏虛也欲嚏不能此人胃中寒作痛

夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

寸口脈弦者則脇下拘急而痛其人喜嘔惡寒也

寸口脈浮而滑頭中痛

跌陽脈緊而遲緊則為寒遲則為虛虛寒相搏則欲食温假令食冷則咽痛

寸口脈微尺中緊而澀緊則為寒微則為虛澀則血不足故知發汗而復下之也緊在中央知寒尚在此本寒氣何為發汗復下之耶

夫脈浮而實乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者當下其寒

脇下偏痛脈緊弦此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯

寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒緊則不欲食弦緊相搏此為寒疝

跌陽脈浮而遲浮則為風虛遲則為寒疝寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥寒其脈沈弦者大烏頭湯主之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有宿食

寸口脈緊如轉索左右無常者有宿食

寸口脈緊即頭痛風寒或腹中有宿食不化

脈滑而數者實也有宿食當下之

下痢不欲食者有宿食當下之

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥屎也所以然者本有宿食故也

宿食在上言當吐之

平五藏積聚脈證第十二

問曰病有積有聚有擊聚一作氣何謂也師曰積者藏氣下同病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移為可治擊氣者脇下痛按之則愈復發為擊氣夫病已愈不得復發今病復發即為擊氣也

諸積大法脈來細而附骨者乃積也細一作結寸口積在胸中微出寸口積在喉中關上積在臍旁上關上積在心下微下關積在少腹尺積在背氣衝脈出在左積在左脈出在右積在右脈兩出積在中央各以其部處之

診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋差夏劇主皮中時痛如虮緣之狀甚者如鍼刺時癢其色白

診得心積脈沈而抌上下無常處病胸滿悸腹中熱面赤脣乾心煩掌中熱甚即唾血主身瘈瘲主血脈夏差冬劇其色赤

診得脾積脈浮大而長飢則滅飽則見脈起與穀爭減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足脾腫脈不能臥起主肌肉損其色黃

診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪走心下足腫寒腸痛引小腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤吝轉筋爪甲枯黑者蝕秋劇其色青

診得腎積脈沈而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則減小腹裏急口乾咽腫傷熠月暗暗骨中寒主髓脈善忘其色黑

寸口脈沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其脈弦腹中急痛脇背痛相引腹中有寒疝瘕

脈弦緊而微細癥也夫寒痺瘕瘕積聚之脈皆弦緊若

在心下卽寸弦緊在胃管卽關弦緊在臍下卽尺弦緊一曰關脈弦長有積
在臍左右上下也
又脈癥法左手脈橫癥在左右手脈橫癥在右脈頭大者在上頭小者在下
又法橫案袁校本橫作衡脈見左積在右見右積在左偏得橫者在中
寶而滑亦爲積弦緊亦爲積爲寒澁爲痂痛
內有積不見脈難治見一脈相應爲易治諸不相應爲不治
左手脈大右手脈小上病在左脇下病在左足右手脈大左手脈小上病在右脇下病在右足
脈弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治
脈來細而沈時直者身有癥腫若腹中有伏梁
脈來小沈而實者胃中有積緊不下食食卽吐
平驚悸卽吐下血胸滿瘀血脈證第十三
寸口脈動而弱動則爲驚弱則爲悸
跌陽脈微而浮浮則胃氣虛微則不能食此恐懼之脈
驚迫所作也驚生病者其脈止而復來其人目睛不轉
不能呼氣
寸口脈緊跌陽脈虛案袁校本作浮胃氣則虛寸口脈緊寒實也寒在上焦胸中必滿而噫胃氣虛者跌陽脈浮少陽脈緊心下必悸何以言之寒水相搏二氣相爭是以悸
脈得諸澀滿弱爲亡血
寸口脈弦而大弦則爲減大則爲乳減則爲寒乳則爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血
亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振
問曰病卽連日不止其脈何類師曰脈來輕輕在肌肉尺中自溢一云尺脈浮目睛暈黃卽必未止暈黃去目睛慧了知卽今止
師曰從春至夏發卽者太陽從秋至冬發卽者陽明
寸口脈微弱尺脈澀弱則發熱澀爲無血其人必厥微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛爲實上虛下實必卽也
太陽脈大而浮必卽吐血
病人面無血色無寒熱脈沈弦者卽也
卽家不可發其汗汗出必額上促急而緊直視而不能眴不得眠
脈浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血寸口脈微而弱弱氣血俱虛男子則吐血女子則下血嘔吐汗出者爲可治案治字二本並無
跌陽脈微而弱春以胃氣爲本吐利者爲可不者此爲欲胃中虛冷故吐也
陽緊陰數其人食已卽吐陽浮而數亦爲吐寸緊尺澀其人胸滿不能食而吐吐止者爲下之故不能食設言未止者此爲胃反故尺爲之微澀也
寸口脈緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脈爲陰絡而逆其人則噎關上脈數其人則吐脈弦者癖也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之令脈反弦故名曰虛
跌陽脈微而澀微則下利澀則吐遊寒不得入也
寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足
血不足則胸中冷
跌陽脈浮而澀浮則爲虛澀則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而澀其病難治
夫吐家脈來形狀如新臥起
病人欲吐者不可下之
下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠血

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者豬苓散主之

嘔而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

夫六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者下利不禁下甚者手足不仁

下利脈沈弦者下重其脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死

脈滑按之虛絕者其人必下利

下利有微熱其人渴脈弱者今自愈

下利脈數若微發熱汗自出者自愈設脈復緊爲未解

下利寸脈反浮數尺中自澁其人必清膿血

下利手足厥無脈灸之不溫若脈不還反微膚者死少陰負趺陽者爲順也

下利脈數而浮一作渭者今自愈設不瘥其人必清膿血以有熱故也

下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生脈不還者死

下利脈反弦發熱身汗者自愈

下利熱者當利其小便

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿其藏寒者當溫之

下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱干金方遠下文

下利清穀必鬱冒汗出而解其人微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表

下利脈遲而滑者實也利未欲止當下之

下利脈反滑者當有膿去下乃愈

下利差至其年月日時復發此爲病不盡當復下之

下利而譫語爲有燥屎也宜下之

下利而腹痛滿爲寒實結當下之

下利腹中堅者當下之

下利後更煩按其心下濡者爲虛煩也

下利後脈三部皆平按其心下堅者可下之

下利脈浮大者虛也以強下之故也設脈浮革因而腸鳴當溫之

病者痿黃躁而不渴胃中寒實而下利不止者死

夫風寒下者不可下之下之後心下堅痛脈遲者爲寒實也設脈大浮弦下之宜已

但當溫之脈沈緊下之亦然脈大浮弦下之宜已

平肺痿肺癰咳逆上氣煎飲脈證第十五

問曰熱在上焦者因咳爲肺痿肺痿之病從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難

數被驅藥下利重亡津液故得之

寸口脈不出反而發汗陽脈早索陰脈不遲三焦脚調人而不出陰脈不遲身體反冷其內反煩多吐唇燥小便反難此爲肺痿傷於津液便加燔爪亦如脈脳但坐發汗故也

肺痿其人欲咳不得咳咳則出乾沫久久小便不利甚則脈浮弱

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制下也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以溫其藏

師曰肺痿咳唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也

咳而口中自有津液吾上胎滑此爲浮寒非肺痿也

問曰寸口脈數其人咳口中反有濁唾涎沫者何也師曰此爲肺癰辟癰咳則胸中隱隱痛

脈反滑數此爲肺癰

咳唾膿血脈數虛者爲肺痿脈數實者爲肺癰

問曰病咳逆脈之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脈何類

師曰寸口脈微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮咳而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則咳口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血爲之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死

咳而胸滿振寒脈數咽乾不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者爲肺癰桔梗湯主之

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸棗湯主之

寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而咳跌陽脈浮緩胃氣如經此爲肺癰

問曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此爲癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿腹之所在何以別知其處

師曰假令膿在胸中者爲肺癰

其人脈數咳唾有膿血設膿未成其脈自緊緊去但數膿爲已成也

夫病吐血喘咳上氣其脈數有熱不得臥者死上氣面燥腫有息其脈浮大不治又加利尤甚上氣躁而喘者

爲肺脹欲作風水發汗則愈

一云咳而上氣肺脹其脈沈心下有水氣也要略十金

夫酒客欬者必致吐血此坐極飲過度所致也
欬家脈弦爲有水可與十棗湯下之欬而脈浮其人不
欬不食如是四十日乃已一云三十日欬而時發熱脈卒弦
者非虛也此爲胸中寒實所致也當吐之欬家其脈弦
欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐之其脈沈者不可治其
可發汗久欬數歲其脈弱者可治實大數者不可治
脈虛者必苦冒其人本有支飲不胸中故也治屬飲家
問曰夫飲有四何謂也師曰有懸飲有溢飲一云留飲有
飲有支飲問曰四飲何以爲異師曰其人素盛今瘦水
走腸間瀝瀝有聲謂之淡飲飲後水流在脇下欬唾引
痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身
體疼重謂之溢飲欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂
之支飲

留飲者脇下痛引缺盆欬嗽轉甚一云氣已
胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脈沈者有
留飲

夫心下有留飲其人背寒冷大如手

病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此
爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

病淡飲者當以溫藥和之

心下有淡飲胸脇支滿目眩甘草湯主之

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之

支飲亦喘而不能臥加短氣其脈平也

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沈緊得
之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之

脈緊本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小
半夏湯主之心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

夫有支飲家欬煩胸中窘者不卒死至一百日或一歲
可與十棗湯

膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出目泣
自出一作目眩其人振振身瞤劇必有伏飲

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多心下水停甚者
則悸微者短氣

脈雙弦者寒也皆大下後喜虛脈偏弦者飲也肺飲不
弦但喜喘短氣

病人一臂不遂時復轉移在一臂其脈沈細非風也必
有飲在上焦其脈虛者爲微勞榮衛氣不周故也久久
自瘞一云冬自瘞

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣也防己椒目葶藶大黃
丸主之

假令瘦人臍下悸吐涎沫而癲眩者水也五苓散主之
先渴卻吐爲水停心下此屬飲家半夏加茯苓湯主之
水在心心下堅築短氣惡水不欲飲飲水在肺吐涎沫欲
飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿嘔而痛水在
腎心下悸

平癰腸癰金瘡侵淫脈證第十六

脈數身無熱內有癰也一云腹無積聚有熱脈數此爲腸有癰素身無居敬本作身體
慧巧附子敗醬湯主之案句意校居敬本作身
諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發其
癰

脈微而遲必發熱弱而數爲振寒當發癰腫
脈浮而數身體無熱其形憎嘿胸中微燥不知痛之所
在此人當發癰腫

脈滑而數數則爲熱滑則爲實滑則主榮數則主衛榮
衛相逆則結爲癰熱之所過則爲膿也

師曰諸癰腫欲知有膿與無膿以手掩腫上熱者爲有
膿不熱者爲無膿也

問曰宮羽林婦病腸脈之何以知婦人腸中有膿爲下
之則愈師曰寸口脈滑而數滑則爲實數則爲熱滑則
爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上昇榮衛相干血爲濁
敗少腹痞堅小便或澀或時汗出或復惡寒屢爲已成
膿

設脈遲緊緊爲欬血下之則愈

腸癰之爲病其身體甲錯腹皮急按之濡如腫狀

腸癰者小腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自汗
出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈洪數
者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

問曰寸口脈微而澀法當亡血若汗出設不汗云何答
曰若身有瘡被刀器所傷一云血故也

侵淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者
不可治

平妊娠分別男女將產諸證第一

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證第二

平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證第三

平帶下絕產無子亡血居經證第四

平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證第五

平咽中如有炙臠喜悲熱入血室腹滿證第六

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七

平婦人病生死證第八

平小兒雜病證第九

平妊娠分明男女將產諸證第一

脈平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脈動甚者妊子也少陰心脈也心主血脈又腎名胞門子戶尺中腎脈也尺中之脈按之不絕法妊娠也左右三部脈沈浮正等按之無絕者妊娠也妊娠初時寸微小呼吸五至三而尺數也脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也

婦人妊娠四月欲知男女法左疾爲男右疾爲女俱疾爲生二子

又法得太陰脈爲男得太陽脈爲女太陰脈沈太陽脈浮

又法左手沈實爲男右手浮大爲女左右手俱沈實狠生二男左右手俱浮大狠生二女

又法尺脈左偏大爲男右偏大爲女左右俱大產二子大者如實狀

又法左右尺俱浮爲產二男不爾則女作男生左右尺俱沈爲產二女不爾則男作女生也

又法遮妊娠人面南行遥復呼之左迴首者是男右迴首者是女

肖者是女也

又法看上圊時夫從後呼之左回首是男右回首是女也

又法婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女也

婦人懷妊離經其脈浮設腹痛引腰脊爲今欲生也但離經者不病也

又法婦人欲生其脈離經半夜覺日中則生也

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證第二

婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陰脈養六月足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足少陰脈養十月足太陽脈養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰（宋版云少陰字疑衆今衆刻本四字也次十卷列手三陰手心主外別列手少陰心主爲手厥陰矣則此少陰無疑）手心主脈養即少陰月水上爲乳汁活兒養母懷妊者不可灸刺其經必墮胎

婦人懷妊三月而渴其脈反遲者欲爲水分復腹痛者必墮胎

脈浮汗出者必閉其脈數者必發癰膿（宋居敬本作癰）五月六月脈數者必向壞脈緊洛必胞濁脈滑者必胞漏而喘浮者必水壞爲腫

問曰有一婦人年二十所其脈浮數發熱師以故不與食脈復浮經水絕何也師曰法當有娠何以故不欲食脈復浮經水絕何也師曰法當有娠何以故此虛家法嘗微弱而反浮數此爲戴陽陰陽和合法當有娠到立秋熱當自去何以知然數則爲熱熱者是火火是木之子死於未未爲六月位土王火休廢陰氣生秋節氣至火氣當罷熱自除去其病即愈

師曰乳後三月來脈無所見此但是軀有兒者護之恐病利也何以故懷身陽氣內養乳中虛冷故令兒利

婦人懷妊六月七月脈弦發熱其胎踰腹（宋金匱踰腹作愈脹）痛惡寒寒著小腹如扇之狀（宋金匱著作者無之狀二字）所以然者子藏開故也當以附子湯溫其藏

婦人妊娠七月脈實大牢強者生沈細者死

婦人妊娠八月脈實大牢強弦緊者生沈細者死

婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤臟預下故也

師曰寸口脈洪而滿洪則爲氣滿則爲血氣動丹田其形即溫滿在於下胎冷若冰陽氣胎（宋脫胎字據宋本作強）活陰氣必終欲別陰陽其下必預（宋脫預字據宋本作強）假令陽終奄然若杯問曰婦人妊娠病師脈之何以知此婦人雙胎其一獨死其一獨生而爲下其死者其病即愈然後竟免軀其脈何類何以別之師曰寸口脈衛氣平調榮氣緩舒陽施陰化精盛有餘陰陽俱盛故知雙軀今少陰微緊血即凝經養不周胎則偏天小腹冷滿臍腰疼痛腰重起難此爲血痺若不早去害母失胎

師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不長欲知生死令人損之如覆杯者則男如肘頭參差起者女也冷在何面冷者爲死溫者爲生

師曰婦人有漏下者有半生後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛爲胞漏（一作胞阻）膠艾湯主

之

婦人妊娠經斷二月而得漏下下血四五日不止胎欲動在於臍下此爲案金匱此爲下有瘀痼害三字妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷二月胎也所以下血不止者其瘀不去故也當下其瘀宜桂枝茯苓丸

問曰婦人病經水斷一二月而反經來今脈反微遲何也師曰此前月中若當下利故令妨經利止月經當自下此非胞也

婦人經自斷而有胞其脈反甚恐其後必大下不成胞也

婦人懷胞七月而不可知時時腹動血而轉妨者此爲胞也腹時噦案居敬本作噫而動者非胞也

脈來近去遠故曰反以爲有胞而反斷此爲有胞其後將然其故也

婦人經月下但爲微少師脈之反言有胞其後將然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反酒漸不欲食欲頭痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不數陽多氣盛陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁瘀胞散散者損墮設復陽盛雙妊二胎今陽不足故令激經也

婦人妊娠小便難飲如故當歸貝母苦參丸主之

婦人妊娠有水氣身重小便不利洒洒惡寒起即頭眩葵子茯苓湯五之

婦人妊娠宜服當歸散即易產無疾苦

師曰有一婦人來診脈作脉自道經斷不來師言一月爲雞乳子熱者爲酸寒者多渴且當須後月復來經當人月幾日來假令以七日所來因言且須後月十日所來相問設其主復來者因脈之脈反沈而滑案袁校本滑作澁因問曾經半生者漏下亡血者定爲有胞其人言實有是宜當護之今經微剔恐復不安設言當奈何當爲合藥治之

師曰有一婦人來診自道經斷脈之師曰一月血爲閉二月若有若無三月爲血積譬如雞伏子中寒者獨今夫人熱即瘕欲令胎壽當治其母使寒懷子命不壽也譬如雞伏子試取雞一毛拔去覆子不孵中寒者獨今夫人有胞小便寒手掌反逆奈何得有胞婦人因言當奈何師曰當與溫經湯設與夫家俱來者有胞與父母家俱來者當言寒多久不作胞袁校云有脫誤師曰有一婦人來診因言陰陽俱和調陽氣長陰氣短俱案俱居敬本作但出不入去近來遠故曰反以爲有胞偏反血斷斷來幾日假令審實者因言急當治恐經復下設令宮中人若寡婦無夫曾夜夢寐交通邪氣或懷久作癥瘕急當治下服耳湯設復不愈因言墜胎而反不下此何等意邪可使且將視赤鳥一作赤鴈師曰若名爲胞桂枝下有湯字主之法六十日當有驗設有醫治逆者御一月加吐下者則絕之

葵子茯苓湯五之

婦人妊娠宜服當歸散即易產無疾苦

師曰有一婦人來診脈作自道經斷不來師言一月爲胞二月爲血三月爲居經是定作胞也或爲血積譬如

胞門其藏不瀉經絡不通名曰血分

問曰病有血分何謂也師曰經水前斷後病水名曰血分此病爲難治

問曰病有水分何謂也師曰先病水後經水斷名曰水分此病易治何以故去水其經自當下

脈濇而弱反在關濇反在巔遲在上緊在下遲則爲寒名曰渾陽濁則陰氣俱弱名曰霧緊則陰氣俱弱則中溼弱則中寒寒溼相搏名曰痺腰脊骨節苦煩肌肉爲不仁此當爲痺而反懷躯遲歸經體重以下脚爲腫按之沒指腰冷不仁此爲水懷喘則倚息小便不通緊脈爲嘔血氣無餘此爲水分榮衛乖亡此爲非躯

平產後諸病鬱冒中風發熱嘔下利證第四

問曰新產婦人有三病一者病痓（亦作痙）一者病鬱冒一者病大便難何謂也師曰新產亡血虛多汗出喜中風故令痓病痓何故鬱冒師曰亡血復汗寒多故令鬱冒鬱冒其脈微大便難師曰亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脈弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以生婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復其大便堅若嘔不能食者此爲胃熱氣實湯主之病解能食七八日而更發熱者此爲胃實承氣湯主之病解能食七八日而更發熱者此爲胃實承氣湯主之方在傷寒中

婦人產得風續之（案續之金匱作續續）數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅（案堅金匱作明）乾嘔汗出難久陽旦證續在可與陽旦方在傷寒中桂枝是也（案湯且本作酳剉去桂枝湯加黃芩治太陽中風按剉本云金匱作陽旦陽旦湯桂枝湯加黃芩治太陽中風按剉本熱者今久風而熱不已酳陽旦證仍在故云可與陽旦）

婦人產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

婦人產後腹中疠痛可與當歸羊肉湯

師曰產婦腹痛頗滿不得臥法當枳實芍藥湯主之假令不愈者此爲腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯

婦人產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便四五日脈陽脈微實再倍其人發熱日晡所頗躁者不能食譫語利之則愈宜承氣湯

婦人產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便四五日脈陽脈微實再倍其人發熱日晡所頗躁者不能食譫語利之則愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也方在傷寒中

婦人熱利重下新產虛極白頭翁加甘草湯主之（千金方加阿膠）

平帶下絕產無子亡血居經證第四

師曰婦人帶下六極之病脈浮則爲腸鳴腹滿緊則痂瘕腹中痛少陰脈浮而緊緊則痂瘕腹中痛半產而墮傷汙則亡血絕產惡寒

師曰肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者胸上有寒

婦人小腹硯（音奚磊力罪切）轉痛而復自解發作無常經反斷膀胱中結堅急痛下引陰中氣衝者久必兩脇拘急

師曰帶下有三門一門胞門二門龍門三門玉門已產屬胞門未產屬龍門未嫁女屬玉門

問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮則發熱小腹裏急痛腹滿手掌熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故會經半產瘀血在小腹中不去何以知之其三病者或見丹下驚怖得病屬帶下

師曰婦人病下利而經水反斷者何也師曰但當止利有期當庚辛爲期餘皆倣此（袁校云疑有脫誤）

問曰有一婦人年五十所病但苦背痛時時腹中痛少食多脈喜陽脈微陽尺小緊形脈不相應願知所說師曰當問病者飲食何如假令病者言我不欲飲食閉穀氣臭者病爲在上焦假令病者言我少多爲欲食不食亦可病爲在中焦假令病者言我自飲食如故病在下焦爲病屬帶下治之

婦人帶下經水不利腹滿痛經一月再見土瓜根散主之

婦人帶下脈浮惡寒漏下者不治

師曰有一婦人將一女子年十五所來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰言此女爲是夫人親女非耶若親女者當相爲說之婦人因答言自是女弟師曰所以問者無他夫人年十四時亦以經水下所以斷此爲避年勿怪後當自下（袁校云疑有脫誤）

婦人小腹冷惡寒久年少者得之此爲無子年大者得之絕產

師曰脈微弱而遲年少得此爲無子中年得此爲絕產

師曰

誤以陽脈微而濇微則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃熱濇則失液少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來此爲居經三月一來

師曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可不治

者此爲居經三月一來

問曰婦人妊娠三月師脈之言此婦人非娠今月經當下其脈何類何以別之師曰寸口脈衝浮而大榮反而弱浮大則氣强反弱則少血孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衝降榮竭陰爲精寒陽爲聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽往一作有故令少血時發洒淅咽燥汗出或渡稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故知非娠當來月經三月一來陰盛則瀉名曰居經

問曰婦人年五十所一朝而猜血二三日不止何以治之師曰此婦人前絶生經水不下今反清血此爲居經不須治當自止經水下常五日止者五日愈

婦人月經一月再來者經來其脈欲自如常而反微不利不汗出者其經二月必來袁校云或有脫誤

平巻曰五朝滿下經閉不利腹中諸病證第五

問曰婦人病經水通下而發其汗則巻冒不知人何也師曰經水下故爲裏虛而發其汗爲表復虛此爲表裏俱虛故令巻冒也

問曰婦人病如癲疾巻冒一日二十餘發師脈之反言帶下皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈滿而緊滿則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不和邪氣舍於榮衛疾起少年時經水來以合房室移時過度精感命門開經下血虛百脈皆張中極感陽動微風激成寒因虛舍榮衛治積於丹田發動上衝奔在胸脇津液掩口入涎唾湧溢出眩冒狀如厥氣衝髓裏熱氣醬名爲癲灸之因大劇

問曰婦人病苦氣上衝胸眩冒吐涎沫髀裏氣衝熱師脈之不名帶下其脈何類何以別之師曰寸口脈沈而微沈則衛氣伏微則榮氣絶陽伏則爲疹陰絶則亡血病當小便不利津液閉塞今反小便通微汗出沈緊爲寒欬逆嘔沫其肺成痿津液竭少亡血損經絡因寒爲血厥手足苦痺氣從丹田起上至胸脇沈寒怫鬱於上胸中窒塞氣感陽部面翕如醉形體似肥此乃浮虛巻反下之長鉄復重虛榮衛久發眩冒故知爲血厥也

問曰五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳津黄崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如漆此爲熱入血室無犯胃氣若上二焦必當自愈一字疑

因言夫人年幾何夫人年七七四十九經水當斷反至今不止以故致此虛也

寸口脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏脈則爲革婦人則半產漏下旋覆花湯主之

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之一云治懷妊

婦人經水不利抵當湯主之方在傷寒中一云腹中疼

婦人經水閉不利臟燥胞系了戻故不得溺也何以故師曰此人故肌一作胞

婦人經水閉不利臟燥胞系了戻故不得溺也何以故師曰此人故肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉中空感一作胞系了戻故致此病但利小便則愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也方在虛勞中

師曰脈得浮緊法當身軀疼痛設不痛者當射云何因之

平咽中如有炙臠喜悲熱人血室腹滿證第六

婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠甘草小麥湯主之

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀其人譫語此爲熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方在傷寒中

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣若上二焦必當自愈一字疑

陽明病下血而譫語此爲熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而取之

婦人小腹滿如敦敦狀妻略云滿而熱小便微難而不渴生後者此爲水與血并結在血室大黄甘遂湯主之

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七

婦人陰寒温中坐藥蛇牀子散主之

婦人著坐藥強下其經目睚爲痛足跟難以踐地心中狀如懸

問曰有一婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此病轉胞不得溺也何以故師曰此人故肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉中空感一作胞系了戻故致此病但利小便則愈宜服腎氣丸方在虛勞中

師曰脈得浮緊法當身軀疼痛設不痛者當射云何因之

平咽中如有炙臠喜悲熱人血室腹滿證第六

婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠甘草小麥湯主之

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀其人譫語此爲熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方在傷寒中

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣若上二焦必當自愈一字疑

陽明病下血而譫語此爲熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而取之

婦人小腹滿如敦敦狀妻略云滿而熱小便微難而不渴生後者此爲水與血并結在血室大黄甘遂湯主之

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七

婦人陰寒温中坐藥蛇牀子散主之

婦人著坐藥強下其經目睚爲痛足跟難以踐地心中

師曰寸口脈浮而弱浮則爲虛弱則爲無血浮則短氣弱則有熱而自汗出

趺陽脈浮而滑浮則氣滿滑則有寒喜噫吞酸其氣而下少腹則寒

少陰脈弱而微微則少血弱則生風微弱相拘陰中寒寒胃氣下泄吹而正喧

師曰胃氣下泄吹而正喧此穀氣之實也脅髮前導之

少陰脈滑而數者陰中則生瘡

少陰脈數則氣淋陰中生瘡

婦人陰中蝕瘡爛狼牙湯洗之

婦人藏腫如瓜陰中疼引腰痛者杏仁湯主之

少陰脈弦者白腸必挺核

少陰脈浮而動滑爲虛動爲痛婦人則脫下

平婦人病生死證第八

診婦人漏血下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大堅實數者死

診婦人新生乳子脈沈小滑者生實大堅弦急者死

診婦人痂瘕積聚脈弦急者生虛弱小者死

診婦人新生乳子因得熱病其脈弦小四肢溫者生寒清者死

診婦人生產因中風傷寒熱病喘鳴而肩息脈實大汙緩者生小急者死

診婦人生產之後寸口脈緊疾不調者死沈微附骨不絕者生

金瘡在陰處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者生

平小兒雜病證第九

小兒脈呼吸八至者平九至者傷十至者困診小兒脈多雀關要以三部脈爲主若緊爲風痛沈者乳不消弦急者客忤氣

小兒是其日數應變蒸之時身熱脈亂汗不出不欲食食輒吐哯者脈亂無苦也

小兒脈沈而數者骨間有熱欲以腹按冷清也

小兒大便赤青辭發洩脈小手足寒難已脈小手足溫易已

小兒病困汗出如珠著身不流者死

小兒病其頭毛皆上逆者必死耳間青脈起者瘈瘲小兒病而齒陷入其口脣乾目皮反口中出氣冷足與頭相抵臥不來身手足四肢垂其臥正直如得縛其掌中冷皆死至十日不可復治之

手檢圖二十一部袁氏云首言十二經脈次言奇經八脈次言三部二十四穌脈末見所謂手檢圖二十一部者豈經原有圖今不傳耶而宋林億剖中云世之傳授不一其別行三有以隋巢元方時行病源爲第十卷者有以第五卷分上下卷而撮諸篇之文別增篇目者今則悉去重複補其脫漏其篇第亦頗改易仍舊爲一十卷則知此卷經文傳疑已久億雖補正其脫漏而所謂手檢圖二十一部云者直據舊目無從探考耳案經文十二經止九奇經人止七又藏脈五恰合二十一部其闕而不言者則不知何故耳

經言肺者人之五藏華蓋也上以應天解理萬物主行榮氣法五行四時知五味寸口之中陰陽交會中有五部前後左右各有所主上下中央分爲九道浮沈結散知邪所在其道奈何岐伯曰脈大而長者病在下候浮直上下交通者陽脈也堅在脈大而長者病在下候浮直上下交通者陽脈也堅在腎急在肝實在肺前如外者足太陽也中央如外者足陽明也後如外者足少陽也中央直後者手太陰也前如內者足厥陰也中央如內者足少陰也後如內者足少陰也前部左右彈者陽蹻也中部左右彈者帶脈也後部左右彈者陰蹻也從少陽之厥陰者陰維也從少陰之太陽者陽維也來小時大者陽絡也來大時小者陰絡也前如外者足太陽也動苦頭項腰痛浮爲風濇爲寒熱緊爲宿食

前如外者足太陽也動苦目眩頭頸項腰背強痛也男子陰下溼女子月水不利少腹痛引命門陰中痛子藏閉浮爲風濇爲寒血滯爲勞熱緊爲宿食鍼入九分卻至六分

中央如外者足陽明也動苦頭痛面赤微滑若大便不利腸鳴不能食足脛痺

中央如外者足陽明也動苦頭痛面赤熱浮微滑苦大便不利喜氣滿滑者爲飲酒爲啘臥腸鳴不能食足脈鍼入九分卻至六分

後如外者足少陽也動苦腰背脇股肢節痛

後如外者足少陽也浮爲氣滿滿爲風血急爲轉筋弦爲勞鍼入九分卻至六分

右足三陽脈

前如內者足厥陰也動苦少腹痛月經不利子藏閉

前如內者足厥陰也動苦少腹痛與腰相連大便不利小便難莖中痛女子月水不利陰中寒子戶塞絕內少腹急氣男子痂氣兩尤上入淋也鍼入六分卻至三分

中央如內者足太陰也動苦胃中痛食不下欬唾有血足脛寒少氣身重從腰上狀如居水中

中央如內者足太陰也動苦腹滿上管有寒食不下病以飲食得之沈滿者苦身重四肢不動食不化煩滿不能臥足脛痛苦寒時欬血泄利黃鍼入六分卻至三分

後如內者足少陰也動苦少腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦少腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

前部左右彈者陽蹻也動苦腰背痛微滿爲風癘取陽蹻

前部左右彈者陽蹻也動苦腰背痛癲疾狂走不擇飲食

右足二陰脈

前部左右彈者陰蹻也動苦腹痛癲癎惡風偏枯偃仆

中部左右彈者帶脈也動苦少腹痛引命門女子月水不來絕繼復下止陰辟寒令人無子男子苦少腹拘急或失精也

後部左右彈者陰蹻也動苦癲癎寒熱皮膚強（一作痙）淫

後部左右彈者陰蹻也動苦少腹痛裏急腰及髖帶下相連陰中痛男子陰痂女子漏下不止

右陰蹻陽蹻帶脈

中央直前者手少陰也動苦心痛微堅腹腸急氣堅者爲感忤純虛者爲下利腸鳴滑者爲有娠女子陰中瘈痛痛出玉門上一分前

中央直中者手心主也動苦心痛面赤食苦嘔多喜怒寸口中脈躁竟尺關中無脈應陽干陰也動苦腰背腹痛陰中若傷足寒刺足太陽少陰直絕骨入九分灸太陽陽蹻在足外踝上三寸鍼入五分又灸太陰五分

尺中脈堅實竟關寸口無脈應陰干陽也動苦兩脛腹重少腹痛癲疾刺足太陰踝上三寸鍼入五分又灸太陽陽蹻在足外踝上三寸直絕骨是也

右手三陰脈

從少陰斜至太陽是陽維也動苦肌肉痺瘓

從少陰斜至太陽是陽維也動苦肌肉痺瘓腸鳴足痺痛酸腹滿不能食得之此腎脈也動苦少腹上三寸間也入五分此脈出魚際引甚者失音不能言癲疾直取客主人兩陽維脈在外踝絕骨下二寸

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦癲痫僵仆羊鳴羊足相踝絕骨下二寸

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦癲痫僵仆失音肌肉痺汗出惡風

脈來暫小暫大是陰絡也（一作結）動苦肉痺應時自發身洗洗也

脈來暫小暫大者是陽絡也（一作結）動苦皮膚痛下部不仁汗出而寒也（袁校云以上陽維陰維陽絡陰絡脈六條案此注語敬本無下同）

肺脈之來也如循榆葉曰平如風吹毛曰病狀如連珠者死期丙丁日禺中日中

心脈之來也如反荷葉大曰平如連珠曰病前曲後居案疑當作倨如帶鉤者死期壬癸日人定夜半

肝脈之來也搏而弱曰平如張新弓弦曰病如雞距如屋漏者死期庚辛日晡時日入

脾脈之來徒阿阿如緩曰平來如雞舉足曰病如烏之啄如水之漏者死期甲乙日平旦日出

腎脈之來也微細以長曰平來如彈石曰病去如解索者死期戊己日食時日昳黃昏雞鳴（袁校云以上平五藏脈五條）

寸口中脈躁竟尺關中無脈應陽干陰也動苦腰背腹痛陰中若傷足寒刺足太陽少陰直絕骨入九分灸太陽陽蹻在足外踝上三寸鍼入五分又灸太陰五分

寸口脈緊直至魚際下小按之如持繩干（一作雖）毛狀其病從少陰斜至太陽是陽維也動苦癲痫僵仆羊鳴羊足相踝絕骨下二寸

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦癲痫僵仆失音肌肉痺瘓汗出惡風

初持寸口中脈如細堅狀久按之大而深動苦心下有寒胸脇苦痛陰中痛不欲近丈夫也此陰逆刺期門入六分又刺胃俞入五分可灸胃管七壯

初持寸口中脈如躁狀洪大久按之細而牢堅動苦腰腹相引痛以下至足脛重也不能食刺腎俞入四分至五分亦可灸胃管七壯

尺寸俱沈但有關上脈苦寒心下痛
尺寸俱沈關上無有者苦心下喘
尺寸俱數有熱俱遲有寒
尺寸俱微厥血氣不足其人少氣
尺寸俱滿弱發熱惡寒出汗一云內虛熱手足逆冷汗出
寸口沈胸中痛引背一云短氣
關上沈心痛上吞酸
尺中沈引背痛
寸口伏胸中有逆氣
關上伏有水氣泄瀉
尺中伏水數不消
寸口弦胸中拘急一作心下偏偏
關上弦胃中有寒心下拘急
尺中弦少腹臍下拘急
寸口緊頭痛逆氣
尺中遲下焦有寒背痛
寸口滿陽弱自汗出
關上滿下重
尺中滿少血發熱惡寒
寸弱陽氣少
關弱無胃氣
尺弱少血袁校云以上參吉三部二十四種脈

關上數胃中有熱
尺中數惡寒小便赤黃
寸口實即生熱虛即生寒
關上實即痛虛即脹滿
尺中實即小便難少腹牢痛虛即閉
寸口扎吐血微扎鮮血
關上扎胃中虛
尺中芤下血微扎小便血
寸口浮其人中風發熱頭痛
關上浮腹痛心下滿
尺中浮小便難
寸口遲上焦有寒
關上遲胃有寒
尺中遲下焦有寒背痛
寸口滿陽弱自汗出
關上滿下重
尺中滿少血發熱惡寒
寸弱陽氣少
關弱無胃氣
尺弱少血袁校云以上參吉三部二十四種脈

尺中滑下利少氣
寸口數即吐

關上滑中實逆
尺中滑無陰寒冷
寸口微無陽外寒
關上微中實一作能食故裹急一作無胃氣
尺中微無陰寒腹中拘急
寸口滑胸滿逆
關上滑無陰寒冷
尺中滑無血寒冷

脈訣

劉完素撰

江陰朱氏校刊本

金 河間劉完素著

人身之脈　本乎榮衛　榮者陰血　衛者陽氣　榮行脈中　衛行脈外　脈不自行　隨氣而至　氣動脈應　陰陽之義　氣如橐籥　血如波瀾　血脈氣息　上下循環　十二經中　皆有動脈　手太陰經　可得前息　此經屬肺　上系咽嗌　脈之大會　息之出入　初持脈時　令仰其掌　掌後高骨　是謂關上　關前爲陽　關後爲陰　陽寸陰尺　先後推尋　寸關與尺　兩手各有　揣得高骨　上下左右　男女脈同　惟尺則異　陽弱陰盛　反此病至　調停自氣　呼吸定息　四至五至　平和之則　三至名遲　遲則爲冷　六至爲數　數卽熱證　轉遲轉冷　轉數轉熱

在人消息　在人差別　卽辨浮沉　浮表沉裏　浮數表熱　遲數裏熱　沉遲冷結　察其六部　一部兩經　一臟一腑　合於小腸　關爲肝膽　右寸主肺　大腸同條　尺命三焦　不特臟腑　上下中央　三部分齊　關候膈下　尺候於臍　左脈候左　右脈候右　不病者否　浮沉遲數　外因於天　內緣於人　風雨晦明　人喜怒憂　外因之浮　則爲表證　數則熱盛　內因浮脈　沉氣遲冷　數躁何疑　風氣冷燥　辨內外因　浮沉之脈　亦有當然　沉屬腎肝　脾者中州　肺重三菽　皮毛相得　得之血脈　脾九菽重　肝與筋平　重十二菽　獨沉之極　按之至骨　脈理浩繁　總括於四　專衍其義　析而言之　又有九道　其名乃備

是名扎脈　有力爲洪　沉而有力　其脈爲實　伏則沉極　脈遲有力　無力緩濇　漫同一例　脈名爲緊　小緊爲弦　合則爲四　離爲七八　神授之訣　舉之有餘　泛泛浮浮　如水漂木　絕類蒸蒸　指下成窟　消脈如珠　往來轉旋　實　則然　弦如張弦　洪較之浮　大而力健　微渺難尋　舉無按有　似遲不遲　是謂之緩　濇難而短　遲則極緩　濡則軟軟　弱則忽忽　又知八裏　九道之形　請家九道　互有去取　可以相有　過於本位　短則不及　來去乖張　其虛可知　促結俱止　代止不然　止難回之　當審毫釐　牢比弦緊　動則動搖　厥厥不定　小而有力　弦大虛扎　渙漫不收　其脈爲散　脈最易見　卽脈求病　病無不明

病參之脈　可決死生　然有應病
有不相應　此最宜詳　不可執定
人安脈病　是曰行尸　人病脈和
可保無危　中風脈浮　滑兼痰氣
其或沉滑　勿以風治　或浮或沉
而微而虛　扶危降痰　風未可疎
寒中太陽　浮緊而澁　及傷而變
名狀難悉　陽明則長　少陽則弦
太陰入裏　遲沉必兼　及入少陰
其脈迷緊　脈陰熱深　脈伏脈冷
在陽當汗　次利小便　表解裏病
其脈實堅　此其大略　治法之正
至於大法　自有仲景　傷寒有五
脈非一端　陰陽俱盛　緊濇者寒
陽浮而滑　陰濇而弱　此名中風
勿用寒藥　陽濇而弱　陰小而急
此非風寒　乃濕溫病　陰陽俱盛
病熟之極　浮之而滑　沉之散濇
惟有溫病　脈散諸經　各隨所在
不可指名　暑傷於氣　所以脈虛
弦細乳遲　體狀無餘　或濇或細
或濇或緩　是皆中濕　可得而斷
痛脈自弦　弦遲多寒　弦數多熱
隨時變遷　風寒濕氣　合而爲痺
浮濇而緊　三脈乃備　脚氣之脈
其狀有四　浮弦爲風　濇弱濕氣
遲濇因寒　洪數熱鬱　風汗濕溫

熱下寒熨　腹痛之脈　皆沉而弦
兼浮者風　兼緊者寒　濇細則濕
實則閃肭　指下既明　治斯不惑
尺脈虛弱　緩濇而緊　病爲足痛
或是痰病　濇則無血　脈寒爲甚
尺微無陰　下痢逆冷　熱厥脈伏
時或而數　便秘必難　治不可錯
疝脈弦急　積聚在裏　少陽則弦
弱急者死　沉遲浮濇　牢急者生
痛甚則伏　或細或動　疝痕寒痛
氣薄生涎　下虛上實　風寒暑濕
風浮寒緊　濕細暑虛　皆量而施
虛脈則無　治時量法　涎弦而滑
先理痰氣　次隨證治　代者雀亂
代者雀亂　徵滑者生　尤當審詳
偏弦爲飲　或沉弦滑　浮風緊寒
痰飲中節　款啟所因　右關濇者
數熱細濕　房勞濇難　疲極肝衰
飲食傷脾　左關弦短　五臟之咳
浮短肺傷　法當救以　沉數實熱
各視本部　浮緊虛寒　形盛脈細
洪滑多痰　弦濇少血　皆是死脈
不足以息　沉少伏匿　外證內脈
惟有浮大　而數者生　便知是氣
參考秤停　下手脈沉　其或沉滑
沉極則伏　濇弱難治　氣兼痰飲
氣兼痰飲　沉弦細勁　皆氣痛證

心痛在寸　腹痛在關　下部在尺
脈象顯然　心中驚悸　脈必代結
飲食之悸　沉伏動滑　顛癇之脈
浮洪大長　滑大堅疾　痰蓄心狂
乍大乍小　乍長乍短　此皆邪脈
神志昏亂　汗脈浮虛　或濇或濡
歌散洪大　渴飲無餘　遺精白濁
當驗於尺　結乳動緊　二證之的
鼻頭色黃　小便必難　脈浮弦濇
爲不小便　便血則乳　數則赤黃
實脈癰閉　熱在膀胱　諸證失血
皆見乳脈　隨其上下　以驗所出
大凡失血　脈貴沉細　設見浮大
後必難治　水腫之證　有陰有陽
察脈觀色　問證須詳　陰脈沉遲
其色青白　不渴而瀉　小便清澈
脈或沉數　色赤而黃　燥屎赤溺
兼渴爲陽　脈滿脈弦　脾制於肝
洪數熱脈　遲弱陰寒　浮爲虛滿
緊則中實　浮則可治　虛則危急
胃痞脈滑　爲有痰結　弦伏亦痞
濇則氣劣　肝積肥氣　弦細青色
心爲伏梁　沉乳色赤　浮濇痞氣
浮大而長　其色脾土　中央之黃
肺積息賁　浮毛色白　奔脈爲腎
沉急面黑　五臟爲積　六腑爲聚
積在本位　聚無定處　駛緊浮牢

小而沉實　或結或伏　爲聚爲積
實强者生　沉小者死　生死之別
病同脈異　氣口緊盛　爲傷於食
食不消化　浮滑而疾　滑而不勻
必是吐瀉　霍亂之候　脈代勿訝
夏日泄瀉　脈應暑濕　洪而數溲
脈必虛極　治暑濕瀉　分其小便
虛脫固腸　罔或不痊　無積不痢
脈宜滑大　浮弦急死　沉細無害
五疸寔熱　脈必洪數　如或微濇
證其虛弱　骨蒸勞熱　脈數而虛
熱而濇小　必損其軀　如汗加咳
非藥可除　頭痛陽弦　浮風緊寒
風熱洪數　濕細而堅　氣虛頭痛
雖弦必濇　痰厥則滑　腎厥堅寔
癰疽浮數　惡寒發熱　若有痛處
癰疽所發　脈數發熱　而疼者陽
不數不熱　不疼陰瘡　發癰之脈
弦洪相搏　細沉而澁　肺肝俱數
寸數而寔　肺癰已成　寸數虛濇
肺癰之形　肺癰色白　脈宜短濇
死者浮大　不白而赤　腸癰難知
澁數可推　數而不熱　腸癰何疑
遲緊未膿　下以平之　洪數膿成
不下爲宜　陰搏於下　陽別於上
血氣如調　有子之象　手之少陰
其脈動甚　尺按不絕　此爲有孕

少陰屬心　心主血脈　皆爲肺門
脈應於尺　或寸脈微　關滑尺數
往來流利　如雀之啄　或診三部
浮沉一止　或平而虛　當問月水
男女之別　以左右取　左疾爲男
右疾爲女　沉是在左　浮大在右
右女左男　可以預剖　離經六至
沉細而滑　陣痛連腰　胎卽時脫
血瘕弦急　而大者生　虛小弱者
卽見死形　半產漏下　革脈主之
弱卽血耗　立見傾危　診小兒脈
浮沉爲先　浮表沉裏　便知其源
大小滑濇　虛寔遲駛　容依脈形
以審證治　大凡婦人　及夫嬰稚
病同丈夫　脈卽同例　惟有婦人
胎產血氣　小兒亰指　變蒸等類
各有方法　與丈夫異　要知婦孺
貴識證形　問始之詳　脈難盡憑
望聞問切　神聖工巧　愚者昧昧
明者了了　病脈診法　大略如斯
若乃持脈　猶所當知　謂如春弦
夏名鉤脈　秋則爲毛　冬則爲石
寔强大過　病見於外　虛微不及
病決在內　四脈各異　四時各論
皆以胃氣　而爲之本　胃氣者何
脈之中和　過與不及　皆是偏頗
春王肝木　夏主心火　脾土乘旺

脈訣

則在長夏　秋主肺金　冬主腎水
五臟脈象　與五運配　肝脈弦長
脈脈毫毳　指下尋之　如循榆葉
益堅而滑　如循長竿　是謂太過
受病於肝　急如張弦　又如循刀
如按琴瑟　肝死之應　浮大如散
心和且安　累七如環　如循環玕
病則益數　如雞舉足　死操帶鉤
後踈前曲　浮濇而短　蕩七如蓋
此肺之平　按之益大　病如循羽
不下不上　死則消索　吹毛飄七
沉濡而滑　腎乎則若　上大下銳
滑如雀啄　腎之病脈　啄啄連屬
連屬之中　然而微曲　來如解索
去如彈石　巳死之腎　在人脊識
脾者中州　平和不見　然亦可察
中大而緩　來如雀啄　如滴漏水
脾臟之衰　脈乃見此　如漏水
脩長侏儒　胞沉瘦浮　又有肥瘦
各分診法　不可一途　短促長疏
難窮者理　得之於心　難盡者意
勉旃小子　日誦琅琅　應之於指
箋證可忘　造道之玄

脈訣刊誤

附錄

戴啓宗撰

四庫全書提要

脈訣刊誤二卷附錄二卷元戴啓宗撰啓宗字同父金陵人官祕興路儒學教授考隋書經籍志戴王叔和脈經十卷唐志並同而無所謂脈訣者呂復華經古方論曰脈訣一書乃六朝高陽生所撰託以叔和之名譌立七表八裏九道之目以惑學者通眞子劉元賓爲之注且增歌括附其後詞既鄙俚意亦滋晦其說良是然以高陽生爲六朝人則不應隋志唐志皆不著錄是亦考之未審文獻通考以爲熙寧以前人僞託得其實矣其書自宋以來頗爲諸家所攻駁然泛言大略未及一一核正其失且淺俚易誦故俗醫仍相傳習啓宗是書乃考證舊文句句爲排原書僞妄殆抉摘無遺於脈學殊爲有裨明嘉靖間郡門汪機刊之又以諸家脈書要語類爲一卷及所撰婚世醫脈論一卷並附錄於後以其說足相發明仍並載之資參考焉

脈訣刊誤序

世所傳脈訣辭最鄙淺非叔和之本書也當叔和時來有歌括此蓋後人特假其名以取重於世耳撫爲韻誦取便講習人人皆知口熟脈訣以爲能而不復究其經之爲俚也元季同父戴君深以爲病因集諸家之論正於歌括之下名曰脈訣刊誤鄉先正風林朱先生爲節抄之予始即是言於歙之醫家彼視爲祕典不輕以示人予備重貲不遠百里往拜其門手錄以歸然而傳寫既久未免脫誤予於是補其缺而正其訛又取諸家脈要語及予所撰矯世惑脈論附錄于後以擴刊誤未盡之旨誠診家之至要也將欲祕之以爲己有則有孤作者之盛心欲梓之以廣其傳則又乏貲以供所費藏之巾篋蓋亦有年吾徒許忠因質之休寧師魯程先生先生轉語其姻鄂吳君子用刻之以垂久遠且使是書不致於湮沒也自今而後學者得見是書而用其心則歌括之謬一齊可見矣嗟使天下後世舉得以由乎正道而不惑於曲學未必不由是書之刻也吳君之心之德何其盛歟視彼建琳宮塑佛像費用於無益者其相去殆萬矣是知吳君之心即仁者之心也傳曰仁者壽又曰仁者必有後豈欺我哉必有驗於茲矣

明汪機

脈訣刊誤卷上

元　戴啓宗撰

六朝高陽生撰輔晉太醫令王叔和。撮其切要。撰爲脈訣。蔡西山稱之詳矣。世相因。人相授。咸曰王叔和脈訣。既不能正其名。又不能辨其非。說承惑固。是以罔覺今刊其誤。題曰脈訣。不以王叔和加其首者。先正其名也。竊取靈素內經。秦越人。張仲景。華佗。王叔和。及歷代名醫之書以證。又述諸家所解。集長捨短。知我者其惟脈訣乎。罪我者其惟脈訣乎。

診候入式歌

左心小腸肝膽腎。右肺大腸脾胃(命)終於足厥陰。一晝夜五十周。朝於寸口。會於平旦。內經診以平旦。十二經動脈猶衆緒端。始於手太陰。十二經動脈。皆可診於寸口。上古診法有三。其一。各於十二經動脈見處。分爲三部。天。地。人。以候各臟腑。其二。以寸口與人迎。獨取寸口。寸口者。卽手太陰之經渠穴也。上古診法有三。其一。各於十二經動脈見處。分爲三部。天。地。人。以候各臟腑。其二。以寸口與人迎。獨取寸口。以爲寸口。臟腑之位。脈訣述之有差。脈經兩尺並屬腎。與膀胱。肝。逆而至太陽寒水。外應十一月。內應於左尺腎與膀胱。接右手。脘應九月。居右寸。逆至太陰土爲脾。應右關。又逆至手厥陰與三焦。以最考之。此乃地六氣之步位。故歌首于春初之氣。亦始厥陰風木君火不任令。退居二氣。而少陽相火當夏爲三之氣。四氣太陰。五氣陽明。六氣太陽。乃取地之六氣。依四時而至。難以言寸口三部之位。且六節氣位。乃地理之應也。經曰。閻明之右。君火之位。君火之右。退行一步。相火治之。復行一步。土氣治之。維始以君火。亦順次而行。未嘗逆。楊仁齋以右尺。其經手厥陰。其藏心包絡。其府三焦。其名命脈。決非右腎之命門。以愚考之。十二經脈。自上古立名。今不悟脈歌非王叔和之本經。又立命脈。以附和之。且本于內經尺內以候腎。原不曾分左右。是合左右之尺。皆以候腎。亦無所謂命脈矣。仁齋直指于醫方發明甚高。惜乎于此未明。

[女人反此背看之)男女脈形尺(脈)位。俱三同(斷)胥病。

歌首二句。只言部位未論脈。女人反此背看云者。原其慈于男左腎右命門。女右腎左命門。故言反此。又繼之曰尺脈第三同斷病。則反此背看者。只論尺脈耳。男女有異同者。脈形耳。如男脈偏上盛。女脈偏下盛。男左大右小爲順。女右大左小爲順。男女脈位卽無異同也。以十二經脈所行之終始。五藏之定位成形。則一也。惟竅戶及胞門子戶。精血之不同爾。安可言脈位。女人與男人反而背看乎。脈訣之誤。因于腎與命門有男女之別。不知腎有兩。其左爲腎。右爲命門。難經雖有左右之別。亦無男女左右之分。其實皆腎藏非命門也。至褚氏遺書。則又以女人心胞自尺始。倒裝五藏。則謬又益焉。或曰前

政北政三陰司天在泉而尺寸亦或易位褚氏之論或原此乎曰不然也司天在泉以天之六步爲客脈也故隨南北政以分尺寸之不應耳其地之六部爲主脈即隨候以見而不移也心肺在上肝腎在下脾脈在中自三才分而爲人亘古今何異無求子曰所謂反者男子尺脈常弱今反盛女子尺脈常盛今反弱故謂之反耳李晞范因之雖於反字幾明不洞於兼論然反盛反弱乃男女之病脈今入式歌方言部位而遽以病脈兼解似非本旨特作歌者不善行文故以反此背看傳惑於世耳今刊而改之如上

心與小腸居左寸肝膽同居左關定腎居尺脈亦如之用意調和蕃安靜肺與大腸居右寸脾胃脈從關裏認命門還與腎脈同用心俘細須尋趁

此脈訣重分左右寸關尺部所出也其曰命門還與腎脈同以此句觀之命門即腎也既知其非動脈前何必以命門爲藏而別部邪察病指南以右手尺爲命門卻又曰一名手心主包絡則又差以命門爲心主也心爲藏小腸爲府以府配藏者實以手少陰心經與手太陽小腸經二經脈相接故同一部其餘藏府同部者同然藏府之脈實以浮沈之位別之府陽也故因浮而見藏陰也故因沈而見然以難經一脈十變推之如云心急甚者肝邪干心心微急者膽邪干小腸是又以本藏之脈徵甚別藏府也察病指南以七難六氣褚甲子旺脈分六府者非也陽明脈浮大而短安得爲胃脈形也浮大而短明燥金脈也

〔若診他脈覆手者要自看時仰手驗〕診脈皆須仰手看診因不應

古人診病必仰病人手而診醫者覆其手以三部九候菽重之法取之惟反其診者不然蓋南北二政之說三陰司天在泉尺寸或有不應者反其診則應矣不應者脈沈不應診也覆病人手診之則脈見也沈者爲浮細者爲大捨此之外無覆手之診

升按脈訣之言副診他則覆手自診則仰手取手便而已刊誤蓋誤認歌意以醫之覆手診人爲覆病人之手也自此以後有似此者節去之而不辨

三部須教指下明

難經曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大要會也從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺中一寸陽得寸內九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也　蔡氏曰手太陰之脈自腕中橫紋至魚際橫紋得同身之一尺一寸自腕中橫紋前盡一尺爲陰之位自魚際後一寸爲陽之位太陰動脈前不及魚際橫紋一分後不及腕中橫紋九寸故古人于寸內取九分尺內取一寸寬契陽九陰十自然之數尺寸之間謂之關關者陰陽之限也　素氏曰請家論脈部位或曰尺寸或曰四尺或曰三寸爲三部通論其不同者何也素問言脈之部位止言尺寸未言關也至扁鵲假設關位而寓于尺寸之交以爲三部也其實只有尺寸而已逮仲景本論王叔和言脈之部位或以尺寸通論某藏某府受病者是假言諸藏府之脈各出之意也乃合扁鵲之說矣今究仲景叔和既宗黃帝說豈黃帝言只有尺寸者約度之義扁鵲言三部者亦約度之義仲景叔和所以兼取並用非疑而兩存之也　千金載黃帝問三部脈豈思邈假托耳　通眞子曰素問三部九候論所述三部言身之上中下部非關寸關尺也

九候了然心通印

素問曰人有三部部有九候乃各于動脈現處候之分九候今脈決所說以寸關尺三部兼三部內中有浮中沈三候浮以候府中以候胃氣沈以候藏通一手三部爲九候也

大腸（共）俠肺爲傳送

素問曰大腸者傳導之官變化出焉肺者相傳之官治節出焉傳送者大腸之職非與肺共也大腸以肺爲藏俠送腸副而已

〔心與小腸爲受盛〕小腸受盛與心腸

素問曰小腸者受盛之官化物出焉小腸配心藏與之相應非心與小腸同受盛也

脾胃相通五穀消

素問曰脾與胃以膜相連爾胃受五穀脾氣膜而消之

膀胱腎合〔爲津液〕通調

腎之所攝者精胞之所藏者溺精溺之液同爲一徑資而出若曰津液府胃有津液非腎膀胱所專主也

三焦〔無狀〕狀貌空有名〔寄〕分在胸〔中〕腹爲相應

此段皆以藏府配合爲歌至三焦卻不以命門爲配其以三焦附于尺診歟且心主與三焦爲表裏心本脈歷絡三焦手少陽脈徧歷三焦其治各有所上焦如霧中焦如漚下焦如瀆各有法象不偏在下府胃有津液非腎膀胱所專主也

三焦〔無狀〕狀貌空有名〔寄〕分在胸〔中〕腹爲相應

此段皆以藏府配合爲歌至三焦卻不以命門爲配其以三焦附于尺診歟且心主與三焦爲表裏心本脈歷絡三焦手少陽脈徧歷三焦其治各有所上焦如霧中焦如漚下焦如瀆各有法象不偏在下安可診于尺也且難經曰上部法天主胸以上至頭之有疾即上焦之部中下部卻中下焦分診甚明矣三因方之好異也云三焦有形如脂膜附于兩腎夾脊若果如此則內經難經言之矣其經脈又何徧歷絡之云乎

肝膽同爲津液〔府〕居〔能〕上通眼目爲清淨

素問曰膀胱者州都之官津液藏焉則津液府施于膀胱爲當以爲肝膽則非又肝藏膽府今云同爲府腑又害意今改之同爲津液居乃言肝膽之津液耳五藏各有液肝之液泣其候目五府皆有出入肝膽無出入其膽之精氣則因肝之餘氣溢入于膽故藏在肝知葉間相並而居內藏精汁三合其汁清淨經曰膽者清淨之府肝藏血開竅于目目受血而能視故上通眼人年老目昏者血衰肝葉薄膽

智者能調五藏和自然察認諸家病。

素問曰。常以不病調病人。醫不病。故爲病人平息以調之爲法。陳氏曰。凡欲診脈先調自氣息。脈。氣病人息以候其遲數。過與不及。所謂以我醫彼。莫之敢違。

掌後高骨號爲關。骨下關脈形宛然。以次推排〔名〕分尺〔澤〕寸三部還須仔細看。

尺澤者手太陰之合穴。在肘中約紋上。其取一寸九分之法。上始魚際太淵下絡尺澤一尺一寸。於尺取一寸。於寸取九分。爲三部之位。通眞子云。三部寸口在上。關脈在中。尺澤在下。尺澤者。尺脈一寸之外。餘脈所不出不見。如入深澤而穴。故曰尺澤。安可以穴名而言尺部。今改之。撫來子。於三部。神部以浮中沈及四旁分爲七候。先浮按消息之。次重按消息之。次上鑒消息之。次下鑒消息之。次推指外消息之。次推指內消息之。撫求子合經中諸法。以爲定法也。凡診平人之脈常以平旦。

凡診病脈。則不以盡夜至晨子午決也。

關前爲陽名寸口。關後爲陰。直下取。陽弦頭痛定無疑。陰弦腹痛何方走。陽數〔卽吐〕爲血兼〔頭痛〕吐血。

難經曰。數則爲熱。脈經曰。陽數則吐血。

陰微卽寫腑中吼。陽實應知面熱風。陰微盜汗勞兼有。陽實大滑應舌強。陰數〔脾熱并口臭〕。脾下熱久。

脈經云。尺脈數惡溲瞬下熱痛。尺主下部。今云脾熱口臭。脾在中州。非尺所係。

陽微浮動定心寒。陰滑〔食注脾家咎〕。經脈不調候。當診于關上。

脈經曰。尺脈滑。血氣實。婦人經脈不利。及尿血。食注脾家咎當診于關上。

陰微不能吸。今脈訣所述。或遵或違何也。潔古曰。陽弦下利。陽實大滑應舌強。陰數吐血。陰微下利。

乃脈之浮沈也。經曰。浮爲表。沈爲裏。非止寸口獨浮。尺獨沈。尺寸俱有浮沈。今按潔古論浮沈表裏則是而以論此段陰陽則非。蓋脈經脈訣皆以關前陽關後陰啓之。中論脈證。後又以關前陽後陰啓之。

結之安可以浮沈論。

一息四至號平和。更加一至太無疴。

素問曰。人一呼脈再動。一吸脈再動。呼吸定息。脈五動。閏以太息。命曰平人。難經曰。脈來一呼再至。不大不小。曰平。二經之言不同何也。蓋難經因論損至之脈。而概舉也。故於至脈。則云一呼再至。曰平。不言一吸者舉一便反三隅也。及後再舉。則兼呼吸。總論。不大不小者。息數調勻也。然不若內經理備言詳。其曰閏以太息者。閏在氣盛脫虛之間。太息在呼吸之間。猶歲之閏。非一呼一吸之外再有呼吸也。太息者呼吸定息在呼吸之間。脈因而又一動。以成五動之數。亦如呼出心與肺。吸入腎與肝。而脾受穀氣于中。右呼出吸入之間也。

三逆二敗冷危困。六數七極熱生多。八脫九死十歸墓。十一十二絕魂逝。

〔三至爲逆一二敗〕一息一至者。兩息一至。死非怪。

逆敗前已言矣。今重出。況下文兩息一至正論損。損有四等。今改之以舉其凡例。十四難曰。何謂損。一呼一至曰難經。二呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。損脈從下上。自一呼一至。而至四呼一至也。然難經奪精則必死矣。何待三呼四呼一至。故脈決兩息一至卽言死。仲景曰。脈有四損三日死。平人四息。病人脈一至也。五損一日死。平人五息。病人脈一至也。此仲景于四損之上。又增五損六損。爲一日一時死期。

逆冷數熱古今同。難經越度分明載。

難經曰。數則爲熱。逆則爲冷。越度者秦越人之法度也。

熱〔卽〕極生風熱精之多則風生。冷不能生氣。冷積之多則勫氣。然冷熱。亦能動血而爲病。不可專泥也。

冷〔生〕勫氣用心指下丁寧記。

熱豈能生風。熱精之多則風生。冷不能生氣。冷積之多則勫氣。然冷熱。亦能動血而爲病。不可專泥也。

春弦反〔洪〕鉤秋似毛多石依經分節氣。

素問曰。春脈如弦。其氣來耎弱輕虛以滑。端直以長。故曰弦。夏脈如鉤。其氣來盛去衰。故曰鉤。秋脈如浮。其氣來輕虛以浮。來急去散。多脈如營。其氣來沈以搏。故曰營。難經曰。春弦。脈來根根前前。如循榆莢。信依素問作脈來微弱前後相招。如按長竿末稍。曰平。夏實而滑。如循長竿。曰病。急而勁益強。如新弓弦。曰死。夏鉤。脈來數數如瑵。如循琅玕。曰平。來盛數如雞舉足。曰病。前曲後居。如操帶鉤。曰死。秋毛。脈來薶薶。如車蓋。按之益大。信依素問作脈來虛前後相招。如落榆莢。曰平。不上不下。如循雞羽。曰病。按之消索。如風吹毛。曰死。冬石。脈來上大下銳。如雀之啄。曰平。啄啄連屬。其中微曲。曰病。來如解索。去如彈石。曰死。　今按四時之脈。皆取法象本乎難經。夏脈不當改作洪。

阿阿緩者春楊柳。此是脾家居四季。

四時之脈。土旺十八日。此脾土之本位。然而四時之候。四藏之脈。皆以脾土胃氣爲本。難經曰。脾者中州。其平和不可得見。衰乃見爾。來如雀之啄。如水之漏下。是脾家之衰見也。脈經曰。六月季夏。建未坤之間。土之位。脾旺之時。其脈大。阿阿而緩。名曰平脈。今脈訣增春楊柳以爲法象。蔡氏曰。凡脈不大不細。不長不短。不浮不沈。不滑不澀。應手沖和。意思欣欣。難以名狀者。爲胃氣。亦可謂善於形容者矣。

今按難經所言。四時之平脈者。有胃氣之脈也。病脈者。四時脈多而胃氣少者是。死脈者。但有四時脈而無胃氣者也。如此則胃氣之脈。隨四時而寓於當時之脈之中。爲平脈也。不可得而見。亦不可得而形容。其曰阿阿而緩者。專以四季十八日中所診而見者言之耳。

在意專心察細微。靈機曉解通玄記。

浮乳滑實弦緊洪。〔七表〕脈。還應是本宗。微沈緩濇遲并伏。濡弱相雖〔八裏〕脈同。

脈不可以表裏定名也。推浮沈二脈。可以表裏論。芮岐越人仲景叔和皆不言表裏。脈經王氏所作。無

七表八裏九道之名。今脈訣託叔和之名。其論脈御悖於脈經。自六朝以來。以七表八裏九道爲世大惑。未有言其非者。王寇著圖微論。謂脈訣論表不及裏。於表裏則不言其非。一周與十分身之八。其始入于陰。當從足少陰注于腎。腎注于肺。肺注于心。心注于脾。脾復注于肝。肝注于腎。爲周。是故夜行一次。人氣行于陰藏一周。與十分藏之八。亦如陽行之二十五周。而復會于目。故爲一周。是故日行一舍。人氣行于陽二十五度。而後大會于平旦者。營衛息數同也。其始從中焦注手太陰。陽明。陽明注足陽明。太陰。太陰注手少陰。少陰注手心主。少陽。少陽厥陰。厥陰復注手太陰。此經脈行度終始也。與衛氣之行則各異。

三因方云。血爲脈。氣爲息。一呼一吸。一定息。脈行六寸。二百七十息。行盡十六丈二尺者。血之脈也。氣之息遲于脈。八息三分三釐三毫方行一寸。一萬三千五百息。方行盡十六丈一尺。今按經云。氣稍于胃。以通營衛。各行其道。宗氣流于海。下者。注氣街。上者走息道。如此則營衛各道。如上文雖無所言。營者水穀之精氣。出于中焦。變化爲赤。入于脈。與息數呼吸應。衛者水穀之悍氣。出于上焦。行于脈外。溫分肉。充皮膚。司開闔。不與脈同行。不與營同道。不與息數同應。營衛也。其異如此。然而行于身也。晝夜五十周。則營與衛一也。三因以血爲脈。指營言。以氣爲息。指衛言。而謂腎血之脈行于晝夜五十周。衛氣之息晝夜一周。不知何據。而與古經如此其異也。又按難經曰。營氣之行。常與衛氣相隨上下。衛由息而動。巢元方謂氣行則血行。氣住則血住。皆疑其傳誤。王冰謂剌絡通營衛。不當兼言衛在絡之間也。

心藏歌一

心藏身之(精)君。小腸爲(弟兄)盛。

心者。君主之官。一身之主宰也。經曰。主明則下安。曰身之精。不見心爲尊矣。精經曰。兩神相搏。合而成形。常先身生。是謂精。非心之專主也。有五藏六府之精。經曰。腎受而藏之。腎爲精之處。非心之所主也。心藏。小腸府。大言陰與陽。小言夫與婦。不可以兄弟言。

心藏歌二

離隨夏旺。屬火向南(生)明。
物無纖巨。多謀最有靈。內行于血海。

大指之間。入寸中。其至于足也。入足心。出踝下行陰分。復合于目。故爲一周。與十分身之八。其始入于陰。當從足少陰注于腎。腎注于肺。肺注于心。心注于脾。脾復注于肝。肝注于腎。爲周。是故夜行一次。人氣行于陰藏一周。與十分藏之八。亦如陽行之二十五周。而復會于目。故爲一周。是故日行一舍。人氣行于陽二十五度。而後大會于平旦者。營衛息數同也。其始從中焦注手太陰。陽明。陽明注足陽明。太陰。太陰注手少陰。少陰注手心主。少陽。少陽厥陰。厥陰復注手太陰。此經脈行度終始也。與衛氣之行則各異。

三因方云。血爲脈。氣爲息。一呼一吸。一定息。脈行六寸。二百七十息。行盡十六丈二尺者。血之脈也。氣之息遲于脈。八息三分三釐三毫方行一寸。一萬三千五百息。方行盡十六丈一尺。今按經云。氣稍于胃。以通營衛。各行其道。宗氣流于海。下者。注氣街。上者走息道。如此則營衛各道。如上文雖無所言。營者水穀之精氣。出于中焦。變化爲赤。入于脈。與息數呼吸應。衛者水穀之悍氣。出于上焦。行于脈外。溫分肉。充皮膚。司開闔。不與脈同行。不與營同道。不與息數同應。營衛也。其異如此。然而行于身也。晝夜五十周。則營與衛一也。三因以血爲脈。指營言。以氣爲息。指衛言。而謂腎血之脈行于晝夜五十周。衛氣之息晝夜一周。不知何據。而與古經如此其異也。又按難經曰。營氣之行。常與衛氣相隨上下。衛由息而動。巢元方謂氣行則血行。氣住則血住。皆疑其傳誤。王冰謂剌絡通營衛。不當兼言衛在絡之間也。

心藏歌一

心藏身之(精)君。小腸爲(弟兄)盛。

心者。君主之官。一身之主宰也。經曰。主明則下安。曰身之精。不見心爲尊矣。精經曰。兩神相搏。合而成形。常先身生。是謂精。非心之專主也。有五藏六府之精。經曰。腎受而藏之。腎爲精之處。非心之所主也。心藏。小腸府。大言陰與陽。小言夫與婦。不可以兄弟言。

心藏歌二

離隨夏旺。屬火向南(生)明。
物無纖巨。多謀最有靈。內行于血海。

衝脈爲十二經之海。運樞曰。血海者衝脈也。又手太陽少陰二經爲表裏。心主血上爲乳汁。下爲月水。經曰。二陽之病發心脾。女子不月。心厥云。內行血海。以此率喻范以肝爲血海。而率合之。非也。

素問曰。五氣所病。脾爲吞。又曰。刺中脾。十日死。其動如吞。李瑡范曰。連吞者。所以形容緊數之脈狀。乖于內經。失脈訣意。

實夢歌。歡樂。虛爭飲食分。濕多成五泄。腸〔走〕噁。若雷鳴。痞氣多爲積。皮黃四體昏。二斤十四兩三斗五升存。

脾藏歌二

三部俱緩脾家熱。口臭胃翻長嘔逆。齒脈斷宜注氣緩。寒熱時時少心力。

脾藏歌三

脾脈實并浮。消中脾胃虛。口乾饒飲水。多食亦肌虛。（肌一作飢。）單滑脾家熱。口臭氣多粗。滿則非多食。食不作肌膚。微浮假客熱。來去乍微疏。有緊脾家痛。仍兼筋急拘。欲吐即不吐。沖沖來役役。若弦肝氣盛。妨食被機謀。大實心中痛。如邪勿禁符。溢關涎出口。風中見鶴孤。

肺藏歌一

肺藏最居先。大腸通道宣。兌爲八卦〔地〕訣。金〔屬〕次。五行〔峯〕輝。皮與毛通應。魂將魄共連。鼻聞香臭辨。藜藋氣相煎。腸過多成癰。痰浮酒灌穿。猪汗凝者吉。枯骨命雖全。本積息賁患。乘春右脇邊。順時浮滿知反即大洪。弦實夢兵戈。說盛行〔涉〕多。〔水〕野田。

澀極曰。厥氣客于大腸。則夢田野。脈訣以水田爲肺虛之夢。非也。大腸虛爲厥氣所客。則夢田野。府虛致藏虛。或可連稱。若曰水田。則腎夢也。

三斤三兩重六錢散分鹽。

肺藏歌二

三部俱浮肺藏風。鼻中多水唾稠濃。壯熱盛寒皮肉痛。額乾雙目淚酸疼。

肺藏歌三

肺脈浮兼實。咽門澁又傷。大便難且澀。鼻內乏馨香。實大相兼滑。毛焦涕唾粘。更和咽有燥。秋盛夏宜砭。

沈緊相兼滑。仍聞咳嗽聲。微浮兼有散。肺脈本家形。溢出胸中滿。氣泄大腸鳴。弦冷腸中結。乾（燥痛無成。）爲失血。是不痛也。潔古解得之。解作痛者又非。改爲失血爲當。

沈細仍浸滑。應知是骨蒸。皮毛皆總澀。寒熱兩相承。

腎藏歌一

腎藏對分之。膀胱共合宜。旺冬（身）行。屬水。位北定無欺。兩耳通爲竅。（三焦附在斯。二陰竅形（陰）竅（才）長三（寸）五

難經曰。脾厥三寸長五寸。脈訣止言扁三寸。尖長五寸之文。今合廣長著三五之數。

肾凝散半斤。順時脈緩慢。失則氣連吞。

素問曰。五氣所病。脾爲吞。又曰。刺中脾。十日死。其動如吞。李瑡范曰。連吞者。所以形容緊數之脈狀。乖于內經。失脈訣意。

實夢歌。歡樂。虛爭飲食分。濕多成五泄。腸〔走〕噁。若雷鳴。痞氣多爲積。皮黃四體昏。二斤十四兩三斗五升存。

脾藏歌二

三部俱緩脾家熱。口臭胃翻長嘔逆。齒脈斷宜注氣緩。寒熱時時少心力。

脾藏歌三

脾脈實并浮。消中脾胃虛。口乾饒飲水。多食亦肌虛。（肌一作飢。）單滑脾家熱。口臭氣多粗。滿則非多食。食不作肌膚。微浮假客熱。來去乍微疏。有緊脾家痛。仍兼筋急拘。欲吐即不吐。沖沖來役役。若弦肝氣盛。妨食被機謀。大實心中痛。如邪勿禁符。溢關涎出口。風中見鶴孤。

肺藏歌一

肺藏最居先。大腸通道宣。兌爲八卦〔地〕訣。金〔屬〕次。五行〔峯〕輝。皮與毛通應。魂將魄共連。鼻聞香臭辨。藜藋氣相煎。腸過多成癰。痰浮酒灌穿。猪汗凝者吉。枯骨命雖全。本積息賁患。乘春右脇邊。順時浮滿知反即大洪。弦實夢兵戈。說盛行〔涉〕多。〔水〕野田。

澀極曰。厥氣客于大腸。則夢田野。脈訣以水田爲肺虛之夢。非也。大腸虛爲厥氣所客。則夢田野。府虛致藏虛。或可連稱。若曰水田。則腎夢也。

三斤三兩重六錢散分鹽。

肺藏歌二

三部俱浮肺藏風。鼻中多水唾稠濃。壯熱盛寒皮肉痛。額乾雙目淚酸疼。

肺藏歌三

肺脈浮兼實。咽門澁又傷。大便難且澀。鼻內乏馨香。實大相兼滑。毛焦涕唾粘。更和咽有燥。秋盛夏宜砭。

沈緊相兼滑。仍聞咳嗽聲。微浮兼有散。肺脈本家形。溢出胸中滿。氣泄大腸鳴。弦冷腸中結。乾（燥痛無成。）爲失血。是不痛也。潔古解得之。解作痛者又非。改爲失血爲當。

沈細仍浸滑。應知是骨蒸。皮毛皆總澀。寒熱兩相承。

腎藏歌一

腎藏對分之。膀胱共合宜。旺冬（身）行。屬水。位北定無欺。兩耳通爲竅。（三焦附在斯。二陰竅形（陰）竅（才）長三（寸）五

味鹹鮎發豆精志自相隨沈滑當時(水)脈浮(撮)緩厄在脚色同烏羽吉形似炭煤危冷積多成墜焦煩水易數奔豚臍下積究竟骨將痿實夢腰(膝)冒解

曰難解是不解也

虛行溺水溺一斤餘二兩(脇下)脊緩對相(並)候

難經曰腎形如豆相並而曲附于脊脊外與脾相對脇下肝之部位非腎位亦不並

腎藏歌二

三部俱遲腎藏寒皮膚燥澤髮毛乾經夢鬼神時入水發寒慄悲愁

腎藏歌三

腎散腰間氣尿多更滑精軟爲膝脛痛陰汗豈無證實滑小便澀淋痛澹澹脈澹精頻漏恍惚夢魂多小腹痛氣墜夢裏涉江河實大腸脫熱小便澀難通滑弦腰腳痛沈緊病還同(單)平勻無病憂浮緊耳應聾

左右手分診五藏五時脈歌

左右須候四時脈四十五(動爲一息)日三氣

難經曰脈不滿五十動一止一藏無氣脈缺生死歌云五十不止身無病數內有止皆知病正本難經今此乃曰四十五動爲一息及六部脈歌皆以四十五動爲準平于內經謬于名數今于後六歌皆當改作五十動爲是且一息者一呼一吸也四十五動非止一息也若以息爲止息則脈經所謂五十動不止者五藏六府皆受氣即無病五十動一止五藏死五動一止五日死四十五動除去五動而不及五十不知何意今詳此句想因四時脈而言或本于內經冬至夏至各四十五日爲陰陽上下之期一時六氣九十日三氣得四十五日今改爲四十五日以合內經李暗范脈髓作四十五動圖說亦巧而未敢信通眞子潔古諸解穿鑿皆非蓋脈之流行如環無端無一息之停未嘗以五十動一止爲限但止即爲病依數而止期以歲死不依數而止則爲結促代三病脈矣

右手第二指連脾(四十五動)五十動足無緒疑盜動名爲脾熱極食不能消定若斯尋之慢極遲吐逆不定經旬日胃氣衰必待夏時

右手尺部(命門)腎脈歌

右手(命)腎脈三指下(四十五動)五十動足不須怕一十九動獸然沈有死無生命絕也指下急急動如弦腎藏有風猶且治七動沈沈更不來努力今朝應是死

(七表一)

(一)浮者陽也指下(等)按之不足舉之有餘(再再尋之如太過)脈在肉上行曰浮主咳嗽氣促冷汗自出背膊勞倦夜臥不安

脈訣曰如太過曰浮既曰舉之有餘矣如何而太過曰太過則浮洪浮緊浮弦之脈如何診之脈經並無如太過之文又尋與按不同按者重手于肌肉筋骨部也尋則或上或下或左右隨脈部以尋之浮脈按之不足舉之餘再再尋之指下浮盛中積冷藥中熱欲得生精用補虛寸浮中風頭熱痛關浮腹脹胃虛空尺部見之風入肺大腸乾澁故難通

(二)乳者陽也(指下按之兩頭即有中間全無)舉之浮太而軟按之兩邊實中間虛曰乳(生淋澀氣入小腸)主失乳草名其葉類葱中心虛空故以指按乳草葉驗失血之脈乳之名不見于內經又曰安臥脈盛謂之

脫血。至仲景傷寒論曰。脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。此名爲革。亦未曾以芤爲定名。但附見于革。至王叔和始立芤脈。脈經曰。芤脈。其象兩邊似有。中間全無。今脈訣乃曰。兩頭則有。中間全無。則誤矣。夫尺脈上不至關爲陰絕。寸口下不至關爲陽絕。若兩頭似有。中間全無。則是陰陽絕脈也。安得爲芤脈乎。經曰。營行脈中。是血在脈中行。脈以血爲形。血盛則脈盛。血虛則脈虛。故芤脈中空者。血之脫也。芤脈。先舉指時浮大而軟。因按而中空。今脈訣言指下尋之。非也。仲景曰。脈浮而緊。按之不芤。此人本不虛。是皆于按上以見芤脈。尋者在浮舉沈按之間耳。下倣此。

指下尋之中且虛。邪風證入小腸。虛患（疑誤）。血多移痼。大作湯丸必自除。

諸家論芤皆爲失血之診。今曰邪風入小腸而淋瀝。非其證也。蓋是尿血之證矣。

寸芤積血在胸中。關內逆孔腸裏難。尺部見之虛在腎。小便澀瀝血凝瞼。

（三）滑者陽也。（指下尋之三關如珠動。按之即伏。不進不退。）往來循卻（疑誤）。利。脈轉。賢然與動。如欲脫。指圓滑。又曰。滑。主殷盛。困弊。腳手酸痛。小便赤澀。

脈經曰。輕手得之爲浮滑。重手得之爲沈滑。其象往來流利。顯指圓滑。若珠之圜指。今脈訣曰。按之即伏。不進不退。則是有浮滑而無沈滑也。經曰。一陰一陽者。謂脈來沈而滑也。是沈中亦有滑也。故王叔和言脈訣論裘不及裏也。且脈有獨見于一部者。有通三部見者。今曰三關如珠動。非也。按之即伏。不進不退。則是脈不往來而定。豈所謂滑乎。今取脈經所載。而去其浮中而有力之語。蓋此語只言浮滑。亦一偏之言。夫血多則脈滑。滑之本體也。若氣血和順。其動不遽不急。不緩不慢。和滑之脈。爲不病。婦人爲妊子。今若曰滑爲陽爲病。熱爲實。則此滑字。當帶數及小實言之。大抵此脈訣之形狀。往往未當。今據經改正之。而脈下所主之證。多與本脈不類。改之則不勝改。姑置之可也。

滑脈如珠動曰陽。腰中牛氣逐前腸。胞酸只爲生寒熱。大瀉三焦必得康。

滑脈居寸多嘔逆。關滑胃寒熱不下食。尺部見之（脈似冰）。熱下（飲水下焦聲濕濕）。月信不通。腸血溲。曰關滑。胃中有熱。又云中實逆滑。爲熱實。故不前脾藏歇云。單滑脾家熱。今云胃寒不下食。何也。脈經曰。關滑欲食。食即吐逆。可明爲熱。池氏謬言肝木克脾土。致寒。弦爲肝脈。滑豈肝脈乎。脈經曰。尺滑不利少氣。脈賦解義云。男子尺滑。主膀胱冷氣。小腹急脹。便旋利數。又云尺滑。主胞絡極冷。月經不調。直以滑脈爲陰。主冷。不當。不若脈經所謂尺滑。血氣實。婦人經脈不利。男子尿血。爲得。今脈訣云。臍似冰。則滑爲陰證。又曰飲水。則滑爲陽熱。又曰溲澀作聲。則滑爲停水之證。既言冷。又言熱。不知何謂。今正之。

（四）實者陽也。（指下尋之不絕。舉之有餘。）浮中沈三候皆有力。曰實。主伏陽在內。脾虛不食。股體勞倦。

柳氏曰。實者氣結不通。欠疏快。意上部實。則氣壅。下部實。則氣脹。中部實。中脘不快。素問曰。氣來實強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。此表裏虛實之診也。今脈實而曰脾虛。未敢信。

實脈（尋之無）滑沈皆有餘。伏陽蒸內致脾虛。食少只緣生胃熱。溫和湯藥乃蠲除。

舉有餘。止言浮實。故改之。

脈訣刊誤　卷上

（五）弦者陽也。（指下尋之不足。舉之有餘。狀若筝弦。時時帶數。）如弦引指。曰弦。主勞風乏力。盜汗多出。

指下左右皆無。從前中後直過。挺然於指下。曰弦。此血氣收斂不舒之候。脈訣以弦爲陽。傷寒論以弦爲陰。脈賦解義。亦云弦滑雖胎七裹。皆主於陰。活人書云。若弦而洪數者爲陽。弦疾而沈。且微細者爲陰。主拘急。以愚觀之。經曰。陰中之陽。肝也。當爲半陰半陽之脈。脈訣曰。指下尋之不足。舉之有餘。則是有浮弦而無沈弦也。經曰。脈沈而弦者。主懸飲內痛。是沈中亦有弦。又曰。時時帶數。則是弦數二脈相雜。非單弦脈也。素問曰。氣來耎弱。輕虛以滑。端直以長。曰弦。今不取輕虛以滑。恐有弦數。弦遲。雜他脈之診。故止以弦本狀。端直以長爲弦。然有弦而細。有弦而粗。看在何部。弦而耎。其病輕。弦而硬。其病重。大率弦脈急強。血氣不和之所生也。又有偏弦。變弦之診。

（弦脈爲陽）端直長。狀若弦。四肢更被氣相煎三度（解）消。勞風始退。常須固濟下丹田。

弦浮數。大四者皆勞也。大者易治。脈氣未衰。可斂而正也。弦者難治。血氣已耗而難補。雙弦則賊邪侵脾。尤爲難治。加數則殆矣。內經曰。勞者溫之。不可用解。

（寸部脈緊一條弦。胸中急痛狀繩牽。關中有弦寒在胃。下焦停水滿丹田。）寸弦頭痛胸中痛。左關弦痛掣右關。有飲寒留胃尺。弦痛小便不（禁）通。

既歌弦脈。又言脈緊。非也。此歌脈證未是。未盡。今改作。脈經曰。尺滑不利少氣。一云胸中拘急。關弦胃寒。心下厥逆。一云心下拘急。此胃氣虛故爾。尺弦。小便痛。小腹及腳中拘急。一云臍下拘急。

（六）緊者陽也。（指下尋之三關通度。按之有餘。舉指甚數。狀如洪弦。）弦如轉索。來往有力。左右彈人手。

氣。伏陽上衝。化爲狂病。

內經。難經。未言緊也。內經曰。急不曰緊。曰來而左右彈人手。有緊脈之狀。者如轉索無常。又曰緊脈從何而來。假令亡汗若吐。以肺裏寒。假令嗽者。坐飲冷水。假令下利。以胃中虛冷。皆內寒而脈緊。故脈急爲寒。脈緊爲寒。至王叔和脈經。則又增如切繩狀。故總合三者所論以形容之。左右彈人手者。緊脈來之狀。左右彈人手也。轉索無常者。索之轉動。不常在一處。或緊轉在左。或緊轉在右。此舉指而得緊脈之狀也。切繩狀者。繩以兩股三股糾合爲徵。轉。又以物切之。其展轉之緊。得之于按指而見。以損按脈。猶如切繩。合此三者。論之方備。脈經曰。重手得之爲沈緊。輕手得之爲

浮緊故咳嗽之脈沈緊則死中惡之脈浮緊則死今脈訣曰狀若洪弦此謬也緊爲寒爲痛弦爲寒爲飲洪爲氣爲熱主疾既殊治之亦異一概言之爲害甚矣且弦小於緊數大於弦洪則不然舉按俱大非與二脈同也又緊而遲爲寒緊而數爲熱若曰按有餘舉甚數則又類實脈若緊遲緊細又何以診又難曰三關不曰三部又昧於尺寸之名今悉改之　論此緊脈者或曰在筋肉之間遲度或曰按之實數是有三部之通緊而無各部之獨緊有按之緊而無浮之緊皆一偏之辭　仲景曰脈至如轉索者其日死爲其緊急不軟無胃氣也轉索一也有死生之分宜詳辨之

緊脈三關數又弦上來風是正根元忽然狂語人鬼相不過良醫不得逞

前言狀若洪弦今曰數又弦是見之不明而頻移其說以遲就也前云主風氣伏陽化爲狂今去伏陽獨言風仲景及脈經皆曰諸緊爲寒非可以爲風狂伏陽之診難經曰重陽者狂豈緊脈爲重陽乎重陽者謂陽部更有洪大滑長數等脈見耳內經曰陰不勝其陽則脈流溢疾并乃狂溢疾者極虛而急數并謂盛實亦非緊脈也

緊脈關前頭裏痛到關切痛無能動（隱指寥寥）轉索脈緊如轉索非隱指寥寥之狀緩結非痂之狀今改之李氏曰陽脈至陰部自然隱伏指下寥寥入來若在寸部則不寥寥以恐視之脈隨病而見不隨部而改小腹痛必寒氣固結攻擊於下焦所以脈緊安有因在尺部而脈變形乎

（七）洪者陽也（指下尋之極大舉之有餘）極大在指下來大去長面溝指曰洪主頭痛四肢洪熱大腸不通燥熱糞結口乾渴身疼痛

指下尋之極大舉之有餘是浮沈皆大之象有類實脈本狀診者自當隨其見於浮沈以參求耐　極大在指下者指下前後左右四旁脈來皆盛大滿指是言本體之形大也來大去長言其來去之形大也

洪脈根元本是陽遇其（季夏）月自然昌若逢秋（季）月及冬（季）月發汗通腸始得涼仲景曰立夏得洪大脈是其本位爲應時之脈今曰季夏池氏遵就以爲季夏心火漸退得脾土假之其熱病自退若然則秋冬只在九月十二月得洪脈方可發汗通腸乎今季字皆改爲月字

洪脈關前熱在胸當關翻胃（幾千重）熱來衝更向尺中還若是小便赤澁腳痿疼

（八裏）

（一）微者陰也（指下尋之極微）再再尋之（若有若無）欲絕非絕又曰欲絕如絕若有若無按之如欲無曰微主敗血不止面色無光

若有若無欲絕非絕所以形容微之不可見按之如欲盡謂必輕手診則可見重手按則欲盡而無也

微與濡弱相類極軟而浮細曰濡極軟而沈細曰弱極細而軟無浮沈之別者微脈也微與濡細何以分細而又短於微來往甚滯曰濡細而稍大常有曰細細而稍長似有似無曰微合五脈相類者詳分之則微脈可知矣　陽微惡寒陰弱發熱微浮雖甚不成病不可勞　脈經曰脈者氣血之候氣血既

微則脈亦微矣沈微則補陰浮微則補陽調補之道以此爲準凡得是脈必虛之病多得是脈　柳氏曰脈分四時春夏發生長旺見此脈秋冬見尙虛難又曰人稟氣以生若微脈太過陽病氣乏何足以生

指下尋之有若無灘之敗血小腸虛崩中日久爲白帶漏下多時骨亦枯

微脈關前氣上便當關霍結氣排心尺下見之臍下積身寒欲水即呻吟

微在尺爲陰盛陽虛故爲身寒不可飲水若飲水則兩寒相搏痛而呻吟也通真子曰多嘔池氏曰身寒欲水李氏曰好飲冷水皆非也

（二）沈者陰也（指下尋之似有舉之全無緩度三關狀如煙綿）舉之不是按之有餘重按乃得在肌肉之下曰沈主氣服兩脇手足時冷

輕指於皮膚間不可得徐按至肌肉中部間應指又按至筋骨下部乃有力此沈脈也沈與浮相反與伏相近沈脈重按乃得於筋骨下部若伏脈則難重按至筋骨下部亦不見必用指推開筋方可見脈難經曰伏者脈行筋下也內經曰推而內之推而外之皆虛用指推筋脈以求之非一定其指於病人臂上俟其脈之自見也此持脈口訣也　脈經曰沈者陰脈之始也其象按之至筋骨得之者是也其體沈潛深居諸脈之下有地之氣焉凡諸脈即沈而見則知其在陰而裏受之今脈訣曰按之似有狀如煙綿曰沈如此則沈弱沈微沈細之脈又當何如而診之甚失脈經之意矣經曰開以後者陰之動也脈當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及豈有按之狀若煙綿之不及也

按之（似）即有舉還無氣滿三焦藏府虛冷氣不調三部舉通腸健胃始能除

按之似有是沈微脈非獨沈也今改云按之即有沈爲陰通腸宜溫藥利之

寸脈沈今胸有痰當關氣（短）塔痛難堪

氣短者氣不能相續似喘而實非氣上衝似呻吟而無痛乃氣急而短促也今曰痛難堪則非氣短脈經曰關沈心下有冷氣若滿吞酸則痛者氣病不通而痛也

若在尺中腰腳重小便稠數色如泔

（三）緩者陰也指下尋之往來遲緩（小于遲脈）遲陰脈浮大而遲陽脈同等曰緩主四肢煩悶氣促不安

緩有二義去來亦遲小駛於遲每居中部或下部間柔軟而慢但小于沈脈不及之緩陰陽氣和陽寸陰尺上下同等同浮大而軟無有偏勝此無邪之診爲陰陽和緩之緩緩與遲二脈相類緩脈大而慢遲脈小而衰緩者衛有餘而營不足遲者陰氣盛而陽氣衰二診不同遲脈一息三至緩脈一息四至　脈經曰緩脈小駛於遲今脈訣反云小於遲脈誤矣四肢煩悶氣促不安皆非緩脈之證

來往尋之狀若遲臂間生氣耳鳴時邪風積氣來衝背腦後三針痛即移

緩脈關前攝項筋。營關氣結。腹難伸。尺上若逢癥冷結。夜間常夢鬼隨人。

〔四〕濇者陰也。〔指下尋之似有舉之全無。前虛後實。無複次序。〕一止濇來。雖往來雖且數。或一止濇來。又曰細而止。曰濇。主腹痛。女子有孕。胎痛。無孕。敗血爲痛。

脈來蹇澁。細而遲。不能流利。圓滑。濇者澁也。與滑相反。如刀刮竹。竹皮澁。又有節。刀刮而行澁。遇節則倒退。有濇脈往來雜之意。如雨沾沙。沙者不聚之物。由雜沾之。其體亦細而散。有濇脈往來散之意。或一止復來。是因濇不流利之止。與結促代之止不同。王函經曰。切脈定知生死路。但於止代濇中取。看取濇脈與止代。此是死期之大概。濇脈與外有形證。來可斷他殂大命。若是形證與代同。尺部見之。皆死定。黎氏曰。代者止也。一藏絕。他藏代主。爲真死脈。不分三部。隨應皆是。濇者。三五不調。如雨沾沙。爲精血不足之候。與代相似。然三秋診得濇而有胃氣。爲中脈。右手寸口。浮短而濇。爲肺正脈。二者皆非死脈。若尺寸俱浮緊而濇。外證必發熱惡寒。項強腰痛。參連百節俱痛。乃大陽經傷寒汗之愈。舉此數端。以見濇脈與代脈不可例觀。尺脈者人之根本。濇爲精血不足之候。若獨于尺中見濇。則死候也。

脈經曰。濇脈之象。往來蹇澁。行而多礙。夫脈者。資血氣而行。血氣損傷。營衛行澁。故脈亦澁。脈訣曰。按之假有。舉之全無。是有沈濇無浮濇。經曰。一陰一陽。謂脈來浮而濇也。則是浮中亦有濇。豈獨沈中有濇乎。蓋浮而濇者。營衛傷。沈而濇者。精血損。裘裹之證不同。故脈亦異。豈獨有裏而無表乎。難經曰。前虛後實。濇爲少血。其形蹇澁。細短且散。安能後實。若後實則非濇矣。其曰無複次序。卽內經所謂參伍不調。上下如參。參之脈。是脈之亂。脈亂則死矣。今以脈經改之。

濇脈如刀刮竹行。丈夫有此號傷精。婦人有孕胎中痛。無孕還須敗血成。

濇脈關前胃氣并。當關血散不能停。尺部如斯逢逆冷。證寒脾下作雷鳴。

〔五〕遲者陰也。〔指下尋之重手乃得隱隱。〕去來極遲。一息三至。曰遲。主腎虛不安。

中風口喎。脈浮而遲。則生。今脈訣於遲脈曰。重手乃得。是無浮遲之脈乎。立脈之名曰遲。以其比平人一息四至。減去一至。故也。今曰隱隱。果何所似。且如蛛絲曰氣衰。如風吹毛曰肺死。微甚欲絕。伏甚不出。則庶可隱隱形容之。三至爲遲。何隱隱乎。

〔遲脈人逢狀且難〕三至爲遲　一息問

遲脈一息三至。以至數之至爲易見。

過其季夏不能瘥。神工診著知時候。〔道是脾來水必乾〕成是脾虛　成腎寒。

通真子曰。遲脈屬腎。腎水爰在土。土季夏王。潔古云。遲本土也。當做此一脈爲時勝故長。夏勝冬。土克水。池氏曰。季夏現遲。季夏土正旺。勝其腎水。水必枯。病不瘥。抑脾土。滋腎水。方爲良工。以愚致之。內經曰。脈遲者爲藏病。難經曰。遲者陰也。遲爲在藏。非脾旺脈。亦非屬腎之脈。假使季夏土旺。脾能克腎。不遲弱相近。一息三至。隨浮沈而見曰遲。極軟而浮細。輕手乃得。不能沈。曰濇。輕軟而沈細。按之乃得。重按欲絕。指下不能起伏。不能浮。曰弱。潛弱遲微之脈。皆氣血之不足者也。大病後。或產婦。喜見此等脈。

曰因時正脈。能克所勝。則是春肝脈旺。必克脾土。四時旺脈。因序而見。人人四時皆病矣。今此脈訣之意。蓋以夏月萬物盛大。陽旺之時。而得遲脈。爲失時反證。陰氣太盛。脾者陰中之至陰也。遲在脾則脾冷。腎者亦陰也。遲在腎則腎冷。內經曰。未有藏形。春夏而脈沈濇。秋冬而脈浮大。命曰逆四時。今遲脈在夏。亦逆四時也。

寸口遲脈。心上寒。當關腹痛欲嘔。難流入尺中。要關重厚衣重覆也嫌單。

〔六〕伏者陰也。〔指下尋之似有呼吸定息全無。再再尋之不離三關。〕極重按之。沈不出。乃得。又曰極上沈不出。又曰脈行筋下。曰伏。

伏脈者。初下指輕按不見。次尋之中部。又不見。次重手極按。又無其象。直待以手推其筋於外而診。乃見。蓋脈行筋下也。若如常診。不推筋以求。則無所見。味者以爲脈絕矣。孔脈因按而知。伏脈因推而得。伏與沈相似。沈者重按乃得。伏者重按亦不得。必推筋乃見也。若重按不得。推筋著骨全無。則脈絕無而死矣。脈訣曰。指下尋之似有。則非伏也。呼吸定息全無。則脈絕也。再再尋之不離三關三部。一陰一陽。謂脈來浮而濇也。則是浮中亦有濇。豈獨沈中有濇乎。蓋浮而濇者。營衛傷。沈而濇者。精血損。裘裹之證不同。故脈亦異。豈獨有裏而無表乎。難經曰。前虛後實。濇爲少血。其形蹇澁。細短且散。安能後實。若後實則非濇矣。其曰無複次序。卽內經所謂參伍不調。上下如參。參之脈。是脈之亂。脈亂則死矣。今以脈經改之。

濇脈如刀刮竹行。丈夫有此號傷精。婦人有孕胎中痛。無孕還須敗血成。

濇脈關前胃氣并。當關血散不能停。尺部如斯逢逆冷。證寒脾下作雷鳴。

〔五〕遲者陰也。〔指下尋之重手乃得隱隱。〕去來極遲。一息三至。曰遲。主腎虛不安。

中風口喎。脈浮而遲。則生。今脈訣於遲脈曰。重手乃得。是無浮遲之脈乎。立脈之名曰遲。以其比平人一息四至。減去一至。故也。今曰隱隱。果何所似。且如蛛絲曰氣衰。如風吹毛曰肺死。微甚欲絕。伏甚不出。則庶可隱隱形容之。三至爲遲。何隱隱乎。

〔遲脈人逢狀且難〕三至爲遲　一息問

遲脈一息三至。以至數之至爲易見。

過其季夏不能瘥。神工診著知時候。〔道是脾來水必乾〕成是脾虛　成腎寒。

通真子曰。遲脈屬腎。腎水爰在土。土季夏王。潔古云。遲本土也。當做此一脈爲時勝故長。夏勝冬。土克水。池氏曰。季夏現遲。季夏土正旺。勝其腎水。水必枯。病不瘥。抑脾土。滋腎水。方爲良工。以愚致之。內經曰。脈遲者爲藏病。難經曰。遲者陰也。遲爲在藏。非脾旺脈。亦非屬腎之脈。假使季夏土旺。脾能克腎。不遲弱相近。一息三至。隨浮沈而見曰遲。極軟而浮細。輕手乃得。不能沈。曰濇。輕軟而沈細。按之乃得。重按欲絕。指下不能起伏。不能浮。曰弱。潛弱遲微之脈。皆氣血之不足者也。大病後。或產婦。喜見此等脈。

〔七〕濇者陰也。〔指下尋之似有。按之依前卻去。〕極軟而浮。卽輕手。乃得。不任尋按。曰濇。主少氣。五心煩熱。腦痛耳鳴。下元冷極。

有餘于上曰浮。旣浮而細曰軟。浮而軟細曰濇。按之無有。舉之則浮。細而極軟。必輕手乃可得。脈經曰。如帛衣在水中。帛漫在水。盧浮見於水面。若用指按之。則隨手而軟散。不與手應。此濇脈之狀也。濇與遲弱相近。一息三至。隨浮沈而見曰遲。極軟而浮細。輕手乃得。不能沈。曰濇。輕軟而沈細。按之乃得。重按欲絕。指下不能起伏。不能浮。曰弱。潛弱遲微之脈。皆氣血之不足者也。大病後。或產婦。喜見此等脈。

平人強人忌見之。更隨時隨病消息之。　脈訣曰指下尋之似有。與言伏脈同。何是何非耶。且諸脈之應。指皆一來一去。如曰來疾去遲曰來盛去不盛。以別鈎脈。外實內虛之診。今曰按之依前卻去。其狀果何如耶。　內經曰秋脈經曰濇。同一脈也。難經曰春脈弦。濇弱而長。按之濇舉之來實者。腎也。沈濇而滑曰石。是皆兼他脈。以濇在中和之為平脈。旺脈若濇脈獨見。則病脈也。內經曰心脈耎散。當消瘅自已。肝耎散。病溢飲。胃耎散。病食痺。脾耎散。食不澤。足胕腫。腎耎散。病少血。其言耎散脈。與搏堅而長對言。病也。獨言○此下有脫文。原註。獨言當作故以未是。氣來虛微。來實強。對言之。非所謂濇與虛弱之診也。

〔按之似有舉之無〕按如無。舉之全無力。曰濇。今從之。

脈訣首句全非濇診。活人曾曰。按之似無。舉之全無。力。曰濇。今從之。

髓海丹田定已枯。四體骨蒸勞熱甚。醫厨終傳命必殂。濇脈關前〔八足汗〕汗。虛自

脈訣足字本為充足之足。昧者誤以手足之足訓之。今改為自汗。脈無誤也。

當關少氣精神散。尺部綿綿卻惡寒。骨與肉疏多不管。

〔八〕弱者陰也。指下等之如爛綿相似。〔輕手乃得。重手乃無。快快不能前。〕極軟而沈。綿。按如絕。指下。曰弱。〔主氣居于裏。〕生產後客風而腫。

弱者扶持不起之狀。不能起伏。不任尋按。大體與濇相類。濇脈細軟而浮。弱脈則細軟而沈。以此別之。病後見此脈為順。強人平人見之為損為危。獨見一部或二部猶應。三部六部皆見之。甚矣。脈經云。按之乃得。舉之無有。今脈訣云輕手乃得。重手乃無。與脈經相反。今改之。又弱為虛候。氣血損減。今云氣居于表。果何證乎。裏病脈必因浮而見。今弱脈沈細在下。何以診裏。第問曰。面腫曰風。不拘于產後也。弱脈亦難以驗風。

〔三關〕脈行。快快不能前。〔只為風邪與氣連〕軟細而沈。但覺緩。胃。

關前弱脈陽道虛。關中〔有此氣多疏〕虛熱。氣虛。

脈經曰關弱胃氣虛。胃中有客熱。脈弱為虛。熱作病。有熱。不可大攻之。熱去則寒起矣。　池氏曰關乃陰陽分處。脈弱則陰陽隔絕。主氣喘。李晞范因之。今按氣喘者脈必實。脈弱則氣乏。不足以息。今依脈經改之。　柳氏曰氣虛血弱。弱脈乃見。寸弱為陽氣虛。尺弱為陰氣虛。關弱為胃虛。仲景曰諸弱發熱。乃弱為陽虛。虛而發熱。非實熱也。大抵陽少陰多。皆為不足之候。脈經曰弱為虛為悸　內經曰脈弱以滑。是有胃氣。命曰易治。脈小弱以濇謂之久病。同一弱也。以滑濇相雜而易診。

若在尺中〔陰氣絕。疼疼引髓主皮膚〕陽氣少。骨煩。發熱。痛。難屈。

脈經曰。尺弱陽氣少。發熱骨煩。又云少血。脈經曰骨煩者。腎主骨髓也。脈訣作皮膚。乃肺之合。非腎所主。今改之。　結

〔九道〕

通真子曰七表八裏為陰陽正脈。外有九種脈相通而見者。經所謂脈來浮滑而長。沈濇而短。浮大而寸口尺中皆退促。附近關中見一半。如蟲縮頭曳尾之狀。以其陰陽不及本位。故曰短。若關中短。上為寸脈。下不至關。下為尺脈。上不至關。是陰陽絕脈。此皆不治決死。故關中不以短脈為診。　脈經曰短脈之象。應指而退。不能滿部。浮而短者。榮衛不行。沈而短者。藏府痞塞。短與長對。知長則知短矣。

平之類。是也。以愚觀之。脈無正不正之定名也。為邪為病。為藏為腑。則皆正脈也。脈合陰陽。難以七表八裏為陰陽正脈。難經曰浮滑長皆陽脈。沈濇短皆陰脈。非陰陽也。又曰外有九種脈相通而見。故曰九道。且脈之相通。乃榮脈參互為一。以示證也。二十四字。除浮沈結促代伏。居于上下。止于緩急。不能相通。其他皆相通。難經曰一陰一陽。謂浮而濇。是八裏通乎八裏也。內經所載。仲景所論。多通衆脈而言病。二脈經二十四字。有散數。無短長。脈訣去散數。增長短。亦以足二十四字。脈經論二十四字通為一處。亦無次序之定。蓋脈隨變而見。但宜以陽脈從陽類。陰脈從陰類。不可以一浮二弦為定序。且三至為遲。六至為數。去數。其可乎。是知脈不可以二十四字為定數也。亦不可立表裏道之異名也。陳氏沈氏并用散數為二脈于後。以足脈經之所論。而不去短長者。脈之所當速者也。既不拘于表裏道二十四字之數。則脈之以一字立名。皆詳論可也。或曰子既辨表裏道之非。不刪而通其說文何也。曰此朱文公作孝經刊誤程子通大學親民之例也。不刪者存其舊也。用愚觀者當刪者也。辨其下者。使人皆知其非。不復為舊文所惑。不刪之刪也。

〔一〕長者陽也。指下尋之三〔關〕部。如持竿之狀。舉之有餘。

從尺至關。連寸口。直過如橫竿之狀。此三部之長脈。過于本位。謂或尺或關或寸。過于一指之外。此各部之長脈。欲知其病。則必于浮沈遲數大小之間求之。若無病。經曰長則氣治是也。　大概平人病人。脈長為吉。深不大不小。不浮不沈。不遲不數。則氣自治而有餘。內經心脈搏堅而長。病舌卷不能言。至腎脈搏堅而且長。壽脈也。尺脈長。根深蒂固。心脈長。神氣合而病也。春肝脈軟弱輕虛而滑。端直以長。肝脈。如循長竿末稍曰平。如循長竿曰病。有餘而過。故也。長脈迢迢度三關。指下來時又卻迢。

通真子曰。此云來時又卻還者。似一陰三陽之脈。愚曰非也。來而還。只可謂脈之來去。然諸脈皆如是。若不能自還。則代而死矣。一陰三陽者。諸脈來浮滑而長時一沈也。是四脈共見也。

陽毒在藏三焦熱。徐徐發汗始能安。

潔古曰此陽明脈。尺寸俱長。當汗。陽化氣也。今按假使是陽明當汗。少陽陽明隨證解利。當依表裏分汗下。

〔二〕短者陰也。指下尋之。不及本位曰短。主憎寒。惡寒。腹中冷氣。宿食不消。

寸口尺中皆退促。附近關中見一半。如蟲縮頭曳尾之狀。以其陰陽不及本位。故曰短。若關中短。上為寸脈。下不至關。下為尺脈。上不至關。是陰陽絕脈。此皆不治決死。故關中不以短脈為診。　脈經曰短脈之象。應指而退。不能滿部。浮而短者。榮衛不行。沈而短者。藏府痞塞。短與長對。知長則知短矣。

短脈陰中有伏陽氣鬱三焦不得昌盛中宿食生寒氣大瀉通腸必得康

通真子曰脈訣以一陽三陰脈來沈濇而短時一浮乃云有伏陽耳今按脈訣單論短爲陰中伏陽蓋代者此脈已絕他脈代其至之義一藏氣絕而他藏之氣代而至也代與止異者止者按之譬于指下而中止代者忽還尺中停久方來則是歇至數動止而復來因其呼吸陰陽相引乃復動也今脈訣曰代者陰也指下尋之不足舉之亦然大而軟按之隱指動而復起則不代矣是不明動而中止爲代也再再不能自還之下卻不言因而復動是不能自還之後脈絕不來矣今以仲景原文改之　內經曰代則氣衰脾脈代注云奠弱也仲景曰傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之皆不以代爲死脈也王氏脈經始曰脈結者生代者死仲景言結代脈曰脈按之來緩時一止復來名曰結又脈來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脈者必難治王氏脈經謎之而與仲景本文有差仲景兩明結脈總曰陰也脈經分前一論來緩時一止名曰結陽多添一陽字于後一論中有還者反動改作不能自還舉之則動卻依本文曰結陰也以前爲結陽則脈緩非陽也此脈訣所謂結脈以後爲結陰則脈數乃陽也分二脈之異今混而同之不可也代則血氣衰虛不能相續因而呼吸相引復動此所以代爲難治活人書云陰盛則結生胸滿煩躁陽盛則促主精漿氣猝憂思所成大抵結促二脈雖時一止爲病脈非死脈也代則真死矣或曰死脈必代而代脈未必皆死者止也人見其脈動搖來往略有一止便以爲代便以爲死鮮有不失者蓋代脈固以其有止而有止者未可便以爲代也脈細而遲往來難時一止者爲濇脈來數時一止者爲促脈來緩時一止者爲結凡此三者均謂之止而其所以止者迥然不同爲病亦異而皆非死脈也甄別于此庶不與陽氣和雜也又曰脈浮數能食不大便此爲實曰陰結亦以陰陽氣偏結因發證而分之不以脈止爲結也內經曰結陽者腫四肢四肢者諸陽之本也結陰者其所病主血也二陽結謂之消謂大腸胃熱三陽結謂之隔謂小腸膀胱熱三陰結謂之水謂脾肺寒一陰一陽結謂之噎痺謂心主三焦熱是亦分陰陽之結也王氏脈經蓋因仲景之文于脈緩止卻爲結陽數止卻爲結陰誤甚詳述在代脈下其實脈訣之結脈爲陰與促脈爲陽相對非若內經與仲景所言有陰陽之分也若必論陰陽則緩而止爲結陰數而止爲結陽方允當

精氣生于脾藏旁大腸疹痛卒難當只宜稍瀉三焦火莫謾多方立紀綱

〔六〕代者陰也指下尋之（動而復起再再不能自還）動而中止不能自還四面復動曰代主形容羸瘦口不能言

代者此脈已絕他脈代其至之義一藏氣絕而他藏之氣代而至也代與止異者止者按之譬于指下而中止代者忽還尺中停久方來則是歇至數動止而復來因其呼吸陰陽相引乃復動也今脈訣曰代者陰也指下尋之不足舉之亦然大而軟按之隱指動而復起則不代矣是不明動而中止爲代也再再不能自還之下卻不言因而復動是不能自還之後脈絕不來矣今以仲景原文改之　內經曰代則氣衰脾脈代注云奠弱也仲景曰傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之皆不以代爲死脈也王氏脈經始曰脈結者生代者死仲景言結代脈曰脈按之來緩時一止復來名曰結又脈來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脈者必難治王氏脈經謎之而與仲景本文有差仲景兩明結脈總曰陰也脈經分前一論來緩時一止名曰結陽多添一陽字于後一論中有還者反動改作不能自還舉之則動卻依本文曰結陰也以前爲結陽則脈緩非陽也此脈訣所謂結脈以後爲結陰則脈數乃陽也分二脈之異今混而同之不可也代則血氣衰虛不能相續因而呼吸相引復動此所以代爲難治活人書云陰盛則結生胸滿煩躁陽盛則促主精漿氣猝憂思所成大抵結促二脈雖時一止爲病脈非死脈也代則真死矣或曰死脈必代而代脈未必皆死者止也人見其脈動搖來往略有一止便以爲代便以爲死鮮有不失者蓋代脈固以其有止而有止者未可便以爲代也脈細而遲往來難時一止者爲濇脈來數時一止者爲促脈來緩時一止者爲結凡此三者均謂之止而其所以止者迥然不同爲病亦異而皆非死脈也甄別于此庶不與陽氣和雜也又曰脈浮數能食不大便此爲實曰陰結亦以陰陽氣偏結因發證而分之不以脈止爲結也內經曰結陽者腫四肢四肢者諸陽之本也結陰者其所病主血也二陽結謂之消謂大腸胃熱三陽結謂之隔謂小腸膀胱熱三陰結謂之水謂脾肺寒一陰一陽結謂之噎痺謂心主三焦熱是亦分陰陽之結也王氏脈經蓋因仲景之文于脈緩止卻爲結陽數止卻爲結陰誤甚詳述在代脈下其實脈訣之結脈爲陰與促脈爲陽相對非若內經與仲景所言有陰陽之分也若必論陰陽則緩而止爲結陰數而止爲結陽方允當

精氣生于脾藏旁大腸疹痛卒難當只宜稍瀉三焦火莫謾多方立紀綱

〔代脈時時動若來〕動而中止不能還〔再而復動似還無〕復動因爲代脈者三元正氣隨風去魂魄（冥冥何所拘）

曰動若來則不止也一作動若浮尤悖理潔古亦隨繆解之何也曰似還無于脈狀何似故改之

〔七〕牢者陰也指下〔尋之則無按之則有〕似沈似伏大而長實曰牢主骨間疼痛氣居于表

尋之則無按之則有則沈脈也可以言牢脈所見之位而失言牢脈之本狀似沈似伏者牢脈所居之位也實大而長微弦者牢脈之形也脈經曰有似沈伏沈氏分言似沈似伏尤爲明著又曰似還無于脈狀何似故改之曰沈按之極下曰伏隱指倘倘曰實滿指洪盛曰大過于本位曰長緊而直曰弦兼是數者爲牢脈耳氏曰牢者堅也固固之象氣之鬱結故如此柳氏曰牢實不轉移主有積聚主疼痛不移其處得此一脈病邪牢堅其病難愈　沈氏曰陰陽革否其氣沈伏在下固結不移其氣欲上出而不得故曰革也

今按古今多以革與牢同論。素問云渾渾革至如湧泉。綿綿其去如弦絕。死曰革至如湧泉。流出之甚也。綿綿其去。流而不返。義如弦絕者。若弓弦琴瑟。弦斷絕不可再續。故云死。王說曰革脈渾渾如湧泉。謂出而不返也。爲陰氣隔陽。又爲溢脈。溢脈。蓋自尺而出。上于魚際。離經無根本。又有盛脈。自寸口下退。過而入尺。皆必死。此等脈見于兩手或一手。難以逐部求。或曰牢脈即黃帝之所謂革脈。千金翼亦以革爲牢。夫以革爲牢。蓋以革牢同一義。然內經渾渾革至如湧泉。則此革不與脈經沉伏之革同矣。然則牢革兩義也。雖經曰牢而長者肝也。牢陰長陽。因沉而得。爲肝牢脈。又曰脈之虛實。搖者爲虛。緊牢者爲實。以邪氣之盛爲實也。此牢也。仲景曰脈弦而大。弦則爲減。大則爲乾。減則爲寒。寒則爲虛。虛寒相搏。此名爲革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。此革也。（實革主邪氣盛。或虛革主精血虛。）或又曰如按鼓皮。鼓皮可以言革。而于實大弦長難以取象。脈經曰三部脈革。長病得之死。卒病得之生。雖病以斷也。雖經曰病若吐血。復鼽衄血者。脈當沉細。反得浮大而牢者死。脈病相違也。仲景曰寒則牢堅。脈當往往以牢革爲一。有牢則無革。有革則無牢。究而言之。所謂牢者牢也。緊牢爲實。仲景所謂革者。虛寒相搏也。脈形脈理二者不同。不可混也。因牢論革。及此。若內經渾渾革至云者。又別作一樣看可也。

〔脈入皮膚辨急難〕（實大弦長沉伏同）

牢脈居沉伏之位。非入皮膚之浮部也。牢以脈形固結。潛而在下。不與運數辨息多少以立名。故改之。

時時氣促在胸前。只緣水火相刑剋。若待蓬除更問天。

牢脈亦難以爲水火相刑之象。五行各有相刑。皆有死症。

〔八〕動者陰也。指下尋之似有舉之還無。中丹尋之不離其處。不往不來。（若數脈見於關上。上下無頭尾如豆大厥厥動搖）動主髓弱虛勞崩中血痢。

仲景云動脈若數。脈見於關上。上下無頭尾如豆大。厥厥動搖。王氏脈經作厥厥動搖。而去若數脈及上下五字。正云見於關上。無頭尾如豆大厥厥動搖。夫動必因數而後見。此五字不可除也。脈訣並遵依。却自云尋之似有。舉之還無。乃爲弱沉之狀。動脈厥厥動搖。出于衆脈。豈舉之還無乎。不離其處。果何處也。動見于關。不能如衆脈通三部而見。內經曰脈不往來死。若不往不來。則脈定而死矣。衆皆以動爲陽。脈訣以動爲陰。此脈居關上。陰陽相搏爲動。當以陽動爲陽。陰動爲陰。方當內經曰手少陰脈動甚。考妊子也。謂手少陰命門穴中脈動甚。爲有妊之兆。非言動脈之狀。言動脈止于仲景曰陰陽相搏名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱。形冷惡寒。此三焦傷也。成無己曰。方其陰陽相搏。而虛者則動。陽虛則陽動。故汗出。陰虛則陰動。故發熱。如不發熱汗出而反形冷惡寒。爲三焦傷。陽氣不通。脈安常曰。關位占六分。前三分爲陰。後三分爲陽。若當陽。逆寸口動。而陰脈法當有汗而解。素問曰陽加于陰謂之汗。若當陰。逆尺動。而陽靜。則發熱。素問曰尺熱爲熱中。若大汗後。形冷惡寒者。三焦傷。此是心也。最提散脈獨見。獨見則危矣。柳氏曰是散漫無統紀無拘束之象。一至。更不曾來往整齊。或動來即動去。或來至多去至少。或去至多來至少。是解散不收聚。精血走。作根本脫離不佳之兆。若產婦得之則生子。孕婦得之爲墮傷。凡常心脈及夏月。最不宜獨見此脈。

衆合名之厥厥。沈氏曰陽動者。陽不能衛于膚腠。故汗出也。陰動者。陰不能榮于肌肉。故發熱。又仲景云。陽微則惡寒。陰弱則發熱。是也。

動脈（根原氣主陰）（陰陽相搏形）（三關指下碾沈沈）（關中如豆動連滾）

動脈見關上。不見于三關。厥厥動搖。不沈沈碾指下也。池氏承訛終解。故改之。

血出一倒經年月。（智士名醫只可尋）（爲病爲脈經）

內經曰陰虛陽搏謂之崩。陰脈不足。陽脈盛搏。則內崩。血流下。此動脈爲血崩者。即仲景所謂陰動也。陰虛內損。動數見焉。豈非陽乎搏。

（九）細者陰也。指下尋之。細細如線。（來往極微）（小大于微。常有且細）曰細。主足脛惱冷。乏力少氣。

脈經曰。細者陰也。直細而軟。若絲線之應指。主血少氣衰。有此症則順。非此而得之爲逆。故壯朗血。得沈細則生。蓋血行脈中。血既減少。脈所以細也。然雖血少。未至于無。血失脈亦失。故究主失血。是知孤爲失血。細爲血少。今脈訣言細脈。乃云來往極微。則微之又微。非細矣。今改之。

乏力無精脛裏酸。形容憔悴髮毛乾。如逢冬季經霜月。不療其疾必自蹇。

冬季後陽氣生。或可復其生理耳。亦不可不療自蹇。今特爲增散數二脈。以足脈經之本旨。

散者陽也。一息六至。又曰去來促急爲數。

經曰數則爲熱。知其熱在表裏。察其大小。知其熱之盛衰。亦有如數之脈。細詳之。沈氏曰以陰陽言。數爲陽脈。以臟腑言。數爲腑病。論病則爲熱。論脈則爲熱。若夫微數之脈。傷寒則謹不可汗。無病則謹不可勞。此先賢之格言。內經曰數爲煩心。惟小兒之脈。一呼數胠八至。而細數者。大而散者是也。氣失血虛。有表無裏。故脈散也。

沈氏曰散者不聚之名。仲景曰傷寒咳逆上氣。其脈散者死也。若脈有邪氣。風也。難經曰。浮而大散者心也。最提散脈獨見。獨見則危矣。柳氏曰是散漫無統紀無拘束之象。一至更不曾來往整齊。或動來即動去。或來至多去至少。或去至多來至少。是解散不收聚。精血走。作根本脫離不佳之兆。若產婦得之則生子。孕婦得之爲墮傷。凡常心脈及夏月。最不宜獨見此脈。

脈訣刊誤卷下

雖曰知者一實而終不知者流散無窮。脈之爲說。前已論辨於各脈之下。今又以分合偶比類五字。以經論錯綜之旨無惑矣。

分　有脈之形。分謂脈各有形狀。當先明辨。便了然不疑。大小浮沈滑澁。可以指別。邇然各異。辨之於毫中。上半指不動。下半指微動。爲短。此乃浮澁而短。肺不病之脈也。肺脈本部。在於皮毛之上。見於簡表。是其浮也。入於皮毛之下。見於血脈肌肉之分。是其沈也。六部做此。此診之定法。可以合衆脈之形矣。

偶　脈合陰陽。必有偶對。經曰。善爲脈者。必以比類奇恆。從容知之。浮沈者。脈之升降也。浮升在上。沈降在下。爲諸脈之根本。爲陰陽之定位。爲表裏之定診。浮法天。有輕清在上之象。沈法地。有重濁在下之象。浮爲風。爲虛。體高而氣浮也。沈爲中堅。爲內蘊。體聚而不散也。論諸脈者。必先此二脈。

遲數者。脈之緊慢也。脈以四五至爲平。減一至爲三至曰遲。增一至爲六至曰數。難經曰。遲陰爲在藏。數陽爲在府。遲則爲寒。數則爲熱。亦偶言之也。中藏經曰。數在上。陽中之陽。遲在上。陽中之陰。在下。陰中之陽。數在中。則中熱。遲在中。則中寒。寒用熱助。熱用寒助。本乎陰陽也。

虛實者。脈之剛柔也。按之浮中沈皆有力。爲實。遲大而軟。按之豁然空。爲虛。虛實之由。皆以有餘不足占之。故以按而知。經曰。其氣來實強。爲大過。病在外。氣來虛微。爲不及。病在內。血實脈實。血虛脈虛。亦皆偶而言之。論表裏虛實。必以此二脈　中藏經曰。脈舉之滑。按之微。看在何部。以斷其藏。又按之沈、小、弱、微、短、澁、軟、濡、俱爲藏虛。其脈舉按皆盛者實也。又長、浮、數、疾、洪、緒、弦、大、俱曰藏實。其脈浮而實大者。府實也。輕手按之滑。重手按之平者。府虛也。左右寸口沈、結、實、大者。上實也。左右尺脈伏而澁者。下實也。尺中脈滑而澁者。下虛也。尺中微、澁、短、小者。俱屬下虛也。許叔微曰。可溫。沈而有力。緊實爲表實。浮緩爲表虛。傷風、解肌、浮緊澁有力爲表實。傷寒發汗。脈沈無力爲裏虛可溫。可下。此論傷寒表裏虛實。凡此皆非單論脈虛實之理。

長短者。脈之盈縮也。脈盈過於本位曰長。脈縮不及本位曰短。長有見於尺寸。有通見於三部。短只見於尺寸。蓋必窮於中而後知過於中爲長。不及於中爲短。經曰。長則氣治。短則氣病。脈有三陰三陽。而長短在其中。是亦偶而言之。又曰人長脈長。人短脈短。又因人形體而別。

滑澁者。脈之通澁也。脈通則流利無礙曰滑。脈澁則壅滯不流曰澁。內經曰。滑者陰氣有餘。澁者陽氣有餘。難經三陰三陽。滑澁對舉。千金曰。滑者多血少氣。澁者多氣少血。皆偶言也。以二義考之。陰氣有餘者血多也。血多則氣少。脈者血之府也。營行脈中。今血多故流利。固滑。陽氣有餘者氣多也。氣多則血少。故艱澁而散。一止復來。先明氣血之多少。斯知滑澁之理。

洪微者。脈之盛衰也。血熱而盛。氣隨以溢。滿指洪大。衝湧有餘。洪爲脈之盛也。氣虛而衰。血隨而澁。應指微細。欲絕非絕。微爲脈之衰也。

緊緩者。脈之急慢也。緊爲傷寒。寒則傷營。營受寒邪。脈絡激搏。若風起水湧。既如切繩。又如轉索。緩爲風結。皮膚不仁。營血不流。衛氣獨行。不能疾速。血虛頑痺。脈爲緩慢。營受寒邪。則脈緊。二脈由營而見。沈氏曰。緊爲陰。陰主寒。寒則物斂。而有拘攣之象。又主痛。諸痛皆原於寒。又主宿食。由胃虛挾寒。不能腐化。故也。緩爲陽熱主血虛。血虛則脈體弱。又主氣虛。氣虛則脈體無力。又主風。風

者陽邪主舒啓縱弛故也
動伏者脈之出處也出見於外故數見關上如豆大出類而異於三部者動也藏於內不見其形脈行筋下者伏也二者猶人物之出處也
結促者因之以別陰陽之證也陽盛則促陰盛則結脈徐而時止雖有止非死脈也代則死脈也促結爲偶而代無對　脈不可以偶對言者不收藏也三因方並爲偶名而以弦弱乳微濇革散代亦爲偶非一陰一陽也因知其不可盡以偶言也必一陰一陽而後乃偶然又有脈偶而同見者如大小緩急疾徐疏數之類經曰前大後小前小後大來疾去徐來徐去疾去不盛來反盛去盛來不盛乍大乍小乍短乍長乍疏乍數是二脈偶見也亦有兩手偶見者如左大右小左小右大之類
比者所以明相類之脈比其類而合之因其疑也辨其異而分之決其疑也內經曰脾盛浮似肺腎小浮似脾肝急沈似腎此皆工者之所亂也然從容得之以知其比類也注云以三藏相近故脈象參差而相類是以工惑亂爲治之過失矣必從容比類而得三藏之形狀故浮緩曰脾浮短曰肺浮而滑曰心急緊而散曰肝搏沈而滑曰腎不能比類則疑惑彌甚是以脈經立相類之脈今立比字爲綱使從容比類先明於未診之先免交疑於持脈之際脈經曰浮與乳相類一曰與洪相類弦與緊相類滑與數沈與伏微與濇收與弱緩與遲革與實千金云牢與實今細詳之有弦細有乳虛有濇乳有洪散有牢伏有數脈同類者洪散俱大也而散無力濇弱同極軟而細也有浮沈之異微細俱小也而微無力乳類浮也按之邊有中無濇類乳也按之如無沈伏牢同居下也按有餘曰沈按實大長弦曰牢按不見脈行筋下曰伏弦細同直長之形同收斂之義也亦有大小之分弦如弦之直細如線之細遲緩同慢也有三至四至之異大慢小衰之別濇微易識也何疑乎相類牢與實革與實非相類也脈賦云洪與實形同彷彿是相類也洪實同有力而大也洪分沈浮之異實合浮沈而皆有力弦與緊之異弦左右無而中直如弦緊左右彈而有如帳索雖相類而甚相遠也又有數脈之相類如濇促結代同一止也而全不同他如濇弱遲如乳虛如微細濇弱濇已辨於各脈條下

類易曰方以類聚又曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也內經曰脈合陰陽又曰察之有紀從陰陽始衆脈陰陽各以類從知乎此則七表八裏九道之非不謬因於先入之言矣旨哉蔡西山之論也曰凡中脈不大不細不長不短不浮不沈不滑不濇應手中和意思欣欣雖以名狀者爲胃氣其太過爲大爲長爲實爲堅爲強爲浮爲乳爲滑爲洪爲數爲沈爲結爲伏爲濇爲微者皆陰也陽搏陰爲弦陰搏陽爲緊陰陽相搏爲動寒虛相搏爲革陰陽分離爲散陰陽不續爲代

雖經曰諸陽爲熱諸陰爲寒數則爲熱遲則爲寒浮爲表沈爲裏三因方云博則二十四字不濫祥毫約則浮沈遲數總括綱紀故知浮爲風爲虛沈爲濕爲實數爲熱爲燥風濕寒熱屬外虛實冷燥屬內內外既分三因頓別三點劃立之亦以浮沈遲數四字爲綱以教學者浮風沈氣遲冷數熱

分別三部爲證此誠初學入門然必博學反約然後能知脈之妙若濫以此自足則今汝蹇矣故述此於分合比偶類五字之後

診雜病生死候歌

五十不止身無病數內有止皆知定四十一止一藏絕卻後四年多沒命三十一止即三年二十一止二年應十五一止一年殂以下有止看暴病

柳氏曰以動數候脈是喫緊語候脈須候五十動知五藏之氣有無缺失今人手指到病人腕臂便以爲見了殊不知五十動見豈彈指間事相習成風以疾速爲神奇盧山劉文叔之說曰三點以手中指點人三部脈生死吉凶多驗舉徒相傳亦用之劉果三點之神耶抑亦醫色得之耶色可傳脈不可傳古人以切脈爲上工如扁鵲飲上池水能洞見人藏府病如華陀刳骨剔胃是豈切脈而得之歟後世聖神之術不常有所當學者診脈以知內臺以問證察言觀色以知外則可耳　脈經曰脈來五十投而不止者五藏皆受氣即無病四十投而一止者一藏無氣卻後四藏死以至十投一止者四藏無氣藏中死其言幾藏無氣以分別幾歲之死期予竊疑之內經曰腎絕六日死肝絕八日死心絕一日死果此藏氣絕又安能待四藏三藏乎大抵五十動者脈之大數要必候五十動不可不及五十動而遽不候也或問候止脈何處數起曰得止脈後再從始至脈數起看得幾至而止爲數

診臟病歌

兩動一止或三四三動一至六七死四動一止卻八朝以此推排但依次

此是十動內有止脈者然雖必關臟病有此久病亦有見此者但當以至數定死期不必專於診臟病也

形脈相反歌

健人脈病號行尸病人脈健（亦如之）（濇而短長肥瘦並如此細心診候有依稀）（脈病相違亦著斯）

內經曰形氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足生仲景曰脈病人不病名曰行尸以無王氣卒應摟不識人則死人病脈不病名曰內虛以無穀神雖困無苦今脈訣曰亦如之是與行尸同也故改之仲景曰肥人實浮瘦人實沈肥人當沈今反浮故實之瘦人當浮今反沈故虛之大小長短皆如其人之形性則吉反之則爲逆肥人脈細小如絲身濇而脈來往滑身滑而脈來往濇皆死　前言形脈相反又有脈病相反不可不慎舉難經所謂脈不應病病不應脈者是也素問曰形盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大胸中多氣者死形氣相得者生三五不調者病形肉已脫九候雖調者死病熱脈靜濇而脈大脫血而脈實脾在中脈實堅病在外脈不實堅者皆難治難經曰病若閉目不欲見人脈當肝脈弦急而長而反得肺脈浮濇而短者死也病若緊實而數反得沈濇而微者死此類皆脈病相反脈訣所缺今改此歌末句以著之

診四時病五行相克歌

春得秋脈定知死。死在庚辛申酉裏。夏得冬脈亦如然。還于壬癸爲期斷。嚴冬診得四季脈。戊己辰戌逗是尅。秋得夏脈亦同前。爲緣丙丁相刑尅。季月季夏得春脈。克在甲寅應病極。直逢乙卯亦非良。此是五行相鬼賊。

內經難經。並以天干五行論克賊。脈訣又以地支並論。若用支干上下純爲鬼邪之日爲死。必六十日方過。若死期之近何以克之。不若以天干一旬爲期。依內經爲斷。不失之拘也。內經又曰。夫邪氣之客於身也。以勝相加。至其所生而愈。（謂我所生者。）至其所不勝而甚。至其所生而持。（謂生我者。）自得其位而起。必定五藏之脈。乃可言間甚之期。

決四時（虛實）五邪歌。

一藏有五邪。今只取虛實微三邪作歌。及立名。又只取二邪而遺其一。今改作診五邪歌。

春得冬脈只是虛。嫩令補腎病自除。若是夏脈緣心實。還應瀉子自無嘘。（夏秋冬月皆如是。）（所謂爲微不勝賊。）

在前爲實後爲虛。春中若得四季脈。不治多應病自除。（今添補句云正邪自病。通五藏仿此。）

難經曰虛則補其母。實則瀉其子。虛當補母。人所共知。千金曰心勞甚者。補脾氣以益之。脾旺則咸於心矣。若乃勞則補其子。人所未聞。蓋母生我者也。子繼我而助我者也。方治其虛。則補其生我者。與郭氏葬書本體得氣。遺體受蔭。同義。方治其勞。則補其助我者。與荀子所謂未有子富而父貧。同義。此補虛與治勞之異也。

傷寒歌

傷寒熱病同看脈。滿手洪拍拍。出至風門遇太陽。一日之中見脫厄。過關微有慢關候。直至伏時並候覓。掌內迢迢散慢行。遼軋痛疔多不的。大凡當日問途程。通數洪微更消息。

熱病須得脈浮洪。細小徒費用神功。汗後脈靜當便差。喘熱脈亂命應終。

此歌未足以括傷寒之綱要也。三百九十七法。一百一十三方。學者以仲景傷寒論爲祖。成無己注及明理論。許叔微百證百問。薛宋二氏鈐。則又發明仲景之旨。與外此則闕。葢寶鑑金匱要略。無求子百問。南陽白問。脈訣規正。安常。王仲弓。盧祀。韓祇和。孫用和。及諸家之書。通貫參考。守之以正。條用之以活法。方爲盡善。此歌其能盡乎。予又病世之醫者。往往以活人言自是。不復祖之仲景之論。況南陽失仲景之旨者有之。不特宋氏所譏。況傷寒爲大病。生死在五六日間。可不盡心乎。

陽毒陰毒歌

陽毒健氣四肢煩。而赤生花作點斑。狂言妄語如神鬼。下痢頻多喉不安。汗出遍身應大差。魚口開張命欲翻。有藥不尊但與服。能過七日漸須安。

陰毒但寒身體重。背強眼痛不堪任。小腹急痛口青黑。毒氣衝心轉不禁。四肢厥冷惟思吐。咽喉不利脈細沈。若能速疾將輸下。六日君過兒喜深。

陰陽二毒病有輕重。治有淺深。仲景略言於金匱要略。後世傳述。備載諸書。亦難以二歌盡。

診諸雜病生死脈候歌

病源各不一。今歌本診生死之脈。故不論病源。只論脈之生死。

腹根浮大是出厄。盧小命殆須努力。

此篇大抵以脈病相應不應言生死。然亦不可專執。臨病參考可也。如中惡腹脹脈緊細者生。浮大者死之類。

下痢微小卻爲生。脈大浮洪無差日。

下痢脈代經者不死。雜色惡病脈微弱。霧冷傷陽脈細欲絕。冷熱不調者。洪大易治。微遲小細難治。

恍惚之病（定顛）爲狂。其脈實牢保安吉。寸關尺部沈細時。如此來聞人救得。

恍惚顛狂三病也。恍惚心不寧。陰顛而陽狂也。脈經曰。顛病脈虛可治。實則死。蓋重陰爲顛。謂陰部內見沈滿微短脈。是陽脈不見而陰獨盛。故爲顛疾。經曰陰氣從下下虛上實。故作顛疾。則沈細脈。是病相應而不逆矣。

消渴脈數大者活。虛小病深危難脫。

三消之證內消渴一證。沈小者生。實堅大者死。此外如少陰自利而渴。脈必沈。中暑渴脈虛。蓐後渴脈多弱。難專以虛小爲渴之因。

水氣浮大得延生。沈細應當是死別。

水病之證不一。脈亦不一。三因方曰。沈伏相搏名曰水。葢沈者乃水之病脈。但風水皮本脈浮。石水腰沈。黃汗沈遲。營衛病原病證爲斷。況水病肌肉爲水所脹。脈元多沈。若脈出必死。脈病相反也。今曰浮大延生。更宜參審。

霍亂之候脈微遲。氣少不語大難醫。三部浮洪必救得。古今諜定更無疑。

病原曰脈伏及代而亂者。霍亂也。不亂猶不治。微細不可治。霍亂吐可治。脈經所無。脈訣自創之例也。通真子曰。清濁相干霍亂時。脈如微細是相宜。不言氣劣微遲小。此候神工亦莫醫。通真子注脈訣。不遵之而。自作歌。一曰浮洪可救。一曰微細相宜。何哉。葢病原不同。脈隨而見。以病原參之。勿一例但曰霍亂而已也。

鼻衄吐血沈細宜。忽然浮大卽傾危。

吐血證中有卒中惡吐血。脈沈數細者死。浮大疾快者生。又雜病衄血實熱。傷寒衄血實熱。表熱者脈必浮。

咳而尿血鼠瘦形。其脈疾大命難任。咳血之脈沈弱吉。忽若實大死來侵。金瘡血（盛）出虛細活。急疾大數必危身。

此六句參錯在後。今移於此。從失血類。

脈訣所論金瘡本於脈經中藏經。皆論已出血之脈。若金瘡未出血則又別。經歷內傷。堅強安。小弱凶。

頓仆內傷同。胥楊內有結血。寸大生。虛小死。鉄撲傷損。浮大易安。謂血散外。沈細緊實多死。謂惡血攻歐。

病人脈健不用治。健人脈病號行尸。

病人脈健。此云不用治者。是前形脈相反歟。何其謬也。

心腹病脈沈細。差浮大弦長命必殂。

仲景曰。假令病人云。腹內卒痛。浮而大。知其差也。何以知之。若裏有病者。脈當沈細。今浮大。故知愈也。

病原曰。若其人不卽愈者。必當死。以脈病相反也。然心痛與腹痛各異。凡痛五藏相干。而心痛脈各異。見。惟真心痛不問脈。旦占夕死。夕占旦死。腹痛病原亦不一。虛寒緊弦。積寒沈緊而牙。肝腎弦大。爲寒痛。故知弦長亦難以死斷。

頭痛短氣應須死。浮滑風痰必易除。

脈訣此言。只可斷風寒頭痛一證而已。頭痛共八經。又有伏暑、積聚、痰厥、伏痰、腎痰、產後失血、風寒在膈、邪熱上攻、氣虛氣攻、諸證不同。隨證診脈。斷生死可也。

中風口噤遊浮吉。急實大數三魂孤。魚口氣粗難得差。面赤如妊不久居。中風髮直口吐沫。煩燥悶亂起復蘇。咽喉曳鋸水難嚥。搖頭上竄氣長噓。病人頭面青黑暗。汗透毛端恰似珠。眼小目瞪不須治。喘汗如油不可蘇。

中風口噤至此皆言中風之死候。簡易方云風邪中人。其狀奄忽。故六脈多沈伏。亦有脈隨氣弊。指下洪盛者。當此之際。脈亦難辨。但以證參爲是。中風。目閉口開。手撒遺尿。聲如鼾睡者。必難療。

內傷腹眼痛滿益。心下勞強。乾嘔頻。手足煩熱。脈沈細。大小便澁死多眞。

柔問曰。五實死。脈盛、皮熱、腹眼、前後不通。悶瞀。此謂五實。自汗得後利。則實者活。今脈訣增乾嘔。去悶瞀。又以脈沈細與病反。決以爲死。此條宜參之內經。

外實內熱吐相連。下清注穀糈難安。忽然診得脈洪大。莫救神功定不痊。

協熱下利。胃熱嘔吐。脈亦洪大。不可遽以死斷。

內外俱虛身冷寒。汗出如珠微嘔煩。忽然手足脈厥逆。憎不安寧必死矣。

柔問曰。五虛死。脈細皮寒濈利。前後。飲食不入。若糜粥入胃。泄注止。則虛者活。今脈訣內外俱虛。與內經多異。全本脈經。

上氣浮腫肩息頻。浮滑之脈卽相成。忽然微細應難救。神功用盡也無生。

脈經曰。上氣面浮腫肩息。其脈大。不可治。加利甚者必死。今脈訣以微細爲難救。似與脈經相悖。

通眞子改差無由作。命須傾。當協訛也。

上氣喘急候何寧。手足溫煖滑滑生。反得寒澁脈厥逆。必知歸死命須傾。

此二句移在此。從氣色類。

中惡腹脹緊細生。若得浮大命逡巡。

面色忽然黧之齊。近之如黑卒難當。

面赤目白憂息氣。待過十日定存亡。而青目黃中時死。診候須看兩日強。而黃目青衆惡傷。榮衛不通立

須亡。（面青目白赤須亡。）

據脈經改添此句。內經曰。凡面色見黃爲有胃氣。皆不死。面黃目青酒齇類邪氣在胃。衰非身面黑目白命門敗。困極八日死來徙。

此四句并上面赤目白定存亡二句。刊誤本無。據刊本添之在此。

面無精光如土色。不能食時四日亡。目無精光齒牙黑。面白目黑亦哀。鼽口如魚口不能閉。氣出不返命。口鼻氣出不復回。脣反無文（黑）如似煤。皮毛焦乾爪枯折。造程二日定知哀。面黑齒痛目如盲。自汗如水腰折。顏皮肉潤（結）鄂髮無澤。四日應當命不存。

脈經曰病人不能語者。不治。熱病者可治。又有風癉不語。而卒不死者。有妊娠胞脈絕不語。侯產後自能言。

尸臭元知。（尸）不高。人中靣滿。發脅青。（俗本作胃胃非）三日須知命必傾。（補類）（黑）類赤入（病久）必死。

上云尺微。下云尺數。可見上尺爲誤。女脈在關下。尺脈常盛。若尺微則無陰。爲病矣。脈經云妊娠初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。內經曰手少陰脈動甚者。妊子也。又云陰搏陽別。謂之有子。陰謂尺也。

面黑齒痛目如盲。自汗如水腰折。顏皮肉潤（結）鄂髮無澤。四日應當命不存。

改結爲鄂。本難經。

診婦人有妊欵（欵文不倫。今據諸類。）

肝爲血。分肺爲氣。血爲榮。分氣爲衛。陰陽配偶不參差。兩藏通和皆類例。血衰氣旺定無妊。血旺氣衰應有體。

已上論成妊之原。

（尺）寸微關滑尺帶數。流利往來併雀啄。小兒之脈已見形。數月懷胎猶未覺。

上云尺微。下云尺數。可見上尺爲誤。女脈在關下。尺脈常盛。若尺微則無陰。爲病矣。脈經云妊娠初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。內經曰手少陰脈動甚者。妊子也。又云陰搏陽別。謂之有子。陰謂尺也。又云尺微下云尺數。可見上尺爲誤。女脈在關下。尺脈常盛。若尺微則無陰。爲病矣。脈指南云脈中搏謂搏擊於手。尺脈搏擊。與寸口殊別。則陰氣挺然。爲妊之兆。此即所謂寸微尺數也。脈指南云脈動入產門者有胎也。謂出尺脈外。名曰產門。又云尺中脈數而旺者。胎脈也。爲血盛也。關滑。雀啄。脈經並不載。素問曰滑爲多血少氣。故有子。此脈訣所自增也。流利往來。滑脈之形。雀啄者。脈指南云關上一趺一止者一月。二趺一止者二月。餘仿此。推之萬不失一。此所謂雀啄。雀啄在他病爲死形。

手足爪青呼鼠多。筋絕九日定難過。髮直如麻（平日）壅死。

中藏經曰。腸絕髮直。汗出不止。不得屈伸者。六日死。髮眉俱衝起者死。髮如麻喜怒不調者死。髮直者十五日死。今脈訣作半日死。與本文不協。蓋有六日十五日之異。今改曰應是死。　脈訣只欵骨肉筋腸四絕。除心肝絕在前。又有腎絕。小便赤澁。下血不止。耳乾。腳浮。舌腫。六日死。是腫九日死。脾絕。被脾欵欲中。肝絕。汗出不止。恐懼不安。伏臥。目直面青。八日死。胃絕。齒落面黃。七日或十日死。今附注於此。庶具載不遺。肉絕中藏經元無。面脈訣自增。故礙理。

尋衣（語死）（語無多。）

脈經曰尋衣縷縷語者不可治。陰陽俱絕。尋衣撮空妄言者死。

論五藏察色候欵

面黑青黑。舌卷青。四肢乏力眼如盲。流血不止是肝絕。（八日應當）（日遇庚辛。命必傾。）

此云八日從甲數至庚爲八日。此言則膠柱矣。從而改爲庚辛。

面黯眉悉直睫看。又發寒腫沒文理。狂言亂語心胸熱。一日之內到冥間。

口鼻氣出不復回。脣反無文（黑）如似煤。皮毛焦乾爪枯折。造程二日定知哀。

面黑齒痛目如盲。自汗如水腰折。顏皮肉潤（結）鄂髮無澤。四日應當命不存。

改結爲鄂。本難經。

診婦人有妊欵（欵文不倫。今據諸類。）

肝爲血。分肺爲氣。血爲榮。分氣爲衛。陰陽配偶不參差。兩藏通和皆類例。血衰氣旺定無妊。血旺氣衰應有體。

已上論成妊之原。

（尺）寸微關滑尺帶數。流利往來併雀啄。小兒之脈已見形。數月懷胎猶未覺。

上云尺微。下云尺數。可見上尺爲誤。女脈在關下。尺脈常盛。若尺微則無陰。爲病矣。脈經云妊娠初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。內經曰手少陰脈動甚者。妊子也。又云陰搏陽別。謂之有子。陰謂尺也。又云尺微下云尺數。可見上尺爲誤。女脈在關下。尺脈常盛。若尺微則無陰。爲病矣。脈指南云脈中搏謂搏擊於手。尺脈搏擊。與寸口殊別。則陰氣挺然。爲妊之兆。此即所謂寸微尺數也。脈指南云脈動入產門者有胎也。謂出尺脈外。名曰產門。又云尺中脈數而旺者。胎脈也。爲血盛也。關滑。雀啄。脈經並不載。素問曰滑爲多血少氣。故有子。此脈訣所自增也。流利往來。滑脈之形。雀啄者。脈指南云關上一趺一止者一月。二趺一止者二月。餘仿此。推之萬不失一。此所謂雀啄。雀啄在他病爲死形。

三部（沈正等無疑）（浮沈按尺內不止眞胎孕。）

脈經曰三部浮沈正等。按之無絕者。有妊也。今脈訣去浮以疑易經。云沈正等無疑。誤甚。今改之。夫正等者。即仲景所謂寸關尺三處大小浮沈遲數同等也。仲景以同等爲陰陽和平之脈。雖劇當愈。叔和以正等又按無絕。爲有妊之兆。眞吉徵也。內經腹中論曰何以知懷子之且生也。岐伯曰身有病而無邪脈也。所謂身有病。謂經閉也。尺脈來而斷絕者。經閉月水不利。今病經閉。而脈反如常不斷絕者。妊娠也。

（滑疾不散）（胎三月。但疾不散五月母。）

脈經曰脈滑疾。重手按之欵者。胎已三月也。重手按之不散。但疾不滑者。五月也。今改上句從脈經。已上論三月內有胎之兆。然未知男女之兆也。四月方可以別。故此以下乃分男女之診。分作兩類乃明。

左疾爲男。右爲女。流利相通邊來去。兩手關脈大相應。已形亦在前通語。

脈經曰妊娠四月欲知男女法。左尺偏大爲男。右尺偏大爲女。左右尺俱大。生二子。大者如實狀。左疾爲男。右疾爲女。俱疾生二子。既分左右脈疾。又云流利相通。又云兩手關脈大相應。乃是左右尺脈疾大。上與關大相應。又流利相應。與寸通應。但分左右。尺以別男女。左陽右陰。以位定也。池氏以左疾爲左寸心部屬太陽經。以右疾爲右寸肺部屬太陰經。蓋惑於脈賦太陰洪而女孕。太陽大而男孕。不知

脈賦惑於脈訣之差。蓋脈賦脈訣。皆竊叔和之名以行世。所述之脈。醇疵相半。遂使之賦皆代求有而世鮮知其非。明於醫者。間亦改之一二。而未能盡正云。

左手〔太陽浮大〕沈實診爲男。右手〔太陰沈細〕浮大診爲女。

脈經曰。得太陰脈爲男。得太陽脈爲女。太陰脈沈。太陽脈浮。又云左手沈實爲男。右手浮大爲女。左右手俱沈實。猥生二男。左右手俱浮大。猥生二女。李氏雖改脈訣沈細爲沈大。猶未知太陽脈沈非男。脈經作女診也。太陰脈沈非女。脈經作男診也。又以太陽爲左手心部。太陰爲右手脇部。是又惑於脈訣脈賦之差。狗池氏以舛注舛之非也。脈經雖曰太陽脈沈爲男。太陰脈浮爲女。亦不明言以何經爲太陽。太陰。當於何部診之。不若脈經後條浮大爲女。沈實爲男。爲明白。故依後條改之。

諸陽爲男諸陰爲女。指下分明。是記取。

脈經曰。左右尺俱浮爲產二女。不爾則男作女生。前云右浮大爲女。左沈實爲男。是獨以左右脈各異立言。今左右俱浮爲二男。俱沈爲二女。是並左右兩尺脈一同以立言。其於諸陽男諸陰女。未嘗差也。左沈實左疾。左偏大。與俱浮或以脈。或以位。皆陽也。右浮大。右疾。右偏大。與俱沈或以脈。或以位。皆陰也。此二句總結男女分診定法也。　巳上辨四月之後。妊娠男女之診。

〔母乘子〕夫乘妻〕母來子。夫乘妻〕今縱氣謂妻乘夫今橫氣助子乘母今逆氣參。〔夫乘妻〕母來子。今順氣護。

仲景謂脈有相乘。水行乘火。金行乘木。曰縱。謂其氣直衝。乘其所勝也。火行乘水。木行乘金。曰橫。謂其氣橫逆。反乘所不勝也。水行乘金。火行乘木曰逆。謂子加於母而氣逆也。金行乘水。木行乘火。爲順。謂由母至子。其氣順也。李晞范不知此論相乘。脈中夫婦母子。卻作人身形之夫婦母子解之。理不能通。然脈訣引此以診別男女妊形。據脈經別殺於前。不哉在診妊娠之條。本只是取仲景所論相乘之脈。脈訣不相甄別。混引以歌妊娠。今姑依仲景解之。此四句元在後。今移在此。與縱橫逆順從類。其縱順二脈。改依仲景元文。

左手帶縱兩箇兒。右手帶橫一健女。左手脈逆生三男。右手脈順生三女。寸關尺部皆相應。一男一女分形證。

巳上十句。皆脈訣自撰之辭。恐難以診妊娠男女之別也。且相乘之脈。乃五藏之邪。發爲病證。見之於脈。妊娠乃陰胎和平。陽施陰化以成形。豈有逆於理。乘於藏。現於脈。用爲男女之診。又寸陽尺皆應。卽是左右手俱後如一也。卽脈經所謂三部浮沈正等之脈。何以應一男一女乎。　巳上係脈訣差取仲景所論相乘之脈。以論妊娠。今條其非如前。

往來三部遲流利。滑數相參。皆替替。陽盛陰虛。脈得明。遍滿胸堂。皆逆氣。

此實熱阻之證之脈。

小兒足日胎成。聚身熱脈氣無所苦。汗出不食。吐逆時。精神結儐其中住。

此亦謂孕阻證也。脈亂。蓋謂滑數而躁疾也。非謂雜亂無次序者。　此八句。皆謂妊娠疾脈。有時子死母身存。或卽母亡存子命。牢緊弦滑者安。沈細而微。歸泉〔路〕脈改以診。沈細而微。謂三部俱如此。凶兆也。　此四句論妊婦生死脈證之別。

妊婦雜病生死歌

血下如同月水來。漏極胞乾生殺胎。亦損妊母須臾盡。爭遣神丹救得回。

通真子曰。此只論漏胎候也。夫胎之漏。或因入房勞損。損輕則漏輕。損重則漏重。但漏血蓋則死。然安胎有三法。因母病而動胎。但治母疾。母因以病。但治胎。則母自安。若胎有不堅。致動。其胎自安。

妊娠心腹急痛歌

心腹急痛面目青。冷汗氣絕命必傾。血下不止胎衝上。四肢冷悶定傷身。

妊娠倒仆損傷歌

墮胎倒仆或舉重。致胎死在腹中居。已損未出血不止。衝心悶痛母魂孤。

妊婦傷寒歌

傷寒頭痛連百節。氣急衝心溺如血。上生斑點赤黑時。壯熱不止致胎滅。嘔痛裂。六七日來熱腹中。小便不通大便結。

見此證不損胎。而妊母亦或致死。治法詳見活人書。

產後傷寒歌

產後因待熱病候。脈細四肢發者生。脈大忽然肢逆冷。須知其死莫留停。

脈證身熱。待之傷寒。產後熱病。脈必洪大。難便。以脈大爲死證。必遵內經爲汗。衰而仍大。是爲陰陽交。乃可斷死。汗後脈靜。乃可斷生。豈可以病狂生。四肢冷發。當參以病證。或陽厥陽厥。或作汗而厥。今脈訣所歌。膠柱刻舟之論。

產難生死歌

欲產之婦脈離經。沈細而滑也同名。夜半髮痛應分娩。來日日午定知生。

脈經曰。離經其脈浮。設腹痛引腰脊。爲欲生也。但離經者不產也。又云其經者常也。謂離其常處爲離經。假如妊婦昨日見左沈實爲男之脈。今日異於平日。又見腹痛。是知將誕也。通真子引難經一呼三至曰離經爲解。日離經以解沈細而滑。皆非也。難經言損至二脈。雖同名離經。其脈與理脈浮也。不會引拔離經之文。今脈訣因其言脈浮。又添沈細而滑。同名離浮大爲女。若只脈浮。豈離經。若平常見浮大爲女之脈。何以辨離經。故又常經爲沈滑也。聚惠方云。夜半子時髮腹痛。來日午時必定生產。謂子午相衝。正半日時數也。通真子

曰夜半痛日午生此言恐未爲的又曰腹痛而腰不痛者未產也若腹痛連腰痛甚者即產所以然者腎候於腰胞繫於腎故也診其尺脈轉急如切繩轉珠者即產也生產有難易痛來有緊慢安可定半日當斷以活法

身重惡熱寒又煩舌下之脈黑復青及舌上冷子當死腹中須臾母歸冥而赤舌青細夥君母活子死定應難脣口俱青沫又出須臾母死子活定知眞不僞若能君臣驗尋之賢哲不虛陳

脈指南作而青舌亦蓋而以候母舌以候子今云子活合以舌赤爲是若云舌青則與前而赤舌青母活子死之候相反若胎先下其子得活如未下子母俱亡　自身重體熱寒又類至此並不用脈只以外候參決子母生死蓋以臨產脈不可考但當以察色而知之

新產生死歌

新產之脈緩滑吉實大弦急死來侵若得沈重小者吉忽若整牢命不停寸口(當)疾不調死沈細附骨不絕生審君此候分明記長須念取向心經

脈經曰產後寸口脈緊疾不調者死沈微附骨不絕者生今脈訣流脈經作歌既用其文不明其理擅改緊爲濇其謬以爲濇濇疾駛並行方可言不調反以緊疾爲非是不知脈濇則不疾脈疾則不濇其不調者以緊疾也產後失血多五藏虛故以緩滑沈微不絕爲脈應病濇爲少血亦應病之脈惟緊疾不調勻則脈形之速緊浮於上故云死一字之差生死頓異

小兒生死候歌

通眞子曰經云六歲以下爲小兒十八以下爲少年二十以上爲壯年五十以上爲老年其六歲以下經所不載是以乳下嬰兒病難治者皆無脈可以考也中古有巫方立小兒顱顖經以占天壽疾病生死相傳習有少小方焉迄乎晉宋推諸醫家又有巢氏作小兒病源候論今脈訣此歌乃萬分之一爾愚謂自宋以來專小方脈者稍多如錢氏朱氏張氏幼幼新書全嬰方嬰孩寶鑑活幼口議鴻氏妙選寶祕方及諸家名方必博覽方可況小兒之脈當以大指展轉分按三部且其脈未定當以察形色爲上工諸肹中諸變蒸五肹急慢驚風搐搦與大人殊其他雜病與大人治療則同但藥劑有大小輕重

小兒乳後飜嘔逆吐衄脈亂無憂慮

脈經曰是其日數應變蒸之時身熱脈亂汗不出不欲食飜吐呪者脈亂無苦也

弦急之時被氣閉脈(緩)沈只是不消乳

脈經曰小兒脈沈者食不消脈訣云緩非也

緊數細快亦少苦(虛濇邪氣藏風助)脈緊り是脈細數

脈經曰緊爲風痛本事方同今脈訣作虛濇非

利下宜腸急痛時浮大之脈隨泉路

此非脈經小兒脈內所遺已詳解在下利微小卻爲生下　脈經略舉數脈立證以備其變是一脈自爲一證李暗范乃總爲吐後脈證何見之不明且小兒吐有數等今脈亂之吐乃歐變蒸之候

小兒外證十五候歌

眼上亦脈下貧瞳人顧門雁起筋及作坑鼻乾黑燥肚大筋青目多直視視不轉睛指甲黑色忽作鴟聲齒舌出口噤齒咬人魚口氣急啼不作聲蛔蟲既出必是死形用藥速急十無一生

附錄辨奇經脈

兩手脈浮之俱有陽沈之俱有陰陽陰皆實盛者此爲衝脈也衝督之脈者十二經之道路也衝督用事則十二經不復朝於寸口其人皆苦悗悗狂癡否者必當猶豫仍兩心　兩手陽脈浮而細微綿綿不可知其有陰脈亦復細綿綿此爲陰蹻陽蹻之脈此家曾有病鬼魅厥死苦悗悗亡人爲禍診得陽蹻病拘急陰蹻病緩　尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰脊強痛不得俛仰大人癲疾小兒風痛　脈來中央浮直上下痛者督脈也動苦腰背膝寒大人顛小兒癎　尺寸脈俱牢一作其直上直下　此爲衝脈胸中有寒疝也

巳上元文俱浮脈條下

脈來中央堅實徑至關者衝脈也動苦小腹痛上搶心有瘕疝絕孕遺失溺腸支滿煩　橫寸口邊丸丸者任脈也若腹中有氣如指上搶心不得俛仰拘急　脈來緊細實長至關者任脈也動苦少腹繞臍下引橫骨陰中切痛

巳上元文俱實脈條下

吳先生云五藏六府之經分布手足凡十二脈魚際下寸內九分尺內十分者手太陰肺經之一脈也督者於寸關尺輒名之曰此心脈此肺脈此浮脈此腎脈非也兩手三部皆肺藏脈而分其部位以候他藏之氣焉耳其說見於崇間脈要精微論而其所以之故則秦越人八十一難之首章發明至矣是何也脈者血之流派氣使然也肺居五藏之上氣所出入門戶也脈行始肺終肝而後復會於肺故其經穴名曰氣口而爲脈之大會一身之督必於是占焉

脈訣刊誤附錄

診脈早晏法

岐伯曰診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂故乃可診有過之脈切脈動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決死生之分（機按診法以平旦且主無病者言若過有病則隨時皆可以診不必以平旦爲拘也于此又知前聖決死生之分不專於脈而不廢問其餘是不知前聖垂訓之意也故表而出之示後人）

十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之候者然寸口脈之大會手太陰之動脈也脈行五十度周于身而復會于手太陰太陰者寸口也（口爲五藏主也雖經四關而五藏皆以胃氣爲生其脈在關上是人之生死亦係於關上入關十四關又皆人之有尺皆如樹之有根脈有根本人有元氣故知不死是生死又係於尺脈也可見寸關尺各有所知故越人所以錯綜其義也）

寸關尺

脈經曰從魚際至高骨卻行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陽三陰三陽生于尺動于寸陰生于寸動于尺（機按雖經曰尺寸脈之大

五藏平脈

心脈浮大而散

心合血脈故脈道粗者爲大又稍加力脈道闊軟者爲散餘倣此（機按此以氣口脈而得之）

肺脈浮滿而短

肺合皮毛故脈循皮毛而行得者爲浮稍加力脈道不利爲滿又稍加力及本位曰短（按至皮毛面得者爲浮稍加力及本位曰短）

肝脈弦而長

肝合筋故脈循筋而行手筋脈近爽爭弦相似爲弦爽稍加力脈道過者爲長（按至筋骨沈實而稍疾者肝脈也）

脾脈緩而大

脾合肌肉故脾脈循肌肉而行持脈指法如九藏之重按至肌肉如微風輕輕拂稍之狀爲緩又稍加力脈道粗者爲大（按至肌肉而得之）

腎脈沈而軟滑

腎合骨髓故脈行一寸至骨卻行一寸其中名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陽三陰三陽生于尺動于寸陰生于寸動于尺（機按雖經曰尺寸脈之大會尺中名曰陰也故其脈自尺之內一寸九分之所治也從一寸九分至二寸九分之所治也于一寸九分之間取之一寸九分尺之所治也于一寸九分尺之內一寸九分之所治也從一寸九分至二寸九分之所治也于二寸九分之間取之二寸九分尺之所治也于二寸九分尺之內二寸九分之所治也從二寸九分至三寸九分之所治也于三寸九分之間取之三寸九分尺之所治也于三寸九分尺之內三寸九分之所治也從三寸九分至四寸九分之所治也于四寸九分之間取之四寸九分尺之所治也于四寸九分尺之內四寸九分之所治也從四寸九分至五寸九分之所治也于五寸九分之間取之五寸九分尺之所治也于五寸九分尺之內五寸九分之所治也從五寸九分至六寸九分之所治也于六寸九分之間取之六寸九分尺之所治也于六寸九分尺之內六寸九分之所治也從六寸九分至七寸九分之所治也于七寸九分之間取之七寸九分尺之所治也于七寸九分尺之內七寸九分之所治也從七寸九分至八寸九分之所治也于八寸九分之間取之八寸九分尺之所治也于八寸九分尺之內八寸九分之所治也從八寸九分至九寸九分之所治也于九寸九分之間取之九寸九分尺之所治也于九寸九分尺之內九寸九分之所治也從九寸九分至十寸九分之所治也于十寸九分之間取之十寸九分尺之所治也于十寸九分尺之內十寸九分之所治也從十寸九分至十一寸九分之所治也于十一寸九分之間取之十一寸九分尺之所治也于十一寸九分尺之內十一寸九分之所治也從十一寸九分至十二寸九分之所治也于十二寸九分之間取之十二寸九分尺之所治也于十二寸九分尺之內十二寸九分之所治也從十二寸九分至十三寸九分之所治也于十三寸九分之間取之十三寸九分尺之所治也于十三寸九分尺之內十三寸九分之所治也從十三寸九分至十四寸九分之所治也于十四寸九分之間取之十四寸九分尺之所治也于十四寸九分尺之內十四寸九分之所治也從十四寸九分至十五寸九分之所治也于十五寸九分之間取之十五寸九分尺之所治也于十五寸九分尺之內十五寸九分之所治也從十五寸九分至十六寸九分之所治也于十六寸九分之間取之十六寸九分尺之所治也于十六寸九分尺之內十六寸九分之所治也從十六寸九分至十七寸九分之所治也于十七寸九分之間取之十七寸九分尺之所治也于十七寸九分尺之內十七寸九分之所治也從十七寸九分至十八寸九分之所治也于十八寸九分之間取之十八寸九分尺之所治也于十八寸九分尺之內十八寸九分之所治也從十八寸九分至十九寸九分之所治也于十九寸九分之間取之十九寸九分尺之所治也于十九寸九分尺之內十九寸九分之所治也從十九寸九分至二十寸九分之所治也于二十寸九分之間取之二十寸九分尺之所治也于二十寸九分尺之內二十寸九分之所治也從二十寸九分至二十一寸九分之所治也于二十一寸九分之間取之二十一寸九分尺之所治也于二十一寸九分尺之內二十一寸九分之所治也從二十一寸九分至二十二寸九分之所治也于二十二寸九分之間取之二十二寸九分尺之所治也于二十二寸九分尺之內二十二寸九分之所治也從二十二寸九分至二十三寸九分之所治也于二十三寸九分之間取之二十三寸九分尺之所治也于二十三寸九分尺之內二十三寸九分之所治也從二十三寸九分至二十四寸九分之所治也于二十四寸九分之間取之二十四寸九分尺之所治也于二十四寸九分尺之內二十四寸九分之所治也從二十四寸九分至二十五寸九分之所治也于二十五寸九分之間取之二十五寸九分尺之所治也于二十五寸九分尺之內二十五寸九分之所治也從二十五寸九分至二十六寸九分之所治也于二十六寸九分之間取之二十六寸九分尺之所治也于二十六寸九分尺之內二十六寸九分之所治也從二十六寸九分至二十七寸九分之所治也于二十七寸九分之間取之二十七寸九分尺之所治也于二十七寸九分尺之內二十七寸九分之所治也從二十七寸九分至二十八寸九分之所治也于二十八寸九分之間取之二十八寸九分尺之所治也于二十八寸九分尺之內二十八寸九分之所治也從二十八寸九分至二十九寸九分之所治也于二十九寸九分之間取之二十九寸九分尺之所治也于二十九寸九分尺之內二十九寸九分之所治也從二十九寸九分至三十寸九分之所治也于三十寸九分之間取之三十寸九分尺之所治也于三十寸九分尺之內三十寸九分之所治也從三十寸九分至三十一寸九分之所治也于三十一寸九分之間取之三十一寸九分尺之所治也于三十一寸九分尺之內三十一寸九分之所治也從三十一寸九分至三十二寸九分之所治也于三十二寸九分之間取之三十二寸九分尺之所治也于三十二寸九分尺之內三十二寸九分之所治也從三十二寸九分至三十三寸九分之所治也于三十三寸九分之間取之三十三寸九分尺之所治也于三十三寸九分尺之內三十三寸九分之所治也從三十三寸九分至三十四寸九分之所治也于三十四寸九分之間取之三十四寸九分尺之所治也于三十四寸九分尺之內三十四寸九分之所治也從三十四寸九分至三十五寸九分之所治也于三十五寸九分之間取之三十五寸九分尺之所治也于三十五寸九分尺之內三十五寸九分之所治也從三十五寸九分至三十六寸九分之所治也于三十六寸九分之間取之三十六寸九分尺之所治也于三十六寸九分尺之內三十六寸九分之所治也從三十六寸九分至三十七寸九分之所治也于三十七寸九分之間取之三十七寸九分尺之所治也于三十七寸九分尺之內三十七寸九分之所治也從三十七寸九分至三十八寸九分之所治也于三十八寸九分之間取之三十八寸九分尺之所治也于三十八寸九分尺之內三十八寸九分之所治也從三十八寸九分至三十九寸九分之所治也于三十九寸九分之間取之三十九寸九分尺之所治也于三十九寸九分尺之內三十九寸九分之所治也從三十九寸九分至四十寸九分之所治也于四十寸九分之間取之四十寸九分尺之所治也于四十寸九分尺之內四十寸九分之所治也從四十寸九分至四十一寸九分之所治也于四十一寸九分之間取之四十一寸九分尺之所治也于四十一寸九分尺之內四十一寸九分之所治也從四十一寸九分至四十二寸九分之所治也于四十二寸九分之間取之四十二寸九分尺之所治也于四十二寸九分尺之內四十二寸九分之所治也從四十二寸九分至四十三寸九分之所治也于四十三寸九分之間取之四十三寸九分尺之所治也于四十三寸九分尺之內四十三寸九分之所治也從四十三寸九分至四十四寸九分之所治也于四十四寸九分之間取之四十四寸九分尺之所治也于四十四寸九分尺之內四十四寸九分之所治也從四十四寸九分至四十五寸九分之所治也于四十五寸九分之間取之四十五寸九分尺之所治也于四十五寸九分尺之內四十五寸九分之所治也從四十五寸九分至四十六寸九分之所治也于四十六寸九分之間取之四十六寸九分尺之所治也于四十六寸九分尺之內四十六寸九分之所治也從四十六寸九分至四十七寸九分之所治也于四十七寸九分之間取之四十七寸九分尺之所治也于四十七寸九分尺之內四十七寸九分之所治也從四十七寸九分至四十八寸九分之所治也于四十八寸九分之間取之四十八寸九分尺之所治也于四十八寸九分尺之內四十八寸九分之所治也從四十八寸九分至四十九寸九分之所治也于四十九寸九分之間取之四十九寸九分尺之所治也于四十九寸九分尺之內四十九寸九分之所治也從四十九寸九分至五十寸九分之所治也于五十寸九分之間取之五十寸九分尺之所治也于五十寸九分尺之內五十寸九分之所治也從五十寸九分至五十一寸九分之所治也于五十一寸九分之間取之五十一寸九分尺之所治也于五十一寸九分尺之內五十一寸九分之所治也從五十一寸九分至五十二寸九分之所治也于五十二寸九分之間取之五十二寸九分尺之所治也于五十二寸九分尺之內五十二寸九分之所治也從五十二寸九分至五十三寸九分之所治也于五十三寸九分之間取之五十三寸九分尺之所治也于五十三寸九分尺之內五十三寸九分之所治也從五十三寸九分至五十四寸九分之所治也于五十四寸九分之間取之五十四寸九分尺之所治也于五十四寸九分尺之內五十四寸九分之所治也從五十四寸九分至五十五寸九分之所治也于五十五寸九分之間取之五十五寸九分尺之所治也于五十五寸九分尺之內五十五寸九分之所治也從五十五寸九分至五十六寸九分之所治也于五十六寸九分之間取之五十六寸九分尺之所治也于五十六寸九分尺之內五十六寸九分之所治也從五十六寸九分至五十七寸九分之所治也于五十七寸九分之間取之五十七寸九分尺之所治也于五十七寸九分尺之內五十七寸九分之所治也從五十七寸九分至五十八寸九分之所治也于五十八寸九分之間取之五十八寸九分尺之所治也于五十八寸九分尺之內五十八寸九分之所治也從五十八寸九分至五十九寸九分之所治也于五十九寸九分之間取之五十九寸九分尺之所治也于五十九寸九分尺之內五十九寸九分之所治也從五十九寸九分至六十寸九分之所治也于六十寸九分之間取之六十寸九分尺之所治也于六十寸九分尺之內六十寸九分之所治也從六十寸九分至六十一寸九分之所治也于六十一寸九分之間取之六十一寸九分尺之所治也于六十一寸九分尺之內六十一寸九分之所治也從六十一寸九分至六十二寸九分之所治也于六十二寸九分之間取之六十二寸九分尺之所治也于六十二寸九分尺之內六十二寸九分之所治也從六十二寸九分至六十三寸九分之所治也于六十三寸九分之間取之六十三寸九分尺之所治也于六十三寸九分尺之內六十三寸九分之所治也從六十三寸九分至六十四寸九分之所治也于六十四寸九分之間取之六十四寸九分尺之所治也于六十四寸九分尺之內六十四寸九分之所治也從六十四寸九分至六十五寸九分之所治也于六十五寸九分之間取之六十五寸九分尺之所治也于六十五寸九分尺之內六十五寸九分之所治也從六十五寸九分至六十六寸九分之所治也于六十六寸九分之間取之六十六寸九分尺之所治也于六十六寸九分尺之內六十六寸九分之所治也從六十六寸九分至六十七寸九分之所治也于六十七寸九分之間取之六十七寸九分尺之所治也于六十七寸九分尺之內六十七寸九分之所治也從六十七寸九分至六十八寸九分之所治也于六十八寸九分之間取之六十八寸九分尺之所治也于六十八寸九分尺之內六十八寸九分之所治也從六十八寸九分至六十九寸九分之所治也于六十九寸九分之間取之六十九寸九分尺之所治也于六十九寸九分尺之內六十九寸九分之所治也從六十九寸九分至七十寸九分之所治也于七十寸九分之間取之七十寸九分尺之所治也于七十寸九分尺之內七十寸九分之所治也從七十寸九分至七十一寸九分之所治也于七十一寸九分之間取之七十一寸九分尺之所治也于七十一寸九分尺之內七十一寸九分之所治也從七十一寸九分至七十二寸九分之所治也于七十二寸九分之間取之七十二寸九分尺之所治也于七十二寸九分尺之內七十二寸九分之所治也從七十二寸九分至七十三寸九分之所治也于七十三寸九分之間取之七十三寸九分尺之所治也于七十三寸九分尺之內七十三寸九分之所治也從七十三寸九分至七十四寸九分之所治也于七十四寸九分之間取之七十四寸九分尺之所治也于七十四寸九分尺之內七十四寸九分之所治也從七十四寸九分至七十五寸九分之所治也于七十五寸九分之間取之七十五寸九分尺之所治也于七十五寸九分尺之內七十五寸九分之所治也從七十五寸九分至七十六寸九分之所治也于七十六寸九分之間取之七十六寸九分尺之所治也于七十六寸九分尺之內七十六寸九分之所治也從七十六寸九分至七十七寸九分之所治也于七十七寸九分之間取之七十七寸九分尺之所治也于七十七寸九分尺之內七十七寸九分之所治也從七十七寸九分至七十八寸九分之所治也于七十八寸九分之間取之七十八寸九分尺之所治也于七十八寸九分尺之內七十八寸九分之所治也從七十八寸九分至七十九寸九分之所治也于七十九寸九分之間取之七十九寸九分尺之所治也于七十九寸九分尺之內七十九寸九分之所治也從七十九寸九分至八十寸九分之所治也于八十寸九分之間取之八十寸九分尺之所治也于八十寸九分尺之內八十寸九分之所治也從八十寸九分至八十一寸九分之所治也于八十一寸九分之間取之八十一寸九分尺之所治也于八十一寸九分尺之內八十一寸九分之所治也從八十一寸九分至八十二寸九分之所治也于八十二寸九分之間取之八十二寸九分尺之所治也于八十二寸九分尺之內八十二寸九分之所治也從八十二寸九分至八十三寸九分之所治也于八十三寸九分之間取之八十三寸九分尺之所治也于八十三寸九分尺之內八十三寸九分之所治也從八十三寸九分至八十四寸九分之所治也于八十四寸九分之間取之八十四寸九分尺之所治也于八十四寸九分尺之內八十四寸九分之所治也從八十四寸九分至八十五寸九分之所治也于八十五寸九分之間取之八十五寸九分尺之所治也于八十五寸九分尺之內八十五寸九分之所治也從八十五寸九分至八十六寸九分之所治也于八十六寸九分之間取之八十六寸九分尺之所治也于八十六寸九分尺之內八十六寸九分之所治也從八十六寸九分至八十七寸九分之所治也于八十七寸九分之間取之八十七寸九分尺之所治也于八十七寸九分尺之內八十七寸九分之所治也從八十七寸九分至八十八寸九分之所治也于八十八寸九分之間取之八十八寸九分尺之所治也于八十八寸九分尺之內八十八寸九分之所治也從八十八寸九分至八十九寸九分之所治也于八十九寸九分之間取之八十九寸九分尺之所治也于八十九寸九分尺之內八十九寸九分之所治也從八十九寸九分至九十寸九分之所治也于九十寸九分之間取之九十寸九分尺之所治也于九十寸九分尺之內九十寸九分之所治也從九十寸九分至九十一寸九分之所治也于九十一寸九分之間取之九十一寸九分尺之所治也于九十一寸九分尺之內九十一寸九分之所治也從九十一寸九分至九十二寸九分之所治也于九十二寸九分之間取之九十二寸九分尺之所治也于九十二寸九分尺之內九十二寸九分之所治也從九十二寸九分至九十三寸九分之所治也于九十三寸九分之間取之九十三寸九分尺之所治也于九十三寸九分尺之內九十三寸九分之所治也從九十三寸九分至九十四寸九分之所治也于九十四寸九分之間取之九十四寸九分尺之所治也于九十四寸九分尺之內九十四寸九分之所治也從九十四寸九分至九十五寸九分之所治也于九十五寸九分之間取之九十五寸九分尺之所治也于九十五寸九分尺之內九十五寸九分之所治也從九十五寸九分至九十六寸九分之所治也于九十六寸九分之間取之九十六寸九分尺之所治也于九十六寸九分尺之內九十六寸九分之所治也從九十六寸九分至九十七寸九分之所治也于九十七寸九分之間取之九十七寸九分尺之所治也于九十七寸九分尺之內九十七寸九分之所治也從九十七寸九分至九十八寸九分之所治也于九十八寸九分之間取之九十八寸九分尺之所治也于九十八寸九分尺之內九十八寸九分之所治也從九十八寸九分至九十九寸九分之所治也于九十九寸九分之間取之九十九寸九分尺之所治也于九十九寸九分尺之內九十九寸九分之所治也從九十九寸九分至一百寸九分之所治也于一百寸九分之間取之一百寸九分尺之所治也于一百寸九分尺之內一百寸九分之所治也從一百寸九分至一百一寸九分之所治也于一百一寸九分之間取之一百一寸九分尺之所治也于一百一寸九分尺之內一百一寸九分之所治也從一百一寸九分至一百二寸九分之所治也于一百二寸九分之間取之一百二寸九分尺之所治也于一百二寸九分尺之內一百二寸九分之所治也從一百二寸九分至一百三寸九分之所治也于一百三寸九分之間取之一百三寸九分尺之所治也于一百三寸九分尺之內一百三寸九分之所治也從一百三寸九分至一百四寸九分之所治也于一百四寸九分之間取之一百四寸九分尺之所治也于一百四寸九分尺之內一百四寸九分之所治也從一百四寸九分至一百五寸九分之所治也于一百五寸九分之間取之一百五寸九分尺之所治也于一百五寸九分尺之內一百五寸九分之所治也從一百五寸九分至一百六寸九分之所治也于一百六寸九分之間取之一百六寸九分尺之所治也于一百六寸九分尺之內一百六寸九分之所治也從一百六寸九分至一百七寸九分之所治也于一百七寸九分之間取之一百七寸九分尺之所治也于一百七寸九分尺之內一百七寸九分之所治也從一百七寸九分至一百八寸九分之所治也于一百八寸九分之間取之一百八寸九分尺之所治也于一百八寸九分尺之內一百八寸九分之所治也從一百八寸九分至一百九寸九分之所治也于一百九寸九分之間取之一百九寸九分尺之所治也于一百九寸九分尺之內一百九寸九分之所治也從一百九寸九分至二百寸九分之所治也于二百寸九分之間取之二百寸九分尺之所治也于二百寸九分尺之內二百寸九分之所治也從二百寸九分至二百一寸九分之所治也于二百一寸九分之間取之二百一寸九分尺之所治也于二百一寸九分尺之內二百一寸九分之所治也從二百一寸九分至二百二寸九分之所治也于二百二寸九分之間取之二百二寸九分尺之所治也于二百二寸九分尺之內二百二寸九分之所治也從二百二寸九分至二百三寸九分之所治也于二百三寸九分之間取之二百三寸九分尺之所治也于二百三寸九分尺之內二百三寸九分之所治也從二百三寸九分至二百四寸九分之所治也于二百四寸九分之間取之二百四寸九分尺之所治也于二百四寸九分尺之內二百四寸九分之所治也從二百四寸九分至二百五寸九分之所治也于二百五寸九分之間取之二百五寸九分尺之所治也于二百五寸九分尺之內二百五寸九分之所治也從二百五寸九分至二百六寸九分之所治也于二百六寸九分之間取之二百六寸九分尺之所治也于二百六寸九分尺之內二百六寸九分之所治也從二百六寸九分至二百七寸九分之所治也于二百七寸九分之間取之二百七寸九分尺之所治也于二百七寸九分尺之內二百七寸九分之所治也從二百七寸九分至二百八寸九分之所治也于二百八寸九分之間取之二百八寸九分尺之所治也于二百八寸九分尺之內二百八寸九分之所治也從二百八寸九分至二百九寸九分之所治也于二百九寸九分之間取之二百九寸九分尺之所治也于二百九寸九分尺之內二百九寸九分之所治也從二百九寸九分至三百寸九分之所治也于三百寸九分之間取之三百寸九分尺之所治也于三百寸九分尺之內三百寸九分之所治也從三百寸九分至三百一寸九分之所治也于三百一寸九分之間取之三百一寸九分尺之所治也于三百一寸九分尺之內三百一寸九分之所治也從三百一寸九分至三百二寸九分之所治也于三百二寸九分之間取之三百二寸九分尺之所治也于三百二寸九分尺之內三百二寸九分之所治也從三百二寸九分至三百三寸九分之所治也于三百三寸九分之間取之三百三寸九分尺之所治也于三百三寸九分尺之內三百三寸九分之所治也從三百三寸九分至三百四寸九分之所治也于三百四寸九分之間取之三百四寸九分尺之所治也于三百四寸九分尺之內三百四寸九分之所治也從三百四寸九分至三百五寸九分之所治也于三百五寸九分之間取之三百五寸九分尺之所治也于三百五寸九分尺之內三百五寸九分之所治也從三百五寸九分至三百六寸九分之所治也于三百六寸九分之間取之三百六寸九分尺之所治也于三百六寸九分尺之內三百六寸九分之所治也從三百六寸九分至三百七寸九分之所治也于三百七寸九分之間取之三百七寸九分尺之所治也于三百七寸九分尺之內三百七寸九分之所治也從三百七寸九分至三百八寸九分之所治也于三百八寸九分之間取之三百八寸九分尺之所治也于三百八寸九分尺之內三百八寸九分之所治也從三百八寸九分至三百九寸九分之所治也于三百九寸九分之間取之三百九寸九分尺之所治也于三百九寸九分尺之內三百九寸九分之所治也從三百九寸九分至四百寸九分之所治也于四百寸九分之間取之四百寸九分尺之所治也于四百寸九分尺之內四百寸九分之所治也從四百寸九分至四百一寸九分之所治也于四百一寸九分之間取之四百一寸九分尺之所治也于四百一寸九分尺之內四百一寸九分之所治也從四百一寸九分至四百二寸九分之所治也于四百二寸九分之間取之四百二寸九分尺之所治也于四百二寸九分尺之內四百二寸九分之所治也從四百二寸九分至四百三寸九分之所治也于四百三寸九分之間取之四百三寸九分尺之所治也于四百三寸九分尺之內四百三寸九分之所治也從四百三寸九分至四百四寸九分之所治也于四百四寸九分之間取之四百四寸九分尺之所治也于四百四寸九分尺之內四百四寸九分之所治也從四百四寸九分至四百五寸九分之所治也于四百五寸九分之間取之四百五寸九分尺之所治也于四百五寸九分尺之內四百五寸九分之所治也從四百五寸九分至四百六寸九分之所治也于四百六寸九分之間取之四百六寸九分尺之所治也于四百六寸九分尺之內四百六寸九分之所治也從四百六寸九分至四百七寸九分之所治也于四百七寸九分之間取之四百七寸九分尺之所治也于四百七寸九分尺之內四百七寸九分之所治也從四百七寸九分至四百八寸九分之所治也于四百八寸九分之間取之四百八寸九分尺之所治也于四百八寸九分尺之內四百八寸九分之所治也從四百八寸九分至四百九寸九分之所治也于四百九寸九分之間取之四百九寸九分尺之所治也于四百九寸九分尺之內四百九寸九分之所治也從四百九寸九分至五百寸九分之所治也于五百寸九分之間取之五百寸九分尺之所治也于五百寸九分尺之內五百寸九分之所治也從五百寸九分至五百一寸九分之所治也于五百一寸九分之間取之五百一寸九分尺之所治也于五百一寸九分尺之內五百一寸九分之所治也從五百一寸九分至五百二寸九分之所治也于五百二寸九分之間取之五百二寸九分尺之所治也于五百二寸九分尺之內五百二寸九分之所治也從五百二寸九分至五百三寸九分之所治也于五百三寸九分之間取之五百三寸九分尺之所治也于五百三寸九分尺之內五百三寸九分之所治也從五百三寸九分至五百四寸九分之所治也于五百四寸九分之間取之五百四寸九分尺之所治也于五百四寸九分尺之內五百四寸九分之所治也從五百四寸九分至五百五寸九分之所治也于五百五寸九分之間取之五百五寸九分尺之所治也于五百五寸九分尺之內五百五寸九分之所治也從五百五寸九分至五百六寸九分之所治也于五百六寸九分之間取之五百六寸九分尺之所治也于五百六寸九分尺之內五百六寸九分之所治也從五百六寸九分至五百七寸九分之所治也于五百七寸九分之間取之五百七寸九分尺之所治也于五百七寸九分尺之內五百七寸九分之所治也從五百七寸九分至五百八寸九分之所治也于五百八寸九分之間取之五百八寸九分尺之所治也于五百八寸九分尺之內五百八寸九分之所治也從五百八寸九分至五百九寸九分之所治也于五百九寸九分之間取之五百九寸九分尺之所治也于五百九寸九分尺之內五百九寸九分之所治也從五百九寸九分至六百寸九分之所治也于六百寸九分之間取之六百寸九分尺之所治也于六百寸九分尺之內六百寸九分之所治也從六百寸九分至六百一寸九分之所治也于六百一寸九分之間取之六百一寸九分尺之所治也于六百一寸九分尺之內六百一寸九分之所治也從六百一寸九分至六百二寸九分之所治也于六百二寸九分之間取之六百二寸九分尺之所治也于六百二寸九分尺之內六百二寸九分之所治也從六百二寸九分至六百三寸九分之所治也于六百三寸九分之間取之六百三寸九分尺之所治也于六百三寸九分尺之內六百三寸九分之所治也從六百三寸九分至六百四寸九分之所治也于六百四寸九分之間取之六百四寸九分尺之所治也于六百四寸九分尺之內六百四寸九分之所治也從六百四寸九分至六百五寸九分之所治也于六百五寸九分之間取之六百五寸九分尺之所治也于六百五寸九分尺之內六百五寸九分之所治也從六百五寸九分至六百六寸九分之所治也于六百六寸九分之間取之六百六寸九分尺之所治也于六百六寸九分尺之內六百六寸九分之所治也從六百六寸九分至六百七寸九分之所治也于六百七寸九分之間取之六百七寸九分尺之所治也于六百七寸九分尺之內六百七寸九分之所治也從六百七寸九分至六百八寸九分之所治也于六百八寸九分之間取之六百八寸九分尺之所治也于六百八寸九分尺之內六百八寸九分之所治也從六百八寸九分至六百九寸九分之所治也于六百九寸九分之間取之六百九寸九分尺之所治也于六百九寸九分尺之內六百九寸九分之所治也從六百九寸九分至七百寸九分之所治也于七百寸九分之間取之七百寸九分尺之所治也于七百寸九分尺之內七百寸九分之所治也從七百寸九分至七百一寸九分之所治也于七百一寸九分之間取之七百一寸九分尺之所治也于七百一寸九分尺之內七百一寸九分之所治也從七百一寸九分至七百二寸九分之所治也于七百二寸九分之間取之七百二寸九分尺之所治也于七百二寸九分尺之內七百二寸九分之所治也從七百二寸九分至七百三寸九分之所治也于七百三寸九分之間取之七百三寸九分尺之所治也于七百三寸九分尺之內七百三寸九分之所治也從七百三寸九分至七百四寸九分之所治也于七百四寸九分之間取之七百四寸九分尺之所治也于七百四寸九分尺之內七百四寸九分之所治也從七百四寸九分至七百五寸九分之所治也于七百五寸九分之間取之七百五寸九分尺之所治也于七百五寸九分尺之內七百五寸九分之所治也從七百五寸九分至七百六寸九分之所治也于七百六寸九分之間取之七百六寸九分尺之所治也于七百六寸九分尺之內七百六寸九分之所治也從七百六寸九分至七百七寸九分之所治也于七百七寸九分之間取之七百七寸九分尺之所治也于七百七寸九分尺之內七百七寸九分之所治也從七百七寸九分至七百八寸九分之所治也于七百八寸九分之間取之七百八寸九分尺之所治也于七百八寸九分尺之內七百八寸九分之所治也從七百八寸九分至七百九寸九分之所治也于七百九寸九分之間取之七百九寸九分尺之所治也于七百九寸九分尺之內七百九寸九分之所治也從七百九寸九分至八百寸九分之所治也于八百寸九分之間取之八百寸九分尺之所治也于八百寸九分尺之內八百寸九分之所治也從八百寸九分至八百一寸九分之所治也于八百一寸九分之間取之八百一寸九分尺之所治也于八百一寸九分尺之內八百一寸九分之所治也從八百一寸九分至八百二寸九分之所治也于八百二寸九分之間取之八百二寸九分尺之所治也于八百二寸九分尺之內八百二寸九分之所治也從八百二寸九分至八百三寸九分之所治也于八百三寸九分之間取之八百三寸九分尺之所治也于八百三寸九分尺之內八百三寸九分之所治也從八百三寸九分至八百四寸九分之所治也于八百四寸九分之間取之八百四寸九分尺之所治也于八百四寸九分尺之內八百四寸九分之所治也從八百四寸九分至八百五寸九分之所治也于八百五寸九分之間取之八百五寸九分尺之所治也于八百五寸九分尺之內八百五寸九分之所治也從八百五寸九分至八百六寸九分之所治也于八百六寸九分之間取之八百六寸九分尺之所治也于八百六寸九分尺之內八百六寸九分之所治也從八百六寸九分至八百七寸九分之所治也于八百七寸九分之間取之八百七寸九分尺之所治也于八百七寸九分尺之內八百七寸九分之所治也從八百七寸九分至八百八寸九分之所治也于八百八寸九分之間取之八百八寸九分尺之所治也于八百八寸九分尺之內八百八寸九分之所治也從八百八寸九分至八百九寸九分之所治也于八百九寸九分之間取之八百九寸九分尺之所治也于八百九寸九分尺之內八百九寸九分之所治也從八百九寸九分至九百寸九分之所治也于九百寸九分之間取之九百寸九分尺之所治也于九百寸九分尺之內九百寸九分之所治也從九百寸九分至九百一寸九分之所治也于九百一寸九分之間取之九百一寸九分尺之所治也于九百一寸九分尺之內九百一寸九分之所治也從九百一寸九分至九百二寸九分之所治也于九百二寸九分之間取之九百二寸九分尺之所治也于九百二寸九分尺之內九百二寸九分之所治也從九百二寸九分至九百三寸九分之所治也于九百三寸九分之間取之九百三寸九分尺之所治也于九百三寸九分尺之內九百三寸九分之所治也從九百三寸九分至九百四寸九分之所治也于九百四寸九分之間取之九百四寸九分尺之所治也于九百四寸九分尺之內九百四寸九分之所治也從九百四寸九分至九百五寸九分之所治也于九百五寸九分之間取之九百五寸九分尺之所治也于九百五寸九分尺之內九百五寸九分之所治也從九百五寸九分至九百六寸九分之所治也于九百六寸九分之間取之九百六寸九分尺之所治也于九百六寸九分尺之內九百六寸九分之所治也從九百六寸九分至九百七寸九分之所治也于九百七寸九分之間取之九百七寸九分尺之所治也于九百七寸九分尺之內九百七寸九分之所治也從九百七寸九分至九百八寸九分之所治也于九百八寸九分之間取之九百八寸九分尺之所治也于九百八寸九分尺之內九百八寸九分之所治也從九百八寸九分至九百九寸九分之所治也于九百九寸九分之間取之九百九寸九分尺之所治也于九百九寸九分尺之內九百九寸九分之所治也從九百九寸九分至一千寸九分之所治也于一千寸九分之間取之一千寸九分尺之所治也于一千寸九分尺之內一千寸九分之所治也從一千寸九分至一千一寸九分之所治也于一千一寸九分之間取之一千一寸九分尺之所治也于一千一寸九分尺之內一千一寸九分之所治也從一千一寸九分至一千二寸九分之所治也于一千二寸九分之間取之一千二寸九分尺之所治也于一千二寸九分尺之內一千二寸九分之所治也從一千二寸九分至一千三寸九分之所治也于一千三寸九分之間取之一千三寸九分尺之所治也于一千三寸九分尺之內一千三寸九分之所治也從一千三寸九分至一千四寸九分之所治也于一千四寸九分之間取之一千四寸九分尺之所治也于一千四寸九分尺之內一千四寸九分之所治也從一千四寸九分至一千五寸九分之所治也于一千五寸九分之間取之一千五寸九分尺之所治也于一千五寸九分尺之內一千五寸九分之所治也從一千五寸九分至一千六寸九分之所治也于一千六寸九分之間取之一千六寸九分尺之所治也于一千六寸九分尺之內一千六寸九分之所治也從一千六寸九分至一千七寸九分之所治也于一千七寸九分之間取之一千七寸九分尺之所治也于一千七寸九分尺之內一千七寸九分之所治也從一千七寸九分至一千八寸九分之所治也于一千八寸九分之間取之一千八寸九分尺之所治也于一千八寸九分尺之內一千八寸九分之所治也從一千八寸九分至一千九寸九分之所治也于一千九寸九分之間取之一千九寸九分尺之所治也于一千九寸九分尺之內一千九寸九分之所治也從一千九寸九分至二千寸九分之所治也于二千寸九分之間取之二千寸九分尺之所治也于二千寸九分尺之內二千寸九分之所治也從二千寸九分至二千一寸九分之所治也于二千一寸九分之間取之二千一寸九分尺之所治也于二千一寸九分尺之內二千一寸九分之所治也從二千一寸九分至二千二寸九分之所治也于二千二寸九分之間取之二千二寸九分尺之所治也于二千二寸九分尺之內二千二寸九分之所治也從二千二寸九分至二千三寸九分之所治也于二千三寸九分之間取之二千三寸九分尺之所治也于二千三寸九分尺之內二千三寸九分之所治也從二千三寸九分至二千四寸九分之所治也于二千四寸九分之間取之二千四寸九分尺之所治也于二千四寸九分尺之內二千四寸九分之所治也從二千四寸九分至二千五寸九分之所治也于二千五寸九分之間取之二千五寸九分尺之所治也于二千五寸九分尺之內二千五寸九分之所治也從二千五寸九分至二千六寸九分之所治也于二千六寸九分之間取之二千六寸九分尺之所治也于二千六寸九分尺之內二千六寸九分之所治也從二千六寸九分至二千七寸九分之所治也于二千七寸九分之間取之二千七寸九分尺之所治也于二千七寸九分尺之內二千七寸九分之所治也從二千七寸九分至二千八寸九分之所治也于二千八寸九分之間取之二千八寸九分尺之所治也于二千八寸九分尺之內二千八寸九分之所治也從二千八寸九分至二千九寸九分之所治也于二千九寸九分之間取之二千九寸九分尺之所治也于二千九寸九分尺之內二千九寸九分之所治也從二千九寸九分至三千寸九分之所治也于三千寸九分之間取之三千寸九分尺之所治也于三千寸九分尺之內三千寸九分之所治也從三千寸九分至三千一寸九分之所治也于三千一寸九分之間取之三千一寸九分尺之所治也于三千一寸九分尺之內三千一寸九分之所治也從三千一寸九分至三千二寸九分之所治也于三千二寸九分之間取之三千二寸九分尺之所治也于三千二寸九分尺之內三千二寸九分之所治也從三千二寸九分至三千三寸九分之所治也于三千三寸九分之間取之三千三寸九分尺之所治也于三千三寸九分尺之內三千三寸九分之所治也從三千三寸九分至三千四寸九分之所治也于三千四寸九分之間取之三千四寸九分尺之所治也于三千四寸九分尺之內三千四寸九分之所治也從三千四寸九分至三千五寸九分之所治也于三千五寸九分之間取之三千五寸九分尺之所治也于三千五寸九分尺之內三千五寸九分之所治也從三千五寸九分至三千六寸九分之所治也于三千六寸九分之間取之三千六寸九分尺之所治也于三千六寸九分尺之內三千六寸九分之所治也從三千六寸九分至三千七寸九分之所治也于三千七寸九分之間取之三千七寸九分尺之所治也于三千七寸九分尺之內三千七寸九分之所治也從三千七寸九分至三千八寸九分之所治也于三千八寸九分之間取之三千八寸九分尺之所治也于三千八寸九分尺之內三千八寸九分之所治也從三千八寸九分至三千九寸九分之所治也于三千九寸九分之間取之三千九寸九分尺之所治也于三千九寸九分尺之內三千九寸九分之所治也從三千九寸九分至四千寸九分之所治也于四千寸九分之間取之四千寸九分尺之所治也于四千寸九分尺之內四千寸九分之所治也從四千寸九分至四千一寸九分之所治也于四千一寸九分之間取之四千一寸九分尺之所治也于四千一寸九分尺之內四千一寸九分之所治也從四千一寸九分至四千二寸九分之所治也于四千二寸九分之間取之四千二寸九分尺之所治也于四千二寸九分尺之內四千二寸九分之所治也從四千二寸九分至四千三寸九分之所治也于四千三寸九分之間取之四千三寸九分尺之所治也于四千三寸九分尺之內四千三寸

野合竹故野脈緩者而行持脈指法按重候上面稍者爲浮沉火重按之脈道自然可聽經言無力爲軟事指來去至久成數一遍爲一息凡此五藏平脈須要察之久久成數一遍爲一息凡此五藏平脈須要察之久久成數一遍爲一息凡此五藏平脈須要察之久

八段錦

第一。平鋪三指關。初持脈時不必遽尋三部且閱尺之三指平鋪三部而尺中脈之外脅肉內皮上也此處不診得動脈身但探試皮膚形勢或急或緩或滑或澀或浮或沉或實或虛或冷或熱或緊或弱或芤或革或牢或濡或散或伏或動或促或結或代或疾或遲或長或短或洪或細或微或弦或數或促或結或代或疾或遲或長或短或洪或細或微或弦或數或促或結或代或疾或遲或長或短或洪或細或微或弦或數

豈得爲處士精詳乎豈得爲窮至事物之理而推極吾之所知乎又豈得爲父而慈爲子而孝乎且醫之良亦不專于審診一節苟或動靜有常舉止不妄存心而忠厚發言而純篤察病詳審處方精專雖此數者亦可謂之良矣雖據脈言症或有少差然一脈所主非一病故所言未必盡中也若以此而遽棄之所謂以二難子而棄干城之將烏可與智者道哉姑以浮脈言之脈經云浮爲風、爲虛、爲氣、爲喘、爲厥、爲痛、爲眩、爲澁、不食、爲熱、爲內結等類所主不下十數條病假使診得浮脈彼將斷其爲何病耶苟不彀之以望聞問而欲的知其爲何病吾謂戛戛乎其難矣古人以切脈望聞問之後則是望聞問之間已得其病情矣不過即診其脈若病應與不應也若病與脈應則害而易醫脈與病反則凶而難治以脈參病意蓋如此爲常以診脈知病爲貴哉夫脈經一書舉舉示人以診法而開卷入道便言觀形察色彼此參伍以決死生可見望聞問切醫之不可缺一也豈得而偏廢乎嗟世稱善脈莫過叔和尚有待于彼此參伍況下于叔和爲爲者耶故專以切脈言病必不能不至于臆說也安得爲醫之良抑不然此世人又有以太素脈而言人貴賤窮通者此又妄之甚也予嘗考其義矣夫太者始也初也如太極太乙之太素者質也本也如繪事後素之素此蓋言始初本質之脈也始初本質之脈果何脈耶則必指元氣而言也東垣云元氣者胃氣之別名胃氣之脈蔡西山所謂不長不短不疏不數不大不小應乎中和意思欣欣難以名狀者是也撫病之人皆得此脈以此脈而察人之富貴貧賤則不可也何也胃氣之脈難以形容莫能名狀將何以爲貴賤窮通之診乎竊視其書名雖太素而其中論述略無一言及于太素之義所作歌括率多俚語全無理趣原其初志不過託此以爲微利之媒後世不察遂相傳習莫有能辯其非者或又爲之語曰太素云者指貴賤窮通莫于有生之初而言也即脈可以察而知之非謂脈名太素也予曰固也然則太素之所診者必不出于二十四脈之外矣夫二十四脈皆主病言一脈見則主一病貧富貴賤何從而察知哉假如浮脈其診爲風使太素家診之將言其爲風耶抑言其爲貴賤窮通耶二者不可得兼若言其爲風則其所知亦不過病也若遇其病而言其爲貴賤窮通則是近而病體身者尚不能知安得謂之太素則遠而遠諸身者必不能知之也蓋貴賤窮通身外之事與身之血氣了不相干安得以脈而知之乎況脈之變見無常而天之塞塞不一故四時各異其脈不能必其久而不變是以今日診得是脈明日診之而或非春間診得此脈至夏按之而或否彼太素者以片時之等按而斷人一生之休咎殆必撫是理然縱使證則是中亦是捕影捉蛇彷彿形象安有一定之見哉嗚呼脈察病尚不知病之的而猶待於望聞問切況能知人之貴賤窮通乎使脈而能知貴賤窮通則周公之易邵子之數希夷之相子平之命皆不必作矣何翠人之不憚煩也何後世不從其脈之簡便而猶以卜占風鑑晁命而談不絕口哉且脈肇于岐黃演于秦越而詳于叔和徧考素難脈經並撫一字語及此者非闕之也殆必有不可誣者矣若果如太素所言古人嘗先爲之矣又何俟後人之馳騁耶晁氏曰太素脈者善于相法特假太素以神其術耳誠哉言也足以破天下後世之惑矣又有察倚察者以言餂人陰得其實故于診按之際肆言而爲欺罔此又下此一等撫足論也雖然人稟天地之氣以生不能撫清濁

純駁之殊稟氣之清者則必形質清血氣清而脈來亦清清則脈形圓淨至數分明吾診乎此但知其主貴與富而已若曰何年登科何年陞授何曰招財何年得子吾皆不得而知矣稟氣之濁者則必形質濁血氣濁而脈來亦濁濁則脈形重濁至數混亂吾診乎此但知其主貧與賤而已若曰某時招災某時失財某時損妻某時剋子吾亦莫得而知矣又有形濁而脈清者此謂濁中之清所主得意處多而失意處少也質清而脈濁者此謂清中之濁所主失志處多而得志處少也又有形不甚清脈不甚濁但浮沈各得其位大小不失其等亦主平穩而無大得喪也富貴而賤脈清而長貧賤而夭脈濁而促其或清而促濁而長者富貴而夭也濁而長者貧賤而壽也其他言有所未盡舉有所未備舉者可以準此而類推是則吾之所謂以脈而知人富貴窮通者一本于理而論也豈收妄爲之說以欺人哉噫予所以著爲是論者蓋以世之有言太素脈者靡不翕然稱美不惟不能以理折又從而延譽之于人曲而影射此所謂誤己而誤人者也果何益之有哉又有迎醫服藥者不惟不先言其所苦甚至再三詢叩終于默默至有隱疾而困醫者醫罔爲術所困不思身亦爲醫所困矣吁可慨也夫此皆世之通患人所共有故予不得不詳論之以致失口嚀之意伸聲誦者或有所開發焉孟子曰予豈好辯哉予不得已

論滑脈弦脈　出丹溪

脈之狀不一大率多兼見人之病有四曰寒曰熱曰虛曰實故舉證認診者亦必以浮沈遲數爲綱浩者症脈也最難詞浩者症脈也滑者脈也有餘流利爲滑不及澀滯爲澀細而遲往來難且散又曰短而止皆是不足之象得此脈者固因虛或因寒或因濕汗氣虛血少爲氣多血沸血熱然亦有濕痰宿食老痰伏飲胸膈有熱證實人多實之象也經曰春傷於風夏生飧泄秋必痎瘧冬傷於寒春必病溫王安道註曰病溫病瘧其脈皆弦但弦而緊爲寒弦而洪爲熱弦而細爲濕弦而浮爲虛弦而大主牛顏濁而下亡血失精弦而緊主左關痛弦而數以益人多實之於盛金之真反胃痛沈弦爲積病弦而緊欲吐弦而急寒痛弦而緊主腹痛弦而數主寒中腸鳴弦而細主頭痛弦而伏主心腹痛不治弦急爲殺腹痛弦緩爲脾虛弦而長腸下血尺中偏弦多痛之候弦而小爲飲非腹痛水口口口降大之原率是土以水養邪風加土以行濕土敗散風動變爲病先昏後痛之候何以知其病在何經必須診候始知其客于某經結于某藏府成某病耳或濕或風傷寒傷食之原爲傷風傷寒之形氣俱有熱證宜以麻黃桂枝四物湯以診候而知彼之病在何經內藏于經之命脈也外現于皮膚之中宜其見于脈也非若邪脈可以入于診候而知也而王氏所論尚謂脈面病面知者未嘗按之以示來學者又以浮數爲熱爲有餘沈遲爲寒爲不足是不然其間最宜審察不一大率多兼見人之病有四曰寒曰熱曰虛曰實故舉證認診者亦必以浮沈遲數爲綱浩者症脈也最難詞浩者症脈也滑者脈也有餘流利爲滑不及澀滯爲澀細而遲往來難且散又曰短而止皆是不足之象得此脈者固因虛或因寒或因濕汗氣虛血少爲氣多血沸血熱然亦有濕痰宿食老痰伏飲胸膈有熱證實人多實之象也經曰春傷於風夏生飧泄秋必痎瘧冬傷於寒春必病溫王安道註曰病溫病瘧其脈皆弦但弦而緊爲寒弦而洪爲熱弦而細爲濕弦而浮爲虛弦而大主牛顏濁而下亡血失精弦而緊主左關痛弦而數以益人多實之於盛金之真反胃痛沈弦爲積病弦而緊欲吐弦而急寒痛弦而緊主腹痛弦而數主寒中腸鳴弦而細主頭痛弦而伏主心腹痛不治弦急爲殺腹痛弦緩爲脾虛弦而長腸下血尺中偏弦多痛之候弦而小爲飲非腹痛水口口口降大之原率是土以水養邪風加土以行濕土敗散風動變爲病先昏後痛之候何以知其病在何經必須診候始知其客于某經結于某藏府成某病耳或濕或風傷寒傷食之原爲傷風傷寒之形氣俱有熱證宜以麻黃桂枝四物湯以診候而知彼之病在何經內藏于經之命脈也外現于皮膚之中宜其見于脈也非若邪脈可以入于診候而知也而王氏所論尚謂脈面病面知者未嘗按之以示來學者

脈大必病進論　出丹溪

脈之狀不一大率多兼見人之病有四曰寒曰熱曰虛曰實故舉證認診者亦必以浮沈遲數爲綱浩者症脈也最難詞浩者症脈也滑者脈也有餘流利爲滑不及澀滯爲澀細而遲往來難且散又曰短而止皆是不足之象得此脈者固因虛或因寒或因濕汗氣虛血少爲氣多血沸血熱然亦有濕痰宿食老痰伏飲胸膈有熱證實人多實之象也經曰春傷於風夏生飧泄秋必痎瘧冬傷於寒春必病溫王安道註曰病溫病瘧其脈皆弦但弦而緊爲寒弦而洪爲熱弦而細爲濕弦而浮爲虛弦而大主牛顏濁而下亡血失精弦而緊主左關痛弦而數以益人多實之於盛金之真反胃痛沈弦爲積病弦而緊欲吐弦而急寒痛弦而緊主腹痛弦而數主寒中腸鳴弦而細主頭痛弦而伏主心腹痛不治弦急爲殺腹痛弦緩爲脾虛弦而長腸下血尺中偏弦多痛之候弦而小爲飲非腹痛水口口口降大之原率是土以水養邪風加土以行濕土敗散風動變爲病先昏後痛之候何以知其病在何經必須診候始知其客于某經結于某藏府成某病耳或濕或風傷寒傷食之原爲傷風傷寒之形氣俱有熱證宜以麻黃桂枝四物湯以診候而知彼之病在何經內藏于經之命脈也外現于皮膚之中宜其見于脈也非若邪脈可以入于診候而知也而王氏所論尚謂脈面病面知者未嘗按之以示來學者

脈說　出東垣

脈之大一也內傷得之於外傷者邪客於經脈亦大宜作邪勝治之合二者而觀之皆病脈也但分別不知太素家診得此脈亦將謂其貴歟而知此分別否乎

脈之證候診法。尚矣。至虛者。天下有實一候大二數實有亦因氣狀變面之氣血耳似之大凡夫多神所生禍求細之以異可不愼能知病不宜可病以所面其實而失其益氣血之自問失也則巧能辨治非以驗全其名虛之工偵至以不皆自之所見而脈之中疑似之間全於已有之所脈之中疑似之間全於已有之所脈之中疑似之間全於已有之所

脈訣指掌病式圖說

朱震亨著

題丹溪重脩脈訣

莊子曰生非吾有也乃天地之委和性非吾有也乃天地之委順黃帝曰人之生也懸命於天受氣於地氣以成形理亦賦焉劉子曰民受天地之中以生故肖天地之形天之陽在南而陰在北故清陽之七竅皆見於面濁陰之二竅皆出於下地之陽在北而陰在南故三陽之脈皆聚於背三陰之脈聚於胸腹況乎脈者天地之元性男子之寸脈盛而尺脈弱者肖乎天也女子之尺脈盛而寸脈弱者肖乎地也秦越人乃以男子生於寅女子生於申三陽從天生三陰從地長謬之甚矣遂令百犬吠聲流至於今千有餘年莫有能正其謬者獨先生以神明之資洞燭物理乃推本律法混合天人而著論闕之使千載之誤一旦昭明豈不韙哉

歲在戊申門生龍丘葉英題

脈訣指掌病式圖說

元　丹溪朱震亨著

論脈法配天地

昔軒轅黃帝之體天治民也使伶倫截嶰谷之竹作黃鍾律管以候天之節氣以觀其太過不及修德以養之命岐伯取氣口作脈法以候人之動氣以察其太過不及設九針藥石以調之故黃鍾之數九分氣口之數亦九分律法曰天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成數也其二四六八十爲陰十者陰之成數也黃鍾者陽聲之始也陽氣之動也故其數皆九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應然後寸之數始形焉此陽唱而陰和男行而女隨邵子曰陰者陽之影故脈之動也陽得九分而盛陰得一寸而弱其吻合於黃鍾者以民受天地之中以生故肖天地之形天之陽在南而陰在北故清陽之七竅皆見於面濁陰之二竅皆出於下地之陽在北而陰在南故三陽之脈皆聚於背三陰之脈聚於胸腹況乎脈者天地之元性男子之寸脈盛而尺脈弱者肖乎天也女子之尺脈盛而寸脈弱者肖乎地也秦越人乃以男子生於寅女子生於申三陽從天生三陰從地長謬之甚矣遂令百犬吠聲流至於今千有餘年莫有能正其謬者獨先生以神明之資洞燭物理乃推本律法混合天人而著論闕之使千載之誤一旦昭明豈不韙哉

歲在戊申門生龍丘葉英題

男女手脈之圖

三部九候圖說

三部者從魚際至高骨一寸名曰寸口自寸至尺名尺澤故曰尺中寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界又云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入六分爲關分從關分又入六分爲尺分故三部共得一寸九分

九候浮中沉

一部分三候三三爲九候



上候浮
初下指與皮毛相得者爲肺之部
中候中
輕按之與血脈相得者爲胃之部
下候沉
重按之與筋骨相得者爲腎之部

學診例

凡欲診脈先調自氣歷取病人息以候其遲數過與不及所謂
以我醫彼智與神會則莫之敢違
凡診脈須先識脈息兩字脈者神也息者氣也脈不自動爲氣
使然所謂長則氣治短則氣病也
凡診脈須識人迎氣口以辨內外因其不與人迎氣口相應爲
不內外因所謂關前一分人命之主
凡診脈須先識五藏六經本脈然後方識病脈歲主藏害氣候
逆傳陰陽有時與脈爲期此之謂也
凡診脈須認取二十四字名狀與關前一分相符推說證狀與
病者相應使無差忒庶可依原治療

手式寸尺內外圖說



左心小腸肝膽腎
右肺大腸脾胃命
心與小腸居左寸
肝膽同歸左關定
腎脈元在左尺中



左手
却與膀胱府相應
肺與大腸居右寸
脾胃脈從右關認
心包右尺配三焦
此是醫家真要領

右五藏所屬寸尺部位

左寸外以候心內以候膻中
左關外以候肝內以候膈中
左尺外以候腎內以候腹中
釋曰五藏六府十二經絡候之無踰三部要之前五六經乃候
淫邪入自經絡而及於藏府後說五藏乃候七情內鬱自藏府
出而應於經內外之辨頗然明白學診之士當自此始外因雖
自經絡而入必及於藏府須識五藏六府所在內因雖亦必外應於經亦須循經驗証不可偏局執見故經云上竟上
胃候中事也下竟下腰足中事也不可不通

陰陽相乘相盪格關格圖說



寸之前者陽之動也脈見九分
而浮魚曰平太過不及者病
關以後者陰之動也脈見一寸
而沉關曰平太過不及者病

難經曰脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格謂
也丹溪先生曰陰乘陽則惡寒陽乘陰則發熱

左手人迎圖



右手氣口圖



左爲人迎以候天之六氣風寒暑濕燥熱之外感者也
人迎浮盛則傷風緊盛則傷寒虛熱則傷暑沉細則傷
濕慶數則傷熱皆外所因法當表散惟虛熱則傷暑宜
清補

右爲氣口以候人之七情內傷怒氣思慮悲恐驚內傷之邪
其若口脈激急則脈浮思則脈結悲則脈緊恐則脈沉驚則脈動內所因看與何部何應即知何
藏何經受病方乃不失病根法當溫凉攻補如後說些
診按表裏名義清楚始如後說些經所述諸脈者脈之
主脈者氣之府氣者神之都脈者氣之使長則氣治短
則氣病數則煩心大則病進文義雖則義理難明須詳
之諸有脈有約等則二十四字不

數總括綱紀辨理探然浮爲風爲虛沉爲濕爲寒爲冷數爲熱爲燥爲痰爲風濕寒熱屬於外虛實冷燥屬於內內外既分三因須別學者宜詳覽不可憚煩也

總論脈式

經云常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻乃可診有過之脈或有作爲爲停食頃俟定乃診師亦如之

釋曰停食頃俟之即不拘於平旦況倉卒病生豈特平旦學者知之

經云切脈動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰可以參決死生之分

釋曰切脈動靜者以脈之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分爲氣口以候七情內傷爲內所因惟其所自用肯經常爲不內外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道雖名狀不同証候差別皆以人迎一分而推之與三部相應而說証則萬無一失也

陳氏辯三藏本脈息數尺度

人之脈者乃血之隧道也非氣使則不能行故血爲脈氣爲息脈息之名自是而分呼吸者氣之蒙籠動應者血之波瀾其經以身寸度之計十六丈二尺一呼脈再動一吸脈再動呼吸定息脈五動閏以太息則六動一動一寸故一息脈行六寸十息六尺百息六丈二百息十二丈七十息四丈二尺計二百七十息漏水下二刻盡十六丈二尺營周一身百刻之中得五十營故曰脈行陽二十五度行陰亦二十五度也息者以呼吸定之一日計一萬三千五百息呼吸進退既運於脈故八息三分三釐方行一寸八十三息三分三釐行一尺八百三十三息三分行一丈八千三百三十三息行十丈餘六丈二尺計五千一百六十七息通計一萬三千五百息行盡一十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜大會於風府者是也脈神也陽也陽行速猶太陽之一日一周天息氣也陰也陰行遲猶太陰之一月一周天如是則應周天之常度配四時之定序春肝脈絃細而長夏心脈浮大而洪長夏脾脈緩大而緩秋肺脈浮濇而短冬腎脈沉濡而滑各以其時而候旺相休囚脈息無不及太過之患故曰平人以五藏六府皆稟氣於胃以胃氣爲本氣以黃色爲生取其資成也合本藏氣三分春以弦洪緩濇沉則爲平脈若兼藏脈見則不從矣



右手足六經之圖

手少陽三焦脈洪散而急
手厥陰心色絡脈沉弦而數
足陽明胃脈浮長而滑
足太陰脾脈沉軟而滑
手陽明大腸脈浮短而滑
手太陰肺脈濇短而浮

心合小腸肝合膽
脾連於胃腎膀胱

足厥陰肝脈在左關上弦細而長足少陰腎脈在左尺中沉濡而滑足太陰脾脈在右關上沉軟而緩足少陽膽脈在左關上弦大而浮足陽明胃脈在右關中浮長而滑足太陽膀胱脈在左尺中洪滑而長手厥陰心主包絡在右尺中沉絃而數手少陰心脈在左寸口洪而微實手太陰肺脈在右寸口濇短而浮手少陽三焦脈在右尺中洪散而急手陽明大腸脈在右寸口浮短而滑手太陽小腸脈在左寸口洪大而緊此手足陰陽六經脈之常體及其消息盈虛則變化不測運動吝移與天地參同彼春之弦爲夏之暑彼秋之濇爲冬之怒四變之動脈與之應者乃氣候之至脈也

素問六氣主合至脈

十二月大寒至　二月春分爲初之氣厥陰風木主令

經云厥陰之至其脈弦一云沉短而散

春分至　四月小滿爲二之氣少陰君火主令

經云少陰之至其脈鉤一云緊細而微

小滿至　六月大暑爲三之氣少陽相火主令

經云少陽之至大而浮一云在肺在數在短在長

大暑至　八月秋分爲四之氣太陰濕土主令

經云太陰之至其脈沉一云緊大而長

秋分至　十月小雪爲五之氣陽明燥金主令

經云陽明之至短而濇一云浮大而短

小雪至　十二月大寒爲六之氣太陽寒水主令

經云太陽之至大而長

本脈至脈雖識體狀又須推尋六氣交變南政北政司天在泉

左手足六經之圖

寸　關　尺

手少陰心脈洪而微實
手太陽小腸脈洪大而緊
足厥陰肝脈弦細而長
足少陽膽脈弦大而浮
足少陰腎脈沉濡而滑
足太陽膀胱脈洪滑而長

心包元向三焦配
肺藏還歸對大腸

少陰之脈應與不應詳細而推知寸關尺一失也

巳丑巳未二歲太陰司天少陰在左少陽在右故左尺脈不應



右巳丑巳未南政太陰司天脈圖

辰戌二歲太陰在泉少陰在右少陽在左故右尺脈沉細不應



右甲辰甲戌南政太陰在泉脈圖

巳亥二歲厥陰司天太陽在左少陰在右右手寸口脈沉細不應

右巳巳巳亥南政厥陰司天脈圖

寅申二歲厥陰在泉太陽在右少陰在左左手尺脈沉細不應

右甲寅甲申南政厥陰在泉脈圖

子午二歲少陰司天厥陰在左太陰在右兩手寸口脈不應

右甲子甲午南政少陰司天厥陰在泉脈圖

卯酉二歲少陰在泉太陰在左厥陰在右故兩手尺脈俱沉細不應

右巳卯巳酉南政少陰在泉脈圖

丑未二歲太陰司天少陰在左少陽在右兩手尺脈俱不應

右乙丑辛丑丁未癸未北政太陰司天脈圖

辰戌二歲太陰在泉少陽在左少陰在右左手寸口脈不應

右丙辰庚辰戊戌壬戌戴北政太陰在泉脈圖

巳亥二歲厥陰司天太陽在左少陰在右左尺脈不應

右乙巳辛巳丁亥癸亥北政厥陰司天脈圖

寅申二歲尺陰在泉少陰在左太陽在右左寸脈不應

右丙寅庚寅戊申壬申歲北政厥陰在泉脈圖

歲當陽明司天少陰在泉法當兩尺脈沉細不應而反浮大兩寸脈當浮大而反沉細是太陽與少陰相反經云尺寸反者死

當浮大而反沉細 當沉細而反浮大

右巳酉巳卯南政尺寸脈反之圖

歲當陽明在泉少陰司天法當兩寸沉細不應而反浮大兩尺脈當浮大而反沉細是陽明與少陰尺寸相反經云尺寸反者死

當沉細而反浮大 當浮大而反沉細

右甲子甲午二歲尺寸相反脈圖

北政陽明司天少陰在泉法當兩寸沉細不應而反浮大兩尺脈當浮大而反沉細是陽明與少陽尺寸相反經云尺寸反者死

當沉細而反浮大 當浮大而反沉細

右乙卯丁卯癸酉辛酉尺寸相反脈圖

北政少陰司天陽明在泉法當兩尺脈沉細不應而反浮大兩寸脈當浮大而反沉細是陽明與少陰尺寸相反經云尺寸反者死

當浮大而反沉細 當沉細而反浮大

右丙子庚子戊子壬午尺寸相反脈圖

南政少陽在右少陰在左左寸脈當沉細不應而反浮大右寸脈當浮大而反沉細不應是謂左右交左右交者死



當浮大而反沉細 當沉細而反浮大

右巳丑巳未左右脈交之圖

南政少陽在右少陰在左左寸脈當沉細不應而反浮大左尺脈當浮大而反沉細是謂左右交少陰在右而交於左



當沉細而反浮大 當浮大而反沉細

右甲辰甲戌左右脈交之圖

南政太陰在左少陰在右右寸脈當沉細不應而反浮大左寸脈當浮大而反沉細不應是謂左右交於左

當浮大而反沉細 當沉細而反浮大

右巳亥巳巳左右脈交之圖

南政太陽在右少陰在左左尺脈當沉細不應而反浮大右尺脈當浮大而反沉細不應是謂左右交於左

當浮大而反沉細 當沉細而反浮大

右甲寅甲申左右脈交之圖

北政太陽在左少陰在右右寸脈當沉細不當洪大左寸脈當浮大而反沉細是謂左右交　少陰在右而交於左

右乙巳丁巳辛亥癸亥左右脈交之圖

辯七情動發五藏變病脈法

右手關前一分爲氣口者以候人之臟氣動發與氣口相通與不及現他變必見於脈者以食氣入胃浮於胃胃氣上注於肺肺朝百脈氣出於口經曰五藏皆禀於胃者五藏之太過氣不能自致於手太陰必因胃氣而至乃氣口脈獨見則死假如天地草木無土氣不生人無胃氣則死胃氣者和緩不過之脈也

辯五藏過不及之爲病

觀夫太過不及脈之大要迫近面散不可失機審而調之爲上工矣學者不可不察也



辯五藏過不及之爲病

人之五藏配木火土金水以善惡神意魄志而生怒喜思憂恐故



此蓋五情動以不正衛所不勝經所謂不恒其德侍其所勝來復傷反受邪此之謂也能乘而侮之甚則所勝來復傷反受邪此之謂也

凡怒則魂門施張木氣奮激傷其脾土甚則子金乘其肝虛來復母譬剋其木足謂傷者肺金也是猶吳王夫差之爭習傷無備越王勾踐乘其虛而伐之遂以破吳吳不得志而越竟破之傷反受邪即此義也

凡喜則神延融燄火氣薄義傷其肺金甚則子火乘心虛來復母譬剋其心火是謂傷反受邪肺脈反濇濇者腎水脈也故喜甚有暴中之患而暴怒亦有暴中之患皆此意也

凡久思則意舍不寧土氣凝滯傷其脾土甚則子木乘其肝虛來復母譬剋其脾土是謂傷反受邪脾脈反弦弦者肝脈也

凡久憂則魂門不閉金氣滿聚傷其肝木甚則子火乘其肺虛來復母譬剋其肺金是謂傷反受邪肺脈反洪洪者心火脈也

凡多恐則志室不遂水氣旋翔傷其脾土甚則子土乘其腎虛來復母譬剋其腎水是謂傷反受邪腎脈反濇濇者脾土脈也



悲則脉虛

凡悲則傷肺故肺脉自虛經曰悲則氣消脉虛心火來乘金氣自虛故悲則淚下或因寒飲食之氣上逆留於胸中留而不去久爲寒中或曰肺金乘肝木而爲淚

脉散而亂

應氣口

凡驚則氣亂驚則肝氣散亂乘其脾土故小兒驚則病青大人驚則面青者肝血亂而下降故青其肝脉亦亂一日驚則肝氣乘心大驚者心脉易位向裏驚乘人心者多尿血也



傳授勝尅流變又當詳而論之故經云五臟受氣於其能生傳之於其所勝氣舍於其所不勝如則知肝死於肺候之於秋庚日篤辛日死餘同干後

悲則脉虛

凡悲則傷肺故肺脉自虛經曰悲則氣消脉虛心火來乘金氣自虛故悲則淚下或因寒飲食之氣上逆留於胸中留而不去久爲寒中或曰肺金乘肝木而爲淚

脉散而亂

應氣口

凡驚則氣亂驚則肝氣散亂乘其脾土故小兒驚則病青大人驚則面青者肝血亂而下降故青其肝脉亦亂一日驚則肝氣乘心大驚者心脉易位向裏驚乘人心者多尿血也

傳授勝尅流變又當詳而論之故經云五臟受氣於其能生傳之於其所勝氣舍於其所不勝如則知肝死於肺候之於秋庚日篤辛日死餘同干後



凡一日之中又分五時以別死時之早晏且脾病甲日病傷乙日死則死於寅卯時以脾屬土日時俱屬木重木剋土故死於此特此內傷藏病之傳次也然暴病卒發者不必泥於傳次也或傳化不以次入者乃憂恐悲怒喜思驚七情并傷於令不得以其次傳所以令人大病此五臟傳變之指要學者不可不知也

辯六淫外傷六經受病脉圖說

左手關前一分爲人迎者以候天之寒暑燥濕風熱中傷於人其邪自經絡而入以迎納之故曰人迎前折方論謂太陽主凡感邪則自太陽始以此考尋經意似若不然風寒喜傷腎暑喜傷心包濕喜傷脾熱傷心燥傷肺以若燥濕同源故不別論以類推之風當自少陽入濕當自陽明入暑當自三焦入寒邦自太陽入故經云陰爲之主陽者衛之使陰氣不入陽氣從來此之謂也經云修己俟天所以立命也由是古人調其臟氣而浮邪不入故先七情而後六淫經云厚德之士必先藏氣故運氣又先之以其次第也

足太陽傷寒左手尺中與人迎皆浮緊而盛浮者足太陽脉也緊者傷寒脉也緊者病增也其証頭項腰脊痛無汗惡寒不惡風



浮緊而洪 浮緊而盛

足陽明傷濕右手關上與人迎皆滿細而沉滿者太陰脉也細者濕脉也長者病發也其証關節煩疼而弱小便濇和大便殰泄

太陰脾經之圖



濡細而沉

少陰腎經之圖



厥陰肝經之圖



厥陰心包絡之圖

少陰太陰心肺二經傷燥熱脈圖

辨不內外因五用乘違病症

察脈必以人迎氣口分內外所因若乃學診之要道也所以脈訣云關前一寸人迎主之然既有三因固不可盡詳而考之於理自備且如疲極筋力盡神度量飲食饑飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡墜折虎狼毒蟲鬼疰客忤鬼壓溺水等外非六淫內非七情內外不收心局不內外雖漢論曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食殊不知飲食入胃能助發宿藴其所以應於氣口者止由七情鬱發因食動見本非宿食能應氣口且如

牢沉作浮陽邪來見脈則浮洪陰邪來見脈則沉緊鬼
症客忤三部皆滑洪大嫡媚沉沉俾澀但與病症不相
應者皆五尸鬼邪遁症之所爲也又如遁尸症脈沉
而不至寸或三部皆緊急如診得此等脈証雖與人迎
氣口相應亦當分數推尋三因交結四季料簡所謂俾
內俾外不內不外亦內亦外亦不內外脈理微妙藝能
難精學然後知所因此之謂也然形於脈兆蘊於數義
未有不學而能者未有學而不成者宜留心焉人如忽
見異像驚戒眩亂脈多失次急虛卒中五藏閉絕脈不
往來譬如墮溺脈不可察與夫金瘡跌折頓走血氣脈
亦無準學者當看外証不必拘脈

辯脈體名狀

浮者按之不足舉之有餘與人迎相應則風寒在經與
氣口相應則營血虛損
沉者舉之不足按之有餘與人迎相應則寒伏陰經與
氣口相應則血凝腑藏
遲者應動極緩按之盡牢與人迎相應則溫寒凝滯與
氣口相應則虛冷氛積
數者去來促急一息數至與人迎相應則風暑自汗與
氣口相應則陰虛陽盛
虛者遲大而軟按之豁然與人迎相應則經絡傷暑與
氣口相應則榮衛失本
實者按舉有力不疾不遲與人迎相應則風寒食經與
氣口相應則心膈胞寒
伏者沉伏不出着骨乃得與人迎相應則風燥熱煩與
氣口相應則氣血壅脈
緩者浮大而軟去來微遲與人迎相應則風熱入藏與
氣口相應則怒極傷筋
緊者動轉無常如絃[illegible]與人迎相應則經絡傷寒與
氣口相應則臟腑作痛
洪者來之至大去之且長與人迎相應則寒濕諸陽與
氣口相應則氣攻百脈
細者指下尋之來往如線與人迎相應則諸經中濕與
氣口相應則五臟凝證
滑者往來流利有如貫珠與人迎相應則中風暑濕與
氣口相應則涎飲凝滯
濇者參五不調如雨沾沙與人迎相應則風濕寒痺與
氣口相應則精血敗耗
弦者端緊徑急如張弓絃與人迎相應則風走疰痛與
氣口相應則飲積溢痰
弱者按之欲絕輕軟無力與人迎相應則風濕緩經與
氣口相應則積阻氣節
芤者中空傍實如按蔥葱與人迎相應則邪壅吐衄與
氣口相應則榮虛衰行
微者極細而軟似有若無與人迎相應則風暑自汗與
氣口相應則陰虛陽盛
動者在關如豆厥厥不行與人迎相應則痰痺陽經與
氣口相應則榮衛失本
促者往來急數時止復來與人迎相應則陰散陽生與
氣口相應則風濕寒痺
結者往來遲緩時止更來與人迎相應則風寒在經與
氣口相應則飲積溢痰
弱者按之欲絕輕軟無力與人迎相應則風濕緩經與
氣口相應則積阻氣節
革者沉伏實大如按鼓皮與人迎相應則中風暑濕與
氣口相應則涎飲凝滯
散者有陽無陰按之滿指與人迎相應則風走疰痛與
氣口相應則精血敗耗
代者藏絕中止餘藏代動無問內外所因得此必死

辯七表脈訟

浮爲在表　爲風應入迎　爲氣應氣口　爲熱　爲
痛　爲嘔　爲脹　爲病　爲喘　浮緩爲不仁　浮大長爲
爲滿不食　浮大爲鼻塞　浮大而濇爲宿食滯氣
風眩癇疾　浮滑疾爲宿食　浮細而滑
浮短爲肺傷諸氣　浮滑爲走刺爲飲　浮數爲大便堅小便
爲傷飲　浮滑疾緊爲百合病
數　浮緊爲淋爲癃閉
芤主血　寸芤爲吐血　微芤爲
出血爲腸癰　尺芤爲下焦虛小便出血
滑爲吐　爲滿爲欬爲熱　爲伏痰　爲宿食　爲蓄
血　爲經閉　爲鬼疰　爲血氣俱實　滑散爲癰緩
滑數爲結熱　滑實爲胃熱　和滑爲妊娠　滑而
大小不勻必吐爲病進爲泄病　滑而浮大小腹痛
弱則陰中痛小便亦然
實爲熱　爲嘔　爲痛　爲氣塞　爲喘欬　爲大便
不禁　實緊爲陰不勝陽爲胃寒　爲腰痛
弦爲寒　爲痛　爲飲　爲瘧　爲水氣　爲中虛
短者按舉似數不及本部與人迎相應則邪閉經脈與
氣口相應則積遊藏氣
濇者按之不見輕手乃得與人迎相應則諸經中濕與
氣口相應則殘泄緩弱
革者沉伏實大如按鼓皮與人迎相應則中風暑濕與
氣口相應則半產脫精
散者有陽無陰按之滿指與人迎相應則淫邪脫泄與
氣口相應則精血敗耗
代者藏絕中止餘藏代動無問內外所因得此必死

爲厥逆　爲拘急　爲寒癖　弦緊爲惡寒　爲疝瘕
爲癖　爲瘀血　雙弦脇急痛　弦而鉤爲脇下刺
痛　弦長爲積隨左右上下
緊爲寒　爲痛頭骨肉等　爲欬　爲喘　爲滿　浮
緊爲肺有水　緊滑爲蛔動　爲宿食　爲逆吐　緊
急爲遆尸　緊數爲寒熱
洪爲腹爲滿爲痛爲熱爲煩　洪實爲癰　洪緊爲癰
疽爲喘急亦爲腹　洪大爲祟　洪浮爲陽邪來見
辯八裏脉病証
微爲虛爲弱爲鼠爲喉爲泄爲亡汗爲拘急　微弱爲
少氣爲中寒
沉爲在裏爲實爲水爲寒爲喘爲癥爲瘕　沉弱爲寒
熱　沉細爲少氣脊不能舉　沉滑爲風水爲下重
不行則止促止促非惡脉也
沉緊爲上熱下冷　沉重而直前絕者爲瘀血
沉重而中散爲寒食成瘕　沉重不至寸徘徊絕者
爲遆尸　沉緊爲懸飲　沉遲爲痼冷　沉重爲傷
暑發熱
緩爲在下爲風爲寒爲弱爲痺爲疼爲不仁爲氣不足
爲脏氣　緩而滑爲熱中　緩而遲爲虛寒相搏食
冷則咽痛
濇爲少血爲亡汗熱氣不足爲逆冷爲下痢爲心痛
濇而緊爲痺爲寒濕　濇細爲大寒
遲爲寒爲痛　遲而濇爲癥瘕咽酸　遲滑爲脹　遲
緩爲寒
伏爲霍亂爲疝瘕爲水氣爲溏泄爲停痰爲宿食爲諸
氣上衝爲張腹實肌
濡爲虛爲痺爲自汗爲氣弱爲下重　濡而弱爲內熱

外冷自汗爲小便難
弱爲虛爲風熱爲自汗
辯九道脉病症
細爲氣血俱虛爲病在內爲積爲傷濕爲後泄爲寒爲
神勞爲憂傷過度爲腹滿　細而緊爲癥瘕攻痛
刺痛　細而滑爲偏仆爲發熱爲嘔吐
數爲熱爲虛爲吐爲痛爲煩渴爲煩滿
動爲痛爲驚爲痺爲泄爲恐
虛爲寒爲虛爲脚弱爲食不消化爲傷暑
促脉經並無文　釋曰其促有五一曰氣二曰血三曰
飲四曰食五曰痰但藏熱則脉數以氣血痰飲食
不行則止促止促非惡脉也
結爲痰爲飲爲血爲積爲氣
釋曰氣寒脉緩則爲結數則爲促雖緩數不同結冰
當如促脉分則可也
散脉經無文　釋曰六腑氣絕於內則手足寒上氣五
臟氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脉皆散散則
不聚病亦危矣
革爲滿爲急爲虛寒相搏婦人半產漏下
釋曰革者革也固結不移之狀三部應之皆危脉也
代者一藏絕他藏代至
釋曰代其死脉不分三部隨應皆是
如前所說凡例皆本聖經學者當熟讀令心開眼明識
取體狀然後交結互究與夫六經外感五臟內傷參
以四時旺相依各部位推尋所因必使了然不疑方
爲盡善其如隨病分門諸脉諸証尤當參對詳審如
是精研方可爲醫門萬分之一否則倘傍聖教欺妄
取財爲含靈之臣賊幸祈勉旃

詩曰
浮芤滑實弦緊洪名爲七表屬陽宮微沉緩濇遲并伏
濡弱爲陰八裏同細數動虛促結散代革同歸九道中
在經在府并在藏識得根源爲上工

分關前關後陰陽詩
掌後高骨號爲關傍骨關脉形宛然次第推排寸關尺
配合天地人三元關前爲陽名寸口尺脉爲陰在關後
陽脉頭痛定無疑陰弦腹痛何方走陽數卽吐兼頭痛
關微卽瀉腸中吼陽實應知面赤風陰微益汗勞兼有
陽實大滑應舌強關數脾熱并口臭陽微浮弱定心寒
關滑食注脾家胎關前關後別陰陽察得病源爲國手

定息數詩
先賢切脉論太素週行一身五十度晝則行陽自陰出
夜則行陰自陽入晝夜各行二十五上合天度爲常則
血榮氣衛定息數一萬三千五百息此是平人脉行度
太過不及皆非吉一息四至平無他更加一至身安和
三遲二數冷爲甚七數六極熱生多八脫九死十歸墓
十一十二魂已去一息一至元氣敗兩息一至死非怪
我今括取作長歌編次心通并意解

六極脉　又名六絕脉皆死脉
雀啄連來四五啄屋漏半日一點彈石來硬事卽散
搭指散滿加解索魚翔似有一仍無緩遊靜中忽一躍
寄語醫家仔細看六脉兒一休下藥

辨男女左右手脉法圖序
黃帝之拯民疾也參天地究人事以立脉法嗟乎脉
者先天之神也故其書夜出入莫不與天地等夫神焉

則出於心而見於眼故脈晝行陽二十五度寐則棲於腎而息於將故脈夜行陰亦二十五度其動靜棲息皆與天地晝夜四時相合且以天道右旋而主乎生化則男子先生右腎右屬陽爲三魂降精氣赤以鎮丹田故男子命脈在右手尺部地道左旋主乎成物則女子先生左腎左屬陰爲七魄降真氣黑以鎮子宮故女子命脈在左手尺部若男子病右尺部命脈好病雖危不死若女子病左尺部命脈好病雖危亦不死天之陽在而陰在北故男子寸脈盛而尺脈弱陽在寸陰在尺也地之陽在北而陰在南故女子尺脈弱陽在寸陰在尺也陽強陰弱天之道也非反也反之者病故男得女脈爲不足女得男脈爲太過左得之病在右右得之病在右男左女右天地之定位也非天也蓋人立形於地故從地化楚人尚右者夷道也地道也故男子左脈強而右脈弱女子則右脈弱而左脈弱天以陰爲用故人之左耳目明於右耳目地以陽爲使故人之右手足強於左手足陰陽互用也非反也凡男子診脈必先伸左手女子診脈必先伸右手男子得陽氣多故左脈盛女子得陰氣多故右脈盛若反者病脈也男子以左尺爲精腑女子以右尺爲血海此天地之神化也所以別男女決死生者也苟不知此則男女莫辯而生死聵然矣於是列圖於左以詔來者李希范曰近年以來人心巇嶮習俗刁薄有兩手營淨男子往往居帷帳之中面目藏祕伸手求診粗工受欺遂致嗤笑噫昔諸葛公嘗以巾幗婦人之服遺司馬將軍天下恥之況乎甘心臥幃幄作婦人以自欺耶斯亦不足稱也矣

傍通五臟法　横看



心經脈圖

心屬火
病則火炎上
故脈洪
主嘔吐沉緩
主胸膈怒氣
痛可利大便

脈訣
本宮滑
脈
脈洪脈
脈實
日來大主溫病發熱

圖象天地晝夜左右陰陽各有所主



腎經過

腎屬水故脈實

宮脈圖

包絡過

包絡屬相火故脈實

宮脈圖



論五臟沉遲數應病詩

左手心部

浮數沉遲熱胃腸浮遲腹冷胃虛冀沉數狂言并苦强
沉遲氣短力難成　生氣不相接續

肝部

浮數惡風筋卽抽浮遲冷眼淚難收沉數疾生常怒氣
沉遲不睡損雙脾

腎部

浮數勞熱小便赤浮遲聽重濁來侵沉數腰疼生赤濁

沉遲白濁耳虛鳴

右手肺部

浮數中風兼熱秘浮遲冷氣搐難禁沉數風痰并氣喘
沉遲氣弱冷涎停

脾部

浮數鬱宣并盜汗浮遲胃冷氣虛膨沉數熱多生口臭
沉遲腹滿脹堅生

包絡部

浮數精泄三焦熱浮遲冷氣濁難任沉數渴來小便數
沉遲虛冷小便頻

診脈裁法斷病歌

左右手脈

心脈迢迢恰似弦頭痛心熱數狂癲男子騰空女騰跌
腎弦氣痛小腸連

心脈煩頻來得實其人煩悶氣喘疾若還止絕更加臨
壬癸死之是端的

心脈微微喑似飢病心補腎卽相宜若其肝微能五癈
醫人調理不須疑

心脈遲遲主嘔吐沉加怒氣痛牽連斯人倘息雖無事
腎者能調便與宜

肝實眼翳能生瘴腹痛尤加脚手酸更被醯酸來刺也
調和補藥便能安

肝微內障甚筋攣失血吞酸頭更旋洪在大腸能泄利
腎微脚冷定相連

肝經帶緩氣須疼食拒心頭主刺酸止代庚申辛酉死
醫人調理定難安

肝脈浮洪偏眼赤刺酸盜汗定相隨數脈忽然潮熱至
甲寅止代定歸眞

命門弦主渴來侵濁帶加之更患淋實脈轉筋兼帶濁

脈洪虛汗渴將臨

命門微細小便頻緩脈膀胱冷氣侵沉緩腰疼浮緩揭更兼遲緩小便生

診暴病歌

兩動一止或三四三動一止六七死四動一止即八朝以此推排但依次

池氏曰暴病者喜怒驚恐其氣暴逆致風寒暑濕所侵病生卒暴損動胃氣而絕即死不過日也脈兩動而一止乃胃氣相絕猶三四日方死三動一止而胃氣將盡猶將六七日穀氣絕盡方死後倣此至若十五動而一止乃死期在於一年也

脈訣指掌圖終

雲岐子七表八裏九道脈證藥目錄

小柴胡湯嘔吐 地骨皮散氣熱
調中湯腹脹 七聖散潤燥
加減梔豉湯吐在乳上 豬苓湯乳下
鴻黃湯乳中 犀角地黃湯血在上
抵當湯九血在下 加減桃仁承氣湯血在中
加減大柴胡湯實熱 大承氣湯秘澁
半夏湯咽痛 小柴胡湯加桂表寒
附子四逆湯下痢寒 簽香半夏散胃痛
涼膈散胃熱 木附湯小便不禁
黃連鴻心湯狂痴 小承氣湯狂語
芍藥湯脾痛 桂枝芍藥湯脾下痛
麻黃湯發表 調中湯脾胃
澤鴻散小便澁

已上屬七表

香蘇湯血亂 當歸芍藥湯補血
補肺散勞嗽 八物湯治久吐
半夏丸痰實 橘皮半夏湯胃痛
枳木湯中痞 羌活湯風傷衛
七氣湯脾痛 桂枝加乾葛湯發寒
龍骨丸失精 桔梗湯氣澁
五補丸補中 木附湯土痛
桂枝加附子湯脾痛甚 五膈寬中散膈痛
生薑瀉心湯脾痛 地骨皮散潤燥

加減小柴胡湯發熱 人參養胃湯代脈
八物湯治血虛 解肌湯主表
已上屬八裏 九道脈

雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法

撰人不詳

七表脈變例論

七表脈者是客邪來傷也乃陰盛陽陽而內陰見也七表脈但熱而不惡寒者是內外皆陽也如七表證自汗惡風却得八裏脈者當用麻黃桂枝各半湯如八裏證自汗惡風得七表脈亦用麻黃桂枝各半湯如有汗不惡風者黃芩白朮黃芩湯如無汗不惡風者葛根湯

脈如浮滑而長為三陽裏發不可發汗經曰陽盛陰虛汗出而死仲景曰脈浮當汗三陽當汗者謂陽中有陰陽分也脈浮亦陽分也汗脈寄陰也故當發汗且陽中有陰有陽乃禦衛之分寄陰自外入者之故宜表出而發去之經曰在上者因而越之此說非謂陽中有陰形之陰是陽中寄邪之陰者其表也夫三陽之表是三陽標也無形經絡受寄陰乃表之表也為陽中陽分也宜發去寄陰之邪故前說陽中有陰當汗者是三陽本也主有形受邪勝此寄陰之表是也外有所主內無所受所主者皮毛血脈肌肉筋骨也無所受者無所受盛也在三陰經絡中有邪者是為無形乃陰中之陽受寄邪當發汗去之為三陰標之病也三陰可汗而已是經絡無形之病也三陰本者藏也當則終歸于裏是有形病也當自各經絡中藥入胃下去之此乃三陰當下也是為陰中之陰可下而愈此為主之陰非是寄邪之陰也夫寄主共論陰中有陽當下去之者陰中者主也有陽者寄邪也言陰經中受陽邪熱可下略說八裏乃陽表陰也其證身涼四肢厥惡熱是外陰而內陽也但寒不熱不渴者是內外皆陰也仲景云厥深熱亦深厥微熱亦微口傷爛亦因發汗得之夫七表八裏互相交變乃深證來止下治傷寒必當子細論之七表八裏九道脈理脈中一說六脈交變浮滑長為三陽乃陽中有陰沉濇短為三陰乃陰中有陽當要表裏分其內外以辨虛實治從標本萬舉萬當夫標本者大陽有標本之化少陰亦然大陽標熱而本寒從此生七表少陰標寒而本熱從此生八裏大陽明與厥陰不從標本從乎中也此舉六氣之標本也叙和所載者是七表八裏九道脉

計一十四道脈之標本也有皆從標從本從乎中假令太陽少陰各有標本之化太陽脈浮少陰脈沉此乃浮沉交內經曰若從標本論之是為長短交長以發汗短以下長曰陽明短曰太陰寸下七寸則太陰寸下一寸半則奪之下令無理凝故長脈發之短脈下之者是滑與澁交滑居寸而熱澁居尺而寒滑居尺而熱澁居寸而寒滑脈曰生澁脈曰死此是二陰二陽變化表裏略舉數端隨脈條下盡窮其理有不盡者於各部脈訣內詳之

七表脈

一浮　二弦　三滑　四實　五弦　六緊　七洪

雲岐子云左手三部寸關尺受非謂主位之脈皆然浮者陽也指下尋之不足舉之有餘再再舉之浮主數數氣促冷汗自出胃脾受強夜卧不安按之不足舉之有餘陰不足陽太過寒則傷形熱則傷氣故肺傷數數氣促宜

柴胡　黃芩　五味子　製半夏各半兩　人參　白芍藥　人參　桑白皮各一錢半

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片煎至七分去滓溫服食按之不足舉之餘再再舉之指下浮藏中積冷榮中熱欲可生精要補虛

藏中積冷按之不足榮中有熱舉之有餘陽有餘陰不足也治之宜

人參　地骨皮　柴胡　黃芩　生地黃各等分　白芍藥　知母各一錢半　石膏一兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片煎至七分去滓溫服食後服連夜頓服生精補虛地黃丸

寸浮中風頭熱痛

主脈浮緊又浮緊主同宮主太陽中風頭痛有汗脈浮緩桂枝湯無汗脈浮緊麻黃湯風在上焦如太陽頭痛有汗出轉陽明頭痛白虎湯少陽頭痛小柴胡湯太陽頭痛羌活湯

關浮腹脹胃虛

主脈弦寒脈浮風寒熱相合致胃中虛空何謂胃虛夫浮脈者風邪也弦者肝脈也以木能克土致胃中虛空理中丸主之風在中焦胃虛不能運化水穀精氣流溢經絡以灌溉皮膚肌肉乳乳脈主淋瀝小便濃又血之風在中焦胃虛不能運化水穀精氣流溢經絡以灌溉皮膚肌肉乳乳脈主淋瀝小便濃又血



製厚朴　陳皮去白　製半夏各壹兩　白术壹兩半　人參五分　甘草炙三分

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片煎至七分去滓溫服食前

尺部見之風入肺大便乾澁故難通

腎脈沉反見浮脈為風火所乘肺氣虛故風入肺市煙使津液於水中知水反不勝火浮主諸風之盛之意也風入肺者何也是金水之虛水既衰弱金無所恃是木火之實火助木而生風腎氣虛內竭故大腸乾澁而燥內經曰侮所勝己乘所勝也火侮其水而勝其金薄其子而因其母治之以

檳榔　木香　羌活　川芎　大黃　郁李仁各壹兩

右為細末棗九桐子大每服三十九漸加之微利為度生薑湯下

乳者陽也指下尋之兩頭即有中間全無曰乳主淋瀝氣入小腸乳主失血弦浮無力手足太陽在寸則吐血在下則瀉血在上焦或以吐止

乳脈在上加減瀉肺湯

梔子四个碎　香豉半兩

先以水二盞煮梔子仁至七分入豉煮三五沸去滓溫服得吐止

乳脈在中宜瀉黃湯

薑香葉　山梔子仁　甘草各半兩　石膏壹兩

右㕮咀水二盞煎一兩細細服無時

乳脈在下宜瀉膀胱湯

衛矛　滑石　澤瀉　阿膠炒各等分

右㕮咀水二盞先用前味煎至一盞去滓後入阿膠化開食前溫服

指下尋之中且虛邪風透入小腸居患時淋瀝兼疼痛大作湯丸必自除

雲岐云乳主血凝而不流凡人之十二經絡以灌溉其是衛血氣不散不能盈滿經絡故見乳乳脈主淋瀝小便濃又血當大柴湯丸也　四物湯地黃丸補之桃仁承氣湯瀉之一

寸乳積血在胸中

主脈弦客脈乳浮乳相合血積胸中熱之甚也治之以

生地黃酒製黃芩各半兩　黃連壹兩　大黃半兩

右㕮咀水一盞半一兩煎至一盞去滓食後服之

關內逢乳腸裏離

主脈弦客脈乳弦相合積血於腸中是肺先受邪傳入大腸當用桃仁承氣湯血在中焦又云乳脈在中或吐血生離治抵當丸或地黃丸

大黃　水蛭炒製各半兩　蝱蟲炒去翅足各半兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服二十丸食後溫水下利為度未利加數服之

尺部見之虛在腎小便遺溺血凝臍

主脈沉客脈弦沉乳相合積血在下焦或以沉澀桃仁承氣湯

桃仁半兩　大黃壹兩　甘草半兩　桂去皮各半兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片煎至一半去滓入芒硝三錢化開食後服以利為度未利再服

又云上焦有血先便後血下焦有血先血後便中焦有血便血齊作

三滑者陽也指下尋之三關如珠動按之即伏不進不退曰滑主四肢困弊腳手酸疼小便赤澁

仲景曰衛氣前通小便赤澁腰中生氣熱中膀胱又云小便赤澁大便難是為實熱宜瀉黃湯主之

赤芍藥　柴胡各壹兩　枳實　大黃各半兩　甘草各半兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片煎至一盞去滓溫服以利為度未利再服

滑脈如珠動曰陽腰中生氣透前腸胃酸只為生實熱大瀉中焦必得康

雲岐云夫小便赤澁腰中生氣是命門所生其脈流利數而疾宜瀉氣湯主之

熱多寒少故宜瀉以辛寒

厚朴製薑炒　枳實麩炒　大黃各半兩

右㕮咀每用水一椀生姜十片先煎厚朴枳實至一盞半再入大黃煎至一盞去滓入芒硝化開午食後未利次日晚食

後服之
滑脉若干多嘔逆
主脉浮客脉滑浮滑相合而為嘔逆生姜半夏湯主之有往來寒熱者小柴胡湯主之寒在上焦緩者
製半夏壹兩　茯苓貳兩
右㕮咀每服一兩水一盞生姜七片煎至一半去滓食後不嘔吐者止不止者再服
関滑胃寒不下食
主脉弦客脉滑弦滑相合引寒入胃致不能食者夏平胃散
秋冬理中丸主之如有表者小柴胡加桂湯半夏湯主之寒在下焦
在中焦
小柴胡加桂湯
柴胡　黄芩　赤芍藥各壹兩　人參半兩
甘草炙三分　桂四分
右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片煎去滓温服
又部見之肝似冰飲水下焦聲瀝瀝
主脉沉客脉滑沉滑相合寒結膀胱胃寒在下焦
炮附子　炮姜各半　白朮壹兩　甘草炙三分　桂七分
每服一兩㕮咀水二盞煎至一盞去滓温服食前
四實者陽也指下尋之不絶舉之有餘曰實主伏陽在內脾虛不食四肢勞倦
實脉尋之舉有餘伏陽烝內致脾虛食少只緣生冒舉温和湯
藥乃痊除
潔古云脾脉本緩反得客脉實緩實相合主胃中有熱故氣温反實故不食也食少氣不宣通故為胃雍上出噫氣也一云氣寒則不宣通即流行伏陽者藏熱于胃脾食少胃中虚熱多生雍陳治之以
厚朴湯
厚朴　生薑各壹兩　丁香半兩
蘇香葉　製半夏各壹兩
右為麤末每服二錢水一盞半生姜七片煎去滓稍熱服食前
雲岐曰脾受熱而反虚故不能食温和湯藥乃平胃散是也
實脉関前胃熱甚
主脉浮客脉實浮實相合陽氣有餘胃中熱甚實在上焦宜
黄連湯
黄連　生地黄　知母各半兩　黄芩壹兩
右㕮咀每服一兩水一盞半煎服
緊脉三関數又弦上來風是正根元忽然狂語人驚怕不遇良醫不得療
潔古云此是三陽合病緊數大陽也弦多少陽也狂言陽明也故實則譫語
山梔子仁壹兩　連翹　黄芩各壹兩　大黄半兩
薄荷壹兩半
右為麤末每服二錢水一盞半生姜七片煎去滓稍熱服食前
雲岐曰緊主風氣伏陽上衝化為狂病　此太陽少陽相合主伏陽上衝變為狂病宜
黄連湯
黄連　生地黄　知母各半兩　黄芩壹兩
右㕮咀每服一兩水一盞半煎服
緊脉三関數又弦上來風是正根元忽然狂語人驚怕不遇良醫不得療
潔古云此是三陽合病緊數大陽也弦多少陽也狂言陽明也故實則譫語
雲岐曰其脉緊洪而實陽氣有餘之象主熱即生風發作狂語可用
調胃承氣湯主之
生地黄　黄芩　山梔子仁各壹兩　大黄半兩
右㕮咀水煎一兩次利為度
緊脉関前頭裏痛
主脉浮客脉緊浮緊相合諸頭痛皆屬三陽
大陽頭痛羌活湯主之必愈入府大承氣湯下之
少陽頭痛在經小柴胡湯主之入府調胃承氣湯下之
陽明頭痛在經白虎湯主之入府調胃承氣湯下之
其脉弦而頭痛者内外也大柴胡湯主之緊在上焦
到関切痛無能動
主脉弦客脉緊弦緊相合大陰受邪脾中切痛治之以
桂枝加芍藥湯
赤芍藥壹兩　甘草半兩　桂參分
右㕮咀水煎一兩加生姜七片服
如實痛加大黄或大承氣湯當揀而用之緊在中焦
隱指寥寥入尺來繳結遲腑常手捧
主脉沉客脉緊沉緊相合遲腑痛者大陰與桂枝芍藥湯不已是寒濕在脾胳也宜附湯主之緊在下焦
桂枝加大黄湯
桂壹兩　芍藥　炙甘草各半兩
右㕮咀每服一兩入生姜棗薑煎服
七洪者陽也指下尋之極大舉之有餘曰洪主伏陽在內
大陽不通燥糞結溢口乾遍身疼痛
潔古云此乃是正陽陽明身熱目痛鼻乾不得卧則知病在陽明經也洪脉有按之實舉之盛洪者陽大過陰不及主頭痛四肢熱大便難小便赤澁夜卧不安治法陽證下之則愈如下之隨證虚實有大承氣湯有小承氣湯有大柴胡湯挑仁湯隨證用之此證有兩證或按之無舉之盛實脉表不可下下之則死脉沉當下下之則愈
洪緊根元本是陽過其季宜用救陰者逢秋季其冬季發汗通腸從裏發汗從表通腸從裏
雲岐曰其脉緊按皆盛本為相火之象
從表宜麻黄湯從裏宜大承氣湯麻黄湯
麻黄　芍藥各一兩　葛根二兩
右㕮咀每服一兩水一盞生姜七片煎服無時以得汗而解
也故實則譫語

未汗服　仲景謂脉來痛立夏得洪大脉知其病愈也
過度七宣及七聖及大柴胡大承氣可選而用之或
洪脉則熟在胃
土脉浮客脉洪浮洪相合熱結於胃中涼膈散加減用之或
連翹二兩柴胡　當歸　生地黄　赤芍藥各半兩
黄芩一兩大黄三錢
右㕮咀一兩水煎服之洪在上焦
利則胃幾半里
土脉弦客脉洪弦洪相合胃熱不停食而吐以酸棗除之
或和之以調胃
大黄出氣熟半　葛根　黄芩　芍藥
桔梗　蔗本　白朮　甘草炙各等分
右㕮咀水煎一兩服之不拘時候日二三服洪在中焦
如秋冬寒在胃中不可用春夏可用胃中有餘熱也又云
在胃者涼藥不可速也胃化火冲出其食酒沫衝上皆為於
熱食不得入
更向人中還若是小便赤澁腳酸疼
潔古云洪在人中陰不及陽也至從下上先損腎肝故小便
赤澁膀胱痛
桑皮白主脉沉客脉洪沉洪相合小便赤澁閉塞不通當
用主之
赤茯苓　澤瀉各半　桑白皮　山梔子仁各一兩
右㕮咀水煎一兩服之得小便利為度不除者腎氣下痛可
用大柴胡加大黄下之洪在下焦
凡此七表雖名陽脉有用熱藥者何答曰陽中有陰故也通
上下中二十一道脉證用藥法者七表之病在於上下調之
上下在中者和之於中辨其脉證知其主客用仲景之藥無
不効也七表脉春夏得之為順秋冬得之為逆
海藏云　浮中風寒乳失血　滑吐實下應須別
弦為拘急緊為痛　洪大從來偏主熱

八裏脉變例論

夫八裏脉者乃右手三部寸關尺受邪者也陽乘陰也是微沉
緩澁遲伏濡弱八裏脉也有裏之表乃三陰經絡拘攣標裏
名也有裏之裏者乃三陰之本腎肝拘攣標之名也且三陰
標者為陰中之陽本者為陰中之陰也盛則歸於胃土乃邪
染有形故裏之表是陰中之陽當潰形以為汗宜發之主宜
緩裏之裏是陰中之陰分也當急下之客實急是知諸中客
邪當急諸于自病當緩前說七表之說八裏
乃秋冬具三陰當指授所在主客相合脉證依緩急治之
假令寒者裏之表也當與麻黄附子細辛湯緩發之是清
形以為汗也如有不惡風寒而反欲去衣身涼面目赤四肢
逆數日不大便小便赤澁引飲身靜重如山讝語舌胃脉沉
細而疾數者是足少陰經及受火邪也是裏之裏病乃陰中
之陰陽邪也此客邪當急下夫之以大承氣湯除之
今將七表脉有下者八裏脉有下者此四者為古今之則於
之裏有脉為證相雜之法　仲景桂枝脉得麻黄證或麻黄
脉得桂枝證沸用麻黄桂枝各半湯
如桂枝證二停麻黄證一停當用桂枝二麻黄一湯法
或麻黄證二停桂枝一停當用麻黄二桂枝一湯法
或麻黄脉桂枝證取脉多少脉停為二停證為一停用麻黄
二桂枝一湯治之
或桂枝脉麻黄證亦脉為二停證作一停用桂枝二麻黄一
湯治之　大抵聖人謂脉者司人之命故以脉為主多從脉
而少從證也舉此脉證交互二法是不令全從於脉亦不令
不從於證如合證當兩取之如證脉俱陽虚法中只合從脉不從
證也然亦不拘亦當臨時消息傳受並從元證來理所投去
處又天之時令且七表有下者為內外皆陽緩下八裏有汗
者為內外皆陰緩汗七表有汗者為外陽而內陰急汗八裏
有下者為內陽而外陰急下故素問說標本之化立四因之
法為此一說也

八裏脉

一微一沉二弦　四濇　五促　六伏　七濡　八弱
雲岐子曰八裏脉者乃右手三部寸關尺受之此八裏脉乃
客邪之脉非主位之脉夫三部主脉寸濇關緩又數是也此
皆主陰客變也
一微者陰也指下尋之往來極微再尋之若有若无曰微主
敗血不止面色无光微脉法象秋冬在陰為慘陰太過陽不
及是血不能守水勝火也血不止者治之以
當歸　白芍藥　桂各半兩　丁香
右㕮咀水煎一兩不拘時候
投之似有舉还无氣滿三焦藏府虛冷氣不調三部皆遲腸鳴
胃飽能除　沉者陰也聚者虛結也言通腸者溫也芍方溫白
尤主之證令變也
一微者陰也指下尋之往來極微再尋之若有若无曰微主
敗血不止面色无光微脉法象秋冬在陰為慘陰太過陽不
及是血不能守水勝火也血不止者治之以
當歸　白芍藥　桂各半兩　丁香
右㕮咀水煎一兩不拘時候
投之似有舉还无氣滿三焦藏府虛冷氣不調三部皆遲腸鳴
胃飽能除　沉者陰也聚者虛結也言通腸者溫也芍方溫白
尤主之證令變也
一微者陰也指下尋之有若无旋之敗血下腸虛崩中日久
時骨木枯　此腎氣有餘命門不足當補命門命門者男子藏
精女子繫胞崩中白帶者命門敗也經水前中謂之骨木枯
治婦人伏龍肝散主之　是為血不能守水勝火也血去精
亡筋骨骨指陰成形養血補虛骨
當歸　白芍藥　熟地黄各一兩
右㕮咀水煎一兩食前服
微脉關前氣上侵
陽虛內氣上衝冷則生氣主脉濇客脉微相合逆氣上
侵可用膈氣散主之微在上焦又云肺氣上衝當以補肺
主之又治勞嗽
阿膠一兩半　甘草三分炙　桑粘子二分半　馬兜苓半兩炒
杏仁去皮尖七个
右為麤末水煎半兩食後溫服加糯米煎尤妙又勻氣散治
不足
當歸　附子炮去皮
主脉緩客脉微緩微相合太陰虛落勻氣散主之補肺散亦
可微在中焦
尺部見之臍下積身寒飲水即呻吟
主脉數客脉微數微相合陰盛陽虛法中只合從脉不從
證也然亦不拘亦當臨時消息傳受並從元證來理所投去
處又天之時令且七表有下者為內外皆陽緩下八裏有汗
者為內外皆陰緩汗七表有汗者為外陽而內陰急汗八裏
有下者為內陽而外陰急下故素問說標本之化立四因之
法為此一說也

八裏脉

一微一沉二弦　四濇　五促　六伏　七濡　八弱
雲岐子曰八裏脉者乃右手三部寸關尺受之此八裏脉乃
客邪之脉非主位之脉夫三部主脉寸濇關緩又數是也此
皆主陰客變也
一微者陰也指下尋之往來極微再尋之若有若无曰微主
敗血不止面色无光微脉法象秋冬在陰為慘陰太過陽不
及是血不能守水勝火也血不止者治之以
當歸　白芍藥　桂各半兩　丁香
右㕮咀水煎一兩不拘時候
投之似有舉还无氣滿三焦藏府虛冷氣不調三部皆遲腸鳴
胃飽能除　沉者陰也聚者虛結也言通腸者溫也芍方溫白
尤主之證令變也
一微者陰也指下尋之有若无旋之敗血下腸虛崩中日久為漏下多

右為末生姜汁搗丸如桐子大每服三十九至五十九生姜湯下沉在上焦

當關氣短痛難伸

主脈緩客脈沉緩沉相合胃中有寒即痛可以九痛丸或桂枝湯主之

陳皮去白三兩　半夏製　枳殼麩炒去穰各一兩　白朮　茯苓　桂各半兩

右咬咀每服一兩生姜七片水煎食前沉在中焦

若在尺中腰脚重小便調數色如泔

主脈數客脈沉沉相合客勝主也寒氣有餘命門三焦而虛故小便如泔八味丸中加桂附治之

一法用黃耆丸主之沉在下焦

三緩者陰也指下尋之往來遲緩小於遲白緩主四肢煩痛氣促不安證在太陽風傷衛當服桂枝湯一云

清氣在下則生飧泄濕不藏矣
七濡者陰也指下尋之似有毋毋不來按之依前却去曰濡
主少力五心煩熱腦轉耳鳴下元極冷
按之似有聚之无髓海丹田定已枯四肢骨痠勞熱甚藏府終
傳命必殂　髓者腎之主四肢骨痠者腎氣衰絕終傳者七
傳也土來尅水必殂也
濡脈關前人足汗
主脈濡客脈濡濡相合肺氣虛也而衛不能固于皮故多
汗桂枝湯主之濡在上焦
當關氣少精神散
主脈緩客脈濡緩濡相合精神散失乃氣衰弱也治之以定
志丸或四君子湯加茯神濡在中焦至此難治也
尺部綿綿即畏寒骨痿肉疎都不管
主脈數客脈濡數濡相合主骨痿不能起於床五指至骨俱
衰故不治
八弱者陰也指下尋之如蛛綿相似輕手乃得重手稍無快快
不前曰弱主氣虛表生產後客風面腫氣弱多傷也
三關快快不能前只為風邪與氣逢少年得此須愛重老弱
之病却瘥　脈若蛛綿者陽氣弱也以應秋毛之脈氣弱多
傷快快者輕手乃得不前者重手稍無是也少年得此病
重者乃春夏也此時當洪大而有力今反無力而不前故要
其重也是春夏為逆秋冬為順老弱逢之病却瘥老弱者秋
冬也秋冬脈當浮毛故為順
關前弱脈陽道虛
主脈濡客脈弱濡弱相合陽氣虛也治之以五補丸為主
四逆湯急治之
關中有此氣多疎
主脈緩客脈弱緩弱相合胃氣內虛故氣多疎散治之以益
黃散平胃散選用之弱在中焦
若在尺中陰氣絕酸疼引變上皮膚
主脈數客脈弱數弱相合主下部損腎氣內絕既陰絕陽盛
疼引於皮膚是三焦無陰鎮撫離其原也氣已損於肺無法
可治也　已上七表是春夏具三陽八裏是秋冬具三陰
故曰得神者昌失神者亡使令氣血各守其鄉也

論九道脈法

一長曰乾大二短坤脾三虛離心四促坎腎五結兌肺六代中土
七牢震肝八動艮小腸九細巽膽
一長者陽也指下尋之三關如持竿之狀舉之有餘曰長過於
本位亦曰長主渾身壯熱夜卧不安
潔古云長法乾此陽明脈故尺寸俱長身熱目痛鼻乾不得
卧當汗陽化氣也
長脈迢迢度三關指下時來又却遠陽毒在藏三焦熱徐徐發
汗發能安
雲岐曰陽毒在藏何由言發汗非在五藏之本陽毒之氣在
五藏之標何為五藏之本肝心脾肺腎是也何為五藏之標
皮毛血脈肌肉筋骨是在此藏也本以其在五藏之深遠也急則邪不能出發之以升麻湯
徐發汗者為在標之淺近也急則邪不能出發之以升麻湯
發在陽明標　一法加羌活麻黃　中治法以地骨皮散治
渾身壯熱
地骨皮　茯苓兩各半　柴胡　黃芩　生地黃
知母略銼　石膏搗碎兩
如自汗已多加知母以咬咀入生姜煎徐徐發者汗之緩也
二短者陰也指下尋之不及本位曰短主四肢惡寒腹中生氣
宿食不消　短法坤腹中有宿食當下之短主陰成形陰不
化穀也
短脈陰中有伏陽氣壅三焦不得宣藏中宿食生寒氣何由通腸謂陰中伏
陽必得康　宿食生寒氣何由通腸謂陰中伏陽氣虛也治之以五補丸為主
焦之氣宣行於下下故用巴豆動藥也外藥備說之病又溫白丸新病備急丹
此在長短脈交論內細說之病又溫白丸新病備急丹
三虛者陰也指下尋之不足舉之亦然曰虛主少力多驚心中
恍惚小兒驚風虛症寫虛脈者離火也中虛之象心主血也
血虛則脈息難成驚風治以瀉青丸
恍惚心中多悸驚三關定息脈難成血成藏府生煩熱補益三
焦便得寧　恍惚者陽主動之兒脈難成往來之象煩熱者
血虛也欲令氣血實故補益三焦命門以助心神之氣也是
以男子藏精婦人繫胞宜以加減小柴胡湯主之
柴胡去苗一兩　黃芩去腐一兩　地骨皮　人參　知母
半夏製　茯苓各半兩　甘草炙一分　白芍藥八分
右㕮咀每服一兩生姜水煎父疾虛煩不得眠酸棗仁湯治之
四促者陽也指下尋之極數併若寸口曰促漸加即死漸退即

禹餘粮湯 赤石脂九主之
動脈根源氣主於陰三關指下模沉沉血山一倒經年月志十名
醫又可尋 以衛為葉榮為根血去則根亡根亡則榮枯此
脉寸有又无絶无根此又脉第三同斷病也宜養血氣 八物湯
戎方一云動主血敗不止面色無光治之宜 當歸 白芍藥 熟地黃 白朮酌一人參
乾姜炮 茯苓 桂各半兩
右㕮咀每服一兩生姜七片水煎食前
九細者陰也指下尋之細細似線來往極微曰細主脏酸髓冷
乏方折精腎無所養陰不榮於上陽不相守
乏方無精治法春夏地黃丸秋冬八味丸主之
乏方無精腰裏酸形容憔悴鬚毛乾如塵冬季經痛月不瘥其
疾必自死 細脉象蛛風也為末風生發陽氣內不潤於皮
毛致毛髮乾至秋則失時秋氣平故不瘥自愈此緒陽發於
春夏諸陰發於秋冬吉也菩薩前胥丸主之
上有氣浮腫本在表宜 麻黃湯
葛根 黃芩各一兩 麻黃半兩 赤芍藥 桂枝
右㕮咀一兩生姜七片水二盞煎至一盞去滓熱服食前
若汗出浮腫是邪從汗出浮者陽也宜發散而解之若不愈
諸消腫藥治之有息類者喘者脉浮而滑亦在於表宜麻黃
湯發表也 葶藶丸 崔氏came來三五咏 至晚終日一服泻
彈石硬來尋即散 捻指數時真脉禁 魚翔似有亦似无
脈迸靜中跳一躍 寄蜂蟄手細看 六部見一休下藥
雲岐子七表八裏九道脉訣畢

論曰余每覽越人入虢之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也怪當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外而悴其內皮之不存毛將安附焉卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗賈百年之壽命持至貴之重器委付凡醫恣其所措咄嗟嗚呼厥身已斃神明消滅變爲異物幽潛重泉徒爲啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟不惜其命若是輕生彼何榮勢之云哉而進不能愛人知人退不能愛身知已遇災值禍身居厄地蒙蒙昧昧蚤若遊魂哀乎趨世之士馳競浮華不固根本忘躯徇物危若冰谷至於是也余宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十稔其死亡者三分有二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷橫天之莫救乃勤求古訓博采衆方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄并平脈辨證爲傷寒雜病論合十六卷雖未能盡愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集思過半矣夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏經絡府俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識妙豈能探其理致哉上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉公下此以往未之聞也觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生實爲難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博識知之次也余宿尚方術請事斯語

傷寒論

張仲景著
王叔和撰次
成無己注解

注解傷寒論序

夫前聖有作後必有繼而述之者則其教乃得著于世矣醫之道源自炎黃以至神之妙始興經方繼而伊尹以元聖之才撰成湯液俾黎庶之疾疢咸遂蠲除使萬代之生靈普蒙拯濟後漢張仲景又廣湯液爲傷寒卒病論十數卷然後醫方大備茲先聖後聖若合符節至晉大醫令王叔和以仲景之書撰次成叙得爲完帙昔人以仲景方一部爲衆方之祖蓋能繼述先聖之所作迄今千有餘年不墜於地者又得王氏闡明之力也傷寒論十卷其言精而奥其法簡而詳非寡聞淺見所能賾究後雖有學者又各自名家未見發明僕忝醫業自幼祖老躭味仲景之書五十餘年矣雖粗得其門而近升平堂然未入於室常爲之慊然昨者邂逅聊攝成公議論該博術業精通而有家學注成傷寒十卷出以示僕其三百九十七法之內分析異同彰明隱奥調陳脈理區別陰陽使表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二方之後通明名號之由彰顯藥性之主十劑輕重之彼分七精制用之斯見別氣味之所宜明補瀉之所適又皆引內經旁牽衆說方法之辨莫不允當實前賢所未言後學所未識是得仲景之深意者也昔所謂慊然者今悉達其奥矣親覩其書誠難默默不揆荒蕪聊序其

傷寒論十卷目錄
卷第一
辨脉法
平脉法
卷第二
傷寒例
辨痓濕暍脉證
辨太陽病脉證并治法上
卷第三
辨太陽病脉證并治法中
卷第四
辨太陽病脉證并治法下
卷第五
辨陽明病脉證并治法
辨少陽病脉證并治法
卷第六
辨太陰病脉證并治法
辨少陰病脉證并治法
辨厥陰病脉證并治法
卷第七
辨霍亂病脉證并治法
辨陰陽易差後病脉證并治法
辨不可發汗病脉證并治法
辨可發汗病脉證并治法
卷第八
辨發汗後病脉證并治法
辨不可吐
辨可吐
卷第九
辨不可下病脉證并治法
辨可下病脉證并治法
卷第十
辨發汗吐下後病脉證并治法

傷寒論藥方目錄
卷一　無方
卷二　方六道
桂枝湯
甘草乾薑湯
調胃承氣湯
卷三　方二十七道
葛根湯
麻黄湯
小青龍
麻黄杏仁甘草石膏湯
茯苓桂枝甘草大棗湯
厚樸生薑半夏甘草人參湯
茯苓桂枝白朮甘草湯
茯苓四逆湯
茯苓甘草湯
梔子厚樸湯
梔子豉湯
梔子乾薑湯
小柴胡湯
桂枝二越婢一湯
芍藥甘草湯
四逆湯
葛根黄芩黄連湯
大青龍湯
乾薑附子湯
桂枝甘草湯
芍藥甘草附子湯
五苓散
梔子豉湯
梔子乾薑湯
小建中湯

大柴胡湯　桃核承氣湯
柴胡加龍骨牡蠣湯　救逆湯
桂枝甘草龍骨牡蠣湯　抵當湯
抵當圓

卷四　方一十九道

大陷胸圓　大陷胸湯
小陷胸湯　文蛤散
白散　柴胡桂枝乾薑湯
半夏瀉心湯　十棗湯
大黃黃連瀉心湯　赤石脂禹餘糧湯
旋覆代赭石湯　桂枝人參湯
瓜蒂散　黃芩湯
黃連湯　桂枝附子湯
甘草附子湯　白虎湯
炙甘草湯

卷五　方十道

大承氣湯　小承氣湯
猪苓湯　蜜煎導方
猪膽汁方　茵陳蒿湯
吳茱萸湯　麻仁圓
梔子蘗皮湯　麻黃連翹赤小豆湯

卷六　方二十道

麻黃附子細辛湯　麻黃附子甘草湯
黃連阿膠湯　附子湯
桃花湯　猪膚湯
甘草湯　桔梗湯
苦酒湯　半夏散及湯
白通湯　白通加猪膽汁湯
通脈四逆湯　烏梅圓
麻黃升麻湯　白頭翁湯
當歸四逆湯　烏頭桂枝湯
乾薑黃芩黃連人參湯

卷七　方五道

理中圓　理中湯附
烧裩散　牡蠣澤瀉散
枳實梔子湯　竹葉石膏湯

卷八　無方
卷九　無方
卷十　無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯　桂枝加厚樸杏子湯
桂枝加附子湯　桂枝去芍藥湯
桂枝去芍藥加附子湯　桂枝麻黃各半湯
桂枝一麻黃一湯　白虎加人參湯
桂枝去桂加茯苓白朮湯　已上九方皆在第二卷
葛根加半夏湯
桂桂加芍藥生薑人參新加湯
梔子甘草豉湯　梔子生薑豉湯
柴胡桂枝湯　桂枝加桂湯　已上六方皆在第三卷
生薑瀉心湯　附子瀉心湯
黃芩加半夏生薑湯　已上五方證在第四卷　甘草瀉心湯
桂枝加大黃湯　桂枝加芍藥湯
四逆加吳茱萸生薑湯　已上五方證在第六卷
四逆加人參湯
四逆加猪膽汁湯方　已上五方證在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如以咽者即今之劑如麻豆大是也云一升者即今之大白盞也云銖者六銖爲一分　即二錢半也　二十四銖爲一兩也云三兩者即今之一兩云三兩即今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣

傷寒論藥方目錄終

注解傷寒論卷一　江陰朱氏校刊本

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

辨脉法第一

問曰脉有陰陽者何謂也答曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死（內經曰微妙在脉不可不察察之有紀從五行生滋萬端變化之有經從陰陽始始之有紀故也陽脉有五陰脉亦五者比之脉之陰陽者以脉從陰陽始故也陽道常饒大浮數動滑一者比之以脉從五行生故也陽道常饒大浮數動滑一者比之平脉也有餘故謂之陽陰道常乏沉濇弱弦微五者比之平脉也不及故謂之陰傷寒之為病邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陰病見陽脉而生生者則邪氣自表之表欲汗而解也如脉陰中風脉微浮為欲愈不浮為未愈者是也陽病見陰脉而生死者則邪氣自裏之裏正虛邪勝如讖言妄語脉沉細者死是也金匱要略曰諸病在外者可治入裏者即死此之謂也）　問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脉沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結也期十四日當劇（結者氣偏結固陰陽不得而雜之陰中有陰陰陽相雜以為和不相離以為結浮數陽也能食而不大便裏虛也為陽氣結固陰不得而雜之是名陽結沉遲陰脉也不能食身病重陰氣結固陽不得見陰脉期當下利今大便鞕者為陰象結固陽不得雜之是名陰結論其數者傷寒之病一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰至六日厥陰傳經盡七日不愈者謂之再經者再經者再歷也自太陽而傳至十二日再經歷陰為傳經盡十三日當愈六至日不愈者謂有一止者陰陽之氣不得相續也陽行也速陰行也緩緩以候陰若陰氣勝而陽不能相續則脉來緩而時一止數以候陽若陽氣勝而陰不能相續則脉來數而時一止數以候陽若陽氣勝而陰不能相續則脉來數而時一止謂寒有結代之脉自愈為死脉此結促之脉止是陰陽氣和而時有一止即非股絕而止云此皆病脉曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒（動為陰陽相搏方其陰陽相搏而虛者則動陽動為陽虛故汗出陰動為陰虛故發熱也如不汗出發熱而反形冷惡寒者三焦傷也三焦者原氣之別使主行氣於陽三焦既傷則陽氣不通而微致身冷經曰陽微則惡寒）　若數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動（脉經云陽出陰入以關為界關為陰陽之中也若數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者是陰陽之氣相搏也故名曰動）陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰陽脉同等者名曰緩也（陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰寸口也陰脉尺中也上下同等奪有偏勝者是陰陽之氣和緩也非苦遲緩之有邪也陰陽偏勝者為結為促陰陽相搏者為動陰陽氣和者為緩學者不可不知也）　脉浮而大者名曰芤芤動微也其脉浮而汗出者則血虛血虛則筋急也（氣盛也陽為氣陰為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚闔腠理也脉浮者汗出衛氣外衰也浮主傷虛則不能滿潤筋絡故筋急也）其脉沉者榮氣微也（經曰氣主呴之血主濡之血主濡之有餘則血實血實則脉盛血虛則脉虛此其常也脉沉者知榮血內微也）如流珠者衛氣衰也（毛肥張理司開闔衛氣外衰也浮主傷寒如流珠者落落不密開闔不司為衛氣外衰故主傷寒以浮沉別榮衛之表或浮沉俱緊以浮沉別榮衛之表或浮沉俱微而衛榮俱虛如流珠為陽氣外脫所以衛氣散於皮膚榮氣微於內故主亡血）　脉濇如車蓋者名曰陽結也（濇為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也）　脉濇如車蓋者名曰陽結也（濇為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也）　脉濇如車蓋者名曰陽結也（濇為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也）

者則血虛血虛則筋急也（陽為氣陰為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰氣主呴之血主濡之血主濡之有餘則血實血實則脉盛血虛則脉虛此其常也脉沉者知榮血內微也）其脉沉者榮氣微也（經曰氣主呴之血主濡之血主濡之有餘則血實血實則脉盛血虛則脉虛此其常也脉沉者知榮血內微也）其脉浮而汗出者衛氣衰也（毛肥張理司開闔衛氣外衰也浮主傷寒如流珠者落落不密開闔不司為衛氣外衰故主傷寒以浮沉別榮衛之表或浮沉俱緊以浮沉別榮衛之表或浮沉俱微而衛榮俱虛如流珠為陽氣外脫所以衛氣散於皮膚榮氣微於內故主亡血）　如流珠者衛氣衰也（毛肥張理司開闔衛氣外衰也浮主傷寒如流珠者落落不密開闔不司為衛氣外衰故主傷寒以浮沉別榮衛之表或浮沉俱緊以浮沉別榮衛之表或浮沉俱微而衛榮俱虛如流珠為陽氣外脫所以衛氣散於皮膚榮氣微於內故主亡血）　如燒鍼則血流不行更發熱而躁頻也（陰榮氣微者謂陰虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也又加燒鍼以補陽不愈頓加發熱而內燥頓也）　脉濇如車蓋者名曰陽結也（濇為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也）　脉濇如車蓋者名曰陽結也（濇為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也）　脉濇如車蓋者名曰陽結也（濇為血陽脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰陰虛生內熱內熱則榮血不行必更外發熱而內燥頓也）

而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名曰緩也（脉浮者衛氣有餘也陰脉弱者榮血虛也內經曰寸口也陰脉尺中也上下同等奪有偏勝者是陰陽之氣和緩也非苦遲緩之有邪也陰陽偏勝者為結為促陰陽相搏者為動陰陽氣和者為緩學者不可不知也）　脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也（脉緊者與緊相類以弦為虛故雖緊而弦不足也經曰弦則為減以緊為病但是切之如轉索無常而不散金匱要略曰脉緊如轉索無常者有宿食也）脉浮而大弦則為減大則為芤減則為寒寒者謂陰盛也陽氣少也大則為芤芤則為虛虛者謂血少不足也所謂革者言其既實且虛則氣血改革不循常度男子得之為亡血失精婦人得之為陰血虛而不能滋養故主半產漏下（問曰病有戰而汗出因得解者何也荅曰脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解但汗出耳不發戰也（浮數陽也能與正爭故不發戰）病有不戰而汗出解者何也荅曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也（陽勝則熱陰勝則寒陰陽爭則戰邪氣將出邪則發精邪氣愛陰陽交會胃和脉生先主陰氣後至則脉前為陽氣後為陰也陽氣全勝陰無所爭何戰之有）　問曰病有不戰不汗出而解者何也荅曰寸口闊上尺中三處

大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脈陰陽和平雖劇當愈三部脈均等即正氣已和雖有餘邪何害之有立夏得洪大脈是其時脈故使然也四時倣此脈來應時為正氣內固雖外感邪氣但自汗出而亦解謂內經曰脈得四時之順者病無他問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病明日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陰得陽則解也夜半得病明日日中愈者以陰得陽則解也日中得病者陽受之夜半得病者陰受之陽不和解也得陰則和是解以夜半陰不和得陽則和是解以日中經曰用陽和陰用陰和陽寸口脈浮為在表沉為在裏數為在府遲為在藏假令脈遲此為在藏也經曰諸陽浮數為乘府諸陰遲濇為乘藏病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知血亡也微為亡陽濇為亡血經曰諸陽者跌陽之脈胃之脈診得浮而濇者脾胃不足也浮者以為氣實濇者以為血虛者此并也經曰脈浮而大浮為氣實大為血虛者脈浮大當為氣實血虛今跌陽脈浮而濇浮則胃虛濇則脾寒脾胃虛寒則穀不消而水不別法當下利少陰腎脈也腎為肺之子為肝之母浮為肺脈弦為肝脈少陰脈弦而浮為子母相生故云調脈若滑而數者則吝熱在下焦使血流腐而為膿故屎膿也寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗也脈經云風傷陽寒傷陰衛為陽榮為陰風為陽寒為陰各從其類而傷也易曰水流濕火就燥者是矣衛得風則熱榮得寒則痛榮衛俱病故跌陽脈遲而緩胃氣如經也跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞕氣噫而除今脈反浮其數發汗以榮氣不足血少故也脈浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗浮大之脈當責邪在表若心下反鞕者則熱已甚但見表證者為病未可攻以遲為不足但見裏熱也蔵屬陰為悉在裏故可下之也不可謂脈浮大更與發汗病源曰熱毒氣乘心心下痞滿此謂有實宜速下之屬府者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻雖心下鞕若餘無裏在陽謂之屬府當先解表然後攻痞溲小便必鞕謂走其津液也汗多則邪氣除而結而利小便使其溲數大便必鞕也經曰邪熱不盡又走其津液必便難也鞕家當下設脈遲則未可攻以遲為不足脈浮而洪身汗如油喘而不休水者為邪氣勝病有不可治卻裏氣未實故也

脈浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗浮大之脈當責邪在表若心下反鞕者則熱已甚而內結也有熱屬藏者為別無虛寒而但見裏熱也蔵屬陰為悉在裏故可下之攻之謂下之也不可謂脈浮大更與發汗病源曰熱毒氣乘心心下痞滿此謂有實宜速下之屬府者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻雖心下反鞕者餘無裏在陽謂之屬府當先解表然後攻痞溲小便必鞕謂走其津液也汗多則邪氣除而結而利小便使其溲數大便必鞕也經曰邪熱不盡又走其津液必便難也鞕家當下設脈遲則未可攻以遲為不足脈浮而洪身汗如油喘而不休水者為邪氣勝病有不可治卻裏氣未實故也

脈浮而洪身汗如油喘而不休水者為邪氣勝病有不可治卻裏氣未實故也脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之脈浮為在表遲為在裏表熱裏寒故下利清穀四逆湯方

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人可大附子一枚乾薑三兩

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀四逆湯主之

脈浮而數浮則為風數則為熱風熱相搏名曰風溫風溫為病自汗身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被發汗者必額上陷脈急緊直視不能眴不得小便必發驚痓

脈浮而數浮則為風數則為熱風熱相搏名曰風溫風溫為病自汗身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被發汗者必額上陷脈急緊直視不能眴不得小便必發驚痓

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

傷寒論 卷一 六

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者真武湯主之

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

真武湯方

茯苓三兩 芍藥三兩 生薑三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

在外陰之使也發汗亥陽亡津液而陽氣不足者漏之也陽不守空經曰表氣虛裏氣不守故使邪中於陰也陽乃亥陰守邪氣因得而入之內搏陰血陰失所守血乃亥行未知從何道而出若脈浮鼻燥者知血必從鼻中出也

諸脈浮數當發熱而瘧漸惡寒若有痛處欲食如常者留積有膿也若數之脈主邪在經當發熱明寒病人一身盡痛不欲飲食如常若瘧人一處欲食如常若瘧發熱惡寒而痛偏著一處欲食如常若瘧是邪氣影絡於經絡之間血氣壅澁不通後者邪氣散解不能作瘧脈浮而遲面熱赤而戰慄者六七日當汗出而解今反發熱者差遲遲為無陽不能作汗其身必痒赤者邪氣外浮於表也脈遲戰慄者本氣不足也日為邪傳經盡當汗出而解之時若當汗不汗邪無從出是以其不能得小汗出故其身必痒也

寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛腫痺酸所為陽中雾露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相涸內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中胃氣上衝脾氣不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入彭府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣微陰無所使客氣內入嘘而出之聲嗢咽塞寒厥相逆為熱所擁疑自下狀如脈肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不關清便下重令便數難膿築淋痛命將難全浮為陽沉為陰陽脈緊則寒邪中於下焦上焦者太陽也下焦者少陰也發熱頭痛項強頸攣腰疼腹痛而寒邪中於少陰也因表氣微虛邪乃而客之不守邪乘裏弱逆中於陰陰虛遇邪內為叫氣急矣內經曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上焦之邪甚則下于中焦下焦之邪甚則上焦此上焦之陽已和故云欲解脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀裏寒外熱汗出而厥通脈四逆湯主之

下利脈數有微熱汗出今反惡寒者表未解也

下利脈數而渴者欲飲水也以其人本有熱在裏故令渴飲水白虎加人參湯主之

下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利脈沉弦者下重也四逆散主之

四逆散方

柴胡 芍藥 枳實 甘草

右四味各十分搗篩已和服方寸匕白飲和服日三服

傷寒論 卷一 十二

外證發於上焦而為熱與藏相薰曰蒸中焦為上下二焦之邪熱不便上為口糜中焦為上下二焦之邪熱不治中焦在胃之中中焦失治胃氣內上衝也胃中苦濁不得脾坤也脾坤勝胃氣磨消水穀脾氣不轉則胃中水穀不消胃中苦濁榮者水穀之精氣也衛者水穀之悍氣也榮血者陰氣也衛氣者陽氣也榮血者陰氣也不流衛氣不得通行故使熱氣得行若陰陽無所使逆陰氣前通也內經曰陽氣者衛外而為固也內經曰陽氣者衛外而為固也外邪客於肺經則聲寒氣內入者客於肺之候肺主聲寒者聲嘔咽塞寒者少外邪也厥者內邪也外內之邪合併相逐為熱則血凝自下如脈附也上焦陰氣厥二氣俱厥不相順接即脾氣獨下焦陰氣厥二氣俱厥不相順接即脾氣獨

化氣血滋養五藏致五藏俱虛而五液注下藏不和使液溢而下流於陰陽合也清邪而不合故數便而下重腸為生氣之原胃為水穀之海腸胃氣絕故曰命將難全脈陰陽俱緊而當解若不解者精氣脫也必不可治傷寒數逆上氣而當不合故數便而下重腸為生氣之原胃為水穀之海腸胃氣絕故曰命將難全脈陰陽俱緊而當解若不解者精氣脫也必不可治傷寒數逆上氣口中氣出譬口乾燥踡卧足冷鼻中涕出舌上滑胎胞胎陰陽俱盛大汗出不解者死傷寒數逆上氣妄治也到七日已來其人微發熱手足溫者此為欲解也腹內痛者必欲利也脈陰陽俱緊為寒為陰得陽則解出譬口乾燥者陽氣漸復正氣方溫也雖踡卧足冷鼻中涕出舌上滑胎胞胎陰陽未分之時不可妄治以漸陰陽之氣到七日已去其陰陽俱盛大汗出不解者死千金方云以喘嗽為欲愈其脈散者死謂其形損故也上氣者肺病散者心脈是心火刻肺金也內經曰心刻肺潤之死陰死陰之屬不過三日而死以形見其損傷故也

問曰脈有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作効象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病証

若手足三部脈皆至是正氣漸邪氣微陽氣復寒氣散必欲解也

若脈和其人大煩目重臉內際黃者此為欲解也脈經曰病人兩目背有黃色起者其病方盛病以脈平治中焦在胃之中中焦失治胃氣內上衝也胃中苦濁不得脾坤也脾坤勝胃氣磨消水穀脾氣不轉則胃中水穀不消胃中苦濁榮者水穀之精氣也衛者水穀之悍氣也榮血者陰氣也不流衛氣不得通行故使熱氣得行若陰陽無所使逆陰氣前通也內經曰陽氣者衛外而為固也內經曰陽氣者衛外而為固也外邪客於肺經則聲寒氣內入者客於肺之候肺主聲寒者聲嘔咽塞寒者少外邪也厥者內邪也外內之邪合併相逐為熱則血凝自下如脈附也上焦陰氣厥二氣俱厥不相順接即脾氣獨

改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分明師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關上部關為中部尺為下部榮衛流行不失衡銓衡銓者猶也可以稱量夏應中矩秋應中衡冬應中權榮行脈中衛行脈外榮衛與脈相隨上下應四時不失其常度譬況心洪肺浮肝弦此自經常不失錄分腎北方水王於冬而脈沈心南方火王於夏而脈洪肺西方金王於秋而脈浮肝東方木王於春而脈弦此為經常錄分此不差也出入升降漏刻周旋水下二刻一周循環人生之脈計長一十六丈二尺一呼一吸為一息脈行三寸一呼脈行三寸一吸脈行三寸一呼一吸為一息脈行六寸一日一夜一萬三千五百息脈行八百一十丈五十度周於身則一刻之中人一百三十五息脈行八丈一尺水下二刻人二百七十息脈行一十六丈二尺

周於身也脈經之行終而復始若循環之無端也當復寸口虛實見焉始從中焦寸口之要皆見於寸口之中變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉潛水滀支飲急弦動則爲痛數則熱煩風陽浮虛寒潛支飲傷陰故脈牢堅者積於內者謂之水飲故脈急弦動則陰陽相引則和是大者無病也於外者謂之支飲故脈急弦動則陰陽相搏則痛生焉數爲陽邪氣勝陽勝則熱煩焉設有不應知變所緣三部不同病各異端脈與病不相應者必係傳變之所致三部部以候五藏之氣陽部察其虛實焉

太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸宄察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度府藏獨見若神爲子條記傳與賢人

太過不及之脈皆有邪氣干於正氣審看師曰呼吸者脈之頭也呼吸定息脈行三寸一呼脈行三寸一吸脈行三寸初在表在裏入府入藏隨其所舍而治之

難經曰一呼脈行三寸一吸脈行三寸一呼一吸脈行六寸以脈醫呼吸而行故言脈之頭也初持脈來遲去疾此出疾入遲名曰內虛外實也外爲陽內經曰來者爲陽去者爲陰是出以候外入以候內疾爲有餘則實遲爲不足不足則虛來疾去遲者陽有餘不足故曰內虛外實來遲去疾者外虛問曰上工望而知之請云病人苦發熱身體疼病人自卧師到診其脈沈而遲者知其差也何以知之表有病者脈當浮大今脈沈遲故知愈也

望以觀其形證問以知其所苦脈以別其表裏病若發熱身疼邪在表也當卧不安而脈浮數今病人自卧而脈沈遲者表邪微也是有裏脈而無表證則知表邪當愈也

人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其病在外當以汗解今脈沈而細今病人腹痛者裏寒也痛甚則不能起而脈沉細相參而無裏證問病切脈三者相參而得之可爲十全之醫故經曰知一爲上知二爲神知三神且明矣師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脈不和處言已愈則不可治今向壁卧師到不驚起而盼視若三焦不通內外否隔上下痞塞表裏不和榮衛不行三焦別焉知其所舍消息診看料度府藏獨見若神爲子條記傳與賢人

太過不及之脈皆有邪氣干於正氣審看師曰呼吸者脈之頭也呼吸定息脈行三寸一呼脈行三寸一吸脈行六寸初在表在裏入府入藏隨其所舍而治之

難經曰一呼脈行三寸一吸脈行三寸以脈醫呼吸而行故言脈之頭也初持脈來遲去疾此出疾入遲名曰內虛外實也外爲陽內經曰來者爲陽去者爲陰是出以候外入以候內疾爲有餘則實遲爲不足不足則虛來疾去遲者陽有餘不足故曰內虛外實來遲去疾者外虛問曰上工望而知之下工脈而知之願聞其說師曰病家人來請云病人苦發熱身體疼病人自卧師到診其脈沈而遲者知其差也何以知之表有病者脈當浮大今脈沈故知愈也

望以觀其形證問以知其所苦脈以別其表裏病若發熱身疼邪在表也當卧不安而脈浮數今病人自卧而脈沈遲者表邪微也是有裏脈而無表證則知表邪當愈也

人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其病在外當以汗解今脈沈而細今病人腹痛者裏寒也痛甚則不能起而脈沉細相參而無裏證問病切脈三者相參而得之可爲十全之醫故經曰知一爲上知二爲神知三神且明矣師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脈不和處言已愈則不可治今向壁卧師到不驚起而盼視若三焦不通內外否隔上下痞塞表裏不和榮衛不行

言三止脈之噦唾者此詐病也設令脈自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈詐病者非善人以言恐之設經曰陽使其畏懼則愈也

脈病人欠者無病也引而上陰陽相引故欠陰陽不相引脈之呻者病也爲陰陽相引則和是欠者無病也呻吟之聲身有所苦則然也言遲者風也急舌強難運用也搖頭言者裏強也表強者由筋經引急而行裏強者由筋經引急而言

風陽浮虛寒潛支飲傷陰故脈急弦動則陰陽相搏則痛生焉數爲陽邪氣勝陽勝則熱煩焉設有不應知變所緣三部不同病各異端脈與病不相應者必係傳變之所致三部部以候五藏之氣陽部察其虛實焉

太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸宄察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度府藏獨見若神爲子條記傳與賢人

太過不及之脈皆有邪氣干於正氣審看師曰呼吸者脈之頭也呼吸定息脈行三寸一呼脈行三寸一吸脈行六寸初在表在裏入府入藏隨其所舍而治之

難經曰一呼脈行三寸一吸脈行三寸以脈醫呼吸而行故言脈之頭也初持脈來遲去疾此出疾入遲名曰內虛外實也外爲陽內經曰來者爲陽去者爲陰是出以候外入以候內疾爲有餘則實遲爲不足不足則虛來疾去遲者陽有餘不足故曰內虛外實來遲去疾者外虛問曰上工望而知之下工脈而知之願聞其說師曰病家人來請云病人苦發熱身體疼病人自卧師到診其脈沈而遲者知其差也何以知之表有病者脈當浮大今脈沈故知愈也

望以觀其形證問以知其所苦脈以別其表裏病若發熱身疼邪在表也當卧不安而脈浮數今病人自卧而脈沈遲者表邪微也是有裏脈而無表證則知表邪當愈也

人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其病在外當以汗解今脈沈而細今病人腹痛者裏寒也痛甚則不能起而脈沉細相參而無裏證問病切脈三者相參而得之可爲十全之醫故經曰知一爲上知二爲神知三神且明矣師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脈不和處言已愈則不可治今向壁卧師到不驚起而盼視若三焦不通內外否隔上下痞塞表裏不和榮衛不行

大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈詐病者非善人以言恐之設經曰陽使其畏懼則愈也此其是歟師持脈病人欠者無病也引而下

曰心脈來不盛去反盛此爲不及病在中頭小本大者即前小後大也小爲正氣大爲邪氣則邪氣先在裏今復還於表故名曰覆不云去而止云來者是邪氣微頭小爲前小則表中氣虛故主汗出下微爲沉微本大爲後大沉則在裏大則病進內經曰心爲牡藏小腸爲之使今邪甚下行格閉小腸使正氣不得從名曰關格脈經曰陽氣上出汗兒於頭今關格正故主汗出下不通而上脫 西方肺脈其形何似師曰肺者金也名太陰其脈毛浮也肺病自得此脈若得緩遲者皆愈若得數者則煩何以知之數者南方火火剋西方金法當癰腫爲難治也 問曰二月得毛浮脈何以處言至秋當死師曰二月之時脈當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝脈屬木應濡弱反得毛浮者是肺脈也肺屬金金來剋木故知至秋死他皆倣此 當春時反見秋脈爲金氣乘木肺來剋肝奪王脈而見至秋肺王肝氣則絕故知至秋死 也 師曰脈肥人責浮瘦人責沉肥人當沉今反浮瘦人當浮今反沉故責之 肥人肌膚虛其脈當沉瘦人肌膚滿其脈當浮今肥人脈反浮瘦人脈反沉必有邪氣加下 師曰寸脈下不至關爲陽絕尺脈上不至關爲陰絕此皆不治決死也若計其餘命死 使脈反常故當責之

生之期期以月節剋之也 脈經曰陽生於寸動於尺陰生於尺動於寸寸脈下不至尺也尺脈上不至關者爲陽絕不能下應於尺也內經曰陰陽離決精氣乃絕不能上應於寸也 陽偏絕故皆決死期以月節剋之者如陽絕於春夏陰絕於秋冬 師曰脈病人不病名曰行尸以無王氣卒脫仆不識人者短命則死人病脈不病名曰內虛以無穀神雖困無若 於者人之根本病人不病也脈病而死不治也 名曰行尸以無王氣卒脫仆不識人者短命則死人病名曰強也 跌陽脈滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊鮮鞭陰陽相抱榮衛俱行剛柔相搏名曰彊也 跌陽脈滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強痛還自傷以手把及坐作瘡也 跌陽之脈以候脾胃兩各有餘脈氣不足生病脾胃兩各實緊相擊府藏自傷前痛當若以手把及而成瘡豈非自病其害乎 寸口脈浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆跌陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格 伏則胃氣伏而不宣中焦關格正氣壅塞而脈浮而大浮爲風遊 經曰浮爲虛內經曰大則病進浮則爲正氣虛大則邪氣實在尺則邪氣格關閉下焦裏氣不得下通故不得小便在寸則邪氣格關閉上焦使食不得入故

自序

不能消穀故令噦耳下焦竭即渴渴欲飲水少多隨病與之其人即利復渴者死以下焦竭津液不復水穀不熟故令利復渴也上焦竭不能作汗令身痛脈不和久則傳入腑胃不能復傳化故不大便也發汗若下之病不解而便閉者死以上焦竭胃中乾燥故令大便難也趺陽脈浮而澁浮則胃氣實澁則小便難今浮澁相搏大便則堅其脾約是也脾約之病雖大便堅小便數大便雖堅不名結也脾約丸主之方見脾約中

脈浮而芤浮者衛氣芤者榮氣傷榮衛俱微三焦無所稟受脈道不利使經絡上下不通血不榮於筋肉肌肉消瘦故曰

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

傷寒例第三

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也春夏爲陽春溫夏熱者以陽之動始於温盛於暑故也秋冬爲陰秋涼而冬寒者以陰之動始於清盛於寒故也冬時嚴寒萬類深藏若天地閉則不傷於寒閉固之者乃名傷寒耳冬三月陰厥盛用事陽乃伏藏冰地坼寒氣嚴烈富是之時善攝生者避其所忌則合乎閉藏之道矣若觸冒之則傷人也其傷於四時之氣皆能爲病春風夏暑秋濕冬寒謂之四時之氣以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也熱爲陽陽主生寒爲病最爲暴殺毒厲之氣中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲温病至夏變爲暑病暑病者熱極重於温也內經曰先夏至日爲温病後夏至日爲暑病温暑之病本傷於寒而得之故大旨均謂之傷寒也其傷於四時之氣皆能爲病春風夏暑秋濕冬寒謂之四時之氣以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也熱爲陽陽主生寒爲病最爲暴殺毒厲之氣中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲温病至夏變爲暑病暑病者熱極重於温也內經曰先夏至日爲温病後夏至日爲暑病温暑之病本傷於寒而得之故大旨均謂之傷寒也是以辛苦之人春夏多温熱病皆由冬時嚴寒所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也四時氣候不正爲病非暴厲之氣時氣所行爲病非暴厲之氣但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳內經曰陰陽者天地之道萬物之綱動而不息濁陰爲地靜而不移天地陰陽交合變化之源也是以彼春之暖爲夏之暑是以彼秋之凉爲冬之寒冬寒者温夏熱秋涼冬寒春温夏熱者四時之正氣也從霜降以後至春分以前凡有非節之暖者名曰冬温冬温之病中而即病者也其冬有非節之暖與傷寒大異冬温復有先後更相重者亦有輕重爲病或輕而不治不同證如後章此爲時行之氣前云冬時嚴寒萬類深藏若天地閉則不傷於寒閉固之者乃名傷寒耳冬三月陰厥盛用事陽乃伏藏冰地坼寒氣嚴烈富是之時善攝生者避其所忌則合乎閉藏之道矣若觸冒之則傷人

項痛腰脊強太陽為三陽之長其氣浮於外故尺寸俱浮是邪氣初入皮膚外在表也當一二日發風府穴名也項中央太陽之脈從巔入絡腦還出別下項是以上連風府其經循肩膊內俠脊抵腰中故病頭項痛腰脊強尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥尺寸俱長者邪傳於陽明也陽明血氣俱多併陽明而血氣淖溢也太陽受邪不已傳於陽明是當二三日發其脈俠鼻者陽明脈起於鼻交頞中絡於目陽明主身之熱者陽明主身之熱者陽明之脈正上顛還出繫目系身熱者陽明之脈正上顛還出繫目系身熱目疼鼻乾者陽明主肌肉鍼經曰陽明氣盛則身以前皆熱目疼鼻乾不得臥者胃氣逆不得從中客邪也不得臥者胃氣逆不得從其道也內經曰胃不和則臥不安尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡於耳故胃脇痛而耳聾者內經曰陽中之少陽通於春氣春脈弦尺寸俱弦耳聾者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當三四日發胃脇痛而耳聾者經氣壅而不利也此三經皆受病未入於府者可汗而已便入府者入府則宜下故云未入於府者可汗而已尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾陽脈循咽喉絡於嗌故嗌乾腹滿而嗌乾者陽脈尺寸俱沉細者邪在裏也則見陽脈微邪在表則見陰脈陽邪傳陰邪氣內陷故太陰受病而脈尺寸俱沉細也自三陽傳於太陰是當四五日發也邪入於陰則漸成熱腹滿而窒乾者脾經壅而氣血不行也尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈繫舌本故口燥舌乾而渴少陰腎水也性趣下少陰受邪不已五六日則傳於少陰也四五日太陰病當五六日發以其脈繫舌本故口燥舌乾而渴病脈尺寸俱沉也四五日太陰病當五六日發人骨於寒則為病熱謂始為寒而終成熱也少陰為病口燥舌乾而渴邪傳入裏熱氣漸深也尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮也厥陰脈微緩者邪傳厥陰熱氣已劇近於厥也當六七日發以少陰邪傳於厥陰煩滿而囊縮者熱氣聚於內也此三經皆受邪已入於腑可下而已三陰受邪為病也當下於法當下而已入於府者可下而已經曰腑病之工宜須兩察若兩緩於寒者一日未變受之腑與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則頭痛口乾煩滿身熱不欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則頭痛口乾煩滿身熱不欲食譫語厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行府藏不通則死矣俠陽俱病表裏俱傷者為兩感也當一二日發以其陰陽兩感病則兩證俱見至於傳經則亦陰陽俱傳也始得一日頭痛者太陽日也口乾煩滿而渴者少陰亦傳於太陽身熱惡寒者陽明病也腹滿而太陰又傳於厥陰耳聾者少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當二三日發以其脈循脇絡於耳故胃脇痛而耳聾者內經曰陽中之少陽通於春氣春脈弦尺寸俱弦耳聾者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當二三日發以其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥尺寸俱長者陽明之邪不已傳於陽明也陽明血氣俱多併陽明而血氣淖溢也太陽受邪不已傳於陽明是當二三日發其脈俠鼻者陽明脈起於鼻交頞中絡於目陽明主身之熱者陽明之脈正上顛還出繫目系身熱者陽明主肌肉鍼經曰陽明氣盛則身以前皆熱目疼鼻乾者陽明之氣盛故身以前皆熱目疼鼻乾不得臥者胃氣逆不得從中客邪也不得臥者胃氣逆不得從其道也內經曰胃不和則臥不安尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡於耳故胃脇痛而耳聾者內經曰陽中之少陽通於春氣春脈弦尺寸俱弦耳聾者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當三四日發胃脇痛而耳聾者經氣壅而不利也此三經皆受病未入於府者可汗而已便入府者入府則宜下故云未入於府者可汗而已尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾陽脈循咽喉絡於嗌故嗌乾腹滿而嗌乾者陽脈尺寸俱沉細也自三陽傳於太陰是當四五日發也邪入於陰則漸成熱腹滿而窒乾者脾經壅而氣血不行也尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈繫舌本故口燥舌乾而渴少陰腎水也性趣下少陰受邪不已五六日則傳於少陰也四五日太陰病當五六日發人骨於寒則為病熱謂始為寒而終成熱也少陰為病口燥舌乾而渴邪傳入裏熱氣漸深也尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮也厥陰脈微緩者邪傳厥陰熱氣已劇近於厥也當六七日發以少陰邪傳於厥陰煩滿而囊縮者熱氣聚於內也此三經皆受邪已入於腑可下而已三陰受邪為病也當下於法當下而已入於府者可下而已經曰腑病之工宜須兩察若兩緩於寒者一日未變受之腑與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則頭痛口乾煩滿身熱不欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則頭痛口乾煩滿身熱不欲食譫語厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行府藏不通則死矣俠陽俱病表裏俱傷者為兩感也當一二日發以其陰陽兩感病則兩證俱見至於傳經則亦陰陽俱傳也始得一日頭痛者太陽日也口乾煩滿而渴者少陰亦傳於太陽身熱惡寒者陽明病也腹滿而太陰又傳於厥陰耳聾者少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當二三日發以其脈循脇絡於耳故胃脇痛而耳聾者內經曰陽中之少陽通於春氣春脈弦尺寸俱弦耳聾者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當二三

若反下之則脫其正氣而死純由本發汗之為逆夫如是則復下之此為逆也本先下之而反汗之為逆也若汗
神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里吉凶之機應若影響豈容易哉神丹者發汗之藥也甘遂者下藥也
下當則吉汗下不當則凶況桂枝下咽陽盛則斃承氣下咽陰盛以亡桂枝湯者發汗藥也承氣湯者下藥也
其應如影隨形如響逐聲入胃陰盛以亡金匱玉函曰不當汗而強與汗之者令人鬲陽轉枯槁而死不當下而強與下之者令人閉陽轉甚假令不禁而死生之要在予
須臾視身之盡不暇計日投湯不當則災禍立至此陰陽
虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而
醫術淺狹憒然不知病源為治乃憒使病者殞效自謂
其分至令冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈
不痛歟凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同
而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又
除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以
愚愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上
之士但務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗催明者居
然能雅其本近取諸身夫何遠之有焉成不治之疾醫
者大宜消息審其先後次第而治之若
安意攻治以求速效者必致傾危之敗凡發汗溫服湯
藥其方雖言日三服若病劇不解當促其間可半日中
盡三服若與病相阻即便有所覺重病者一日一夜當
晬時觀之如服一劑病證猶在故當復作本湯服之至
有不肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也發汗藥
服者易為發散也日三服者藥勢續也病勢稍重當促
急服之以折盛盛不可拘於本方設藥病不相對湯入
即便知之如陰多者投以涼藥即寒逆隨生陽多者投
以溫劑則熱毒即起是便有所覺時時者周時也一日
一夜服湯藥盡劑更看其傳如病證猶在當復作本湯
以發其汗若服三劑不解汗不出者邪氣大甚湯不能
勝必成大疾千金曰熱病脈躁盛而不得汗者此陽脈之極也死　凡得時氣病至五六
日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尚
少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水

者猶當依證與之與之常令不足勿極意也言欲飲一
斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若嘔不可與之
忽然大汗出是為自愈也熱在三焦則為消渴言熱消而上焦乾燥則生渴也若強飲則傷飲變為諸
大熱則能消水熱少不能消之若強飲則傷飲變為諸
病至七八日陽腑氣退自解之時多向生太渴亦須少
少與之以調胃氣不可令過度傷也若飲而腹滿小便不
利若喘若嘔者為水飲內停而不散不可更與之忽然
陽氣通水氣散先發於外作大汗而解　凡得病反能飲水此為欲愈之病
其不曉病者但聞病飲水自愈小渴者為腹中熱少若強與飲病也凡得病
成其禍不可復數小渴者為腹中熱少水水飲不消復為諸飲病也凡得病
脈動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈

脈陰陽俱盛者真氣弱也熱不止者邪氣勝也內經曰病溫虛甚者死　脈至在頭在數者
死為天真榮衛絕也脈至如轉索者其日死為緊急而不軟
不出其證言妄語身微熱脈浮大手足溫者生逆冷脈
沉細者不過一日死矣譫言妄語陽病也身微熱脈浮大手足溫為脈病相應若身逆
冷脈沉細為陽病見陰脈脈病不相應故不過一日而死難經曰脈不應病病不應脈是為死病　此以
前是傷寒熱病證候也

辨痓濕暍脈證第四

傷寒所致太陽痓濕暍三種宜應別論以為與傷寒相
似故此見之痓音強內經曰肺移熱於腎傳為柔痓柔筋柔

同水也脈沉而細者水性趨下也痺痛也因其關節煩疼而名曰濕痺非腳氣之痺也內經曰濕勝則濡瀉便不利大便反快者濕氣內勝也但當利其小便宣泄腹中濕氣古云治濕之病不利小便非其治也濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似熏黃色者腎脈熱也此身色如熏黃即非陽明振熱身黃發於胃家胃家者脾也脾主土其色黃土之爲表裏有振熱則身不疼痛此一身盡疼者濕傷脾也脾病而色見是以身發黃者爲其黃如煙熏非正黃色也濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胃滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒濕渴欲得水而不能飲則口燥煩也此寒濕相搏雖有汗吉不能周身故但頭出也背陽也腹陰也太陽之脈火者脈書太陽受病中風陽氣微後而寒濕中於陰氣故但頭汗出背強欲得被覆向火以宣泄頭中寒濕病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出當風而得之者則先傷於風風而後中濕可與麻黃杏仁薏苡甘草湯見金匱要略中方太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也汗出惡寒身熱而渴風也汗出惡寒也若發汗已身灼熱名曰風溫風溫爲病脈陰陽俱浮自汗出身腫多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癎時瘛者風溫也風傷於上而陽受風脈陰陽俱浮自汗出者痛受邪氣微後而寒濕中於陽故但

者寒在皮膚熱在骨髓也（皮膚言淺骨髓言內身熱欲得衣者表熱裏寒也身寒不欲衣者表寒裏熱也）太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之（陽以候衛陰以候營衛中風也陰陽俱病并於衛則衛實而榮虛故發熱汗自出病發熱汗出者此為榮弱衛強者是也惡寒之貌也淅淅者洒洒惡寒狀榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒微惡風之謂也翕翕者翕翕然而熱也若合而熱也翕翕者氣弱也胸膈氣逆也與牡蠣湯同義乾嘔者風痰在表也鼻鳴乾嘔者風痰而氣逆也與牡蠣湯同義）

桂枝湯方

桂枝三兩去皮　芍藥三兩味苦　甘草二兩炙味甘平

生薑三兩切　大棗十二枚擘味甘溫

內經曰辛甘發散為陽桂枝湯辛甘散風邪內經曰風淫所勝平以辛佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以桂枝為主芍藥甘草為佐也內經曰風淫於內以甘緩之以生薑大棗為使也

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歡熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之（頭痛者太陽也發熱汗出惡風者中風表虛也與桂枝湯以和表加麻黃葛根以祛風且麻黃主表實後葛根湯證云太陽病項背強凡凡無汗惡風為葛根湯主之藥味正與此方同其無汗者當用麻黃今日汗出恐不

加麻黃但加葛根也）太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之（太陽病屬表而反下之則虛其裏邪欲乘虛傳入若不上衝者裏虛不能傳邪而氣逆上與邪爭也則邪仍在表故當復與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能與邪爭邪氣已傳裏也故不可復與桂枝湯攻表）太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不可與也觀其脈證知犯何逆隨證治之（太陽病三日中有吐下溫針壞其正氣邪仍不解者謂之壞病言為醫所壞病也不可復與桂枝湯解外觀脈證知犯何逆而治之逆者隨所逆而救之桂枝本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也（脈浮發熱汗不出者傷寒也可與麻黃湯常須識此勿妄治也）若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也（酒客內熱喜冷而酒復助其熱湯甘酒客得之則中滿而嘔喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳（喘家謂素有喘病之人厚朴杏仁以降氣）

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也（內熱者服桂枝湯則吐如酒客之類也既亡津液又為熱所搏其後必吐膿血吐膿血謂之肺癰金匱要略曰肺癰喘不得臥葦莖湯主之）

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之（太陽病發汗遂漏不止而惡風者為陽氣不足也內經曰衛出下焦下焦者主出而不內內經曰衛氣者晝則行於陽夜則行於陰陽氣已虛亡津液陽氣虛則小便難者汗出亡津液陽氣虛也四肢微急難以屈伸者陰陽俱虛不能榮於四末也可與桂枝湯以溫經復陽）

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之（脈來數時一止復來者名曰促為陽盛則了因下後而脈促為陽盛也太陽病下之其脈促不結胸者此為欲解也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

傷寒八九日則邪傳再經又過三陽欲傳三陰之時也四經次第前三日陽去入陰不入陰者為欲解其傳陰經第六日傳過三陰為傳遍三陰為傳遍再經者至九日其不解傳為再經者至九日若欲解則六日傳遍三陰為傳遍再經者至九日其不解傳為再經者至九日若有將也寒多者為病進也今日發少熱多其病為愈寒多者為病進也今日發少熱多其病為愈寒多寒少為陽氣進故為病進也今日發熱惡寒而熱多寒少為陽氣進而邪氣少也衰不和者邪氣深也日再發者邪氣復常也日再發者邪氣復常也寒熱相半者邪氣復常也日再發者邪氣復常也日二三發者邪氣數也內經曰大則邪至小則平言邪甚則脈大邪少則脈微今日數多而脈微微者是邪氣微微故也故云欲愈脈微而惡寒者表裏俱虛也陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也陰陽俱虛故不可更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

其汗以除表邪）太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻與桂枝湯則愈（煩者繆也服桂枝湯後當汗出而身痒和若反煩不解者風甚而未能散也先刺風池風府以通太陽經而泄風氣卻與桂枝湯解散則愈）

作桂枝湯加厚朴杏子佳（太陽病發汗遂汗漏不止而惡風加厚朴杏仁以降氣）

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也（內熱者服桂枝湯則吐如酒客之類也既亡津液又為熱所搏其後必吐膿血吐膿血謂之肺癰金匱要略曰肺癰喘不得臥葦莖湯主之）

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之（太陽病發汗遂漏不止而惡風者為陽氣不足也內經曰衛出下焦下焦者主出而不內內經曰衛氣者晝則行於陽夜則行於陰陽氣已虛亡津液陽氣虛則小便難者汗出亡津液陽氣虛也四肢微急難以屈伸者陰陽俱虛不能榮於四末也可與桂枝湯以溫經復陽）

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之（脈來數時一止復來者名曰促為陽盛則了因下後而脈促為陽盛也太陽病下之其脈促不結胸者此為欲解也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯方

桂枝二越婢一湯方

桂枝去皮　芍藥　甘草各十八銖　生薑一兩　大棗四枚擘　麻黃十八銖去節　石膏二十四銖碎綿裹　

胃為十二經之主脾治水穀為生氣通行津液外營於胃脈所以謂之越婢者以發越脾氣通行津液外營於胃脈即此義也

右七味咬咀以五升水煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升本方當裁為越婢湯桂

枝湯合飲一升今合為一方桂枝二越婢一服桂枝湯或下之仍頭項强痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之頭項强痛翕翕發熱無汗下為邪氣仍在表也心下滿微痛小便不利則欬結胸今外證未罷無汗小便不利則心下湯微痛為合故也與桂枝湯以解外加茯苓白朮利小便行留飲傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其脚以復其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之脈浮自汗出小便數若陽氣不足也心煩脚攣急若陰氣不足也陰陽氣俱虛則不可發汗若與桂枝湯攻表則又損陽氣故為誤也得之便厥咽中乾煩吐逆者先作甘草乾薑湯復其陽氣得厥愈足温乃與芍藥甘草湯緩其陰血則脚伸若陰陽氣復其自汗出小便利若胃氣燥譫語少與調胃承氣湯微溏以和其胃重發汗為亡陽加燒鍼則損陰內經曰榮氣微者加燒鍼則血不行重發汗復燒鍼是陰陽之氣大虛四逆湯以復陰陽之氣

甘草乾薑湯方

甘草四兩炙　乾薑二兩炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服

芍藥甘草湯方

白芍藥四兩酸微寒　甘草四兩炙甘平

芍藥苦而赤酒白收而赤散酸以收之甘以緩之酸甘相合用補陰血

右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分温再服

調胃承氣湯方

大黃四兩去皮　甘草二兩炙　芒硝半升味鹹苦大寒

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少温服之

四逆湯方

甘草二兩炙味甘平　乾薑一兩半味辛熱　附子一枚生用去皮破八片辛大熱

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人可大附子一枚乾薑三兩

服後如師言夜半手足當温兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子温經亡陽故也厥逆咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其厥即愈足温更與芍藥甘草湯緩其陰血則脚伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯和其胃氣胃氣和譫語即止若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

辨太陽病脈證并治法中第六

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之太陽病項背強几几者中風表虛也項背強几几無汗惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之

葛根湯方

葛根肆兩　麻黃三兩去節　桂二兩去皮　芍藥二兩　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘

本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也

右柒味㕮咀以水壹斗先煮麻黃葛根減貳升去沫內諸藥煮取參升去滓溫服壹升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

太陽病不解併於陽明者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病陽明少陽合病陽明少陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽虛寒邪氣甚客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與葛根湯以散經中甚邪太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

邪氣外主裏裏氣不和氣下而不上者但下利而不嘔逆而不下者但嘔而不下利與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣

葛根加半夏湯方

葛根肆兩　麻黃三兩去節湯泡去黃汁焙乾稱　生薑三兩切　甘草二兩炙　芍藥二兩　桂枝二兩去皮　大棗十二枚擘　半夏半升洗

右捌味以水壹斗先煮葛根麻黃減貳升去白沫內諸藥煮取參升去滓溫服壹升覆取微似汗

諸藥煮取參升去滓溫服壹升覆取微似汗太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

此太陽傷寒也寒則傷榮頭痛身疼腰痛骨節疼痛者太陽經榮血不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而榮虛惡風寒也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

麻黃三兩味甘溫去節　桂枝三兩去皮味辛熱　甘草一兩炙味甘平　杏仁七十個湯去皮尖味辛溫

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草開腠發汗桂枝杏仁散寒下氣

右肆味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服捌合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

此傷寒見風脈也傷寒者身疼此以風勝故不久脈必利無少陰裏證者為風寒外傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也大青龍湯主之

此中風見寒脈也浮則為風緩則傷衛緊則為寒風則傷榮榮傷則血不行寒則傷榮榮傷衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風并於衛衛為陽盛雖下利脈遲微邪在裏也促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出甚所致當而汗出者為因喘而汗出氣逆所致與葛根黃芩黃連湯散表邪除裏熱

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤　甘草二兩炙　黃芩二兩味苦寒　黃連三兩味苦寒

內經曰甘寒散熱為陽表未解者散以之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

右肆味以水捌升先煮葛根減貳升內諸藥煮取貳升去滓分溫再服

出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也大青龍湯主之

此中風見寒脈也浮則為風緩則傷衛緊則為寒風則傷榮榮傷俱病故發熱惡寒身疼痛也風并於衛衛為陽盛雖下利脈遲微邪在裏也促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出甚所致當而汗出者為因喘而汗出氣逆所致與葛根黃芩黃連湯散表邪除裏熱

大青龍湯方

麻黃六兩去節　桂枝貳兩去皮味甘溫　杏仁四十個去皮尖味苦甘溫　生薑叁兩切味辛溫　大棗拾貳枚擘　甘草貳兩炙味甘平　石膏如雞子大碎味甘微寒

辛甘均為發散然風宜辛散寒宜甘發以辛甘相合乃能發散榮衛之風寒麻黃甘草石膏杏仁以發散榮中之寒桂枝薑棗以解除衛中之風

右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服壹升取微似汗汗出多者溫粉粉之壹服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

此傷寒見風脈也傷寒者身疼此以風勝故不久脈必利無少陰裏證者為風寒外傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

小青龍湯方

麻黃叁兩去節　芍藥叁兩味酸微寒　五味子半升味酸溫　乾薑叁兩味辛熱　甘草叁兩炙味甘平　細辛叁兩味辛溫　桂枝叁兩去皮味辛熱　半夏半升湯洗味辛微溫

寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣燥內經曰腎

苦燥急食辛以潤之乾薑細辛半夏之辛以行水氣而潤腎欲逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安肺

右捌味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥

煮取叁升去滓溫服壹升

加減法　若微利者去麻黃加芫花如雞子熬令赤色下利者不可攻其表汁出必脹滿麻黃發其陽水消入胃必作利芫花下十二水水去利則止　若渴者去半夏加栝蔞根栝蔞根苦潤生津液非渴者所宜故去之　若噎者去麻黃加附子一枚泡經曰水得寒氣經曰水得寒氣冷必相搏其人即噎加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘去麻黃惡發汗　若小便不行爲小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行爲小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓導

水於下加所當也　若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要畧曰其人形腫按之不內麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴脈湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之　欬而微喘者水寒射肺也發熱不渴者表證未罷也與小青龍湯發表散水服湯已渴者裏氣温水氣散爲欲解也太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯　脈浮弱者桑弱弱衛強也　太陽病外證未解不可下也下之爲逆

太陽病先發汗而復下之浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之　經曰桑胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆則其類矣　太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之　經曰本發汗而復下之爲逆也若先發汗治不爲逆

發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之　經曰桑胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆則其類矣　太陽病外證未解脈浮弱汗出惡風者桂枝湯主之　浮弱汗出表虛也

太陽病外證未解不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之　下後大喘表裏氣上逆則爲裏氣上逆加厚朴杏仁

喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之　下後表虛邪氣傳裏正氣將脫也下後微喘則爲裏氣上逆以下逆氣　太陽病外證未解者不可下也下之爲逆

者宜桂枝湯主之　經曰本發汗而復下之爲逆也若先發汗治不爲逆

發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之　經曰桑胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆則其類矣　太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之　脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日而表證仍在亦當發其汗既服溫暖發散湯藥雖未作大汗亦微除也煩者身熱也邪氣不爲汗解鬱而發熱蒸於經絡發於肌表故生熱則血爲熱所傷裏也今尺脈微身重心悸者知下後裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈　經曰諸脈浮數當發熱而漸惡寒今反不惡寒不惡熱而身重心悸者損其津液不足則不可發汗發汗則傷衛數則傷榮榮衛俱虛陽氣微也脈微細者陰血弱也

搏肝氣不治故目瞑也劇者熱甚於經迫劇妄行而厲卻得衄則熱隨血散而解陽氣重者熱氣重也與麻黃湯以解前太陽傷寒之邪也　太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈風寒在經不得汗解鬱而變熱衄則熱隨血散故云自衄者愈二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色繆繆正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也　太陽病未解脈併入陽明而太陽證罷者名曰併病續自微汗出不惡寒者爲太陽證罷陽明證具也法當下之若太陽證未罷者爲表未解則不可下當小發其汗先解表也當解之熏之經循面色繆繆正赤者陽氣怫鬱在表也當於經故躁煩也之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣怫鬱在表也當於經故躁煩也之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣不得越散邪無從出擁甚於經迫血妄行上爲衄也　傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯主之　煩者熱也與桂枝湯以解外邪若頭疼不已爲邪氣乘虛傳裏也今尺脈微身重心悸者知下後裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈　經曰諸脈浮數當發熱而漸惡寒今反不惡寒不惡熱而身重心悸者損其津液不足則不可發汗發汗則傷衛數則傷榮榮衛俱虛陽氣微也脈微細者陰血弱也

則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮膚是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則愈　病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之　藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表病也先其時者先發汗則愈　傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之　傷寒脈浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出擁甚於經迫血妄行因致衄也　傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小便清者不可盡那在裏是仍在

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人

參三兩新加湯主之汗後身疼煩邪氣夫盡若血虛不足亡津液胃燥或也又曰遲者榮氣不足血少故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生薑人參以益不足之血發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之發汗後喘當作桂枝湯汗出則喘愈今汗出喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯以散其邪

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃 肆兩去節　杏仁 五十箇去皮
味甘溫　味甘溫

甘草 貳兩炙　石膏 半斤碎綿
味甘平　味甘寒

內經曰肝苦急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以純甘之劑發之

右肆味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取貳升去滓溫服壹升

發汗過多其人又手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之發汗過多亡陽也陽受氣於胃中胃中陽氣不足故病又手自冒心心下悸欲得按者與桂枝甘草湯以調不足之氣

桂枝甘草湯方

桂枝 四兩去皮　甘草 貳兩炙
味辛熱　味甘平

桂枝之辛走肌而益氣甘草之甘入脾而緩中

右伍味以水壹斗煮取參升去滓溫服壹升日三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊為邪在表當發汗發汗則外動經絡損傷陽氣外虛則不能主持諸脈身為振振搖也與此湯以和經陽

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓 四兩去皮　桂枝 三兩去皮
甘平　味辛熱

甘草 貳兩炙　白朮 貳兩炙
味甘平　味甘溫

右肆味以水六升煮取三升去滓分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之發汗病證則不解表氣亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒與芍藥甘草附子湯以補榮衛

芍藥甘草附子湯方

芍藥 三兩炙　甘草 三兩炙　附子 壹枚炮去皮破
酸微寒　味甘平　捌片味辛熱

右肆味以甘澗水壹斗先煮茯苓減貳升內諸藥煮取參升去滓溫服壹升日參服作甘澗水法取水貳斗置大盆內以杓揚之水上有珠子伍陸千顆相逐取用之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之發汗後腹脹與下後同但滿而不實者何以言之發汗後外已解也若病人不能飲水口乾但欲漱水者此為裏虛有熱也與此湯和脾胃而降氣

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴 半斤去皮　生薑 半斤切
炙味苦溫　味辛溫

甘草 貳兩炙　半夏 半斤洗
味甘平　味辛平

人參 壹兩味
甘溫

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用甘泄之厚朴之苦以泄腹滿人參甘草之甘以益脾胃半夏生薑之辛以散滿氣

右伍味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷陽氣外虛則不能主持諸脈身為振振搖也與此湯以和經陽

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓 四兩去皮　桂枝 三兩去皮
甘平　味辛熱

甘草 貳兩炙　白朮 貳兩炙
味甘平　味甘溫

右肆味以水六升煮取三升去滓分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之發汗病證則不解表氣亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒與芍藥甘草附子湯以補榮衛

芍藥甘草附子湯方

芍藥 三兩炙　甘草 三兩炙　附子 壹枚炮去皮破
酸微寒　味甘平　捌片味辛熱

右肆味以水五升煮取壹升五合去滓分溫服疑芍藥之酸收斂發汗之辛溫固陽氣而補衛甘草之甘調和辛酸而安正氣以上三味以水五升煮取壹升五合去滓分溫服疑脫非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之發汗若下之病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁與茯苓四逆湯以復陰陽之氣

茯苓四逆湯方

茯苓 六兩味
甘平

人參 壹兩味
甘溫

附子 壹枚生用去皮破捌片味辛熱

甘草 貳兩炙　乾薑 壹兩
味甘平　味辛熱

右伍味以水五升煮取三升去滓溫服七合日二服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏實也遂因汗出不惡寒者此表解裏未和與調胃承氣湯和胃氣

調胃承氣湯方

芒硝 半斤味鹹寒

甘草 貳兩炙　大黃 三兩去皮
味甘平　味苦寒

右叁味以水三升煮取壹升去滓內芒硝更煮一兩沸頓服

發汗後不可行甘草瀉心湯與調胃承氣湯和胃氣

發汗後惡寒者虛不惡寒但熱者實當和胃氣與調胃承氣湯

發汗後不可行桂枝湯汗出而渴者五苓散主之汗出而渴者亦不惡寒今發汗病不解表邪未盡也煩渴者表邪未盡也汗出則傷津液胃燥故渴

五苓散方

豬苓 十八銖去皮
甘平

澤瀉 一兩六銖
甘平味酸鹹

茯苓 十八銖
甘平

桂枝 半兩去皮
味辛熱

白朮 十八銖
味甘平

右伍味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之發汗已脈浮數者表邪未盡也煩渴

亡津液胃燥也與五苓散和表裏燥傷寒汗出而渴者五苓散以和表裏若者茯苓甘草湯主之傷寒汗出而渴者亡津液胃燥汗出不渴者邪氣不傳裏也五苓散以和表裏汗出不渴者邪氣不傳裏但在表而表虛也與茯苓甘草湯和表合觀

茯苓甘草湯方

茯苓貳兩味甘平　桂枝貳兩去皮味辛熱　生薑三兩切味辛溫　甘草壹兩炙味甘平

茯苓甘草之甘益津液而和衛桂枝生薑之辛助陽氣而解表

右四味以水四升煮取貳升去滓分溫三服

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之中風發熱至六七日則表也渴欲飲水邪傳裏也裏熱甚則能消水傳裏不散飲而吐水而吐故名水逆與五苓散和表裏散停飲　未持脈時病人手叉自冒心師因教試令欲而不欲者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此發汗多亡陽胃中陽氣不足手叉自冒心即見外證知陽氣不足也又試令欲而不即欲者耳聾也知陽氣虛明矣耳聾者陽氣虛精氣不得上通於耳故也　發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘喘肺疾飲水多喘者飲

佛懊其人因致國金匱要略曰亡血復汗寒多故令發冒汗出則佛鬱之邪得解解則冒愈金匱要略曰冒家欲解必大汗出汗出表和而裏未和者然後復下之**太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解但陰脈微**者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯主之脈陰陽俱停無偏勝俱者陰陽氣和也經曰寸口關上尺中三處大小等也脈陰陽俱停無偏勝也脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者陽不足而陰有餘也經曰陽虛陰盛汗之則愈陰脈微者陰不足而陽有餘也經曰陽盛陰虛下之則愈**太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使**汗出欲救邪風者宜桂枝湯太陽中風脈浮而緊發熱汗出惡風而淡淡者小弱也浮者陽也發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必湊之故少氣時嘔而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛之

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳者與小柴胡主之病有在表者有在裏者有在表裏之間渴之半表半裏證五六日也玉函邪氣自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日中風五六日傷寒往來寒熱即是或中風或傷寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂或中風或傷寒非定處是以寒熱往來也邪在表則心煩有定處則心腹脹滿今止言胸脇苦滿知邪氣在表裏也默默靜也至於心腹痞言胸脇苦滿知邪氣在表裏也默默靜也邪在表則呻吟不安邪在裏則煩悶亂內經曰陽入之陰則靜默默者邪方自表之裏在表裏之間也邪在裏則不能食邪在裏則不欲食邪在表裏之間未至於必不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏而嘔心煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏處則所傳不一故有或為之證有柴胡證但見一證便是即是此或為之證

小柴胡湯方

柴胡半斤味苦微寒　黃芩三兩味苦寒　人參三兩甘温　半夏半斤洗味辛温　生薑三兩切甘平　甘草三兩炙甘平　大棗十二枚擘味甘温

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服　後加減法

若胃中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛温熱宜苦括蔞實苦寒以泄胃中蘊熱若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤括蔞根苦而涼微熱生津二物為當若脇下痛加牡蠣四兩甘鹹以軟之牡蠣入中渴者亦牡蠣之屬若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩飲而水行

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡湯主之身熱惡風頸項強者表不解也滿而渴者裏不和也邪在表則手足温邪在裏則手足煩今手足温而渴者知邪在表裏之間也與小柴胡湯主之與小柴胡湯主之身熱惡風頸項強者表不解也滿而渴者裏不和也邪在表則手足温邪在裏則手足煩今手足温而渴者知邪在表裏之間也與小柴胡湯主之**若不差者非裏熱也必由邪氣自表之裏耳氣不和所致與小柴胡湯主黃芩加芍藥以除傳裏之邪**

若胃中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚胃中煩而不嘔者令人中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛温熱宜苦括蔞實苦寒以泄胃中蘊熱**若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩**半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤括蔞根苦而涼微熱生津二物為當**若脇下痛**

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服　後加減法

若胃中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚胃中煩而不嘔者令人中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛温熱宜苦括蔞實苦寒以泄胃中蘊熱**若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩**半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤括蔞根苦而涼微熱生津二物為當**若脇下痛**

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡湯主之身熱惡風頸項強者表不解也滿而渴者裏不和也邪在表則手足温邪在裏則手足煩今手足温而渴者知邪在表裏之間也與小柴胡湯主之**若不差者非裏熱也必由邪氣自表之裏耳氣不和所致與小柴胡湯主黃芩加芍藥以除傳裏之邪**

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩甘鹹以安之**病人胸中似喘不喘似呕不呕似食非食**似喘不喘似呕不呕似食非食邪在表則不能食邪在裏則不欲食邪在表裏之間未至於必不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏而嘔心煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏處則所傳不一故有或為之證有柴胡證但見一證便是即是此**或為之證**

小柴胡湯方

柴胡半斤味苦微寒　黃芩三兩味苦寒　人參三兩甘温　半夏半斤洗味辛温　生薑三兩切甘平　甘草三兩炙甘平　大棗十二枚擘味甘温

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服　後加減法

微煩者為未解也與大柴胡下之則愈日數過多服下而柴胡證不罷者亦須先與小柴胡湯以解其表經曰凡柴胡病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯是也嘔不止其表裏和可名嘔不止雖劇微煩者裏熱已甚結於胃中也與大柴胡湯下其裏熱則愈

大柴胡湯方

柴胡半斤味苦平　黃芩三兩味苦寒　芍藥三兩味酸微寒　生薑五兩切味辛溫　枳實四枚炙味苦寒　大棗十二枚擘味甘溫　大黃二兩味苦寒

柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥之酸苦泄而扶陰辛者散也半夏之辛以散逆氣辛甘和脾薑棗之辛甘以和榮衛

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方用大黃二兩若不加大黃恐不為大柴胡湯也

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以圊藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之傷寒十三日再傳經盡當解之時也若不解胸脇滿而嘔者邪氣猶在表裏之間此為柴胡湯證若以柴胡湯下之使其潮熱自利醫反以大藥下之虛其腸胃邪熱乘虛入府日晡所發潮熱已而利也潮熱雖為熱實然胃腸之邪未已故先與小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯以下胃熱

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之傷寒十三日不解過經譫語者胃有燥屎也當以語導令大便出今反下利者知醫以丸藥下之也若小便利者津液偏滲大便當鞕反下利者知醫以丸藥下之也下利脈數而厥者今欲自利也反利脈調和則非虛寒由腸胃熱脇熱而利也與調胃承氣湯以下胃熱太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方太陽膀胱經也太陽經邪熱不解入府為熱結膀胱其人如狂者以熱在下焦未至於狂但不應爾經曰其人如狂血不為畜為熱迫之則血自下下者愈此為熱在膀胱必與血相搏若血下則熱隨血出而愈若血不下者則血為熱所畜積於下而少腹急結乃可攻之與桃核承氣湯下熱散血內經曰從外之內而盛於內者先治其外後調其內此之謂也

桃核承氣湯方

桃仁五十箇去皮尖味甘平　桂枝二兩去皮味辛熱　芒硝二兩　甘草二兩炙　大黃四兩

甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃仁之甘下蓄血散以桂枝之辛大熱之氣寒以取之鹹苦攻之故加二物於調胃承氣湯中也

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之傷寒八九日邪在表不當下而下之胃中空虛客於胃中也傷者心惡熱而神不守也虛津液不行也譫語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行於裏不營於表也與柴胡湯加龍骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚加桂枝以行陽氣而利小便加大黃以泄胃熱此譫語加桂枝去皮

柴胡加龍骨牡蠣湯方

人參一兩　龍骨一兩半　鉛丹一兩半　桂枝一兩去皮　茯苓一兩半　大黃二兩　牡蠣一兩半熬

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一二沸去滓溫服一升

傷寒腹滿讝語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門腹滿讝語者脾胃病也浮而緊者肝脈也脾病見肝脈木行乘土也經曰水行乘火名曰橫刺期門以瀉肝之盛氣肝脈木行乘土名曰縱刺期門者肝之募刺之以瀉肝經盛氣傷寒發熱讝語者胃熱也大渴欲飲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門傷寒發熱讝語者胃熱也大渴欲飲飲水不止者必發狂也發狂不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

而虛腎氣乘寒氣而動發爲奔豚金匱要略曰病有奔豚從驚發得之腎欲上乘心故其氣從少腹上衝心也先灸核上以散其寒與甘草龍骨桂枝加桂湯以泄奔豚之氣火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之因虛又加燒針煩躁故生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣湯以散火邪

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝壹兩 甘草貳兩 牡蠣貳兩熬 龍骨貳兩

辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中之火邪澁可去脫龍骨牡蠣之澁以收斂浮越之正氣

右爲末以水伍升煮取貳升去滓溫服八合日參服

太陽傷寒者加溫針必驚也寒則傷榮榮氣微者加燒針則血留不行發作煩躁

桃仁 二十箇去皮尖 大黃三兩酒洗

苦甘平大黃之苦以下結熱桃仁之甘以散結血

右肆味爲末以水伍升煮取貳升去滓溫服壹升不

太陽病身黃脈沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

水蛭三十箇熬 蝱蟲三十箇熬去翅足 桃仁二十箇去皮尖 大黃三兩酒洗

苦寒蝱蟲水蛭之鹹苦以除蓄血桃仁大黃之苦以下結熱

右肆味爲末以水伍升煮取參升去滓溫服壹升不

温温欲吐鬱鬱微煩則邪熱已下於胃也日數頗多若不經吐下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上中二焦之邪若胃吐下傷損胃氣先發其汗胡湯所能去與調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣虛即招乘虛入胃爲實非柴

在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽經

瘀熱在裏故也抵當湯主之

太陽經也陰陰也太陽經中之熱乘虛傳裏之邪熱結於胃中若不結於胃中其人發狂者以熱在下焦少腹當結於胃中其人發狂者以熱在下焦少腹當結

邪氣傳裏之邪熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂血自下下者愈此之謂也

當結者熱結在膀胱者血證諦也抵當湯以下逐血

抵當湯方

水蛭三十箇熬 蝱蟲三十箇熬去翅足 桃仁二十箇去皮尖 大黃三兩酒洗

苦甘平大黃之苦以下結熱桃仁之甘以散結血水蛭蝱蟲之鹹以除蓄血

右肆味爲末以水伍升煮取參升去滓溫服壹升不

而實蓄血也應抵當湯以下蓄血

利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當圓

蓄血於下焦若熱蓄津液不通則小便不利其熱不甚而蓄血證悉具故以丸藥緩攻之

抵當丸方

水蛭二十箇熬 蝱蟲二十箇熬去翅足 桃仁二十箇去皮尖 大黃三兩

右肆味爲末分爲四丸以水壹升煮一丸取汁合服之

辟時當下血若不下者更服
太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦
裹急也飲水多而小便自利者則水不內畜但腹中水
多令心下悸小便少而小便不利則水畜於內而不行必苦裹急也

辨脈法

內諸藥上音納 噦弱上音悅飲水也切 惕熟上音挾切 見風脈現上音
漬疾智切 蚘音回人腹中長蟲也 蚑音祇 瞑音下音參 咬咀上音交下才與切 咬咀嚼也 更衣音更改也 沫音末 懊上於刀切 憹女交切 心亂也 懊憹痛悔聲 窒陟栗切 塞也 擗脾入聲切 拘音驅 目搖音栗 瞤音閏 悸音季 心動也 人迎切 頸大脈也 喘音舛 悸息數也 咄音恰 驚也 惡現下音 餂音舔 食也 嗌於賣切 咽也 噦於月切 氣逆也 噫於介切 出聲也 但兒音蜎 蟲動貌 水蛭質音 蟲音駃 騠上音 決下音 思俊切 坡險也

注解傷寒論卷四 江陰朱氏校刊本

漢張仲景述 王叔和撰次 成無己注解

辨太陽病脈證并治法下第七

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脈浮
關脈沉名曰結胸也何謂藏結答曰如結胸狀飲食如
故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰藏結舌上白
胎滑者難治結胸者邪結在胸藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入於胃中故關與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故曰藏結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞕痛寸脈浮關脈沉知邪結在陽也陰結而陽不結陰氣乘陽虛而下故時下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治藏結無治故云難治
舌上白胎滑者邪氣結胸中亦寒故不渴舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲飲水而小便不利者名曰
瘕水也與下瀉藏結故使之然
病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸也
太早故也發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入裏結於胸中為結胸無熱惡寒者發於陰也而反下之則表中陰邪入裏結於心下為痞結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胸丸方結胸痙項強者為邪結胸中津液不通故也與大陷胸丸下結滿痛按之亦如柔痙之狀
大陷胸丸方
大黃半斤 芒硝半升 甘遂一錢七 杏仁去皮尖熬黑半升 葶藶半升熬 芒硝一名消石以其鹹能軟堅 甘遂苦寒 葶藶苦寒 杏仁苦寒 大黃苦寒 芒硝苦寒 葶藶味苦甘溫 大黃芒硝之苦以下熱杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達之速取其洞利皆以下泄滿實也
右末先取水二升煮大黃取一升去滓內芒硝更煮一
兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服
大陷胸湯方
大黃六兩去皮苦寒 芒硝一升 甘遂一錢七 苦寒
大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名消石以其鹹能可以直達透結胸甘遂三物為允

結胸證其脈浮大者不可下下之則死結胸為邪結胸
禁如藥法
結胸證悉具煩躁者亦死結胸證悉具以邪結已深也煩躁者正邪結
得寸脈浮關脈沉者為在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難可制故云結是在表者猶多未全結也下之則死結胸證悉具煩躁者亦死
氣散亂也邪氣下之則死
太陽病脈浮而動數浮則為風數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒
者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛
客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則
為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗
劑頸而還小便不利身必發黃也動數皆陽脈也當責邪在表轉而汗出者謂之盜汗出反惡寒者表邪乘虛其胃氣表邪乘虛陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲膈內拒痛者客氣動煩也金匱要略曰短氣不足以息者實也邪氣躁煩心中懊憹皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於膈鬱於心下為鞕滿而痛成結胸也與大陷胸湯以下結熱若胃中空虛陰氣不結於胃膈下入於胃中者逆身汗出則為熱越不得越必發黃也
大陷胸湯方
大黃六兩去皮苦寒 芒硝一升 甘遂一錢七 苦寒 甘遂苦寒
大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名消石以其鹹能軟堅甘遂以直達透結胸
可以直達結胸三物為允
右參味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮
一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服
傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞕者
大陷胸湯主之病在表而下之熱入因作結胸此不云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實緊為裏實以心下痛按之傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱爲正邪分爭未全斂結與大柴胡湯下之但結胸無大熱者亦非熱結也是水飲結於胸脇謂之水結胸周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞕滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱盛也與大陷胸湯以下其邪小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之心下鞕痛手不可近者結胸也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胸結胸脈沉緊或寸浮關沉今脈浮滑知熱未深結與大陷胸湯以逐其水太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞕滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱盛也與大陷胸湯以下其邪小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之心下鞕痛手不可近者結胸也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胸結胸脈沉緊或寸浮關沉今脈浮滑知熱未深結與

小陷胸湯以除飽脇上結熱也

小陷胸湯方

黃連一兩 半夏半升洗 栝蔞實大者一箇苦寒 苦寒以泄之辛以散之黃連栝蔞實之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右三味以水六升先煮栝蔞取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

取貳升去滓分溫叁服

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

脈浮者必結胸也脈緊者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血此太陽病下之後邪氣傳變其脈促者爲陽盛下後脈促爲陽勝陰也結胸也故不作結胸爲欲解下後脈浮爲上焦陽邪結而爲上焦陽脈沉下後脈緊則太陽之邪傳於少陰經曰結胸者寸脈浮關脈沉下後脈緊則太陽之邪傳於少陰經曰脈緊者屬少陰內經曰邪客於少陰內食所以脈緊者必咽痛脈弦陰之經令人啞病不可內食所以脈緊者必咽痛脈弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳所以脈弦者必兩脇拘急下後邪氣

脈浮者必結胸也脈緊者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血此太陽病下之後邪氣傳變其脈促者爲陽盛下後脈促爲陽勝陰也結胸也故不作結胸爲欲解下後脈浮爲上焦陽邪結而爲上焦陽脈沉下後脈緊則太陽之邪傳於少陰經曰結胸者寸脈浮關脈沉下後脈緊則太陽之邪傳於少陰經曰脈緊者屬少陰內經曰邪客於少陰內食所以脈緊者必咽痛脈弦陰之經令人啞病不可內食所以脈緊者必咽痛脈弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳所以脈弦者必兩脇拘急下後邪氣

脈浮者必結胸也脈緊者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血此太陽病下之後邪氣傳變其脈促者爲陽盛下後脈促爲陽勝陰也結胸也故不作結胸爲欲解下後脈浮爲上焦陽邪結而爲上焦陽脈沉下後脈緊則太陽之邪傳於少陰經曰結胸者寸脈浮關脈沉下後脈緊則太陽之邪傳於少陰經曰脈緊者屬少陰內經曰邪客於少陰內食所以脈緊者必咽痛脈弦陰之經令人啞病不可內食所以脈緊者必咽痛脈弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳所以脈弦者必兩脇拘急下後邪氣

以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結於胃脇心下鞕痛本以水寒伏熱爲實而瀉之胃無熱證者外無熱而熱悉收斂於小陷胸湯以下逐之白散下熱故亦可攻

小陷胸湯方

文蛤五兩 瓜蔞實大者一箇味鹹寒 鹹走腎則可以勝水氣

右壹味爲散以沸湯和壹服湯用五合

文蛤散方

文蛤五兩味鹹寒 鹹走腎則可以勝水氣

右壹味爲散以沸湯和壹服湯用五合

白散方

桔梗三分味辛微溫 巴豆一分去皮心熬黑研如脂辛溫 貝母三分味辛苦平 辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣巴豆之辛用以散寒

右件叁味爲散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢七羸者減之病在膈上必吐在腸下必利不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若水以潠之洗之盖令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥叁兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩內上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

者太陽表病也少陽裏病也太陽少陽相併爲病不純在表故頭項痛而或眩冒亦未全入裏故時如結胸心下痞鞕不但強痛而或眩冒時如結胸心下痞鞕此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以瀉少陽之邪在半表半裏則可發汗發汗則亡津液譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門

熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之中風發熱惡寒表病也若經水適來血室不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入於血室熱除脈遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脘下滿如結胸狀譫語者熱入血室而裏實期門者所以瀉熱入血室也婦人中風七八日續

婦人中風七八日續

熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之中風發熱惡寒表病也若經水適來血室不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入於血室熱除脈遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脘下滿如結胸狀譫語者熱入血室而裏實期門者所以瀉熱入血室也婦人中風七八日續

婦人中風七八日續

者太陽表病也少陽裏病也太陽少陽相併爲病不純在表故頭項痛而或眩冒亦未全入裏故時如結胸心下痞鞕不但強痛而或眩冒時如結胸心下痞鞕此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以瀉少陽之邪在半表半裏則可發汗發汗則亡津液譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門

熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之中風發熱惡寒表病也若經水適來血室不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入於血室熱除脈遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脘下滿如結胸狀譫語者熱入血室而裏實期門者所以瀉熱入血室也婦人中風七八日續

婦人中風七八日續

後則邪當所去胃腑滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之間為未解也胃腑滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間為未解也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以留其裏之邪復津液而勃陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半斤味苦平 桂枝三兩去皮味辛熱 乾薑二兩味辛熱 括蔞根四兩味苦寒 黃芩三兩味苦寒 牡蠣二兩熬味鹹寒 甘草二兩炙味甘平

內經曰熱淫於內以苦鹽之柴胡黃芩之苦以發越其陽桂枝甘草之辛甘以發散在表之邪陽以泄胃腑之滿牡蠣之酸以斂胃液之竭乾薑之辛以回陽復少汗津液不足而為渴若以生津液

右柴味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升溫服壹升日叁服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解 傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯 傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯 傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

半夏瀉心湯方

半夏半升洗味辛平 黃芩味苦寒 人參各三兩味甘溫 黃連一兩味苦寒 大棗十二枚擘味甘溫 甘草三兩炙味甘平 乾薑一兩味辛熱

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣黃芩之苦以泄痞熱參甘草大棗之甘以緩之

右柴味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升溫服壹升日叁服

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩太陽少陽併病為邪氣在半表半裏之二經之邪乘虛而入太陽表邪人裏結於胃中為結胸心下鞕少陽裏邪乘虛下迫則利不止若邪結陰分則飲食如故而為熱逆裏受邪也邪在裏者下之可攻之若浮入裏結此為陽邪內結故水漿不下而心煩 脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳浮而緊者當發其汗而反下之若浮入裏為陽邪入裏則作結胸浮不入裏而緊入裏者為陰邪入裏則作痞逆表解者乃可攻之其人漿漿汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之可下亦須待表解者乃可攻之其人漿漿汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯方

芫花熬味辛溫 甘遂味苦寒 大戟十枚擘味苦寒

芫以散之芫花之辛以散飲若以泄之甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主泄甘者脾之味也大棗之甘而勝水

表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不罷者不為逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後邪傳裏者則結於胃中為陽結胃以下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以心下為陰受氣之分與太陽陷胃湯以下其結陰邪傳裏者則結於胸中為結胸以胸為陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞此之謂也

半夏瀉心湯方

半夏半升洗味辛平 黃芩味苦寒 人參各三兩味甘溫 黃連一兩味苦寒 大棗十二枚擘味甘溫 甘草三兩炙味甘平 乾薑一兩味辛熱

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣黃芩之苦以泄痞熱參甘草大棗之甘以緩之

右柴味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升溫服壹升日叁服

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩太陽少陽併病為邪氣在半表半裏之二經之邪乘虛而入太陽表邪人裏結於胃中為結胸心下鞕少陽裏邪乘虛下迫則利不止若邪結陰分則飲食如故而為熱逆裏受邪也邪在裏者下之可攻之若浮入裏結此為陽邪內結故水漿不下而心煩 脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳浮而緊者當發其汗而反下之若浮入裏為陽邪入裏則作結胸浮不入裏而緊入裏者為陰邪入裏則作痞逆表解者乃可攻之其人漿漿汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯方

芫花熬味辛溫 甘遂味苦寒 大戟十枚擘味苦寒

芫以散之芫花之辛以散飲若以泄之甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主泄甘者脾之味也大棗之甘而勝水

右七味等分各別搗為散以水壹升半先煮大棗肥者擘取肉藥末強人服壹錢七羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩而色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈 太陽病因發汗遂發熱惡寒因復下之又虛其裏表中除也因復下之又虛其裏表中寒者外虛陽氣邪復不除也因復下之心下痞者表邪內陷傳於心下痞按之濡為陽邪表證罷為無陽裏有痞為塌陽火火氣內攻致胃煩也傷寒之病以陽為主今人面色青膚肉瞤動者陽氣大虛故云難治若面色微黃手足溫者即陽氣得復故云易愈 心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之 心下鞕按之痛關脈沉者實熱也心下痞按之濡其脈關上浮者虛熱也大黃黃連湯以導其虛熱

大黃黃連瀉心湯方

大黃二兩味苦寒 黃連一兩味苦寒

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱

右貳味以麻沸湯貳升漬之須臾絞去滓分溫再服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之 心下痞者虛熱內伏也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽 本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之 本因下後成痞當與瀉心湯再之若其人渴而口燥煩小便不利者是水熱痞也與五苓散發汗利水則愈一方忽之一日乃愈者不飲者外水不入所作之水得行而痞亦愈矣

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭腸下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之 胃為津液之主下痞鞕乾噫食臭胃中空虛客氣上逆心下痞鞕金匱要略曰中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀也脾下有水氣腹中雷鳴下利者土弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃

寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之 傷寒中風是傷寒而反下之因爾腹中雷鳴下利者甘草瀉心湯主之 風也邪氣在表醫不作表解之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞕乾嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆也與瀉心湯以攻表加甘草以補虛前以汗後胃虛足外傷陽氣故加生薑以此以下後胃虛是內損陰氣故加甘草 傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便 傷寒服湯藥下後利不止而心下痞鞕者氣虛而客氣上逆也與瀉心湯攻之則痞已醫復以他藥下之又虛其裏致利不止也理中丸脾胃虛寒下利者服之愈此以下焦虛故與之其利益甚聖濟經曰滑則氣脫欲其收之此利由下焦開腸洞泄便溺遺失澁劑所以收之赤石脂禹餘糧湯以澁洞泄下焦主分清濁下利者與赤石脂禹餘糧湯以澁劑所以收之此利由下焦不約也如水殺不分也若服澁劑而利不止當利小便以分其氣

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂一斤碎 味甘溫 禹餘糧一斤碎 味甘平

本草云澁可去脫石脂之澁以收飲之重可去怯餘糧之重以鎮墜

已上貳味以水陸升煮取貳升去滓叁服

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿 傷寒吐下後發汗則表裏之氣俱虛虛煩脈甚微爲正氣內虛邪氣擾亂七八日正氣當復邪氣當罷而心下痞脇下痛氣咽喉眩冒者正氣內虛而不復邪氣留結而不去脈動惕者經絡之氣虛極久則熱氣還經必成痿

寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復代赭石湯主之 大邪雖解以曾發汗吐下胃氣弱而虛氣上逆故心下痞鞕噫氣不除與旋復代赭石湯降虛氣而和胃

旋復代赭石湯方

旋復花三兩味鹹溫 人參二兩味甘溫 生薑五兩切味辛溫 代赭石一兩味苦寒 大棗十二枚擘 甘草三兩炙甘溫 半夏半升洗味辛溫

傷寒論 卷四 十四

鞕則氣堅醫味可以頓之旋復之鹹以耎痞堅則氣浮重劑可以鎮之代赭之重以鎮虛逆辛者散也生薑半夏之辛以散虛痞甘者緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升溫服壹升日叁服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯 前第三卷廿六證云發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯此同汗下難殊既不當損正氣則一邪氣所傳既同遂用一法治之經所謂若發汗若下若吐後亦不在裏而在胃中也胃中與表相應故知邪在胃中者猶如桂枝證而寸脈微浮也以胃中痞鞕氣上衝咽喉不得息知寒邪客於胃中而不在表也十金曰氣浮上部與寒胃心胃中滿者吐之則愈與瓜蒂散以吐之

瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黃 赤小豆一分酸溫 右貳味各別搗篩爲散已合治之取叁錢匕以香豉一合用熱湯柒合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死素有宿昔之積結於腹下爲痞今因傷寒邪氣入下痞若表解而下利心下痞者可與瀉心湯若不下利但心下痞者可先解表而後攻痞表不解而心下痞者可與此語治法同汗下難殊既不當損正氣則一邪氣所傳既同遂用一法治之經所謂若發汗若下若吐後亦不在裏而在胃中也胃中與表相應故知邪在胃中者猶如桂枝證而寸脈微浮也以胃中痞鞕氣上衝咽喉不得息知寒邪客於胃中而不在表也十金曰氣浮上部與寒胃心胃中滿者吐之則愈與瓜蒂散以吐之

舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯散熱生津 傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之 無大熱者爲母無大熱也口燥渴心煩背微惡寒爲表未全罷而以屬太陽也當與附子湯今反與白虎加人參湯散熱生津故知非太陽少陽併病也 傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之 傷寒脈浮發熱無汗表不解不渴者麻黃湯渴者宜五苓散非白虎所宜大汗後大渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之 麻黃湯渴者乃可與白虎加人參湯以散裏熱非別太陽少陽併病也

心下痞鞕而項強如刑狀背反張者痙 痙病強直如刑狀背反張證爲發熱而傳裏也浮爲在表沈爲在裏今寸脈微浮則邪不在表

太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之 心下痞鞕而項強而眩者少陽也頸項強者太陽也刺大椎肺俞則邪出太陽之經

以太陽脉下項依脊故爾肝俞以寫少陽之邪以膽爲表裏之府故爾太陽爲在表少陽爲在裏即是半表半裏之邪少陽之邪益甚干胃必發讝語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛入裏必作結胸太陽與少陽併病而反下之成結胸

合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

太陽陽明合病自下利爲在表當與葛根湯發汗陽明少陽合病自下利爲在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利爲在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以合解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以散逆氣

黃芩湯方

黃芩 三兩味苦寒 甘草 二兩炙味甘平 芍藥 二兩味酸平 大棗 十二枚擘味甘温

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

右肆味以水壹斗煮取叁升去滓温服壹升日再夜壹服若嘔者加半夏半升生薑叁兩

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

溫家下後舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒是邪氣入裏而爲下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而爲下熱上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而獨治於下爲下寒腹中痛陽不得降而獨治於上爲胸中熱欲嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣

黃連湯方

黃連 味苦寒 甘草 炙味甘平 乾薑 味辛熱 桂枝 去皮味辛熱各三兩 人參 二兩味甘温 半夏 半升洗味甘温 大棗 十二枚擘味甘温

上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂薑半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓温服壹升日叁服夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之

傷寒七八日再經之助則邪氣多在裏身必不苦疼痛今日數多復身體疼煩不能自轉側者風也煩者風濕相搏也煩者風濕也經曰風則浮虛脉經曰脉來濇者氣也不嘔不渴裏無邪也脉得浮虛而濇身有疼痛但在經也與桂枝附子湯以散表中風濕

若其人大便鞕小便自利者去桂枝加白朮湯主之

桂發汗走津液此小便利大便鞕爲津液不足去桂加朮

桂枝附子湯方

桂枝 四兩去皮味辛熱 附子 三枚炮去皮破八片味辛熱 生薑 三兩切味辛温 甘草 二兩炙味甘温 大棗 十二枚擘味甘温

風在表者散以桂枝甘薑之辛甘溫在經者逐附子之辛熱薑棗辛甘行氣衛通津液以和表也

右伍味以水陸升煮取貳升去滓分温叁服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪劇也風勝則傷故骨節煩掣痛不得屈伸近之則痛劇也風勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣爲風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫爲濕外搏也與甘草附子湯散風固衛氣

甘草附子湯方

甘草 二兩炙味甘平 附子 二枚炮去皮破味辛熱 白朮 二兩味甘温 桂枝 四兩去皮味辛熱

桂枝甘草之辛甘散風邪而和衛附子白朮之辛甘解濕氣而温經

右肆味以水陸升煮取叁升去滓温服壹升日叁服得微汗則解能食汗止復煩者服伍合恐壹升多者宜服六七合爲始

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

浮爲在表有熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府故止言寒如瓜蒂散證云胸上有寒者是矣與白虎湯以解內外之邪

白虎湯方

知母 六兩味苦寒 石膏 一斤碎味甘寒 甘草 二兩炙味甘平 粳米 六合味甘平

內經曰熱淫所勝佐以苦甘以緩之甘草粳米之甘以益氣

右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓温服壹升日參服

脉按之來緩而特一止復來者名曰結又脉來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治

結代之脉一爲真氣虛衰脉來動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰爲難治之脉經曰脉結者生代者死此之謂也

脉按之來緩而時一止復來者名曰結陰也脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰代陰也得此脉者必難治

結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也脉來甘草湯益虛補血氣而復脉

炙甘草湯方

甘草 四兩炙味甘平 生薑 三兩切味辛温 桂枝 三兩去皮味辛熱 人參 二兩味甘温 生地黃 一斤味甘寒 阿膠 二兩味甘温 麻子仁 半升味甘平 大棗 三十枚擘味甘温

甘草大棗之甘以補不足之桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津耗散爲枯五藏虛弱榮衛澀滯經脉結代心動悸甘草大棗之甘以補不足之桑柏寒明冬地黃之甘澤以潤之麻仁阿膠潤經益血復脉通心也

傷寒論卷四終

釋音

俛 音免俯也 瞤 如倫切目動也 眞 求位切匿也 瘈 於危切痙病也 爽 音軟柔也 椎 直追切擊也 涸 胡各切竭也 烊 音羊爍也

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

辨陽明病脉證并治法第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也陽明胃也邪自太陽經傳之入府者謂之太陽陽明經曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈是太陽陽明腑約病也正陽陽明者胃家實是也邪自陽明經傳入府者謂之正陽陽明經曰陽明病脉遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解可攻裏也手足濈濈然汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若一服谷氣通便也餘如前法少陽陽明者胃家實也邪自少陽經傳之入府者謂之少陽陽明經曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語陽明之為病胃家實是也此屬胃即是少陽陽明病也邪傳入胃熱毒留結則胃家為實其候下去之不可留於胃中是知邪在陽明胃家實也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也邪自少陽經傳之入府者謂之太陽陽明經曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語陽明之為病胃家實也此屬胃即是少陽陽明病也邪傳入胃熱毒留結則胃家為實其候下去之不可留於胃中是知邪在陽明胃家實也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也邪自少陽經傳之入府者謂之太陽陽明經曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語陽明之為病胃家實也此屬胃即是少陽陽明病也邪傳入胃熱毒留結則胃家為實其候下去之不可留於胃中是知邪在陽明胃家實也問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內

鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也先亡津液使大便鞕小便數少津液分別大便必自下也傷寒嘔多雖有陽明少陽證不可攻之嘔者熱在上焦未全入府故不可下陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發汗則惡寒虎上坐而渴小便不利者亦死利小便者必嗜臥其人大便鞕小便數者不嗜臥但頭汗出者與調胃承氣湯主之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者慎不可攻攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯下之宿食謂燥屎也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩即是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱

陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃小便不利也合謂陽明病面色通赤者熱在經也不可下之下之虛其胃氣耗其津液令中之熱乘虛入胃必發熱色黃小便不利也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩即是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者表未解也若脈遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足爲熱蒸之則周身汗出津液不足爲熱蒸之其手足濈然而汗出卽大便已鞕也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮是熱未成實故不可便與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者表未解也若脈遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足爲熱蒸之則周身汗出津液不足爲熱蒸之其手足濈然而汗出卽大便已鞕也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮是熱未成實故不可便與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣

陽明病脈遲若汗出多微發熱惡寒者表未解也若脈遲

胃虛熱甚語言必亂與大承氣湯却下胃中邪熱則止　傷寒四五日脈沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則讝語邪氣入內之時得脈沉而喘滿裏證具也則胃中乾燥大便必難久則尿燥讝語　三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之　腹滿身重難以轉側口不仁面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之　腹滿身重難以轉側口不仁面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

也針經曰少陽病甚則面微塵此面垢者少陽也三者以陽明證多故出陽明藥中三為表汗者發汗攻表則燥熱益甚必讝語若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之　腹滿身重難以轉側口不仁面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

少陽也邪氣入內之時得脈沉而喘滿裏證具也則胃中乾燥大便必難久則尿燥讝語　三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之　腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

併陽明一身汗出為熱越今手足漐漐汗出是熱聚於胃也必大便難而讝語經曰手足漐漐汗出者必大便已鞕也與大承氣湯以下胃中實熱　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

本太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是無表證但發潮熱是熱聚於胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦逆之名也針經曰水穀入於口則聚於胃其液別為二天也衣消則胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便也　脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏散寒　若胃中虛冷不能食者飲水則噦逆者胸逆是也千金曰咳逆者噦逆之名也胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦　脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經迫血妄行故衄也熱甚於經能食者熱未入於胃也　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之　浮為表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏散寒　若胃中虛冷不能食者飲水則噦逆者胸逆是也千金曰咳逆者噦逆之名也胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦　脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經迫血妄行故衄也熱甚於經能食者熱未入於胃也　陽明病下之其外有熱手足溫結胸心中懊憹不能食但頭汗出者梔子豉湯主之　陽明病下之其外有熱手足溫結胸心中懊憹不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

猪苓湯復利其小便故也　浮為表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏散寒　若胃中虛冷不能食者飲水則噦逆者胸逆是也千金曰咳逆者噦逆之名也胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦　脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經迫血妄行故衄也熱甚於經能食者熱未入於胃也　陽明病下之其外有熱手足溫結胸心中懊憹不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃燥猪苓湯復利其小便故也　浮為表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏散寒　若胃中虛冷不能食者飲水則噦逆者胸逆是也千金曰咳逆者噦逆之名也胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦　脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經迫血妄行故衄也熱甚於經能食者熱未入於胃也　陽明病下之其外有熱手足溫結胸心中懊憹不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

猪苓湯方

滑石碎　猪苓去皮　甘平　茯苓　甘平　阿膠　甘平

澤瀉甘鹹寒各一兩

甘甚而反淡淡味滲泄為陽猪苓茯苓之甘以行小便蓋味淡滲泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水滑利竭阿膠滑石之滑以利水道

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烊消溫服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃燥猪苓湯復利其小便故也　浮為表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏散寒　若胃中虛冷不能食者飲水則噦逆者胸逆是也千金曰咳逆者噦逆之名也胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦　脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經迫血妄行故衄也熱甚於經能食者熱未入於胃也　陽明病下之其外有熱手足溫結胸心中懊憹不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

乾鼻燥能食者則衄　脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經迫血妄行故衄也熱甚於經能食者熱未入於胃也　陽明病下之其外有熱手足溫結胸心中懊憹不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍疑似飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲

大便時乃去之

豬膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃

當大便出

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯　陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯　陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病發潮熱大便溏小便自可胃腸不去者小柴胡湯主之　陽明病發潮熱大便溏小便自可胃腸不去者小柴胡湯主之

陽明病發潮熱大便溏小便自可胃腸不去者小柴胡湯主之　陽明病發潮熱大便溏小便自可胃腸不去者小柴胡湯主之

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯　陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

退黃

茵蔯蒿湯方

茵蔯蒿六兩 微寒 苦 梔子十四枚 擘 苦寒 大黃二兩去皮 苦寒

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之茵蔯梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補必以酸大黃之下瘀熱

右三味以水一斗二升先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯下之

內經曰血并於下亂而喜忘此下本有久瘀血所以喜忘也非夜少大便鞕以畜血在內屎雖鞕大便反易其色黑也與抵當湯以下瘀血

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎故使不大便也

不大便六七日者胸大便必結爲燥屎也胃中燥其氣不得下通故續膈煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則轉矢氣必臭

轉矢者屎出如轉丸之狀

上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也

陽明病外證未去者不可下下之則腹滿小便難

外證謂頭痛發熱惡寒者表未罷也

陽明病不吐不下心煩者與調胃承氣湯

調胃承氣湯方

大黃四兩去皮 苦寒 甘草二兩炙 甘平 芒硝半升 鹹寒

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更煮一二沸溫頓服之以調胃氣

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

桃核承氣湯方

桃仁五十個去皮尖 甘平 大黃四兩 苦寒 桂枝二兩去皮 辛溫 甘草二兩炙 甘平 芒硝二兩

上五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更煮一沸分溫三服

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂以熱下血自下者愈

此外證未解之故雖發狂不可攻之

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈

此內證已罷故雖如狂血自下者愈

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂以熱下血自下者愈

此外證未解之故雖發狂不可攻之

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂以熱下

者急下之宜大承氣湯發汗不解邪熱傳入府而成腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯滿者傳之述也是須急下之邪大滿大實自可除下之大承氣湯下其滿實若腹滿不減邪非內實也則不可下金匱要畧曰腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相剋賊名爲負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯七八日邪火陷之時病人無表裏證但發熱亦可與大承氣湯下之浮爲熱客於氣浮數亦可與大承氣湯下之浮爲熱客於氣數爲熱客於血下之邪熱去而浮數之脈俱當解若下後脈去而煩熱不解者此爲邪氣獨留心中則飢邪熱不從裏潮熱發渴之證此熱氣合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦蓄積於下爲瘀血與若脈數不解而下不止必協熱便膿血也血於下爲瘀血也若下後脈數不解而不大便若是熱不得泄不止者爲熱得下泄迫血下行必便膿血傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕出求之金匱要畧曰黃家所起從濕得之汗出熱去則不能發黃發汗已身目爲黃者風氣去濕氣在也脾惡濕濕氣內著脾色外奪者身目爲黃若瘀血在裏者則可下此以寒濕在裏故不可下當從寒濕法治之寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之當熱邪之時身黃如橘子色是熱毒發泄於內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出小便利小腹滿者熱氣也於外而津液不得下行也與茵陳湯利小便退黃逐熱傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之傷寒身黃胃有瘀熱當須下去之此以發熱爲熱未實與梔子蘗皮湯解之

梔子蘗皮湯方

梔子二十五箇擘苦寒　甘草一兩炙甘平　黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之瘀熱在裏與麻黃連翹赤小豆湯除熱散瘀

麻黃連翹赤小豆湯方

麻黃二兩去節　赤小豆一升甘平　連翹二兩連翹根也苦寒

杏仁四十箇去皮尖　大棗十二枚擘甘溫　生梓白皮一升苦寒

生薑二兩切　甘草二兩炙甘平

右五味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日服盡

辨少陽病脈證并治法第九

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

寅至辰上

釋音

刖音泪　瘕音假　腹古對切　憒古對切　心亂也　懵丁賀切　憒也　瘕勞病也　疸音旦　黃病

注解傷寒論卷六　　江陰朱氏校刊本

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

辨太陰病脈證并治法第十

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胃下結鞕太陰爲病陽邪轉裏也太陰之脈布胃中邪氣壅而爲腹滿上不得降者噫吐而食不下不得上者自利益甚時腹自痛寒氣在中而爲腹痛者則爲常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下爲結鞕經曰病發於陰而反下之因作痞　太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者爲欲愈太陰脾也主營四末太陰中風陽邪轉裏而爲煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向利則澁甚長者湯也陰病見陽脈則生以陰得陽則解故云欲愈　太陰病欲解時從亥至丑上　脾爲陰土王於丑亥太陰解時　太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯　經曰浮爲在表宜桂枝湯裏太陰病脈浮者邪在中焦填四逆等經也故當解之　自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩　自利而渴者屬少陰爲寒在下不渴者屬太陰爲寒在中焦填四逆等　傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也　太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之若大實痛者桂枝加大黃湯主之　大實大滿自可徐下之　太陰病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也　後滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也　後利則邪雖在裏未成大實欲與大黃芍藥攻其痛者宜少與之以胃氣尚弱易爲動利也

辨少陰病脈證并治法第十一

少陰之爲病脈微細但欲寐也　少陰爲病脈微細爲邪氣傳裏擇也衛氣行於陽則寤行於陰而不行於陽故但欲寐　少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也　欲吐不吐心煩者則屬太陰傳少陰之時自利不渴者屬太陰寒在下焦虛也自利而渴者屬少陰寒在下焦盛也下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴而陰寒甚然以小便色白明非裏熱不可察病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利　脈陰陽俱緊汗出者亡陽也法當無汗反汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨足陽少陰之絡令人臨痛不可內食少陰寒甚是當咽痛而復吐利　少陰病欲而下利讝語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也　欲而下利裏虛陽加火氣煩之故讝語小便難也　少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗　少陰病始得之反發熱脈沉者爲邪在經可與麻黃附子細辛湯　汗少陰病脈細沉數爲邪在經病在裏故不可發汗　脈微而沉反不發熱者爲少陰病　脈微爲亡陽表虛不可發汗弱澁爲亡陽裏虛復不可下　少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱澁者復不可下之　脈微爲亡陽表虛不可發汗弱澁爲亡陽裏虛復不可下　少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱澁者復不可下之　脈微爲亡陽表虛不可發汗弱澁爲亡陽裏虛復不可下　少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱澁者復不可下之

頻但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也　欲吐不吐心煩者則屬太陰傳少陰之時自利不渴者屬太陰寒在下焦盛也自利而渴者屬少陰寒在下焦盛也下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴而陰寒甚然以小便色白明非裏熱不可察病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利　脈陰陽俱緊汗出者亡陽也法當無汗反汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨足陽少陰之絡令人臨痛不可內食少陰寒甚是當咽痛而復吐利　少陰病欲而下利讝語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也　欲而下利裏虛陽加火氣煩之故讝語小便難也　少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗　少陰病始得之反發熱脈沉者爲邪在經可與麻黃附子細辛湯　汗少陰病脈細沉數爲邪在經病在裏故不可發汗　脈微而沉反不發熱者爲少陰病　脈微爲亡陽表虛不可發汗弱澁爲亡陽裏虛復不可下之　脈微爲亡陽表虛不可發汗弱澁爲亡陽裏虛復不可下　少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱澁者

麻黃二兩去節　甘草二兩炙　附子一枚炮去皮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以温經氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯主之

二三日以上脈經日風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於二三日已上寒極變熱之時熱煩於內心中煩不得卧也與黃連阿膠湯去陰散熱

黃連阿膠湯方

黃連四兩苦寒　黃芩一兩苦寒　芍藥二兩酸平　雞子黃二枚甘温　阿膠三兩甘温

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以甘補之雞黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得温服七合日三服

少陰病得之二三日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥是無熱也背爲陽背惡寒者陽氣弱陰氣勝也經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子湯温經散寒

附子湯方

附子二枚炮破去皮辛熱　茯苓三兩甘平　人參二兩甘温　白朮四兩甘温　芍藥三兩酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則爲病水欲令陰陽水氣勻也

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

腎水而主骨節身體疼痛支冷脈沉者寒勝於陰也身疼骨痛若脈浮手足熱則可發汗此手足寒脈沉故當與附子湯温經少陰病下利便膿血者桃花湯主之

便膿血者陽熱也少陰病下利便膿血者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂一斤一半篩末甘温　乾薑一兩辛熱　粳米一升甘平

濇可去脫赤石脂濇以固腸門辛以散之乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合內赤石脂末方寸七匕若一服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

二三日以至四五日腹痛者裏寒也小便不利者腹痛不別也下利不止便膿血者腸門虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利　少陰病下利便膿血者可刺

下焦血氣留聚腐化則爲膿血氣之以利下焦宣通血氣

手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

吐利手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者陽氣內爭與吳茱萸湯助陽散寒　少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

少陰之脈從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨屬入肺中循喉嚨其支別者從肺出絡心注胸中邪自陽經傳於少陰陰虛客熱下利咽痛胸滿心煩也與猪膚湯調陰散熱

猪膚湯方

猪膚一斤味甘寒　白蜜一升　白粉熬香和令相得温分六服

猪水畜也其氣先天腎少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得温分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

陽邪傳於太陰郭熱爲咽痛服甘草湯則差若寒熱相搏爲咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯以和少陰之氣

甘草湯方

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓温服七合日二服

桔梗湯方

桔梗一兩味辛温　甘草二兩味甘平

桔梗辛温以散寒甘草甘平以除熱甘桔相合以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能言語聲不出者與苦酒湯以解絡熱愈咽痛

苦酒湯方

半夏洗破如棗核大十四枚辛温　雞子一枚去黃內上苦酒著之

半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以斂陰疮

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐶中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

實熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰客寒咽痛半夏散及湯主之

半夏散及湯方

半夏洗各等分

半夏之辛以散之甘草之甘以緩正氣桂枝去皮辛熱　甘草炙甘平

桂枝之辛以散寒甘草之甘以緩急

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸七日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸七更煎三沸下火令小冷少少嚥之

少陰病下利白通湯主之

少陰主水少陰客寒不能制水故自利也白通湯温裏散寒

白通湯方

葱白四莖辛温　乾薑一兩辛熱　附子一枚生用去皮破八片辛熱

內經曰腎苦燥急食辛以潤之薑白之辛以通陽氣薑附之辛以散陰寒

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

少陰病下利脈微爲寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脈乾嘔煩白通湯加猪膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰通者正治從者反治此之謂

也服湯脈暴出者正氣因發泄而脫也故死脈微續者陽氣漸復也故生

白通加猪膽汁湯方

蔥白四莖　乾薑一兩　附子一枚生去皮破八片

人尿五合　猪膽汁一合

內經曰若調寒熱之道冷熱必行則熱物冷服下嚥之後冷證即消熱性便發由是病氣隨愈嘔苦寒物於情且不逆而致大益此和人尿猪膽汁誠苦寒之寒也內通陽於陰中要其氣相從則可以去格拒之寒也

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服若無膽亦可用

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或嘔者真武湯主之少陰病二三日則邪氣猶淺至四五日邪氣已深腎病不能制水水飲停爲水氣腹痛者寒濕內甚也肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者水穀不別也內經曰濕勝則瀉泄與真武湯益陽氣散寒濕

真武湯方

茯苓三兩　芍藥三兩　生薑三兩切　甘平　酸平　辛溫

白朮二兩　附子一枚炮去皮　破八片　辛熱　甘溫

脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾逐所勝平以辛熱溫注所勝佐以酸平附子芍藥生薑之辛以溫經散濕

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

後加減法

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩氣逆欬者五味子之酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛乾薑之辛以散水寒　若小便利者去茯苓小便利則無伏水故去茯苓　若下利者去芍藥加乾薑二兩芍藥之酸泄氣乾薑之辛散寒若嘔者去附子加生薑足前成半斤氣逆則嘔附子神而氣生薑散氣干金

曰嘔家多服生薑此爲寒多服生薑

甘草二兩炙　附子大者一枚生用去皮破八片　乾薑三兩強人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者愈

面色赤者加蔥九莖蔥味辛以通陽氣　腹中痛者去芍藥之酸通寒利腹中痛爲氣不通也　嘔者加生薑二兩辛以散嘔逆其人或欬或小便利或嘔者加桔梗一兩咽中如結痛者去芍藥加桔梗一兩桔梗利能散之經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之利止脈不出者去桔梗加人參二兩利止脈不出者亡血也加人參以補之經曰脈微而數微則無血數則發熱脈病若與方相應者乃可服之少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

四逆散方

甘草炙　枳實破水漬炙　柴胡苦平　芍藥酸微寒

內經曰熱淫於內治以甘苦以酸收之以苦發之枳實甘草之苦甘以泄裏熱芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服

欬者加五味子乾薑各五分并主下利五味子之酸以收逆氣乾薑之辛散肺寒并主下痢者肺與大腸爲表裏上欬下利治則頗同　悸者加桂枝五分悸者氣虛而不能通行心下虛氣動也桂枝之辛以導陽氣若欲以使小便利　若小便不利者加茯苓五分茯苓味甘而淡用以滲泄腹中痛者加附子一枚炮令裂虛過非則痛泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升二合去滓分溫再服泄利下重者下焦氣滯也加薤白以泄氣滯

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯主之下利不渴者裏寒也此下利渴者裏熱也其欬寒故也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯主之下利不渴者裏寒也此下利渴者裏熱也其欬寒故也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

桃花湯方

赤石脂一斤一半全用一半搗篩　乾薑一兩　粳米一升

右三味以水七升煮米熟湯成去滓內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

猪膚湯方

猪膚一斤　白蜜一升　白粉五合

右三味以水一斗先煮猪膚取六升去滓內蜜粉攪令相得煎令減半分溫六服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之其欬寒故也此下利不渴者裏寒也此下利渴者裏熱也其欬寒故也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之其欬寒故也此下利不渴者裏寒也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之下利不渴者裏寒也此下利渴者裏熱也其欬寒故也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之下利不渴者裏寒也此下利渴者裏熱也其欬寒故也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之下利不渴者裏寒也此下利渴者裏熱也其欬寒故也此下利嘔渴知非裏寒寒心煩不得眠知協熱也與猪苓湯滲泄而清熱

豬苓湯方

豬苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　各一兩

右四味以水四升先煮三味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

熱飢不欲食蚘在胃中無食則動悶食臭而出得食則吐蚘此熱在厥陰經也若使下之蚘上入膈其門氣厥陰未罷相乘必吐厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈經曰諸見浮下不上厥陰病欲解時從脈而生浮者陽也厥陰中風脈微浮為邪氣還表向汗之時故云欲愈　厥陰病欲解時從丑至卯上　厥陰本足下至於卯丑寅向王故為解時　厥陰病渴欲飲水者少與之愈　邪至厥陰為傳經盡欲汗之時渴欲得水者少少與之胃氣得通則愈　諸四逆厥者不可下之虛家亦然　四逆者四肢不溫也厥者手足陽氣少而陰氣多故不可下虛家亦然下之是為重虛　傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利　陰氣勝則厥逆而利陽氣復金匱玉函曰虛者十補勿一瀉之則發熱利必自止見厥則止也　傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者陰氣還勝而腹利也　凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也手之三陰三陽相接於手十指足之三陰三陽相接於足十指陽氣內陷陽不與陰相順接故手足為之厥冷也　傷寒六七日不結胸熱結在裏表復無汗骨節疼煩躁不得臥而寸脈微浮者此為表未罷相乘必吐下不止厥陰病欲解時從丑至卯上　厥陰病渴欲飲水者少與之愈　邪至厥陰為傳經盡欲汗之時渴欲得水者少少與之胃氣得通則愈　諸四逆厥者不可下之虛家亦然　四逆者四肢不溫也厥者手足陽氣少而陰氣多故不可下虛家亦然下之是為重虛　傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利　陰氣勝則厥逆而利陽氣復金匱玉函曰虛者十補勿一瀉之則發熱利必自止見厥則止也　傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者陰氣還勝而腹利

者當歸四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者陰血內虛脈行不利
與當歸四逆湯
助陽生陰也

當歸四逆湯方

當歸三兩 辛溫 桂枝三兩 辛熱 芍藥三兩 酸寒 細辛三兩 辛熱
大棗二十五枚 甘溫 甘草二兩炙 甘平 通草二兩 甘平

內稽曰脈者血之府也諸血者皆屬心通脈者必先補心益血若先入於心當歸之苦以助心血心虛急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急急食甘以緩之大棗甘草通草之甘以緩陰血

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之茱萸辛溫以散久寒生薑辛溫以行陽氣大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之大汗出則熱當去大汗若大下利則氣反不去者亡陽也內拘急下利者寒甚於裏四肢疼厥逆而惡寒者寒甚於表與四逆湯復陽散寒大汗若大下利內外雖殊其亡津液損陽氣則一也陽虛陰勝故生厥逆與四逆湯固陽退陰病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心下滿而煩飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散手足厥冷者邪氣內陷也脈緊牢者為實故心下滿而煩胃中無邪則喜飢以病在胸中之邪飢而不能食與瓜蒂散以吐胸中之邪傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯部治其厥不已水停心下甚者則悸厥逆下部脈不至陰之時大下之後下焦氣虛陽氣內陷寸脈反浮而遲浮則為虛遲則為寒虛寒相搏胸中氣結故悸陰陽氣不相順接故厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之傷寒六七日大渴欲飲水數升者白虎加人參湯主之傷寒六七日邪傳厥陰之時大下之後下焦氣虛陽氣內陷寸脈反浮而遲浮則為虛遲則為寒設下部脈不至厥陰之脈貫膈上注肺循喉嚨在厥陰隨經射肺因亡津液遂成肺痿咽喉不利而唾膿血也金匱要略曰肺痿之病從何得之被快藥下利重亡津液故得之若泄利不止者為裏氣大虛故云難治與麻黃升麻湯以調肝肺之氣大虛不溫四末

麻黃二兩半去節 一兩一 升麻一兩一分甘平 當歸一兩一分辛溫

知母苦寒 黃芩苦寒 菱藕甘平各十八銖
石膏碎綿裹 甘寒 白朮甘溫
芍藥酸平 天門冬去心 甘平 桂枝辛熱
扶芩甘平 甘草炙甘平 乾薑辛熱

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三平米頃令盡汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也傷寒本自寒下醫反下損傷正氣寒氣內為格拒經曰格則吐逆食入口即吐渴重虛而死是更逆吐下與乾薑黃連黃芩人參湯以通寒格

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑辛熱 黃連苦寒 黃芩苦寒 人參甘溫各三兩

辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

右四味以水六升煮取二升去滓溫服一升不愈更服一升

下利有微熱而渴脈弱者今自愈設復緊為未解下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死下利手足厥逆無脈者氣微陽氣大虛也陰氣之陽氣復手足溫而脈還為欲愈若手足不溫而脈還反微喘者死少陰負陽者為順也少陰腎水跌陽脾土下利為腎水不勝土則為微邪故為順也下利有微熱而渴脈弱者今自愈下利陰寒之疾反大裏氣方溫也經曰諸弱發熱脈弱者陽氣得復也今必自愈下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之下利清穀為裏寒身熱不解為外熱汗出陽氣大虛也與白頭翁湯以固陽氣虛不利致後重則傷氣氣虛不利致後重則未當厥其汗出而厥者陽氣也與白頭翁湯以厥熱厚腸

白頭翁湯方

白頭翁二兩 苦寒 黃連苦寒 黃檗苦寒 秦皮苦寒各三兩

內經曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃溫其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯下利腹滿者裏有虛寒先與四逆湯溫裏身疼痛為表未解利止要和與桂枝湯攻表下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之自利不渴為藏寒與四逆湯以溫藏下利飲水為有熱與白頭翁湯以瀉中

有燥屎也宜小承氣湯經曰實則讝語有燥屎為胃實以下利為腸虛與小承氣湯燥屎下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子豉湯下利後不煩為欲解若更煩而心下堅者恐為劇煩而心下濡者是邪熱乘虛客於胃中為虛煩也與梔子豉湯吐之則愈嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈癰則嘔而吐膿不可治嘔得膿盡嘔即自愈嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之嘔而脈弱為邪氣傳裏嘔則氣上小便當不利小便復利者裏虛也身有微熱見厥者陰勝陽陽乾嘔吐涎沫頭痛者與四逆湯溫裏助陽乾嘔吐涎沫頭痛者與茱萸湯主之乾嘔吐涎沫者寒也頭痛者寒嘔而發上攻也與吳茱萸湯溫裏散寒熱者小柴胡湯主之經曰嘔而發熱者柴胡證具傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也大吐大下因氣上逆虛復極發汗又亡陽氣外邪怫鬱於表則身熱譬與之水以發其汗胃虛得水虛寒相搏成噦也傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈下也視其前後部有不利者即利之以降其氣前部小便也後部者大便也

釋音

蹉音參不伸也　擯扶紛切惡濕上烏路切下他合切也　擯擊也

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

辨霍亂病脈證并治法第十三

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂三焦者道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦則既吐且利以飲食不節寒熱不調清濁相干陰陽乖隔遂成霍亂輕者止曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼吐利重者揮霍撩亂名曰霍亂問曰病惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂霍亂自吐下又利止復更發熱也發熱頭痛身疼惡寒者本是傷寒因邪入裏傷於脾胃上吐下利令為霍亂利止裏和復更發熱者還是傷寒必汗出而解傷寒其脈微澁者本是霍亂今是傷寒脈微澁則本是霍亂利止裏和而四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞕十三日愈所以然者經盡故也傷寒大吐大下因氣上逆虛復極發汗亡陽亡血亡津液則小便當少小便復利而大汗出霍亂吐利亡陽亡血吐利止傷寒之邪未已還是傷寒脈微澁則本是霍亂四五日邪傳陰經之時裏虛過邪必甚於上又利者孤甚於下先霍亂亦不治若欲似大便而反失氣仍不利者利為虛不利為實欲大便而反失氣者邪之氣未已還是傷寒脈微澁則本是霍亂裏氣大虛又傷寒之邪再傳為吐利是重虛也故為

辨陰陽易差後勞復病證并治法第十四

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩散主之 大病新差血氣未復餘熱未盡強合陰陽得病者名曰易男子病新差未平復男子與之交得病名曰陽易婦人病新差未平復婦人與之交得病名曰陰易以陰陽相感動其餘毒相染著如換易也其人病身體重少氣者損動眞氣也少腹裏急引陰中拘攣脾胵拘急陰氣極也熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花者感動之毒所易之氣熏蒸於上也與燒裩散以通陰氣

燒裩散方

右取婦人中裩近隱處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便卽利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩當燒灰

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚 病有勞復有食復有新病未盡有舊病新病有所藏因其發動名曰勞復勞復則熱氣所藏因其發動名曰食復食復則胸有宿積加大黃以下之

枳實梔子豉湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 豉一升綿裹 苦寒

枳實梔子豉湯則應吐劑此云發汗者以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之此之謂也

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子豉更煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗

汗

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解脈沉者以下解 差後除熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脈浮者熱在表故以汗解脈沉者熱在裏故以下解之 大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之 大病差後脾胃氣虛不能制約腎水下爲腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬平 澤瀉鹹平 括蔞根苦寒 蜀漆辛平洗去腥鹹寒洗去鹹已上各等分

蜀漆味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦燥之蜀漆葶藶之酸辛與商陸之酸辛與苦以導腫濕

右七味異搗下篩爲散更入臼中治之白飲和服方寸七小便利止後服日三

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以圓藥溫之宜理中圓 汗後陽氣不足胃中虛寒不能消穀故喜唾不了了與理中丸以溫其胃

傷寒論 卷二 八

後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉二把 石膏一斤 半夏半升洗 麥門冬一升去心 人參三兩 甘草二兩炙 粳米半升 甘寒 甘溫 甘平 辛平 甘寒 甘溫 甘寒

竹葉石膏湯

而虛羸少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱

傷寒差已後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚 病有勞復有食復有新病未盡有舊病新病有所藏因其發動名曰勞復勞復則熱氣所藏因其發動名曰食復食復則胸有宿積加大黃以下之

枳實梔子豉湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 豉一升綿裹 苦寒

枳實梔子豉湯則應吐劑此云發汗者以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之此之謂也

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子豉更煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解脈沉者以下解 差後除熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脈浮者熱在表故以汗解脈沉者熱在裏故以下解之 大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之 大病差後脾胃氣虛不能制約腎水下爲腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬平 澤瀉鹹平 括蔞根苦寒 蜀漆辛平洗去腥鹹寒洗去鹹已上各等分

蜀漆味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦燥之蜀漆葶藶之酸辛與商陸之酸辛與苦以導腫濕

右七味異搗下篩爲散更入臼中治之白飲和服方寸七小便利止後服日三

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以圓藥溫之宜理中圓 汗後陽氣不足胃中虛寒不能消穀故喜唾不了了與理中丸以溫其胃

後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉二把 石膏一斤 半夏半升洗 麥門冬一升去心 人參三兩 甘草二兩炙 粳米半升 甘寒 甘溫 甘平 辛平 甘寒 甘溫 甘寒

竹葉石膏湯

而虛羸少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚 病有勞復有食復有新病未盡有舊病新病有所藏因其發動名曰勞復勞復則熱氣所藏因其發動名曰食復食復則胸有宿積加大黃以下之

枳實梔子豉湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 豉一升綿裹 苦寒

枳實梔子豉湯則應吐劑此云發汗者以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之此之謂也

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子豉更煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗

汗

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解脈沉者以下解 差後除熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脈浮者熱在表故以汗解脈沉者熱在裏故以下解之 大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之 大病差後脾胃氣虛不能制約腎水下爲腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬平 澤瀉鹹平 括蔞根苦寒 蜀漆辛平洗去腥鹹寒洗去鹹已上各等分

蜀漆味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦燥之蜀漆葶藶之酸辛與商陸之酸辛與苦以導腫濕

右七味異搗下篩爲散更入臼中治之白飲和服方寸七小便利止後服日三

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以圓藥溫之宜理中圓 汗後陽氣不足胃中虛寒不能消穀故喜唾不了了與理中丸以溫其胃

後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉二把 石膏一斤 半夏半升洗 麥門冬一升去心 人參三兩 甘草二兩炙 粳米半升 甘寒 甘溫 甘平 辛平 甘寒 甘溫 甘寒

竹葉石膏湯

而虛羸少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱

滿反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血脈而月寒血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血脈而月寒陽微發汗躁不得眠寸關爲陽脈當浮盛弱反在關則表氣不及濇反在巔則表氣不逮寸關爲在上以候衛微反在上是陽氣不足衛行脈外浮爲在下以候榮濇反在下是無血也陽微不能固外腠理開疎風因客之故令汗出而躁煩無血則陰虛不與陽相順接故脈而且寒陽微無津液則不能作汗若發汗則必亡陽而躁經曰汗出多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也 動氣在右不可發汗發汗則胃爛而渴心苦煩飲卽吐水動氣者築築然氣之不治也難經曰肺內證膀右有動氣按之牢若痛肺氣不治正氣內虛氣動於鼻氣虛氣動於膀之右也發汗則動肺氣肺主爲動亡津液胃燥則煩渴而心苦煩肺壅寒飲冷則傷肺故氣卽吐水動氣在右者在膀胱也動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤難經曰肝內證膀左有動氣按之牢若痛肝氣不治正氣內虛氣動於膀之左也肝爲陰之主發汗亡津液胃燥則煩渴而心苦煩肺壅寒飲冷則傷肺故氣卽吐水動氣在左者在膀胱也動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端難經曰心內證膀上有動氣按之牢若痛心氣不治正氣內虛氣動於膀之上也心爲陽發汗亡陽則愈損心氣動氣在下於臍之上也心氣不治正氣內虛動氣上衝正在心端

不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前雖經曰腎內證膀下有動氣按之發於臍之下也腎虛不能制心火也骨節苦疼者腎主骨也中大煩者腎氣不治正氣內虛動氣上衝心火也目運者腎病則目眩眩如無所見惡寒者腎主寒也食則反吐穀不得前者腎水乾也王冰曰病唱而吐食久反出是咽中閉塞無水也

厥冷欲得蹉臥不能自溫脈門者胃之系胃經不和則厥冷而上必吐血也胃經不和而反攻表則陽虛於外故氣欲絕手足冷欲得蹉臥不能自溫脈門者胃之系胃經不和則厥冷而上必吐血也胃經不和而反攻表則陽虛於外故氣欲絕手足冷欲得蹉臥不能自溫

病人脈已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈陽明王於申酉戌微煩當小下之以損宿穀

取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗

辨不可發汗病脈證并治法第十五

傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之脈浮者以汗解脈沉者以下解 差後除熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脈浮者熱在表故以汗解脈沉者熱在裏故以下解之 大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之 大病差後脾胃氣虛不能制約腎水下爲腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬平 澤瀉鹹平 括蔞根苦寒 蜀漆辛平洗去腥鹹寒洗去鹹已上各等分

蜀漆味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦燥之蜀漆葶藶之酸辛與商陸之酸辛與苦以導腫濕

右七味異搗下篩爲散更入臼中治之白飲和服方寸七小便利止後服日三

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以圓藥溫之宜理中圓 汗後陽氣不足胃中虛寒不能消穀故喜唾不了了與理中丸以溫其胃

後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉二把 石膏一斤 半夏半升洗 麥門冬一升去心 人參三兩 甘草二兩炙 粳米半升 甘寒 甘溫 甘平 辛平 甘寒 甘溫 甘寒

竹葉石膏湯

而虛羸少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱

血傷者裏為之陰寒外氣怫鬱為上實裏有陰寒為下虛表熱裏寒意欲得温若反發汗亡陽陰獨故寒慄不能自還　欬者則劇欬吐涎沫咽中必乾小便不利心中饑煩睡時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗踡而苦滿腹中復堅肺寒氣逆欬者則劇吐涎沫咽中必乾小便不利膈中陽氣虛心中飢而煩一日一夜氣大會於肺邪上相擊時時而發形如寒瘧但寒無熱虛而寒慄發汗攻陽則陽氣愈虛陰寒甚故踡而苦滿腹中復堅　厥脈緊不可發汗發汗則譫亂咽噤舌萎聲不得前厥而脈緊則少陰傷寒也法當温裏而反發汗則損少陰之氣少陰之脈入肺中循喉嚨挾舌本腎為之本厥為之標諸逆發汗本虛則標弱故聲亂咽噤舌萎聲不得前　病微者難差劇者言亂目眩者死命將難全不可救汗而強發之輕者困發汗加重而難差重者脫其陰陽之氣言亂目眩也脫陰者目直視也脫陽者見鬼是此言亂也脫陰陽也眩非立而見玄是近於盲也欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥逆冷脈若虛不能治下者欬而死雖經曰脫陽者見鬼是此言亂也脫陰者目直視

注解傷寒論卷九　　江陰朱氏校刊本

漢張仲景述　王叔和撰次　成無己注解

辨不可下病脈證并治法第二十

脈濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上濡反在下微則陽氣不足濡則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澁則無血脈而且寒陽微不可下下之則心下痞鞕陽下之陽氣已虛陰氣內甚故心下痞鞕　動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也動氣在右肺之動也下之則津液內竭咽燥鼻乾肺主燥也頭眩胃動肺津液內竭咽燥鼻乾心悸者肺主氣而虛也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲蜷臥則欲蜷屈其肝之動也下之損脾而肝氣益勝復行於脾故腹內拘急食不下動氣更劇也雖有身熱臥則欲蜷臥則欲蜷屈其肝之動也下之損脾而肝氣益勝復行於脾故腹內拘急食不下動氣更劇也雖有身熱以裏氣不足故臥則欲蜷屈作表寒裏熱也二氣在下不可下下之則腹脹自灌作表寒裏熱也二氣在下不可下下之則腹脹藏陰陽寒熱明可見焉動氣在下不可下下之則傷胃內動心氣在上心之動也下之則傷胃內動心氣在上心之動也下之則傷胃內動心氣心為火主熱針經曰心所生病者掌中熱煩滿心悸者肺主氣而虛也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲蜷臥則欲蜷屈其肝之動也下之損脾而肝氣益勝復行於脾故腹內拘急食不下動氣更劇也雖有身熱以裏氣不足故臥則欲蜷屈作表寒裏熱也二氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌動

醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀熱多者便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之小便難者爲危殆脈陰陽俱緊則清邪中上焦邪中下焦太陽少陰俱感邪也惡寒甚者則變熱者太陽少陰俱感邪也惡寒甚者則變熱者太陽多也者表邪欲傳裏也惡寒甚者則變熱者太陽多也以少陰之脈循喉嚨故也熱多者太陽多也自赤脈多者瞞不慧以太陽之脈起於目故也發汗攻陽則少陰之脈絕之熱因發而上行故咽中傷若復下之則太陽之邪內陷發汗出喉中痛虛而內陷故兩目閉陰邪下行爲寒客必便清下行爲熱多必便膿血熏之則火熱甚身必發黃熨之則火熱轉必爲咽燥小便利者爲津液已竭雖小便難者津液尚可救之小便難者爲津液已絕雖小便利者爲津液尚可救之傷寒發熱口中勃勃氣出虛痛目黃衂不可制食水者必嘔惡水者厥若下之則太陽少陰俱感邪也惡寒甚者則變熱者太陽多也自赤脈多者太陽多也以少陰之脈循喉嚨故也熱多者太陽多也發汗攻陽則少陰之脈絕之熱因發而上行故咽中傷若復下之則太陽之邪內陷發汗出喉中痛虛而內陷故兩目閉陰邪下行爲寒客必便清下行爲熱多必便膿血熏之則火熱甚身必發黃熨之則火熱轉必爲咽燥小便利者爲津液已竭雖小便難者津液尚可救之則雖可制而危殆矣傷寒發熱口中勃勃氣出虛痛目黃衂不可制食水者必嘔惡水者厥若下之則假令手足溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉食水者脈必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脈數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也傷寒發熱口中熱客上膈也頭痛目黃衂不可制者熱蒸於上也千金曰無陽即厥無陰即嘔食水者必嘔則陰虛也惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出

桂枝去芍藥加附子湯方 於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

桂枝麻黃各半湯方

桂枝一兩十六銖去皮　芍藥　生薑切　甘草炙　麻黃各一兩去節　大棗四枚擘　杏仁二十四個湯浸去皮尖及兩仁者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝二麻黃一湯方

桂枝一兩十七銖去皮　芍藥一兩六銖　麻黃十六銖去節　生薑一兩六銖切　杏仁十六箇去皮尖　甘草一兩二銖炙　大棗五枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升再服

白虎加人參湯方 於白虎湯內加人參三兩餘依白虎湯法

桂枝去桂加茯苓白朮湯方 於桂枝湯內去桂加茯苓白朮各三兩餘依前法 一服小便利則愈

已上九方病證並在第二卷內

葛根加半夏湯方 於葛根湯方內加入半夏半升依葛根湯法

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方 於第二卷桂枝湯內更加芍藥生薑各一兩人參三兩餘依桂枝湯法服

梔子甘草豉湯方 梔子豉湯方內加入甘草二兩餘依前法得吐止後服

梔子生薑豉湯方 梔子豉湯方內加生薑五兩餘依前法得吐止後服

柴胡加芒硝湯方 小柴胡湯內加芒硝六兩餘依前法服不解更服

桂枝加桂湯方 第二卷桂枝湯方內更加桂二兩共五兩餘依前法

已上六方病證並在第三卷內

柴胡桂枝湯方

桂枝去皮　芍藥　人參各一兩半　甘草一兩炙　半夏二合半　生薑一兩切　大棗六枚擘　柴胡四兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

附子瀉心湯方

大黃二兩　黃連　黃芩各一兩

附子一枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯方

生薑四兩切　甘草三兩炙　人參　乾薑各一兩　黃連　黃芩各一兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

甘草瀉心湯方

甘草四兩　黃芩三兩　乾薑二兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘　黃連一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

黃芩加半夏生薑湯方 於黃芩湯方內加半夏半升生薑一兩半餘依黃芩湯法服

已上五方病證並在第四卷內

桂枝加大黃湯方

桂枝三兩去皮　大黃二兩　芍藥六兩　生薑三兩切　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝加芍藥湯方 於第二卷桂枝湯方內更加芍藥三兩餘依桂枝湯法

四逆加吳茱萸生薑湯方

當歸二兩　芍藥三兩　甘草二兩炙　通草二兩　桂枝三兩去皮　細辛三兩　生薑半斤切　吳茱萸二升　大棗二十五枚擘

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓溫分五服一方水酒各四升

已上三方病證並在第六卷內

四逆加人參湯方 於四逆湯方內加人參一兩餘依四逆湯法服

四逆加豬膽汁湯方 於四逆湯方內加入豬膽汁半合餘依前法服如無豬膽以羊膽代之

已上二方病證並在第七卷內

傷寒論卷十終

傷寒總病論

附札記

龐安時撰

啓。久不奉問。思企日深。過辱存記。遠枉書教。具悉起居佳勝。感慰衆集。恐示傷寒論。眞得古聖賢救人之意。豈獨爲傳世不朽之資。蓋已裨實幽明矣。謹當爲作題首一篇寄去。方苦多事。故未能便付去人。然亦不久作也。老悔甚矣。秋初決當求去。未知何日會見。臨書悵悵。惟万万以時自愛。不宣。　再拜。

安常處士閣下。

人生浮脆。何者爲可恃。如君能著書傳後有幸。念此便當爲作數百字。仍欲送杭州開板也。知之。知之。

五月廿八日。

又白。

（以前原缺一葉半）
結胸證　大陷胸湯　大綰胸丸
小陷胸湯　三物白散方
心下痞證　半夏瀉心湯　大黃黃連瀉心湯　加附子瀉心湯
生薑瀉心湯　甘草瀉心湯
陽毒證　升麻湯　瓦陰丹
陰毒證　甘草湯　附子飲子
鼠黃丸
狐惑證　赤小豆當歸散
百合證　百合知母湯　滑石代赭湯　百合雞子湯
百合地黃湯　栝樓牡蠣散　百合滑石散
痙濕暍等證
痙證　葛根麻黃湯
濕證　黃耆湯　杏人薏苡湯
桂枝附子湯　甘草附子湯
暍證　瓜蒂湯　小橘皮湯
發汗吐下後雜病證

第四卷

傷寒總病論卷一

宋　新水龍安時撰

敍　論（凡言曰・其下有注・皆安時自・）

太陽證　少陽證

陽明證　少陰證

太陰證　兩感證

厥陰證

三陰三陽傳病證

敍論

龍曰、案問云、冬三月是謂閉藏、水冰地裂、無擾乎陽、又云、彼春之暖、爲夏之暑、彼秋之忿、爲冬之怒、是以嚴寒冬令、爲殺溝之氣也、故君子善知攝生、當嚴寒之時、周密居室而不犯寒毒、其有舁屍荷重、勞虧之人、皆辛苦之徒也、當陽氣閉藏、反擾動之、令鬱發勝理、津液強泄、爲寒所搏、腠湊反密、寒毒與榮衛相渾、當是之時、勇者氣行則已、怯者則著而成病矣、其卽時成病者、頭痛身疼、肌膚熱而惡寒、名曰傷寒、其不卽時成病、則寒毒藏於肌膚之間、至非夏陽氣發生、則寒毒與陽氣相搏於榮衛之間、其患與冬時卽病候無異、因春溫氣而變、名曰溫病也、因夏暑氣而變、名曰熱病也、因八節虛風而變、名曰中風也、因暑濕而變、名曰濕病也、因氣逆風熱相搏而變、名曰風溫也、其病本因冬時中寒、隨時有變病之形態爾、故大醫通謂之傷寒焉、其暑病濕溫風溫、死生不同、形狀各異、治別有法、

龍曰、天寒之所折、則折陽氣、足太陽爲諸陽主氣、其經夾脊貫五臟六府之腧、上入腦、故始則太陽受病也、以其經貫五臟六府之腧、故病有臟腑傳變之候、以其陽經先受病、故次第傳入陰經、以陽主生、故足太陽水傳足陽明土、土傳足少陽木、爲微邪以陰主殺、故木傳足太陰土、土傳足少陰水、水傳足厥陰木、木至第六七日、當傳足厥陰、肝木必移氣克於脾土、脾再受賊邪、則五臟六府皆危殆矣、榮衛不通、耳聾猝不知人、則死、速用承氣湯下之、（方在可下證中・）則可保五死一生、勿從容拯溺、令病人水漿不入、湯液不下、無可柰何也、素問云、脾熱病則五臟危、又云、七敗不賊則死、若第六七日傳厥陰、脈得微緩微浮、其證寒熱似瘧、此爲必愈、宜桂枝麻黃各半湯和之、（方在可汗證中・）微緩微浮爲脾胃脈也、故知脾氣全不再受兇邪無所容、否極泰來、榮衛將復、水升火降、則寒熱作而大汗解矣、人將大汗必冒昧者、若久旱天將時雨、六合皆至昏昧、雨降之後、草木皆蘇、庶物明淨、王册所謂換陽之吉證也、王叔和云、土地濕涼、高下不同、物性剛柔、營居亦異、是以黃帝興四方之問、岐伯立四治之能、以訓後賢、開其未悟、臨病之工、宜兩審之、

龍曰、叔和非醫之圓機、孰能臻此也、如桂枝湯自西北二方居人、四時行之、無不應驗、自江淮間地偏暖處、唯冬及春可行之、自春末及夏至以前、桂枝麻黃青龍內宜黃芩也、自夏至以後、桂枝內故須隨證增知母、大青、石膏、升麻、乾取汗也、若時行寒疫及病人素虛寒者、正用古方、不在加減矣、夏至以後、蜜宜白虎、詳白虎湯白非新中喝而變暑病、乃汗後解表藥耳、一白虎未能驅逐裏邪故也、或有冬及始春、寒甚之時、人患斯疾、因汗下偶變狂躁不解、須當作內熱治之、不拘於時令也、南方無霜雪之地、不因寒氣中人、地氣不藏、蟲類泄毒、風癘間作、不在此法、治別有方也、又一州之內、有山居者爲居積陰之所、盛夏冰雪、其氣寒勝理閉、難傷於邪、其人壯、其有病者多中風中寒之疾也、有平居者爲居精陽之所、嚴冬生草、其氣溫勝理疎、易傷於邪、其人天、其有病者多中溫中暑之疾也、凡人稟氣各有盛衰、其卽時成病者、頭痛身疼、肌膚熱而惡寒、名曰傷寒、其傷寒蒸趨宿疾、更不在或異氣面變者、假令素有寒者、多變陽虛陰盛之疾、或變陰毒也、素有熱者、多變陽盛陰虛之疾、或變陽毒也、

龍曰、四時之中、有寒濕燥濕風火相搏喜變諸疾、須預察之、其飲食五味禽魚蟲菜果實之處、性偏有嗜者、或金石草木藥毒有餌者、人五臟有大小、高下、堅脆、端正偏倚、六府亦有大小、長短、厚薄、緩急、令人終身長有一病者、貴者後賤、富者乍貧、有常貴、有常富、有暴富、有暴貧、有暴藥有暴苦、有始藥後苦、有雖經結變恐喜怒者、夫常貴後賤、名曰脫營、常富後貧、名曰失精、暴藥暴苦、始藥後苦、精竭憑乳、脫勢俟

王精神內傷情慕尊貴妄爲喪志始富後貧焦皮燥筋常富惡勞驅墮精滑離間親愛者魂遊絕所懷者意喪所慮者神勞結恨恨者志苦疑愁者閉藏而不行盛衰者迷惑而不治恐懼者蕩揮而不收喜樂者傷散而不藏此皆非外邪所中而得之於內也良工必預審問其由先知臟府經絡受病之所可舉萬全

傷寒

傷寒一日太陽受之脈若靜者爲不傳頗欲吐若煩躁脈數急者爲傳也

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也病發熱而惡寒邪發於陽也不熱而惡寒者邪發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈陽數七陰數六故也（發於陽者臨證用汗藥攻其外發於陰者用陽證温其內）

太陽病頭痛至七日以上自愈者其經竟故也若欲作再經者針足陽明使經不傳（補足陽明土三裏穴也）

太陽病初服桂枝湯反煩不解先刺風池風府即與桂枝湯則愈

太陽病自汗四支難以舉伸若小便難者可與陽旦證內加附子壹枚

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風太陽病或已發熱未發熱必惡寒體痛脈陰陽俱緊者名爲傷寒

太陽病發熱汗出惡風其脈緩者名爲中風太陽病或已發熱未發熱必惡寒體痛脈陰陽俱緊者名爲傷寒

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衂者愈

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衂衂乃解所以然者尺中亦微而緩知經絡自和也

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衂者愈

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衂者愈

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衂者愈

黃芩 叁錢　黃連 叁兩　甘草 半兩　乾薑 貳兩

細剉。水壹升半。煎七合半。去滓。溫飲壹盞。日三服。

陽明證

尺寸俱長者。陽明受病也。當二三日發。以其脈夾鼻絡於目。故身熱目痛鼻乾。不得臥。（此證屬裏可壹汗。若裏熱。屬正陽明。宜白虎湯。屬胃家實。屬正陽明。宜調胃承氣湯。方在太陽證下。）

經曰。有三陽陽明者。其太陽陽明本太陽病。若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明也。少陽陽明者。本傳到少陽。因發汗利小便已。胃中燥。大便難也。正陽陽明者。病人本風盛氣實。津液消爍。或始惡寒。汗出多。寒慄而反發熱。或始得病便發熱狂言也。

凡陽明證俱宜下。唯中寒惡寒。為病在經。與太陽合病。屬表。可發其汗。

二陽合病。脈必浮大而長。外證必頭痛腰疼。肌熱目疼鼻乾也。浮大者。太陽受病也。長者。陽明也。頭腰、太陽也。肌目鼻、陽明也。

二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漐漐汗出。大便難而讝語者。大承氣湯下之則愈。（方在可下證中。）

二陽併病。太陽初得時。發其汗。汗先出復不徹。因轉屬陽明。自微汗不惡寒。若太陽證不能不可下。下之為逆。如此者。可小發其汗。設面色正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之蒸之。若汗出不徹。當短息不足。言陽氣怫鬱不得越。當汗出而不汗。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。宜麻黃湯。更發其汗即愈。何以知其汗不徹。其脈澁故知也。（方在可汗證中。古本字多差誤。以從來所見病人證候中。符合如此。故改正。陽明病能食為中風。不能食為中寒。）

陽明病中寒。脈浮無汗。其人必喘。發汗則愈。宜麻黃湯。（方在可汗證中。）

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解。發汗則愈。宜桂枝湯。（方在可汗證中。）若不惡寒。為外欲解。手足濈然汗出者。大便已鞕。宜大承氣湯。（方在可下證中。）

陽明病有不可攻者。謂陽明病。心下鞕滿者不可攻。攻之利不止者死。利止者愈。

陽明病。或發汗。或自汗。大便雖鞕。小便少者。未可攻。津液恐還入胃。必先鞕後溏也。小便自如。乃可攻之。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。其脈浮緊。若下之則腹滿。小便難也。（此證必無汗。與後證相似。且惡寒無汗。為異。以桂枝湯亦不宜正與汗藥。別與治法也。）

陽明病。脈浮而緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒而反惡熱。身重。若發汗。則躁。譫慣反讝語。若加溫針。必怵惕煩躁不得眠。若下則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上苔。梔子香豉湯主之。

肥梔子 拾枚　香豉 貳合

水貳升。煮梔子減半。下豉再煮。捌合。去滓。溫服壹盞。得快吐者。止後服。

脈浮緊。必無汗。而反有汗。咽燥。腹滿。惡熱。法當下之。而又脈浮緊。不當下。此恐變風湯。宜細詳。

陽明病。口鼻燥。但漱水而不欲嚥者。必劇。

少陽證

尺寸俱弦者。少陽受病也。當二三日發。以其脈上循脇。絡於耳。故胸脇痛而耳。（足少陽脈。環本。並者。細長曰弦。非洪此弦脈也。凡傷寒脈浮緊相搏。皆為弦之類也。有屬太陽。屬陽明者。少陽正得弦脈。皆是小弦長大脈也。多宜和裘。鮮有汗證。如琴弦狀。仲景云。脈浮而緊者。名曰弦。）

少陽之證。口苦咽乾目眩也。

此三陽經皆病。未入於藏。可汗而解。（仲景少陽證唯小柴胡。乃指裏藥耳。）

弦細頭痛發熱。屬少陽。宜小柴胡湯。不可發汗。發汗則讝語。此屬胃。胃和則愈。不和則煩而躁。宜調胃承氣湯。

本太陽病不解。轉入少陽者。脇下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未可吐下。脈緊者。小柴胡湯主之。（少柴胡證中。）

若已吐下發汗。溫針讝語。小柴胡湯證罷。此為壞病。知犯何逆。以法治之。（知犯何逆者。犯四種溫病。壞候也。）

少陽中風。兩耳微聞。目赤。胸中滿而煩。不可吐下。吐下則驚悸。小柴胡湯主之。（方在和裘證中。）

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠睡。合目則汗。（不言弦者。於長大也。）

三陽合病。面垢讝語。遺尿。發汗則讝語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗者。宜白虎湯。（方在陽陰證中。）

傷寒四五日。或六七日。無大熱。其人躁悶。此為陽去入陰也。

傷寒三四日。陽為盡。三陰當受邪。其人反能食。而不嘔。此為三陰不受邪也。（病到陰必壯利。）

傷寒三日。少陽脈小者。欲愈也。（小而平勻者也。）

太陰證

尺寸俱沈細者。太陰受病也。當四五日發。其經布胃中。絡於嚨。故腹滿而嚨乾。宜大承氣湯下之。（方在可下證中。）

太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸下結鞕。自利不渴者。屬太陰。其藏有寒故也。（當溫之以四逆證。）

傷寒三日。太陽脈弱。至四日。太陰脈大。（張大而洪。痛多裘者。宜吐之。無此證者。不宜吐之。）傷寒脈浮緩。（赤大之類。）手足自溫者。繫在太陰。小便不利者。必發黃。（五苓散加茵蔯湯主之。）若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖鞕。頗下利。且十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。橘皮湯主之。

五苓茵蔯散

茵蔯濃煎湯。調五苓散貳錢服之。日三四。黃從小便下。以小便清為度。

橘皮湯

橘皮　壹兩　生薑　貳兩
細剉。水壹升半。煎七合。去滓。分貳服。稍熱呷。未差。再作服。

本太陽病。醫反下之。因禰腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝芍藥湯主之。

桂枝　壹兩半　芍藥　壹兩　甘草　貳兩　大棗　陸枚　生薑　壹兩半
�once咀。以水叁升。煮取壹升半。去滓。每溫壹盞。日叁服。法云。小建中湯不用飴飯。故芍藥湯者。此桂復利耶故也。

少陰證

尺寸俱沉者。少陰受病也。當五六日發。以其經貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。大承氣湯下之。方在可下篇中。

少陰之爲病。脈微細於察也。

少陰中風。陽微陰浮。爲欲愈也。

凡少陰病四逆者。宜溫之。

少陰病始得之。反發熱。脈沉者。麻黃細辛附子湯主之。

麻黃　貳兩　細辛　貳兩　附子　壹枚
�once咀。以水三升。先煮麻黃壹升。去滓。內諸藥。煮取壹升。去滓。每溫壹盞。日三服。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微汗。以二三日無陽證。故微發汗也。謂初得病二三日。常見少陰證。無陽者。須發小汗也。

麻黃　貳兩　甘草　貳兩　附子　壹枚
�once咀。以水叁升。先煮麻黃十數沸。去上沫。內諸藥。煮取壹升半。去滓。每溫一盞。日三服。

脈曰。少陰病脈沉。不知何沉也。且沉緊發汗則動經。沉數爲病在裏。不可發汗。詳此脈或沉而緊。或沉而微。是表中寒而裏不消。脈應裏而發熱在裏。故以小辛之藥。溫散而微。微取汗也。

少陰病吐利。手足不逆冷。發熱者不死。脈不至者。灸少陰七壯。太谿穴在內踝後跟骨上。動脈陷中。百壯熱者。斷其身發熱也。

少陰病吐利煩躁。四逆者死。陽氣者。內煩躁也。與柴胡湯。證宜細審其生死也。

少陰病惡寒而勫。屠風切時時自煩。不欲厚衣。宜大柴胡湯。方在可下篇中。

少陰病四逆。惡寒而勫。脈不至。而吐利煩躁者死。證詳定此。

少陰病下利。利止而眩。時自冒者死。此合是少陽冒昧。汗濕出。小浮者生。少陰無陰冒之證。

少陰病六七日。息高者死。

少陰病脈微細沉。但欲臥。汗出不煩。自欲吐。至五六日自利。復煩躁不得臥寐者死。

少陰病得之二三日以上。心中煩不得臥者。黃連阿膠湯主之。

黃連　壹兩　黃芩　壹分　芍藥　壹分

雞子黃　壹枚　阿膠　貳分　搗末。

以水貳升。先煮三物。取壹升。去滓。內阿膠烊盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫溫一盞。日三四服。

少陰病下利清水。色純清。心下必痛。口乾燥者。大承氣湯下之。方在可下篇中。

少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。茱萸湯主之。

茱萸　壹兩半　洗三遍　人參　叁分
生薑　壹兩半　大棗　叁個
以水叁勝。煮取壹勝半。去滓。每溫一盞。日叁服。

少陰病咽痛者。桔梗甘草湯主之。

桔梗　半兩　甘草　壹兩
細剉。水壹勝。煎半勝。去滓。作叁服。細呷之。

又半夏散亦主之。　半夏　湯洗七遍。

甘草　炙。
桂枝　去皮
甘草　炙。
右各等分。各別搗篩已。合治之。每服叁錢。水壹盞半。煎至八分。溫冷少少嚥之。

少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脈不出者。通脈四逆湯主之。

甘草　貳兩　附子　大者半個。生用。去皮。破八片。　乾薑　叁分。強人加壹兩半。
細剉。水叁升。煎至壹升。去滓。每溫服一盞。日三四服。宋叁急更作一劑。不可作叁散。其脈續續出者。愈。暴出者死。面赤者加葱四莖。去青。腹痛去葱。加芍藥壹兩。嘔者加生薑壹兩。咽痛者去芍藥。加桔梗半兩。利止脈不出者。去桔梗。加人參半兩。病與方皆相應者。乃與服之。

少陰病下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。宜豬苓湯。

豬苓　茯苓　澤瀉　滑石　阿膠　各等兩。
�once咀。以水五升。煮取貳升半。去滓。加白蜜半升。白粉貳合半。熬香。和令相得。每溫服一盞。日三四服。

少陰病四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。

甘草　枳實　柴胡　芍藥　各伍分。
擣篩爲細末。白飲和服方寸匕。日三服。欬者加五味子。乾薑。炮各貳分半。并主下利。悸者加桂貳分

半小便不利者加赤茯苓貳分半腹痛者加附子壹箇炮去皮臍泄利下重者先以水叁升煎白芷
升半煮取貳升去滓以散方寸匕用雞白湯一盞煎八分日三四服

厥陰證

尺寸俱微者厥陰受病也六七日發以其脈循陰而絡於肝故煩滿而囊縮（微緩者謂必不縮若外證發熱渴者宜柴胡湯下之方在可下證中）宜烏梅丸主之

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯（有用了悸者吐之多服爆人）次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯（次治其厥不爾水飲入胃必作利也）茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升煎壹升去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微浮者爲欲愈不浮爲未愈

脈遲反以黃芩湯得微其熱腹中應冷當不得食今反能食此爲除中必死

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

脈微而澁者胃中無穀故令嘔也胸中陽氣不通故令噦也

脈緊而數者胸中有寒也

脈緊而澁者必下重也

脈緊而滑者有宿食也

脈緊如轉索無常者有宿食也

脈緊而浮者必嘔吐發熱也

脈緊而大者必欲嘔吐心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆（等分）

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加叁再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服（有用了悸者吐之多服爆人）

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水飲入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂（各壹兩）　甘草（叁兩炙）　白朮（各貳兩）

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯（有不因下而自利加減法在後）

麻黃（壹兩）　升麻（當歸各半兩）　知母　黃芩

菝葜（各叁錢）　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑（各壹錢半）

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一服以汗出卽住服

本自寒醫復吐下之寒格食入口卽吐宜乾薑黃芩湯

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆腳裏有寒也

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之

知母　石膏（搥碎）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩

陰與少陽俱病。是重傳得六日死矣。其有三日死者。素問謂陽明爲五藏十二經脈之長。其邪氣盛。故不知人。三日其氣乃絕。故死矣。夫邪氣盛則實。表裏邪實。併領血氣。入胃不通於榮衛氣血。故氣血鬱邪而盛。則三日死矣。其脈候素問已脫。今詳之。凡沉者皆爲陰也。一日脈當沉而大。沉者少陰也。大者太陽也。二日脈當沉而長。三日脈當沉而弦。乃以合表裏之脈也。沉長沉弦皆隱於沉大。凡陰不當合病。唯三陽可以合病。今三陰與三陽合病。故其脈似沉實而長。亦類革至之死脈也。

三陰三陽傳病證

扁曰。傷寒一日。巨陽受病。前所說勝脫詳矣。病源云。小腸雖則諛其標本。其手足陰陽自有併病者。故素問云。六日三陰三陽五藏六府皆受病。榮衛不行。五藏不通。則死矣。是表裏次第傳。不必兩感。亦有至六日傳徧五藏六府而死者也。素問云。諸浮不躁者皆在陽。則爲熱。其有躁者在手。假令第一日脈不躁。是足太陽脫脈先病。脈加躁者。又乘手太陽小腸也。又云。諸細而沉者皆在陰。則爲骨痛。其有靜者在足。設令第四日脈靜者。足太陰始傳病也。脈加數又乘手太陰病也。故六日亦能傳徧藏府也。躁謂脈數。靜謂脈不數。用藥則同。若用鍼。須取足與手之經也。

傷寒總病論卷二

可發汗證　不可發汗證

四逆證　和表證

可下證 血證附　不可下證

可水不可水證　可吐不可吐證

可灸不可灸證　可火不可火證

可溫證　火邪證

可發汗證

大法春宜發汗。

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者自發熱。陰弱者自汗出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

桂枝　芍藥　生薑各壹兩半　甘草壹兩　大棗拾枚

咬咀。水叁升半。微火煎取壹升七合半。生布絞去滓。溫服一盞。須臾。啜熱粥一椀。令助藥力。周覆一時。汗徧身濈濈者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。止後服。不必盡劑也。若不汗。如前法更服。半日許。令三服。若病重者。一日一夜可盡一劑。病證猶存者。更作服。若汗未出。乃至二三劑。忌生冷黏滑肉麪五辛酒酪臭惡等物。

太陽病初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。按風池是少陽之經。陽維之會。不針天柱而取風池者。陽維維諸陽。且陽與諸陽主氣故也。

扁曰。凡桂枝湯證。若當自汗出。小便不數。手足溫和。或手足指稍冷之則愈。若始可行之。若病者身無汗。小便數。或手足逆冷。不惡寒反惡熱。或飲酒後。頭不可行。桂枝湯也。

太陽病發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四支微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。桂枝湯內加附子壹枚。炮。去皮尖。切片。

太陽病項背強几几。汗出惡風者。桂枝加葛根貳兩。添水成四升。煎取貳升。通治柔痙。

太陽下之微喘者。表未解也。桂枝加杏人厚朴湯主之。桂枝內加厚朴壹兩。杏人肆拾枚。此則中風自汗。用桂枝湯證也。

扁曰。惡寒者。不當風而憎寒。惡風者當風而憎寒。皆屬表證。太陽病頭痛發熱。身疼痛。骨節煩疼。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。

麻黃壹兩半　桂枝貳兩　甘草壹兩半　杏人肆拾個

咬咀。水貳升。煎去上沫。內諸藥。煮取壹升貳合半。去滓。每飲一盞。綴次服盡。不用粥投溫覆。如桂枝法將息。未汗可再作二三劑。

扁曰。傷寒之脈緊。盛而按之濇是也。脈浮而緊。浮爲風。緊爲寒。風傷衛。寒傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。外證必發熱。無汗或喘。其人但憎寒。手足指末必微厥。久而復溫。掌心不厥。此傷寒無汗用麻黃證。

凡脈浮數或浮緊。無汗。小便不數。病證十餘日。尚宜麻黃湯也。

太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身痛不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。自汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆筋惕肉瞤。此爲逆也。大青龍湯。

麻黃壹兩　桂枝　甘草　石膏各壹兩　杏人貳拾個　薑　生薑壹兩半

咬咀。水五升。煮麻黃數沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。每溫飲一盞。微汗爲度。若汗周身潤則止服。未

周身潤可停待少時服盡不欲汗多亡陽故也亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯主之（少陰宜青太陰・按太陰證內行脈浮緩・手足溫者・屬太陰・太陰宜發・發脈脈浮緩・但桂枝證反煩汗而脈緩發・但麻黃證反不煩而脈浮緊・）

太陽病項背八八無汗惡風葛根湯主之

葛根（貳兩）　麻黃（壹兩半）　桂枝（壹兩）　甘草（壹兩）　芍藥（壹兩）　大棗（擘十枚）　生薑（壹兩半）

㕮咀・水四升・先煮麻黃葛根數沸・去沫・下諸藥・煮取貳升半・去滓・每溫飲一盞・日三服・如桂枝湯將息・

太陽與陽明合病・必自下利者・葛根湯主之・

太陽與陽明合病・不利但嘔者・葛根加半夏湯主之・用前葛根湯內加半夏壹兩・登分・湯洗十遍・每個作四破・

龐曰・脈浮緊・無汗・服湯未中病・其人發煩・目瞑極者必劇・小劇而脈尚浮者・宜麻黃湯・劇後脈已微者・不可再行也・凡脈浮自汗・服湯不中病・桂枝證尚在・必頭痛甚而致劇・小劇而脈尚浮者・再與桂枝湯・劇後脈已微者・不可再行也・

傷寒三日後・與諸湯不差・脈勢如數・陽氣猶在經絡・未入滋府・宜桂枝石膏湯・此方可夏至後代桂枝證用之・若加麻黃壹兩・可代麻黃青龍湯用之・

石膏（參兩）　梔子（貳拾肆個・）　生薑（壹兩半・）　甘草（各壹兩・）　升麻　桂枝（各壹兩・）　葛根（各壹兩半・）

咬咀・水五升・煮取貳升半・去滓・溫飲一盞・食頃再服・若得汗即止後服・

龐曰・凡發汗以辛甘爲主・復用此苦藥者何也・然辛甘者・折陰氣而助陽氣也・今熱盛於表・故加苦以發之・素問云・熱淫于內・以苦發之故也・

葛根龍膽湯・療病四五日不差・身體悉熱面赤・兼治陽毒風溫・

葛根（生者貳兩・乾者貳兩代・）　生薑　升麻　大青　龍膽　芍藥（各半兩・）　菱蕤（壹兩・）　石膏（壹兩半・）

咬咀・水四升・煮取貳升・去滓・溫飲一盞・日三夜二・（凡葛根須用家園味甘多白粉者爲佳・若誤用味苦野葛多粗・入藥治病・）

桂枝湯發汗後・脈浮緊・法當身痛・當以汗解・假令尺中脈遲・爲榮氣不足・血少故也・（脈陽明病脈遲汗出・多從虛寒・宜桂枝湯・不宜發不足・甚尺脈遲・其人必大便硬・小便數者・宜小建中湯・）

小建中湯

桂枝（參分）　生薑（參分）　芍藥（壹兩半・）　甘草（半兩・）　飴糖（兩合半・）　大棗（擘十枚・）

咬咀・水貳升半・煮取九合・去滓・方下飴糖・煎令化・每溫飲一盞・日進二三服・尺尚遲・再作一劑・入人參加半兩・同煎最良・當有微汗或嘔者・不用飴糖也・兼治傷寒一二日胸中悶而煩・及汗後身疼脈沉遲・又治傷寒陽脈濇・陰脈弦・法當腹中急痛・先小建中湯不差・與柴胡湯・方在柏表節中・

太陽與陽明合病・必自下利者・葛根湯主之・用前葛根湯內加半夏壹兩・登分・湯洗十遍・每個作四破・

太陽與陽明合病・不利但嘔者・葛根加半夏湯主之・

龐曰・脈浮緊・無汗・服湯未中病・其人發煩・目瞑極者必劇・小劇而脈尚浮者・宜麻黃湯・劇後脈已微者・不可再行也・凡脈浮自汗・服湯不中病・桂枝證尚在・必頭痛甚而致劇・小劇而脈尚浮者・再與桂枝湯・劇後脈已微者・不可再行也・

傷寒三日後・與諸湯不差・脈勢如數・陽氣猶在經絡・未入滋府・宜桂枝石膏湯・此方可夏至後代桂枝證用之・若加麻黃壹兩・可代麻黃青龍湯用之・

石膏（參兩）　梔子（貳拾肆個・）　生薑（壹兩半・）　甘草（各壹兩・）　升麻　桂枝（各壹兩・）　葛根（各壹兩半・）

咬咀・水五升・煮取貳升半・去滓・溫飲一盞・食頃再服・若得汗即止後服・

龐曰・凡發汗以辛甘爲主・復用此苦藥者何也・然辛甘者・折陰氣而助陽氣也・今熱盛於表・故加苦以發之・素問云・熱淫于內・以苦發之故也・

葛根龍膽湯・療病四五日不差・身體悉熱面赤・兼治陽毒風溫・

葛根（生者貳兩・乾者貳兩代・）　生薑　升麻　大青　龍膽　芍藥（各半兩・）　菱蕤（壹兩・）　石膏（壹兩半・）

咬咀・水四升・煮取貳升半・去滓・溫飲一盞・日三夜二・（凡葛根須用家園味甘多白粉者爲佳・若誤用味苦野葛多粗・入藥治病・）

桂枝湯發汗後・脈浮緊・法當身痛・當以汗解・假令尺中脈遲・爲榮氣不足・血少故也・（脈陽明病脈遲汗出・多從虛寒・宜桂枝湯・不宜發不足・甚尺脈遲・其人必大便硬・小便數者・宜小建中湯・）

小建中湯

桂枝（參分）　生薑（參分）　芍藥（壹兩半・）　甘草（半兩・）　飴糖（兩合半・）　大棗（擘十枚・）

咬咀・水貳升半・煮取九合・去滓・方下飴糖・煎令化・每溫飲一盞・日進二三服・尺尚遲・再作一劑・入人參加半兩・同煎最良・當有微汗或嘔者・不用飴糖也・兼治傷寒一二日胸中悶而煩・及汗後身疼脈沉遲・又治傷寒陽脈濇・陰脈弦・法當腹中急痛・先小建中湯不差・與柴胡湯・方在柏表節中・

557

脈曰、凡脈緊、病必無汗、唯濇而緊、病必自汗、勿誤行桂枝、宜建中湯也、

四逆證

四逆湯治病發熱頭痛、脈反沉、若不差、身體疼痛者、脈浮遲、表熱裏寒、下利清穀者、汗出熱不去、內拘急、四逆湯治病發熱頭痛、脈反沉、若不差、身體疼痛者、宜治中陽、渴吐逆而脈滑數者、及傷寒支節疼四逆者、下利厥逆惡寒者、下利腹脹滿、身疼脈浮者、先用四逆溫裏、得利止、乃可隨證用藥攻表也、

甘草（炙兩）　附子（生用破八片）　乾薑（叁分）

咬咀、以水壹升半、煮取壹合、去滓、溫分作貳服、

手足厥脈微欲絕者、當歸四逆湯主之、

當歸四逆湯

當歸（桂枝）　芍藥　細辛（各壹兩半）

甘草（炙兩）　木通（各壹兩）　大棗（捌枚擘開）

咬咀、以水四升半、煮二升二合、去滓、每溫一盞服、

和表證

傷寒表不解、心下有水氣、乾嘔發熱而欬、或渴或利、或噎或小便難、腹滿而喘者、小青龍湯主之、

小青龍湯

麻黃　芍藥　細辛　乾薑　甘草

桂枝（各壹兩半）　半夏（叁分）　五倍子（半兩）

咬咀、以水六升、先煮麻黃數沸、去上沫、內諸藥、煮一升、去滓、每溫服一盞、若渴者、去半夏、加括樓根壹兩半、若微利、去麻黃、加蕓花一雞子大、炒赤、若噎者、去麻黃、加附子壹枚、炮、小便不利、小腹滿者、去麻黃、加茯苓貳兩、若嘔、去麻黃、加杏仁壹兩壹分、無蕓花、以桃花壹鴨子大、不炒代之、

太陽病得之八九日、如瘧狀、發熱惡寒、熱多寒少、其人不嘔、渴便欲自可、一日二三度發、脈微緩者、為欲愈也、脈微而惡寒、此陰陽俱虛、不可更發汗吐下也、面色反有熱色者、未解也、以其不能得小汗出、其身必痒、宜桂枝麻黃各半湯、

桂枝湯末　麻黃湯末

桂枝（各壹兩半）　麻黃（叁分）　芍藥　甘草　人參（各壹分）　茯苓（叁分）

蘆末、每五錢、水兩盞、薑三片、甘李根白皮一圓、如雞子黃大、煎八分、通口、日三五服、

動氣在右、不可發汗、汗出則劇、而渴心苦煩、飲則吐水、（驗者、即心煩中虛氣動、若誤汗有此證、先宜五苓散三服、方在可水證中、次服竹葉湯、方在前、）

動氣在左、不可發汗、發汗則頭眩、汗出則筋惕肉瞤、此為逆、難治、（但先服防風白朮故、次服建中湯、方在前、）　防風白朮散、

防風（壹兩）　牡蠣粉（半兩）　白朮（叁分）

細末、溫米飲調下二錢、日二三服、汗出續與建中湯、

動氣在上、不可發汗、發汗則氣上衝、正在心端、李根湯主之、

李根湯

半夏（半兩）　桂枝　當歸　芍藥

甘草　人參（各壹分）　茯苓（叁分）　黃芩

蘆末、每五錢、水兩盞、薑三片、甘李根白皮一圓、如雞子黃大、煎八分、通口、日三五服、

動氣在右、不可發汗、汗出則劇而渴心苦煩、飲則吐水、（驗者、即心煩中虛氣動、若誤汗有此證、先宜五苓散三服、方在可水證中、次服竹葉湯、方在前、）

動氣在左、不可發汗、發汗則頭眩、汗出則筋惕肉瞤、此為逆、難治、（但先服防風白朮故、次服建中湯、方在前、）　防風白朮散、

防風（壹兩）　牡蠣粉（半兩）　白朮（叁分）

細末、溫米飲調下二錢、日二三服、汗出續與建中湯、

動氣在上、不可發汗、發汗則氣上衝、正在心端、李根湯主之、

李根湯

半夏（半兩）　桂枝　當歸　芍藥

甘草　人參（各壹分）　茯苓（叁分）　黃芩

蘆末、每五錢、水兩盞、薑三片、甘李根白皮一圓、如雞子黃大、煎八分、通口、日三五服、

動氣在下、不可發汗、發汗則心中大煩、骨節苦痛、目運惡寒、食則反吐、瘧不得前、先服大橘皮湯、得吐止、後服建中湯、

大橘皮湯（亦主寒足冷腫脹、）

橘皮（壹兩半）　生薑（貳兩）　甘草（半兩）

人參（叁分）　竹茹（半兩）

咬咀、水叁勝、煎壹升半、去滓、溫服一盞、食頃再服、

不當汗而強汗之、則津液枯槁而死、

四逆證

四逆湯治病發熱頭痛、脈反沉、若不差、身體疼痛者、脈浮遲、表熱裏寒、下利清穀者、汗出熱不去、內拘急、四逆湯治病發熱頭痛、脈反沉、若不差、身體疼痛者、宜治中陽、渴吐逆而脈滑數者、及傷寒支節疼四逆者、下利厥逆惡寒者、下利腹脹滿、身疼脈浮者、先用四逆溫裏、得利止、乃可隨證用藥攻表也、

甘草（壹兩）　附子（生用破八片）　乾薑（叁分）

咬咀、以水壹升半、煮取壹合、去滓、溫分作貳服、

手足厥脈微欲絕者、當歸四逆湯主之、

當歸四逆湯

當歸（桂枝）　芍藥　細辛（各壹兩半）

甘草（炙兩）　木通（各壹兩）　大棗（捌枚擘開）

咬咀、以水四升半、煮二升二合、去滓、每溫一盞服、

和表證

傷寒表不解、心下有水氣、乾嘔發熱而欬、或渴或利、或噎或小便難、腹滿而喘者、小青龍湯主之、

小青龍湯

麻黃　芍藥　細辛　乾薑　甘草

桂枝（各壹兩半）　半夏（叁分）　五倍子（半兩）

咬咀、以水六升、先煮麻黃數沸、去上沫、內諸藥、煮一升、去滓、每溫服一盞、若渴者、去半夏、加括樓根壹兩半、若微利、去麻黃、加蕓花一雞子大、炒赤、若噎者、去麻黃、加附子壹枚、炮、小便不利、小腹滿者、去麻黃、加茯苓貳兩、若嘔、去麻黃、加杏仁壹兩壹分、無蕓花、以桃花壹鴨子大、不炒代之、

太陽病得之八九日、如瘧狀、發熱惡寒、熱多寒少、其人不嘔、渴便欲自可、一日二三度發、脈微緩者、為欲愈也、脈微而惡寒、此陰陽俱虛、不可更發汗吐下也、面色反有熱色者、未解也、以其不能得小汗出、其身必痒、宜桂枝麻黃各半湯、

桂枝湯末　麻黃湯末

桂枝（各壹兩半）　半夏（叁分）　麻黃（各三分）

以水一升半、煎三個、生薑三片、煎減半、去滓、溫飲一盞、未有小汗、再服之、

服桂枝湯、大汗出後、大煩渴、脈洪大者、白虎湯加人參主之、（方在厥陰證中、）

桂枝湯末（壹兩）　麻黃湯末（半兩）

以水一升半、煎三片、煎減半、去滓、溫飲一盞、未有小汗、再服之、

服桂枝湯、大汗出後、大煩渴、脈洪大者、白虎湯加人參主之、（方在厥陰證中、）

脈曰、傷寒已得汗、身和脈絃細、讝語妄見、此為津液不和、與小柴胡去仁參、加桂枝湯服之、津液和自愈、

未差、與調胃承氣湯下之、

傷寒六七日、發熱微惡寒、支節煩疼、微嘔、心下支結、外證未去者、柴胡桂枝湯主之、兼治寒疝腹痛、

柴胡　壹兩　桂枝　黃芩　人參　各半兩　半夏　四錢　半字、

芍藥　半兩　甘草　一錢　半字、　大棗　九枚　生薑　半兩

咬咀、以水三升半、煮取一升七合半、去滓、溫飲一盞、

小柴胡湯治傷寒五六日中風、往來寒熱、胸脇滿、嘿嘿不欲食、心煩喜嘔、或胸中煩而不嘔、或渴、或腹中痛、或脇下痞鞕、或心下悸、小便不利、或不渴、身微熱、或欬者、

柴胡　貳兩　甘草　黃芩　人參　各三分、

半夏　陸錢一字、　生薑　三分　大棗　叁枚、

咬咀、以水六升、煮取三升、去滓、再煎取一升半、溫作三服、若胸中煩而不嘔者、去半夏、人參、加括樓根貳兩、若腹中痛、去黃芩、加芍藥壹兩半、若脇下痞鞕、去大棗、加牡蠣貳兩、若心下悸、小便不利、去黃芩、加茯苓貳兩、若不渴、外有微熱、去人參、加桂枝壹兩半、溫覆微汗愈、若欬、去人參、大棗、生薑、加五味子壹兩壹分、乾薑壹兩、

傷寒中風、有柴胡證、但見一證、不必悉具、凡以柴胡證而下之、與柴胡湯、必蒸蒸而振、却復發熱汗出而解也、

病十日以上、脈浮細嗜臥、者爲已安候、小柴胡和之、細而遲者勿與、

婦人中風七八日、續自寒熱、發作有時、經水適斷者、此爲熱入血室、其血必結、故使如瘧狀、發作有時、小柴胡湯主之、

婦人傷寒發熱、經水適來、晝日明了、暮則讝語、如見鬼狀、此爲熱入血室、無犯胃氣、必自愈、先宜小柴胡湯、不愈、可刺、期門、

婦人中風、發熱惡寒、經水適來、得之七八日、熱除而脈遲、身涼胸脇下滿、如結胸狀、讝語、此爲熱入血室也、當刺期門、隨其實取之、

陽明病潮熱、大便溏、小便自如、胸脇滿不去者、小柴胡湯主之、又不大便而嘔、舌上白苔者、亦宜服之、上焦得通、津液得下、胃氣因和、身蒸然汗出而解、

陽明中風、脈浮弦大而短氣、腹滿、脇下及心痛、久按之氣不通、鼻乾不得汗、嗜臥、一身及目悉黃、小便難、有潮熱、時時噦、耳前後腫、刺之小差、外不解、病過十日、脈續浮者、與小柴胡湯、若不尿、腹滿加噦者不治、

可下證　血證附

大法秋宜下、

陽明病發熱、不惡寒、汗多者、急下之、

凡脈沉細數、爲熱在裏、又兼腹滿咽乾、或口躁舌乾而渴者、或六七日不大便、小便自如、或自中暵子不明、無外證者、或汗後脈沉實者、或下利三部脈皆平、心下堅者、或連發汗、已不惡寒者、或已經下、其脈沉按之有力者、宜大承氣湯、

大黃　半兩　厚朴　壹兩　枳實　壹枚　朴消　半兩

咬咀、以水四升、先煮厚朴枳實至叁升、下大黃、煮取壹升半、去滓、下朴消、煎化、每溫一盞、利即止後服、如作養散煎、每服厚朴枳實末共叁錢、水兩盞煎壹盞半、下大黃末壹錢、煎壹盞、絞去滓、下朴消、煎化、每溫一盞、利即止後服、

陽明與少陽合病而利、脈不負者爲順也、負者失也、互相克爲負也、脈滑而數者有宿食、當下之、宜大承氣湯、陽明

脈雙弦而遲、心下堅、或脈大而緊者、陽中有陰、可下之、病者煩熱、汗出如瘧狀、日晡則發潮熱者屬陽明、其脈必實、當下之而愈、

病人小便不利、大便乍難乍易、時有微熱、喘冒不能臥者、有燥屎、宜下之、

傷寒者吐下後不解、不大便五六日以上至十餘日、日晡則發潮熱、不惡寒、獨語如見鬼狀、若劇者、發則不識人、循衣妄撮、常見有此證型、故改之、揚而不安、微喘直視、脈弦者生、脈牆者死、微者但發熱讝語、可下之、一服

過經讝語者可下之、

病人不大便五六日、繞臍痛、煩躁、發作有時、此有燥屎、故不大便、可下之、以上承氣湯、

太陽病未解、其脈陰陽俱停者、必先振慄、汗出而解、

陽微者、先汗之所解、陰實者、先下之而解、下之宜大柴胡湯、

柴胡　肆兩　黃芩　芍藥　各壹兩半、　枳實　兩枚

生薑　貳兩　半夏　壹兩壹分、　大棗　陸枚、　大黃　壹兩

咬咀、以水六升、煮取叁升、去滓再煎、每溫一盞服、

因下之後、潮熱而微利者、此醫以丸藥下之、非其治也、而有表證、仍胸脇滿而嘔者、先服小柴胡湯、後服大柴胡湯、

傷寒發熱、汗出不解、心中痞鞕、嘔吐下利者、大柴胡湯主之、

傷寒十餘日、結熱在裏、往來寒熱者、宜大柴胡湯、

陽明病讝語發潮熱、脈滑疾者、小承氣湯主之、

大黃（貳兩）　厚朴（壹兩）　枳實（兩枚）

咬咀。水貳升半。煎至八合。去滓。放溫。時飲一盞。以利爲度。凡大便祕悶。恐有裏證者。但少少飲之。微下爲度。不可飲多。恐大泄利也。虛弱人可作煮散煎服。

太陽病若吐下發汗後。微煩。小便數。大便難者。與小承氣湯。利之則愈。（此太陽陽明證也。）

下利讝語者。有燥屎也。宜小承氣湯。初一服讝語止。若更衣者。停後服。不爾盡與之。（更衣卽登廁也。非謂便利也。古注頗誤更衣之義。）

陽明病不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。（方在大陽陽中。）

發汗後。惡寒者。虛也。不惡寒。但熱者。實也。當和其胃氣。宜調胃承氣湯。

傷寒十三日過經。讝語者。此有熱。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。反下利。而脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。爲內實也。宜調胃承氣湯。

太陽病過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡湯證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。爲未解也。與大柴胡湯。下之則愈。

本太陽。初服湯。口乾燥。煩。實實故也。

傷寒發汗。若吐下之後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。

傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。反與桂枝湯。攻表。此爲誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。

傷寒吐後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。

發汗後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。

發汗後。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。與調胃承氣湯。

傷寒十三日。不結胸。不滿。而渴欲飲水。小便利者。與五苓散。寒實結胸。無熱證者。與三物小白散。

傷寒十三日過經。讝語者。有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。反下利。而脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。爲內實也。宜調胃承氣湯。

太陽病過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡湯證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。爲未解也。與大柴胡湯。下之則愈。

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此爲熱入血室。當刺期門。隨其實而瀉之。

傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞕。嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發熱者。屬少陽。小柴胡湯主之。

傷寒十三日。不結胸。不滿。而渴欲飲水。小便利者。與五苓散。寒實結胸。無熱證者。與三物小白散。

傷寒十三日。不結胸。其人發狂者。乃熱在下焦。小腹當鞕滿。小便反利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀血在裏故也。（小腹滿而小便不利者。非血證。）

水蛭（熬。各拾枚）　蝱蟲（各拾枚）　桃仁（壹拾枚）　大黃（貳兩）

抵當湯治太陽病。六七日表證仍在。脈微而沉。反不結胸。其人發狂者。乃熱在下焦。小腹當鞕滿。小便不利。渴而飲水。嘔者。以瘀熱在裏。身必發黃。

茵陳蒿（壹兩）　大黃（壹兩半）　梔子（貳拾個。擘。）

咬咀。水貳升半。煮至壹升。去滓。溫溫分四服。未下再服。虛人不可作半料服之。

每五錢水壹盞半。煎壹盞。去滓服之。

桃人承氣湯治太陽病不解。熱結在膀胱。其人如狂。血自下者乃愈。其外不解者。尚未可攻。當先隨證治之。（不瀉塞盡外解之。）

桃人（貳拾個。）　大黃（貳兩）　甘草（貳兩）　桂枝（壹兩）　芒消（各壹兩。）

咬咀。以水貳升半。煎取壹升半。去滓。內芒消烊化。溫服壹盞。虛人減作半料亦可。作煮散每伍錢水壹盞半。煎至壹盞。去滓。下芒消壹錢半。烊化服之。

桃人承氣湯又治產後惡露不下。喘脹欲死。服之十盞。十服湯治太陽病中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人漐漐汗出。發作有時。頭痛心下痞鞕滿。脇下痛。乾嘔。短氣。汗出不惡寒者。此表和裏未和也。

芫花（壹拾枚。醋拌炒令黃。）　甘遂（大戟。各壹分。與芫花同。）　大棗（拾枚。入白荷朴二三百下。）

先以水壹升。煮肥棗拾枚。擘碎。煮取半升。去滓。用煎湯少半。調末一錢匕。服人半錢。再單飲煎湯送之。平旦服。若下少而病不除。明旦加藥一錢半。如前服之。服之必利。利後糜粥自養。

桃人承氣湯又治產後惡露不下。喘脹欲死。服之十盞。

肥曰。脈朝夕缺者。實癖也。可下之。朝平夕缺者。非癖也。不可下。缺謂數脈。六七至者也。若脈數一息八九至。愼不可下。若下之則煩躁。下利不止而死。凡數脈與皮毛相得。亦不可下也。合下不下。令病人腹脹滿。通身浮腫而死。

不可下證

脈軟而弱。弱反在關。（關下三分也。）溫反在頭。（關上三分也。）微反在上。（寸口也。）澁反在下。（尺部也。）微則陽不足。澁則無血。陽氣反微。中風汗出而反煩躁。澁則無血。脈而且塞。宜建中湯。（方在不可下證中。）

大黃（叁分）　葛根　黃芩　芍藥　桔梗　甘草（各半兩。）

茯苓　桑本白皮　甘草（各半兩。）

陽欲不可下。下之則心下痞。

諸勤氣在心腹上下左右。俱不可下。

勤氣在右。不可下。下之則津液內竭。咽燥鼻乾。頭眩心悸。宜竹葉湯。方有不可汗證中。

勤氣在左。不可下。下之則腹裏拘急不止。勤氣反劇。身雖有熱反欲勤。先服炙甘草湯。方在太陽證中。後服建中湯。方在不可汗證中。

勤氣在上。不可下。下之則掌握熱煩。身冷熱汗自泄。欲水自潘。竹葉湯主之。方在不可汗證中。

勤氣在下。不可下。下之則腹滿。卒起頭眩。食則下清穀。心下痞堅。半夏高心湯主之。方在痙汗證中。

咽中閉塞。不可下。

寇曰、諸脈沈弱。微虛細相搏。俱不可下。

諸四逆。不可下。虛家亦然。

寇曰、若下證悉具。而見四逆者。是失下後。氣血不通使然。但手足微厥。靠心常温。時復指稍温便下之。不可拘忌也。

可吐不可吐證

傷寒喘多。雖有陽明證。不可攻也。

寇曰、凡下證小便不利。或尚少。未可攻之也。

不當下而強下之。令病人腸胃洞泄不禁而死。

可水不可水證

寇曰、凡病非大渴。不可與冷水。若小渴口咽乾。小小呷潤之。若大渴煩躁甚。能飲一斗者與五升。能飲一升者與半升。若乃不與則乾燥無由作汗。煩喘而死者多矣。但勿令足意飲也。若大汗將來。躁渴甚者。但足意飲之勿疑。常人見因渴飲水而得汗。見小渴遂強與之。致停飲心下。滿結喘而死者亦多矣。其有熱脈數。尚可作汗而解者。出於天幸也。

五苓散治病人水藥入口則吐。或渴而嘔者。或汗後脈尚浮而煩渴者。或下利渴而小便不利者。或因渴停水心下。短息者難治。嘔而小便不利者。皆主之。

豬苓　白朮　茯苓　桂枝　澤瀉　各半兩。

細末。白飲調下貳錢。日叁服。數飲煖水。汗出效。

陽明病小便數者。大便即堅。不更衣。十日無所苦。欲得水。但與之。當以法救渴者。五苓散主之。

霍亂頭痛發熱。身體疼。發熱欲飲水。五苓散主之。若得病無熱。但狂言煩躁不安。精采不與人相當。勿以火導之。但以豬苓散方寸匕服之。當逼飲新汲井水壹升。即令指喉中吐去之。病隨手愈。若不能吐者。勿強與水。水停則結心下也。當以藥吐之。不爾。更致危病。若當吐不時。以豬苓散吐之。其死迫速矣。亦可必死。須先用藥温之。久而可熨。凡臍下冷結成關陰。大小便不通。服藥雖多不見效。以炒鹽熨臍下。須臾即通。然關陰已服巴豆甘遂、大黃、輕粉之類。太多。即暴通利而損人。尤宜詳之也。

可温證

大法冬宜温熱藥。

少陰病。其人飲食入則吐。心中温温欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脈弦遲。若膈上有寒飲乾嘔者。不可吐。宜四逆湯温之。方在四逆湯中。

針之尤佳。夫飲爲實難治。此皆三死一生也。太陽病發汗後。大汗出胃中乾燥。煩不得眠。其人欲飲水者。

但與之。當稍稍飲之。令胃和則愈。

可吐不可吐證

寇曰、胸膈痞悶。掀臆寒發。脈得浮或滑。並宜瓜蒂散吐之。方在諸中。

與吐之。須臾立止。

下利日數十行。其脈反遲。寸口微滑。吐之則止。

寇曰、虛家當吐而不敢吐之。宜以枳實散脈氣。誰痰水過日誰入胃。乃可微下之也。

諸四逆脈微弱虛細。或弦遲。雖中滿悶不可吐。宜橘皮湯枳實散在痰論中。

不可吐而強吐之。氣築心。即死矣。

可灸不可灸證

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發貲豚。氣從少腹上衝者。灸其核上一壯。與桂枝加桂湯。桂枝湯內加桂。

下利其脈浮大此爲虛以強下之故也設脈浮大因胃煩鳴宜當歸四逆湯温之（方在四逆湯中）

火邪證（證以火劫床下或過身用火迫劫汗或致驚煩失治成火邪也）

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽譫或狂起臥不安者宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝（壹兩半）　蜀漆（壹兩半）　甘草（壹兩）　龍骨（貳兩）

牡蠣（貳兩半）　生薑（壹兩半）　大棗（肥枚）

以水陸升先煮蜀漆減壹升內諸藥煮取貳升去滓温服壹鎰無蜀漆以倭山代之火劫後脈浮當汗出而愈

火邪下之因燒針煩躁者桂枝甘草湯主之

桂枝（半兩）　甘草　牡蠣　龍骨（各壹兩）

以水二升煮一升去滓温取一鎰可代救逆湯使之

龍曰灸及燒針後證似火劫者並宜火劫治之煩躁譫及狂用六石風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯亦通用

病人因火劫至十五六日身黃下利狂欲走師脈之言當下消血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脈陽浮而陰澁弱陽浮爲風澁弱爲虛浮虛受風少血發熱惡寒洒洒項強頭眩醫以火熏鬱令汗出惡寒遂甚客熱因火而發情鬱漆於肌膚自爲黃小便微難短氣鼻中出血而復下之胃無津液利遂不止熱瘀在膀胱商緒成積狀如豚肝當下不下心亂迷憒狂走赴水必不能自制蓄血若去目明心了此皆醫所爲輕者得意極者不治

傷寒總病論卷三

結胸證　心下痞證

陽毒證　陰毒證

狐惑證　百合證

瘟濕暍證　瘧候　濕候　暍候

發汗吐下後雜病證

傷寒勞復證　陰陽易證

結胸證

病發於陽而反下之熱入內作結胸其病心下堅滿按之如石鞕而痛項強如柔痙狀其脈寸口浮關上尺中皆沉或沉緊名曰結胸也下之則和宜大陷胸湯（今作瓜蒂散瘀之）

大黃（壹兩半）　芒消（壹兩半結半）　甘遂（末壹錢匕）

異末先以水壹升半煎大黃半升絞去大黃滓下消末更煮一二沸內甘遂末和勻温分二服一服快利止後服如作散散卽先以水一鎰煎大黃末肆錢匕至捌分下消末貳錢匕候化勻下甘遂末

半錢匕。沸勻。溫服之。移時未利。再煎一服。快利爲度。

臟結如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸口脈浮。關上脈小細沉緊。名曰臟結。舌上白苔者難治。臟結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上苔滑不可攻也。

結胸證。其脈尺寸浮大者不可下。下之則死。（復宜發汗也。）

結胸證悉具。煩躁甚者死。

太陽病。脈浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客熱動膈。短氣煩躁。心下懊憹。陽氣內陷。心下因鞕。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗。餘處無汗。齊頸而還。小便不利。身必發黃也。

大陷胸湯。

結胸證。其脈大者。此爲水結在胸脅也。但頭微汗出者。宜大陷胸湯。

太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。舌燥而渴。日晡則少有潮熱。從心下至小腹。滿而痛不可近者。宜大陷胸湯。

大黃（去皮）　四兩　芒硝　半升　甘遂　一錢匕

杵二味。內甘仁、朴消。合研如脂。丸如彈子大。抄甘遂末一錢。白蜜貳合。水貳升。煮取壹升。溫頓服之。一宿乃下。不下更服。

小結胸正在心下。按之則痛。脈浮滑者。宜小陷胸湯。

半夏（洗）　半升　黃連　一分　栝樓（壹枚。用四錢。）

以水叁升。煮栝樓至貳升。去滓。溫服一盞。食頃再服。一日盡劑。微解下黃涎。

甘遂末壹錢。白蜜貳合。水貳升。煮取壹升。溫頓服之。

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞕也。甘草瀉心湯主之。

甘草（貳兩）　黃芩　乾薑　人參（各半兩）

半夏（壹兩壹分）　大棗（陸枚）　黃連（半兩）

以水伍升。煮取叁升。去滓。再煎取壹升半。溫作四服。胃虛故加甘味。

大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。（附子瀉心湯之辛味。）

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾嘔食臭。脅下有水氣。腹中雷鳴下利。宜生薑瀉心湯。

生薑（貳兩）　人參　甘草　黃芩（各壹兩）

半夏（壹兩壹分）　大棗（陸枚）　黃連　乾薑（各半兩）

心下痞證

臚曰。近世治結胸多行針頭。丸用硫黃陽起石者。若病熱甚者必死。唯治冷結痼實耳。止飲冷粥止之。

心下痞。按之濡。其脈關上浮者。宜大黃黃連瀉心湯。

傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞕。嘔吐而利者。大柴胡湯主之。（汗出嘔吐下利。是胃中津液越。裏有結熱也。此證是發後熱汗過多。故先須解表也。）

傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞕。吐噦下利者。大柴胡湯主之。（汗出嘔吐下利。是胃中津液越。裏有結熱也。此證是發後熱汗過多。故先須解表也。）

病人脅下素有痞。連臍傍引小腹入陰筋者。此爲藏結。死。

陽毒證

初得病一二日。便成陽毒。或服藥吐下後。變成陽毒。其病腰背痛。煩悶不安。狂言欲走。或見鬼。或下利。其脈浮大而數。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。吐下膿血。五日可治。七日不可治。升麻湯主之。（不可作發散。）

升麻　壹兩　當歸　甘草（各貳分。）　雄黃（研。壹分。）

桂枝 壹分　鼈甲 炙兩　蜀椒 炒汗 半分

咬咀。水貳升煎壹升。去滓。溫服一鎰。食頃再服。溫覆手足出汗。汗出則解。未解更作之。得吐尤佳。

陽毒宜葛根鼈甲湯方在錢氏方中。

陰毒證

初得病一二日。便成陰毒。或服藥六七日以上至十日。變成陰毒。其病身重背痛。腹中絞痛。咽喉不利。毒氣攻心。心堅強氣不得息。嘔逆唇青面黑。四支厥冷。其脈沉細而緊。仲景云。陰毒之候。如被杖。喉咽痛。五六日可治。七日不可治。甘草湯主之。不可作蜜煎。

甘草　鼈甲　升麻　當歸　蜀椒　桂枝 各貳分　雄黃 壹分

咬咀。水叁升煎取壹升。去滓。溫溫每飲一鎰。食頃再服。溫覆。中毒當汗吐之。汗吐則愈。不吐再服之。

治陰毒反陰井

硫黃 伍兩。研末。　太陰玄精石 味鹹者。研末。

用鐵銚子先鋪玄精石一半。次鋪硝石一半。中間下硫黃。又以硝石蓋硫黃。都以玄精石蓋之。用鹽和泥。固濟銚子。合定。合三斤炭火燒。令得所。勿以煙出多。急取出。以瓦盆合定。地下四面灰擁。勿令煙出。直候冷取細研。漆餅心丸。豌豆大。艾湯下十五丸。病重加至二三十丸。此法甚驗。喘促吐逆者入口便安。服此藥三五服。覺不退便於臍下一寸半灸之。須是大壯百壯。未愈可至二百壯。若手足極冷。小便澀。小腹鞕疼痛。氣縮。即須更於臍下四寸。如前灸之。乃與當歸四逆并反陰丹。頻頻與服。內外通逐方可解。若稍緩即死矣。當歸四逆乃加吳茱萸生薑者是。慎勿與。蒂當利小便藥。此是陰毒氣結在小腹所致也。有見小便不通。使用炒鹽及裹熱熨斗。熨臍下。欲盡小便通利。其冷氣在小腹之間。被熱物所發。無處通出。即奔上衝心。其死速矣。

硝石 研末。各貳兩。

又治陰毒硫黃丸

硫黃 貳兩　水銀 壹兩

同研入銚。酒少許。慢火炒。欲似煙出。再出火酒醋。如此三四徧。地上放冷研之。蒸餅丸梧桐子大。每服二十三十丸。艾湯吞下。日三服。食前。

陰毒脈沉微。欲絕。四支逆冷。大躁面渴不止。附子飲子。

附子 壹枚。半兩以上者。炮。去皮尖。四破。

以水九升。煎至三升。去附子。入瓶。油單密封。沉井底。候極冷取飲之。仍下硫黃丸甚妙。

陰毒之爲病。因汗下藥性冷所變。多在四五日也。或素來陽氣虛冷。始得病便成陰毒。或始因傷風傷冷

物。便成陰毒。其病六日內可治。過六日不可治。

狐惑證

狐惑之爲狀。如傷寒。或因傷寒變成斯疾。其候默默欲眠。目不得閉。臥不欲臥。欲食惡聞食臭。其面乍黑乍白。上部則聲嗄。甘草瀉心湯主之。方在瘧中。蝕於下部則咽乾。蝕於肛門者。燒雄黃薰之。雄黃氣味。薰下部。病者脈數。則熱微煩。默默但欲臥。汗出初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日則兩目四眥周匝黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。赤小豆一升。浸。當歸一兩。

細末。漿水調下二錢匕。日三服。

百合證

脈曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病。意欲食復不能食。常默默欲臥。欲出行復不能行。或有美食時。或惡聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則增劇吐利者。如有神祟者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺頭不痛。淅然者。四十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或二十日或一月微見者。隨證治之。

治汗後百合病百合知母湯

百合 拾枚　知母 壹兩 半。

百合先洗淸一宿。當白沫出。去其淸水。別以淸泉水壹升半。煮百合。取壹升。去滓。別以泉水壹升。煮知母。取半升。去滓。同百合湯煎至壹升。溫分三服。

淸卜後百合病滑石代赭湯

百合 拾枚　滑石 壹兩 半。　代赭 半兩。

先以水淸百合一宿。當白沫出則去其水。更以泉水壹升半。煮取一升。去滓。別以泉水一升。煮滑石代赭。取半升。去滓。合和重煎至一升。分溫三四服。

治吐後百合病百合雞子湯

百合 拾枚　雞子黃 貳枚

先以水洗百合。淸一宿。當白沫出。去其水。更以泉水一升。煮取一升。去滓。下雞子黃。攪勻。分溫三服。

治不經吐下發汗百合病形如初者百合地黃湯

百合 拾枚　地黃汁 半升

先以百合水淸一宿。有白沫出。去其水。更以泉水一升半。煮取一升。去滓。內地黃汁再煮。取一升。合溫溫分三服。中病勿更服。

治百合病一月不解。變成渴者。百合洗之。

百合（一升・如煎洗・先漬一宿・當白沫出・去其水・）
更以水一斗煎數沸洗周身・愼風・仍食白湯餅・但勿與鹽豉也・煮餅是切麪條湯・煮水沸過・熱湯苦
食之・
渴不差・栝樓牡蠣散主之・
栝樓（無實服者・）　牡蠣粉（等分）
細末・水調方寸匕・日三服・
治百合病變發熱・百合滑石散・
百合（炙兩）　滑石（參兩・）
細末・清飲調方寸匕・日三服・當微利・熱則除・已利勿服之・
百合病見於陰者・以陽法救之・見於陽者・以陰法救之・見陽攻陰・復發其汗・此爲逆・見陰攻陽・乃復下之・
此亦爲逆・

痙濕暍證

傷寒所至・太陽病痙濕暍・此三種宜應別論・以爲傷寒相似・故此見之・

痙

太陽病發熱無汗・反不惡寒・名曰剛痙・
太陽病・微熱汗出・不惡寒・名曰柔痙・（病源云・惡寒・）
其證身熱足寒・頭強項急・惡寒時頭熱・面赤目脈赤・獨頭搖・卒口噤・背反張者・痙病・
太陽病發汗太過・因致痙・（素問曰・太過所至・爲寒汗座・又云・帥熱移於胃・傳爲柔痙・始太陽中風・發熱而故迫之氣復者・太陽證・故發痙也・師論・金匱子面證者・故發熱於胃水・水爲火迫則上升・復逆心位・水入火鄉而爲邪・若汗大多・因而濕寒・汗反爲冷濕・）
痙病臥不着席・小兒腰背去席二指・大人側拳爲難・
治痙病脈弦・直上下行・
仲景云・太陽病證其身躰八然・脈反沉遲者・爲欲作痙・宜桂枝加栝樓湯・（栝樓不上中風・頸項八八・其證湯內當加栝樓四兩・）痙病不宜大發汗及針灸・宜小汗之・
柔痙宜桂枝加葛根湯・（桂枝湯內加葛根四兩・）
剛痙宜葛根麻黃湯・（方在解表證中・）
剛柔痙加減葛根麻黃湯・
葛根　麻黃　生薑（各壹兩・）　防風
白朮　人參　葶藶　黃芩
芍藥
防己

桂枝　甘草（各半兩・）　附子（壹枚・）
咬咀・水六升・先煮麻黃葛根數沸・去上沫・內諸藥・煮取二升・去滓・飲服一盞・食頃再服・日四五・夜二
三・柔痙自汗者・去麻黃加葛根・成壹兩半・
剛痙胸滿口噤・臥不着席・脚攣急・其人必齘齒・宜大承氣湯下之・（方在可下門中・）

濕證

太陽病關節疼痛而煩・脈沉緩・濕痺之候・其人小便不利・大便反快・但當利其小便・宜五苓散・（方在水
濕家之爲病・一身疼發熱・身如熏黃・仍治風濕・脈浮・身汗出惡風・宜黃耆湯・
黃耆（貳兩半・）　防己（壹兩）　甘草（壹兩）　白朮
生薑（各壹兩半・）　浆（拾個・）
咬咀・水四升・煎至二升・去滓・溫飲一盞・食久再服・喘者加麻黃壹兩半・胃中不和者加芍藥壹兩半・氣
上衝者・加桂枝壹兩半・下有燥寒者・加細辛壹兩・服後當如蟲行皮中・從腰下如冰・厚坐被上・又以
手摩之・令藥氣遍身・須臾・坐定・汗出如浴・但濕家其人但頭汗出・背強・欲得被覆向火・若下之早則噦・胸滿・小便不利・舌上如胎者・此丹田有熱・胸上
有寒・渴欲得水而不能飲・口燥故也・
濕家下之・額上汗出・微喘・小便不利者死・下利不止者亦死・問曰・風濕相搏・一身盡疼痛・法當汗出而解・
值天陰雨不止・汗出已解・身復痛何也・答曰・發其汗・汗大出者・但風氣去・濕氣在・是故不愈也・若治風
濕者・發其汗・但微似欲出汗者・風濕俱去也・
濕家病身上疼痛・發熱面黃而喘・頭痛鼻塞而煩・其脈大・自能飲食・腹中和無病・病在頭中寒濕・故鼻塞
而不聞香臭酸辛・宜瓜蒂散・（瓜蒂二枚・熬黃・）
濕家身煩疼・可與麻黃湯・內加白朮貳兩・（麻黃湯在可
病者一身盡疼・發熱・日晡則劇者・此名風濕・此病因傷於汗出當風・或久傷於冷所致也・可與杏仁薏苡
湯・
麻黃（叁兩半・）　杏仁（肆拾枚・）　薏苡仁　甘草（壹兩半・）
咬咀・以水二升・先煮麻黃一二十沸・去上沫・內諸藥・煮取一升・去滓・溫二三服・
傷寒八九日・風濕相搏・身體煩疼・不能轉側・不嘔不渴・脈浮虛而濇者・宜桂枝附子湯・此治大便自利・小
便不利者・
桂枝（貳兩・）　附子（貳枚・）　生薑（壹兩半・）　大棗（貳拾枚・）
咬咀・以水三升・煮取一升・去滓・分溫四服・若大便堅・小便自利者・去桂枝加白朮貳兩・煎如前法・初

一二服身如痺半日許服之都盡其人如冒狀勿怪此乃風附并走皮間逐水氣未得除故使之耳風溫相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則極汗出短氣小便不利惡風不欲去被或有微腫者甘草附子湯主之

附子 貳兩　白朮 貳兩　桂枝 肆兩　甘草 貳兩

咬咀水三升煮取一升去滓分溫三服身腫者加防己貳兩悸氣小便不利加茯苓壹兩半溫水成四升煎一升三合

暍證

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎湯加人參主之方在厥陰證中

太陽中暍者身熱疼重而脈微此夏月傷冷水水行皮中所致也瓜蒂湯主之

瓜蒂 貳拾枚　水半升煮取二合半去滓溫服

太陽中暍發熱惡寒身重而疼煩其脈弦而細弦而遲小便已洒然毛發手足逆冷小有勞身即熱口前開板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則反熱甚下之則淋甚宜大小橘皮湯大橘皮湯在不可汗證中小橘皮湯主手足逆冷

橘皮 貳兩　生薑 肆兩

咬咀水三升煮取一升半去滓作四服稍熱呷之

發汗吐下後雜病證

病人脈微而澀此乃醫所病大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其體所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃氣虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中躁熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲澀故知亡血也此皆可治陽微惡寒四逆陰弱發熱內熱病宜苦酒艾之類大下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者宜乾薑附子湯不可作發散

乾薑 叁兩　附子 叁枚生

咬咀水一升半煎至半升時欲一小盞食久再服

傷寒若吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者宜茯苓白朮湯

茯苓 貳兩　桂枝 貳兩半　白朮　甘草 各壹兩

咬咀水三升煮至一升半去滓分溫四服

發汗吐下後煩不得眠若劇者必反復顛到心中懊憹舍豉梔子湯主之少氣者加甘草嘔者加生薑梔子香豉湯

肥梔子 貳拾枚　香豉 綿裹

水二升煎梔子至一升三合下豉取七合半去滓再進一盞得吐止後服

梔子甘草湯前湯內加甘草壹兩同梔子煮後下豉如前法加水半升

梔子生薑湯前方內加生薑貳兩半同梔子煮後下豉同前法加水一升

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者欲解也屬梔子香豉湯主之用前方

下後腹煩滿起臥不安者梔子厚朴湯主之

梔子 入個大者　厚朴 貳兩　枳實 二枚

咬咀水二升煮一升去滓溫飲一盞

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯主之

肥梔子 八個　乾薑 壹兩

以水一升七合煮取八合去滓分溫三服

凡用梔子湯得效即止後服病人猶有微煩不可與之發汗者下之而煩熱胸中窒塞者梔子豉湯主之

作甘爛水法

取水貳斗置大盆中以楊柏枝擊水上有珠子五六千箇相逐取用之

傷寒五六日已發汗而復下之胸脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱煩者此表未解柴胡桂枝乾薑湯主之

桂枝　黃芩　各壹兩半　柴胡　肆兩　栝樓根　貳兩　乾薑　甘草　牡蠣　各壹兩　右㕮咀水六升煎取三升去滓再煎一升半溫溫時飲一盞食頃再服

傷寒發汗若吐下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復花代赭湯主之

旋復花　甘草　各壹兩半　人參　壹兩　代赭　末半兩　薑　三枚　半夏　壹兩半　生薑　貳兩半　右㕮咀水五升煎三升去滓再煎取一升半溫分四服

傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲水至數升者白虎加人參主之方在發汗中

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯主之

柴胡　貳兩　龍骨　黃芩　生薑　鉛丹　人參　桂枝　茯苓　牡蠣　各參分　大黃　壹兩　薑　貳個　半夏　壹合　右㕮咀水六升煎取三升下大黃切如棋子塊更煎取貳升去滓溫飲一盞

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中治中焦此利在下焦以赤石脂禹餘糧湯主之復不止當以五苓散方在可水證中治之

赤石脂　禹餘糧　各八兩　右㕮咀水四升煮取二升去滓溫飲一盞

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之

桂枝　甘草　各貳兩　白朮　人參　乾薑　各壹兩半　右㕮咀水五升先煮四味取三升內桂更煮取一升去滓溫分三服

發汗後腹脹滿者厚朴人參湯主之

厚朴　四兩　甘草　壹兩　生薑　四兩　半夏　壹兩　人參　半兩　右㕮咀水五升煮取一升半去滓溫分三服

治頭痛壯熱心中煩黃芩梔子湯

黃芩　梔子　各壹兩半　石膏　乾葛　各貳兩　豉　半兩　葱白　十莖　右㕮咀水四升煮取一升半溫溫作三四服始得病便如前證亦可服治夏月傷寒毒殊驗

傷寒發汗後吐未發汗頭痛如破宜葱白湯

連鬚葱白　十莖　生薑　貳兩　水二升煮一升去滓溫溫作二三服

服前湯頭痛未解宜葛根葱白湯

葛根　壹兩　芍藥　芎藭　知母　各半兩　葱白　十莖　生薑　壹兩　右㕮咀水二升半煮取一升去滓溫溫分減服

傷寒頭痛立効荊芥散

天南星　草烏頭　炮去皮臍生用者　荊芥穗　各半兩　石膏　壹兩　右細末每服二錢半陳茶一錢薑汁半盞薄荷三葉水兩盞煎至八分溫溫相次三服

傷寒嘔吐不止惡寒脈細或浮遲宜理中丸兼治霍亂吐利及傷寒後發熱水停喜唾者

人參　乾薑　甘草　白朮　各壹兩　右細末蜜丸雞子黃大每服一丸百沸湯一盞化令細煎三五沸溫服之霍亂腑上築者不宜此可作湯去朮加桂一兩半水三升煎取八合稍熱服之吐甚去朮加生薑一兩半作湯煎如前法飲熱粥一椀微溫覆之勿發揭衣被有寒腹滿痛或四肢拘急或下利轉筋加生附子二枚作湯服之

治傷寒嘔吐欲死生薑半夏湯

半夏　壹兩半　生薑　壹兩　水三升半煮一升去滓溫溫分四服

治嘔吐發熱脈滑數或洪者茅根湯

茅根　半升　麥門冬　貳合半　半夏　壹兩　人參　半兩　茯苓　半兩　生薑　貳兩　右㕮咀水五升煎一升半去滓溫溫分減服

霍亂頭痛發熱身疼多飲水者宜五苓散方在水證中

傷寒發熱自利脈浮大數及鼻血或嘔者宜黃芩芍藥湯

黃芩　壹兩半　芍藥　甘草　各壹兩

咬咀。水五升煮取一升半。去滓。分四服。嘔者加半夏一兩一分。生薑一兩半煎服。

治傷寒熱痢。或發腹痛。黃連當歸丸。

黃連　當歸（各壹兩）　乾薑　赤石脂（各壹兩）

細末。蜜丸梧桐子大。米飲吞下二三十丸。日三夜二服。

傷寒下利如爛肉汁。赤帶下。伏氣腹痛。諸熱毒悉主之。薤白梅子湯。

豉（半升。綿裹）　薤白（壹握）　肥梅子（大者。柒個）

水三升半。先煮梅子十沸。下薤白煎至二升。去滓。下豉煮一升半。溫分減服。必解下惡積。

傷寒汗解。因飲酒復劇。苦煩悶乾嘔。口燥伸吟。錯誤不得臥。此藥解熱毒。除酷熱。不必飲酒劇者瘥。五日中神効。黃連黃芩湯。

黃連（壹兩半）　黃芩（黃芩各壹兩）　肥梔子（拾貳個）

咬咀。水三升煎一升二合。去滓。溫溫分減服。未差更作。

傷寒四日而大下。熱利時作。白通諸藥多不得止。四順湯。熱白通湯。苦溫除熱止利。莫若黃連熟艾湯。

黃連　黃芩（各壹兩半）　龍骨（壹兩）　熟艾（兩鍰子大）

咬咀。水四升煮一升二合。去滓。分減溫服。

龍曰。凡冷利皆宜四逆。冷利膈下必寒。水穀黃白色或青黑也。熱利膈下必熱。利黃赤色也。天行熱毒。下利赤白。久下膿血及下部諠氣。當下細蟲如布絲縷大。或長四五寸。黑頭銳尾。宜麝香丸。

麝香（壹銖）　附子（雄黃　丹砂　乾薑　各壹分）

搗下篩。乞煉蜜和丸。小豆大。米飲下二丸。未知增之。（此方本无巴豆。是古方故去。服之不効。今增巴豆。試之甚驗。）

傷寒後咳嗽。肉豆蔻湯。

肉豆蔻（壹個）　石蓮肉（拾枚）　荷香（各壹分）　丁香（半分）

生薑　人參（各貳分）　枇杷葉（伍片。拭去毛。炙。）

咬咀。水三升煎至一升半。分四服。空心緩飲之。

龍曰。傷寒汗後咳嗽不止。是陰陽氣升降欲作汗。升之不上。降之不下。故胃氣上逆而咳嗽。撫休止者。宜良薑方。

橘皮　良薑　桂枝　當歸（各壹分）　麻黃（半兩）

橘椰（柒個）　杏仁（貳拾個）　甘草（壹分）　生薑（壹分）　大棗（拾個）

咬咀。水二升半煎至一升。去滓。下橘椰。末。又煎三沸。去滓。通口服一盞。未已再一劑。

時行頭痛。心如醉狀。面愛向黑處。不欲見人。此爲壞熱不散。速行大青湯與服。不爾。狂走赤人。大青湯。

大青葉　秦艽　吳藍　升麻　薺苨

梔椰根（各貳分）　甘菊（壹分）　石膏（柒分）　竹瀝（貳合）　朴消（三分）

咬咀。分二貼。每服一貼。水二升半。煎至一升二合。去滓。下竹瀝朴消分溫四服。肉色黃加茵蔯六分。

面似火加梔子十四枚。加水成三升。煮取一升半。溫飲一盞。

七八日熱盛不解。苦蓼麻湯。

苦酒（壹升半）　苦蓼藍（壹合）　生艾汁（半升）

同煎至七合。作二服。此掠內熱病。有牛黃一刀圭尤良。阮河南曰。今諸瘧疾。多用辛甜。豉桂人參之屬。此皆貴價難得。當有必欲求之。轉以失時。而苦參青葙蓼藍子艾之屬。所在盡有之。除熱解毒。最勝向貴價藥也。前後數參並用之。得病內熱者。不必按常藥次也。便以青葙苦參艾苦酒瘧之。但少促其開耳。無不解者。（苦酒即米醋也。）

龍曰。辛甜豉桂人參之屬。是發散寒氣之藥。其病未傳成內熱者。爲調治之大要藥也。決不可慮其酸苦之藥。正治內熱病急要之藥也。設當行辛甘而用酸苦。設當行酸苦而用辛甘。是昧於陰陽之用。如此醫殺之耳。其辛甘酸苦。自是調治通行之要藥。若論苦則忌甘。論甘則忌苦。雖有厭中。誠爲粗工矣。

時行一切。不知身上疼痛。不塞亦不熱。沉沉似有所思。順舉多語。此藏正傳熱。麻人龍膽丸。服此藥不死。

大麻人　大黃（各壹兩）　柴胡　黃芩　白鮮皮

秦艽　赤芍藥　龍膽草（各貳分）　黃連（壹分）　梔子（肆貳拾個）

細末。蜜丸如梧桐子大。食後煎淡竹葉湯下三十丸。日與三服。以大利爲度。十日小差。壹月平復。

地黃湯。療傷寒及溫病。應發汗而不與發汗。五內有瘀血者。及鼻衄吐血不盡。內熱瘀血。面黃大便黑者。此方主之。消化瘀血甚良。

生地黃（肆兩）　牡丹皮　芍藥　犀角屑（無以升麻代各半兩）

咬咀。水貳升煮取壹升。去滓。溫溫飲一盞。喜忘如狂者。加地黃黃芩各三分。加水一升。脈大來遲。腹不滿。自言滿者。爲無熱。不用黃芩也。

當歸（各壹分）　麻黃（半兩）

生薑（壹分）　大棗（拾個）

時行病。鼻衄或吐血。下血黃芩湯。

黃芩（肆兩）

咬咀。水三升。煮一升半。溫飲一盞。能治婦人漏下血不止。黃連更佳。

吐血百治不差。此方療十差十。大黃散。

地黃汁（半升）　生大黃末（壹方寸匕）

煎地黃汁三滷下大黃末調勻空腹服之每溫飲一小盞日三服血卽止

熱病毒氣入眼赤痛生翳不見光明者大黃梔子湯

生大黃（壹兩）　升麻（半兩）　豉（一合）　甘草（各壹分）　梔子（柒個）

㕮咀水二升煎至一升去滓溫作四服以利爲度難利者煎藥點下朴消二分和服先煮諸藥至一升半乃下大黃大黃先以水漬和水下之則折熱易利

治毒病入眼忽生赤翳或白或腫脹或赤痛不得視光明入心肝或眼浮腫如吹汁出生膜被珠子或內障不見物良由病後不愼酒麪炙煿五辛所致宜服此煎利之秦皮大黃湯

秦皮　柴胡　常山　黃芩　升麻

苦參　白斂　枳實　甘草　大黃（各壹分）

㕮咀水參升煮貳升下大黃再煎一升半去滓食後溫飲一盞熱盛者加焰消半兩湯成後下化勻服末差更作可至五七劑

又方滴眼湯（斑豆蔻不宜用）

秦皮　升麻　黃連（各半兩）

細剉水二升煎至一升綿包筋頭搦湯滴入眼中頻頻用之

下部蟨瘡雄黃散

雄黃　胡椒子　苦參　黃連（各壹分）　桃仁（壹分）

爲散以艾汁和丸棗核大綿包內下部蔭密汁更佳冬月無艾濃煎艾汁和爲丸更以米飲調下貳錢溫飲之日二服

治蟨瘡青黛丸

青黛　丁香　黃連（壹分）

細末甘涎和丸棗核大口中有瘡含之咽汁若下部有瘡綿裹內下部日含化五六十丸差

牽馬丸治天行四五日下部生瘡醫所不能治此方主之

附子（壹分）　藜蘆　桂枝　巴豆（各半兩去皮心熬）

細末別研巴豆加蜜杵丸梧桐子大空心熱水下二丸未知加三丸熱在高上不下飲熱湯半升投吐之下部蟨自差神良

天行口瘡黃連升麻湯

黃連　升麻　甘草（生各半兩）

㕮咀水一升半煮半升入地黃汁一合煎半升分二服細呷之

又方薔薇飲子

薔薇莖葉切一升（冬用根皮）

水三升煮半升溫溫漬之去滓喉咽有瘡者嚥汁少許爲佳

又方黃連飲子

黃連薄切小片蜜漬一宿嚼連汁漬瘡

又方五倍子散

五倍子炒爲末傅之涎出吐去以差爲度

傷寒喉中痛閉塞不通射干煎

生射干　豬脂（各半斤）

㕮咀令煎令射干色微焦去滓取壹盞大綿裹含稍稍嚥之

治喉咽痛塞鵝砂散

鵝砂　殭蠶　牙消　白礬　甘草　雄黃（各壹分）

硇砂（半分）　草烏頭尖（肥者）

細末米飲調一錢細細呷之

古方黑龍煎治咽喉腫痛九種疾

人參（半兩）　甘草（壹兩）　無灰酒（壹升）　不蛀皂角（肥者壹挺）

水三斗浸皂角一宿淨鐺內煎令水減半次下人參甘草細切又同煎三分耗二布絞去滓下酒更入釜煤一匕半攪煎如餳稀入瓷合內埋地中一宿若用時取一丸如雞頭大蓋中以溫酒一呷化之先以水漱口以鵝毛點藥入喉中搐之有惡涎或自出或下腹可更三度引藥方歇良久合吐惡物出盡了令喫少許水浸烝餅及軟飯粥壓之次合甘草一寸嚼汁忌炙煿胡餅豬肉滷藏等物如木舌難下藥以匙按舌用藥搐喉中

九般名

急喉閉　纏喉風　結喉　爛喉　重舌

木舌　遁蟲　蛀喉　飛系入喉

元祐五年自春至夏秋蘄黃二郡人患急喉閉十死八九遞者半日一日而死黃州潘推官昌言親族中亦死數口後得黑龍膏救活者數十人

慮曰急切亦不候合此膏用右方以意處之但得不蛀皂角一兩條搥碎水三升半浸少時揉汁去滓下草一分人參一分同煎作稀膏勿令太稠乃下後藥

霜梅上白鹽　硇砂　焰消（各等分）

三味生研，用前醬齏酒和勻，可以搯得瘡皮，乘以鵝毛搯少許，如前法。此齏得力尤速，若日久醬乾，以甘草水化之，病差後，胸喉外生瘡勿疑，無鹽梅以白鹽代。

天行手足腫疼痛欲脫者，漉煎虎杖汁漬之。

天行後凝氣手足腫痛欲脫，必作癰膿，升麻大黃湯。

升麻　木通　白斂（各等分）　黃芩（各等兩）

甘草（半兩）　大黃（忽兩半）

咬咀，水差升煮二升半，下大黃煮一升半，溫溫飲一盞，利下爲度。

傷寒勞復證

病新差後，氣血津液衰耗，愼勿爲諸勞動事，凡言語思慮，勞神梳沐，澡頮勞力，則生熱而復病，如初也。又新差後精髓枯燥，切不可爲房事，犯房事勞復必死，魏督郵廁子獻病差後，華嬪嘔之，愼勿爲勞事，餘勞尙可，女勞卽死，此是女勞復非陰陽易也，素問云病熱而有所道者，是新差後腸胃尙弱，若多食則難消化，而復病，如初也，此是食復新差，強人足兩月，虛弱人足百日，則無復病矣。

天行勞復頭痛四肢疼，葱豉湯。

葱白　豉（半升）

水二升半，煎葱爛，去滓，入雄鼠屎三七枚，末之和勻，分再服，未差更作。

天行勞復作熱，且至晚則腰背痛，頭項強重，葛根豉湯。

芍藥（各壹兩）　生薑（各壹兩半）　豉（各貳合半）　葛根（貳兩）

咬咀，水三升，煎二升，下豉，煎一升半，去滓，溫飲一盞。

大病差後勞復，枳實梔子湯。

枳實（壹分）　肥梔子（拾貳個）　香豉（半升）

漿水三升，煮枳實梔至二升，下豉，煮一升半，去滓，溫飲一盞，溫覆微汗，食復者，加大黃葉子大七枚，同煎服之愈。

療傷寒已差，勞復如初，脈浮，無汗者，桂枝梔子湯，（自汗者去梔黃。）

梔子（拾貳個）　豉（半升）　桂枝　麻黃（各壹兩）

咬咀，水三升，煎至二升，下豉，取一升半，去滓，溫飲一盞，溫覆取小汗差。

梔子石膏香豉湯

梔子（拾個）　石膏（肆兩）　香豉（壹兩，綿裹。）

水三升，先煮二味至二升半，下豉，煮取一升半，去滓，溫飲一盞。（一法湯成入瘡孔，矢二七枚來良。）

病未平復，後勞動，致熱氣攻胸，手足拘急，搐搦如中風狀，瓜蔞湯。

瓜蔞根（肆兩，無黃腻者。）　淡竹茹（半斤）

水三升，煮一升二合，去滓，日二三服，溫與之。

婦人病未平復，因夫所動，小腹篤中急痛，腰胯疼，四肢不任舉動，無熱證者，附子黃耆湯。

白朮　當歸　桂枝　附子　甘草　芍藥

人參（各半兩）　黃耆（叁分）　生薑（壹兩半）

咬咀，水四升，煮至一升半，去滓，通口服一盞，食久再服，溫覆取小汗。

男子勞房成復病，鼠屎湯。

薤根（壹升）　鼠屎（貳拾壹個，焙末，矢頭尖曬者，是卽牡鼠也。）

水三升半，煮薤根至一升半，去滓，下鼠矢末，再煎三沸，溫飲一盞，相次三服，衣被必有黏汗爲効，未汗再作一劑，兼治陰陽易神驗。

男子房勞復發熱，口噤，臨死舌出數寸，又始得病，百節痛如被打，渾身沉重，恍惚失措，脈促而絕，不可治。

或有吐涎不止，或有譫妄煩亂者，皆不可治。

天行差後，勞復發熱，嘔吐食不下，蘆根湯。

蘆根（半升）　生薑（貳兩）　橘皮　枇杷葉（各壹兩）

咬咀，水三升，煮一升半，去滓，溫飲一盞，大故心煩躁，加石膏貳兩，加水一升，煮二升。

陰陽易證

陰陽易病者，陰陽相感動，其毒氣着人，如換易也，男子病新差，女子與之交，女子得病，鮮有死者，男犯女得病，名曰陽易，女子病新差，男子與之交，男子得病，名曰陰易，若二男二女，則不相易，然女犯男得病，稍緩，則十無一人得生，若女犯男，男自發勞復，則女不病，男犯女，女自發勞復，則男得病，亦輕，富貴之家，雖知其事，後生輕於自恣，犯之多致不救，田野之人，蒙蒙昧昧，只知傷寒能死人，因此病死者十有三四矣，皆不知其所犯之由，深可傷也，男子女人陰陽易病，其狀身體疼痛，熱上衝胸，頭重不能舉眼，內生拘四肢拘急，小腹絞痛，手足舉則皆死，其亦有不卽死者，若小腹裏急，熱上衝胸，頭重不欲舉，百節解離，經脈緩弱，血氣虛，骨髓竭，便吸吸，氣力轉少，着牀不得動，起止仰人，引歲月死，宜此方，足甲視灰散。

取交接婦人手足甲二十枚，搥近證處一尺，同燒灰，燒或米飲，調下二錢，日三服，陰頭微腫，小便利，莫愈，若未愈，灸陰頭一百，壯便差，陰頭在毛際間，提陰向上，當頭是穴。

傷寒總病論卷四

暑病論　暑病表證
察問歲五種暑病　時行寒疫論
時行寒疫治法　聖散子方
班豆方論　溫病發班治法 小兒證附

暑病論

脈曰。冬傷於寒。至夏至後至三伏中。變爲暑病。其熱重於溫也。有如傷寒頭三陰三陽傳者。有不依次第傳。如見五藏熱證者。各隨證治之。

暑病表證

暑病代桂枝并葛根證。

桂枝（三兩） 芍藥（三兩） 知母（三兩）
甘草（二兩炙） 黃芩（二兩半） 葛根（貳兩）
生薑（各三兩半） 棗（拾枚擘）

咬咀。水六升。煮取三升。通口服一盞。相次取汗。

暑病代桂枝并葛根證。

桂枝（三兩） 芍藥（三兩） 知母（三兩）
甘草（二兩炙） 黃芩（二兩半） 葛根（貳兩）
杏仁（貳拾枚） 生薑（各三兩半） 棗（拾枚擘）

咬咀。水六升。煮取三升。通口服一盞。相次取汗。

暑病代桂枝并葛根證。

桂枝（三兩） 芍藥（三兩） 知母（三兩）
甘草（二兩炙） 黃芩（二兩半） 葛根（貳兩）
杏仁（貳拾枚） 生薑（各三兩半） 棗（拾枚擘）

咬咀。水六升。煮取三升。通口服一盞。相次取汗。

暑病代桂枝并葛根證。

桂枝（三兩） 芍藥（三兩） 知母（三兩）
甘草（二兩炙） 黃芩（二兩半） 葛根（貳兩）
生薑（各三兩半） 棗（拾枚擘）

咬咀。水六升。煮取三升。通口服一盞。相次取汗。

暑病代桂枝并葛根證。

桂枝（三兩） 芍藥（三兩） 知母（三兩）
甘草（二兩炙） 黃芩（二兩半） 葛根（貳兩）
杏仁（貳拾枚） 生薑（各三兩半） 棗（拾枚擘）

咬咀。水六升。煮取三升。通口服一盞。相次取汗。

暑病代麻黃證。

桂枝（三兩） 杏仁（三兩） 知母（三兩） 麻黃（三兩） 甘草（二兩） 黃芩（二兩） 生薑（各三兩）

煎如前法。

暑病代青龍湯證。

麻黃（二兩） 桂枝（二兩） 甘草（二兩） 石膏（參兩） 知母（參兩） 杏仁（參拾枚） 生薑（三兩半） 棗（拾枚）

如前煎服。

暑病代葛根麻黃證。

葛根（二兩） 麻黃（三兩半） 桂枝（三兩） 甘草（二兩） 知母（三兩） 芍藥（三兩） 黃芩（二兩） 生薑（三兩半） 棗（拾枚）

如前煎服。

暑病三日外至七日。不欲內熱。令人更相染。大青消毒湯。

大青（三兩） 芒消（各三兩） 山梔子（三兩） 石膏（肆兩） 豉（半升） 濕地黃（半升）

咬咀。水七升。煮取三升。去滓。下芒消化之。溫服一盞。以熱除爲度。

暑病通用白虎。一如傷寒與喝證用之。（方在厥陰證中。）

暑病通用麥奴丸。（方在厥陰證中。）

暑病若吐下後。別見形一如傷寒門治之。

暑病噦逆發。斑痘豆壞。一如溫病門治之。（已上四條先生所論。）

預防熱病急黃賊風葛粉散。

葛粉（貳升） 生乾地黃（壹升） 香豉（半升）

細末。食後服方寸匕。牛乳蜜湯竹瀝米飲烏梅湯任性調下。日三服。有病者日五服。

素問載五藏暑病

肝熱病者先左頰赤。肺熱病者先右頰赤。心熱病者顏先赤。（顏。額也。）腎熱病者頤先赤。（頤。頦也。）脾熱病者鼻先赤。（土主中央。）病雖未發。見赤色刺之。名曰治未病。

肝熱病者先小便黃。腹痛多臥。身熱。熱爭則狂言及驚。脅滿痛。手足躁。不得安臥。庚辛甚。甲乙大汗。氣逆則則庚辛死。

心熱病者先不樂。數日乃熱。熱爭則卒心痛。煩悶喜嘔。頭痛面赤。無汗。壬癸甚。丙丁大汗。氣逆則壬癸死。

女子陽易則取男子手足爪甲。視近隱處。如前燒服之。可灸毛際橫骨上中央曲骨。一穴百壯。

男子陰易如前法灸。若陰卵縮未下。灸足大拇指旋毛上。小炷七壯。是大敦二穴。男女初得陰陽易病。便服雞根鼠矢湯。出汗有驗。

傷寒口乾喜唾方

大棗（肆拾枚。去皮核。） 烏梅（肥者拾個。去核爲末。）

右以棗肉和爲丸。舍化自然汁。

劇手少陰太陽。

脾熱病者先頭重頰痛心煩顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可俛仰腹滿泄兩顧痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死劇足太陰陽明。

逆則甲乙死劇足太陰陽明。

肺熱病者洗淅然厥起寒毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘喝痛急走胸膺背不得太息顧痛不任汗出而惡寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死劇乎太陰陽明出血如豆大立已。

腎熱病者先腰痛脊痠苦渴數飲水身熱熱爭則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死劇足少陰太陽踏汗者至其所勝日汗出也。

劇曰五種熱病二三日逢剋未爲逆急在五六日也。

時行寒疫論

病源敘從立春節後其中無暴大寒又不冰雹而人有壯熱病者此屬非時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫病暴病相似但治有殊耳其治法初用麻膏火炙唯二日法針用葛文行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而愈不解者勿復發汗也四日服升麻鼈甲湯五日服雞鳧湯六日服雞鳧散七日服雞鳧丸不吐者服赤小豆瓜蒂散吐之已解視病尚未了了者復一法針之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病皆速下之時病當待六七日時病始得一日在皮二日在肌三日在肌四日在胸五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱乘虛入胃然要當復下之不得下多致胃爛發斑發者赤斑出五死一生人有強弱相倍也病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法在可水五苓散證中。此張氏蒙治時行寒疫之法耳。溫病書病相似。但治有殊者。溫病無汗宜大汗。及有冬溫時行寒疫合用之方。

時行寒疫治法

初得時行赤色頭痛項強衆治賊風走痓寒痺趙泉黃膏。

大黃　附子　細辛　川椒

乾薑　桂枝各壹兩　巴豆伍拾粒

咬咀苦酒漬一宿以臘月豬脂一斤煎減火三上三下去滓收之以火熨身數百遍衆治賊風最良風走肌膚追風所在癰之神效千金不傳。

崔文行解散時氣不和傷寒發熱。

桔梗炒　細辛各肆兩　白朮銅兩　烏頭炮去皮尖各壹兩

細末傷寒服一錢五錄匕不覺復小增之以知爲度若時氣不和日服一錢五錄匕脾惡欲省病一服了去此時行寒疫通用之無病者預服以辟寒爲佳皆酒調下。

鼈甲散溫脾溫疫傷寒。

鼈甲　蜘蛛　乾薑各肆分　牡丹皮　皂角各伍分

細辛　附子各叁分　桂枝　朱砂各壹分

末之絳囊帶一方寸匕男左女右臂上繫之覺有病之時更以粟米大內鼻中酒服一錢匕覆取汗。日再當取一汗耳。

赤小豆瓜蒂散在厥陰證中。

雞子湯治熱盛狂語欲走。

生雞子　味收　芒消壹兩

井華水一大升同攪千遍去沫頓服之快利爲度。

豬苓散卽傷寒門五苓散也在可水證中。已上五方。據黑氏治時行寒疫合用之方。

麗曰麟齋火炙可行於西北二方餘處雖施莫若初服解散赤散之類如轉發熱而表不解乃行後四方爲佳天行壯熱煩悶無汗者麻黃葛根湯。

麻黃　伍兩　葛根　四兩

麗末每服五錢水二盞煎八分去滓温服取汗止後服。

葛根解肌湯汗後表不解宜服此。自汗者去麻黃。

葛根　肆兩　麻黃　芍藥　大青　甘草

黃芩　桂枝各貳兩　石膏壹兩

煎如前法。

詔書發汗白薇散治時氣二三日不解。

白薇　貳分　杏仁　叁分　貝母　叁分　麻黃　壹分

細末酒調下方寸匕相次二三服溫粉汗出愈。湯調亦得。

聖散子方　此方錄子晚翁書所傳。有序文。

昔賢暨千金方三建散於病無所不治而孫思邈特爲著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物効靈不拘常制至理開感智不能知今予所得聖散子殆此類也歟自古論病唯傷寒及欲發瘡斑未見皆宜下之也瘡已差則再下之此病有二種一則發斑俗謂之麻子其毒稍輕二則豌豆其毒最重多是冬温所變凡覺冬間有非節之暖瘡毒未發卽如法下之次第服預防之藥則毒氣內消不復作矣有不因冬暖四時自行者亦如法下之古方雖有治法而不詳備疑當時毒熱未甚鮮有死者耶近世此疾歲歲未嘗撫也甚者天枉十有五六雖則毒氣內攻不治因將爲祟又大半矣若身疼壯熱頭痛不與小汗何由發散大腸久祕毒攻腰脊或心腹脹滿不與微利何由釋去故當消息汗下然則塞熱固不當行温熱反增熱毒若熱勢大盛脈候洪數涼性之藥不阻表裏氣亦可通用若寒氣阻礙脈候沉遲則温性之藥不阻裏氣者可暫冰釋云不可汗下塞熱之藥只可紫草一味者乃滯隔之流毒是遵逐輕疾以自差爲功若值重病則拱手待斃矣世有權貴自信不任人拘忌冷熱汗下病或不救則貿醫謬誤斯又可爲傷歎夫調瘧者必當移柱故用古方附以愚見爲斑豆方以小兒多染此患故專用小湯劑大人可倍用之

茯苓　高良薑　肉豆蔻　拾箇　木豬苓　石菖蒲

獨活　柴胡　吳茱萸　附子　炮　麻黃　厚朴　製炙

蒼朮　苦參　枳殼　麩炒　吳朮　蜀人謂黃朮之白者爲白朮蓋白朮赤朮也而謂今之白朮爲吳朮也　白朮　澤瀉　藿香

半夏　各半兩　薑汁製　甘草　炙兩　防風　細辛

劉焙作煮散每服七錢水一盞半煎至八分去滓熱服餘滓兩服合爲一服重煎皆空心服治時氣傷寒頭痛身熱腰背強引類及中風口噤治瘧不絕婦人產中風寒經氣腹大喘促亦散方

丹砂　貳分　蜀椒　蜀漆　乾薑　細辛　黃芩

防己　桂枝　茯苓　人參　入參　沙參

女萎　烏頭　常山　各壹分　桔梗

麻黃　代赭　各拾分　雄黃　吳茱萸　各伍分

除細辛丹砂乾薑雄黃桂外皆熬治作散酒服方寸匕日二耐藥者二匕覆令汗出治瘧先發一時稍盡飲之毒從皮中出則愈小兒斟酌服

多温未卽發病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解多温毒始發於肌中斑爛隱瘼如錦紋而欬悶嘔吐濇水宜服黃芩麻黃湯

葛根　橘皮　杏仁　生　麻黃

黃芩　甘草　各半兩　知母

咬咀水二升煮八合去滓温温分減服之嘔吐先定便宜消息不嘔者去橘皮

斑豆瘡論

靈曰天行毒瘡自漢魏以前經方家不載或云建武中南陽征虜所得仍呼爲房瘡其後名醫雖載發

斑候是發汗吐下後熱毒不散裏虛裏實熱氣燥於外故身體發斑又說豌豆疱瘡表虛裏實一如發斑驗特異乃知神物効靈不拘常制至理開感智不能知今予所得聖散子殆此類也歟自古論病唯傷寒及欲發瘡斑未見皆宜下之也瘡已差則再下之此病有二種一則發斑俗謂之麻子其毒稍輕二則豌豆其毒最重多是冬温所變凡覺冬間有非節之暖瘡毒未發卽如法下之次第服預防之藥則毒氣內消不復作矣有不因冬暖四時自行者亦如法下之古方雖有治法而不詳備疑當時毒熱未甚鮮有死者耶近世此疾歲歲未嘗撫也甚者天枉十有五六雖則毒氣內攻不治因將爲祟又大半矣若身疼壯熱頭痛不與小汗何由發散大腸久祕毒攻腰脊或心腹脹滿不與微利何由釋去故當消息汗下然則塞熱固不當行温熱反增熱毒若熱勢大盛脈候洪數涼性之藥不阻表裏氣亦可通用若寒氣阻礙脈候沉遲則温性之藥不阻裏氣者可暫冰釋云不可汗下塞熱之藥只可紫草一味者乃滯隔之流毒是遵逐輕疾以自差爲功若值重病則拱手待斃矣世有權貴自信不任人拘忌冷熱汗下病或不救則貿醫謬誤斯又可爲傷歎夫調瘧者必當移柱故用古方附以愚見爲斑豆方以小兒多染此患故專用小湯劑大人可倍用之

温病發斑治法　小兒雖附

多月觸冒寒毒者至春始發病病初至發或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又多月天氣温煖人感乖候之氣未卽發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒已解多温毒始發出於肌膚斑爛隱瘼如錦文也

治温毒發斑大疫難救兼治豌豆瘡不出地黃膏

濕地黃　肆兩　好豉　半升

以豬膏一斤和勻釀一宿煎五七沸令三分去一絞去滓下雄黃末一錢匕麝香末半錢匕攪勻稍稍盡飲之毒從皮中出則愈小兒斟酌服

咬咀。水三升煮取一升三合。去滓。下芒消。溫溫分減服。

溫病發斑。赤斑者五死一生。黑斑者十死一生。大疫難救。鼠奴丸主之。（方在雜汗證中。）

冬溫至夏發斑。欬而心悶。嘔清汁。眼赤口瘡。下部亦生瘡。或自下利。黃連湯。

黃連（三兩）　栝樓皮　杏仁（三十枚。炒）　枳實

麻黃　葛根　厚朴　甘草（各二兩）

咬咀。水三升煮一升二合。去滓。溫溫分減服。下利先止。別煮消息小兒與酪。

天行發斑。瘡須臾徧身。皆藏白漿。此惡毒云。永徽四年。此瘡自西域東流于海內。但煮葵菜。漉鹽豉之。則止。鮮羊血入口即定。初患急食之。作菜下飯亦得。

小兒時行瘡豆。恐相傳染。先服漏蘆湯下之。本治熱毒難瘡。亦白諸丹。熱毒瘡瘍。（以下皆是小兒湯劑。）

漏蘆葉（無。以山薊子代之。）　連翹　白斂

升麻　枳實　麻黃　黃芩（各二兩半）

咬咀。水二升煮一升半。下大黃煮一升。去滓。下芒消。分減服。以利爲度。大人服可倍作。（大黃水洗。少時和水下之。）

龐曰。凡覺冬溫至春夏必發斑豆。小兒患須服漏蘆湯下之。得下後。逐日空心飲甘草汁三盞。以上一盞。兒小減之。直候腹瀉乃止。未瀉可飲至十日。則永不發。或下後飲羊血一盞。則不發。

治時行豌豆瘡樗皮飲子

樗皮二兩細切。水一升煮至半升。去滓飲汁。分減服。

龐曰。初得病便瘡狂不眠。渾身熱然汗出。問之身不惟寒。亦不惡風。其脈如數。以漏蘆湯下之。不甚數者。以大承氣湯下之。非但瘡豆。傷寒亦然。

治豆瘡悲氣不出。煩悶。熱毒氣攻腰。或腹脇痛不可忍。大便不通。五香湯主之。

麝香（半分）　水香　丁香　沉香　乳香（各一分）

芍藥　枳實　射干　連翹

麻黃　升麻　甘草（各半兩）　大黃（一分）

龐末。每服四錢。水一盞。竹瀝半盞。煎八分。去滓。下朴消一錢匕。和服。以利爲度。

天行熱氣生瘡疱。身痛壯熱。水解散。

麻黃（一兩）　黃芩　桂枝　甘草（各半兩）

細末。煖水調下二錢匕。小兒一錢。覆令小汗。熱氣在表。已發汗未解。或吐下後。熱毒不散。煩躁譫語。此爲裝虛裏實。熱氣躁於外。故身體發斑如錦紋。或不因汗下。始得病一二日便發。皆由溫疫熱毒氣使然也。若則發豌豆瘡。其色白或赤。發於皮膚頭作皰。戴白漿者。其毒則輕。有紫黑色作根。壓隱

在肌肉裏。其毒則重。十死一生。甚者五內七竅皆有瘡形如豌豆。故以名焉。脈洪數者。是其候也。

天行熱毒未解。欲生豌豆。發熱疼痛。宜服解肌出汗葛根石膏湯。

葛根　麻黃（各二兩）　石膏（一斤）　黃芩　芍藥

桂枝　甘草（各半兩）

龐末。每服四錢。水一盞半。煎八分。溫服。取小汗。（白汗者去麻黃。）

斑豆始有白疱。忽搔入腹。漸作紫黑色。無膿。日夜叫煩亂者。犀金散。

犀金一枚（甘草忘分。水半杯。煮乾。去甘草。片切。焙乾。爲細末。）　真腦子（少。半錢。）

同研。每一錢匕。以生豬血五七滴。新汲水調下。不過二服。甚者將氣從手足心出。如蟻狀乃差。此是此患小便澀。有血者中壞也。瘡黑靨無膿。十死不治。斑豆煩喘。小便不利。慘甲湯。

燈心（一把）　慘甲（一兩）

水一升半。煎六合。去滓。溫分作二服。

斑豆定煩喘。淡竹瀝飲子。

淡竹瀝

煖飲之。煩喘自汗。瘡不作黑靨。可治。

定煩喘麻黃甘草湯。

麻黃　杏人　桑白皮　甘草（各一兩）

咬咀。水一升煎四合。放溫分減服。若脈數有熱。以竹瀝代水一半煎之。嗽或喉痛加射干一分。

斑豆瘡出不快。紅花湯。

紅花子（一兩。細研。）

水半升煎百沸。去滓。分減服之。

斑豆服涼藥太過。欬嗽。手足冷。脈遲。甘草乾薑湯。

乾薑（半兩）　甘草（一兩）

咬咀。水一升半煎六合。分作二服。

常行瘡豆。紫草湯最良。患其服之太少。不能中病。但多搥切好紫草。（以湯沃之。用物合定。煎温去滓。分減服。每紫草半升。用湯一升。）斑豆已出。不可正爾發。裝更增斑爛。以裝盛故也。

豌豆瘡欲出。甘草湯。

甘草（一兩）

細剉。水二升煎一升。去滓。分減溫服。發腹中微利即止。

油飲子　飲清油一升。即不生。

豌豆斑瘡不快。表裏不解。煩喘。大便祕。氣攻脹滿。犀角升麻湯。

麻黃（壹分半）　木香　犀角　芍藥　甘草

杏人　枳實　雄黃（各壹分）　大黃（半兩）　麝香（壹錢）

咬咀。水二升煎一升半。下大黃。再煎一升去滓。下雄麝末沸勻。分作三服。以大便通爲度。瘡已出定方。

芒硝　豬膽

和研勻塗之。勿動。痂落無瘢。仍臥黃土末上良。

天行痘豆。預服此則不發。三豆飲子。

赤小豆　黑豆　菉豆（各壹升）　甘草（壹兩）

淨淘。水八升煮熟。逐日空心任性食豆飲汁。七日永不發。

痘豆發瘡。下利赤黃。或膿血。遍身發熱。梔子雞皮湯。

好豉（半升）　薤白（貳兩）　肥梔子（拾陸枚）

水二升半。煮梔子薤白將爛。下豉再煮十數沸。去滓。分減服。解下惡物盡。

傷寒總病論卷五

天行溫病論　　辟溫疫論

青筋牽論　　赤脈攪證

黃肉隨證　　白氣裡證

黑骨溫證　　溫病曉方論

黃病　　傷寒或異氣（或溫病壞證及雜證。）

敗壞別行方　　小兒傷寒

天行溫病論

龐曰。辛苦之人。春夏多溫熱者。皆由冬時觸冒寒毒所致。自春及夏至前也。有冬時傷非節之暖。名曰冬溫之毒。與傷寒大異。即時發病。溫者。乃天行之病耳。其冬月溫暖之時。人或乖候之氣。未即發病。至春或被積寒所折。毒氣不得泄。至天氣暄熱。溫自受乖氣而成。府藏陰陽溫毒者。則春有青筋牽。夏有赤脈攪。秋有白氣裡。冬有黑骨溫。四季有黃肉隨。治亦別有法。難經載五種傷寒。言溫病之脈行在諸經。不知何經之動。隨所在而取之。中風木。傷寒金。

熱病火。濕溫水。溫病土。治之者各取其所勝。讀難經溫病本是四種傷寒。或異氣而變成溫病也。土無正形。因火而名。故以溫次熱也。土寄在四維。故附金木水火而變病。所以王叔和云。陽脈浮滑。陰脈濇弱。更遇其熱。變成溫毒。溫毒爲病最重也。陽脈濇弱。陰脈弦緊。更遇於風熱。變成風溫。陽脈洪數。陰脈實大。更遇濕氣。變爲濕溫。脈陰陽俱盛。重感於寒。變成溫瘧。斯乃同病異名。同脈異經者也。故風溫取足厥陰木。手少陰火。濕溫專取手少陰火。溫瘧取手太陰水。濕溫取足少陰水。手少陰火。故云。陽經所在而取之也。天行之病。大則流罪天下。次則一方。次則一鄉。次則偏着一家。悉由氣運變發。有勝有伏。遷正退位。或有先後。天地九室相形。故令升之不下。則天地不交。萬化不安。必偏有宮分。受斯害氣。莊子所謂運動之泄者也。且人命有遭逢。時有否泰。故能偏着一家。天地有斯害氣。還以天地所生之物。以防備之。命曰賢人知方矣。

辟溫疫論

療疫氣令人不相染。及辟溫病傷寒屠蘇酒。通俗文曰。屠平曰屠蘇。廣雅云。屠蘇。庵也。蘇屠蘇平而庵圍所以寒會以聚藥。故正旦會飲辟溫酒。而以屠蘇爲名也。不相聞。今人家月朔每下作版閣是也。舊貴之家。圍中施羽帳錦幃。

大黃　桂枝　桔梗　川椒 各拾伍銖。
烏頭　菝葜　防風 各拾銖。　白朮 拾銖。

右㕮咀。纏囊盛。以十二月晦日早。縣沉井中。至泥。正旦平曉。出藥置酒中。屠蘇之東。向戶飲之。屠蘇之。續士卒掠藍子南被圍。矢如雨。未至子南馬數尺矣。輒墮地。牆以爲神人。各解圍而去。子南以方教子及諸兄弟。爲將者。皆未皆被傷。累世祕之。澳末。青牛道士得之。以傳安定皇甫隆。隆傳魏武帝。乃有人得之。故一名冠軍丸。一名武威丸。曾試此法。一家五十餘口俱染病。唯四人曾者不染。代代無病。當家內外井皆悉著藥。辟溫氣也。忌豬肉生葱桃李雀肉等。

辟溫粉

芎　朮　白芷　藁本　荅陵香 等分。

爲末。每嘗兩半入英粉肆兩和勻。常撲身上。無英粉蚌粉亦可。凡出汗大多。欲止汗。宜此法。入溫家令不相染。研雄黃并囓法。

水研光明雄黃以筆濃塗鼻竅中。則疫氣不能入。與病人同床。亦不相染。五更初洗面後。及臨時點之。凡溫疫之家。自生臭穢之氣。人聞其氣。即時以紙筋探鼻中。噓之爲佳。不爾。邪氣入上元宮。遂散百脈而成斯病也。以雄黃點之。則自不聞其氣。并辟諸惡怪夢。神良。

常以雞鳴時。存心念四海神名三七遍。辟百邪惡鬼。令人不病溫。

東海神阿明。　南海神祝融。
西海神巨乘。　北海神禺強。

每入病人室。存心念三遍。口勿誦。

古今名賢傳。許季山所撰千敷散。辟溫疫惡疾。不相染着。

附子 一個。炮去皮臍 細辛 乾薑 麻子 柏實 各壹分。

細末。和入柏實麻子令勻。酒服方寸匕。服一日。十年不病。二日二十年不病。三日三十年不病。受師法保應。三日服之。歲多疫則預服之。不飲酒。井花水服。亦得。忌豬肉生菜。

辟溫殺鬼丸。治百鬼惡氣。

雄黃 雌黃 各壹兩。　羖羊角 虎頭骨 各燒兩。
龍骨 鼈甲 陵鯉甲 蜚蝠皮 各壹兩。
柯鷄 拾伍枚。無。以覺青五枚代。　空青 一兩。無。以石綠代。　川芎
眞朱砂 各伍兩。　東門上鷄頭 壹枚。

細末。以鰕鬚拾兩。併丸鷄頭大。正旦門前燒壹丸。男左女右。臂上帶一丸。辟百鬼獨弔喪。周死。吞下壹丸。小豆大。天陰大霧燒壹丸。於門牖前極佳。

務成子益火丸。主辟疾病惡氣。百鬼虎狼。蛇虺蜂蠆諸毒。

五兵白刃。盜賊凶害者。冠軍將軍武威太守劉子南從尹公受得此方。永平十二年於隣界交戰。敗績。士卒掠藍子南被圍。矢如雨。未至子南馬數尺。輒墮地。牆以爲神人。各解圍而去。子南以方教子及諸兄弟。爲將者。皆未皆被傷。累世祕之。澳末。青牛道士得之。以傳安定皇甫隆。隆傳魏武帝。乃有人得之。故一名冠軍丸。一名武威丸。曾試此法。一家五十餘口俱染病。唯四人曾者不染。

務成子益火丸。主辟疾病惡氣。百鬼虎狼。蛇虺蜂蠆諸毒。

五兵白刃。盜賊凶害者。冠軍將軍武威太守劉子南從尹公受得此方。永平十二年於隣界交戰。敗績。士卒掠藍子南被圍。矢如雨。未至子南馬數尺矣。輒墮地。牆以爲神人。各解圍而去。子南以方教子及諸兄弟。爲將者。皆未皆被傷。累世祕之。澳末。青牛道士得之。以傳安定皇甫隆。隆傳魏武帝。乃有人得之。故一名冠軍丸。一名武威丸。曾試此法。一家五十餘口俱染病。唯四人曾者不染。

蛩火 各玖顆。　鬼箭 鵰取皮羽。　蒺藜 各壹兩。　雄黃 雌黃
鑿石 各玖顆。　羖羊角　鍛竈灰　鐵鍾柄 入雞鳴燒赤。各壹兩半。

爲末。以鷄子黃丹雄鷄冠一具和之。如杏子大。作三角絳囊盛。住丸帶左辟。若從軍。緊腰下勿離身。若在家。掛戶之上。辟絕賊盜溫疫神良。

劉根別傳曰。潁川太守到官。民大疫。掾吏死者過半。夫人郎君悉病。府君從根求消除疫氣之術。根曰。寅歲泄氣在亥。今年太歲在寅。於聽事之亥地。穿地深奏尺。與深同。取沙奏斛着中。以淳酒奏升沃其上。府君從之。病者即愈。疫氣遂絕。於聽事取太歲六合之地也。

青筋牽證

春三月青筋牽證。其源自少陰。少陽從少陰而涉足少陽。少陽之氣始發。少陰之氣始衰。陰陽愧繆於腠裏皮毛之間。因生表裏之病。因從足少陽發動。反少陰。則藏府受病而生其病。

肝府藏陰陽毒氣病。頸背雙筋牽急。先寒後熱。其病相反。若府虛爲陰邪所傷者。則腰強急。脚細不伸。府中欲折。眼中生花。此法主之。不可作表証。

576

柴胡地黃湯

柴胡貳兩半　生地黃伍合半　香豉伍合
桂枝半兩　大青　白朮
咬咀。水七升煎三升。去滓。下芒硝溫飲一盞。日三四服。未差再作。

肝府藏陰陽溫毒病。頸背拳急。先寒後熱。其病相反。若藏實則爲陽毒所損。跟黃。頸背強直。若欲轉動。卽合白虎湯。不可作發散。

石膏竹葉湯

淡竹葉貳升　梔子人　黃芩
細辛　玄參各半兩　石膏肆兩
咬咀。水陸升。先下竹葉車前草煮肆升。去滓。下諸藥煮二升。去滓。下芒硝化勻。溫飲一盞。

赤脈搜證

夏三月行赤脈搜病。其源自少陰太陽。
心府藏陰陽溫毒氣。身熱。皮肉痛起。其病相反。若藏實則爲陽毒所侵。口乾舌破。而咽塞。若府虛則爲陰邪所傷。戰掉不定。而驚動。不可作發散。石膏地黃湯。

石膏　生葛根各肆兩　麻黃貳兩
知母半兩　梔子人　大靑
芒硝各壹兩半　濕地黃半升
咬咀。水九升。取四升。去滓。下芒硝烊化勻。溫飲一盞。日三四服。

黃肉隨證

四季月終。餘十八日行黃肉隨病。其源從太陰陽明相格。節氣相移。三焦壅濕不調。四時閉格而起。則藏府之病。隨時而受。陽氣外泄。陰氣內伏。
脾府藏溫毒病。陰陽毒氣。頭重項直。皮肉強。其病相反。藏實則陽疫所傷。鬱而結核。起於頸下。布熱毒於分肉之中。上散入發際。下貫顳顬。隱隱而熱。不相斷離。不可作發散。玄參寒水石湯。

羚羊角屑　大靑各壹兩　升麻
玄參肆兩　寒水石貳兩半　梔子人貳兩半
咬咀。水七升。煎至三升。去滓。下芒消烊化勻。溫飲一盞。日三四服。

扁鵲云。炙肝脾二臟。王治四時隨病。

白氣鯉證

秋三月行白氣鯉病。其源從太陽繫于太陰。太陰受淫邪之氣。則經絡壅滯。毛皮堅豎。發泄邪氣。則藏府傷。隨狀受病。
肺府藏溫病。陰陽毒氣。其病相反。若府虛則陰邪所傷。乍寒乍熱。損肺傷氣。暴嗽喘逆。不可作發散。宜石膏杏仁湯。

石膏肆兩　杏人　前胡各貳兩半　甘草壹兩　梔子人
麻黃　紫菀　桂枝　大靑　玄參
咬咀。水玖升。煎四升。溫飲一盞。日三四服。

肺府藏溫病。陰陽毒氣。其病相反。若藏實則爲陽毒所損。憒熱生班。氣喘引飲。不可作發散。宜石膏葱白湯。

梔子人　升麻　大靑　芒硝各壹兩半　葛根各壹兩半
豉半升　葱白連鬚貳兩　石膏
咬咀。水八升。煎三升半。去滓。下芒硝烊化勻。溫飲一盞。日三四服。

黑骨溫證

冬三月行黑骨溫病。其源從太陽少陰。相搏蘊積。三焦上下壅塞。陰毒內行。藏府受客邪之氣。則病生矣。
腎府藏溫病。陰陽毒氣。其病相反。若藏實陽毒所損。胸脇切痛。頰如刀刺。心腹彭脹。服冷藥差過而便閉泄。不可作發散。苦參石膏湯。

苦參　生葛根各貳兩　石膏　濕地黃各肆兩　梔子人
茵蔯　芒硝各壹兩半　香豉　葱白各半升
咬咀。水八升。煎三升半。去滓。下芒硝烊化勻。溫飲一盞。日三四服。

扁鵲云。炙脾肝腎三臟。治丹毒黑骨溫之病。
知母解肌湯。瘟溫熱病。頭痛。骨肉煩疼。口燥心悶。或是夏月天行毒。外寒內熱者。或熱病自得。利有虛熱煩渴者。

麻黃　甘草各壹兩　知母　葛根各壹兩半　石膏叁兩
咬咀。水三升。煎一升。去滓。溫飲一盞。若已下及自得利下。虛熱未除者。除麻黃加葛根成三兩。病常自汗者。亦如此法加葛根。無汗而難得汗者。加麻黃成一兩半。因鼻泄者。除麻黃加白薇人參各一兩。加水四升。煎至一升半。

溫病嘔方論

伏熱在胃。令人胸滿氣逆。逆則嘔。若大下後。胃中虛冷。亦致嘔也。

溫病有熱飲水暴冷腕茅根葛根湯

茅根　葛根　各半升

水四升煮二升去滓溫飲一盞

溫病熱未除重被暴寒寒毒入胃蘊結不散變腕梓皮飲子

單煮梓皮汁稍稍飲之佳

溫病稍飲冷冷結胃中熱入腎中變壯熱大腕者服梓皮湯夫腎中有熱者病差後足心皮喜剝脫去頭髮悉落是其證也

溫病胃冷變腕茅根橘皮湯

白茅根　半升　橘皮　盞兩半　桂枝　葛根　各盞兩

咬咀水三升煎去半去滓溫飲一盞腕止停後服微有熱減桂半兩微有熱宜去桂加生薑二兩

溫病有熱飲水暴冷腕枇杷茅根湯

枇杷葉　茅根　各半升

水四升煮去半去滓稍熱飲之一二盞已上四方皆不可作發散

溫病者此熱入腎腎藏惡燥熱盛則腎燥腎燥故渴引飲而自救也

蓌蕘湯療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛咽乾舌強胸中痛心胸痞滿腰背強

蓌蕘　白薇　麻黃　獨活　甘草　青木香　葛根　各盞兩　石膏　雞子兩半

大杏人　生　苦酒

咬咀水五升煎二升半去滓飲一盞通口服之取汗若一盞一熱者加朴消半兩大黃壹兩半朴消末後下

病人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風溫四肢不收頭痛身熱常自汗出不解治在少陰厥陰少陽厥陰不可發汗汗出則譫語內煩躁不得臥善驚目光無精治之復發其汗如此者醫殺之耳

風溫之爲病脈陰陽俱浮汗出體重其息必喘喘喘但欲呿下之則小便難發汗則譫語加溫針則耳聾難言但吐下之則遺尿宜蓌蕘湯方在溫病統方論中因發汗後身體不惡寒而反惡熱無下證者名曰風溫知母石膏湯

知母　壹兩　石膏　雞子兩半　葛根　蓌蕘　各壹分　甘草　升麻　人參　杏人　芫活　防風　各半兩

咬咀水三升煎一升半去滓溫飲一盞通口與之取汗

病人素傷於寒因復傷於寒變成溫瘧寒多熱少者華佗赤散主之在瘧後治法中

寒熱相半者丹砂丸雞子治間日

丹砂　人參　各壹兩　附子　壹錢半兩

細末蜜丸梧桐子煎竹葉湯吞下二三十丸發前三服中病則吐或身智智麻木米中病加至四十丸間日發前如法服中病卽止

溫瘧內熱甚昏昏嘿嘿者麥奴丸主之方在可汗門中

溫瘧其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時嘔白虎加桂枝湯

石膏　壹兩　知母　壹兩半　甘草　半兩　粳米　壹合半　桂枝　叁分

瓜蒂貳拾箇水壹升煎去半頓服之

黃疸目黃不除瓜丁散

瓜丁細末

含水香豆許深入鼻中黃水出盡爲度

孫眞人曰凡遇天行熱病多內熱卷黃但用瓜丁散內鼻中黃水出乃愈卽於後不復患病黃矣常須用心警候病人四支身面微似有黃氣卽速行瓜丁散不可令散漫失候必大危矣特忌酒麵色欲犯者死

黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑瘴大便必黑腹脹脹滿如水狀大便黑溏者此女勞之病非水也腹滿者難療消石礬石散

消石　礬石

等分搗篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣被取汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云消石二分熬令燥礬石一分熬令燥故注之

傷寒感異氣成溫病壞候幷癍證

病人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風溫四肢不收頭痛身熱常自汗出不解治在少陰厥陰少陽厥陰不可發汗汗出則譫語內煩躁不得臥善驚目光無精治之復發其汗如此者醫殺之耳

風溫之爲病脈陰陽俱浮汗出體重其息必喘喘喘但欲呿下之則小便難發汗則譫語加溫針則耳聾難言但吐下之則遺尿宜蓌蕘湯方在溫病統方論中因發汗後身體不惡寒而反惡熱無下證者名曰風溫知

母石膏湯

知母　壹兩　石膏　雞子兩半　葛根　蓌蕘　各壹分　甘草　升麻　人參　杏人　芫活　防風　各半兩

咬咀水三升煎一升半去滓溫飲一盞通口與之取汗

病人素傷於寒因復傷於寒變成溫瘧寒多熱少者華佗赤散主之在瘧後治法中

寒熱相半者丹砂丸雞子治間日

丹砂　人參　各壹兩　附子　壹錢半兩

細末蜜丸梧桐子煎竹葉湯吞下二三十丸發前三服中病則吐或身智智麻木米中病加至四十丸間日發前如法服中病卽止

溫瘧內熱甚昏昏嘿嘿者麥奴丸主之方在可汗門中

溫瘧其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時嘔白虎加桂枝湯

石膏　壹兩　知母　壹兩半　甘草　半兩　粳米　壹合半　桂枝　叁分

又方

二味煎令凝滑盡研絞去滓分二服病從小便去有人再病胃中乾糞下便差

咬咀。水三升。煮米熟。去米。下藥。取一升半。溫飲一盞。

溫瘧之為病。先熱後寒。

病人嘗傷於濕。因而中暍。濕熱相搏。則發濕溫。病苦兩脛逆冷。腹滿。又胸頭目痛。苦妄言。治在少陰。不可發汗。汗出則不能言。耳聾。不知痛所在。身青而色變。名曰重暍。如此者。醫殺之耳。

濕溫。濕溫多汗。妄言煩渴。石膏甘草散。

石膏　甘草（等分）

細末。漿水調下二錢匕。日三服。

醫曰。愚醫昧於冷熱之脈。見足脛冷。多行四逆。如此醫殺者。不可勝計。濕溫脈小緊。有如傷寒脈。但證候有異。數進白虎。則脛白溫而差也。

病人素傷於熱。因復傷於熱。變為溫毒。溫毒為病最重也。

本太陽病不解。轉入少陽。小柴胡證罷。此為壞證。知犯何逆。以法治之。

寸口脈洪而大。數而滑。洪大榮氣長。數滑胃氣實。榮長即陽盛。怫鬱不得出。胃實即穀難。大便苦乾燥。三焦閉塞。津液不通。醫復發汗。令陽氣盛不周。復重下之。大便遂祕。小便不利。榮衛如搏。五心煩熱。兩目如火。鼻乾而赤。舌燥齒黃。而大渴。過經成壞病。（瘧氏亦載此一條。今列入證中。經手神效方附。）

三黃石膏湯　治如前證。

石膏（搗碎）　黃連　黃蘗　香豉（貳合半）　梔子（五箇）　麻黃（叁分）

咬咀。水三升。煎取一升。分三服。未中病。再一劑。其效如神。

傷寒八九日不差。名曰敗傷寒。諸藥不能治者。醫甲屋角湯。

醫甲　升麻　柴胡　烏梅肉　枳實　犀角屑

黃芩（各半兩）　甘草（壹分）　生地黃（貳合半）

咬咀。水三升。煎一升半。分五服。日三夜二。

敗傷寒頭痛骨肉痛。荒言妄語。醫所不能療者。用前黑奴丸主之。方在雜治中。

醫曰。有人患時氣。經六七日。因發狂。遂眼瞪不瞬。手執腦血。口禁或有張口者。冥冥不知人事。口鼻氣絕。但心頭溫。面色和。六脈皆動。一如尸厥。如此不省五六日。因作成敗計。救用風引湯加附子。嚥下兩服。遂省。風引加附子湯。

寒水石　石膏　赤石脂　白石脂　滑石（各壹鎰）　附子（壹箇）　龍骨　大黃

甘草　牡蠣粉（各貳鎰）　桂枝（叁鎰）

麤末。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓。溫飲之。

小兒傷寒證

小兒傷寒發熱。自汗多啼。葛根芍藥湯。

敗壞別行方

天行病經七日已上。熱勢彌固。大便祕澁。心腹痞滿。食飲不下。精神昏亂恍惚。狂言異語。其脈沉細。乘狀

之中。撫一可救。決計附子醫甲湯。（不可作煎散。）

醫甲　白薇皮　茵蔯（各半兩）　細辛

吳茱萸　附子　枳實（各壹分）　大黃（叁分）

咬咀。水三升。煮一升。溫作三服。

傷寒將理失節。服冷藥太多。伏熱在藏。手足厥逆。爪甲稍青。恐陽氣漸衰。成陰寒氣。即瞬之間。變入狐惑。血色斑斑如錦紋。木通甘枝湯。

木通　桂枝（各壹兩）　吳茱萸　細辛（各壹分）

甘草（半兩）　薤白（壹把）　粳（玖錢）

咬咀。水二升半。煎一升二合。去滓。溫作四服。

傷寒三七日至四七日。勞病不瘥。熱毒不止。乍熱乍寒。乍差乍發。動作如瘧。醫甲板山湯。

醫甲　牛膝（各壹分）　大青

石膏（貳兩）　烏梅肉　甘草（各壹分）　豉

生麥門冬　生地黃（各貳合半）

咬咀。水五升。煎二升半。溫飲一盞。

牡丹（各半兩）

紫石英

乾薑（各肆錢）

葛根（三分）　芍藥　甘草　黃芩　桂枝（各半兩）

一一六

爲末。每服三錢。水一盞。煎六分。去滓。溫溫作二服。相次與之。熱盛者。去桂加升麻半兩。無汗者。加麻黃一兩。喘者。加杏子半兩。

朏曰。小兒傷寒。始因壯熱不除。被湯丸下後。其項強眼黃。舌苔搐。如發痙狀。久則咽氣。啼聲不出。醫以爲慓風。服朱砂、水銀、牛黃、蚱粉、巴豆、竹瀝之類。藥皆無驗。此由誤下後。邪氣結在心胸。內熱生涎。涎裹諸藥。不能宣行所致也。湯涎散。

粉霜（三錢）　腻粉（一錢匕）　芫花（三分）

細末。煖漿水調下一豉半。病勢大者再服。白色者底者。粉霜也。宜蜜噉之。良久得睡。取下黑黃涎裹包丹砂之類。皆成頑塊。啼聲便出。立安。

朏曰。小兒結胸。亦如前狀。但啼聲出。醫亦多作慓風治之。其脈浮滑。試以指按心下。則痛而啼。宜半夏黃連栝樓湯。斟酌服。當下黃涎便差。（方在結胸門中。）

小兒傷寒。蒸起風熱。發痙。手足搐搦不省。蛇皮湯。

麻黃　大黃　牡蠣　黃芩（各一兩）　寒水石

白石脂　赤石脂　石膏　滑石（各一兩）　蒙石英

人參　桂枝　龍齒（各一兩）

爲末。每服一錢。水一盞半。煎七分。溫分二服。熱多者。進三服。以水井竹瀝中半煎。尤佳。

小兒傷寒後。胃中有熱。煩渴不食。至日晚潮熱。頰赤躁亂。嘔吐。蘆根湯。

生蘆根　生茅根　赤茯苓　甘草（各一兩）　生薑（各五分）　小麥

細到。水一升二合。煎六合。去滓。分三服。立効。

小兒傷寒。欬嗽。胸滿痰壅。喉中呀呷聲。射干湯。

射干　麻黃　紫菀　桂心　半夏（各半兩）

爲末。每服三錢。水一盞半。生薑汁少許。煎六分。去滓。入蜜半匕。拌化勻。溫作二服。

又方。甜葶藶湯。

甜葶藶（炒）　杏人（炒）　麻黃（各等分）

爲末。每二錢。水一盞。煎五分。溫溫分減服。

小兒傷寒後。盜汗。體熱咽乾。犀角黃耆湯。

犀角屑　茯神　麥門冬　黃耆　人參（各半兩）　甘草（一錢分）

傷寒總病論卷六

偽寒雜方　妊娠雜方
傷寒暑病（通用劑法）　傷寒死生候
熱病死生候　温病死生候
天行差後禁忌　解仲景脈說
解華佗內外實說　辨論
與有位辨傷寒論書
總論晉訓　脩治藥法

傷寒雜方

冬夏傷寒。發汗極効。時雨散。（冬用夏初行之。大效。）

青龍（一錢匕）　甘草　麻黃（各貳兩）　豬牙皂角（一挺）

爲末。每服二錢。水一盞。煎三兩沸。和滓溫服。蓋被取汗出。立効。但是時行疫。皆宜服此。可多合以拯貧民。

傷寒頭痛玄精石方

石膏　太陰玄精石各壹兩　麻黃貳兩　甘草半兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞，竹葉二七片，煎七分，去滓，溫飲，不計時候。

傷寒頭痛不止，瓜蒂牙硝散

藜蘆壹錢　瓜蒂壹錢　牙硝貳錢　腦麝各少許

細末，吹少許入鼻，得嚏則愈。

時氣八九日，喘悶煩躁，麻黃杏子湯

桔梗　麥門冬各壹兩　麻黃半兩　杏人　黃芩　甘草各壹分

右㕮咀，每五錢，水一盞半，煎八分，溫溫日三四服。

時氣腦熱，頭疼不止，朴消散

川朴消研，生油調塗頂上。

時氣豌豆瘡出不快，心神煩悶，犀角五香湯

犀角屑　丁香　乳香　木香各半兩　玄參　升麻各壹兩　麝香壹分

右㕮咀，每五錢，水一盞，竹瀝半盞，煎八分，溫溫日三四服。

妊娠雜方

妊娠時氣，令子不落，伏龍肝散

伏龍肝爲末，水調塗臍下，乾時易之，疾差乃止。

妊娠傷寒內熱極甚，令不傷胎，含鷄子法

取鷄子，以絹袋貯，投井底，浸令極冷，旋破吞六七枚，佳。

妊娠傷寒腹脹，大便不通，喘急，牽牛散

大黃　檳榔各壹兩　甘草壹分　牽牛子貳兩，取末貳兩

細末，不計時，蜜湯調下二錢，以利爲度。

妊娠傷寒，服汗下諸藥，熱已退，覺氣虛不和，宜與此藥安胎，黃者人參湯

黃芩　人參　半夏　陳橘皮　麥門冬　當歸　赤茯苓各半兩

右㕮咀，每服四錢，水二盞，薑三片，煎七分，去滓，下阿膠末一小七，烊化，溫與之，日可三四服。

大熱甚，胎不安者，不宜前藥，宜用阿膠散。

阿膠末一錢半，竹瀝調下，無竹瀝，用小麥竹葉煎湯調下。

妊娠傷寒四五日已上，心腹脹滿不止，腰痛重，橘皮枳實湯。

枳實　麥門冬各壹分　陳橘皮壹兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑四片，煎八分，去滓，溫服。

妊娠熱病，胎死腹中，鹿角屑湯

鹿角屑一兩

水一椀，蔥白五莖，破，半合，煎，隔分，去滓，溫作二服。

又方，益母草飲子

益母草絞汁，飲半升，卽出。

治傷寒小產，惡露不行，腹脹煩悶欲死，大黃桃人湯

朴消　大黃

二味，等分，末之，每一錢或二錢，桃人去雙人皮尖，碎之，澱煎湯調下，以通爲度，日三服。

小產後，其惡露被熱蒸，斷不行，地黃飲子

地黃汁　藕汁各壹椀　生薑汁一盞

令和，煖溫，分三四服，微有寒，煎二十沸服之，亦下死胎。

傷寒產後，血運欲絕，紅花散

紅花　荷葉　薑黃等分

末之，炒生薑小便調下二錢。

凡傷寒小產，夏月宜少用醋炭，多有煩悶運死者。

傷寒產後，惡血衝心，悶亂口乾，生薑小便飲子

生地黃汁　藕汁　小便各一盞

和勻，煎三兩沸，溫熱分作三服。

傷寒產後，惡露爲熱搏不下，煩悶眼喘，狂言者，抵黨湯，及桃人承氣湯主之。二方在可下門中。

傷寒小產後，煩悶，大躁渴，石膏

黃連　黃芩　甘草　括樓根各壹兩　石膏半兩

末，每服四錢，水一盞半，煎八分，溫服一盞。

傷寒暑病通用刺法

龐曰，凡過經不解，讝語者，當刺期門，隨其實而瀉之，刺期門之法，須待脈弦或浮緊，刺之必愈，餘刺之不差，以正取肝之邪故也，期門穴直乳下，當腹傍近脇骨，是穴針入一寸。

傷寒發熱，晝晝惡寒，其人大渴飲水者，其腹必滿，小便不利，而自汗出，其病欲解，此爲肝乘肺，名曰縱，當

刺期門。

腹滿譫語。寸口脈浮而緊。此爲肝乘脾。名曰横。當刺期門。

下血而譫語。此爲熱入血室。但額上汗出者。當刺期門。隨其實而瀉之。濈然汗出者愈。

婦人中風。發熱惡寒。其經水適來。得七八日。熱除。脈遲。身涼。胸脇下滿。如結胸狀。而譫語。此爲熱入血室。當刺期門。隨其實者而取之。

太陽與少陽併病。頭痛或眩時。如結胸。心下必堅。當刺瀉肺俞。大杼。愼不可發汗。發汗則譫語。譫語則脈弦。五日譫語不止。當刺期門。

傷寒喉痺。刺手少陰。腕骨小指後動脈是也。刺入三分補之。（作通里二穴。去腕後一寸。是手少陰之經。主熱病喉痺。淺入三分。可灸三壯。）

傷寒脈浮緊。不發汗。因衄。此爲逆也。刺入三分補之。

傷寒厥而嘔。腹滿。不得小便。膝以下腫。如水氣狀。懷孕七月。太陰當養。此心氣實。當刺瀉勞宮及關元。小便利即愈。（勞宮手掌中央。屈名指取之。關元在臍下三寸。）

傷寒飲水過多。腹脹氣喘。刺中脘。（巨闕下三寸。）

熱病得汗身冷。脈欲絕。其人已安靜。但昏沉喜睡。急與四逆湯。令手足温。

傷寒汗不出。作強。喉閉煩滿。針大杼。（大杼穴在第一椎下兩傍。相去各一寸五分。針入一寸。瀉之。）

熱病陽進陰退。頭獨汗出。死。陰進陽退。膝以下至足有汗出。亦死。陰陽俱退。汗出已。寒慄不止。口鼻氣冷。亦死。

傷寒餘熱不盡。皮膚乾燥。針曲池。（在曲肘橫紋頭。可屈下。瀉之。）

熱病所謂併陰者。熱病已得汗。因得泄。是謂併陰。故治。熱病所謂併陽者。熱病汗出。脈反順。可汗者。取之鳥際。太淵。太都。太白。瀉之則熱去。補之則汗出。太甚者。取踝上横紋以止之。（鳥際在大指本節後。內側散脈中。太淵在掌後鋭中。太都在足大指本節後陷中。太白在足內側核骨下陷中。踝上橫紋。不設穴名。當是內踝上二寸。名曰腹溜。主骨寒熱汗注不休故也。）

熱病七八日。脈口動喘而脫者。急刺之。汗且自出。淺刺手大指間。（合谷穴是也。）

熱病先胸脇痛。手足躁。刺足少陽。補足太陰。（據脇痛寒熱是土敗木賊也。是足少陽木受邪。當傳於脾土。故宜瀉足少陽之正經。而補足太陰之太白。諺曰云。補足太陰者是也。其金元起太素。作手太陰而以脇痛。從肺出腋下。故刺脇痛耳。不得索之於金。而以手太陰爲是。既言不得索之於金矣。而復求金乎。是必不然也。既瀉於木。理不合更補於金。若補於金。則木反受賊矣。故當補脾土無疑。）

熱病先手臂痛。刺手陽明太陰汗出止。（太陰諸列缺穴在腕上二寸半。刺七分。陽明商陽穴在手大指次指端。去甲如韭葉。刺三分。）

熱病始於頭首者。刺項太陽而汗出止。（天柱穴在項後髮際。大筋外廉陷中。可刺五分。瀉之。）

熱病先眩冒而熱。胸脇滿。刺足少陰少陽。（足少陰涌泉穴。在兩脚心陷。屈足口指宛宛中。刺入七分。瀉之。無令血出。足少陽俠谿穴。在小指次指之間。本節後陷中。針入五分。瀉之。）

熱病七八日。脈不躁不數而喘。後三日有汗。三日不汗。四日死。未曾汗。勿刺。

熱病身面發黃。面脇心熱。口乾。舌卷。焦黃黑。身麻而臭。伏毒傷肺。中脾者死。

熱病煩悶狂言。不得汗。瘥瘥不止。伏毒傷肝。中膽者死。

熱病汗不出。出不至足。嘔膿吐血。善驚。不得臥。伏毒在膽。足少陽者死。

溫病死生候

傷寒下利。厥逆煩躁。不得臥者死。

傷寒厥逆六七日。發熱而利者生。汗出利不止者死。但有陰無陽故也。

傷寒欲逆上氣。其脈散者死。謂形損故也。

夫病者寅則譫語。盧則鄭聲。（鄭聲是重複譫語。喘滿者死。下利者亦死。）

傷寒脈陰陽俱緊。口中氣出。唇口乾燥。勃臥足冷。鼻中涕出。舌上胎滑。勿妄治也。

傷寒脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。此爲命絕也。又宋知何藏。先受其災。

若汗出髮潤。喘而不休。此爲肺先絕也。陽反獨留。形體如煙熏。直視搖頭。此爲心先絕也。脣吻反青。四肢槩習者。此爲肝先絕也。瘈口利里。黑柔汗發黃。此爲脾先絕也。溲便遺失。狂言目反直視者。此爲腎先絕也。

傷寒脈順。四時夜半得病。日中解。日中得病。夜半解。更不傳也。

熱病死生候

熱病陰陽交者。熱煩身燥。太陰寸口脈浮衝尺躁盛。是陰陽交。死。得脈靜者生。

熱病得汗。身冷。脈欲絕。其人已安靜。但昏沉喜睡。急與四逆湯。令手足温。不爾。熱窠而卒。

熱病陽進陰退。頭獨汗出。死。陰進陽退。膝以下至足有汗出。亦死。陰陽俱退。汗出已。熱如故。亦死。陰陽俱退汗出已。寒慄不止。口鼻氣冷。亦死。

熱病所謂併陰者。熱病已得汗。脈尚躁盛。大熱汗出。雖不汗。身和而潤。是謂併陽。故治。

熱病不知痛所在。不能自收。口乾渴熱甚。陰頭有寒者。熱在骨髓。死。不治。

病若譫語妄言。身當有熱。而反四逆。脈沉細者死。

熱病在腎。令人渴。口乾。舌焦黃赤。晝夜引飲不止。腹大而脹。尚不脈欲。目無精光。死。不治。

熱病所謂陽附陰者。膝以下至足熱。膝以上寒。陰氣下爭而還。心腹滿者死。

熱病所謂陰附陽者。膝以上至頭熱。膝以下寒。陽氣上爭而還。得汗者。口熱病得汗。脈誠躁。身和而赤。此爲榮未交。待時自已。肝病待甲乙之例。（榮未交日。今且發汗。待時而已。）

熱病七八日。脈微小。病者漐血。口中乾。一日半死。代脈日死。

熱病七八日。脈不躁不數而喘。後三日有汗。三日不汗。四日死。未曾汗。勿刺。

熱病身面發黃。面脇心熱。口乾。舌卷。焦黃黑。身麻而臭。伏毒傷肺。中脾者死。

熱病煩悶狂言。不得汗。瘥瘥不止。伏毒傷肝。中膽者死。

熱病汗不出。出不至足。嘔膿吐血。善驚。不得臥。伏毒在膽。足少陽者死。

溫病死生候

溫病汗出。飢復熱。而脈躁疾。不爲汗。汗衰狂言。不能食。病名曰陰陽交。見三死而未見一生。（寅申巳亥。辰戌丑未。）

（半有此證。）溫病得病便短息微悶。神識惺惺。脈尺寸反者死。（于午卯酉年有此證。）

凡溫病人三二日身熱脈疾。頭痛食飲如故。脈直疾八日死。四五日頭痛脈疾。喜吐。脈來細。十二日死。此病不瘥。八九日脈不疾。身不痛。且不赤。色不變而反利。脈來牒牒。按不彈手指。時時大。心下硬。十七日死。（心下不硬者生。）天行差後禁忌。

飲酒合陰陽復病必死。生鱠炙酒。韭菹鱉蓴豆粉。犬羊肉。腸血生菜油肥之類。食之皆發熱。黃。下利不止。救諸勞動皆致更。尚可治。女勞多死。

解仲景脈說

脈曰。動脈見於關上。下無頭尾。厥厥動搖。名曰動也。陽動則汗出。陰動則發熱。關位占六分。前三分爲陽。後三分爲陰。若當陽逆寸動而陰靜。法當有汗而解。素問云。尺處爲熱中。若大汗後。形冷惡寒者。三焦傷也。此是死證。脈按之虛軟。戰汗而解。脈按之有力。熱紫問云。尺處爲熱中。若大汗後。形冷惡寒者。三焦傷也。此是死證。脈按之虛軟。戰汗而解。脈按之有力。躁汗而解。脈虛微。必經汗吐下。無津液作汗。陰陽自衛愈。病未半而湯劑已竭。鄙心也。之自顯抄撮斟酌。積三十餘年。稍習其事。故敢裁減升兩。庶從俗而便於行用。或一方而取半劑。或三分取一。或四分取一。或五分取一。或增其水。有可以作煮散者。有病勢重專用湯攻者。或云古升秤省三升准今之一升。三兩准今之一兩。斯又不然。且營衛氏云。附子一枚准半兩。又云以壹當升。以分當兩。是古之升秤。與今相同。許人減用爾。今之爲醫者多是愚俗。苟且衣食。貴官貴賄。大方既論何以該通。唯密密鄙淺方技。使人不窺其隙。以自矜奧。鮮有多聞博識者。雖時有之士大夫。咸鄙其爲術。自非不加流俗。以拯濟爲心。則不能留神焉。今解釋前言。詳正脫誤。擇其簡論。刪其繁方。仍增入新意。不敢穿鑿。冀新學易見。覽斯文已得其七八矣。此方皆古聖賢撰用。其效如神。更不一一具姓名載其所出。其間自有所見。經手得驗者。其編成卷。在識者覽而知焉。

上蘇子瞻論傷寒論書

安時所撰傷寒解實用心三十餘年。廣尋諸家。反覆參合。決其可行者。始敢編次。從來評脈辨證。處對湯液。頗知實效。不敢輕易謬妄。誤人性命。四種溫病。敗壞之候。自王叔和後。鮮有明然詳辨者。故醫家一例作傷寒行汗下。傷寒有金木水火四種。有可汗可下之理。或與異氣。復變四種溫病。溫病若作傷寒行汗下。必死。傷寒汗下尚或錯謬。又況味於溫病乎。天下枉死者過半。信不虛矣。國家考正醫書。無不詳備。雖此者多矣。盛寒之時云井水。當服以涼藥而成吐利。腹痛者多矣。此皆愚俗人妄傳。以爲實理。往往橫天而自然詳明。不假諂庸粗。甘就橫天者也。設有問孫真人云。今時日月短促。藥力輕虛。人多巧詐。感病厚重。用藥即多。又云加意重複用藥。乃有力。自孫真人至今。相去遙遠。藥反太輕。省何也。安時妄意。出遭安史之亂。藩鎮跋扈。追至五代。四方藥石。鮮有交通。故醫家少用湯液。多行煮散。又近世之人。嗜欲益深。天行

外實。延內實。故治之宜殊。即各與藥。明早並起。某深疑陳壽誤用內外字。華佗本意也。病者頸痛。身熱惡寒。爲陰邪外實。法當發汗。病者頭疼身熱。但蒸蒸發熱。不惡寒。爲陽邪內實也。法當下之。所謂外實者。外爲陽。爲表也。陽氣爲寒所折。爭於表間。陽衰而陰勝。故發熱。復有惡寒之證。可以汗而發之。以復陽氣也。所謂內實者。內爲陰。爲裏也。極陰變陽。寒甚生熱。陽氣反勝而入裏。故胃腑內實。蒸蒸作熱。不惡寒。可以泄利以複陰氣。言實者。非正實。乃邪實也。素問云。邪氣盛則實。所以知佗傳內外二字差謬矣。

辨論

近世當行散。古方湯液存而不用。蓋古方升兩大多。或水少湯濁。藥味至厚。殊不知聖人專攻一病。決一兩劑以取驗。其水少者。自是傳寫有舛。非古人本意也。唐自安史之亂。藩鎮跋扈。至於五代。天下兵戈。道路艱難。四方草石。鮮有交通。故醫家省約。以湯爲煮散。至今未甘革弊。古方湯液。實於今世爲無用之書。唐徐氏大和濟要方。減其升兩。雖則從俗。患其太省。故病未半而湯劑已竭。鄙心也。之自顯抄撮斟酌。積三十餘年。稍習其事。故敢裁減升兩。庶從俗而便於行用。或一方而取半劑。或三分取一。或四分取一。或五分取一。或增其水。有可以作煮散者。有病勢重專用湯攻者。或云古升秤省三升准今之一升。三兩准今之一兩。斯又不然。且營衛氏云。附子一枚准半兩。又云以壹當升。以分當兩。是古之升秤。與今相同。許人減用爾。今之爲醫者多是愚俗。苟且衣食。貴官貴賄。大方既論何以該通。唯密密鄙淺方技。使人不窺其隙。以自矜奧。鮮有多聞博識者。雖時有之士大夫。咸鄙其爲術。自非不加流俗。以拯濟爲心。則不能留神焉。今解釋前言。詳正脫誤。擇其簡論。刪其繁方。仍增入新意。不敢穿鑿。冀新學易見。覽斯文已得其七八矣。此方皆古聖賢撰用。其效如神。更不一一具姓名載其所出。其間自有所見。經手得驗者。其編成卷。在識者覽而

災多用藥極費日月愈促地脈愈薄產藥至少何以知之安時常於民家見其遠祖所錄方册上記昔事跡其間有廣順年巴豆每兩千二足故以知藥石不變通也且溫疫之病周官不載班固亦疫豆始自魏晉間氣壅於晉末故以知年代近季天災愈多用藥極費也礬石甘青之類古人治衆病痼瘕大要之藥今王公大人家尚或閟用民間可知矣人疫當是前年每兩千四五百所出州七不絕如帶民家苗種以獲厚利足以知地脈愈薄產藥至少矣湯液之制遭值天下禍亂之久地脈薄產之時天災乘多之世安得不悼惜而爲裁減乎故今世上工治病比之古人及中工者率爽設有問今之升秤與古不同其藥以古之三升準今之一升古之三兩準今之一兩雖然如此長閒來官依此法而用古方者不能自解裁減又如附子一枚準半兩是用一錢三字爲一枚使人疑混如何得從俗乎安時言唐大和年徐氏撰濟要方其引云秤兩與前代不同升合與當時稍異近者重新纂集約舊删脩不惟加減得中實亦分兩不廣又云今所删定六十三篇六百六首勒成六卷於所在郡邑擕建碑牌明錄諸方以備乘要又云時逢聖曆年屬大和便以大和濟要方爲名備錄如左已具奏過淮物頒行此方已遭兵火燔滅安時家收得唐人以朱墨書者紙籍屬爛首足不完難辨徐氏官與名卽不知本朝崇文諸庫有此本否安時謂裁減古方次第復詐減半芍藥湯中載之詳矣陶隱居云古方今人體大小或異斟酌盛藥品分兩古引以明取所服多少配之或一分爲兩或二銖爲兩以盡當升可也若一一分毫較合如古方承氣湯水少藥多何以裁之所以聖惠方煮散盡是古湯液豈一一計較多少治病皆有據驗在調習多者乃敢自斟酌耳設有問暑熱重於溫病者宜行重複方卻多行煮散者何安時謂夏月多自汗腠理易開經云天暑地熱經水沸溢故用煮散或有病勢重者卽於湯證之下注云不可作煮散也如此之類者頗多聊引梗概俗云耕當問奴織當訪婢士大夫雖好此道未必深造宮姬朝鮮者衆吹毛求瑕安不煩金鼎望省寢狂瞽之言千洩

台尉陳昌無地　　某再拜

傷寒論古訓

敍論

太陽證　麤脊強（下居兩切・麤勁硬也・）

陽明證　鞕（並入切・汗出貌・）佛（扶物切・鬱不舒治也・）憤（公對切・氣也・）

悵惕（上・恥律切・悵惘懊惚也・下・他的切・憂也・）

少陰證　沫（亡活切・水浮沫也・）踝（胡瓦切・踝足踝也・）跟（柯墾切・跟切・悸（其季切・心動也・）

厥陰證　蛕（胡誨切・蟲中長蟲也・）

可發汗證　淅（先歷切・淅洗也・）翕（許及切・翕氣也・）

不可發汗證　芤（苦侯切・艸浮實・中央空者・名曰芤・）劓（如倫切・割鼻也・）

可下證　喘（踐兗切・喘息也・日欲明貌・）脯（布胡切・脯申時也・）妄攝（亡活切・三條力質切・攝極虛也・）瘈（於連切・瘈筋急也・）

不可下證　勁（居員切・

結胸證　其人因氣實胸滿結痛者謂之結胸也・
痰飲胸證　其人因水氣流行胸膈間而作痛者謂之痰飲胸也・
寒實結胸證　胸膈間有寒邪結聚而作痛者謂之寒實結胸也・
水結胸證　無大熱但頭微汗出而胸滿痛者謂之水結胸也・
難病證　甘遂半夏甘草芫花之峻劑攻水而水從大小便出者謂之難病也・
濕證　喘發汗則動經身疼重者謂之濕也・
痓濕痛證　痓濕痛者謂之痓濕痛也・
黃疸證　發熱而渴欲飲水小便不利者謂之黃疸也・
衄血證　從鼻孔出血者謂之衄血也・
吐血證　從口出血者謂之吐血也・
便血證　從大便出血者謂之便血也・
尿血證　從小便出血者謂之尿血也・
發斑證　發於皮膚如錦紋者謂之發斑也・
發狂證　發作狂亂者謂之發狂也・
喘證　喘息氣急者謂之喘也・
悸證　心中動悸者謂之悸也・
眩冒證　頭目昏眩者謂之眩冒也・
嘔證　嘔吐者謂之嘔也・
噦證　噦逆者謂之噦也・
小便不利證　小便不利者謂之小便不利也・
小便利證　小便利者謂之小便利也・
淋證　小便淋瀝者謂之淋也・
遺尿證　小便不禁遺尿者謂之遺尿也・
轉筋證　轉筋者謂之轉筋也・
痙病證　痙病者謂之痙病也・
厥證　厥者謂之厥也・
痙濕暍證　痙濕暍者謂之痙濕暍也・
百合病證　百合病者謂之百合病也・
狐惑病證　狐惑病者謂之狐惑病也・
陰陽易病證　陰陽易病者謂之陰陽易病也・
瘧病證　瘧病者謂之瘧病也・
下利證　下利者謂之下利也・
下血證　下血者謂之下血也・
吐膿證　吐膿者謂之吐膿也・
自汗證　自汗者謂之自汗也・
盜汗證　盜汗者謂之盜汗也・
發熱惡寒證　發熱惡寒者謂之發熱惡寒也・
發熱無汗證　發熱無汗者謂之發熱無汗也・
發熱有汗證　發熱有汗者謂之發熱有汗也・
身疼痛證　身疼痛者謂之身疼痛也・
骨節疼痛證　骨節疼痛者謂之骨節疼痛也・
煩躁證　煩躁者謂之煩躁也・
胸痺證　胸痺者謂之胸痺也・
心痛證　心痛者謂之心痛也・
腹滿證　腹滿者謂之腹滿也・
脇痛證　脇痛者謂之脇痛也・
脇下痞硬證　脇下痞硬者謂之脇下痞硬也・
腹痛證　腹痛者謂之腹痛也・
四肢疼痛證　四肢疼痛者謂之四肢疼痛也・
四肢厥逆證　四肢厥逆者謂之四肢厥逆也・
四肢拘急證　四肢拘急者謂之四肢拘急也・
四肢腫證　四肢腫者謂之四肢腫也・
四肢痿證　四肢痿者謂之四肢痿也・
四肢麻痺證　四肢麻痺者謂之四肢麻痺也・
四肢不仁證　四肢不仁者謂之四肢不仁也・
四肢不收證　四肢不收者謂之四肢不收也・
四肢不舉證　四肢不舉者謂之四肢不舉也・
四肢不遂證　四肢不遂者謂之四肢不遂也・
四肢不隨證　四肢不隨者謂之四肢不隨也・
四肢不用證　四肢不用者謂之四肢不用也・
四肢不動證　四肢不動者謂之四肢不動也・
四肢不知痛癢證　四肢不知痛癢者謂之四肢不知痛癢也・
四肢不知寒熱證　四肢不知寒熱者謂之四肢不知寒熱也・
四肢不知冷熱證　四肢不知冷熱者謂之四肢不知冷熱也・
四肢不知輕重證　四肢不知輕重者謂之四肢不知輕重也・
四肢不知痛癢寒熱冷熱輕重證　四肢不知痛癢寒熱冷熱輕重者謂之四肢不知痛癢寒熱冷熱輕重也・

脩治藥法

桂枝湯　桂枝去皮　芍藥　甘草　生薑各切　大棗擘　右五味㕮咀三味以水七升微火煮取三升去滓適寒温服一升服已須臾歠熱稀粥一升以助藥力温覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃至三服若病證不解者此為藥力不足病重者則不在此限也・

桂枝加桂湯　桂枝五兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　右五味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今加桂滿五兩所以加桂者以能泄奔豚氣也・

桂枝去芍藥湯　桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　右四味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之・

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯　桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　蜀漆三兩洗去腥　牡蠣六兩熬　龍骨四兩　右七味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之・

桂枝加附子湯　桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　附子一枚炮去皮破八片　右五味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今加附子將息如前法・

桂枝去桂加茯苓白朮湯　桂枝三兩去皮　茯苓三兩　白朮三兩　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　右五味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今去桂加茯苓白朮湯主之・

桂枝加厚朴杏子湯　桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　厚朴二兩炙去皮　杏仁五十枚去皮尖　右六味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今加厚朴杏子佳・

桂枝加芍藥生薑人參湯　桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙　人參二兩　生薑四兩切　大棗十二枚擘　右六味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今加芍藥生薑人參新加湯・

桂枝加大黃湯　桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　大黃二兩　右六味以水七升煮取三升去滓温服一升本云桂枝湯今加大黃以利為度・

滑石　研。
梔實　去蒂。炒。
烏梅　去核。取肉。
川椒　去目。閉口者。
赤小豆　汲牙。生凌乾。惟狐惑證如此。
石膏　研。
粳米　淘。
瓜丁　即瓜帶也。水之。
梁上塵　篩過。
飴糖　藥鵝方下。
半夏　湯洗七遍。
防風　去蓋。
竹茹　刮淡竹。
五味子　去梗。
茵蔯蒿　去梗。
甘遂　濃煎漿。煨用。
赤皮連珠者。
蓼本　去苗。洗。
藍甲　去裡肉。醋炙令黃色。
水蛭　水浸。去皮。炒。
桃人　去皮尖。炒。研。
慳入諸生用。
龍骨　研。
蘆薈子　隔紙炒研。
貝母　去心。炒。
硫黃　研。
硝石　研。
地黃汁　取自然汗。若用鮮地黃則切。
瀉防已　軟如車輪。
薤莖人　去殼。
猪膚　去脂。切。
柴胡　去苗。
醬歸　去蘆。洗。
黃蘗　刮上麁皮。減漆。減蜜炙。黃紫色。
天門冬　去心。皮。
白朮　去蘆。
杏仁　去皮尖。炒黃。搗碎用不炒。
龍腦　去蘆。
小麥奴　即小麥。秀出焉者。
如無。炒小麥黃代。
淡竹葉　剉。
牡蠣粉　炒。
鼈花　炒。如無。以槐花不炒代之。
李根　白皮。取白皮。削去麁皮。
厚朴　炙。
青黛　研。
旋復花　去梗。
馬兜鈴　細碎。
荊芥穗　去梗。
薤白　切。
薤香　研。
肉豆蔻　煨。
茴香　炒。
桃杷葉　炙。刷去毛。
秦艽　去蘆。
甘菊　須花園中葉者。減。
鄧州白菊亦佳。
生艾汁　細銼。以水搗。研熱艾亦。
大麻人　炒鳴取出。冷地上攤以新磚。增破。
擇去皮。以密佗僧過。擇去殼。
犀角屑　銼。如無。以升麻代之。
蔷薇葉　炒。
生射干　去苗。
鵝砂　研。
草烏頭尖　去黑皮用之。若用烏頭。則皮并尖亦去之。炒焦紫色。惟新芥散用。
白蠟　枯。喚鄧石岡。惟鵝砂散用之。
霜梅上白鹽　無。以白鹽代之。
蘆根　切。
蘆根　去蘆。
生乾地黃　生乾者。
貝齒　燒。研。
獨活　去蘆。
手足指甲　燒存性。
吳朮　去皮。
樗皮　細切。
赤石脂　搗細。
連翹葛白　寸切。
茅根　洗。鋸。
熟艾　炒熱碾末。以竹篩篩過。
丹砂　研。
石蓮肉　炒。
丁香　不焙。
大青葉　去根。壓。
吳藍　用葉。
竹瀝　淡竹二尺長。截兩頭。以墜開火煨。兩頭即竹瀝滴出。以碗盛之。
牡丹皮　去心。
秦皮　鋸。以湯浸。刷洗。中黑色者。真。
苦參　取皮。
蜚蠊　去蘆。炙。
五倍子　去內中蟲。炒。
猪脂　切。
殭蠶　炒。須白直者。而不濕黑者。
硇砂　研。
牙消　生。
焰消　生。
覆瓦矢　瓦尖頭者。
鳥取粉　搗篩取之。
臙脂　炒。
沙參　去蘆。
濃蘆葉　無以山湖子代之。
沉香　不焙。

乳香・研
燈心・切
紅花子・搥碎
菠薐・去雜
柏實・去殼・研
陸鯉甲蛸皮・殺鬼丸內生用・餘皆去焦・
栝蔞・去翅足・無・以瓦壺古代之・
蒸青壹枚・可換栝蔞壹枚・
螢火・焙
東門上鷄頭・焙
鐵鍾柄入藏類篇者・
生葛根・切
羚羊角・鉋・作・
前胡・去蘆
白茅根・去節・洗・
鼠髮・皂角水洗・晒水洗之・
白薇・去心
牛膝・去蘆・酒浸三宿・豆間一宿・
紫石英・光明者・研・
龍齒・研細者大者・
小麥・淘・
茯神・去皮・木・
芫花・去葉皮・
豬牙皂角・刮去黑皮・醋・炙黃焦・
青橘皮・去白・
猪膚・用汁・
雪羊子・去皮心膜・炙炒焦黃色・或用骨炭・
百合・去心・如入湯用・用水浸一宿・拍碎去白沫・慎石合滑石散口口口・
麻黃湯末　桂枝　口口　口口口　嘔方皆在可並行之・皆口口口　秤一半・和勻粗服・
不可作煮散方
陽毒升麻湯　陰毒甘草湯
熱病乾薑附子湯　青筋蛮柴胡地黃湯
赤脈搥石膏地黃湯　黃肉隨玄參滾水石湯
白氣鯉石膏杏人湯　黑苔溫苦參石膏湯
溫噦茅根葛根湯　梓皮欽子
茅根桔皮湯　枇杷茅根湯
溫病壞後三黃石膏湯收壞別行附子鱉甲湯
已上除不可作煮散方外凡湯劑言咬咀者如咬咀麤細之狀今之飽末是也凡麤末每服四錢水一盞半煮八分澄去滓得七分寫準內有半夏附子寫毒藥之類每四錢水二盞入生薑三片煎七分內有或用朴硝或用阿膠或用飴糖或用焰硝或用雞子清皆煎成湯後去滓下之內或用竹瀝煎者每四錢水一盞二分煎至七分下竹瀝三分煎至七分內或用大黃者盧人入大黃同煎之如難得通利人每服四錢水一盞半煎至一盞別入大黃半錢同煎至七分又難得利者以湯澈大黃汁三二分同煎之以取利爲度政和歲次癸巳門人布衣魏　祐編

龐先生傷寒論序

龐安常自少時喜覽方。爲人治病。處其死生多驗。名領淮南諸縣。然爲氣任俠。鬬雞走狗。蹴鞠踰侀。少年衆縱。事無所不爲。博弈音技。一工所難而兼能之。家富多後房。不出戶而所欲得。人之以醫聘之也。皆多已其所好。以順適其意。其來也。病家如市。其疾已也。君股然不受謝而去。中年乃屏絕戲弄。閉門讀書。自神農黃帝經方。扁鵲八十一難經。皇甫謐甲乙。無不貫穿。其脩業紛錯。黃素朽蠹。先師或失其意。學術淺薄。私智穿鑿。曲士或鼠其文。安常悉能辯論發揮。每用以治病。幾乎十全矣。然人疾詣門。不問貧富。爲便房曲癰。調護寒暑。所宜珍膳美蔬。時節其飢飽。愛老而慈幼。不以人之疾皆試其方。如疾痛在己也。蓋其輕財如糞土。耐事如慈母。而有常。似秦漢間任俠而不害人。似戰國四公子而不爭利。所以能動而得意。起人之疾。不可爲數。他日過之。未皆有德色也。其所繆輯傷寒論。皆其日用書也。欲援其大要。論其精妙。使士大夫稍知之。然未嘗游其庭者。雖得不著。著其行事。以爲後序云。前序海上人諾爲之故盧其右以待元符三年三月。豫章黃　序。

重雕宋刻傷寒總病論札記

此卷摘取張長沙之大要。辯論精妙。其有證而無方者。上溯內經。旁及他書。參以己見。爲增損進退之法。實能發仲景未盡之意。而補其未備之方。是爲龐氏之撰著。非僅述諸家抄本。多有異同。或未見宋刻。傳寫互異。或依據張書。增補失眞。文即有抄本。義長者亦第摘取備考。別疏爲札記附於後。丕烈又識。

序文啓。薛本題本此上俱有缺字。居右。再拜。薛本題本此上亦有缺字。嗜小。

後序

三行自少時（聖本無時字）六行虽甫證（證宋本作證）七行悉能辯論發揮（缺用以治病（宋本作悉能辯明考正用以治病）七、八行不問貧富（宋本作不問貧富貴賤）窮便房曲（宋本作不問貧賤窮達）調護寒暑（宋本作不問貧賤窮達均能調護寒暑）八行時節其飢飽之度（宋本無之字度二字）九行尉事（宋本作尉于）十行他日過之（宋本過作見）十一、十二行故不著著其行事（聖本不重著字）

錄前尚有文字否今因無從補刊故仍其缺不敢妄作也

卷第一

一面十行冰也（案也字宋本倶脫）十一行其有（聖本有作人非）又勞房（宋本作力）

三面二行故須（宋本作又非）四行而變證病（聖本病下有所宜二字）七行有平居者（宋本居作處）

四面三行揮散（宋本揮作徹）四行工（宋本此上有粗字）

四面六行欲温（聖本欲字破損今照聖本補）五面六行足（宋本作更）十一行虛寒（聖本作虛汗非）

六面二行一二日發以上連風府（宋本一上有當字以下有其脈二字）

七面後三行大湯劑（聖本大作人今依宋本改）

八面十三行自徹汗（宋本自作身非）九面五行大便已鞕（宋本鞕作鞭不能悉正皆當從校證是）

九面十四行而又脈（聖本又作反）九面三行當二三日發（聖本作二二日誤今依宋聖本改）

行相殺（宋本作相搏）

十一面二行傷寒三四日陽爲盡（宋本作傷寒三四日三陽爲盡聖本作傷寒三四日三陽爲盡案當依宋本是）

十二面五行注故与藥（宋本作但以与藥）九行於寒也（宋本有脫誤案仲景原文當作有欲寒也）

十三面五行故以小辛之藥温散（聖本作溫以溫散之藥）

十四面十三行已合治之。薛本作已御令清之合治之。頤本已作七。案當作各別標節。已合治之。薛頤本皆誤。
十五面十一行熬香。薛本香作藍。非。
十六面六行氣上衝心中痛熱。頤本重一心字是。
十七面一行蜜不得食。薛本頤本皆俱作能。案能字是。
十八面六行次治其厥。頤本次作須。十行永宜此方。薛本張本冰俱作亦。
十九面二行證。頤本作述。
十九面十四行與太陰。頤本無與字。案脫本與字。疑衍。

卷第二

二十二面六行指稍。薛本稍作梢。頤本作愉。是。十二行翕翕熱。薛本翕上有發字。
二十二面二行俯寒。頤本作增譌。今依薛本改。以下增寒及後二行皆做此。
二十四面二行注當發證。頤本證下有汗字。又注清龍湯假桂枝證。薛本湯下有者字。假作以。案假字不誤。
二十五面一行勢如。薛本如作加。案當作加是。
二十六面五行煎愛。薛本愛作波。頤本作皮。十一行注蜚粉。薛本蜚作悲。非。
二十六面十二行以失。薛本以作但。二十七面八行注此若脈緊面遲。頤本若字破損。據薛本補。註本同頤本作此浮緊而遲。非無若字。誤衍。

二十八面六行少氣逆。薛本氣字下重一氣字。案氣字當重。是。十一行氣微絕。頤本微作欲。
二十九面九行穀不得前。薛本前作情。非。
二十九面十四行蚕勝。薛本勝作升。頤本同。三十一面一行五倍子。薛本作五味子。頤本同。案小青龍湯本方有五味子。無五倍子。當作五味子。是。
三十一面十四行去仁參。薛本仁作人。頤本同。案當作人。是。三十二面二行支結。薛本支作支。
三十四面九行瓦。原本作玄誤。頤本作弦。薛本張本均作瓦。案瓦字是。今改。
三十五面十一行大柴胡湯。薛本不重胡字。頤本同。案重者乃衍字也。
三十八面三行在壯熱但主利。薛本在作發。主作下。案當从發从下爲是。
三十八面十二行衰證在。薛本在上有仍字。
三十九面十三行汗開下閉上。薛本頤本皆作閉上閉下。四十面三行。咽燥。薛本同頤本。燥作燥。案當作燥爲是。三行方有。薛本同頤本。有作在。案當作在爲是。

四十面十一行拘忌。頤本忌作急。四十一面三行煩喘。頤本喘作悶。
四十二面十三行微喘。頤本喘作熱。
四十三面十行開陰。頤本作關。十一行同。
四十四面八行桂枝甘草湯主之。薛本作桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。十一行。並宜火劫治之。薛本立下有依字。四十五面一行。自爲

黃。薛本自上有周字。二行諸血若去。頤本若作君。今照各本改。

卷第三

五十面一行注爲陽。薛本爲下有發於二字。頤本同。
五十一面八行發後無汗。薛本發下有汗字。頤本同。十行引小腹入陰筋者。各本同。原文引上有痛字。此痛字俱不可少。
五十二面三行注雜發汗。薛本同張本。雜作可。是。六行如被杖。薛本張本如字上俱有身痛二字。案此亦仲景原文本有此二字。十四行勿以煙出。薛本以作使。
五十三面三行通遂。薛本張本遂作達。五行蒸熱藥。薛本頤本張本並俱作鎏。案當作鎏是。
五十四面三行爲狀。薛本爲下有病字。四行其面作黑色白。薛本張本面字下皆多作黍二字。四行咽乾。薛本張本咽乾下行多苦參兩洗之五字。
五行汗雖黃云云止。張本另提行起。有苦參半斤。槐白皮四兩。頭垂根四兩。右剉。以水五升煎三升。去滓。頭本張本頭俱作藍。案藍實云云。薛本此方。附注于上。又則熱。薛本張本頭俱作煩。案金匱本文作煩。四行細末一行後。張本多通治瘡惡。黃連一兩。右為末。每服四錢。水一盞半。煎八分。去滓。溫溫服之。云云。三行薛本亦多此方。附注於上九行美。薛本頭本俱作美。十一行浙瘧。各本俱作漸。
五十五面一行兩濟字。原本均作濟誤。今據各本改正。
五十六面一行如煎洗。薛本張本煎洗俱作面洗。按下有濟字。若用洗字則重複。當作如前洗為是。十三行所主。薛本至作致。五十七面一行反不惡寒。案仲景原文無不是。

五十七面。接此葉非宋刻原刊。四行而故。薛本張本故俱作熱。又而避害。原本避字模糊。今依薛本張本補。又汗。大俱作太。頭本亦作太。八行強頂。薛本張本俱作項強。按項字原本係項字。頭本亦誤作曰。今依薛本張本改作項字。頭本同。十八面四行齲齒。各本俱作齒痛。案齲字誤。當作齲齒是。四行注方在可下門中。薛本同。頭本門俱作證。
五十八面五行濕證。張本證作痰。六行注水證。張本水上有可字。案可字當有。七行身汗出。薛本張本身下有重字。五十九面一行溺家下之額上汗出微喘小便不利者死。案此為仲景原文也。俱原文乃小便上脫加員小便利者死。以額汗微喘俱與小便利不關。而小便不利。乃溺家本證。何云死耶。薛本張本並同。又按先在腎命證心胸曰一作小便不利來死。溺陽上游而陰不下注也。亦通。
五十九面五行舍水畜。薛本畜作搐。七行可與杏仁薏苡湯。薛本作可與麻黃杏仁薏苡甘草湯。六十面一行故使之耳。薛本張本之俱作然。二行則極。薛本作劇。
六十面五行溢水。薛本溢作諡。頭本作溫。七行暍證。張本證作欲。十二行弦面細孔而遲。薛本面字。無兩。十三行反熱甚。薛本反作發。
六十一面七行宜苦酒艾。原本苦作若誤。今照薛本頭本改。按苦酒即醋也。九行茯苓桂枝湯主之。行酒二鏡煎二鏡四分。薛本同張本。作酒二鏡煎一鏡四分。頭本作酒二鏡四分煎二鏡。二行勝肰。薛本作腫筋。
十八面後九行理中治中焦。薛本治上有者字。
六十五面三行伸吟。薛本張本俱作呻。按篇作呻為是。六十二面二行。並宜火劫治之。薛本作茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

六十九面五行肉豆蔻。薛本蔻作蔻，顯本作蔻誤。
七十一面十二行血不止。原本作上，今依薛本改正。
七十三面一行蜘蛛。薛本作蝪，按此誤。當作蠮，後四行同。
七十五面十三行草一分。薛本張本草上皆有甘字，按原本脫去。
七十七面三行且至晚。薛本且作旦。
七十九面十三行灰燒。薛本無灰字，按原本脫去。
卷第四
八十一面八行爲暑病其熱。此五字原本破去，據抵篆出者。
八十二面十四行政不能食。政今依薛本張本補。
八十三面十行腎熱病者。案內字下有頗八十四面四行洗淅，薛本同張本，顯本俱作先淅，按此亦內字之誤。四行頭痛不任。各本皆同，按內經作頭痛不堪。六行脇痛。薛本脇作脚，非內經作脇痛。
八十四面十行亡逆。薛本逆本俱作無。十四行蓐席。薛本蓐作褥。
八十五面六行法焉。薛本張本俱作云。八行走痓。薛本痓作挫。十行五拾粒。薛本張本下皆有去皮二字。
八十七面八行甘草。薛本無此味。
八十八面七行請居。薛本請作謂，非。十行肉豆蔻。薛本同。
八十九面一行七錢。薛本作三錢，文注於上方曰二十四銖，是皆以七錢也。
九十面四行鉢。各本皆作撥，薛本是字。七行何由衰散大腑久祕。薛本大作六，顯本衰作衰，按當作衰是。
九十一面二行隧繆。薛本繆作謬。
九十二面四行杏仁。熬炒。原本炒字破去，今依薛本顯本補。十三行一盞。薛本盞下有小字。十四行永不發。薛本發下尚有一發字。十四行或下後。薛本闕下字。下有利字。
九十三面三行悸塞。原本作脹，今依各本改。十四行白澀。本薛同顯本，按當作眩爲是。
九十五面一行自汗。本薛盜本同，顯本作自安。又黑脈。薛本脈作髓。
九十六面四行嗽或噦痛。薛本或作而。
卷第五
一〇〇面五行手太陰水。薛本頭本水俱作金，按當從金爲是。七行相形。薛本形作刑。十一行注瓠園。薛本園作圃。
一〇一面八行鼻衄中。薛本衄下有內補陷三字，中下有竅字。九行以紙筋探鼻中蟲之。薛本作以拭筋釵鼻中蟲出之。
一〇二面二行柏實。薛本此下尚有酢漿二味。三行三日服之。薛本張本同顯本之作過，疑誤。七行蝨。按原本作蝨誤，以後時治蝨法，顯本亦作蝨，亦誤。
一〇三面十二行反倒。薛本倒作及。又其病。薛本病下有相反二字。十三行府。薛本作腑。
一〇四面十三行侵。薛本侵下有入字。又咽寒。薛本寒下有膈塞二字。一〇五面六行開格。薛本開作開，顯本作關是。八行嘔氣。薛本氣字連接北病相反四字，下文多著痛盛諸陰邪所加八字，方括頭道頭直，皮肉強等八字，顯字原本作巩，薛字原本所無。八行頸下。薛本作側。
一〇五面十三行膿。原本作膿誤，今依各本改。一〇六面二行狀。薛本作狀。八行生班。薛本顯本皆作斑。
一〇七面一行陽毒。薛本陽字上有則爲二字。一行疹。薛本顯本皆作斑。
一〇八面十行煎去。薛本去作取。
一〇九面四行汗。原本誤作汁，今依薛本張本改。七行洞。薛本顯本同顯本作口。
一一一面七行素傷於寒因復傷於寒。薛本上寒字作風，顯本下寒字作熱。十行米中病。薛本米作來，未字下又多一來字，疑衍。顯本顯本皆作菜。
一一二面三行病苦。薛本苦作若。三行又。顯本作及。十一行素傷於熱。薛本作若

一二八面十一行衝愈。薛本盤本衝俱作和。十三行注太谿。原本誤作大䟦。今照各本改。

一二八面十四行太谿。舊本谿誤作溪。一二九面四行吹則。薛本吹作次。舊本作久。四行通氣。薛本氣作風。案當從脈是。

一二九面十二行覺。此字原本半字。破去。描寫作學。各本亦作學。故以意改之。一三〇面一行華陀本意也。薛本盤本句上有非字。按此處文義似當有非字。五行複陰。薛本盤本同本俱作復。按當從復訪是。

一三〇面十一行故取。原本作故收。改。薛本改。十三行淮。薛本盤本俱作淮。技作技。盤本作板。四行其緒。盤本其作具。一三一面一行密窖。薛本盤本窖俱作窘。又方枝。薛本枝作板。盤本四行其緒。盤本其作具。

一三一面八行顏知。薛本知作諮。八行明然。薛本盤本然俱作炯。十行雖。薛本作惟。十一行賂遺。薛本盤本遺俱作遘。

一三二面三行令王公。盤本令作今。又今增至四五百。薛本盤本此六字俱在上行補于四五句下。

一三三面一行右引。薛本作古。六行安不。薛本盤本安俱作寧。又千逸。各本千俱作平。

傷寒論音訓

一三五面十三行苦侯切。原本作若使切誤。各本亦誤。今依原本校字作苦侯切。改。按查玉篇兄字本音侯切。知前人所改非妄。故從之。

一三六面六行牡豕　牡鳳。原本牡皆誤作壯。今改正。十四行金鏃口捕物。按原本口作破損。下半字略有痕迹。僅戴字。薛本盤本俱作之。疑非。

術治藥法

一四一面十二行注取自然汗。許當作汁。

一四四面十二行口參。原本破損。以藥味次第考之。當是玄參。一四六面一行口口口口。原本破損。薛本盤本口口作湯末口口口口。三口口口作中立綵。按中立綵二字有誤。

一四六面七行無行溫。許當作骨。

題宋刻龐安常傷寒總病論後

都中藏書家所謂朱奐文游者。余猶及見其人。家多書。以老故。大半散去。最後一買中有龐安常傷寒總病論。亦第輿纂緝並出。主人不以爲宋刻。估人之買者亦未知爲宋刻也。雜置坊間。有識者過而識之。以胥蛟五星易歸。自是我輩之好言收藏者。皆爭相購矣。是書先至小讀書堆顧抱沖家。既而五硯樓袁漪階知之。余亦知之。因漪階先與議易。故歸之抱沖先見是書。遂先錄其副。抱沖所錄。余未之見。見其友人施君少谷手錄本。少谷時在抱沖家。教其子弟習書法。故見而借抄。抄畢。原書歸漪階。余從之傳工影鈔一本。統而計之。宋刻一。影宋刻者抱沖少谷與余有三矣。厥後余與漪階以影鈔易宋刻。是書遂爲百宋一廛中物。年來力絀。舉而贈諸藝芸書舍。不意漪階之影鈔者。亦於其身後展轉歸藝芸。于是刻於鈔盛行。爲他人所有。余則一無所有矣。刻洪氏集驗方之多。余忽得一夢。有人謂余何不再刻龐傷寒醒而異之。遂商諸藝芸。思借鈔入刻。奈藝芸不允。讓影鈔付梓。而允借宋刻備校。適少谷哲嗣稻香欣然輟贈其先人手澤。付諸剞劂。于是復以宋刻較影鈔。而知少谷之影鈔爲功不小也。三卷三十三葉。唯少谷影鈔本有之。餘本都缺。想少谷鈔後。抱沖始鈔。鈔時偶失之。自是宋刻缺此葉。已後影鈔本皆失之。非余之重刻。不知宋刻缺此葉。非少谷之影鈔。不知宋刻之原宋缺此葉也。書之經人拆散傳錄。其弊有如此者。不可

592

不警也。其中五卷十五葉。宋本缺。惟醇性天家鈔本有之。字跡行款。與原本殊。未知何據。後見抱沖所鈔者中。亦有此葉。謂是從王宇泰活字本補入。今余覆刻。據醇本補。據顧本校。存其異同可耳。宋刻不無誤處。余復借張蔣塘家藏鈔本。醇性天家藏鈔本。顧容安家藏鈔本。雖未知其同出一源與否。而字有異同。悉爲標出。可從者或改正文以就之。未敢信者或存校語以參之。余友張君訒菴。索語督理。共相參訂。以定校勘數十條。其任檢閱而草創者。余長孫美齡之力也。是書自王宇泰活字印行之後。未見重梓。卽王本相傳止有二百部。故行世絕少。余姪曾有之。爲友人借去被焚。故未及一校爲憾。刖好中皆想覯是書。渴欲一見。故命工梓行。至于是書之深奧。昔安常友人蘇黃兩公已詳言之。不復丐當代名流之牖瞽。聊述一言已。道光癸未仲春黃丕烈識。



傷寒微旨論

韓祇和撰

傷寒微旨提要

傷寒微旨二卷.宋韓祇和撰.是書.宋史藝文志不載.陳振孫書錄解題.載有其名.亦不著作者名氏.但據序題元祐丙寅.知其爲哲宗時人而已.今檢永樂大典各卷內.此書散見頗多.每條悉標韓祇和之名.而元戴良九靈山房集.亦稱自洪張機著傷寒論.晉王叔和.宋成無己.龐安常.宋肱.許叔微韓祇和.王貺之流.皆互有闡發.其間祇和姓名.與永樂大典相合.是祇和實北宋名醫.以傷寒爲專門者.特宋史方技傳不載.其履貫遂不可考.且書凡十五篇.間附方論.大抵皆推闡張機之旨.而能變通於其間.其可下篇.不立湯液.惟以早下爲大戒.蓋爲氣質鼠弱者言.然當以脈證相參.知其初入陽明與否.以分汗下.不宜矯枉過直.覺廢古方.至如辨脈篇.撮傷寒例枝下咽.陽盛乃斃.亦氣入胃.陰盛乃亡之義.以攻楊氏之謬說.可汗篇分陰盛陽虛.陽盛陰虛.陰陽俱盛三門.則俱能師張氏.而神明其意矣.又如汗.下.溫.三法.分被時候辰刻.而參之脈理病情.乃因張機正傷寒之法.而通之於春夏傷寒.更通之於冬月傷寒.亦頗能察微知著.又如以陽黃歸之過下亡津.則於金匱發陽發陰之論.研析精微.不特傷寒之黃.切中厥要.即雜病之黃.亦可以例推矣.其書向惟王好古陰證略例中間引其文.而原本久佚.今採掇菁粹.復成完帙.謹依原目.蓋爲上下二卷.陳振孫所稱之原序.則永樂大典不載.無從採補.殆編纂之時.舊本已闕歟.

傷寒微旨論卷上

宋 韓祇和撰

傷寒源篇

夫傷寒之病.醫者多不審察病之本源.但只云病傷寒.卽不知其始自至之後.一陽漸生.陽氣微弱.猶未能上行.易曰.潛龍勿用是也.至小寒之後.立春以前.寒毒殺厲之氣大行.時中於人.則傳在臟腑.其內伏之陽.被寒毒所折.深淺於骨髓之間.春之時.伏陽早得發泄.則其病輕.名曰溫病.感寒重者.至夏至之後.真陰漸發.其伏陽不得停留.或遇風寒.或因飲食沐浴所傷.其骨髓間鬱結者.陽氣爲外邪所引.方得發泄.伏陽旣出肌膚.而遇天氣炎熱.兩熱相干.卽病證多變.名曰熱病.按素問生氣通天論云.冬傷于寒.注云.寒毒之氣.內藏骨髓.春陽氣發.寒不爲釋.陽氣內鬱結.而後爲熱病矣.自冬傷于寒.至春變爲溫病.至夏變爲熱病.注云.寒毒之氣.藏于肌膚.陽氣不得散發.而內怫結.故傷寒者.反爲熱病也.以此證之.卽傷寒之病.本于內伏之陽.爲患經絡.分布上下.故手有三陽三陰.足有三陽三陰.手三陽者.太陽小腸也.陽明大腸也.少陽三焦也.三陰者.太陰肺也.少陰心也.厥陰心包絡也.足三陽者.太陽膀胱也.陽明胃也.少陽膽也.三陰者.太陰脾也.少陰腎也.厥陰肝也.今傷寒之病.只受于足三陽三陰者.何也.熱論云.一日巨陽受之.頭項痛.腰脊強.二日

陽明受之。陽明主肉。故身熱口燥。而鼻乾不得臥。三日少陽受之。少陽主脾。故胸脇痞而耳聾。四日太陰受之。故腹滿而咽乾。五日少陰受之。故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。故煩滿囊縮。令經中論其傷寒病所傳受而不傳于手之三陽三陰。古今未見其說焉。且人之生也。稟天地陰陽氣。身半以上。同天之陽。身半以下。同地之陰。或四時有不常之氣。陽邪爲病。則傷于手經也。陰邪爲病。則傷于足經也。故寒毒之氣。則中于足經矣。易云水流濕。火就燥是也。太陰陽明論。陽受風氣。陰受濕氣。注云同氣相求。傷寒又曰。傷于風者。上先受之。傷于濕者。下先受之。注云。陽氣炎上。故受風。陰氣潤下。故受濕。蓋同氣相合。勢至如是。論云。身半以上。其氣三。天之分也。天氣主之。身半以下。其氣三。地之分也。地氣主之。注云。當陰之分。冷病歸之。當陽之分。熱病歸之。脈要精微論云。故中惡風。陽氣受之也。以此爲證。卽寒毒之氣。只受于足之三陽三陰明矣。

傷寒中脈篇

夫傷寒既稟于多。得春夏之氣。則欲發泄而又因飲冷嗜欲。則觸起。因衝風雨。則迫動。因他人病所著。則外邪熏出內邪。既病之後。變動不常。未見于證。先形于脈。脈者人之榰衡。浮數而軟。命之曰傷風。浮緊而急。命之曰傷寒。傷寒之脈。陽毒則頭大尾小。陰毒則頭小尾大。頭者寸也。尾者尺也。寸有餘則爲陽毒。尺有餘則爲陰毒。三部皆有餘。乍小乍大。爲往來未定。陽毒盛則解。陰毒盛則溫。陰陽皆盛。則半陰陽皆窮。則扶。陰陽未定。則待。既久不定。然後觀證。治傷寒以脈爲先。以證爲後。浮者按之便得。數者一息六至以上。硬者有力。凡有吐瀉。當以脈候。關前脈大。關後脈小。或六脈俱大。雖吐瀉大熱之證。不得便以爲熱。關前脈小。關後脈大。或六脈俱微。雖秘結大寒之證。不可便以爲寒。經云。關前爲陽。關後爲陰。

辨脈篇

夫辨傷寒病之脈。不出于數種。曰浮。曰沈。曰數。曰遲。曰陰。曰陽。先識此等六脈。然後辨緩。審大小。察緊緩。爲治病之急務。今之醫流。治傷寒病。則懸脈浮爲陽脈沈爲陰。全不明脈尺寸有陰陽虛盛之理。爲可汗下與不可汗下之規。往往變傷寒爲壞病焉。

浮脈者。皆謂舉之有餘及按之三四菽重得之也。脈有三部。有上部。有中部。有下部。凡脈在上部者。皆名浮脈也。於傷寒病即不然。但病人兩手脈見之于皮外。指到不及按便得者。乃是浮也。若病在表脈浮。不得便以浮爲陽。浮中亦有陽亦有陰也。蓋三陰病在表。脈亦浮也。故有可汗者。有不可汗者。

沈脈者。非謂深取而得之也。若在中部上見即爲沈矣。但兩手脈按之至皮下得者。乃是沈也。傷寒病在裏。三部脈沈。不得便以沈脈爲陰。沈中亦有陽亦有陰也。假令三陽病在裏。脈亦沈也。故有可下者。有不可下者。

數脈者。一息六七至是也。病人脈或浮或沈。若陰陽氣停。脈雖及六七至。只是邪氣傳受。不宜妄投藥也。若脈及七至已上。按之有力。但可投藥解之。此陰氣弱陽氣勝也。

遲脈者。一息四至下三至上是也。病人脈或浮或沈。不以大小緩急。但見脈遲便可投藥和之。此是陽氣

陽俱停。脈雖及六七至。只是邪氣傳受。不宜妄投藥也。

陰虛。是陰陽俱虛之意也。注云。陽脈見寸口浮而實大。今輕手按之。更損減而小。故言陽虛。重手按之。更實大而沈。故言陰實也。楊氏固執此二端。爲治傷寒病汗下之法。況脈經中。立此辨脈陰陽大法。蓋總

言雜病脈浮之損小沈之實大沈之損小浮之實大爲陰陽虛盛之說非爲傷寒病立言也傷寒病脈浮當以關前爲陽關後爲陰也假令三部脈浮有可汗者有不可汗者若寸脈短小尺脈實大名曰陰盛陽虛乃可汗之汗之即死三部脈沈有可下者有不可下者若寸脈實大尺脈短小亦名曰陽盛陰虛乃可下之下之即愈若寸脈實大尺脈短小亦名曰陽盛陰虛不可下之下之即死今楊氏執難經正文爲汗下之誤又言文意反倒不可依用由是不通難經中陰陽二字通是三部脈浮沈中寸爲陽尺爲陰非謂三部脈浮爲陽沈爲陰也使後人妄憑注中之說慢投汗下藥以害人命皆楊氏爲萬世之罪魁也蓋楊氏殊不達聖賢之意自揆己能謬傳於世故也且仲景傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡假令脈浮爲陽合投桂枝湯仲景何言陽盛則斃蓋謂三部脈浮寸脈力大爲陽盛若投承氣湯足以助陰爲毒是病人必死矣假令脈沈爲陰合投承氣湯仲景何言陰盛則亡蓋謂三部脈沈寸脈力小尺脈力大爲陰盛若投承氣湯足以助陰爲毒是病人必亡矣此仲景汗下之戒正與難經陰陽虛盛文意同也則楊氏之失明矣病在表脈浮寸脈力小於關尺此爲陽虛陰盛雖三日以後至四五日亦可投發表藥若寸脈力大於關尺此爲陽盛陰虛雖未滿三日亦不可投發表藥投之則助陽爲逆病人三日以後病猶在表脈浮三部齊等尚不可投汗藥況寸脈力大于關尺耶病在裏脈沈寸脈力大于關尺此爲陽盛陰虛雖四日後亦可下之若四日以前雖有此脈未投下藥亦不爲晚若寸脈力小於關尺此爲陽虛陰盛雖四日至六七日以後亦不可投下藥下之則助陰爲逆病人四五日以後病傳在裏脈沈三部齊等尚不可投下藥況寸脈力小於關尺耶

治病隨證加減藥篇

夫病證變壞急速者無出於傷寒古人以傷寒爲卒病也古今治傷寒無出於仲景方仲景方隨證加減藥味雖病而投之傷寒論辨太陽證小青龍湯方內若渴去半夏加瓜蔞根微利若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓若喘去麻黃加杏仁又傷寒五六日中風往來寒熱小柴胡湯方內若胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蔞根若腹中痛去黃芩加芍藥若脇下硬去棗加牡蠣若心下悸小便不利去黃芩加茯苓若不渴外有微熱者去人參加桂枝若欬去人參棗薑加五味子乾薑又傷寒八九日風濕相搏桂枝附子湯方內若其人大便硬小便自利去桂枝加茯苓加乾薑若小便利去茯苓若下利去芍藥加乾薑若嘔去附子加生薑又雜亂理中丸方內若脐上築者腎氣動也去朮加桂吐多去朮加生薑下利多還用朮悸者加茯苓渴欲得水者加朮腹中痛加人參若寒者加乾薑腹滿去朮加附子今據此五方中加減藥味之法乃是前賢訓誨人之深意也今之醫者見古方中有加減竟不能更張執泥所謂膠柱也況素問有異法方宜論豈是執一端而治病也假令雜病方可用治傷寒病者亦可投之豈須待傷寒論中有法也況古人之心文筆不能盡言者多矣

用藥逆篇

病人若因服下藥太過兩手脈沈細數脫體逆冷煩燥而渴者乃是陽氣下陷入丹田陰氣厥逆滿上二焦故令人躁此名陰躁也醫者見病人煩躁又不詳其端由亦不詳其脈理便用涼藥治之涼藥得下病勢愈甚至於困極不救者多矣病人若因下之太早兩手脈沈遲細而無力或遍身及四肢逆冷煩躁而渴者或引飲不休好泥水中臥者須用性熱藥治之凡投性熱藥皆須冷服何故如是蓋爲病人腹中陰氣太盛若投熱藥湯劑即陰陽氣相激藥下必便吐出須候湯劑極冷即投之投之不吐者乃服腹中陰氣與冷飲相逢即同氣相求調故藥下不吐也藥雖冷飲久即必發熱矣所謂始同而終異也素問云熱因寒用冷飲久必發熱是也假令投仲景四逆湯之類一依前證若病人不煩躁即熱藥可溫服之病人若傷暑熱胃中空虛飲冷太過遂成泄利日二三十往大便色黃米穀不化渴飲水漿醫者見此證云脾胃不和故至此也投熱藥或止之或補之熱藥既下往往吐出及下利愈甚此亦陰陽氣相拒也若處承氣湯之類令病人熱飲之藥既得下必不吐出亦是與胃中熱氣相從也熱力既消藥冷性得行其病即愈素問注云以熱盛和粉雪投之是也

可汗篇

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗證及可汗脈或云脈浮緊或云脈浮面數或云脈浮緊或云脈浮無汗而嗽或云脈浮而往表今略舉數條後人但憑脈之大槩並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不分有可汗有不可汗之處慢投發表藥服之則多變成陽毒之患今舉病人有汗惡風無汗發熱分爲三等及擬立春以後立秋以前氣候輕重各立方治之庶學者易爲開悟耳

病人一二日前兩手脈浮數或緩或緊按之羌軟寸關尺若齊等雖有頭痛身熱但是邪氣傳于陽分不可妄投發表藥也

病人雖頭痛惡風身熱若兩手脈寸關尺三部齊等其力不甚大不甚小者亦未可便與解表藥此是表證未見表脈也直候寸脈力小於關尺方可投解表藥

大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈不見證雖少投藥亦無害也

凡治雜病以色爲先以脈爲後治傷寒以脈爲先以證爲後病人兩手脈浮數面赤目如火狀煩躁力小關後脈力大惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈也若不調藥和之後必惡風及自汗出者立春以後至清明以前宜調脈湯主之清明以後至芒種以後及立秋以前宜葛根柴胡湯主之人參桔梗湯主之

調脈湯

葛根一兩（去蘆）　防風半兩（去蘆）　前胡半兩（去蘆）　人參三錢　甘草半兩（炙）

右爲末每服二錢水一盞生薑一塊如棗大劈破煎至七分去滓溫服如寸脈依前力小加減三箇劈破同煎

葛根柴胡湯

葛根一兩　柴胡一兩　芍藥二分　桔梗三分　甘草三分

右爲末、每服二錢、水一盞、生薑三片、煎至七分、去滓熱服、如寸脈依前力小、加葱白三寸、同煎服之、

人參桔梗湯

人參三分　桔梗三分　麻黃一兩去節　甘草三分

右爲末、每服二錢、水一盞、刮蘆五棗、煎至七分、去滓熱服、如尺脈依前力小、加黃芩三分、去節、同煎服、病人兩手脈浮數而緩、名曰中風、若寸脈力小、尺脈力大、惡風不自汗、此亦陰氣已盛、先見於脈也、若不調藥和之、後必惡風自汗出、若立春以後、至清明以前、宜薄荷湯主之、清明以後、至芒種以前、宜防風湯主之、芒種以後、立秋以前、宜香菅湯主之、

薄荷湯

薄荷一兩　葛根一兩　人參三分　甘草炙半兩　防風半兩

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓熱服、如寸脈依前力小、加葱白三寸、同煎服之、

防風湯

防風去蘆半兩　桔梗三分　甘草炙、旋覆花各半兩　厚朴炒、三分

右爲末、每服三錢、水一盞、入薑一塊如棗大、劈破、煎至七分、去滓熱服、如寸脈依前力小、加荊芥三分、去節、同煎服、病人兩手脈浮數而緩、名曰中風、若寸脈力小、尺脈力大、惡風不自汗、此亦陰氣已盛、先見於脈也、若不調藥和之、後必惡風自汗出、若立春以後、至清明以前、宜薄荷湯主之、清明以後、至芒種以前、宜防風湯主之、芒種以後、立秋以前、宜香菅湯主之、

薄荷湯

薄荷一兩　葛根一兩　人參三分　甘草炙半兩　防風半兩

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓熱服、如三五服、寸脈力尙小、加薄荷二分、

香菅湯

川芎一分　石菅二兩　升麻三分　甘草半兩　厚朴半兩

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓溫服、如三五服後、寸脈力尙小、加細辛二分、前二段、又將中風傷寒各立法者何、蓋爲病人始得病、三日已前、因中風脈緩、或因傷寒脈緊、脈雖先見、而病或猶未見、尙可用藥解之、故各立方爾、

病人兩手脈浮數、或緊或緩、寸脈短、及力小於關尺脈者、此名陰盛陽虛也、若自汗出惡風者、是邪氣在表、陽氣獨有餘也、素問云、陰陽有餘、則無汗而寒、表陰氣獨有餘也、素問云、陰氣有餘、而多汗身寒、是也、卽可投消陰助陽發表藥治之、若立春以後、至清明以前、宜六物麻黃湯主之、清明以後、至芒種以前、宜發表湯主之、

六物麻黃湯

麻黃去節一兩　人參　甘草各半兩　葛根　杏仁各三分

右爲末、每服三錢、水一盞、薑二衝、煎至七分、去滓熱服、如三五服已後、汗未止、加荊芥三分、如三五服後、猶惡風者、加麻黃半兩、石菅一兩、

七物柴胡湯

芍藥　荊芥穗各一兩、石膏三兩、甘草炙半兩、

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓、熱服、如前、

知母湯

知母　麻黃去節、升麻各一兩、石膏二兩、甘草半兩、

右爲末、每服三錢、水一盞、入薑一小塊、同煎八分、去滓、熱服、如前、

仲景云、傷寒有病、脈緩者名中風、脈緊者爲傷寒、若始因經冬溫毒氣中人、內伏之髓、沈沿于骨髓之內、伺至春夏發時、或因外傷寒而引內邪出、及乎內邪既出、即爲病一也、故古人立此二端、恐後人疑其緊脈與緩脈、治法別也、若中風與傷寒脈異、何故仲景撫別法治之、此乃後人不究仲景之心也、

前二段、又將中風與傷寒、以一法治之者何、蓋病人始得病後、脈與證俱見、若投解利藥、必不能愈、故立桂枝湯、治中風、麻黃湯、治傷寒、倘有表脈及表證者、亦可依脈證投藥、凡投解表及發表藥、每一日可飲三服、病甚者可至五服外、不可頻投藥也、如證未解、可投熱粥、內加葱白亦佳、如有汗出、勿厚衣蓋覆、恐出汗太過、作亡陽證、

可下篇

傷寒病有可下者、論中、但統言其可下證及可下脈、或云下利、三部脈皆平、心下硬、或云下利脈遲而滑者內實、或云脈滑而數者、有宿食、或云脈沈者內實、或云脈浮大、按之反濇、有宿食、或云脈實者、今略舉此數說、後人但濕其脈之大綱、即不分脈沈有陰陽虛盛之理、又不分有可下有不可下之處、慎投下藥、緩則變成四肢逆冷、手足拘攣、嘔逆喘滿之患、

病人四五日以後、兩手脈沈數、按之不甚實、若三部力齊等、雖有發熱胃悶、只是邪氣傳于內、潛在胃脘、不可妄投下藥也、若投黃芩湯三服以解之、即可、

病人五六日、兩手三部脈沈數大、按之不斷、寸脈上湧、力大于關尺脈、此名陽盛陰虛、可大小承氣湯、以助陰消陽也、若腰重、口乾、譫語、項背以上濈然汗出時、時潮熱者、可服調胃承氣湯、若第四五日見此證脈、可服小承氣湯、

病人三四日以後、兩手三部脈沈數、寸脈斷、力小、關尺脈力大、此名陰盛陽虛、切不可投下藥、宜攝溫中篇內湯丸投之、以助陽消陰也、

病人兩手三部脈沈數、按之至骨、有力而不斷、口燥咽乾面渴、時時發熱胃悶者、此是陰陽氣俱實、可用藥和之、宜黃芩湯主之、

黃芩湯

黃芩　甘草　山梔子　芍藥　厚朴　花粉等分、

右爲末、每服二錢、水一盞、煎至七分、去滓、溫服、如脈力差軟、住服、若大便渡、去梔子、加芍藥等分、若立春以後、立夏以前、見證者、去梔子芍藥、加柴胡、去苗等分、

病人兩手脈沈數大、按之不斷、寸脈上湧力大于關尺者、此名陽盛陰虛、可投藥下之、以助陰消陽也、若立春以後至清明以前、可下者、小承氣湯內、更加厚朴半兩、誠大黃一兩主之、　若發熱胃悶、腰重引飲、時時譫語、大承氣湯主之、

承氣湯、清明以後、芒種以前、可下者、小承氣湯主之、　若發熱胃悶、腰重引飲、時時譫語、大承氣湯主之、

以後至立秋以前、可下者、大承氣湯主之、　若發熱煩燥、腰重譫語、頭面濈然有汗者、調胃承氣湯主之、

凡用大小承氣及調胃承氣、並用仲景方、

病人立春以後至芒種以前、經三四日、脈有可下證、及有可下脈、亦未可投下藥、直候至第五日、或第六日、投下藥者何、蓋天氣陽力尚微、盧下之太過、變成壞病也、若芒種以後立秋以前、雖第二三日、有可下證、及有可下脈、亦未可便下之、直候至第四五日下之、天氣炎盛、與胃中熱氣相平、雖第四五日投下、必不能成後患也、

凡投下藥、不得務急爲勝、假令今日寅時、投下藥、至申時酉時不動、可再投下藥、至來日雞鳴時不動、再可投下藥、切宜愼守也、

病人三四日以前、切不宜早下、早則多成結胸、及四逆之患、至十二日以後者、見有下證、雖脈不至實盛、亦宜下之、假令第十二三日投下藥之後、至十六七日、尚口燥咽乾譫語者、即更宜下之、何者、蓋爲陰病、不過六七日乃巔、若陽病至十三日以後、頻投下藥、無害也、今立此言者、恐醫流將病人日數淺深、一概

病人四五日以後、假令今日寅時、見下證及有可下脈、未可便投下藥、更候之、午未時間、陽氣盛、再看其脈、若比寅時、寸脈力倍大於關尺脈、即可下之、若與寅時脈力平同、即候次日投下藥、亦不爲晚矣、凡投下藥者、量其脈力輕重、證之深淺、不可下之太過、若太過、則病證多變、且古人立論、無失下之過、但罪其下之太早及太過爾、況病人七八日不大便、古人未嘗罪醫者投下藥之晚、此醫之深意思、後人全不通曉、

病人第五六日、兩手三部脈沈數、寸關尺力齊等者、此乃陰陽氣停、雖然咽乾、腰重、發熱、亦不可投下藥、當大便自下爾、

病人至六七日不大便者、其兩手寸脈小、尺中脈大、亦不可下之、雖不服下藥、須大便者、則必先硬而後溏、蓋由腹中有陰氣也、仲景論曰、先硬後軟、不可攻也、況鴨溏乎、

傷寒論中、或云按之心下堅、腹中滿、不大便、口燥咽乾、汗出譫語、日晡時發潮熱、不能食、體重氣促、濈然汗出、皆是可下之證、雖有此可下之證、若三部脈停力弱、及寸脈小于關尺、此爲有下證無下脈、不可下之、毫釐千里、直候寸脈力大于關尺、可下也、凡投下藥、只參酌仲景承氣湯輕重用之、

治傷寒病、投下藥者、本不爲取積及取食、止爲疎解陽毒之氣、若邪毒在內、陽氣盛、即寸脈大、乃可下之、其陽氣不盛、即三部脈停、何必下之、蓋今人只知沈在裏、便投下藥、殊不較量脈之陰陽虛盛也、

凡投下藥者。本因胃中有邪熱之氣。故投大黃芒硝之類。以消陽氣。今之醫者。絕不解古人下傷寒之法。多投以丸藥。丸藥多用巴豆、水銀、輕粉、粉霜、砒霜、甘遂、石腦油之類。皆是熱藥。但能逐其胃中濁惡。卽愈增其邪熱矣。今用丸藥下傷寒病者。欲去胃中積聚。胃氣旣虛。卽邪熱在內。又與熱相逢。及吐納者熱之氣。足以助湯爲毒。後成壞病也。

今人投下藥。纔見大便利。及三五次。急投和氣藥以補之。本意用大黃等涼藥。疏導胃中熱氣。熱氣纔過。乘虛之際。卽投和氣補熱藥。決然變成發黃斑、出衄血、奔血狂走之患矣。

凡投下藥。住四五日以後。有下脈及有可下證。卽可下之。假令病人不投下藥。至六七日大汗後。依然腰痛、咽乾而渴。日晡發熱。類亦胸中冒悶。兩手脈實而數。宜用黃芩湯一兩服和之。直候大汗出後。至第五六日。投大承氣湯。或調胃承氣湯。亦無害。蓋于汗後至第五六日。投下藥者。是因病人大病後。氣血虛弱。不可早下也。

前可汗篇。別立方藥。而不從仲景方。今可下篇中。不別立藥。而從仲景方者何。蓋太平之人。飲食動作過妄。作陽氣多。若用大熱藥發表。則必變成壞病。故斟酌重輕而立方也。世人陽氣卽多。若用下藥。當從至陰藥投之。非仲景承氣湯之類。卽別藥不能對病矣。請醫者深詳之。

傷寒微旨論卷下

總汗下篇

凡治傷寒病。若能辨其汗下者。卽治病之法。得其十全矣。今之醫者則不然。但憑其熱論云。未滿三日。可汗而已。其滿三日者。可泄而已。又云。脈大浮數。病爲在表。可發其汗。脈細沈數。病爲在裏。卽可下之。此古人立理之綱維。而今人執之爲定法。又全不辨脈尺寸之陰陽。邪氣之虛盛。及內外證之輕重。但未滿三日。卽投發表藥。已滿四日。卽投下藥。其間或有辨脈之浮沈。投汗下藥者。以爲能事矣。殊不知未滿三日。亦有可下者。已滿四日後。亦有可汗者。又不知脈浮有不可汗者。脈沈有不可下者。熱論云。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛、腰脊強。二日。陽明受之。陽明主肉。故身熱、自欲飡、而鼻乾、不得臥。三日。少陽受之。小陽主膽。故胸脇痛而耳聾。三陽經絡。皆受其病。未入於臟。故可汗而已。四日。太陰受之。故腹滿而咽乾。五日。少陰受之。故口燥舌乾而渴。六日。厥陰受之。而盛縮。此三陰三陽。二日陽明爲次也。但會三陰三陽所直之日。與邪氣相逢。各和有形證也。假令一日。或耳聾、或鼻乾、或頭痛、或腹滿、或舌乾而渴、或囊縮。此是邪氣隨陰陽之經絡所傳也。餘日放此。

凡醫者治傷寒病。過其邪氣在裏。並不分邪氣之輕重。脈理之虛盛。只憑脈浮。便將發表藥一例投之。務期汗多爲快。藥力過劑。遂致劇血、吐血、發斑、汗漏、四肢拘攣、因成亡陽之患也。

病人無汗發熱。三部脈浮。寸脈大於關尺者。此是陽盛。陽邪旣盛。若入於胃中。卽變成瘀熱之患。當用解

傷寒例云。尺寸俱浮。太陽受病也。尺寸俱長。陽明受病也。尺寸俱弦。少陽受病也。尺寸俱沈細者。太陰受病也。尺寸俱沈者。少陰受病也。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。此亦是因邪氣傳受三陽三陰之經。故見此脈。亦不可妄投發表藥及投下藥。當候兩手脈浮沈中。或關前力小、關後力大、或關前力大、關後力小。此是陰陽氣之偏勝。卽依脈證投藥治之。且黃帝作三陽三陰證在前。仲景述三陽三陰脈在後。本爲邪氣所傳。故設此語。非務求法治之。恐後人慢投藥也。今人纔見病人有此三陰三陽病證及脈。便急投藥。求命。則失之遠矣。熱論云。七日巨陽病衰。頭痛少愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹滅如故。則思飡。十一日少陰病衰。渴止不滿。若乾已而嘔。十二日厥陰病衰。大氣皆去。病人精神爽慧矣。且素問經中。黃帝與岐伯問答。病證莫知其數。腹微下。大氣皆去。病日已矣。且傷寒病。若見三陽三陰證及脈合。用藥調治。古人何言大氣皆去。病日衰矣。卽知是不須用藥。妄調治也。仲景傷寒論辨太陽證云。太陽病、頭痛至七日以上自愈者。以行其經盡故也。又曰。十二日厥陰病衰。大氣皆去。病人精神爽慧矣。且素問經中。黃帝與岐伯問答。病證莫知其數。皆各立法治之。惟熱論中傷寒病最爲大疾。卻至七日。太陽病衰。又云。大氣皆去。若是傷寒病。須用法調治。卽聖賢皆不言自愈也。今之醫者纔見人病傷寒。多不辨脈之理趣。又不分證之是非。便妄投藥以調

手脈浮沈中或關前大關後小。或關前小關後大。此是陰陽氣之偏勝。卽依脈證投藥治之。仲景傷寒論。

辨汗下藥力輕重篇

凡醫者治傷寒病。過其邪氣在裏。並不分邪氣之輕重。脈理之虛盛。只憑脈浮。便將發表藥一例投之。務期汗多爲快。藥力過劑。遂致劇血、吐血、發斑、汗漏、四肢拘攣、因成亡陽之患也。

病人無汗發熱。三部脈浮。寸脈大於關尺者。此是陽盛。陽邪旣盛。若入於胃中。卽變成瘀熱之患。當用解

表藥、以消陽氣。解表藥者。石膏甘草芍藥生薑豆豉薤荷柴胡葛根之類是也。

病人汗出惡風。脈浮。見陰盛者。可投發表藥消陰氣。發表藥者。桂枝、麻黃、荊芥、葱、當歸、附子、乾薑之類是也。但不可全用桂枝耳。

凡投發表藥。只要消解陰勝之氣。不務汗多爲法。若汗出太過。則成亡陽之病。仲景桂枝湯證云。令遍身漐漐然。微似有汗。不可如水流漓。今既見可汗證。當投發表藥。古人何故卻云。汗不可如水流。是知發表藥。不謂汗多爲愈也。

凡醫者治傷寒病。遇其邪氣在裏。並不分邪氣之輕重。脈理之虛盛。只憑脈沈。使將下藥一例投之。務期大便快利爲法。既過劑。遂成噫噦嘔吐。四肢逆冷及拘攣之患。

病人發熱。口燥。語譫。脈見陽盛者。可投下藥。以消陽氣。陽氣既消。則無忽棱之證。消陽藥者。大黃、芒硝、梔子、甘草、枳實之類是也。如用大黃芒硝。須用少量厚朴以和之。若一服未中。再服之。不可務期快利。切宜愼守也。

凡投下藥。只要消陽毒之氣。不務取積爲快。今既見可下證。古人何故卻罪下之太早及太過。足知不務快利爲法也。

今立此篇。較量藥力輕重者。蓋謂醫流執守古方。不能隨形證淺、深。增減藥味也。若能辨藥輕重。隨證用藥。何慮太過不及之責也。葛氏肘後篇曰。傷寒有數種。初發。作葱豉湯頓服。取汗。如不汗。加葛根升麻。更作加麻黃豉湯。以此較之。卽古人豈一端而治病。故具輕重。出此篇以明之。

温中篇

夫傷寒病之說。始黃帝以開其端由。至於仲景方陳其條目。自後厥淺之學。莫知其數。立言者。只云病在表可發汗。病在裏可下之。或云。不可汗。不可下。未嘗有温中之說。仲景傷寒論云。尺寸俱沈。細。太陰受病也。尺寸俱沈。少陰受病也。尺寸俱微緩。厥陰受病也。又辨太陰證云。病脈浮。可發汗。宜桂枝湯。又自利不渴。宜四逆湯。又腸滿時痛。桂枝加芍藥湯。辨少陰證云。少陰病。始得之。發熱脈沈。麻黃附子細辛湯。少陰證二三日。麻黃附子甘草湯。又少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈。附子湯。又少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死。吳茱萸湯。又少陰病。脈沈。急温之。宜四逆湯。今聚仲景論中數條。最是治三陰病之良法。於今世之用。尙有未盡證者。愚嘗校讎。自至和初歲。迄于今三十餘年。不以歲之太過不及。每夏至前。以有病傷寒人。十中七八。兩手脈俱沈細數。多是胸膈滿悶或吐。或氣塞。或腹鳴。或腹痛。與仲景三陰病之說脈理同。而證不同。因不敢妄投仲景治三陰病藥。醫者繇是脈沈及胸膈滿。便投藥下之。往往不救。皆緣酌仲景理中丸與服之。其病勢輕者。卽胸中便快。其病勢重者。半日許悶亂。依然。或有病人脈沈細遲。故仲景四逆湯温之。多藥力太熱。後必發煩躁。因較量此形證。今別立方以治之。多得對病。不可不傳焉。

中藥以治之。（按王好古云。此一條法甚活。）

病人兩手脈沈遲。或緩或緊。皆是胃中寒也。若寸脈短。及力小于關尺脈者。此是陰盛陽虛也。或胸膈痞悶。腹中脹痛。身體俱急。手足逆冷。急宜温之。若立春以後。至清明以前。宜温中湯主之。清明以後。至芒種以前。宜七物理中丸主之。

温中湯

附上丁香皮　厚朴兩各一　乾薑　白朮　陳皮　丁香枝分各二

右爲末。每服二錢。水一盞。入葱白三寸。荊芥五穗。煎至七分。去滓。熱服。如三服未快。及手足逆冷。嘔吐。更加附上丁香皮二分。乾薑一分。炮。

橘皮湯

陳皮　厚朴兩各一　藿香三分　白朮　葛根各二分

右爲末。每服二錢。水一盞。入薑一塊。如棗大。劈破。同煎至七分。去滓。熱服。如兩三服後未快。手足逆冷。嘔吐不止。加半夏三分。丁香枝半兩。加葱白三寸同煎熱服。

七物理中丸

人參三分　生薑屑二兩　藿香三分　白朮二兩　桔梗三分　葛根二分

右爲細末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。水一盞。煎至七分。和滓熱服。如兩三服後未快。及手足逆冷。嘔吐。加半夏二分。乾薑二分。炮。

病人兩手脈沈細無力。蠼三部脈力停。亦是陰氣盛也。更不須候寸脈短。治之。或胸膈痛。身體拘急疼痛。手足逆冷。宜用温中藥和之。（按王好古云。此一條不須候寸脈短。一例發表。）若立春以後。至清明以前。宜厚朴湯主之。清明以後。至芒種以前。宜白朮湯主之。芒種以後。至立秋以前。宜桔梗湯主之。立秋以後。至白露以前。宜人參湯主之。白露以後。至秋分以前。宜生薑湯主之。

厚朴湯

當歸　丁香枝　厚朴　甘草　乾薑各半兩　細辛分一　人參三分

右爲末。煉蜜於丸。如彈子大。每服一丸。水一盞。煎至七分。和滓熱服。如三五服後。脈尙細。及寸脈未有力。加葱白三寸同煎。（按王好古云。此一條言寸脈小者。陽不及。九天也。加葱以通鬱。）

白朮湯

白朮　半夏　當歸　厚朴　生薑屑各半兩　船上丁香皮分三

右爲末。每服二錢。水一盞。入生薑一塊。如棗大。劈破。同煎至七分。去滓熱服。如三五服後。未有力。及寸

脈力尙小。加細辛半兩。葱白三寸。同煎服。

橘葉湯

橘葉　半夏　厚朴各半兩　薤香　葛根

右爲末、每服三錢、水一盞、入薤一塊、如雀大、勞破同煎、至七分、去滓熱服。如三五服後、脈力尙小、手足通冷、加細辛三分。

病人胸膈滿悶時時嘔逆。支節疼痛。兩脇下痛。腹中鳴。此是停飮。宜二苓湯主之。

二苓湯

赤苓　猪苓　白朮　桂枝各半兩　滑石一兩　白豆仁　通草各一分　丁香皮三分　陳皮三分

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓熱服。小便未快。加罌粟三分。嘔未止、加半夏半兩。寒甚、加葱白三寸。（按王好古云。此與李思訓調小便例同。）

病人八九日後、服汗下藥太過。兩手脈沈細而無力。好蹉足臥。多惡明與人聲。身有衆起。時時發戰。一如瘧證。宜羊肉湯主之。

羊肉湯

當歸　牡蠣　芍藥各一兩　龍骨半兩　桂枝二分去皮　黑附子二兩海內去皮臍

右杵爲粗末、每服用末二兩。羊臑肉四兩。生薑二兩。葱白五寸。同剉爛。以水五升同煮。至二升半。以來。淨絞去滓。分作三盞服。

病人服藥胸中滿者。此是上焦有陽也。或藥力太過。上焦陰氣併入下焦也。雖是下焦積寒。今上焦陽盛。更難投溫下焦藥也。當用炭灰或桑柴灰二三升許。入好醋拌和。乾濕得所。於銚內炒令灰熱。以帛包裹。置臍下熨之。頻換灰包。當令熱。以腹不痛爲度。或初用灰熨。病人不肯受者勿聽。但令極熨之。勿住。灰包如因灰包熨後得下利一兩行。或小便二三升。或微有汗。此是陰氣外出。或下泄也。當勿疑之。病輕者乃得瘥愈。

病人三部脈沈。寸脈力小於關尺。爲陰盛。當投溫中藥以消陰氣。溫中藥者。厚朴橘皮人參白朮藿香當歸乾薑細辛之類是也。（按王好古陰證略例海藏云。霜露山嵐雨濕之氣。而飮冷水。或食生冷瓜果。內傷於脾。或口渴小便不通。或大過用涼藥。或下早。或誤下。或發汗過多。或病人素虛。或年高之人。或小兒。或婦人產後。或大病後。或久病後。或吐瀉後。或亡血後。或新產後。或金瘡後。或汗後。或吐後。或下後。或發汗後。或利後。或厥逆。或嘔噦。或腹痛。或泄瀉。或小便淋閉。或大便閉結。或小便利。或大便利。或小便赤。或大便黑。或小便白。或大便白。或小便清。或大便清。或小便濁。或大便濁。或小便頻數。或大便頻數。或小便不禁。或大便不禁。或小便不通。或大便不通。或小便不利。或大便不利。或小便不出。或大便不出。或小便不行。或大便不行。或小便不止。或大便不止。或小便不調。或大便不調。或小便不順。或大便不順。或小便不快。或大便不快。或小便不和。或大便不和。或小便不正。或大便不正。或小便不節。或大便不節。或小便不常。或大便不常。或小便不定。或大便不定。或小便不固。或大便不固。或小便不收。或大便不收

飢、或喜、或妄或不大便。此乃瘀熱走於下焦。因而畜成積血。及令小腹滿也。傷寒論云。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。宜桃仁承氣湯。又論太陽病。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞕滿。小便自利。瘀熱在裏。故也。抵當湯主之。太陽病。身黃脈沈結。少腹鞕、小便自利。其人如狂者。血證諸也。抵當湯主之。又傷寒有熱。小腹鞕滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。宜抵當湯。又陽明證。其人喜妄者。必有畜血。屎雖鞕。大便反易。其色必黑。宜抵當湯主之。仲景立此數方、治畜血而云小便自利。乃血證諸也。病人本因瘀熱結在膀胱。即小便不利。但血證瘀熱漸證而併走於下。遂積聚於下焦。血積既多。陽氣乃極。極則必反。陽氣既消。陰乃來復。血遇陰氣。凝結如豚肝。其血常冷。膀胱爲冷血所冰。乃澁滯易過。即小便自利也。故仲景曰小便自利。血證諸也。

病人有畜血證。若現餘證。而小便未利。是陽氣尚盛。而血未足也。即未可便投湯丸治之。候小便利。乃可投藥。凡治畜血證。抵當湯丸方中。皆用蠐螬水蛭及桃仁之類。蓋是破血藥。若非此藥。則不能下之。今之用者。往往投之太過。蓋爲不審其病之輕重。與其人之老少強弱也。如遇畜血證。與仲景方對。即可全用其法治之。若病勢少輕。人又老弱。微微抵當湯丸。別用破血藥治之亦可。知此變通。庶免後患。熙寧五年壬子。長安縣君李氏年六十餘。自來瘦弱。患傷寒病至第九日。變成畜血。來召。及到。診之。兩手脈沈遲細。力微。腑冷。小腹滿。昏迷不省人事。再三詢其所由來。其主病者云。自得病後。服發汗藥。至第六日喜妄發狂。至第八日。身體冷。臍下滿。昏迷失次。既得此言。知爲畜血證矣。又問病人曾證小便否。曰。病後小便常不利。愈甚疑之。因用紙釘內其兩鼻中。逐哽數聲。及令驗之。小便已自利。余謂向來小便不利者。因其年老氣弱。不能降下也。若端坐候小便自利。不以法驗之。豈不後時耶。但血雖積聚日多。若投仲景抵當湯丸。藥勢太過。血下之後。尚有藥之餘力。因而損壞臟腑。變成血痢。大爲後患。患因別立地黃湯主之。連投之。其血大下。次日乃愈　元豐四年辛酉。親戚孫氏。妊娠第八月。患傷寒。至第五六日。熱極。第七日墮胎。不及半日。惡露遂絕。至中夜。臍下滿。喜妄。譫語。至次日。兩手脈沈細數。腹冷。小便自利。此畜血證也。但病人年少。血氣充盛。又因產畜血。深邀仲景抵當湯力薄。別處生漆湯。令服三次。共服藥一升半。其血乃下。病遂愈。今之醫者治畜血病。依仲景方。投抵當湯丸。若病熱輕。及病人年老氣弱。其血大下之後。病雖得愈。往往下血不止。何況太平之人。五臟柔脆。若不任攻擊。水蛭之藥。非仲景藥之過也。乃醫者不審其時代。又不量病人之強弱也。若參酌其病能做。做抵當湯丸方。別立藥治之。即免病人後患矣。今人纔見畜血。將謂不可調治。即將抵當湯丸倍增而投之。或連綿而投之。畜血雖出。而血益水蛭勢力未盡。遂損壞腸胃。日夕疗痛。下血不止。至于不救者。十中八九矣。醫者既見病人下血。云是臟毒。尚不知自己投藥太過之罪也。又盛衰論篇云。診有十度。形度脈度。臟度肉度。筋度俞度。陰陽氣血。人病自具。注云。診備盡陰陽虛盛之理。則人病自知之。又五常政大論篇云。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。無使過之。傷其正也。若醫者能參酌藥力。量病投之。乃爲良工矣。

血證諸篇

生地黃湯

生地黃（自然汁一升）生薤（自然汁一升）如無用小薊汁半升）蓮藕（二十箇去足）蓮藕（二十箇去足）蜜（一合）桃仁（卅箇）藍葉（一握切令）乾作末水蛭（十箇炒）乾漆（炒煙盡）大黃（一兩蟅如）蛴螬（十箇炒黃）

右藥入水三升半。慢火煮及二升以來。放冷。分二服。投一服至半日許。血未下。再投之。此比抵當湯丸力勢甚輕。如無地黃與藕汁。計升數。添水同煎。

病人七八日後。兩手脈沈細而數。或關前脈力大。臍下滿。或狂走。或喜妄。或譫語者。不大便。小便自利。若病人年少氣實。血凝難下。恐抵當湯丸力不能及之。宜生漆湯主之。

生漆湯

生地黃汁一升如無）大黃（二兩）犀角（半兩）桃仁（三十箇）

右藥用水三升。好酒一升。慢火煮及三升以來。傾出。溫去滓。再入鍋內。點生光漆一兩半。再煮至二升。即住火。淨濾去滓。分作三服。每投一服。候半日許。血未下。再投一服。候血下。即止後服。如無生地黃汁。更添水一升同煎。

陰黃證篇

傷寒病發黃者。古今皆爲陽證治之。往往投大黃梔子薤皮黃連茵陳之類。亦未嘗得十全。愚每于懷衛二郡間。其病傷寒人有黃證。風俗相傳。多以新汲水浴之。其病其愈者。有不愈者。又於邢磁二郡間。病傷寒人有黃證。風俗相傳。以熱湯浴之。或以湯漬布。搭其胸腹。或以湯盛瓮中。坐在臍下熏之。其病亦有愈者。有不愈者。其醫流莫能知其不愈之故。見此二端。愚深惑之。且黃病既爲陽證。何故以湯浴之。既有得愈者。豈不謂治黃病有證者乎。嘗遍討諸醫書。並無熱藥治黃病。及無治陰黃法。且仲景治傷寒論。辨陽明病脈者。傷寒發汗已。身目爲黃。所以然者。寒濕在裏不解。故也。不可以下之。於寒濕中求之。仲景只云。於寒濕中求之。即不曾別立方藥。後有傷寒類要治黃疸門中。夫熱發黃已久。變成桃花色。心下有堅。嘔逆不下。飲食小便極赤少。四肢逆冷。脈深沈極微細。連者不宜服茵陳湯。除大黃。與生地黃五兩。服湯盡。消息看脈小浮出。形小見。不甚沈微。便可治也。脈浮見者。黃當明。不須桃花色。浮指下自覺也。此類要中。但只云脈浮大可治。脈沈細不可治。又於本卷治陰黃門中。病源。陰黃候陽氣伏。陰氣盛。熱毒加之。故身面色黃。頭疼而不發熱者。名爲陰黃也。論中雖稱陽伏陰盛。即可服茵陳散。方內卻用茵陳大黃梔子黃連紫雪之類。亦皆寒藥。卻與本病相遠。且陰黃者。乃心病也。心火爲濕所折。即遍身發黃。與傷寒病裏夾傷寒病發黃本自脾弱。水來凌犯。又胃中空虛而變爲黃。是與陰黃不同耳。病人始於二三日務求汗下。爲勝。或服發汗溫中藥太過。加以厚衣蓋覆。仍於陰濕不通風處坐臥。或以火劫之。變爲黃病。此乃陽黃也。當投寒藥以治之。藥證仲景論中悉具。

病人三五日後服下藥太過。虛其脾胃。亡津液。引水漿。脾土爲陰濕加之。又與暑相會。至第六七日變爲黃病。此乃陰黃也。當投湯藥治之。治法具在後說。

病人六七日。兩手脈沈遲細微。肢體逆冷。皮有粟起。時或嘔吐。舌上白胎。身發黃。煩躁。欲於泥水中臥。小便赤少。醫者見病人黃生。更不審察脈理。便投寒藥。其病愈甚。愚因而別撰成治陰黃病證并方六七首。凡十餘年。不逢病陰黃者。自疑無證。元豐二年己未六月中。滄陽人趙宗顏病傷寒。至六七日發黃。來召。及到。診之。其脈沈細遲。無力。皮膚涼發躁。欲於泥中臥。嘔噦。小便澀。再三問病人曰。得非服下藥太過乎。病人曰然。才見此深哉之。此乃陰黃也。先投茵陳蒿皮湯。不及劑。嘔噦止。次日投小茵陳湯半劑。脈漸出。不欲於泥水中臥。次日又投茵陳附子湯半劑。四肢發熱。小便二三升。當日中大汗。元豐五年壬戌五月中。滄陽趙宗秀才病傷寒。亦是醫者投下藥太早。及投解利涼藥過劑。至六七日。轉發黃病。至第七日來召。及到。診之。兩手寸脈不見。關尺脈沈遲細微。腹滿。小便澀。四肢遍身冷。面如桃花。一身盡黃。先投茵陳茯苓湯半劑。小便得利。夾服茵陳四逆湯。脈出。四肢熱。日中黃先退。次日大汗。當年假此證者十餘人。不能一一寫錄。恐向日所思陰黃病處方六首。初盧不能用。今既治數人。皆得中病。不可不傳焉。

傷寒病。若枝之。每過太陰或太陽司天歲。若下之太過。往往變成陰黃。何也。温中篇內七物理中丸、温中湯可也。

司天寒化太過。即水來犯土。丑未歲。太陰濕土司天。土氣不及。即脾氣虛弱。又水來凌犯。多變斯證也。醫者宜審察之。

病人大病差後勞復者。多是因熱所致。即再成傷汗之疾。其間有胃中寒者。只可與温中藥。即更不傳汗也。温中藥者何。用温中篇內七物理中丸、温中湯可也。

病人大病後勞復者。纔二三日以後。脈沈實。若寸脈差大於關尺脈。或寸關尺脈三部力停。皆可下之。況勞復病。只有失下。並無下之太早。亦無下之太過。何者。蓋胃中有瘀熱在也。更與熱飲食相合。若下之晚。及下藥力少時。雖得汗。汗罷。成勞復。至于三四發也。

病人二三日以後。服下藥畢。至第八九日未汗。纔見有證。即便宜下之。不可後時也。凡治勞復患。投下藥。不得與傷寒初受病人一法治之也。

病人若因飲食所勞復。傷至第二三日。兩手脈沈實有力。或寸脈力大於關尺脈。或胸已上濈然汗出者。當急下之。宜大承氣湯。如一服下利未快。即再作調胃承氣湯服之。並用仲景方。

病人勞復。三四日以後。兩手脈沈數大有力。或發熱煩躁。咽乾面黑。齒垢。或曰中及遍身皆發黃者。宜丹砂丸主之。

茵陳蒿湯治病人服附子湯、證尚未退、及脈浮者。

茵陳蒿莢湯治病人服附子湯、證尚未退、及脈浮者。

茵陳蒿莢　木通各一兩　乾薑　茵陳各一兩半　當歸三分　附子一兩一枚破

右爲末。水四升。煎取二升。去滓。放温。分作三服。

勞復證篇

傷寒病。大汗後餘熱未盡。或飲酒。或食肉。或吃熱食太過。與熱毒相逢。便成勞復之患。熱論篇云。熱病已愈。時有所遺者。何也。岐伯曰。諸遺者熱甚而強食。故有所遺。若此者。智病已衰。而熱有所藏。因其穀氣相薄。兩熱相合。故有所遺也。帝曰。治遺奈何。岐伯曰。視其虛實。調其逆從。可使必已。夾又岐伯曰。病熱少愈。食肉則復。多食則遺。此其禁也。注云。是所謂戒食勞也。熱雖少愈。猶未盡除。脾胃氣虛。未能消化。內堅食駐。故熱復生。復謂復舊病也。仲景傷寒論。大病差後勞復者。枳實梔子湯。又傷寒差已後。更發熱。小柴胡湯主之。脈浮以汗解之。脈沈實以下解之。又大病差後。喜唾。久而不了了。胸上有寒。當丸藥温之。宜理中丸。

大病差後勞復者。多是因熱所致。即再成傷汗之疾。其間有胃中寒者。只可與温中藥。即更不傳汗也。温中藥者何。用温中篇內七物理中丸、温中湯可也。

病人大病差後勞復者。纔二三日以後。脈沈實。若寸脈差大於關尺脈。或寸關尺脈三部力停。皆可下之。況勞復病。只有失下。並無下之太早。亦無下之太過。何者。蓋胃中有瘀熱在也。更與熱飲食相合。若下之晚。及下藥力少時。雖得汗。汗罷。成勞復。至于三四發也。

病人二三日以後。服下藥畢。至第八九日未汗。纔見有證。即便宜下之。不可後時也。凡治勞復患。投下藥。不得與傷寒初受病人一法治之也。

病人若因飲食所勞復。傷至第二三日。兩手脈沈實有力。或寸脈力大於關尺脈。或胸已上濈然汗出者。當急下之。宜大承氣湯。如一服下利未快。即再作調胃承氣湯服之。並用仲景方。

病人勞復。三四日以後。兩手脈沈數大有力。或發熱煩躁。咽乾面黑。齒垢。或曰中及遍身皆發黃者。宜丹砂丸主之。

丹砂丸

丹砂水飛過　馬牙硝各半兩　砂石一兩　麥門冬去心　厚朴各三錢　金箔三十片　牛黃一錢

右合研勻。用濕紙裹爛粳米飯於溝火內燒。紙乾爲度。和前藥丸如彈子大。每服一丸。砂糖水化下。如黃甚者。煎茅根湯放冷。入砂糖一塊如棗大。同化下。如黃未退。來日再服之。

病人用承氣湯下之後。至四五日。兩手脈沈數有力。或潮熱。或譫語者。更宜下之。或再投承氣湯。又胃中若不甚實。宜用丹砂散下之。

丹砂散

丹砂一錢、研　朮粉一錢、氣弱者減半　人參半兩

右舍研勻，用桃柳心共一把許，細切研爛，紐取自然汁，入砂糖一塊如棗大，更入新汲水，通前成半盞，化開藥下之，如經一晝夜不利，動再作服之，此藥奇妙，不得與尋常下藥爲比也，如冬月無桃枝柳條，用生地黃一兩剉碎，水一升，煎取半升，化藥服。　凡中諸藥毒者，用新銅錢一箇，口內含之，一二時辰許，如錢色黑，是中毒驗也，用丹砂一粒，鹹粉一錢，砂糖一塊如棗大，同研勻，以藍葉取自然汁化下，日一服，重者不過三服，當下血如豚肝也，如無藍葉汁，只用藍葉末三錢匕，入在藥內，以東流河水同調下。　凡小兒陽痫，潮搐涎盛，及角弓反張者，量大小，每用丹砂丸一粒，分作三服，只用砂糖水化下，如要利動，每服入鹹粉，加少許同化下，此藥極有神效，今特錄示，諸病於此者，恐醫流懆治，傷寒汗下，若血黃病及勞復也。

四庫未收書

傷寒九十論提要

宋白沙許叔微知可述．先列病證．後論治法．剖析頗精．是書諸家書目俱未著錄．伏讀欽定四庫全書總目云．叔微書．詞辭簡雅．不諧於俗．故明以來不甚傳布．是則因傳本稀少．故藏書家俱未之見歟．陳振孫曰．叔微有傷寒治法八十一篇．未知即此書否．

張金吾藏書志．

傷寒九十論　目錄

辯桂枝湯用芍藥證第一．
桂枝加厚朴杏子湯證第三．
大青龍湯證第五．
陽明蜜兌證第七．
膀中出血證第九．
傷寒暴死證第十一．
大柴胡湯證第十三．
傷寒自解證第十五．
筋惕肉瞤證第十七．
桂枝加葛根湯證第十九．
剛痓證第二十一．
太陰證第二十三．
指甲黑青證第二十五．
桂枝加附子湯證第二
麻黃湯證第四．
陽明可下證第六．
腎虛陽脫證第八．
陰中伏陽證第十．
夜間不眠證第十二．
陽明急下證第十四．
熱入血室證第十六．
陽明當下證第十八．
葛根湯證第二十．
厥陰證第二十二．
太陽中喝證第二十四．
瞳目直視證第二十六．



舌卷囊縮證第二十七
邪入大經證第二十九
桂枝證第三十一
少陽證第三十二
兩感證第三十四
三陽合病證第三十五
發熱惡寒證第三十七
結胸可灸證第三十九
漏風證第四十一
妊娠傷寒胸脇證第四十三
狐惑證第四十五
澤家發黃證第四十七
太陽瘀血證第五十
辯少陰脈緊證第五十二
下瞤血證第五十四
陰陽交證第五十六
叉手冒心證第五十八
揚手躡足證第六十
舌上滑胎證第六十二
傷寒脅痞證第六十四
發班證第六十六
陽結證第六十八
胃熱嘔吐證第七十
兩脛逆冷證第七十二
汗後搐搦證第七十四
傷寒下利證第七十六
面垢惡寒證第七十八
傷寒表實證第八十
寒熱類傷寒證第八十二
脾約證第八十四
太陽陽明合病證第八十六
兩手撮空證第八十八

褥衣摸牀證第二十八
太陽桂枝證第三十（內併論桂枝麻黃各湯三證）
少陰證第三十二
兩感證第三十四
白虎加人參湯證第三十六
結胸可下證第三十八
汗後吃逆證第四十
小便出血證第四十二
風溫證第四十四
發黃證第四十六
黃入清道證第四十八
太陽瘀血證第五十
辯少陰脈緊證第五十二
下瞤血證第五十四
陰陽交證第五十六
叉手冒心證第五十八
揚手躡足證第六十
舌上滑胎證第六十二
傷寒脅痞證第六十四
發班證第六十六
陽結證第六十八
胃熱嘔吐證第七十
兩脛逆冷證第七十二
汗後搐搦證第七十四
傷寒下利證第七十六
面垢惡寒證第七十八
傷寒表實證第八十
寒熱類傷寒證第八十二
脾約證第八十四
太陽陽明合病證第八十六
兩手撮空證第八十八

下利服承氣湯證第八十七
血結胸證第八十九
濕溫證第八十八
六陽俱絕證第九十

傷寒九十論

宋　白沙許叔微知可述

辯桂枝湯用芍藥證一

馬亭道庚戌春病發熱頭疼鼻鳴惡心自汗惡風宛然桂枝證也時賊馬破儀眞三日矣市無芍藥目擊國醫採芍藥以利劑一醫曰此赤芍藥耳安可用也予曰此正當用再服而微汗解

論曰仲景桂枝加減法十有九證但云芍藥聖惠方皆稱赤芍藥孫尚藥方皆曰白芍藥聖惠方太宗朝翰林王懷隱編集孫兆爲國朝醫師不應如此背戾然赤者利白者補予嘗以此難名醫皆愕然失措謹案神農本草辨芍藥主邪氣腹痛利小便通順血脈利膀胱大小腸時行寒熱則全是赤芍藥也又桂枝第九證云微寒者去赤芍藥蓋懼芍藥之寒也惟芍藥甘草湯一證云白芍藥調其兩脛拘急血寒也故用白芍藥以補非此時也靈樞云濇者陽氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒傷寒脈濇身熱無汗蓋邪中陰氣故陽有餘非麻黃不能發散中風脈浮多汗身寒蓋邪中陽故陰有餘非赤芍藥不能刮其陰邪然則桂枝用芍藥赤者明矣當參百證歌

桂枝加附子湯證二

有一李姓士人得太陽因汗後汗不止惡風小便澀足攣曲而不伸予診其脈浮而大浮爲風大爲虛此

證。桂枝湯第七證也。仲景云。太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子三投而汗止。再投以芍藥甘草而足得伸。數日愈。

論曰。仲景第十六證云。傷寒。脈浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯以攻其表。此誤也。得氣不周。老壯當下。不爾別請醫占。主病者曰。審可下。一醫所治。予以大承氣湯。半日殊未知。診其病。察其證宛然在。予曰。藥曾盡否。主者曰。恐氣弱不禁。但服其半耳。予曰。再作一服。親視飲之。不半時間。索溷器。先下燥糞十數枚。次瀉洩一行。穢不可近。未離已中汗矣。澈然周身一時頃。汗止身涼。諸苦遂除。次日予自鎮歸。病人索補劑。予曰。服大承氣湯得差。不宜服補劑。補則熱仍復。自此但食粥。旬日可也。故予治此疾。終身止大承氣一服而愈。未有若此之捷。

論曰。老壯者形氣也。寒熱者病邪也。脈有熱毒。雖其年邪可下。然有羸壯年可溫。要之與病相當。乃失此。是致速斃也。謹之。

陽明蜜兌證七。

庚戌仲春。艾道先染傷寒。近旬日。熱而自汗。大便不通。小便如常。神昏多睡。診其脈。長大而虛。予曰。陽明證也。乃兄景先曰。舍弟仝似李大夫證。又屬陽明。莫可行承氣否。予曰。雖爲陽明。此證不可下。仲景陽明自汗。小便利者。爲津液內竭。雖堅不可攻。宜蜜兌導之。作三劑。三易之。先下燥糞。次洩溏已而汗解。

論曰。二陽明證雖相似。然自汗小便利者。不可潟。潟五藏爲無津液也。然則傷寒大證相似。脈與證稍異。通變爲要。仔細斟酌。正如以格局看命。雖年月日時皆同。貴賤窮通不相侔者。於一時之頃。又有後深也。

陽明證。

朱保義撫辰。庚戌春。權監務。予一日就務謁之。見擁爐忍痛。若不禁狀。予問所苦。小腸氣痛。求予診之。予曰。六脈虛浮而緊。非但小腸氣。恐別生他疾。越數日再往。臥病已五日矣。人其室。見一市醫孫倚者供藥。予診之曰。此陰毒證。腎虛陽脫。脈無根帶。獨見於皮膚。黃帝所謂懸絕。仲景所謂警如奏上肥也。早晚喘急。未幾而息已高矣。孫生倚與兩附湯灸臍下。予曰。雖盧扁之妙無及矣。是夕死。故論傷寒以眞氣爲主。論曰。傷寒不拘陰證陽證。陰毒陽毒。要之眞氣強壯者易治。眞氣不守。受邪幾重。便有必死之道。何也。陽證宜下。眞氣弱則下之便脫。陰證宜溫。眞陰弱。溫之則客熱便生。故醫者難於用藥。非病不可治也。主本無力也。經曰。陽勝則身熱。腠理閉。喘粗。爲之俛仰。汗不出而熱。齒乾。以煩冤。陰勝則腹滿死。帝曰。調此二者奈何。岐伯曰。女子二七天癸至。七七止。男子二八精氣溢。八八止。婦人月事。以時下。故七欲損也。男子精。欲滿不欲竭。故八欲益也。如此則男婦身常無病。無病精氣常固。雖有寒邪。易於調治。故曰二者可調。是知傷寒眞氣壯者易治也。

腈中出血證九。

一婦人得傷寒數日。咽乾。煩渴。脈弦細。醫者汗之。其始衄血。繼而腈中出血。醫者驚駭而退。予曰。少陰強汗之所致也。蓋少陰不當發汗。仲景云。少陰強發汗。必動其血。未知從何道而出。或從口鼻。或從耳目。是也。何曰。今煩躁甚。予投以大青龍湯三投。汗解。

論曰。桂枝治汗出惡風。麻黃治無汗惡寒。青龍治無汗而煩。三者皆欲下厥上竭。此爲難治。仲景云無治法。無藥方。予投以蓋附湯數服。血止。後得微汗愈。

論曰。本少陰證而誤汗之。故血妄行。自腈中出。若服以止血藥。可見其標。而不見其本。予以治少陰之本。

陽明可下證六。

一武井李姓。在宣化作譬。傷寒五六日矣。鎮無醫。抵郡召予。予診視之曰。脈洪大而長。大便不通。身熱無

而用甘草附湯故血止而病除

陰中伏陽證十

鄉人李信道權獄官得病六脈俱沈不見深按至骨則弦細有力頭疼身温煩躁手指末皆冷中滿惡心更兩醫突而發者不曉但供調藥予往視之曰此陰中伏陽也仲景方無此證而世人患者多若用熱藥以助之則陰邪隔絶不能引導其陽反生客熱用寒藥則所伏眞火愈見銷鑠須是用破陰丹行氣導水奪眞火之藥使火升水降然後得汗而解予令以冷鹽湯下破陰丹三百丸作一服不半時煩躁狂熱手足漸温譫語躁擾非家人能制予曰汗證也須臾稍緩昏睡濈然汗出自悟遂以方中藏紅花末(桃仁和丸桐子大每服三十丸)冷鹽湯送下(破陰丹方出身涼而病除方破陰丹)

傷寒暴死證十一

己未歲一時官病傷寒發熱狂言煩躁無他惡證四日死或者以爲兩感然其證初無兩感證候是歲得此疾三日四日死者甚多人竊怪予歎之曰是運使然也己爲土運土運之歲上見太陰蓋太乙天符爲貴人中執法者其病遂而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死謂之異也又曰臣爲君則逆運則其病危其害速是年少宮土運木氣大旺邪中貴人故多暴死氣運當然何足怪也

夜間不眠證十二

陳姓士人初得病身熱脈浮自汗醫者麻黃湯汗之發熱愈甚夜間不得眠頭重煩悶怔忡恍然中風證強言汗之過也仲景云太陽病發汗後大汗出胃中乾燥不得眠其人欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈予先與猪苓湯次投之以當歸地黃麥門冬芍藥烏梅之類爲湯飲之不汗而愈

論曰黃帝鍼經曰衛氣者晝行陽夜行陰衛氣不得入於陰常行於外行於外則陽滿滿則陽盛而不得入於陰陰虛則夜不得眠也今津液內竭胃中乾燥獨惡於陽陰無所歸其候如此故以當歸地黃補血用烏梅以收之故不汗自愈

大柴胡湯證十三

羽流蔣尊病其初心煩喜嘔往來寒熱醫初以小柴胡湯與之不除予診之曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能除也仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡二服而病除

論曰大黃爲將軍故荷澤潛熱在傷寒爲要藥今大柴胡湯不用誠誤也王叔和曰若不加大黃恐不名大柴胡須是酒洗生用乃有力昔後周姚僧垣名善醫上因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥至尊年高不宜輕用上弗從服之遂不起及至元帝有疾諸醫者爲至尊至貴不可輕服宜用平藥僧垣曰脈洪而實必有宿食不用大黃病不能除上從之果下宿食而愈此明合用與不合用之異也

陽明急下證十四

鄉里豪子得傷寒身熱目痛鼻乾不眠大便不通尺寸俱大已數日矣自昨夕汗大出予曰速以大柴胡下之衆醫駭然曰陽明自汗津液已竭當用蜜兌何故用大柴胡藥予曰此仲景不傳妙處諸公安知之

予力爭竟用大柴胡兩服而愈

論曰仲景論陽明云陽明病多汗者急下之人多謂己自汗若更下之豈不裹裏俱虛也論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈盛也世人率讀予以爲不然仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏凡稱急者急不之有三處幾從汗出多未至津液乾燥速下之則爲徑捷免致用蜜兌也蓋用蜜兌已是失下出於不得已耳若智中識得了了何疑殆之有哉

傷寒自解證十五

閩人李宗古得疾口中氣熱舌乾屈體臥足冷舌上有胎予診之尺寸俱緊或者謂氣熱口乾疑其陽勝證足臥足冷疑其陰勝而又陰陽俱緊是誠可疑也若不熟讀仲景方法何能治予曰尺寸俱緊是寒邪勝也仲景云陰陽俱緊法當清邪中於下焦又云陰陽俱緊口中氣出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人發熱手足温者此爲欲解蓋已上證候皆是陰盛陽弱故仲景云勿妄治者誠恐後人之疑也故予以抑陰助陽温劑與之緊脈漸退四體和不汗而自解矣

熱入血室證十六

辛亥二月毗陵學官王仲景妹始傷寒七八日晝寒喉中漬響如鋸目瞑不知人病勢極矣予診之詢其未晝寒以前證即在側曰初病四五日夜間譫語如見鬼狀予曰得病之初正值經候來否答曰經水方來因身熱病作而自止予曰此熱入血室也仲景云婦人中風發熱經水適來晝日明了夜則譫語發作有時此爲熱入血室證者不曉例以熱藥補之遂致譫語不利三焦不通漬潮上脫喘急息高予曰病熱極矣先當化其漬後當除其熱撫汗而自解矣予急以一呷散投之兩時間漬定得睡是日遂省人事自次日以小柴胡湯加生地黃三投熱除撫汗而解

筋惕肉瞤證十七

鄉里市人姓京鬻繩爲業謂之京繩子其子年近三十初得病身微汗脈弱惡風醫者誤以麻黃湯汗之汗遂不止發熱心痛多煩悸夜間不得眠臥譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫者以鎮心驚風藥治之予視之曰強汗之過也仲景云脈微弱汗出惡風者不可服若服桂枝湯可收之仲景云太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之予三投而大病除次以清心丸竹葉湯解餘毒數日差

陽明當下證十八

鄉人李生病傷寒身熱大便不通煩渴譫冒一醫以巴豆藥下之下之雖得通利而病宛然如舊予觀之曰陽明熱結在裏非大柴胡承氣不可巴豆止去寒積豈能蕩滌邪熱温毒耶與進大柴胡三服而通利中夜汗解

論曰仲景一百十三方丸者有五理中陷胸抵當麻仁烏梅也理中陷胸抵當皆大諍丸煮化而服之與

湯散無異。至於麻仁治脾約。烏梅治澤瀉。故須小丸逐下部。其他胃入經絡。逐邪毒破堅癖。瀉血潤燥。隨之額。必惡湯劑也。未聞巴豆小丸以下邪毒。且如巴豆性熱大毒。療病熱人服之。非徒無益。而爲害不小矣。李生慢服不死。其大幸歟。

桂枝加葛根湯證十九。

庚戌。建康徐南強。得傷寒。背強。汗出。惡風。予曰。桂枝麻黃各半湯與之。予曰。非其治也。是謂項強兒汗出愈加。予曰。得非仲景三方乎。曰然。予曰誤矣。是方有麻黃。服則愈見汗多。林億謂止於桂枝加葛根湯也。予以瓜蒂散治之。一呷而愈。

葛根湯證二十。

論曰仲景論喝有三證。一則汗出惡寒。身熱而渴。此太陽經中喝也。一則發熱惡寒。身疼痛。其脈弦細芤遲。一則夏月傷冷水。水行皮中。身熱。疼痛重而脈微弱。不可下。不可行溫鍼。上二證皆宜用白虎加人參湯後一證。宜用瓜蒂散方治。不見於本論。而見于金匱要略。其脈證云。治太陽中喝。身熱。疼痛而脈微弱者。夏月傷冷水。水行皮中所致。宜瓜蒂散。蓋謂此也。

指甲黑青證二十一。

市人楊姓者。病傷寒。無汗。惡風。項雖屈而強。醫者以桂枝麻黃各半湯與之。予曰。非其治也。是謂項強兒。凡葛根證也。三投。濈濈然微汗解。翌日項不強。脈已和矣。

論曰。何謂兒。兒如嬰孩。雖屈而強也。謝復古謂病人羸弱。須遷兒而起。非是。此與成氏解不同。

剛痙證二十一。

宣和戊戌。表兄秦雲者。病傷寒。身熱。是寒。頸項痙攣。搐。醫作中風治。見其口噤故也。予診其脈實而有力。而又腳攣。嚙齒。大便不利。身燥。無汗。予曰。此剛痙也。先以承氣湯下之。次以葛根湯調之。愈矣。

論曰。五常政大論曰。赫曦之紀。上羽與正徵同。其收齊。其病痙。蓋戊太陽寒水羽也。戊火運。正徵也。太過之火。上見太陽。則天氣且剛。故其收齊。而人病痙者。過氣然耳。火木遇故牟病。此證多剛痙。

厥陰證二十二。

壁中一中表病。渴甚。飲水不止。胃中熱移。氣衝心下。八九日矣。醫者或作中風治。或作貴豚。予診之曰。證假厥陰。曾吐蟲否。曰昨曾吐蛔。予曰審如是。厥陰證也。可喜者脈來沈而緩。遲耳。仲景云厥陰爲病消渴。氣上撞心。飢不欲食。食則吐蛔。又曰厥陰病。渴欲飲水者。少少與之愈。今病人飲水過多。乃以茯苓甘草湯。尤杜枝湯治之。得止。後投以烏梅丸。數日愈。

論曰。病至厥陰。若太陽傳者。三陰三陽皆已遍。惟恐脈強。則肝邪盛。脾土受剋。故舌卷縮而死。今脈來遲緩而沈。則土脈得氣。脾不受剋。故有可喜之道。仲景云衛氣和。名曰緩。營氣和。名曰遲。遲緩相搏。名曰沈。又曰寸口脈緩而遲。緩則陽氣長。其色鮮。其顏光。其聲商。遲則陰氣盛。骨髓滿。精血生。肌肉緊。營衛供行。剛柔相濟。豈非安脈耶。

太陰證二十三。

曹生初病傷寒六七日。腹滿而吐。食不下。身溫。手足熱。自利。腹中痛。嘔。惡心。醫者謂之陽多。尚疑其手足熱。恐熱畜於胃中而吐嘔。或見吐利而爲霍亂。請予診。其脈細而沈。質之曰。太陰證也。太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。予止以理中丸。用仲景云如雞子黃大。晝夜投五六枚。繼以五積散。數日愈。

論曰。予見世醫論傷寒。但稱陰證。湯證。蓋仲景有三陰三陽。統一證中。又有偏勝多寡。須是分開看。在之額。必惡湯劑也。未聞巴豆小丸以下邪毒。且如巴豆性熱大毒。療病熱人服之。非徒無益。而爲害不小矣。李生慢服不死。其大幸歟。

桂枝加葛根湯證二十四。

庚戌。建康徐南強。得傷寒。背強。汗出。惡風。予曰。桂枝麻黃各半湯與之。予曰。非其治也。是謂項強兒。汗出愈加。予曰。得非仲景三方乎。曰然。予曰誤矣。是方有麻黃。服則愈見汗多。林億謂止於桂枝加葛根湯也。予以瓜蒂散治之。一呷而愈。

論曰。仲景論喝有三證。一則汗出惡寒。身熱而渴。此太陽經中喝也。一則發熱惡寒。身疼痛。其脈弦細芤遲。一則夏月傷冷水。水行皮中。身熱。疼痛重而脈微弱。不可下。不可行溫鍼。上二證皆宜用白虎加人參湯後一證。宜用瓜蒂散方治。不見於本論。而見于金匱要略。其脈證云。治太陽中喝。身熱。疼痛而脈微弱者。夏月傷冷水。水行皮中所致。宜瓜蒂散。蓋謂此也。

指甲黑青證二十五。

乾明俗人。病傷寒。目赤。顏渴。咽乾。欲水無算。腰疼。身熱。脈沈而微細。此少陰證也。恣縱不慎。忌飲水。遂致疼氣結聚。身如破杖。數日變爲陰毒矣。脈見於皮膚上。大而且虛。鼻中如煙煤。甲青。須臾發喘。是夕死。

論曰。扁鵲云手足爪下青黑者死。宋迪陰證訣云。陰毒盛。則指甲黑青。病至此則爲不治。

瞳目直視證二十六。

田仲容得傷寒數日。身熱。手足時厥。腹滿。瞳目直視。狂言不識人。予診之曰。證假厥陰。曾吐蟲否。曰吐蛔。予曰不可治也。心腎俱絕矣。夜死。

論曰。仲景云直視搖頭。此爲心絕也。又曰狂言反目直視。此爲腎絕也。目者五藏精華之所聚。今直視而不瞬。則知五藏有死絕矣。故不治。

舌卷縮證二十七。

句容縣豪子李姓。初得傷寒。手足冷。氣上衝心。飢不欲食。脈緊而弦。予診曰。厥陰惡具。脈有刑。最忌舌卷縮。翌日卷舌而死。

論曰。內經云。厥陰者肝也。肝者筋合之。筋者聚於陰器。絡於舌本。厥陰之氣。故舌卷縮也。

循衣摸牀證二十八。

僕真一婦。病傷寒。八九日。發熱。昏悶不識人。手循衣縫。摸牀。譫語。不識人事。他醫不識。或汗或利。旬日增甚。予診之曰。此脈澀而小便不利。不可治也。翌日死。

論曰。華陀云。病人循衣摸牀譫語。不可治。仲景云傷寒。吐下後不解。不大便。五六日。發潮熱。不識人。循衣摸空。徵喘。直視。脈弦者生。脈澀者死。又云小便利者可治。今脈澀。小便不利。見其兩死。不見一生。吾莫能爲也。

邪入大經證二十九。

維揚謝廉中任饒眞酒官。咽乾。煩渴。臟腑。身熱。脈細而微急。予診視之。曰此眞少陰證也。六經之中。少陰證治。少陰病傳之經絡。此證有補瀉法。仲景論者用承氣。補者用四逆。誤之則相去遠矣。此證當温。勿以水證爲疑也。予適以事出境。後七日歸。則爲他醫汗之矣。經絡飽虛。邪毒流入大經之中。手足瘈瘲。如癎狀。其家狼狽求救。予曰不可治也。予驗此甚多。是謂邪入太經。不旋踵。其家已哭矣。

太陽桂枝證三十。

鄉人吳德甫得傷寒。身熱。自汗。惡風。鼻出涕。關以上浮。關以下弱。予曰此桂枝證也。仲景法中第一方。而世人不究耳。但公服之。一啜而微汗解。翌日諸苦頓除。公曰仲景法如此徑捷。世人何以不用。予應之曰仲景論裝證。一則桂枝二則麻黄三則青龍。桂枝則治中風。麻黄治傷寒。青龍治中風見寒脈。傷寒見風脈。此三者人皆能言之。而不知用藥對證之妙處。故今之醫者多不曉用。無足怪也。且脈浮而緩。中風也。故頭痛發熱。身疼腰痛。骨節皆疼。惡風無汗而喘。仲景以麻黄對之。至於中風脈緊。傷寒脈浮緊。仲景皆以青龍對之。何也。予嘗深究三者。審於證候。脈息。相對用之。無不應手而愈。何以言之。風傷衛。衛氣也。寒傷營。營血也。營行脈中。衛行脈外。風傷衛。則風邪中於陽氣。陽氣不固。發越而爲汗。是以汗出而表虛。故仲景用桂枝以發汗。苟藥以利其血。蓋中風病在脈之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故桂枝證云。令遍身漐漐。微似有汗者。益佳。不可如水淋漓。病必不除。是知中風不可大發其汗。發其汗。反動營血。邪乘虛而居中。故病不除也。寒傷營。則寒邪干於陰血。而營行脈中者也。寒邪客於脈中。非特營受病也。邪自內作。則併於衛氣犯之。久則浸淫及骨。是以汗不出而熱煩冤。仲景以麻黄大發其汗。又以桂枝辛甘助其發散。欲捐其內外之邪。營衛之病耳。大抵二藥皆發汗。而桂枝則發衛之邪。麻黄併衛與營而治之。仲景桂枝第十九證云。病常自汗出者。此爲營氣和。營氣和者外不諧。以衛氣不共營氣和諧故耳。營行脈中。衛行脈外。復發其汗。營衛和。則愈。宜桂枝湯。又第四十七證云。發熱汗出者。此謂營弱衛強。故使汗出。欲救風邪。宜桂枝湯。是知中風汗出者。營和而衛不和也。又第一卷云。寸口脈浮而緊。浮則爲風。緊則爲寒。風則傷衛。寒則傷營。營衛俱病也。麻黄湯中併桂枝而用。此仲景之意歟。至於青龍雖治傷寒見風脈。傷風見寒脈。然仲景云。明篇第十證。三陽合病。腹滿身重。難轉側。口不仁而垢。譫語。遺尿。不可汗。汗則謵語。下則額上汗出。手足逆冷。乃三投白虎湯而愈。

白虎加人參湯證三十六。

從軍王武經病。始嘔吐。俄爲醫者下之。已八九日。而內外發熱。予診之曰。當行白虎加人參湯。或云既吐復下。是裏虛矣。白虎可行乎。予曰仲景云。見太陽篇二十八證。若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎加人參湯。證相當也。蓋吐者爲其熱在胃脘。而脈致令虛大。三投而愈。論曰仲景稱傷寒若吐下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱者。人參白虎湯主之。又云傷寒脈浮無汗。發熱不解。不可與白虎湯。又云脈滑爲表有熱。裏有寒。白虎湯主之。國朝林億被正。謂仲景此法。必表裏

少陰證三十二。

有人病傷寒數日。自汗。咽喉腫痛。上吐下利。醫作伏氣。予診之曰。此證可疑。似是之非。乃少陰也。其脈三部俱緊。安得謂之伏氣。伏氣脈必浮弱。謂非時寒冷。著人肌膚。咽喉先痛。次下利者是也。近雖有寒冷不時。然當以脈證爲主。若誤用藥。其斃可待。予先以吳茱萸湯救之。次調之以諸藥而愈。

論曰仲景論伏氣之病。其脈微弱。喉中痛。似傷寒非喉痺也。實咽中痛。今復下利。仲景少陰云。病人手足厥冷。反汗出者亡陽也。此謂少陰證。法當咽痛而復吐利。此證見少陰篇。今人三部脈俱緊。而又自汗。咽痛下利。與伏氣異。然毫釐之差。千里之謬。須講熟此書。精詳分別。庶免疑惑矣。

少陽證三十三。

市人周姓者。同里俱病頭痛發熱。耳聾目赤。胷中滿悶。嘔中見外證胷滿。遂吐之。既吐後病宛然在。又見其目赤發熱。復利之。病不除。惴惴然恟懼。予診視之。曰少陽誤吐下之過也。仲景少陽中風。兩耳無聞。目赤。胸滿而煩者。不可吐下。吐下則驚而悸。此當用小柴胡湯。今誤吐下。遂成懊憹證矣。乃以牡蠣四逆湯調之。以桂枝柴胡各半湯。旬日瘥。

論曰仲景雖云三陽受病。未入於臟者可汗。然少陽脈弦細。則不可汗。將入少陰經也。若誤吐下之。是逆之且當以救逆。先待其悸定。後治餘證。此所謂急其所當先也。

兩感證三十四。

族弟初得病。頭痛口乾煩渴。第三日。予往視之。則已耳聾囊縮。昏冒不知人。脈逆水漿不下矣。予曰遂治後事。是謂兩感證。不可治矣。越三日死。

論曰仲景論傷寒兩感云。凡傷於寒。熱雖甚不死。若兩感於寒而病者。必死。又曰兩感病俱作。治有先後。發表攻裏。本自不同。既云必死。又云治有先後。何也。大抵此病表裏雙傳。誠解俱病。思此者十無一生。故云必死。然仲景豈以已見而重誣後人哉。故有發表攻裏之說。以勉後人。恐萬世後遇大聖而得之。不欲絕望於後人。仲景之心仁矣。

三陽合病證三十五。

有市人李九妻。患腹痛。身體重。不能轉側。小便遺失。或作中濕治。予曰非是也。三陽合病證。仲景云。見陽明篇第十證。三陽合病。腹滿身重難轉側。口不仁而垢。譫語。遺尿不可汗。汗則譫語。下則額上汗出。手足逆冷。乃三投白虎湯而愈。

白虎加人參湯證三十六。

從軍王武經病。始嘔吐。俄爲醫者下之。已八九日。而內外發熱。予診之曰。當行白虎加人參湯。或云既吐復下。是裏虛矣。白虎可行乎。予曰仲景云。見太陽篇二十八證。若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎加人參湯。證相當也。蓋吐者爲其熱在胃脘。而脈致令虛大。三投而愈。

論曰仲景稱傷寒若吐下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱者。人參白虎湯主之。又云傷寒脈浮無汗。發熱不解。不可與白虎湯。又云脈滑爲表有熱。裏有寒。白虎湯主之。國朝林億被正。謂仲景此法。必表裏

字差矣。是大不然。大抵白虎能除傷寒中暍。表裏發熱。故前後證或云裏熱裏寒。皆可服之。宜也。中一證稱裏不解不可服者。以其宜汗發熱。此全是傷寒麻黃與葛根湯證。安可行白虎。林但見所稱裏裏不同。便謂之差。是亦不思不精之過也。

發熱惡寒證三十七。

人患發熱惡寒自汗。脈浮而微弱。予以三服桂枝投之。遂愈。仲景云太陽中風。陽浮而陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。宜桂枝湯。

論曰仲景云假令寸口脈微名曰陽不足。陰氣上入陽中。則淅淅惡寒也。尺脈弱名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱。此謂醫所病而然也。大抵陰不足陽從之。故病或作漏風證。治之不愈。予曰此風溫病。投以婆鞮湯。獨活湯。數日瘥。

風溫證四十四。

己酉歲驕被淮俱疫癘大作。時有王朝奉高夫婦。得疾。身熱自汗。體重。難以轉側。多眠。睡。譫妄。三陽合病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如狂。躁。時瘛瘲。又云陽脈浮滑。陰脈濡弱。更遇於風。變爲風溫。大抵溫氣大行。更遇風邪。則有是證。令當春夏。病此者多。醫作傷寒論風治。非也。不是火不可下。不可大發汗。而仲景無藥方。古法謂可取手少陰火。是厥陰木。隨經所在而取之。故用婆鞮湯。獨活湯。最爲宜。若發熱無下證者。當用知母石膏湯。誤汗之。則防己黃芪湯救之。

狐惑證四十五。

句容縣東豪子李姓者。得傷寒數日。村落無醫。易師巫者五六日矣。或汗下。雜治百出。遂成壞病。予時自江北避寇。近伏江左。求宿於其家。夜半聞呻吟聲。詢之。云患傷寒。逾旬矣。予爲診視。其脈見於上下將習已盡。蝕。聲嘶。面赤。舌上白胎。齒無色。予曰病名狐惑。殺人甚急。乘燭爲作雄黃丸瀉心湯。投之。數日瘥。

發黃證四十六。

五月。避地維揚東面里沙中。一豪子病傷寒八九日。身體洞黃。鼻目皆痛。兩髆及項頭腰皆強急。大便澀。小便如金。予診曰脈緊且數。其病脾先受溼。暑熱蘊蓄於是。太陰之經。宿穀相搏。鬱蒸而不得泄。故使頭面有汗。項以下無之。若鼻中氣冷。寸口近寧無脈。則死。今脈與證相應。以茵陳湯調五苓散與之。數日瘥。

溼家發黃證四十七。

人病身體疼痛。面黃。喘。滿。頭痛。自能飲食。大小便如常。或者多以茵陳五苓散與之。予診其脈。大而虛。鼻塞且煩。其證如前。則非溼熱與宿穀相搏。乃頭中寒溼。仲景云疼痛發熱而黃。面喘。頭痛。鼻塞而煩。其脈大。自能飲食。腹中和。無病。病在頭中寒溼。故鼻塞。納藥鼻中則愈。而仲景無藥方。其方見水壺瓶繫證云。治天行熱毒。通貫臟腑。沈鼓骨髓之間。或爲黃疸。須瓜蒂散。瓜蒂二七枚。赤小豆如大豆許。內鼻中。縮鼻。當出黃水。慎不可吹入鼻中深。（文煥按水字疑有誤）

黃入清道證四十八。

夏有高師病黃證。鼻內痠疼。身與目如金色。小便赤澀。大便如常。則知病不在臟腑。今眼睛疼。鼻額痛。則

妊娠傷寒腳腫證四十三。

里巷一婦人妊娠。得傷寒。自腰以下腫滿。醫者或謂之阻。或謂之腳氣。或謂之水分。予曰此證受胎脈也。病名曰心實。當利小便。醫者曰利小便。是作水分治。莫用木通草蘆桑皮否。曰當瀉勞宮關元穴。醫大駭曰此出何家書。予曰仲景玉函經曰。婦人傷寒妊娠。及七月。腹滿。腰以下如水溢之狀。七月太陽當養不養。此心實。當瀉勞宮及關元。以利小便。則愈。予教令刺穴。途差。

風溫證四十四。

己酉歲驕被淮俱疫癘大作。時有王朝奉高夫婦。得疾。身熱自汗。體重。難以轉側。多眠。睡。譫妄。三陽合病。或作漏風證。治之不愈。予曰此風溫病。投以婆鞮湯。獨活湯。數日瘥。

論曰仲景云見太陽病脈緊。太陽病。發熱而渴。不惡寒者爲溫病。若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如狂。躁。時瘛瘲。又云陽脈浮滑。陰脈濡弱。更遇於風。變爲風溫。大抵溫氣大行。更遇風邪。則有是證。令當春夏。病此者多。醫作傷寒論風治。非也。不是火不可下。不可大發汗。而仲景無藥方。古法謂可取手少陰火。是厥陰木。隨經所在而取之。故用婆鞮湯。獨活湯。最爲宜。若發熱無下證者。當用知母石膏湯。誤汗之。則防己黃芪湯救之。

狐惑證四十五。

句容縣東豪子李姓者。得傷寒數日。村落無醫。易師巫者五六日矣。或汗下。雜治百出。遂成壞病。予時自江北避寇。近伏江左。求宿於其家。夜半聞呻吟聲。詢之。云患傷寒。逾旬矣。予爲診視。其脈見於上下將習已盡。蝕。聲嘶。面赤。舌上白胎。齒無色。予曰病名狐惑。殺人甚急。乘燭爲作雄黃丸瀉心湯。投之。數日瘥。

發黃證四十六。

五月。避地維揚東面里沙中。一豪子病傷寒八九日。身體洞黃。鼻目皆痛。兩髆及項頭腰皆強急。大便澀。小便如金。予診曰脈緊且數。其病脾先受溼。暑熱蘊蓄於是。太陰之經。宿穀相搏。鬱蒸而不得泄。故使頭面有汗。項以下無之。若鼻中氣冷。寸口近寧無脈。則死。今脈與證相應。以茵陳湯調五苓散與之。數日瘥。

溼家發黃證四十七。

人病身體疼痛。面黃。喘。滿。頭痛。自能飲食。大小便如常。或者多以茵陳五苓散與之。予診其脈。大而虛。鼻塞且煩。其證如前。則非溼熱與宿穀相搏。乃頭中寒溼。仲景云疼痛發熱而黃。面喘。頭痛。鼻塞而煩。其脈大。自能飲食。腹中和。無病。病在頭中寒溼。故鼻塞。納藥鼻中則愈。而仲景無藥方。其方見水壺瓶繫證云。治天行熱毒。通貫臟腑。沈鼓骨髓之間。或爲黃疸。須瓜蒂散。瓜蒂二七枚。赤小豆如大豆許。內鼻中。縮鼻。當出黃水。慎不可吹入鼻中深。（文煥按水字疑有誤）

黃入清道證四十八。

夏有高師病黃證。鼻內痠疼。身與目如金色。小便赤澀。大便如常。則知病不在臟腑。今眼睛疼。鼻額痛。則

知病在消道中矣。消道者。華蓋。肺之經也。若服大黃。則必腹脹爲逆。當用瓜蒂散。先含水。次搐之。令鼻中黃水盡。則愈。如其言。數日而病除。

先汗後下證四十九。

己酉夏。一時官病傷寒。身熱頭疼無汗。大便不通。已五日矣。予適自外邑歸城。訪之。見醫者治大黃芒硝。蓋將下之矣。予曰。子姑少待。予適爲診視。視之脈緩而浮。臥密室中。自稱惡風。予曰。病人表證如此。雖大便閉。腹且不滿。別無所苦。何遽便下。於仲景法。須表證罷。方可下。不爾。邪毒乘虛而入內。不爲結胸。必爲協熱利也。予作桂枝麻黃各半湯。糜之以小柴胡湯。猝然汗出。大便通數日愈。

論曰。仲景云。傷寒病多從風寒得之。始裘中風。寒入裏。則不消矣。擬欲攻之。當先解表。方可下之。若表已解。而內不消。大滿大堅。實有燥屎。方可議下。若不宜下而遽攻之。諸疑不可勝數。輕者必篤。重者必死。

太陽瘀血證五十。

仇景裘子儀病傷寒七八日。脈微而沈。身黃發狂。小腹脹滿。臍下如冰。小便反利。醫見發狂。以爲熱毒蓄伏心經。以鐵粉牛黃等藥。欲止其狂躁。予診之曰。非其治也。此瘀血證爾。仲景云陽病身黃。脈沈結。小腹硬。小便不利。爲無血。小便自利。其人如狂者。血證也。可用抵當湯再投。而下血塊數升。狂止。得汗而解。經云。血在下則狂。在上則忘。太陽膀胱絡也。隨經而蓄于膀胱。故臍下脹。自關門會參入大腸。若大便黑者。此其驗也。

陰病陽脈證五十一。

劉中道初得病。四肢逆冷。臍中築痛。身疼如被杖。蓋陰證也。急投金液來復之類。其脈得沈而滑。蓋沈者陰證也。滑者陽脈也。病雖陰而是陽脈。仲景所謂陰證見陽脈生也。於是再灸臍下丹田百壯。謂手足溫。陽回。體熱而汗解。

或問滑脈之狀如何。曰。仲景云翕奄沈名曰滑。古人論滑脈。難云往來前卻。流利展轉。替替然與數相似。又云來若轉豆。去如新瓜。蓋謂此也。

辯少陰脈緊證五十二。

玄華得傷寒六七日。煩。昏。睡多吐嘔。小便白色。白汗出。予診其脈。寸口尺中俱緊。謂曰。寒中少陰經中。是以脈緊。當作少陰治也。仲景云病人脈緊反汗出。亡陽也。屬少陰證。當咽痛而復吐利。蓋謂此也。

有難者曰。脈決以緊爲七表。仲景以緊爲少陰。緊脈爲陰耶。予曰。寸口脈俱緊者。口中氣出。脣口乾燥。踡臥。足冷。鼻中涕出。舌上白胎。勿妄治也。又云緊則爲寒。又云仲爲人所難。緊脈從何而來。師曰。假令亡汗若吐。以肺裏寒。故令脈緊。又曰寸口脈微。尺中緊。其人虛損多汗。由是觀之。則是寒邪入經。結所致。皆虛寒之脈也。其在陽經則浮而緊。在陰經則沈而緊。故仲景云浮緊者名爲傷寒。又云陽明脈浮而緊者。必潮濕。此在陽則脈浮而緊者。仲景又云病人脈陰陽俱緊者。屬少陰。又云寸口脈微。尺脈緊。其人虛損多

汗。則陰當在經不見陽。又云少陰脈緊至七八日。自下利。脈暴微。手足反溫。脈緊反去者。此欲解也。此在陰沈而緊也。仲景云浮爲在表。沈爲在裏。數爲在腑。遲爲在臟。欲知表裏臟腑。先以浮沈遲數爲定。然後兼餘脈而定陽陰也。若於脈訣而言。則疏矣。故予嘗謂傷寒脈者。當以仲景脈爲準法。

青筋牽引證五十三。

吳德甫戊申春病傷寒。先寒後熱。項筋強急。腳跟縮不得伸。醫者欲以麻黃湯除其足縮。予曰。智非治也。此時行疫氣病。爲青筋牽引。投以柴胡地黃湯三服而病已。

論曰。扁鵲云。當治四時受邪氣。而成腠腑陰陽俱病者。若名青筋牽。夏曰赤脈拘。四季中十八日名黃肉。隨毒氣在頭項。使人青筋牽急。故先寒後熱。腳縮不得伸。蓋謂此。夫天行之病。大則流毒天下。小則方次一鄉。亦有遍着一家者。悉由氣運變結。變成乖戾之氣。人命遭之。所成病者。能調護將理。應可免耳。

下膿血證五十四。

遠族人患傷寒。他醫以陰證治之。硫黃附子相繼而進。旬日大腹下膿血。或如赤豆汁。醫尙作少陰證治。復下桃花湯治之。予因診視曰。所誤多矣。表裏虛熱。氣乘虛入腸胃。而又投以燥藥。是以下膿血也。遂投梅煎散。數劑愈。

刺陽明證五十五。

庚戌五月。李氏病傷寒。身熱頭痛無汗。渾身疼痛。脈浮大而緊。予投以麻黃湯。數服。終不得汗。又多用張苗燒蒸之法。而亦不得。予教令刺陽明。少間汗出。漿粟遍身。一時間。是夕身涼病退。

論曰。刺熱論云。熱病先手臂痛。刺陽明而汗出。又曰。刺陽出血如大豆。病已。蓋謂刺也。陽明穴。在手大指內側。去爪甲角。手陽明脈之所出也。刺可入同身寸之一分。留一呼。大凡傷寒熱病。有難取汗者。莫如刺之爲妙。仲景云凡治溫病。可刺五十九穴。素問云病甚者爲五十九刺。其詳在註中。

陰陽交證五十六。

里有張姓者。病傷寒。醫汗之。汗雖出。身熱如舊。予診之曰。得汗宜身涼脈靜。喜食。今脈躁。身熱。不食。狂言。病名陰陽交。不可治也。素問黃帝問有溫病汗出輒復熱。而脈躁。病不爲汗衰。狂言不能食。名何疾。岐伯曰。病名陰陽交。交者死也。人所以汗出者。皆生於穀。穀生於精。今邪氣交爭於骨肉。而得汗者。是邪卻而精勝也。精勝則能食。而不復熱矣。汗者精氣。今汗出而復熱者。是邪勝也。不能食者精無俾也。其死可立而俟也。果半日死。

陰陽易證五十七。

己巳。鄰人王友生。以販京爲業。畜一婢。患傷寒。熱八九日。予爲治之。得汗而愈。未數日。生白病。身熱頭重不欲舉。目中生花。召予視之。予曰。是必傷寒初愈。婦人交接得之。卻令陰頭上必腫。小腹絞痛。然是陰陽易也。生曰。前患者婢子。適謂已安。遂與之交。翌日得此疾。良苦。予曰。失所治。必旺者數寸而死。予作豬鼠

發燒擺散等以利其毒氣。旬日安。

叉手冒心證五十八。

乙巳六月。吉水譚商人寓城南。得傷寒。八九日。心下惕惕然。以兩手捫心。身體振振動搖。他醫以心痛治之。不效。予曰。此汗過多之所致也。仲景云。持脈時。病人叉手自冒心。心下悸。所以然者。以重發汗。虛故如此。又云。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯證。予投黃芪建中。與武及甘草桂枝。漸得平復。

傷寒耳聾證五十九。

戊申年。類試山陽。一時官。病傷寒八九日。耳聾而無聞。楚證少陽治。意謂仲景稱少陽受病。則脅痛而耳聾也。予診之曰。兩手脈弱而無力。非少陽證也。若少陽則渴欲飲水。心煩。俱寐。咽痛。今俱無此證。但多汗鄧。必汗過多所致也。仲景云。未持脈時。令病人欬。而不欬者。兩耳聾無所聞也。所以然者。因重發汗。虛故如此。病家曰。醫者皆大發汗矣。遂投以真武。白朮附子湯。數日。耳有聞而愈。

揚手踏足證六十。

己酉。王仲賢患傷寒。發熱頭痛。不惡風。身無汗。煩悶。脈浮而緊。八九日不退。予診之曰。麻黃證也。所感多熱。是以煩躁。遂投以麻黃湯三服。至暮。煩愈甚。手足躁亂。揚擲不止。或以爲發狂。須用寒藥。予爭之曰。此汗證也。幸勿疑。切忌亂服藥。守一時。須稍定。比寐。少時。中汗出矣。仲景云。至六七日。三部大。手足躁擾者。欲解也。蓋謂此耳。若行寒劑。定是腎殺。

遺尿證六十一。

城南婦人。腹滿身重。遺尿。言語失常。他醫曰不可治也。腎絕矣。其家尤愛撫措。密召予至。則醫尚在座。乃診之曰。何謂腎絕。醫家曰。仲景謂溲便遺失。狂言。反目直視。此謂腎絕也。予曰。今脈浮大而長。此三陽合病也。故爲腎絕。仲景云。腹滿身重。難以轉側。口不仁。譫語。遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足厥冷。白虎證也。今病人證語者。以不當汗而汗之。非狂言反目直視。須是腎絕脈方可言此證。乃投以白虎加人參湯。數服而病悉除。

舌上滑胎證六十二。

丁未五月。鄉人邢原暉病傷寒。寒熱往來。心下鬱悶。舌上白滑胎。予曰。舌上滑胎。有數證。有陰陽脈緊。鼻出涕者。有藏結而不可治者。有溫瘧。丹田有熱者。有陽明脅下堅者。此證屬陽明。宜梔子湯吐之於前。小柴胡繼於其後。數日汗解而愈。

蚵血證六十三。

唯陽張士美病傷寒七八日。口燥飲水而不嚥入。俄而蚵血。脈浮緊。身熱。醫者云傷寒。脈浮緊。不發汗。因致蚵血者。屬麻黃湯。予曰不可。古人雖云當汗不汗。熱化爲血。此證亦有不可汗者。仲景云陽明病。口燥。但欲飲水而不嚥者。必發蚵。蚵家不可發汗。發汗則額上陷。不得眠。不能瞬。此只可用犀角湯。地黃湯。若

當時行麻黃必額上陷。直視不眠也。

傷寒脅痛證六十四。

蓬齋賢病傷寒數日。兩脅挾臍痛不可忍。或作奔豚治。予視之曰。非也。少陽證也。若少陽則渴欲飲水。心煩。喜嘔。渴往來寒熱。默不能食。胸脅滿悶。少陽證也。始太陽傳入此經。故有是證。仲景云。太陽病不解。傳入少陽。脅下滿。乾嘔者。小柴胡湯主之。三投而痛止。續得汗解。

傷寒溫瘧證六十五。

友人孔彥輔病傷寒。身大熱。頭痛。自汗。惡熱。陽明證也。此公不慎將理。病未除。當風取涼。以自快。越半月。寒熱大發。作予再視之。曰。爲壞病。溫瘧矣。仲景云。若十三日以上。更虛羸氣。變爲他病者。當依傷壞病證面治之。若脈陰陽俱盛。重感於寒。變成溫瘧。脈之變證。方治如法。乃小柴胡湯之類。加桂枝治之愈。

論曰。往來胥見一士人施瘧方。以楞雖陽市肆。柴胡白虎之類也。俗人不問是何瘧證。例用前方。往往反變大疾。嗚呼。將欲濟人。反致損人。豈理也哉。予嘗謂瘧證最多。有暑瘧。食瘧。脾瘧。肺瘧。腎肝心胃亦有瘧。各各不同。安得一概與柴胡白虎湯耶。誤治尚可擬議。惟脾寒中暑二證。若水火不相將。素問曰。夏傷於暑。秋爲痎瘧。又曰。夏暑汗不出者。秋成風瘧。始因伏暑。得秋氣乃發。故先熱後寒。或熱多寒少。頭目昏痛。盧則發戰。汗出一時而止。蓋心惡暑氣。心爲君。君暑伏於內。中豈比脾寒而厚朴草果所能驅。溫瘧而柴胡黃芩所能止也。非砒霜腦麝之屬不能入。故暑瘧脾寒患者多。而醫者不識。妄投以寒藥。真氣先受病。所以連綿不已也。予嘗精究瘧證一病。須詳審諦當。然後行藥。十治十中。無有失者。衆人以瘧爲難療。予獨以爲易治。要在別其證類。識其先後耳。因論溫瘧。言及此。亦欲使患者知藥不可妄投也。素問瘧論甚詳。當精視之。

發斑證六十六。

族有乳媼。患傷寒七八日。發斑。肌體如火。脈洪數而牢。心中煩滿不快。俄而變赤黑斑。其家甚懼恠。予曰此溫毒也。溫毒爲病最重。而牢固爲邁。是誠可憂也。仲景云。傷寒脈洪數。陰脈實大。更遇溫熱。變成溫毒。溫毒最重也。故斑疹生。心下不快。痞悶。途以升麻玄參湯與之。日夜四五服。斑退而愈。

論曰。華陀云。傷寒五日在腹。六日在胃。入胃則可下也。若熱毒未入於胃。胃爛然熱入胃。要須復下之。不得留在胃中也。胃若實。爲致此病三死一生。其熱微者。赤斑出。劇者黑斑出。亦斑出者五死一生。黑斑出者十死一生。但若人有強弱耳。病者至日。不以時下之。熱不得泄。亦胃爛斑出。蓋此是惡候。若下之早。則熱乘虛入胃。或下遲。則熱入不得泄。須是乘機不可失時。庶幾輕可也。

臟結證六十七。

甲辰。鹽商艤舟江次。得傷寒。胃脘痞。連臍下旁不可忍。飲食不進。予診之曰。此非結胸。乃臟結也。不可救矣。臟結者。寸脈浮。關脈細小沉緊者。尚有白胎。痛引小腹。則死。仲景云。痛引小腹入陰經者死。次日痛引

陽結證六十八。

豫章劉商人傷寒發熱口苦咽乾腹滿能食大便閉醫作陽明治召予視同坐予問醫曰何以見證屬陽明醫曰仲景云陽明病若能食名曰中風不能食名曰傷寒又曰少陽陽明者胃中煩大便難是審茲三者全是陽明證也予曰陽明之脈長而實中風者必自汗今證雖陽明脈反見數而身無汗果可作陽明治否醫無以應予曰以僕觀之所謂陽結也今計其日已十六日矣來日當病劇當與公治之其家疑而不決來日病果大作頭召予曰是陽結證也仲景云脈有陰結陽結何以別之答曰其脈浮而數能食不大便此爲胃名陽結也其脈沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結期十四日當劇今病者十七日而劇者是其候也乃投以大柴胡兩啜而病除矣

論曰仲景云脈來累累如循長竿者名曰陰結滿滿如車蓋者名曰陽結脈來累累如循長竿者名曰陰結滿滿如車蓋則是浮是數之狀仲景所謂審取象矣然則陽結何以十七日當劇陰結何以十四日當劇蓋十七日老陽少陽之數七七九計十六更進一數陽之數而其道常饒又陽數奇故也老陰之數六少陰之數八八六計十四日不進者陰主靜而其道常乏又陰數偶也如此益庶消息營衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾便愈醫者在座難之曰虛則補其母實則瀉其子此虛則補其子也予曰出千金方論子不知虛勞之證乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛則補其母也千金方心勞甚者補脾氣以益其心脾旺則咸於心矣此勞則補其子也蓋母生我者也子繼我助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣證證受陰同義方治其勞則補其助我者與荀子未有子富而父貧同義故二者補法各自有理醫唯唯而退

汗後猶瘧證七十四。

李操大夫病傷寒發熱而口渴赤氣上衝服滿大小便閉無汗脈緊而浮予令服大承氣湯他醫以小柴胡湯與之不驗又以大柴胡湯與之亦不效又增大柴胡湯大劑大便通下燥屎得愈乃詒曰果不須大承氣矣笑曰公苟閉目前而不知貽禍於後病雖瘧必作猶瘧之證後半月忽體生赤斑次日背發腫如盤堅如石痛不堪忍巢以爲背疽腫甚急召予予曰猶瘧之證也若當日服承氣今無此患矣治以數日瘧或者問何以知其猶瘧之證予曰仲景云跌陽脈滑而緊者胃氣強持實蟄強痛還自傷以手把刃坐作瘧蓋病勢有後深藥力有輕重治者必察其病者如何耳疾勢深則以重劑與之疾勢輕則以輕劑與之正如持衡細銖不偏也不然焉用七方十劑今病人毒邪如此深須藉大黃朴硝蕩滌臟腑經絡毒氣利三二行則邪毒皆去今醫小心謹慎又不能了了見得根源但以大柴胡發汗而脈虛弱所以弦遲芤細皆虛脈而可知矣

便得安瘥不知遺禍於後必猶瘧當時若聽予言豈有斯患

面垢噩寒證七十五。

一尼病頭痛身熱煩渴躁診其脈大而虛問之曰小便赤背惡寒毛竦酒酒然面垢中暑也醫作熱病治但未敢服藥予投以白虎湯數日愈

論曰仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤遲何也荼問曰寒傷形熱傷氣暑傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所以弦遲芤細皆虛脈而可知矣

傷寒下利證七十六。

呂適得傷寒自利腹滿不煩不渴嘔吐頭痛予診趺陽脈大而緊曰太陰證也若少陰下利必渴今不渴故知太陰證仲景云自利不渴屬太陰蠲治數日愈

論曰或問傷寒何以診趺陽予曰仲景稱趺陽脈大而緊者當卽下利脈經云下利脈大而緊者今日愈仲景論趺陽脈九十一處皆因脾胃而設也且如稱趺陽脈滑而緊則曰胃實緊乃脾弱跌陽脈浮而濇則曰浮爲吐逆水穀不化濇則食不得入趺陽脈緊而浮浮則腹滿緊則絞痛趺陽脈不出則曰脾虛上下身冷膚硬則皆脾胃之設可知矣大抵外證腹滿自利嘔惡吐逆之類審是病在脾胃而又參決以趺陽之脈則無失矣其脈見於足趺之陽故曰趺陽仲景證世人遑手而不及足

傷寒閉目證七十七。

有人傷寒得傷寒惡寒發熱口中氣熱如火不口七八日矣面目閉不言開予診其脈陰陽俱緊是必汗之不息順得傷寒惡寒發熱口中氣熱如火不口七八日矣面目閉不言開予診其脈陰陽俱緊是必汗之

而復下之故也。此壞證矣。病家曰。一醫於三日前汗之不愈。一醫復下之。而目閉矣。遂投以小柴胡湯。五
嗽而愈。
論曰或者何以知其汗下而目閉。予曰仲景稱傷寒發熱。口中氣勃勃然。頭痛目黃。若下之則目閉。又云
傷寒脈陰陽俱緊。寒甚發熱。目赤。脈多晴不瞑。醫復汗之。咽中傷。若復下。則兩目閉。此壞證。須小柴胡湯。
調之愈。

傷寒表實證七十八。

豹法病傷寒。身熱頭痛。予診之。曰邪在表。此表實證也。當汗之。以麻黃湯數日愈。
論曰或問傷寒因虛。故邪得以入之。今邪在表。何以爲表實也。予曰古人稱邪之所湊。其氣必虛。譬面不
去爲病則實。蓋邪之入也。始因虛。及邪居中反爲實矣。大抵調治傷寒。先要明表裏虛實。能明此四等。則
仲景三百九十七法。可坐而定也。何以明之。有表實。有表虛。有裏實。有裏虛。有表裏俱實。有表裏俱虛。予
於表裏虛實百證歌中。嘗論之矣。仲景麻黃湯類。爲表實而設也。桂枝湯類。爲表虛而設也。裏實。亦氣之
類。裏虛。四逆理中之類。表裏俱實。所謂陽盛陰虛。下之則愈也。表裏俱虛。所謂陰盛陽虛。汗之則愈也。

手足逆冷證七十九。

酒家朱三者。得傷寒六七日。自頭以下無汗。手足厥冷。心下滿。大便祕結。或者見其通冷。又汗出滿悶。以
爲陰證。予診其脈沉而緊。曰此證誠可疑。然大便結者爲虛結也。安得爲陽。脈雖沉緊。爲少陰證。然少陰
證多矣。是自利未有祕結。予謂此半在表。半在裏也。投以小柴胡湯。大便得通而愈。

一醫欲用蜜導。病家相知凡三五人。各主其說。紛然不定。最後請予至。問小便如何。病家云小便頻數。乃
診六脈。下及趺陽脈浮且澀。予曰脾約證也。此屬太陽陽明。仲景云太陽陽明者脾約也。仲景又曰趺陽
脈浮而澀。浮則胃氣強。澀則小便數。浮澀相搏。大便則鞕。其脾爲約者。大承氣大柴胡恐不當。仲景法中
次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者半死半生也。扁鵲望齊侯而逃。其斯之謂歟。

脾約證八十二。

一豪子郭氏。得傷寒數日。身熱頭疼。惡風。大便不通。臍腹膨脹。易數醫。一醫欲用大承氣。一醫欲大柴胡。
一醫欲用蜜導。病家相知凡三五人。各主其說。紛然不定。最後請予至。問小便如何。病家云小便頻數。乃
診六脈。下及趺陽脈浮且澀。予曰脾約證也。此屬太陽陽明。仲景云太陽陽明者脾約也。仲景又曰趺陽
脈浮而澀。浮則胃氣強。澀則小便數。浮澀相搏。大便則鞕。其脾爲約者。大承氣大柴胡恐不當。仲景法中
次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者半死半生也。扁鵲望齊侯而逃。其斯之謂歟。

寒熱類傷寒證八十一。

一尼病惡風。體倦。午寒午熱。而赤心煩。時或有汗。他醫以傷寒溫瘧治之。見其寒熱往來。時方疫氣大作
也。大小柴胡雜進。數日愈甚。轉劇。予診之曰。兩手不受邪。厥陰脈弦長而上魚際。此非傷寒。乃陰動不得
陽也。此正與倉公治一繩女病同。投以抑陰等藥。數日愈。

格陽關陰證八十三。

張奎患患傷寒八九日以上。吐逆。食不得入。小便往來不通。醫作胃熱而吐。將人參朮。則小便不通也。予
診其脈。見寸上二溢。面尺覆關中伏而不見。乃斷之曰。格陽關陰證也。陽溢於上。不得下行。陰犯於下。不

得上達。中有關格之病。是以屢汗而不得汗也。予投以透膈散。三啜而吐止。小便利而解。

論曰。或問何謂格陽關陰。答曰。難經云。關以前動者。陽之動也。脈當見九分而浮。過者。法曰太過。減者。法曰不及。遂入尺爲覆。爲內關外格。此陰乘之脈也。又曰陰氣太盛。陽氣不得營。故曰格。陰陽俱盛。不能相營也。故曰關格。關格者不得盡期而死矣。素問曰人迎四盛以上爲格陽。寸口四盛以上爲關陰。人迎與寸口俱盛四倍以上。爲關格。仲景云在尺爲關。在寸爲格。關則小便不利。格則吐逆。又跌陽脈浮而澀。伏則吐逆。水穀不化。澀則食不得入。名曰關格。由是言之。關脈沉伏而澀。尺寸有覆溢者。關格病也。何以言之。天氣下降。地氣上升。在卦爲泰。泰者通也。天氣不降。地氣不升。在卦爲否。否者閉也。今陽不降。上魚際爲溢。故其病吐逆。名爲外格。陰不得上浮入尺爲覆。故其病小便不通。爲內關。此關格之異也。

太陽陽明合病證八十四。

有豪子病傷寒。脈浮而長。喘而胃滿。身熱頭疼。腰脊強。鼻乾。不得眠。予曰太陽陽明合病證。仲景法中有三證下利者爲根湯。不下利嘔逆者加半夏。喘而胃滿者麻黃湯也。治以麻黃湯得汗而解。

論曰或問傷入之次第。自太陽陽明少陽太陰少陰厥陰何哉。說者謂陽主生。故足太陽水。傳足陽明土。土傳足少陽木。爲微邪。陰主殺。故太陰土傳少陰水。水傳足厥陰木。爲賊邪。少陰水傳厥陰木。安得爲賊也。故予以爲不然。素問陰陽離合論云。太陽根起于至陰。結于命門。名曰陰中之陽。陽明根起于厲兌。名曰陰中之陽。少陽根起于竅陰。名曰陰中之少陽。太陰根起于隱白。名曰陰中之陰。少陰根起于涌泉。名曰陰中之少陰。厥陰根起于大敦。名曰陰之絕陰。大抵傷寒始因中之氣得之于陰。是以止傳足經者。是陰中之陽。陽中之陰。亦自然之次第也。故此篇因黃帝問三陰三陽之離合。岐伯白聖人南面而立。前曰。厥明而推之。且以太陽爲開。陽明爲闔。少陽爲樞。太陰爲開。厥陰爲闔。少陰爲樞。六經不得相失。則其序有授矣。不特此也。以六氣在天而考之。厥陰爲初之氣。少陰爲二之氣。太陰爲三之氣。少陽爲四之氣。陽明爲五之氣。太陽爲六之氣。此順也。逆而言之。則太陽而後陽明。陽明而後少陽。少陽而後太陰。太陰而後少陰。少陰而後厥陰。傷寒爲病。在氣則逆而非順。自太陽而終厥陰也。

懊憹怫鬱證八十五。

士人陳彥夫病傷寒八九日。身熱無汗。喜飲。時時譫語。因下利後。大便不行三日。非煩非躁。非塞非痞。終夜不得眠。但心煩曉會處。或時發一聲如獸息之狀。醫者不曉是何證。但以寧心寬腸等藥。不效。召予診視。兩手關脈長。按之有力。乃曰懊憹怫鬱證也。此胃中有燥屎。宜與承氣湯服之。下燥屎二十枚。次復下潦漿。得利而解。

論曰仲景云陽明病下之。心中懊憹而微煩。胃中有燥屎。可攻。宜承氣湯。又云病者小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。怫鬱不得眠者。有燥屎也。承氣湯主之。蓋屎在胃則胃不和。胃不和則臥不安。此所以夜不得眠也。仲景云胃中燥。大便堅者。必譫語。此所以時時譫言也。非煩非躁。非塞非痞。所謂心中

懊憹也。然口歎息而時發一聲。所謂水氣怫鬱也。燥屎得除。大便通利。陰陽交和。是以其病得除。

兩手撮空證八十六。

市人張某年可四十。病傷寒。大便不利。日晡發熱。手循衣縫。兩手撮空。目直視急。更三醫矣。皆曰傷寒最惡證也。不可治。後召予。予不得已往診之。曰此誠惡候。染此者十中九死。仲景雖有證而無治法。但云脈弦者生。證者死。況經吐下。雖予用藥。證以藥興。若大便得通。而脈強者。庶可料理也。遂用小承氣湯與之。一投而大便通利。諸疾漸退。漸退。脈且微弦。半月得痊。

論曰或問下之而脈得弦者生。何也。答曰金匱玉函經云循衣摸牀。妄撮。怵惕不安。微喘直視。脈弦者生。證者死。微者但發熱譫語。承氣湯與之。余嘗觀錢仲陽小兒決法。手循衣領。及亂捻物者。肝熱也。此證正與仲陽所列在陽明部。陽明胃也。肝有邪熱。乘于胃經。故以承氣湯瀉肝。而得強脈。則平而和。胃且堅不受。此胃生之理也。予嘗謂仲景論不通諸醫書。以發明醫與。而專一經者。未見其能也。須以古今方書。發明仲景微意。

下利服承氣湯證八十七。

客有病傷寒。下利。身熱。神昏多困。譫語。不得眠。或者見其下利。以譫語爲鄭聲。背陰虛證也。予診其脈曰此承氣湯證也。衆皆愕然曰下利服承氣。仲景法乎。答曰仲景云下利而譫語者。有燥屎也。屬小承氣湯。乃投以小承氣。得利止。而下燥屎十二枚。俄得汗解。

論曰內經云微者逆之。甚者從之。逆者正治。從者反治。從少從多。觀其事也。帝曰何謂反治。岐伯曰寒因寒用。通因通用。王冰以爲大熱內結。注瀉不止。熱宜寒療。結伏須除。以寒下之。結散利止。此寒因寒用也。

濕溫證八十八。

丙午歲。西人張皓。季夏得疾。胃項多汗。四肢時冷。頭痛。譫語。予診其脈。關前濡。關後數。斷曰營作濕溫。蓋先受暑。後受濕。暑濕相搏。是謂濕溫。投以白虎加參。次以白虎苓連。頭痛漸退。足漸温。汗漸止。數日愈。此病名賊邪。誤服藥則死。

論曰或者難云。何謂賊邪。予曰難經論五邪。有實邪。虛邪。正邪。微邪。賊邪。從後來者爲虛邪。從面來者爲實邪。從所不勝者爲賊邪。從所勝者爲微邪。自病者爲正邪。又曰假令心病中風者。心先受邪。而濕勝之。水剋火。從所不勝。斯爲賊邪。五邪之最逆者也。難經有云濕溫之脈。陽浮而弱。陰小而急。濕弱見於陽部。濕氣搏者也。小急見於陰部。暑氣淫蒸也。故經曰暑濕相搏。名曰濕溫。是爲賊邪也。

血結胃證八十九。

丁未歲。一婦思傷寒。寒熱。夜則譫語。曰中見鬼。狂躁不寐。其夫訪予。詢其治法。予曰若經水適來適斷。恐是熱入血室也。越日頒告曰。已作結胃之狀矣。予爲診之曰。若相委信。急行小柴胡湯。尊必愈。前醫不識

論發至此，遂成結胸證，藥不可及也，無已，則有一法，刺期門穴，或庶幾愈，如教而得愈。

論曰：或問熱入血室，何爲而成結胸？予曰：邪入經絡，與正氣相搏，上下流行，或遇經水適來，適斷，邪氣乘虛而入血室，血與邪迫，上入肝經，肝既受邪，則譫語如見鬼，肝病則見鬼，目昏則見鬼，復入膽中，則血結於胃也。何以言之？蓋婦人平居，經水常養肝也，方未孕，則下行之以爲月水，既妊娠，則中斷之以養胎，及已產，則上乘，得金化之以爲乳，今邪逐之併歸肝經，聚於膽中，壅於乳下，非刺期門以瀉，不可也。期門者，肝之膜原，使其未聚於乳，則小柴胡尚可行之，既聚於乳，小柴胡不可用也，譬如囚盜行於閭里，爲邏邏所迫，寇婦處女適啓其門，突入其室，婦女爲盜所迫，直入陰奧以避之，盜踵其踵，必不肯出，乃啓孔道以行，絕焉，血幾其可去也，血結於胃而刺期門，何以異此。

六陽俱絕證九十

一逢官乘舟悉歸，四月風雨，飲食不時，得疾如傷寒狀，頭重自汗，身體悉疼，醫作中風證治，投以荒附薑附等湯，汗不止，單服附子，及灸臍下，亦不止，予往視之，曰六陽俱絕，不可治也。（其汗如珠，連綿不絕。）論曰：難經云六俱氣俱絕者，陰與陽相離，陰陽相離，則腠理開，絕汗乃出，汗出如珠，轉而不流，夕占旦死，旦占夕死，此之謂也。蓋病者之汗，有陽盛陰虛，陰盛陽虛，陽盛者如甘蒸熱病之汗，則流溢如潮，陽絕者如此證，則凝聚而止，假如飯摶之蒸物，出汗而散者，陽盛之類也，假如盛冰於金銀瓦器中，汗出而凝聚不流，陽絕之證也。

二百七行（文瑋按：吃逆宜同乾。）

目錄一百十二行（文瑋按：關臣原作關宣，今從舊本仲景論寒論改。）

傷寒九十論校譌

是書世無刊本，醫家得之，率寫枕中祕，余屢欲刊行，又以原鈔多舛誤處，未得善本校正，人命攸關，非細事也，今夏與徐丈稼甫江君彤甫緒閎他哲，糾正數處，而彤甫復不敢自信，知貝君靜安素習是道，攜往質之，貝君更爲曲證旁參，於是殆可以無憾矣，間有疑假附錄於後，咸豐三年十一月仁和胡珽識。

二百七行（文瑋按：吃字誤。）

三百五行（原作疏，誤。）

本皆一百六行（文瑋按：倩字據舊本作兆，下文當作兆。）

二百一二兩行（附字誤，原作附子。）

三百三行（捐字誤，原作損。）

八百二行（已字誤，原作巳。）

九百六行（文瑋按：京城當作京畿。）

十一百四五兩行（舊本仲景論亦作就，下第九行同。）

十四百七行（舊本仲景論亦作就，文瑋按：字當作使。）

十六百十行（原作嘻，誤。）

十八百八行（原作鬲，誤。）

十七百八行（原作厭，誤。）

二十百三行（原作醫，誤。）

二十一百六行（文瑋按：搏字誤，原作摶。）

二十百三行（文瑋按：當作內。）

五行（文瑋按：心字當有紐字。）

九行（文瑋按：由字當作油，疑高字必誤，夏有高乃人之姓字也，疑誤。）

十一行（文瑋按：水盡當作外盡，是也。）

十五行（原作鳥，誤。）

傷寒九十論續校

目錄二頁八行 校讀云、此原作頭痛、今改、按其并切方海堂圖脊強翹痙光自切、痙字誤、痛字衍、本書二頁十五行 原作小字誤、

三頁五行 蓋字原作蓋字誤、

五頁一行 牀字原作狀字誤、

五頁七行 宛當作宛、宛與菀同也、

八頁二行 處字原作虛字誤、四行 原作下十行 紅出、不字誤、

九頁十二行 ○下之二字疑不應複、

十頁九十兩行 几音殊、殳字幾字並从之、殳字剔下文十一行几几亦同、

十二頁四行 風字原作脈字誤、

三十二頁七行 原作腹字誤、十三行 原作鐵字誤、

三十四頁三行 或者當作或問、

三十七頁三行 傷當作陽、十行 此節至論論脈字衍、

三十八頁六行 浮當作伏、脈下文可知、

傷寒九十論 國校

會稽鏡吾氏葉金鑑輯

附補傷寒九十論 國校

本書四十二頁八行 脈字誤、期字原作金、十行 系字誤、原作金、

校

一頁九行 ○見校讀、

三頁三行 ○見校讀、

九頁十三行 當有止字、

十四頁十四行 聲音出發、

十三頁三行 有誤字、

二十五頁十三行 寒下疑衍一熱字、

十四行 校讀云、今當作今、按今字文義不誤、校讀疑互倒、



重雕元刻傷寒百證歌發微論敘

新編張仲景註解傷寒百證歌五卷，發微論二卷，題曰白沙許叔微知可述。直齋書錄解題云，許叔微傷寒歌三卷，凡百證，皆本仲景注。又有治法八十一篇，仲景脈法三十六圖，類傷寒論二卷，辨類五卷，皆未見。

四庫提要云，叔微字知可，真州人，紹興二年進士，醫家謂之許學士，不知所歷何官也。案傷寒歌即百證歌，三與五篆字之誤。翼傷寒論即發微論也。叔微揚州儀徵人，少孤力學，于書無所不讀，而尤邃于醫，建炎初，胡酋破張遇破真州，已而疾疫大作，知可逼歷里門，視病與藥，十活八九，仕至徽州杭州教官，遷京秩，見影宋抄本乾道庚寅張郯序，及獨醒雜志，西溪叢話，張杲醫說，知可所著類證普濟本事方十卷，宋史藝文志書錄解題，文獻通考，四庫全書，皆著錄，餘俱見于書錄解題，脈法類辨久佚，八十一法當即張月鑑，四庫未收，阮文達張月鑑亦皆未見，惟錢遵王讀書敏求記箸于錄，遵王元葉今歸于余，夫醫家之有仲景，猶儒家之有孔子也，醫書之有傷寒論，猶儒書之有四書也，宋時爲其學者，有成無已之注，李樗之要旨，王實之證治，韓祇和之微旨，龐安常之總病論，朱肱中之活人書，錢聞禮之百問歌，雖皆各有所長，而深且遠，非薄技偏長，執一是之見者所可及也，明萬歷辛亥有喬山日全非，寘改亦復不少，此明人刊板之通病，醫書尤甚者耳，余盧其非傳，後之治醫家言者，由是以求仲景之書，庶幾免殘人之誚乎，

光緒七年歲在重光大荒落季冬之月既生魄歸安陸心源撰，

新編張仲景註解傷寒發微論目錄

卷上

一　論傷寒七十二證候
二　論桂枝湯用赤白芍藥不同
三　論傷寒慎用元子藥
四　論桂枝麻黃青龍用藥三證
五　論兩感傷寒
六　論傷寒以眞氣爲主
七　論治傷寒須依次第
八　論仲景緩遲沉三脈

卷下

九　論表裏虛實
十　論桂枝肉桂
十一　論滑脈

十二　論用大黃藥
十三　論陰不得有汗
十四　論林億疑白虎證有差互
十五　論弦脈陰陽二脈不同
十六　論中風傷寒脈
十七　論表證未能未可下
十八　論中暑脈不同
十九　論傷寒須早治
二十　論發熱惡寒
廿一　論風濕證
廿二　論溫瘧證

新編張仲景註解傷寒發微論卷上

宋　白沙許叔微知可述

論傷寒七十二證候

循衣摸床　仲景云傷寒吐下後不解，不大便五六日至十餘日，發潮熱，不識人，循衣摸床，脈弦者生，濇者死。華佗曰：病人循衣摸牀，脈弦者生，濇者死。聊作云：陰陽俱絕，循衣摸空，妄言者死也。

瞪目直視　仲景云：直視搖頭，此爲心絕。又云：狂言反目，直視，腎絕也。

汗出如油　仲景云：脈浮而洪，身汗如油，喘而不休，此爲命絕也。

兩手撮空　仲景云：吐下不解，大便不利，潮熱，撮床，撮空，若宜大承氣服後，脈弦者生，濇者死。聊作云：陰陽俱絕，撮衣，摸空，妄言者死也。

瘖痙不言　瘖病者，如發癎之狀，瘖痙不言，千金方：熱病七八日，其脈不解不散，當瘖痙，三四日，汗不出者死也。

舌卷囊縮　仲景云：厥陰受病，則舌卷，煩滿而囊縮。聊論云：舌卷囊縮者必死。千金云：陰陽病，脈證俱備，舌出數寸而死。

鼻中煤煙　宋道陸續缺云：陰毒病，深則鼻中黑如煤煙。

指甲黑青　宋道陸續缺云：陰毒甚，則指甲黑，脊痛。聊云：手足爪甲下肉黑者死。

目青見鬼　證經云：脫陰者目青，鬼脫陰者目青。

九竅出血　仲景云：少陰病，咽痛，口燥，寫血，鼻衄，口鼻耳目，是謂下厥上竭，爲難治。

環口黧色　仲景云：環口黧色，柔汗發黃，此爲脾絕也。

轉筋入腹　證候證，轉筋入腹者，鍼灸白湯主之。

吃噫嘔噦　仲景云：寸口脈微而濇，微緊結輪而寒，懊憹，逆噎，嘔吐，寒沫也。又云：脈浮則爲噦，仲景傷寒歌，逆上氣，其脈數者死，謂其形銷飲也。

兩肉拒痛　仲景云：兩肉拒痛，胃中空虛，心下因噎，則爲結胸，此證胸膈也。

發黃直熱　萬金云：陽明病，發熱在裏，必發黃，凡發黃，寸口无脈，鼻氣冷者不可治。

吃噫嘔噦　仲景云：寸口脈微而濇，微緊結輪而寒，懊憹，逆噎，嘔吐，寒沫也。又云：脈浮則爲噦，仲景傷寒歌，逆上氣，其脈數者死，謂其形銷飲也。

兩肉拒痛　仲景云：兩肉拒痛，胃中空虛，心下因噎，則爲結胸，此證胸膈也。

發黃直熱　萬金云：陽明病，發熱在裏，必發黃，凡發黃，寸口无脈，鼻氣冷者不可治。

叉手冒心　仲景云：發汗過多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草湯。仲景云：持脈時，病人叉手自冒心，所以然者，以重發汗虛故如此。

發斑發疹　陽毒面赤斑斑如錦文者，升麻湯。仲景云：風氣相搏，則爲癮疹，身體痒痒者，名瘖風。

頗狂不定　證經云：重陽者狂，重陰者顛。仲景云：太陽病，熱膀胱，其人如狂者，桃核承氣湯，小便利，其人如狂，血證諸也。

耳聾骨痛　仲景云：少陽受病，胸脅痛而耳聾。仲景云：持脈時，其人叉手自冒心，脈因被人強按，而不鼓，必兩耳无聞也，所以然者，以重發汗虛故如此。

上氣喘急　太陽陽明皆有喘證，或水停心下，亦喘，陰證喘者，必喘而加急。

小腹硬滿　小腹硬滿，小便不利者，勝臟有留，熱也，小腹硬滿，小便利者，血證也。

手足逆冷 女子厥逆，謂手足逆冷者，手足逆冷者，手足自温，是愈候也。

大便黑陰 陰謂前陰，男子陰莖，女子陰户，皆有血脈，所以候者，以久病血脈虚微，大便反易，故也。

胸滿氣塞 滿氣塞者，自汗出，惡寒，反倚息短氣，此藏虚也。

外氣惡寒 惡寒者，謂惡小寒在面，皆緩緩正來，名曰氣，邪之來之緩者，故惡寒也。

氣上衝胸 上衝者，氣往來也。

項強几几 項者，頸項也，強几几者，反張出貌也。

脇上下痛 脇在腋下，痛在脇下。

脚緩齒 脚緩者，風濕相搏，筋脈弛緩，故脚緩也。齒者，骨之餘，腎主之。

舌上滑胎 滑胎者，不可食也。又云舌上白胎者，可與白虎湯。又云舌上白胎者，可與調胃承氣湯。

心中懊憹 懊憹者，心中煩，不能安臥，反覆顛倒，欲得吐，不得吐，但欲吐，不能吐，宜梔子豉湯主之。

心下痞硬 痞硬者，滿而不痛，此為痞，氣痞在心下，故曰心下痞硬。

譫語鄭聲 譫語者，謂語言錯亂，前後不倫，如鄭國之音，聽之不了了，故曰譫語鄭聲。

指手撥足 太陽中風，以火劫發汗，邪風被火熱，兩陽相得，其人不能自安，必欲動手足者，名曰指手撥足。

遺尿失溺 遺尿者，小便利而不禁也。失溺者，謂小便不利，溺自出，不覺遺失也。

振振欲擗地 振振者，身體動搖也。擗地者，以頭觸地也。

二便不通 二便不通者，謂大便小便俱不通利也。

上吐下利 上吐者，謂吐逆也。下利者，謂大便泄瀉也。

睡臥略血 睡臥略血者，謂睡臥之時，略有血出，不止為衄血，故曰略血。

漱水不嚥 漱水不嚥者，謂但漱水不嚥，或漱水不嚥者，必渴，或漱水而不能飲，口燥渴也。

額上冷汗 額上冷汗者，謂額上汗出微冷，或額上手指按之有冷汗，陰陽氣不和也。

煩躁發汗 煩躁發汗者，謂太陽病，發汗出後，大煩，不解，反躁煩，因發汗，亡其陽，陽虚，不能制陰，故煩躁也。

因上發作 因上發作者，謂因上焦發作，其人欲吐，不吐，而心煩，因上焦發作，其人欲吐，不吐，而心煩，因上焦發作，其人欲吐，不吐，而心煩，

下利膿血 仲景云少陰下利便膿血者桃花湯主之

吐逆不止 吐有冷熱二證有胃熱吐者有胃冷吐者

面垢背寒 中風則面垢背寒

發汗後腹脹滿者厚朴五物湯下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯又云不轉失氣而下之必腹滿

咳嗽涎盛 咳上焦有熱痰水停心下皆嗽

頭疼惡心 頭疼惡心鼻不痛痛者食積也鼻痛痛者傷寒也

乾嘔食臭 胃中不利心下痞硬乾嘔食臭胸下有水氣者生薑瀉心湯痞心滿痛水者食積也

身痒如蟲行 陽明病當汗而反无汗其身如蟲行皮中之狀為其久虛故也

鼻鳴乾嘔 太陽中風證鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之太陽陽明合病鼻鳴乾嘔者葛根湯主之

酒渐悒悒 仲景云陰氣上入陽中則酒渐悒悒寒也

腰脊疼痛 仲景云一二日太陽受病則頭項痛腰脊強

腹脅時痛 仲景云傷寒五六日中風或腹中痛或脅下痞硬者小柴胡湯又腹中痛小建中湯脅下痛十棗湯

渾身壯熱 仲景云陽明受病則身熱目痛鼻乾不得臥又太陽中風與傷寒皆發熱

以上七十二證或必死或可治淺深雖不同要之皆用赤芍藥不同

論桂枝湯用赤白芍藥不同

仲景桂枝湯加減法凡十有九證但云芍藥聖惠方王惇德等編集孫兆乃累朝醫師不應如此背戾然桂枝湯蓋風傷衛而邪乘之則衛強榮雖不受邪終病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯助其弱故知用白芍藥也榮既弱而不受病乃以非適平也故衛強則榮弱仲景以桂枝發其邪以芍藥斂而設也果此皆用白芍藥而仲景亦止稱芍藥可以赤芍藥瀉之決非仲景意至於小建中為尺遲血弱對證用藥斯過半矣

論傷寒擯用雷子藥

仲景論中百一十三方為田者有五埋中陷胸抵當麻仁烏梅是已埋中陷胸抵當皆大彈丸黃化而服之與湯無異至於麻仁治脾約證烏梅治澼蟲證皆欲必達下部故用小丸堅癖瘀血燥屎之類須憑湯劑以滌除也余見俗醫用小丸藥巴豆以下邪毒而殺人者不可勝數蓋巴豆止導食積而不能去熱毒既下之後藏氣虛而邪毒宛然猶在更再以大黃朴消下之鮮不致斃大抵其必中必當一服而止也故不可不慎歟

論桂枝麻黃青龍川證三證

仲景論表證一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈此三者人皆能言之而不知用藥對病之妙處故今之醫者不效用仲景方無足怪也且脈浮而緩者中風也故薔薔惡寒淅淅惡風翕翕發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而澀者傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘仲景以麻黃對之至於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆以青龍對之何也子嘗深究三者審於證候脈息相對用之無不應手而愈何以言之風傷衛衛氣也寒傷榮榮血也榮行脈中衛行脈外風傷衛則風邪于陽氣陽氣不固發越而為汗是以自汗而表虛故仲景用桂枝以發其邪用芍藥以助其血蓋中風則病在脈之外其病稍輕雖同曰發汗特解肌之藥耳故桂枝證云會逼身榮榮微似有汗者益佳不可令如水流離病必不除是知中風不可大發其汗大發其汗則反動榮血邪乘虛而居其中故不除也寒傷榮則寒邪干陰血而榮行脈中者也寒邪居脈中則非特榮受病也邪自內作則并與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而煩疼仲景以麻黃大發其汗又以桂枝辛甘而其發散欲損其內外之邪榮衛之病故獨大抵二藥皆發汗而桂枝則發其衛之邪麻黃并與榮衛而治之固有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九證云病者自汗出者以為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故耳榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又第四十七證云發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和也又第一卷云寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗病也麻黃湯中并桂枝而用此仲景之意歟至於青龍雖治傷寒見風脈傷風者服之則筋惕肉瞤故青龍一證尤難用必須形證諦當然後可行于實止以桂枝麻黃各半湯代之蓋慎之者也

論兩感傷寒

仲景論兩感傷寒云凡傷於寒熱雖甚不死者兩感於寒而病者必死又云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同既云必死又云治有先後何也大抵此病表裏雙傳臟腑俱受得此者十不全一故云必死然仲景豈以己見而重誣後人哉故有發表攻裏之說以勉後世恐萬世之下一遇大聖而得之者不欲絕望於後人也則仲景仁心可知矣

新編張仲景註解傷寒發微論卷下

論傷寒以眞氣爲主

傷寒不問陰證陽證。陰毒陽毒。要之眞氣完壯者易醫。眞氣虛損者難治。諺云傷寒多死下虛人。誠哉是言也。蓋病人元氣不固。眞陽不完。受病稍重。便有必死之道。何也。陽病宜下。眞氣弱則下之多脫。陰病宜温。眞氣弱則客熱便生。故醫者難於用藥。非病不可治也。主本無力也。素問稱岐伯云。陽勝則身熱腠理閉。喘欬。爲之使仰。汗不出而熱。齒乾以煩冤。腹滿死。能食能音耐。多不能及。陰勝則身寒汗出。身常清。數慄而寒。寒則厥。厥則腹滿死。能及不能多。黄帝曰。調此二者奈何。岐伯曰。能知七損八益。則二者可調。蓋陽勝而汗不出者。傷寒也。陰勝身寒而汗出者。中風也。二者須知七損八益而已。蓋女子二七天癸至。至七七止。男子二八精氣溢。至八八而止。婦人月事以時下。故七欲損。男子精欲滿而不瀉。故八欲益。如此則男子女人身常無病也。自身無病。眞氣完固。雖有寒邪易於用藥。故曰二者可調。是知傷寒以眞氣爲主。

論治傷寒須依次第

仲景論中。雖云不避晨夜。卽宜便治。醫者亦須顧其表裏。待其時日。若不循次第。雖當時得安。損虧五臟。以促壽期。何足尚也。昔范雲爲梁武帝圖官。得時疫熱疾。召徐文伯診視。是時武帝有九錫之命。則在旦夕。雲欲預盛禮。謂文伯曰。可便得愈乎。文伯曰。便瘥甚易。政恐二年外不復起爾。雲曰。朝聞道夕死可矣。況二年乎。文伯於是先以火艾地布梐枑。布席。置雲其上。圍劉汗出。以温粉塗之。雲日遂愈。雲甚喜。文伯曰。不足喜。後二年果卒。夫取汗先期。尚促壽限。況不順表裏。不待時日。便欲速愈者耶。今病家不耐病。才病三四日。晝夜督汗。醫者隨情順意。鮮不致斃。故予歷此而以爲龜鑑也。

論仲景緩遲沉三脈

仲景云。衛氣和名曰緩。榮氣和名曰遲。緩遲相搏。名曰沉。注云緩者四肢不收。遲者身體俱重。沉者腰中直。腹內急痛。若然則三者皆病脈也。安得謂之和。注者乃以脈狀中沉緩遲論之。不知仲景傷寒脈。與雜病脈異。何以言之。上文云衛榮俱高、高、綱、衛榮弱爲慢、卑、損。至此三脈謂之和。則不盛不弱。乃平和脈。豈傷寒之脈。高、章、綱、者陽證類。慢、卑、損者陰證類。卽是而言。則緩、遲、沉者陰陽向安之脈也。不特此爾。下文二寸口脈緩而遲。緩則陽氣長。遲則陰氣盛。陰陽相抱。榮衛俱行。剛柔相得。非安平而何。

論裏裏虛實

傷寒治法先要明裏裏虛實。能明此四字。則仲景三百九十七法。可坐而定也。何以言之。有表實。有表虛。有裏實。有裏虛。有表裏俱實。有表裏俱虛。予於表裏虛實歌中。嘗論其事矣。仲景麻黄湯類。爲表實而設也。桂枝湯類。爲表虛而設也。裏實則承氣之類。裏虛則四逆理中之類是也。表裏俱實。所謂陽盛陰虛。下之則愈也。表裏俱虛。所謂陽虛陰盛。汗之則愈者也。嘗讀魏志華佗傳。有熱所害正同。佗曰。尋當下之。延當發汗。或錯其異。佗曰。尋外實。延內實。故治之宜殊。此所謂能明表裏虛實者也。

論桂枝肉桂

仲景桂枝湯用桂枝者。蓋取桂之枝梢細潤者爾。非若肉桂之肉厚也。蓋肉桂厚實。治五臟。用之者。取其鎮重也。桂枝輕揚。治傷寒用之。取其發散也。今人例用之。是以見功寡。

論滑脈

仲景云。翕奄沉。名曰滑。沉爲純陰。翕爲正陽。陰陽和合。故名曰滑。古人論滑脈。雖云往來前卻。流利展轉。榮榮然與數相似。曾未若仲景三語而足也。翕張也。言脈升而開張也。忽而沉。言脈降而復也。奄言奄

忽之間。與奄觀經艾同發。仲景論滑脈。可謂諦當矣。然其言雖。恐淺識者未易曉。

論用大黃藥

大黃雖爲將軍。然湯滌穢熱。推陳致新。在傷寒乃爲要藥。但欲用之當爾。大柴胡湯中不用。誠脫誤也。王叔和云。若不加大黃。恐不名大柴胡。須是酒洗生用。爲有力。昔後周姚僧垣名善醫。帝因發熱。欲服大黃。僧垣曰。大黃乃是快藥。然至尊年高。不宜輕用。帝非從。遂至危篤。及元帝有疾。召諸醫。咸謂至尊至貴。不可輕脫。宜用平藥。可漸宣通。僧垣曰。脈洪而實。此有宿食。非用大黃。必無差理。元帝從之。果下宿食而愈。此則大用與不用之異也。

論陰不得有汗

仲景第四卷十七證云。脈雖沉緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。又云脈陰陽俱緊而又汗出。爲亡陽。此則少陰大抵陰虛者多汗。而此言陰不得有汗。何也。余嘗深究虛汗之證。亦自有陰陽之別。陽病自汗有九證。皆有治法。唯陰證則類上手背有冷汗。甚者如水洗。然此是陽虛陰盛。亡陽而將脫也。其死必矣。仲景此篇。方論半在表。半在裏。故先曰汗出爲陽微。此則虛汗。陽微故也。非陰證無汗。不得有汗也。有汗則九死一生。由是言之。陽得有汗。陰不得有汗。以意逆志。是爲得之。

論林億疑白虎有差互

仲景稱傷寒。若吐下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎加人參湯主之。又云傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。又云。脈浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎湯主之。國朝林億校正。謂仲景於此表裏自差矣。是大不然。大抵白虎能除傷寒中暍。表裏發熱。故此前後二證。或云表裏俱熱。或云表熱裏寒。皆可服之。宜也。中一證。稱表不解。不可服者。蓋以脈浮無汗發熱。此全是傷寒表證。宜麻黃葛根之類也。安可用白虎。億但見所稱表裏不同。便謂差互。是亦不精不思之過也。

論弦動陰陽二脈不同

仲景云。脈大浮數動滑。此名陽也。脈沉濇弱弦微。此名陰也。脈訣以動脈爲陰。以弦脈爲陽。何也。此是開卷第一行疑處。而世人不知講。予謂脈訣所言。分七表八裏而單言之也。此之所論。兼衆脈而合言之也。大抵雜病各見一脈。唯傷寒必兼衆脈而見。何以言之。仲景之意。若曰浮大者陽也。兼之以動數滑之類。安得不爲陽。沉細者陰也。兼之以濇弦數之類。安得不爲陰。故仲景論動脈。則曰陽動則汗出。陰動則發熱。數脈見於關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖。名曰動也。又結胸證云。脈浮而動。浮則爲風。動則爲痛。故脈數與浮而言動脈。則陽脈陽病也宜矣。仲景論弦脈。則曰弦者狀如弓弦。按之不移。弦則爲減。又曰。支飲急弦。又少陰證云。手足寒。脈弦遲。故此兼遲而言。弦則爲陰脈陰病也宜矣。故仲景傷寒脈。不可與雜病脈同日而語。今陽證往往浮大。而厥厥動搖。其沉細而弦者。必陰證也。何疑之有哉。不特此也。至如曰高曰亢。曰鉤曰懈。曰牢曰損。有縱有橫。有逆有順。跌陽太谿之類極多。予嘗撰仲景三十六種脈法圖。故知治傷寒。當以仲景脈法爲本。

論中風傷寒脈

仲景以浮緩脈爲中風脈。浮濇而緊。爲傷寒脈。中風有汗。傷寒無汗。何也。內經云。滑者陰氣有餘也。濇者陽氣有餘也。陽氣有餘。則身熱無汗。陰氣有餘。則多汗身寒。大抵陰陽欲其適平而已。陽氣不足。陰往乘之。故陰有餘。陰氣不足。陽往從之。故陽有餘。風傷於衛。則榮不受病。故陽不足而陰有餘。是以中風脈浮緩。必多汗也。寒傷於榮。則衛未受病。故陰不足而陽有餘。是以傷寒脈浮濇而緊。亦爲無汗也。仲景辨二者脈證。亦有所受者矣。

論表證未能未可下

仲景云。凡傷寒之病。多從風寒得之。始表中風寒。入裏則不消矣。擬欲攻之。當先解表。乃可下之。若表已解而內不消。大滿大實堅有燥屎。自可除下之。雖四五日不能爲禍也。不宜下而便攻之。內虛熱入。協熱遂利。煩躁諸變。不可勝數。輕者困篤。重者必死矣。（元本宜移「殺」字後。「表已解而內不消」一段。「雖四五日不能爲禍也」一段。「而其理易明也」。）大抵風寒入裏不消。必有燥屎。或大便堅鞕。須是脈不浮。不惡風寒。表證罷。乃可下之。大便不通。雖四五日。未能爲害。若不顧表而便下之。遂爲協熱利也。

論中暑脈不同

仲景云。脈虛身熱。得之傷暑。又云。其脈弦細芤遲。何也。素問曰。寒傷形。熱傷氣。蓋傷氣而不傷形。則氣消而脈虛弱。所謂弦細芤遲。皆虛脈也。仲景以弦爲陰。而朱肱亦云。中暑脈細弱。則皆虛脈也可知矣。

論傷寒須早治

仲景云。凡作湯藥。不可避晨夜。發病須臾。卽宜便治。不等早晚。則易愈矣。如或差遲。病卽傳變。雖欲除治。必難爲力。今之醫者不究根源。執以死法。必汗之於四日之前。必下之於四日之後。殊不知此大綱也。又云。甚者病不服藥。猶得中醫。此爲無醫處而殺也。苟大小便不通。可待其自差乎。蓋前後不得漏。必腹脹。不過數日而死矣。又況結胸瘀血。發狂發黃發斑之類。未有勿藥而喜者。智者知變。愚者執一。所以取喻也。須是隨病淺深。在表在裏。早爲治療。如救火拯溺。庶易差也。素問云。邪風之至。疾如風雨。故善治者治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者半死半生也。扁鵲望齊桓侯而走者。其以此歟。

論發熱惡寒

仲景云。假令寸口脈微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則洒淅惡寒也。尺脈弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。此謂元受病而然也。又云。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此謂發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。此謂醫所病而然也。大抵陰不足。陽往從之。故陽內陷則發熱。陽不足。陰往乘之。故陰上入陽中。則惡寒。陰陽不歸其分。故寒熱交爭。是以發熱而惡寒也。故孫思邈云。有熱不可大攻之。熱去則寒至矣。

論風溫證

仲景云。太陽病發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已。身灼熱者。名風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。

身重多眠、鼻息必鼾、語言難出、若被下者、小便不利、直視、失溲、若被火者、微發黃色、剧、則如狂狐、時瘈瘲、又云、陽脈浮滑、陰脈濡弱、更遇於風、變成風温、大抵温氣大行、更感風邪、則有是證、今當春夏、病此者多、將作傷寒漏風治之、非也、不可火、不可下、不可大發汗、而仲景無藥方、古法或謂當取手少陰火足厥陰大、隨經所在而取之、如麻黃甘草石膏湯、蔵雞湯之類、予以謂收毒獨活、續命、減麻黃去附子、益佳、

論温瘧證

仲景云、若脈陰陽俱盛、重感於寒者、變成温瘧、故朱肱初虞世以小柴胡白虎之類加桂以治之、此則仲景所謂温瘧之一證也、今庸醫見前人有此治法、不問是何證、但見發寒發熱、一概治之、殊失大抵温瘧多端、有暑瘧、有食瘧、瘴瘧、脾寒、而千金又有五藏所受不同、六府之中止有胃瘧一證、種類最多、安得一概而論、瘴瘧者但熱不寒、當用白虎、食瘧者中有伏積、當下而去之、至於中暑、脾寒、此二證、若水火相反、案問曰、夏傷於暑、秋爲瘧瘧、又曰、夏暑汗不出者、秋成風瘧、蓋暑伏于中、得秋氣乃發、故先熱後寒、熱多寒少、頭昏痛、盧則發熾、汗出、一時乃止、蓋心惡暑、心不受邪、而包絡受之、包絡衆涎所聚、暑伏于涎、心、豈若脾寒、厚朴草果所能祛也、非砒沙礬蝟之屬不能入、故暑藉脾寒、患者多、而醫不識病、妄投以藥、邪未退、眞氣先受病、所以連縣不差也、予甞精意深究、據病一科、須是辨脈察證、窮究得病之源、故十治十中、無有失者、衆人以瘧爲難治、予獨以爲易、要在辨其種類、識其先後、素問瘧論、甚有妙處、當思而得之、



新編張仲景註解傷寒百證歌目錄

卷之一
第一證　傷寒脈證總論歌
第二證　傷寒病證總類歌
第三證　表證歌
第四證　裏證歌
第五證　表裏寒熱歌
第六證　表裏虛實歌
第七證　急救表裏歌
第八證　無表裏證歌
第九證　表裏水證歌
第十證　表裏證俱見歌
第十一證　三陰三陽傳入歌
第十二證　陰陽兩感歌
第十三證　陽證陽毒歌
第十四證　陰證陰毒歌
第十五證　太陽陽明合病歌
第十六證　太陽少陽合病歌
第十七證　三陽合病歌
第十八證　太陽少陽併病歌
第十九證　陰證似陽歌
第二十證

偶然以絕說
卷之二
第二十一段
偶然隔日說
第二十二段
偶然以事說
第二十三段
偶然說
第二十四段
中風說
第二十五段
傷寒與風寒中風與風寒傷寒說
第二十六段
痙病中暑說
第二十七段
五種暑說
第二十八段
三種濕說
第二十九段
兩種痙說
第三十段
四種似傷寒說
第三十一段
可汗不可汗說
第三十二段
可下不可下說
第三十三段
可吐不可吐說

第三十四段
可火不可火說
第三十五段
可水不可水說
第三十六段
可灸不可灸說
第三十七段
可針不可針說
第三十八段
傷寒可溫說
第三十九段
數說
第四十段
脈說
卷之三
第四十一段
往來寒熱說
第四十二段
汗之而熱不退說
第四十三段
下之而仍發熱說
第四十四段
蓄漿說
第四十五段
胃蓄漿說
第四十六段
厥證說
第四十七段

卷之四
楔證歌
第六十證
噤證歌
第五十九證
頰證歌
第五十八證
發熱歌
第五十七證
吃逆歌
第五十六證
吐血歌
第五十五證
發狂歌
第五十四證
結胸歌
第四十八證
痞證歌
第四十九證
發黃歌
第五十證
發狂歌
第五十二證
發斑歌
第五十三證
發喘歌
第五十三證
發汗歌
第五十四證

第六十一證
能食歌
第六十二證
心悸歌
第六十三證
自汗歌
第六十四證
乾嘔歌
第六十五證
出汗歌
第六十六證
發亂歌
第六十七證
頭疼歌
第六十八證
脊痛歌
第六十九證
項痛歌
第七十證
咽痛歌
第七十一證
鼓脹歌
第七十二證
遺尿歌
第七十三證
腹滿歌
第七十四證
咳嗽歌

卷之五
傷寒論辨證歌
太陽經上篇
太陽經中風證
太陽經傷寒證
太陽經中風傷寒兼證
太陽經中風傷寒變證
太陽經中風傷寒合病
太陽經中風傷寒並病
太陽經中風傷寒壞病
太陽經中風傷寒欲解
太陽經中風傷寒禁例
太陽經下篇
太陽經中風證
太陽經傷寒證
太陽經中風傷寒兼證
太陽經中風傷寒變證
太陽經中風傷寒合病
太陽經中風傷寒並病
太陽經中風傷寒壞病
太陽經中風傷寒欲解
太陽經中風傷寒禁例

陽明經上篇
陽明經中風證
陽明經傷寒證
陽明經中風傷寒兼證
陽明經中風傷寒變證
陽明經中風傷寒合病
陽明經中風傷寒並病
陽明經中風傷寒壞病
陽明經中風傷寒欲解
陽明經中風傷寒禁例
陽明經下篇
陽明經中風證
陽明經傷寒證
陽明經中風傷寒兼證
陽明經中風傷寒變證
陽明經中風傷寒合病
陽明經中風傷寒並病
陽明經中風傷寒壞病
陽明經中風傷寒欲解
陽明經中風傷寒禁例

第七十五證
自汗證歌
第七十六證
頭汗證歌
第七十七證
欲得汗歌
第七十八證
舌上胎歌
第七十九證
下膿血歌
第八十證
妻夜偏劇歌
卷之五
第八十一證
循衣撮空歌
第八十二證
筋惕肉瞤歌
第八十三證
口燥咽乾歌
第八十四證
傷寒似狐歌
第八十五證
邪中二焦歌
第八十六證
多眠證歌
第八十七證
不得眠證歌
第八十八證

小便不利歌
第八十九證
小便自利歌
第九十證
大便不利歌
第九十一證
大便下利歌
第九十二證
狐惑證歌
第九十三證
百合證歌
第九十四證
辨傷寒疫氣不同歌
第九十五證
婦人傷寒歌
第九十六證
熱入血室歌
第九十七證
傷寒差後病歌
第九十八證
傷寒五逆死絕歌
第九十九證
傷寒死脈歌
第一百證
傷寒死候歌

張仲景註解傷寒百證歌卷一

宋　白沙許叔微知可述

第一證

傷寒脈證總論歌

大浮數動滑陽脈。陰病見陽生可得。沉濇弦微弱屬陰。陽病見陰脈者死。陰陽交互最難明。輕重斟量當別白。脈雖有陰陽，須看經重以分表裏，在下文。輕手脈浮爲在表。表哲浮而雖有力。但浮無力表中虛。自汗惡風常漸漸。傷寒先要辨表裏虛實。此四者爲益。仲景云。浮爲在表。沉爲在裏。然表虛有虛有實。浮而有力者表實也。無汗不惡風。浮而無力者表虛也。自汗惡風也。重手脈沉爲在裏。裏實脈沉來亦實。重手無力大而虛。此是裏虛宜補的。裏證亦有虛實。脈沉而有力者裏實也。故腹滿大便不通。沉而無力者裏虛也。或泄利或陰證之類。已上八句。辨表

裏虛實脈象。風則虛浮寒牢堅。水停水濇必沉潛。動則爲痛數爲熱。支飲雖須脈急弦。太過之脈爲可怪。不及之脈亦如然。仲景云。風則虛浮寒則牢堅。沉潛水濇。支飲急弦。動爲痛數則熱煩。太過可怪。不及亦然。邪不當見中必有針。榮衛太盛名高章。高章相搏名曰綱。榮衛微時名惺惺。徒煩切。恐懼也。卑慄卑相搏損名彰。榮衛既和名緩遲。緩遲名沉此最良。九種脈中辨虛實。長沙之訣妙難忘。仲景云。寸口衛氣盛名曰高。榮氣盛名曰章。高章相搏名曰綱。衛氣弱名曰慄。榮氣弱名曰惺。惺慄相搏名曰沉。大抵仲景脈法。論傷寒與雜病脈法異。故予嘗撰仲景三十六種脈法。醫醫有如黃上肥。此脈定知陽氣微。蒸蒸來如蚰絲細。卻是體中陰氣衰。脈如畫漆之絕者。病人亡血更何疑。仲景云。脈雖如黃上肥者。陽氣微也。脈蒸蒸如蚰蜒絲者。陽氣衰也。脈緊緊如轉索之絕者。亡血也。陽氣衰千金云作陰氣衰。陽結滿滿如車蓋。陰結循筆亦象之。仲景云。寸口脈如車蓋者。陽結也。累累如循竿者。陰結也。陽盛則促來一止。陰盛則結緩而遲。此謂促結二脈也。仲景云。脈來緩。時一止。名曰結。脈來數時一止。名曰促。脈陽盛則促。陰盛則結。縱橫逆順宜審察。變賊災怪要須知。仲景云。脈有相乘。有縱有橫。有逆有順。何謂也。曰。水行乘火。金行乘木。名曰縱。火行乘水。木行乘金。金行乘火。名曰橫。水行乘火。金行乘木。名曰逆。金行乘水。木行乘火。名曰順也。又曰。脈有變賊。何謂也。師曰。脈有弦緊浮滑沉濇。此六者。名變賊。能爲諸脈作病也。又問曰。脈有災怪。何謂也。答曰。得時脈。今乃反作。故謂災怪。脈靜人病內虛故。人安脈病曰行尸。仲景云。脈靜而病。知人人病脈不病。名曰內虛。以無榮神。雖困無苦。右手氣口當主氣。主血人迎左其位。氣口緊盛食必傷。人迎緊盛風邪據。人迎右爲人迎。右爲氣口。人迎緊盛。傷於風。氣口緊盛。傷於食也。緩爲在府邊爲盛。浮爲在表沉在裏。仲景云。浮爲在表。沉爲在裏。緩爲在府。邊爲在臟。脈浮而緩風傷榮。浮緊風寒傷衛。脈微大急令人吐。欲下猶防虛且細。仲景云。脈微不可吐。虛細不可下。沉微氣弱汗爲難。三者要須當審記。孫用和云。陰虛。脈沉微而氣弱者不可汗。三者汗下吐三法。脈有不可行者切當謹也。陽加於陰有汗證。左手沉微卻應未。素問云。陽加於陰謂之汗。跌陽胃脈定死生。仲景說跌陽脈者。凡十有一。以腎脈胃脈爲主。仲景證世人握手不及足者以此。脈來六至或七至。邪氣漸深須用意。浮大盡加並刷陽。沉細夜加分陰位。九至以上來短促。狀若湧泉無入氣。更加躁絕漸無候。命絕天真當死矣。張尚云。脈來七至六至以上。浮大盡加病。沉細夜加病。又加之九至十至。雖和扁亦難救。如八至九至。加以躁絕表無根也。如泉之通。脈無入氣。天真盡而必死矣。病人三部脈調勻。太小浮沉遲數類。此是陰陽氣已和。勿藥自然應可喜。仲景脈。寸口關上。尺中。三處大小浮沉遲數同類雖有寒熱不解。此脈已和雖劇。當愈。

第二證

傷寒病證總類歌

傷寒中風與溫淫。熱病痙暍并時癥。證候陰陽雖則同。別爲調治難專一。（以上七證大略相似須別作調治）一則桂枝二麻黃三則青龍如鼎立。精對無差立便安。何須更數交傳日。（張尚云一桂枝二麻黃三青龍三日證結對無變文當見效不須更候五日轉瀉反致壞病也）發熱惡寒發於陽。無熱惡寒自陰出。（仲景云發熱頭痛惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也）陽證熱多內外熱。白虎相當并竹葉。（白虎湯竹葉石膏湯皆治內外熱證）陰寒淫脈沉弦。四逆理中爲最捷。（張兆云陰盛寒淫則用四逆湯理中圓）熱邪入胃結成毒。大小承氣宜疏泄。（熱邪入胃久則胃燥糞宜調胃承氣大小承氣湯）脇滿宜用瀉心湯。（脇滿證候用大小柴胡湯）結胸痞氣當分別。按之不痛爲虛寒。按之若痛爲實結。淺深大小陷胸元。仲景方中不徒設。（張兆云結胸痞氣兩分淺深則大小陷胸元）茵蔯可治發黃證。蝎皮治痢下血。（發黃證熱則用茵蔯濕下利痢膿血則用蝎皮）小便不利更嘔滿。煩渴五苓安可缺。（利小便止嘔渴用五苓散）半在裏兮半在表。加減小柴胡有法。（小柴胡治半在裏半在表不可下）夜中得脈日中盡。陰得陽兮共必脫。（日中得脈夜中得陰爲自和陰陽調順自和同不須攻治翻爲壞。（張尚云凡傷寒三日脈微而澀者）

第三證

表證歌

身熱惡寒脈又浮。偏宜發汗更何求。（仲景云脈浮宜以汗解之）要須手足俱周徧。不欲淋漓似水流。（金匱云凡發汗欲令手足皆周徧漐漐一時間發佳）不欲流離若病不解。當重發汗。汗多則亡陽虛不得重發汗也。）輕則隨時與和解。重須正發病當愈。（仲景有和解之者有正發之者和解若小柴胡桂枝是也正發若麻黃之類是也）初春陽弱陰尚勝。不可頑奪成援搜。夏時暑熱脈洪大。玄府開時汗易謀。（初春陽弱不可大發汗以損乎陽夏則玄府汗空開故易汗）不可汗脈微而弱。更發尺中脈遲緩。（金匱云脈微不可發汗無陽故也又云尺中脈遲緩不足血氣少不可汗）微弱無陽遲少血。安可麻黃求發散。更有劇血并下血。（仲景云經家不可發汗發汗則額上陷亡血家不可發汗則寒慄而振）脈虛煩且悶之。腹間動氣宜區別。（此五證皆不可汗解在第三十一）嘔人擇水適來時。此是小柴胡證決。忽然厥汗表裏虛。發冒不知人作嘔。（嘔人經水適來適斷此小柴胡証設汗發冒不知人）

第四證

裏證歌

不惡寒兮反惡熱。胃中乾燥并潮熱。（潮謂証候熱汗自出不惡寒反惡熱裏下之又云潮熱者實也宜下之）手心腹下汗常溽。小便如常大便結。腹滿痞或證語。脈沉面滑裏證決。（手心與胸腹下汗小便如常大便結腹滿痞或語脈沉面滑者病在內是日裏證也內宜則痞滿面喘沈面滑者病在內是日裏證也）陽證陰虛蓬下之。安可日數拘屑屑。（仲景云陽證陰虛汗之則死下之則急當須識此期外證除證則屑屑內外皆熱故當下雖三二日猶可下不必四五日始應也）失下心胸皆挂閉。冒懵不安成熱厥。（失下則熱極生寒故冒厥厥則心胸皆挂閉冒懵不安也）庸醫不曉疑是陰。誤進熱藥精魂絕。（精神見越惟以昇陰誤服熱藥則發狂不知人也）三陰大約可温之。稽證見時方發泄。太陰證候或時痛。少陰口燥心下渴。精證悉具更無疑。要在安詳加審別。（三陰大約可温唯有發證當下仲景云太陽病發熱汗出而復下之胸滿痛者此名協熱利也協熱利者下利後更發熱小便數者此爲欲解也雖發熱汗出不惡寒反惡熱者此爲實也實當下之）厥陰消渴氣上撞。心中疼熱飢不欲食。（厥陰消渴者仲景云厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱飢不欲食食則吐蚘下之則利）病在表不可下。脈浮更復虛而滑者。（仲景云脈浮爲在表又云脈虛不可下之）惡寒喘吐小便清。不轉失氣腸鳴瀉。（不轉失氣者屎雖硬以其人本虛轉氣多通也）大便堅硬小便數。脾約證候如斯之類下莫難。表裏俱熱歌

第五證

表裏俱熱歌

身熱欲得衣。當在背脇熱在肌。先與桂枝使表已。小柴加桂次温之。病人身熱欲得衣。當在背脇熱在肌。（仲景云病人身大熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也）先與桂枝使表已。小柴加桂次温之。（仲景云先以白虎加人參湯以發其熱次以桂枝麻黃各半湯以解其外也）病有標本并始末。先後不同當審察。裏寒表熱脈沉遲。裏熱表寒脈浮數。（朱肱云當寒熱錯雜脈必浮也）

第六證

表裏虛實歌

脈浮而緩表中虛有汗惡風膀胱疏浮緊而澀表郁實寒無汗體拘如　傷寒雖發熱表裏俱有表實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛先辨此六者然後用桂麻無不表裏證脈浮而緩又惡風有汗此表虛中風證也脈浮緊而澀尺有力無汗此表實傷寒證也脈沉無力裏虛證四逆理中為對病沉而有力緊且實柴胡承氣宜相應　裏虛宜溫之故用四逆理中裏實宜下之故用柴胡承氣又有表和而裏病下之則愈斯為正裏和表病汗之則愈忽然誤下應雖拯　外證云表和而病下之則愈汗之則死表雖汗之則愈下之則死脈待其時　孫真人論病無急立當見効不必三日以前汗五日以後下也

第七證

急救表裏歌

傷寒下後表裏虛急當救療莫躊躇下利不止身疼痛救裏為先四逆與忽若清便自調適郁宜救表桂枝徒切莫遲延生別病過街脈變在斯須　仲景云傷寒脈下之而得下利不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆救表宜桂枝

第八證

無表裏證歌

既無裏證又無表隨證小柴胡治療大便堅鞕脈浮數郁與大柴胡極妙　仲景云病人無表裏證發熱七八日脈浮數可與大柴胡湯下之　七八日後至過經證候如斯當辨曉何況熱實晴不和當覺目中不了了　仲景云傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便雖微熱者急下之大承氣柴胡

第九證

表裏水歌

有水須分表和裏安可妄投增病勢乾嘔微利咳發熱渴裏有水書詳論　仲景云傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或嘔者小青龍此證表有水也　忽若身涼并汗出兩脅疼痛必下痞表解爭知裏未和也十棗湯主之

第十證

表裏兩證俱見歌

脈來浮大表證剛便亦煩渴卻在裏　脈浮者表證也小便赤而煩渴又郁有裏證也表裏兩證俱見時當用五苓與調理　此證宜用五苓散益五苓治內外俱熱　又如大便數日結頭痛更兼身有熱其人小便卻又清亦是兩證當區別　大便卻知不在裏而在表也　大便堅鞕脈沉細裏證當下分明證頭汗出時微惡寒手足厥冷卻非是　仲景云傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結表復有裏也脈沉亦在裏也此為中在表中在裏矣　仲景著論非一端要在審詳而已矣　仲景云中有陳寒者當吐之此略舉一二為例

第十一證

三陰三陽傳入歌

尺寸俱浮屬巨陽一二日內病如當經絡一連風府穴頭項痛分腰脊強　仲景云尺寸俱浮者太陽受病當一二日發以其上連風府故頭項痛腰脊強脈長陽明為受病二三日內斯為應挾鼻絡目是其經目痛鼻乾眠不寧　仲景云陽明受病也當二三日發以其脈挾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥也　少陽經絡耳耳中脈弦脅痛耳應聾四日以前皆在府汗之即退易為功　仲景云尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以脈循脅於耳故脅痛耳聾也　四五日中得太陰太陰之脈細而沉布胃絡嘔嘔吐痞滿痛　仲景云尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於嘔故腹滿而嘔吐也　少陰傳到脈沉緊貫腎絡肺嗌舌本口燥舌乾渴不休　仲景云尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺係舌本故口燥舌乾而渴　七八日至厥陰經煩滿囊縮可憂慮三陰受邪已入臟卻宜瀉下自和平　仲景云尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其循陰器絡於肝故煩滿而囊縮必三陰皆已入臟故可下而已也　六經已誰傳亦遍止不受邪脈來緩水火相交氣已和實與雨至斯為汗　若傷至厥陰其脈緊緩者神七不再愛克故水升火降氣和而大汗解矣

第十二證

陰陽兩感歌

傷寒熱甚雖不死。兩感傷寒漫料理。仲景云。凡傷於寒則發爲熱。雖甚不死。若兩感於寒而病者。必死。又曰兩感病俱作。治有先後。發表攻裏。本自不同。故漫料理可也。一日太陽少陰病。腹痛口乾煩飲水。太陽腑也。少陰臟也。爲表裏。故仲景云。太陽與少陰俱病。則腹痛口乾。煩滿而渴。二日陽明合太陰。腹滿身熱如火燔。不欲飲食。鼻內乾。妄言譫語終難瘥。仲景云。二日陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譫語。三日少陽合厥陰。耳聾囊縮不知人。厥逆水漿不入口。六日爲期是死辰。仲景云。三日少陽與厥陰俱病。則耳聾囊縮而厥。水漿不入口。不知人者。六日死矣。

第十三證

陽證陽毒歌

太陽陽明與少陽。三陽傳入是甚常。一二日太陽。二三日陽明。三四日少陽。各以其經傳入也。太陽柔痙惡風。陽明不惡寒反惡熱。少陽口苦脅下滿。往來寒熱脈弦張。仲景云。少陽之爲病。口苦咽乾目眩。又曰。太陽病不解。轉入少陽者。脅下鞕滿。往來寒熱。其脈弦。陽若獨盛陰羞絕。變爲陽毒必發狂。三陽病不治。必變爲陽毒。內外熱結舌又卷。鼻中煤煙不可當。脈應洪實或滑促。宜用升麻梔子湯。

第十四證

陰證陰毒歌

飲食不節陰受之。太陰腹脹病在脾。集註云。起居不節。陰受之。飲食不節。則陰受之。傷寒四五日傳太陰。太陰脾經也。故其腹脹滿。少陰腎病脈微細。心煩但欲渴無時。仲景云。少陰之爲病。脈微細。但欲寐。又云。少陰但欲寐。五六日自利而渴。厥陰氣上衝心下。飢不欲食食吐蚘。厥陰病。飢不欲食。食吐蚘。陰病若深陽頓絕。變成陰毒更何疑。四肢逆冷臍築痛。身如被杖痛可知。宋迪云。傷陰盛於下。則微陽浮於上。故其餘沉重。四肢逆冷。臍腹築痛。狀如被杖。或因冷物傷脾胃。成因慾耶腎經衰。內或伏陰外寒氣。腰重頭疼體倦疲。陰毒本因腎氣虛。喘嗽過多。或傷冷物。復傷風邪。內伏陰氣。外又感寒。或先感外寒。而內伏陰。內外皆陰。故陽氣不守。逆發頭疼腰痛。腹痛疾。自汗身冷。額上手背胥冷汗。二三日內尙支持。額上手背胥有冷汗。二三日內。尙可支持。六脈沉細時來疾。尺部短小力遲微。寸口有時或來大。誤經輒瀉者何醫。陰證診之。則六脈俱沉細。而疾。尺部短小。寸口或大。六脈俱浮大。或沉。取之大而不甚疾者。非陰證也。誤瀉則渴轉甚。

門是。仲景一證云。太陽少陽併病。頭痛眩冒。時如結胸。心下痞硬。當刺肺俞肝俞。不可發汗。發汗則譫語。脈弦。五日譫語不止。當刺期門。頸項強時刺大椎。此候在心當切記。一證云。太少併病。心下硬。頸項強而眩者。當刺大椎。肺俞肝俞。慎勿下。

第十五證

太陽陽明合病歌

太陽陽明同合病。仲景法中有三證。自利宜服葛根湯。但嘔卻加半夏應。喘而胸滿卻莫當。黃芩勿下之輕性命。循規守矩治爲宜。要使沖和自安靜。仲景三證。一者太陽與陽明合病。則自利。葛根湯主之。二者合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。三者太陽陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。

第十六證

太陽少陽合病歌

太陽少陽合病時。亦須下利更何疑。下利黃芩湯可用。若嘔還加半夏奇。仲景云。太陽少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯。

第十七證

三陽合病歌

腹滿身重難轉側。面垢遺尿鄭語極。三陽合病口不仁。白虎湯功更奇特。仲景云。三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口中不仁。譫語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足厥冷。自汗。白虎湯主之。

第十八證

太陽少陽併病歌

太少併病證有二。汗下差之皆致斃。頭痛眩冒如結胸。誤若汗時證語至。肺俞肝俞可刺。證語卻刺期

第十九證

陰證似陽歌

烦燥面赤身微熱。脈至沉微陰作祟。（脈來沉細者陰也。陰證生鮮枝懶躁面赤身熱。陰證似陽證者疑。但以脈證斯要訣。但以脈脈辨不參證也。身熱反惡寒者陰也。面赤熱甚於身熱也。煩燥者陰盛也。面赤熱甚於身熱也。煩燥者陰盛也。）熱裏寒陰躁盛。面藏陽兮下虛證。（身熱也。裏寒也。煩燥者陰盛也。面赤陽者。下證故也。此冷陰證似陽也。陰發躁兮熱發厥。物極則反皆理性。（陰極則生躁。熱極則反厥。物極則反者。陰陽之理性也。）

第二十證

陽證似陰歌

小便赤色大便祕。其脈沉滑陽證是。四肢逆冷伏熱深。陽證似陰當審諦。（小便赤。大便祕。脈沉滑。陽證也。陽極生陰。熱極生寒。故令四肢逆冷。以其伏熱深也。曾見陽走逆冷。須以陽證似陰治之。）輕者且宜供白虎。重者須當用承氣。重陽如陰理宜然。逆者之變亦如是。

張仲景註解傷寒百證歌卷二

第二十一證

陰盛隔陽歌

身冷脈沉緊且細。內煩煩躁不欲水。此名陰盛隔陽證。蓐燥散用煩躁止。（脈沉細緊。不欲飲水者。陰盛隔陽也。當用附子湯服。躁若止今應得睡。蓐已散兮陰自退。熱氣上行得汗瘥。火鍼丹砂宜用矣。

第二十二證

陰陽易歌

男子陰腫多絞痛。婦人腰痛并裏急。傷寒差後便行房。男名陽易女陰易。熱上衝胸頭不舉。眼中生花氣

第二十三證

傷寒歌

脈浮緊緊是傷寒。熱少寒多不躁煩。（傷寒脈浮緊而緊。熱少寒多心不煩躁。）頭痛無汗身拘急。微厥之時在指端。膝脊疼痛色多慘。唯宜發汗與通關。（凡看先須要辨傷寒中風二證。傷寒脈浮緊而澀。中風脈浮而緩。傷寒者惡寒不惡風。中風者惡風不惡寒。傷寒者無汗。中風者自汗。傷寒者面色慘慘。中風者其面色和悅也。）大青龍證及麻黃。熱多寒少亦其常。（傷寒大抵雖熱少寒多。亦有熱多寒少者。如麻黃證云。發熱惡寒。大青龍證云。脈浮緊。發熱而惡寒。）熱多寒少不煩躁。亦宜汗解正相當。微弱無陽桂枝越。（仲景云。太陽病發熱多寒少。脈微弱者。無陽也。不可發汗。用桂枝二越婢一湯。）尺遲血少趣中湯。（尺脈遲者。血少也。宜用小建中湯。）滯陰解張法當服。（中風傷寒。法當服中參病。與此中湯。證雖不同。皆少血之病。）淋家衄家不可汗。小柴胡解自安康。（淋家。衄家。蓄家。以至四動脈。不可發汗。王實甫小柴胡湯。）

第二十四證

中風歌

惡風自汗是傷風。（仲景謂傷風為中風。）體熱頭疼病勢濃。手足不冷心煩躁。面色如常無慘容。（解在前篇。）脈浮而緩是本證。寸大尺弱有時遂。（脈雖浮而緩。活人書云。有尺脈到寸口大者。仲景云。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。）桂枝敗毒獨活湯。宜投桂枝麻辛類。（中風藥宜桂枝麻辛之類。）項強桂枝加乾葛。（仲景云。太陽病項背強几几。反汗出惡風者。宜桂枝加葛根湯主之。）漏風加附可收功。（仲景云。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四支微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。）傷風傷寒何以別。寒脈緊謂風浮緩。寒必惡寒風惡風。傷風自汗寒無汗。（解在前篇。）

第二十五證

傷寒見風脈中風見寒脈歌

惡寒不躁微四逆。脈浮而緩來無力。惡風煩躁手足温。脈診緊浮來又澀。傷寒反得傷風診。中風卻見

濇脈。大青龍證是爲宜。調衛榮斯兩得。仲景云。太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。又云。傷寒脈浮緊。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。中風宜浮緩。今脈浮緊。傷寒宜浮緊。今脈浮緩。是中風見傷寒脈。傷寒見風脈也。要知其病加煩躁。方可服之爲最的。脈微自汗又惡風。誤用肉桂并筋惕。仲景云。服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。若脈浮緊。發熱無汗。其表實者。宜麻黃湯。脈浮緩。自汗出。小便數。其表虛者。宜桂枝湯。此爲誤也。故王實止用桂枝湯。其各中病。

第二十六證

熱病中暍歌

身熱惡寒頭痛楚。心煩躁渴如何禦。凡熱病。皆惡風。頭痛。心煩。躁渴。熱病中暍。皆有此證。但脈不同耳。詳在下。脈洪緊盛爲熱病。脈虛細弱爲傷暑。熱病脈必浮大洪緊。傷暑之脈。必虛弱而濇。詳考諸家。暑脈多不一。仲景云。太陽中暍者。身熱疼重。而脈弦細芤濇。小便已。洒洒惡毛豎。朱肱云。暍濇見。熱病脈洪大。中暑脈虛弱。治當以意消息也。傷暑面垢并背寒。四肢倦怠汗無度。口噤五苓白虎佳。衰逆牾皮湯可愈。仲景云。手足逆冷。小有勞。身即煩。口渴。脈極細。若發其汗。則惡寒甚。加溫針。則發熱甚。數下之。則滿甚。皮膚既緩。腠理開。洒然毛竦風寒惡。縱加熱覆發斑黃。可怪庸醫心術昧。仲景云。小便已。洒然毛竪。故其人可出兩惡寒。若行熱藥。加發斑黃也。

第二十七證

五種溫歌　溫病　溫疫　溫毒　風溫　濕溫

傷寒春月名溫病。脈來浮數是其證。發熱頭疼亦惡寒。不與傷寒相稱。以上論溫病也。某問云。冬傷於寒。春必病溫。仲景云。冬月嘗觸冒寒氣。不即病者。藏於肌膚。至春變爲溫病。故其證如此。宜升麻解肌湯之類。尺寸盛兮兼弦數。重感於寒變溫瘧。先熱後寒頭痛劇。以上論溫病變瘧也。仲景云。冬傷於寒。春必病溫。又感於寒者。變成溫瘧。某問云。溫脈自弦。弦數者。熱多。朱肱云。先熱後寒者。小柴胡湯。溫熱不解者。白虎加桂湯主之。潛溺陰脈浮滑陽小柴胡。但熱不寒白虎藥。以上論溫病也。仲景云。若脈陰陽俱盛。重感於寒者。變成溫瘧。某問云。溫脈自弦。弦數者。熱多。朱肱云。先熱後寒者。小柴胡湯。溫熱不解者。白虎加桂湯主之。此是風溫證候宮頭疼。身熱常自汗。四肢不收鼾睡長。當治少陰厥陰病。誤汗黃者防己湯。以上論風溫也。仲景云。陽脈濇。陰脈濇。更遇於風。變爲風溫。其病四支緩。又云。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癎。時瘛瘲也。少陰大也。脈陰木也。當治其大風木。誤汗之。則用黃耆防己湯救之也。脈濇溺兮陰弦緊。遇溫氣來行令。變成溫疫作天行。少長皆同無異病。熱溫寒清順時宜。以平爲期如斯正。以上論溫疫也。仲景云。脈濇而弱。陰濇弦緊者。更遇溫氣爲可怪。陽脈洪數。陰實大。發班嘔衄。如錯文。咳衄心

小急。以上論溫證也。第二中濇之爲病。脈來沉緩其名的。一身盡痛兼發黃。大便反快小便澀。其候令人小便不利。大便反快。但當利其小便。又云。濇家之爲病。一身盡痛。發熱。身色如熏黃。濇家其人但頭汗出。背強欲得被冒。頭不出者。心下必結。劇者必冒。冒家欲解。必大汗出。若下之早。則成腹滿小便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸中有瘀。當欲得水而不能飲。口燥煩也。又云。濇家。身上疼痛。發熱面黃。而脛逆冷。若安蚵陽。湯主之。不爾。必發痓。脈濇而弱。陰濇弦緊。陽濇而數。陰實大。自汗出。欲飲水。小便不利。其人如狂。血自下。下者愈。其外有微熱。身濇。脈濇而弱。陰濇弦緊者。更遇溫氣爲可怪。陽脈洪數。陰實大。發班嘔衄。如錯文。咳衄心無病者。亦名溫疫也。仲景云。脈濇而弱。陰濇弦緊者。更遇溫氣爲可怪。陽脈洪數。陰實大。發班嘔衄。如錯文。咳衄心

第二十八證

三種濕歌　濕溫　中濕　風濕

濕溫中濕并風濕。三者同名而異實。皆濕相搏成濕溫。胸悶多汗頭如射。濕家其人但頭汗出。背強欲得被冒。頭不出者。心下必結。劇者必冒。冒家欲解。必大汗出。若下之早。則成腹滿。小便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸中有瘀。當欲得水而不能飲。口燥煩也。又云。濕家。身上疼痛。發熱面黃。而脛逆冷。若安蚵陽。湯主之。不爾。必發痓。脈濕而濡。發汗則愈。本是風濕山濕氣。中之令人成此疾。第三風濕脈俱浮

四證似傷寒歌 食積　虛煩　痰飲　脚氣

食積虛煩幷有痰。更兼脚氣似傷寒。四家病雖云異。發熱惡寒卻一般。此四證雖非傷寒。然皆發熱惡寒。則同當以汗解之。師曰。寸口脈浮大。按之反澁。尺中亦微而澁。當下之。承氣湯主之。陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲欲解。陽明病。脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若一服汗出病差。停後服。

胸痛滿脈浮自汗體難乾。此痰證也。有痰則胸中痛滿。自汗脈浮。食積令人頭必痛。身不疼兮積證端。氣口緊盛傷於食。心煩脈數嘈吞酸。此食積也。食積則胃不和。但嘈吞酸。氣口緊盛而尺脈數。朱肱云。氣口緊盛。傷於食。虛煩之脈不緊實。但覺身心熱與煩。身不疼兮頭不痛。唯宜竹葉便須安。孫尚云。虛煩與傷寒相似。但得病二三日。脈不浮。不澁。寒身不疼痛。但熱而不煩。不可發汗。發汗必危乱。如脈不緊實。不疼痛。但熱而或不煩。非表氣。亦不可下。下之必危損。唯可服竹葉湯主之。又有脚氣之爲病。大便堅硬足行難。兩脛腫滿或枯細。莫與傷寒一例看。此論脚氣也。脚氣大便堅。脚膝痛。兩脛或有腫滿。或有枯細者。方其發時。亦發熱惡寒。與傷寒同候也。

第三十一證

可汗不可汗歌

脈浮唯宜以汗解。春夏用之何足怪。仲景云。脈浮宜以汗解。又云。大法。春夏宜汗。秋冬宜下。雖有太陽證。若脈沉。不可發汗。宜桂枝湯。若脈浮。可發汗。宜麻黃湯。二證皆曰發汗。自有淺深也。項強凡几葛根湯。心下水氣青龍對。仲景云。項背強。几几者。用葛黃葛根湯。心下有水氣者。小青龍湯主之。少陰亦可微發汗。附子麻黃並其外。仲景云。少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯。微發其汗。風澤發汗惡淋漓。風氣去兮澤氣在。唯宜滋潤偏周身。澤氣風邪俱已退。風邪惟要微微似欲汗出者。大汗出者。風氣雖去。澤氣仍在也。大抵尺遲汗爲逆。自此以下。皆不可汗也。仲景云。尺中遲者。精氣不足。血氣微少。不可汗。微弦濇弱浮爲害。仲景云。汗出者。風氣雖去。濇氣仍在。雖要微微似欲汗出者。大汗出者。風氣雖去。濇氣仍在也。少陰沉細病在裏。少陽弦細卻主內。仲景云。少陰脈沉細數。病在裏。不可發汗。又云。傷寒脈弦細。頭痛發熱。此屬少陽。不可發汗。兩厥若汗必舌萎。厥不可發汗。發汗則發痙。亡血家汗之必成痙。淋家汗之便血殺。衄家汗之額上陷。咽乾汗之咽卻隘。仲景云。亡血家發汗。則寒慄而振。汗家重汗則亡陽。譫語。脈反出者死。淋家發汗。則小便血。衄家汗之。則額上陷。急而反惡寒者。此爲欲解。其脈反和者。此爲極虛。發汗則躁。心愧愧然。無大熱者。此爲欲解。其脈反和者。此爲極虛。發汗則躁。心愧愧然。無大熱者。此爲欲解。

可下不可下歌

宿食不消當下之。寸口浮大尺中微。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脈浮大。按之反澁。尺中亦微而澁。當下之。承氣湯主之。陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲欲解。陽明病。脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若一服汗出病差。停後服。語柴胡湯最宜。金匱云。汗出而譫語者。有燥屎在胃中。此風也。過經乃下之。宜大承氣湯。大柴胡湯。結胸大陷胸圓對。瘀血抵當不可遲。結胸宜大陷胸下之。瘀血宜抵當元下大便堅硬惟承氣。痞氣瀉心湯勿疑。大便堅硬。宜下以承氣湯。痞氣虛浮。宜下以瀉心湯。脈若陽微下則寒。自此以下不可下也。金匱云。陽微不可下。下之則心下痞塞。或糟虛糊更難之。仲景云。脈微不可吐。吐虛糊不可下。結胸浮大下之死。金匱云。結胸證其脈浮大者。不可下。下之則死。虛家亦然。惡寒者表證。雖不可下。嘔吐仍兼胃氣虧。仲景云。病吐者。不可下之。不利失氣必潛利。仲景云。陽明病。不大便。七日內有燥屎。欲知之法。可與小承氣湯。若腹中轉失氣者。此但頭硬。後必溏。不可下。陽明自汗。小便利。此爲津液內竭。雖堅不可攻。宜用蜜煎導之。咽中閉塞尤須忌。玉函經云。咽中閉塞。不可下。下之則上焦下重。脈則欲陷。跌陽浮數已虛脾。仲景云。跌陽脈浮而數。浮則傷胃。數則消穀。則胸滿。此非本病。醫特下之所爲也。左右上下有動氣。更在調和子細醫。仲景云。動氣在左。動氣在右。皆不可發汗。動氣在上。動氣在下。動氣在上下之則掌握熱煩。動氣在下下之則拘攣牽連頭眩。

第三十二證

可汗不可汗歌

脈浮唯宜以汗解。春夏用之何足怪。仲景云。脈浮宜以汗解。又云。大法。春夏宜汗。秋冬宜下。雖有太陽證。若脈沉。不可發汗。宜桂枝湯。若脈浮。可發汗。宜麻黃湯。二證皆曰發汗。自有淺深也。項強凡几葛根湯。心下水氣青龍對。仲景云。項背強。几几者。用葛黃葛根湯。心下有水氣者。小青龍湯主之。少陰亦可微發汗。附子麻黃並其外。仲景云。少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯。微發其汗。風澤發汗惡淋漓。風氣去兮澤氣在。唯宜滋潤偏周身。澤氣風邪俱已退。風邪惟要微微似欲汗出者。大汗出者。風氣雖去。澤氣仍在也。大抵尺遲汗爲逆。自此以下。皆不可汗也。仲景云。尺中遲者。精氣不足。血氣微少。不可汗。微弦濇弱浮爲害。仲景云。汗出者。風氣雖去。濇氣仍在也。雖要微微似欲汗出者。大汗出者。風氣雖去。濇氣仍在也。少陰沉細病在裏。少陽弦細卻主內。仲景云。少陰脈沉細數。病在裏。不可發汗。又云。傷寒脈弦細。頭痛發熱。此屬少陽。不可發汗。兩厥若汗必舌萎。厥不可發汗。發汗則發痙。亡血家汗之必成痙。淋家汗之便血殺。衄家汗之額上陷。咽乾汗之咽卻隘。仲景云。亡血家發汗。則寒慄而振。汗家重汗則亡陽。譫語。脈反出者死。淋家發汗。則小便血。衄家汗之。則額上陷。急而反惡寒者。此爲欲解。其脈反和者。此爲極虛。發汗則躁。心愧愧然。無大熱者。此爲欲解。

第三十三證

可吐不可吐歌

傷寒大法春宜吐。仲景云。大法春宜吐。宿食不消胸滿痞。宿食在下當吐之。胸中鬱鬱發有涎。寸口微數知其故。玉函云。寸口微數。結實胸中鬱鬱。有涎。寸口微數。知其故。玉函云。胸上寒脈弦細。頭痛發熱。此屬少陽。不可發汗。發汗則發痙。亡血家汗之必成痙。淋家汗之便血殺。衄家汗之額上陷。咽乾汗之咽卻隘。仲景云。亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。汗家重汗則亡陽。譫語。脈反出者死。淋家發汗。則小便血。衄家汗之。則額上陷。急而反惡寒者。此爲欲解。其脈反和者。此爲極虛。發汗則躁。心愧愧然。無大熱者。此爲欲解。

第三十四證

可火不可火歌

中風忽然被火劫。咽燥發黃津液竭。仲景云。太陽中風。以火劫發其汗。邪風被火劫。血氣流溢。其身則發黃。至於咽燥竭矣。榮微血弱與燒針。煩躁昏迷并發

可下不可下歌

宿食不消當下之。寸口浮大尺中微。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脈浮大。按之反澁。尺中亦微而澁。當下之。承氣湯主之。陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲欲解。陽明病。脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若一服汗出病差。停後服。語柴胡湯最宜。金匱云。汗出而譫語者。有燥屎在胃中。此風也。過經乃下之。宜大承氣湯。大柴胡湯。結胸大陷胸圓對。瘀血抵當不可遲。結胸宜大陷胸下之。瘀血宜抵當元下大便堅硬惟承氣。痞氣瀉心湯勿疑。大便堅硬。宜下以承氣湯。痞氣虛浮。宜下以瀉心湯。脈若陽微下則寒。自此以下不可下也。金匱云。陽微不可下。下之則心下痞塞。或糟虛糊更難之。仲景云。脈微不可吐。吐虛糊不可下。結胸浮大下之死。金匱云。結胸證其脈浮大者。不可下。下之則死。虛家亦然。惡寒者表證。雖不可下。嘔吐仍兼胃氣虧。仲景云。病吐者。不可下之。不利失氣必潛利。仲景云。陽明病。不大便。七日內有燥屎。欲知之法。可與小承氣湯。若腹中轉失氣者。此但頭硬。後必溏。不可下。陽明自汗。小便利。此爲津液內竭。雖堅不可攻。宜用蜜煎導之。咽中閉塞尤須忌。玉函經云。咽中閉塞。不可下。下之則上焦下重。脈則欲陷。跌陽浮數已虛脾。仲景云。跌陽脈浮而數。浮則傷胃。數則消穀。則胸滿。此非本病。醫特下之所爲也。左右上下有動氣。更在調和子細醫。仲景云。動氣在左。動氣在右。皆不可發汗。動氣在上。動氣在下。動氣在上下之則掌握熱煩。動氣在下下之則拘攣牽連頭眩。

第三十三證

可吐不可吐歌

傷寒大法春宜吐。仲景云。大法春宜吐。宿食不消胸滿痞。宿食在下當吐之。胸中鬱鬱發有涎。寸口微數知其故。玉函云。寸口微數。結實胸中鬱鬱。有涎。寸口微數。知其故。玉函云。胸上寒脈弦細。頭痛發熱。此屬少陽。不可發汗。發汗則發痙。亡血家汗之必成痙。淋家汗之便血殺。衄家汗之額上陷。咽乾汗之咽卻隘。仲景云。亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。汗家重汗則亡陽。譫語。脈反出者死。淋家發汗。則小便血。衄家汗之。則額上陷。急而反惡寒者。此爲欲解。其脈反和者。此爲極虛。發汗則躁。心愧愧然。無大熱者。此爲欲解。

第三十四證

可火不可火歌

中風忽然被火劫。咽燥發黃津液竭。仲景云。太陽中風。以火劫發其汗。邪風被火劫。血氣流溢。其身則發黃。至於咽燥竭矣。榮微血弱與燒針。煩躁昏迷并發

熱。仲景云。其脈沉者。榮氣微也。加燒針者。必怵惕。太陽被火必清血。仲景云。太陽以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。少陰火劫小便難。強責汗時。溺作竅。仲景云。少陰病欲而下利。讝語。是爲被火劫故也。小便必難。強責少陰汗故也。或致虛煩不得眠。或致發黃中鬱結。或致下血如豚肝。或致譫言語無倫。仲景云。陽明病。加温針。則煩躁不得眠。陽明病。被火劫。額上汗出。必發譫語。此皆誤火之爲病。切須子細加分別。張苗欲汗外迸之。卻取燒蔗布桃葉。陳藏器曰。張苗云。亦可燒地布桃葉。蒸湿之氣。於外迸之。可得汗也。

第三十五證

可水不可水歌

太陽汗後不得眠。少與水飲當自全。仲景云。太陽病汗後。若大汗出。胃中乾燥。煩而不能臥。其人欲飲水者。與水飲之。胃中和。則愈矣。厥陰煩渴思得水。斟量多寒亦如然。仲景云。厥陰病渴。欲飲水者。與水飲之。則愈也。霍亂思水五苓妙。嘔吐思水猪苓痊。仲景云。霍亂頭痛發熱。身體疼痛。熱多欲水。五苓散主之。又云。嘔吐而病在前上後。必思水者。與猪苓散飲之也。過多反病成喘咳。小青龍證云。水停心下。成喘咳。胃冷應知嘔噦惡。仲景云。胃中虛冷。其人不能食。欲水則噦。小噦皮上有粟起。仲景云。病在陽。當以汗解。而反以水噀之。若潠之。其人熱不得去。從頭至足。皮上粟起是也。水洗結胸熱可憐。仲景玉函云。結胸熱。以水洗之。冷水潠之。若灌之。其人熱卻不能去。可否醫工要達權。

第三十六證

可灸不可灸歌

少陰吐利時加嘔。手足不冷是其候。口中燥和背惡寒。脈來微澀皆須灸。仲景云。少陰病。其人吐利。手足不逆。反發熱者不死。脈不足者灸。脈少陰七壯。又云。少陰一二日。口中和。背惡寒者。當灸之。又云。下利脈微澀者。灸厥陰可五十壯。陰毒陽虛汗不止。腹脹腸鳴若雷吼。面黑更兼指甲青。速灸關元應不驚。宋迪性證訣云。陰證汗不止。腹脹腸鳴。面黑。指甲青者。速灸關元一百壯。主三百壯。微數之脈卻慎之。因火爲邪恐難救。仲景云。微數之脈。慎不可灸。因火爲邪。則爲煩逆。筋骨煽動。血復流也。脈浮熱甚灸爲難。唾血咽乾誠戾經。仲景云。脈浮熱甚。而灸之。則爲實。實以虛治。因火而動。咽燥。必吐血。自微數之脈。以下皆不可灸也。

第三十七證

可針不可針歌

太陽頭痛經七日。不愈再傳成大疾。法中當刺足陽明。可使不傳邪氣出。愈。仲景云。太陽以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。少陰火劫小便難。強責汗時溺作竅。仲景云。少陰病欲而下利。讝語。是爲被火劫故也。小便必難。強責少陰汗故也。或致虛煩不得眠。或致發黃中鬱結。或致下血如豚肝。或致譫言語無倫。仲景云。陽明病。加温針。則煩躁不得眠。陽明病。被火劫。額上汗出。必發譫語。此皆誤火之爲病。切須子細加分別。張苗欲汗外迸之。卻取燒蔗布桃葉。陳藏器曰。張苗云。亦可燒地布桃葉。蒸湿之氣。於外迸之。可得汗也。

第三十八證

虛寒可温歌

大抵冬宜熱藥温。大法。冬宜服温熱藥。下利少陰有二門。仲景云。注中可温者。有九證。皆下利。與少陰兩家而已。腹滿身痛先救裏。仲景云。病發熱頭痛。脈反沉。若不差。身體疼痛。先温其裏。宜四逆湯。脈來遲緊痛仍存。仲景云。下利脈遲緊。而痛未止。者。當温之。得冷者。滿而便膿垢。少陰兩上有寒飲。仲景云。少陰病。其人欲食。入則吐。心中温温欲吐。復不得吐。始得之。手足寒。脈弦遲。若屬上有寒飲。乾嘔者。切不可吐。當温之。或加嘔利病難分。脈沉微澀如斯證。四逆理中湯可温。仲景云。諸温者。可與理中四逆。附子湯。熱藥治之。

第三十九證

發熱歌

太陽發熱惡寒煩。陽明身熱汗自出。少陽發熱多乾嘔。三陽發熱證非一。仲景云。發熱惡寒者。發於陽也。大抵三陽多發熱。太陽證云。發熱惡寒。反惡熱。故陽發熱。故太陽發熱。則惡寒煩也。陽明證云。身熱汗出。不惡寒。反惡熱。則自汗也。少陽證云。頭痛發熱。胸下堅滿。乾嘔。故少陽發熱則嘔。大抵寒多爲易治。熱多寒少因寒極。寒極生熱。故熱多者寒之漸。解熱大小柴胡湯。庶看淺深爲妙術。若發熱无表證。當用大小柴胡湯。發熱沒者。宜小柴胡。熱深者。大柴胡。小柴胡解肌。大柴胡正下之也。當以外證內脈爲之準。三陰初無

發熱證。雖有少陰兩證。實脈沉發熱脈反沉者。麻黃細辛附子湯主之。又云少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。

第四十證

潮熱歌

潮熱爲實當下。仲景之言可細辨。仲景云。潮熱者實也。大柴胡湯主之。

未可下。記寒脈浮衣證在。與小柴胡湯勿下。仲景云。潮熱者實也。其脈不應。勿與承氣湯。

仲景云。若腹滿。而不大便者。可與小承氣湯。和其胃氣。勿令大下。潮熱之證有三般。皆屬陽明小柴胡。一則潮熱且吃喘。二則微熱與胎證。仲景云。陽明中風。脈弦浮大而短。氣促胸滿。發汗則惡寒。虛煩。小便難。又按之氣不通。鼻乾。不得汗。其人嘿嘿。一身及目悉黃。小便不利。有潮熱。時時發作。宜與小柴胡湯主之。又云。陽明病發潮熱。大便微硬者。可與大承氣湯。不硬者。不可與。小柴胡湯主之。三則日晡發其時。發巳微利增喘聲。噦。乙劣切。逆氣也。仲景云。其人日晡小有潮熱。從心下至小腹。鞕滿痛者。宜與大陷胸湯。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至小腹。堅滿而痛者。宜與大陷胸湯。

第四十一證

往來寒熱歌

往來寒熱亦何常。先寒後熱爲陰證。先熱後寒實在陽。陰陽交爭。故往來寒熱。陰氣勝。故先熱後寒也。此疾

第四十二證

大約有三證。大小柴胡與桂湯。中風胸滿不欲食。心煩喜嘔小腹良。仲景云。中風往來寒熱。胸脅苦滿。默不欲食。心煩喜嘔者。屬小柴胡湯。熱結在裏十餘日。祖是大柴胡克當。仲景云。傷寒十餘日。熱結在裏。往來寒熱者。宜大柴胡湯。巳汗復下胸脅滿。柴胡宜桂保安康。仲景云。傷寒五六日。已汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所發熱。而脅下滿痛。

汗之而熱不退歌

已汗復下脈加躁。不食狂言證新候。此證謂之陰陽交。死候雖醫不可道。張閭云。汗出而復熱。脈躁病不解。汗後狂言。不能食。病名為何也。曰病名陰陽交也。此其人所以汗出者。皆生於液。液生於精。今邪氣隱藏於骨肉之間。而得汗者。邪衰精盛。則當食而不發熱。熱者邪氣也。汗者胃氣也。今汗出而狂言。不能食。邪盛也。死候可明矣。得汗脈靜自然生。汗後復熱命難保。得汗而脈靜者生。躁者死。脈若浮數可再汗。沉實之時下為好。不得已須當汗。下之浮數尚可汗。沉實尚可下之。風溫之候屬萎疑。風溫。自汗而熱。喘萎疑澁。虛煩竹葉湯為宜。虛煩。自汗出而熱。不可下。宜竹葉湯。更若虛實治為宜。可細斟量休草草。淳于意診齊中御府長信病。意稱脈法熱病陰陽交者死。今切之不交。併陰陽者脈順清而急。其熱強未

第四十三證

下之而仍發熱歌

病人脈微來又濇。誤汗誤下皆為失。脈微則氣虛。脈濇則血少。二者不可汗下。既下而又汗。榮衛皆虛。故發熱也。既汗亡陽斯惡寒。又下陰微邪熱極。陰虛者陽必湊之。既下則陰虛。故陽入陰。外所以內外皆熱。張閭云。陽虛則外熱。陰虛則內熱。故熱極也。最忌陰陽皆已虛。熱又不止病斯頑。更有勞復并食復。失於調治之所致。新差血氣尚虛弱。勞復生熱撫氣力。勞復。則元力未全也。半日之間熱復回。揚手擲足煩躁列。熱脈與冷脈。本自不同。冷脈才病脈。熱脈必四五日內方發。半日之間。熱從裏來也。揚手擲足。心中煩躁。要之熱深脈亦深。熱微脈亦微相侵。仲景云。傷寒一二日至四五日脈者。必發熱。前脈者後必熱。脈深。熱亦深。脈微。熱亦微。脈虛下之。而發汗者。必口傷爛赤。血氣不通手足冷。醫人不識卻疑陰。其脈沉伏脾胃尚弱食過多。食復則發熱。逗留食。食復。則發熱。嘔吐。惰胡食矣。小柴胡實梔子湯。數者用之宜審的。

第四十四證

惡寒歌

惡寒發熱在陽經。無熱惡寒病發陰。仲景云。發熱而惡寒者。病發於陽也。无熱而惡寒者。病發於陰也。陽宜發汗麻黃湯。陰宜溫藥理中寧。發於陽立桂枝麻黃青龍湯。發於陰宜四逆理中也。嘔嘔惡寒桂枝證。仲景云。嘔嘔惡寒。桂發熱。桂枝湯證。汗後惡寒虛不任。汗後惡寒。虛也。脈微惡寒不可下。尚宜發汗莫令深。脈微。不可下。誤宜汗。亦有頭汗惡寒者。柴胡加桂直千金。頭有汗而惡寒者。仲景以柴胡加桂湯。

入瀉心。仲景云。心下痞而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。方第十八。

第四十五證

背惡寒歌

背陽復陰各異位。陽弱惡寒多在背。張閭云。背為陽。病為陰。一則三陽合病生。仲景云。三陽合病。額上生汗。背惡寒者是其證。一則少陰寒在背。惡寒者。陰病也。仲景云。少陰病。得之一二日。口中和。背惡寒者。當以灸以附子湯主之。慄讙陰陽病不同。口和不和各分配。仲景云。背惡寒。口不仁者。三陽合病也。又云。口中和。背惡寒者。少陰也。合病口外。仲景云。少陰病。得之一二日。口中和。背惡寒者。當以灸以附子湯主之。慄讙。自汗而熱。喘萎疑澁。虛煩竹葉湯為宜。虛煩。自汗出而熱。不可下。宜竹葉湯。更若虛實治為宜。可細斟量休草草。淳于意診齊中御府長信病。意稱脈法熱病陰陽交者死。今切之不交。併陰陽者脈順清而急。其熱強未上。解在

第四十六證

厥歌

厥有冷厥有熱。厥證當須子細別。冷厥纔病四肢冷。厥但沉微身不熱。冷厥。初得病便覺四支逆冷。脈沉而微。身不甚熱也。熱厥身熱頭且痛。三四日內厥方發。足多躁臥足厥冷是也。故多足指躁。外邪寒。引衣自覆不頓渴。熱厥身熱。引衣自覆。不頓渴。半日之間熱復回。揚手擲足煩躁列。熱厥與冷厥。本自不同。冷厥才病厥。熱厥必四五日內方發。半日之間。熱從裏來也。揚手擲足。心中煩躁。要之熱深厥亦深。熱微厥亦微。仲景云。傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前厥者後必熱。厥深。熱亦深。厥微。熱亦微。厥盛下之而發汗者。必口傷爛赤。血氣不通手足冷。醫人不識卻疑陰。其脈沉伏脾胃尚弱食過多。食復則發熱。逗留食。食復。則發熱。嘔吐。惰胡食矣。小柴胡實梔子湯。數者用之宜審的。

第四十四證

惡寒歌

惡寒發熱在陽經。無熱惡寒病發陰。仲景云。發熱而惡寒者。病發於陽也。无熱而惡寒者。病發於陰也。陽宜發汗麻黃湯。陰宜溫藥理中寧。發於陽立桂枝麻黃青龍湯。發於陰宜四逆理中也。嘔嘔惡寒桂枝證。仲景云。嘔嘔惡寒。桂發熱。桂枝湯證。汗後惡寒虛不任。汗後惡寒。虛也。脈微惡寒不可下。尚宜發汗莫令深。脈微。不可下。誤宜汗。亦有頭汗惡寒者。柴胡加桂直千金。頭有汗而惡寒者。仲景以柴胡加桂湯。

入瀉心。仲景云。心下痞而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。方第十八。

第四十五證

背惡寒歌

背陽復陰各異位。陽弱惡寒多在背。張閭云。背為陽。病為陰。一則三陽合病生。仲景云。三陽合病。額上生汗。背惡寒者是其證。一則少陰寒在背。惡寒者。陰病也。仲景云。少陰病。得之一二日。口中和。背惡寒者。當以灸以附子湯主之。慄讙陰陽病不同。口和不和各分配。仲景云。背惡寒。口不仁者。三陽合病也。又云。口中和。背惡寒者。少陰也。合病口外。仲景云。少陰病。得之一二日。口中和。背惡寒者。當以灸以附子湯主之。慄讙。自汗而熱。喘萎疑澁。虛煩竹葉湯為宜。虛煩。自汗出而熱。不可下。宜竹葉湯。更若虛實治為宜。可細斟量休草草。淳于意診齊中御府長信病。意稱脈法熱病陰陽交者死。今切之不交。併陰陽者脈順清而急。其熱強未

第四十六證

厥歌

厥有冷厥有熱。厥證當須子細別。冷厥纔病四肢冷。厥但沉微身不熱。冷厥。初得病便覺四支逆冷。脈沉而微。身不甚熱也。熱厥身熱頭且痛。三四日內厥方發。足多躁臥足厥冷是也。故多足指躁。外邪寒。引衣自覆不頓渴。熱厥身熱。引衣自覆。不頓渴。半日之間熱復回。揚手擲足煩躁列。熱厥與冷厥。本自不同。冷厥才病厥。熱厥必四五日內方發。半日之間。熱從裏來也。揚手擲足。心中煩躁。要之熱深厥亦深。熱微厥亦微。仲景云。傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前厥者後必熱。厥深。熱亦深。厥微。熱亦微。厥盛下之而發汗者。必口傷爛赤。血氣不通手足冷。醫人不識卻疑陰。其脈沉伏脾胃尚弱食過多。食復則發熱。逗留食。食復。則發熱。嘔吐。惰胡食矣。小柴胡實梔子湯。數者用之宜審的。

第四十四證

惡寒歌

惡寒發熱在陽經。無熱惡寒病發陰。仲景云。發熱而惡寒者。病發於陽也。无熱而惡寒者。病發於陰也。陽宜發汗麻黃湯。陰宜溫藥理中寧。發於陽立桂枝麻黃青龍湯。發於陰宜四逆理中也。嘔嘔惡寒桂枝證。仲景云。嘔嘔惡寒。桂發熱。桂枝湯證。汗後惡寒虛不任。汗後惡寒。虛也。脈微惡寒不可下。尚宜發汗莫令深。脈微。不可下。誤宜汗。亦有頭汗惡寒者。柴胡加桂直千金。頭有汗而惡寒者。仲景以柴胡加桂湯。

入瀉心。仲景云。心下痞而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。方第十八。

第四十七證

結胸歌

病發於陽下之早。熱氣乘虛心懆懆。仲景云。病發於陽。而反下之。熱入因作結胸。所以成結胸者。下之早故也。按之石鞕頭項強。此是結胸證分晰。仲

云結胸者頭項亦強如柔痙狀下之則和又云其脈浮緊心下痛按之如石堅脈浮與大未可下先汗後下無煩倒仲景云其脈浮大不可下下之則死熱帶上攻結在胸枳實理中應怡好大抵結胸未辨處實大抵結胸有三說大結小結幷水結有大結胸有小結胸有水結胸仲景云但結胸無大熱者此爲水結在胸脅也但頭汗出者大陷胸湯更有寒熱二證存熱實寒實宜區別仲景云太陽病從心下至小腹鞕滿痛不可近者大陷胸湯主之此大結胸也又云小結胸病正在心下按之痛脈浮滑者小陷胸湯主之此小結胸也又云傷寒結胸熱實脈沉緊心下痛大陷胸湯主之此熱實者也又云寒實結胸無熱證者三物小陷胸湯亦可服此寒實者也此外有證名蠶結脈浮關小沉細絕仲景云欲登不能時時下利寸脈浮關小細沉緊名曰蠶結舌上白胎滑者誰治也舌上滑胎不可攻痛引陰筋當死別仲景云病者脅下素有痞而在膜俗名曰蠶結舌上白胎滑者此名蠶結死也結胸之狀如痙病從心至臍不可近仲景云結胸者項亦強如柔痙狀又云從心以下至臍不可近大陷胸湯主之心中懊憹幷躁煩陽氣內陷非虛煩居緻切悶也仲景云荷內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹心下因硬則爲結也

第四十八證

痞歌

痛爲結胸否爲痞音被關脈皆沉本同類仲景云結胸病證於陰而反汗之因作痞仲景云傷寒論云病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反汗之因作痞痞與結胸不痛則爲痞結胸與痞可脈浮關上者浮且滑心仲景云心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之發渴煩躁五苓對仲景云心下痞與瀉心湯共入渴而口煩躁小便不利者用五苓湯主之結梗相質湯最佳先與服之使行氣智人治痞氣多作結梗相質湯往往便差以其下氣故耳下利雷鳴心下硬甘草瀉心湯可治仲景論中瀉心湯加減有五證皆爲痞氣而設也但痛而不痞者宜半夏瀉心湯色黃手足温者黃連瀉心湯漐漐汗出者附子瀉心湯乾嘔吐逆者生薑瀉心湯腹中雷鳴下利者甘草瀉心湯也

第四十九證

發黃歌

濕熱在裏不能散熱苦脾中成此患濕熱宿穀更相搏鬱蒸不消黃色起巢氏云寒濕在裏則熱鬱於脾胃脈理不通身體發黃色頭面有汗劑類止渴飲水漿骨節疼煩欲吐仲景云俱頭汗出頸項強而小便不利身必發黃也浮滑緊數脈來時茵蔯五苓皆可選茵陳蒿湯五苓散皆可通瘀血之證亦相類大便必黑此其異血證其間多發狂妄須辨別無乖戾發狂有二證有陽毒發狂多乾嘔煩躁陽氣內陷非虛斷陰煙血如狂脈沉微但欲嗽水不咽入小腹硬滿小便利不發寒熱大便黑仲景云陽明病七八日裏證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹當硬滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也當渴主之大抵當汗而不汗熱化爲血如何散血上苦兮喜忘多血下苦兮還悶亂桑同云血在上則狂血在下則狂更有火劫發狂時桂枝救逆湯加減仲景云傷寒之脈浮而緊浮者陽緊者陰緊則爲寒緊則爲痛寒痛相搏

梔子湯主之。又一證下後不可便行桂枝湯。若汗出而喘。无大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。陽明潮熱小承氣湯。仲景云。潮熱者實也。有潮熱者。小承氣湯主之。水停心下。噁而吵。加減茯苓甘草湯。仲景云。陽明病。口燥。但欲漱水不咽入者。此必衄。衄家不可攻其表。汗出。豁上脈。直視不能眴。不得臥。又云。衄血家不可攻其表。汗出則寒慄而振。　衄後脈微血已虛。慎勿服之令病愈。且君厚角地黃湯。不止茅花須頓速。若脈微血虛。則宜桂枝湯不可用也。小品厚地黃湯。活人書云。茅花湯皆可用。　陰證本來無此候。少陰強發紅來觸。下厥上竭不可醫。血流口鼻或耳目。仲景云。少陰病。但欲無汗而強發之。則衄血。不知從何道出。或從口鼻耳目中出。是為下厥上竭。為難治。

第五十六證

吃噎歌

胃虛為蟨名吃噎。吃。聲嗌語蹇也。噎。胸氣飽出息。多因吐下絲虛極。古人方書无吃字。惟有噦噎。朱肱以噦者吃氣也。　橘皮乾薑退陰散。或灸乳下皆得力。

灸法見活人書井長方中。又有陽明小柴胡。視其前後部何如。仲景云。傷寒。脈面汗者。視其前後。知何部不利。利之則愈。　因虛攻熱必生噦。仲景言之豈妄歟。仲景云。其人本虛。攻其熱必噦。噦火外切。又於月切。逆氣也。　更有一證欲作汗。陰陽升降致屯如。胃氣上逆無休止。逡巡中汗自然除。　噦安常設。

第五十七證

諮語歌

實則譫語。虛則鄭聲。鄭聲者重語也。直視譫語面垢滿者死。下利不止亦死矣。　大小便利手足冷。更兼脈細是虛寒。陽明受病蘊邪熱。在表當汗汗不發。熏源方云。吐血者。皆由陽受邪熱。初在表。當發汗。而汗不發。致使熱毒入深。結在中焦。血從上溢。或從口鼻耳目中出。是為下厥上竭。為難治。

停須吐血。輕者犀角地黃湯。重者抵當方能絕。小品犀角地黃湯。主傷寒及溫病。應發汗而不發之。內多汗。津液外出。胃中燥。大便必堅。堅者證語。承氣湯主之。三陽合病或瘀血。或是熱入於血室。仲景云。三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口中不仁。譫語。又云。脅下滿如結胸狀。其人譫語。此皆熱入血室。　大下寸口脈沉遲。吐血升麻安可缺。陽畢升麻湯。證云。陽畢二脈。吐下之後。慎成陽難。亟吐血。發熱陽脈生。反見陰脈斯為逆。譫語發熱。見陽脈者生。見陰脈者死。

第五十八證

煩躁歌

太陽陽盛必須衄。衄証已解時何幸。衄。鼻血也。張氏云。脈浮發熱。其身无汗自衄者。愈。蓋太陽病。有因衄血而便自解者。　浮緊無汗係麻黃。脈浮自汗桂枝湯。仲景云。陽明脈浮。自汗出。小復惡寒。其人欲飲不了了者。此大便堅也。　傷風之候太陽多。

傷寒煩躁證如何。陽明證與少陰科。陽明脈長大便鞕。仲景云。陽明脈長。自汗出。小復惡寒。其人欲飲不了了者。此大便堅也。

仲景云。太陽病。服桂枝湯。煩不解者。宜刺風池風府。卻與桂枝湯。又云。服桂枝湯。復大煩。渴不解。脈洪大者。白虎湯。陰盛陽虛。亦煩躁。少陰之證。莫令訛。大抵陰盛陽虛。亦煩故。少陰證多煩躁。少陰腎也。腎系煩。故煩躁入腎經。則煩躁。宜灸仲景云。少陰病。煩而總則汗下而煩。腎者證。仲景云。傷寒吐下發汗。虛煩脈甚微。八九日。心下堅。病經脈動惕者。久而成痓。病解而煩氣未和。更有虛煩。宜竹葉。莫作傷寒致誤佗。孫兆云。虛煩熱疾。與傷寒相似。得病二三日。脈不浮。不惡寒。身不疼痛。但熱而煩。非表候。不可發汗。如脈不緊實。病但熱。或不煩。非表實。不可下。汗下必危。但用竹葉湯主之。其病自然而愈也。

第五十九證

懊憹歌

傷寒懊憹意忡忡。懊於告反。憹子金音。作農。外證云奴動切。或實或虛病胃中。結胸下早陽內陷。陽明誤下胃虛空。懊憹證有三。此一證胃中因下空虛。而致也。仲景云。胃中空虛。客氣動膈。煩氣填塞。心中懊憹。陽氣內陷。心中因硬。因爲結胸。又云。陽明證。其脈浮緊。下之則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上白胎者。梔子湯主之。若湯欲飲水者。白虎湯主之。客氣動膈心中躁。梔子湯主之。若湯欲飲水者。白虎湯主之。渴欲大陷胸。結胸陷胸湯主之。胃中燥屎宜承氣。腹滿而堅。不可攻。此一證胃中下後有燥屎也。仲景云。陽明病。下之。心下懊憹。煩胃中有燥屎者。可攻。其人腹微滿。頭硬。後潮者。不可下之。有燥屎者。宜承氣潮者主之。

第六十證

怫鬱歌

怫鬱有虛亦有實。要須子細明證脈。怫音拂。壅塞燥屎者實也。吐下者虛也。燥屎唯宜承氣湯。仲景云。病者小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥。有燥屎故也。承氣湯主之。吐下梅虛胃寒疾。仲景云。傷寒大吐下後。梅虛復梅汗者。其人外氣怫鬱。與之水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。噦如火燒。從心肝出。客熱因火而添。怫鬱益。火盡汗出目須黃。仲景云。寸口脈。浮而緊。緊如轉索無常。此爲胃氣和。其人榮衛通。汗出而愈。仲景云。陽明病。被火。額上微汗出。發黃色。劇則如出不惡寒。加溫針者。必怵惕。煩躁不得眠。脈浮火劫必亡陽。仲景云。傷寒脈浮。自以火迫劫之。亡陽。必驚。狂。起不安者。桂枝去芍藥。加蜀漆。牡蠣龍骨救逆湯。三者不洪而大者。柴胡長。發汗長。仲景云。寸口脈浮大。醫以三陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。發而色澤正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。熏之。則發黃。若小便不利者。必從小便去。

張仲景註解傷寒百證歌卷四

第六十一證

發惕歌

傷寒何故生發惕。吐下溫針或火力。或因吐下。或因溫針。或因火劫。下之譫語壯蠣湯。仲景云。傷寒八九日。下之。胸滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡痛。不可轉側者。柴胡加牡蠣龍骨湯主之。妄用溫針於理逆。仲景云。太陽傷寒。加溫針必驚也。風溫被火多痵。尺世切。亦作瘨。癡。癡子用切。癎癲。時撮搦。若火室之一逆尚引日。再逆促命期。陽明被火額上微汗出。仲景云。陽明病。被火。額上微汗出。發黃色。劇則如出不惡寒。加溫針者。必怵惕。煩躁不得眠。脈浮火劫必亡陽。必驚。狂。起不安者。桂枝去芍藥。加蜀漆。牡蠣龍骨救逆湯。三者不

第六十二證

發惕歌

心悸歌

傷寒心悸有多端。大抵三陽不一般。仲景云。悸證有八九皆屬三陽。太陽便利多飲水。仲景云。太陽病。小便利者。以飲水多。心下悸。小便少者。必苦裏急也。陽明煩喘小便難。仲景云。傷寒五六日。中風。往來多熱。心下悸小便不利。心煩喘滿者。小柴胡湯主之。少陽吐下仍虛悸。仲景云。少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿而煩。不可吐下。吐下則悸而驚。誤下煩時胃內乾。仲景云。傷寒。其脈弦緊。發熱。此屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。爲逆。胃和則愈。胃不和則煩而悸也。脈來結代炙甘草。仲景云。傷寒脈結代。心動悸。炙甘草湯主之。方第三十九。小建中行三日間。仲景云。傷寒二三日。心中悸者。小建中湯。汗過自胃桂甘證。肉瞤眞武定須安。此二證。自汗過而悸也。仲景云。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯。方第二十七。又云。太陽病。發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。方第四十二。

第六十三證

胃悶歌

二陽併病必須冒。宣劑大椎當愼表。仲景云。太陽少陽併病。頭痛或眩。苓桂朮甘湯。方第四十。大椎第一間。肺俞肝俞。慎不可發汗。下利面赤脈沉遲。汗出中心常鬱悗。仲景云。下利脈沉遲。其人面少赤。身有微熱。下利清穀者。必鬱冒汗出。吐下汗後或動經。傷寒吐下後。發汗虛煩。脈甚微。八九日。心下痞。脈浮。自汗出。小便利。病人叉云。吐利汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。暑月忽然心擾痛。兩脚轉筋多冷汗。上吐下利幷躁煩。水漿罔進身那得好。仲景云。霍亂中風。發爲大熱。幷脈沉。發汗熱不止。叉汲水與其身。煩懊擾。欲飲水。則以五苓散與之。故汗出而冒熱。汗下表裏已先虛。汗出表和猶可保。仲景云。太陽病下之而氣先復。發汗以助表。裏俱虛。其人必冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。

第六十四證

乾嘔歌

陽明胃絡從頭走。氣上逆行須便嘔。嘔者胃不和。則胃之絡脈逆。走足。今氣上行而逆。故嘔也。胸中有熱貢逆候。仲景云。傷寒。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。宜瀉熱湯主之。方第二十五。水停心下茯苓甘。發汗吐下後。心下逆滿者。茯苓甘草湯。又方。心下有水氣。乾嘔者。小青龍湯主之。

第六十五證

吐逆歌

三陽往往病頭疼。隨證醫治各異能。三陽經絡上至於頭。三陰至胸中而還。故三陽之邪至頭。必頭疼也。太陽身熱麻黃證。仲景云。太陽病。頭疼發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。胸中有熱貢逆候。仲景云。傷寒。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。宜瀉熱湯主之。方第二十五。無熱陽明胃氣燕。仲景云。陽明病。手足若厥。其人頭必痛。若不嘔不飲。手足不厥者。其頭不痛。少陽受病脈弦細。小柴胡證自分明。仲景云。傷寒。其脈弦細。頭痛發熱。此爲屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。爲逆。胃和則愈。胃不和則煩而悸。三陰太少無頭痛。爲是厥陰之證形。三陰之中。太陰少陰無頭痛。惟厥陰有也。非時忽有痛首疾。痛音潛。必是停飲乃心悸。仲景云。心悸有多端。大抵三陽不一般。陽明煩喘小便難。少陽吐下仍虛悸。誤下煩時胃內乾。汗後胃和則愈。胃不和則煩而悸。三陰太少無頭痛。爲是厥陰之證形。非時忽有痛首疾。必是停飲乃心悸。

第六十六證

嘔亂歌

嘔亂病有證亂者何也。仲景云。病有嘔亂者。何也。答曰。嘔吐而利名嘔亂。仲景云。嘔而發熱者。小柴胡湯主之。嘔吐而利名嘔亂。四肢逆冷臧斯患。寒多不飲理中圓。熱多而渴五苓散。仲景云。霍亂頭痛。熱多欲飲水。五苓散。寒多不飲水者。理中圓主之。暑月忽然心擾痛。兩脚轉筋多冷汗。上吐下利幷躁煩。水漿罔進身那得。仲景云。霍亂吐利汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。

第六十七證

蛔疼歌

蛔疼證有三陽往往病頭疼。隨證醫治各異能。三陽經絡上至於頭。三陰至胸中而還。故三陽之邪至頭。必頭疼也。太陽身熱麻黃證。仲景云。太陽病。頭疼發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。胸中有熱貢逆候。仲景云。傷寒。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。宜瀉熱湯主之。方第二十五。無熱陽明胃氣燕。仲景云。陽明病。手足若厥。其人頭必痛。若不嘔不飲。手足不厥者。其頭不痛。少陽受病脈弦細。小柴胡證自分明。仲景云。傷寒。其脈弦細。頭痛發熱。此爲屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。爲逆。胃和則愈。胃不和則煩而悸。三陰太少無頭痛。爲是厥陰之證形。三陰之中。太陰少陰無頭痛。惟厥陰有也。非時忽有痛首疾。痛音潛。必是停飲乃心悸。仲景云。心悸有多端。大抵三陽不一般。陽明煩喘小便難。少陽吐下仍虛悸。誤下煩時胃內乾。汗後胃和則愈。胃不和則煩而悸。三陰太少無頭痛。爲是厥陰之證形。非時忽有痛首疾。必是停飲乃心悸。

第六十五證

吐逆歌

吐有冷熱兩證異。內脈外形當子細。吐有胃冷。有胃熱者。當以內脈外形辨之。煩渴脈數手心熱。此是胃熱之所致。仲景云。脈來數手心熱。煩渴者。胃熱也。竹葉湯證。曾經汗下關脈遲。胃中虛冷理中治。肝脈遲。胃虛也。理中元及湯主之。兩上寒邪四逆湯。仲景云。若兩上有寒。欲乾嘔者。不可吐。當溫之。宜四逆湯。汗後雨淋煩竹葉。汗後。煩渴。小便不利者。竹葉井橘皮湯證。少陰欲吐復不吐。必覺吐之當瞥記。仲景云。少陰病。其人欲食。入則心中溫溫欲吐。復不得吐。始得之。手足寒。脈弦遲。此胃中實也。不可下。當

第六十六證

霍亂歌

霍亂病有證亂者何也。仲景云。病有霍亂者。何也。答曰。嘔吐而利名霍亂。四肢逆冷臧斯患。寒多不飲理中圓。熱多而渴五苓散。仲景云。霍亂頭痛。熱多欲飲水。五苓散。寒多不飲水者。理中圓主之。暑月忽然心擾痛。兩脚轉筋多冷汗。上吐下利幷躁煩。水漿罔進身那得。仲景云。霍亂吐利汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。

第六十七證

蛔疼歌

蛔疼證有三陽往往病頭疼。隨證醫治各異能。三陽經絡上至於頭。三陰至胸中而還。故三陽之邪至頭。必頭疼也。太陽身熱麻黃證。仲景云。太陽病。頭疼發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。胸中有熱貢逆候。仲景云。傷寒。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。宜瀉熱湯主之。方第二十五。無熱陽明胃氣燕。仲景云。陽明病。手足若厥。其人頭必痛。若不嘔不飲。手足不厥者。其頭不痛。少陽受病脈弦細。小柴胡證自分明。仲景云。傷寒。其脈弦細。頭痛發熱。此爲屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。爲逆。胃和則愈。胃不和則煩而悸。三陰太少無頭痛。爲是厥陰之證形。三陰之中。太陰少陰無頭痛。惟厥陰有也。非時忽有痛首疾。痛音潛。必是停飲乃心悸。仲景云。心悸有多端。大抵三陽不一般。陽明煩喘小便難。少陽吐下仍虛悸。誤下煩時胃內乾。汗後胃和則愈。胃不和則煩而悸。三陰太少無頭痛。爲是厥陰之證形。非時忽有痛首疾。必是停飲乃心悸。

第六十八證

喘滿歌

喘滿病有三陽證。仲景云。病有三陽證者。何也。答曰。喘而發熱者。小柴胡湯主之。喘而汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。喘而發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。喘滿病有三陰證。仲景云。病有三陰證者。何也。答曰。喘而利名喘滿。仲景云。喘而利者。桂枝加厚朴杏子湯主之。喘而汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。喘而發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。喘滿病有水氣。仲景云。病有水氣者。何也。答曰。喘而利名喘滿。仲景云。喘而利者。桂枝加厚朴杏子湯主之。喘而汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。喘而發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。喘滿病有熱證。仲景云。病有熱證者。何也。答曰。喘而發熱者。小柴胡湯主之。喘而汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。喘而發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。喘滿病有三陽證。仲景云。病有三陽證者。何也。答曰。喘而發熱者。小柴胡湯主之。喘而汗出。發熱惡寒。四支拘急。手足厥。四逆湯主之。喘而發熱。身疼。无汗而喘者。麻黃湯主之。

脅痛歌

少陽脅經循脅過，邪入此證痛無那，脅者膜也，仲景云，少陽經循脅過耳，故脅痛屬少陽，其耳聾在此則脅痛兼耳聾也。心下堅滿引脅痛，十棗湯治定須可。仲景云，太陽中風，吐下微煩，心下痞堅滿，引脅下痛，表病裏未和者，十棗湯主之。陽明堅滿大便結，項強不食并潮熱，因而轉入少陽經，唯小柴胡湯緊切。仲景云，陽明病不大便，脅下堅滿，舌上有胎者，可與小柴胡湯，又云，陽明脅下痛者，可與小柴胡湯，又云，陽明病五六日，中風，往來寒熱，胸脅苦滿，默默不欲食，小柴胡湯主之，又云，陽明病，潮不解，脅下堅滿，乾嘔者，小柴胡湯主之。病人痞積貫膈傍，痛引陰筋名藏結。仲景云，病者脅下痛，牽有痞積在膜傍，痛引小腹入陰筋者，名藏結。

第六十九證

腹痛歌

腹痛有實亦有虛，要觀證與脈何如，尺脈帶弦并濇利，陽明虛痛建中須。仲景云，傷寒脈濇，陰脈弦，法當腹中急痛，先與小建中湯。關脈若實大便祕，更加腹滿實中居。仲景云，病人不大便，煩躁，腹滿痛，此為有燥屎，陰證腹痛四逆散。仲景云，少陰病，四逆，其人或欬或悸，小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之，又云，少陰病，下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥，通脈四逆湯主之，又云，少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，或欬或悸，或小便不利，或下利，或嘔者，真武湯主之。下之腹痛桂枝詩。太陽病，發汗，反下之，因而腹滿時痛，屬太陰，桂枝加芍藥湯主之，大實痛者，加大黃湯也。

第七十證

胃痛歌

胃中有邪胸中熱，嘔吐黃連湯可治。仲景云，傷寒，胸中有熱，胃中有邪，氣逆欲嘔吐者，黃連湯主之。

第七十一證

遺尿歌

風溫發下必失溲，肝腎雖昔自汗流。仲景云，風溫為病，脈陰陽俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，語言難出，若發下者，小便不利，直視失溲。三陽合病身體重，不覺遺尿也可疑。仲景云，三陽合病，腹滿身重，難以轉側，口不仁，面垢，譫語，遺尿，發汗則譫語，下之則額上生汗，手足厥冷，自汗出者，白虎湯主之，又云，少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，或欬或悸，或小便不利，或下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥，通脈四逆湯主之，下焦不歸亦遺溺，三者依方病可瘳。仲景云，下焦竭，即遺溺，以上三證，忽然直視并狂語，腎絕如何得久留。仲景云，傷寒，脈結代，心動悸，脈來動而中止，更數更多，動則心悸，而脈結代者，炙甘草湯主之，又云，傷寒，脈結代，心悸者，炙甘草湯主之，又云，傷寒，脈結代，心悸者，炙甘草湯主之，又云，傷寒，脈結代，心悸

第七十四證

蚘厥歌

胃冷仍加發汗重因成蚘厥吐長蟲病源本屬厥陰證宜用烏梅與理中。仲景云蚘厥者其人當吐令病者靜而復時煩此為藏寒蚘上入其膈故須臾煩亂欲飲酸其脈必滑身自汗出小便利其病欲解此屬乘歸名曰蚘當利期門期門穴在乳下。心中懊憹栀子應。仲景云陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹若飢不能食但頭有汗出者宜用栀子湯主之。滿欲吐湯六者看詳宜審訂。

第七十五證

自汗歌

傷寒自汗證有九衞不和兮在枝候。仲景云病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衞氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯。風溫風溼及傷風。仲景云風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻鳴語言難出若被下者小便不利直視失溲若被發汗者必發痓此皆誤治也。澁家之為病其人頭汗出背強欲得被覆被向火。繼上汗出微喘此風溼自汗也。仲景云太陽中風陰弱陽強者自汗出此傷風自汗也。中暑亡陽柔痙有。仲景云太陽中暍者其人汗出惡寒身熱而渴此中暑自汗出也仲景云傷寒自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反掣肢冷加附子湯主之。此為本虛救當驚而汗出本不虛若欲自解但汗出耳不發喘也病有不瘥不汗出而解者何也答曰其脈自微此以當數汗若吐若下若亡血內傷云脈陰陽俱緊而反汗出為亡陽陽少陰此亡陽自汗也。仲景云太陽病發熱汗出不惡寒名曰柔痙此柔痙自汗也。猖亂下利四肢逆。仲景云猖亂吐利出汗發熱惡寒四支拘急手足厥冷四逆湯主之。陽明多汗津液源。仲景云陽明病脈微而汗出少者為自和汗多者太過太過者陽明於內亡津液大便因堅也。少陰無汗或有之額上手背時時透。仲景云陰不得有汗故知非少陰也少陰有汗但額上手背有耳。朱迴傷寒陰證缺云陰病額上手背皆有冷汗三二日中間可行。隨證治療莫令差更看病形深體究。

第七十六證

頭汗歌

病人裏虛而表實玄府不開腠理密無能作汗潤皮膚陽氣上行頭上出津液既竭五內乾誤下重虛成大疾。病人表實玄府不開汗不能泄於周身故上騰而發於頭額也汗既出多五藏津液寡少又虛實之以汗亦成大疾。頭有汗兮多染經劑類而遊發黃病。仲景云若不結胸但頭汗出餘處無汗齊頸而還少餘不利。往來寒熱我未解。仲景云傷寒五六日多必發熱。柱來寒熱而煩此為未解小柴胡湯桂枝湯。手足冷時非陰證。仲景云傷寒七八日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便堅其脈緊此為陽微結有裏沒有表也。反大熱者此為難治設使堅痛者必欲嘔也腹內痛者必欲利也。陽明渴痛并臟結。色白胎滑多在舌。二證見下文。臟結無陽不可攻。仲景云藏結者無陽證不往來寒熱其人反靜舌上滑胎者不可攻。澤瀉丹田應有熱。仲景云澤瀉之候舌上有胎者以丹田有熱胸中有寒澤瀉出胸中邊也。陽明懊憹脅下堅。梔子柴胡不徙設。陽明有二證仲景云陽明心中懊憹舌上胎者梔子湯主之又云陽明病脅下堅痛不大便而嘔舌上胎者可與柴胡湯上痛得通津液得下胃氣因和身濈然汗出則解。

第七十七證

欲得汗歌

陽加於陰有汗期過關之脈要須知。素問云陽加於陰謂之有汗俗謂過關之脈也。有時兩手忽無脈。恰似重陰欲雨時。有時一手無脈或兩手無脈者有汗證也。病人本虛必發顛不虛得汗顛何為不頭不汗自然解陽陰和順更何疑。先曾吐下并亡血內無津液故如斯。仲景云病有發而汗出固得解者何也答曰脈浮而緊按之反芤此為本虛救當驚而汗出也若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不發喘也病有不瘥不汗出而解者何也答曰其脈自微此以當數汗若吐若下若亡血內傷

第七十八證

舌上胎歌

陰陽俱緊鼻出涕舌上胎滑勿妄治蹉跌惡寒多嘔痰腹內痛者須成利。仲景云脈陰陽俱緊口中和出膏口乾燥膏臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也。

第七十九證

下膿血歌

發仲景註解傷寒百證歌　卷四

傷寒發胃裏逼虛。熱氣乘虛腸裏居。下利膿血赤黃汁。或如魚膠狀難拘。病源傷寒病。苦發胃裏虛。熱氣乘虛入於腸胃。則下膿血。如魚膠狀。難拘束也。太陽下之脈浮滑。定知便血色殷於。仲景云。太陽下之。其脈浮者。必下血。殷於。如字。陽明下血。如字。仲景云。陽明病下血而讝語者。必發熱入血室。頭汗出者。亦劇。劇則門醋。其實而病之。讝語。熱氣盛也。熱汗出則愈。少陰膿血桃花證。不爾剌之邪可祛。仲景云。少陰下利。便膿血者。桃花湯主之。又云。少陰病下利。便膿血者可刺。下利脈浮尺中濇。或是發厥熱如初。二證皆圈膿血利。遂見長沙仲景書。仲景云。一證傷寒發熱四日。脈反三四至六日。熱不除。必清膿血。又一證云。下利脈又浮數。尺中自濇。其人必圈膿血。

第八十證

壹夜偏劇歌

衛氣循環不暫停。壹則行陽夜在陰。衛獨留陽陽盛陰。陰虛夜不寐。忽若留陰陰踡濕。陰滿陽虛壹卻爭。黃帝素經云。衛氣者。晝日行於陽。夜行於陰。衛氣不得入於陰。常留於陽。則陽氣滿。滿則陽踡盛而不得入於陰。壹踡卻爭。陰氣虛則夜不得寐也。衛氣留於陰。不得行於陽。陽氣虛。故壹則爭而不安。

第八十一證

褕衣摸空歌

了陰虛證。壹燥陽虛夜氣清。仲景云。婦人傷寒發熱。經水適來。壹則明了。暮則譫語。如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸床。惕不安。微喘直視。脈弦者生。濇者死。仲景云。太陽中風。以火劫之。兩陽相熏灼。其身發黃。喘而胸滿。口鼻氣出。其人小便難。時時惡風。大便反硬。小便利者。可治。華陀云。病人褕衣縫不可治。

第八十二證

筋惕肉瞤歌

罪入之也。故發熱甚。甚了下而復汗。汗出必亡陽。而衛在陰也。故晝瞤夜靜。要須調衛各歸分。二氣諧和可漸平。

病人肉瞤并筋惕。汗過經虛真武啟。仲景云。大青龍湯證云。若脈微弱。汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。又云。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。不然邪入大經中。狀如痙。痙家其人大便反鞕。小便自利。其人口噤。不能言。手足反張。背弓如角。可與大承氣湯。

第八十三證

口燥咽乾歌

脾中有熱胃乾枯。口燥咽乾津液無。陽明白虎加參證。少陽口苦小柴胡。仲景云。陽明病。脈浮緊。咽乾。口苦。口乾苦燥者。白虎湯。又云。少陽之爲病。口苦咽乾目眩者。宜小柴胡湯。咽乾慎不可發汗。發汗無津氣愈虛。仲景云。咽喉乾燥。不可發汗。少陰口燥急須下。腎經少水致焚如。仲景云。少陰病。得之二三日口燥咽乾。急下之。宜服承氣湯。又云。少陰病二三日。咽痛者。與甘草湯。不差。與桔梗湯。此證切宜審用之。蟲蝕上部聲嗄感。咽乾蝕藏下上名狐。仲景云。狐惑之病。蟲蝕上下部。蝕上部則聲嗄。蝕下部則咽乾。

第八十四證

傷寒似瘧歌

傷寒似瘧三證詳。血室陽明及太陽。謂婦人熱入血室。及陽明太陽證也。太陽汗出脈洪大。桂枝各半合麻黃。仲景云。太陽病八九日。如瘧狀。熱多寒少。清便自可。宜桂枝麻黃各半湯。陽明忽爾寒如瘧。不嘔清便熱復涼。脈若虛浮桂枝證。小承氣脈實柏當。仲景云。病者頭熱。汗出即解。復如瘧狀。日晡所發者。屬陽明。脈實者宜下之。脈浮虛者。宜發其汗。下宜承氣湯。發汗宜桂枝湯。婦人熱入血疑結。柴胡加入地黃湯。仲景云。婦人中風。七八日。寒熱往來。經水適斷。血結如腫狀。宜小柴胡主。

第八十五證

邪中二焦歌

寸口陰陽脈俱緊。上下二焦皆受病。仲景云。寸口脈。陰陽俱緊者。當邪中於上焦。濁邪於下焦。清邪中上。名曰渫。濁邪中下。名曰滿也。陰中於邪必內慄。足膝逆冷便溺出。又云。陰中於邪。必內慄也。又云。濁邪中下。陰氣爲慄。足膝逆冷。便利妄出也。頸壅屈。陽中於邪。必發熱頭痛。項強難舉。腰痛難轉。皆因寒露氣爲傷。隨證治之宜審的。

第八十六證

多眠歌

多眠四證病形殊。風溫狐惑及柴胡。更有少陰同共四。當觀形與證何如。風溫身熱常自汗。仲景云。風溫脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠。鼻息必鼾。小柴胡湯。胸滿項強拘。仲景云。陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹都滿。脅下及心痛。其人喜眠。一身及目悉黃。小便難者。潮熱。宜小柴胡湯。少陰自利但欲寐。仲景云。少陰病。但欲寐。五六日自利而煩。但欲寐。不得臥寐者死。又云。心中煩。不得臥者。黃連阿膠湯。雖發雖治要在審詳。然溫病亦有不寐者。仲景云。少陰病。其人欲吐不吐而煩。但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰。仲景不論方。又云。少陰脈微細沉。但欲臥。汗出不渴。雖欲吐。五六日自利。煩躁不得臥寐者死。又云。心中煩。不得臥者。黃連阿膠湯。眠非一途。仲景云。狐惑證。嘿嘿但欲臥。目瞑不得眠。蒸心苦悶過主之。又玉函一證云。三陽合病。脈浮大。上關上但欲寐。目合則汗。

第八十七證

不得眠歌

傷寒何事不得眠。汗過胃中乾燥煩。仲景云。太陽病發汗。若大汗出。胃中乾。躁煩不得眠。其人欲飲水。當稍飲之。令和則愈矣。或因大熱語言顛。陽邪熱病。皆不得眠。小便不利正發渴。心煩少氣苦孜孜。仲景云。少陰病。欲吐不吐。心煩。小便不利。或因吐下虛煩致。仲景云。發汗吐下後。虛煩不得眠。若剧者。必反覆顛倒。心中懊憹。舌乾口燥。欲飲水數升。猪苓可保全。仲景云。胃中乾燥。不得眠者。猪苓湯。傷寒差後熱尚在。陰未復時陽進。使然。菊源云。衛社者。陽和盛。陰氣衰。則相搏。交令熱氣未散。與諸陽并所以陽痛盛。陰偏虛。雖汗病後仍不得眠者。陰氣未復於本。故也。外證有肘後烏梅湯。

第八十八證

小便不利歌

胃中乾則無小便。愼勿利之強使然。菊源云。傷寒發汗後。而汗出不止。津液少。胃中乾小腸有伏熱。故小便不通也。故不可強利之。下焦有熱者。小便反數。下焦有熱。故小便不利。小腸滿或喘者。小青龍湯主之。項強無汗桂枝疼。仲景云。申湯之等候。其人小便不利。大抵中濕發黃者。先利小便。大抵中濕發黃。先利小便。使快。仲景云。申湯之等候。其人小便不利。大抵中濕發黃者。先利小便。使快。仲景云。服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿痛。小便不利。又云。傷寒身色如金黃。可與麻黃連翹赤小豆湯。嗽而有水青龍候。仲景云。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欲咳。或小便不利。小腹滿或喘者。小青龍湯主之。項強無汗桂枝疼。仲景云。申湯之等候。其人小便不利。大抵中濕發黃者。先利小便。使快。仲景云。服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿痛。小便不利。又云。傷寒身色如金黃。可與麻黃連翹赤小豆湯。下焦有熱不通泄。猶病淳沉用藥宜。下焦有熱者。小便反快。仲景云。服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿痛。小便不利。又云。傷寒身色如金黃。可與麻黃連翹赤小豆湯。陽明汗多津液無。卻以小便利爲祝。仲景云。陽明病。汗出多而渴者。不可與猪苓湯。以其汗多。胃中燥。猪苓復利其小便也。

陽若湊之陰分去聲虛小便難出熱中居。案聞云。陰虛者。陽必湊之。陽入陰分。則轉成熱。而小便難。漏風不止桂加附。仲景云。太陽病發汗。遂漏風不止。惡風。小便難。四肢急。桂枝加附子湯主之。陽明風中小柴胡。

第八十九證

小便自利歌

太陽下焦有熱。故小腹必滿。便不利。小便不利反自利。此是抵當血證歸。太抵熱在下焦。小腹必脹滿。小便不利。今反利者。血爲血證。當下之。宜抵當湯。陽明自汗小便結。忽若利時津液竭。屎難堅。脈沉數。小腹堅。小便不利。爲無血。小便自利。其人如狂者。血證諦也。宜抵當湯。又云。太陽病發其汗。反利者。有瘀血也。仲景云。傷寒有熱。而小便難。四肢急。大則爲虛。仲景云。太陽病發汗。遂漏風不止。脈經云。大則爲虛。仲景云。陰虛者。陽必湊之。入陰分。則轉成熱。而小便難。又云。自利而渴者。屬少陰虛。故引水自救也。外審證。內惡脈。內外並觀斯兩得。脈大由來卻是虛。脈滑而數有宿食。滑而數者。有宿食也。協熱而利腳下熱。仲景云。太陽證外證未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞硬。表未解者。桂枝人參湯。案脈云。協熱利。謂下必熱也。諦語而利操屎結。仲景云。下利而讝語者。爲有燥屎也。屬承氣湯。少陰心痛口燥煩。卻與利之斯要訣。仲景云。少陰病。下利。清水色青者。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜大柴胡湯。六經中惟少陰病難治。有神灸之法。不可不審也。

第九十一證

大便下利歌

傷寒下利多種數。要識陰陽勿差互。三陽下利。身熱。三陰下利。但溫而不熱。此其大概也。合病自利。葛根湯。或用黃芩無致誤。仲景云。太陽陽明合病。必自利。葛根湯主之。桂枝證。醫反下之。利不止者。葛根黃芩黃連湯。自利不渴屬太陰。少陰必渴腎虛故。仲景云。自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。宜四逆輩。

第九十二證

狐惑證歌

蟲食下部名曰狐。蟲食上部名曰惑。狐則咽乾惑聖嗄。傷寒變成斯疾面目乍赤乍白黑。但欲睡眠昏默默。更有蟲蟲食臟間。舌上藍白齒無色。仲景云。狐惑之病。其狀如傷寒。默默但欲臥。目閉不得眠。起則不安。食於喉咽者。爲惑。食於陰者。爲狐。狐惑之病。並愛欲食。不欲臥食。其面乍赤乍黑乍白。食於上部。其聲嗄。食於下部。其咽乾。食上部者。蟲心過主之。上唇有瘡蝕其齦。下唇瘡甚連肛食。須細看上下候有無瘡。有瘡則殺人緊急者也。多因下利而得之。此證殺人爲最急。

第九十三證

百合歌

百脈一宗皆病形。無復經絡最難明。巢氏云。傷寒百合病者。謂無經絡。百脈一宗。悉致病也。皆因傷寒虛勞大病之後。不平復而變成斯病也。欲臥欲行復不能。行。欲食食不美有不美。雖如強健步難勝。如有寒復無寒。如有熱復無熱。口苦小便還赤結。藥納入口即吐利。如有神靈來作孽。病後虛勞多變成。百合地黃湯可啜。巢氏云。其狀意欲食。復不得食。常默。欲臥復不得臥。欲行。行而復不能行。欲食或有美時。或有不美。有不可下者。寒則溏。熱則垢。可見陰陽虛實候。歲火不及寒乃大行。民病驚瀉腸胃吼。巢因云。歲火不及。寒乃大行。民病驚瀉者。咽溏也。

第九十四證

辨傷寒疫氣不同歌

春氣温和及暑熱。秋氣淒涼冬凜冽。四時正氣自調均。不犯塞邪無病歟。多時寒慄欲周密。君子深藏宜入室。中而即病曰傷寒。觸冒塞邪成此疾。毒氣若深不即病。至春與夏邪方出。春爲温病夏爲暑。變態無時恐無及。仲景云。婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除脈遂虛。胸脇苦滿。如結胸狀。譫語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其虛實而取之。又云。婦人中風。七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。又云。婦人傷寒。發狂。經水適來。晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀者。此爲熱入血室。無犯胃氣及上二焦。自愈。

第九十七證

傷寒差後病歌

傷寒差後還喜睡。胸裏有寒實無那。此候唯宜服理中。胃痺病治痰自破。仲景云。大病已後。其人喜唾。久久不了。胸上有寒。當温之。宜理中元主之。勢復枳實梔子湯。發熱小柴胡亦可。仲景云。大病已後。腰下有水氣。牡蠣散主之。也。氣牡蠣散。仲景云。大病已後。勞復枳實梔子湯主之。又云。傷寒差後發熱。小柴胡湯主之。腰下水氣者。宜用牡蠣散主之也。日暮微煩脾不勝。要須損穀自然安。甘節吉兮必無禍。仲景云。病人脈已解。日暮微煩者。以病新差。強與穀食。不消也。損穀則愈。周易節卦九五。甘節吉。往有尚。象曰。甘節之吉。居位中也。

第九十八證

傷寒五藏死絕歌

水漿不下汗如油。形體不仁喘不休。此爲命絕終難治。更看何藏絕中求。汗出凝泗爲肺絕。脣吻反青肝絕候。脾絕口黑并黃色。腎絕便失與溲溲。心絕身似煙熏黑。更兼直視與搖頭。五藏皆絕無可療。縱逢和緩亦難瘳。仲景云。脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。此爲命絕也。又未知何藏。先受其災。若汗出凝泗。喘而不休者。此肺先絕也。脣反口黑。面目直視。此爲腎絕也。脣吻反青。四支漐漐者。此肝先絕也。渡口黑。柔汗發黃。此脾絕也。溲便遺失。狂言反目直視。此爲腎絕也。

第九十九證

傷寒死脈歌

傷寒死脈定難差。陽病見陰端可愕。仲景云。陽病見陰脈者死。上氣脈散爲形損。耳聾浮濇命難全。仲景云。傷寒。脈遲上氣。其脈散者死。脈其形損。故也。脈弦浮大而濇者死也。證言身熱宜洪大。沉細而微等不延。腹大泄利當微細。緊大而浮歸下泉。吐衄若得沉細

吉。浮大而牢嘔逆川。脈證云。病若發汗宜桂枝湯。身當有熱。脈當洪大。而反手足脈遲。脈沉細而微者死。病若大吐大下之後。脈當微煩。不煩而渴者死。病若吐血復欲衄血者。脈當沉細。而反浮大而牢者死也。陰陽俱虛熱不止。乍疎乍數命歸天。仲景云。陰陽俱虛。熱不止者死。脈乍數乍疎者死。如屋漏。如雀啄。來如彈石去解索。經云。脈如屋漏。如雀啄者死。脈來如彈石。去如解索者。皆脾氣將絕也。脾氣將絕者。動數而隨散亂。無復以繼者也。蝦遊魚翔脈證乖。轉豆偃刀形候惡。經云。病人脈如蝦之遊。如魚之翔者死。脈如轉豆者死。如偃刀者死。下不至關陽氣絕。上不至關陰氣竭。經云。寸脈下不至關。為陽絕。尺脈上不至關。為陰絕。皆死不治。代脈來時不用醫。必定頓危難救藥。仲景云。代陰也。得此脈者必難治也。

第一百證

傷寒死候歌

傷寒死候要須知。泄而腹滿大難醫。舌本爛傷熱不已。千金云。傷寒死候有九證。二曰瀉而腹滿甚者死。六曰舌本爛傷。熱不已者死。汗後脈躁亦傾危。太素云。躁病已得汗。而脈尚躁。出陰極之脈也。死。千金云。傷寒已得汗。脈靜者生。躁者死。汗出雖多不至足。千金云。汗出不至足者死。手循衣縫更何為。華佗云。病人手循衣縫者不可活。卵縮舌卷證候惡。華陀云。卵縮舌卷者必死。口張目陷不多時。華陀云。口如魚口不閉。目陷縮者皆死。赤斑五死一生在。黑斑十死更何疑。凡發斑者。熱乘虛入胃。胃氣虛也。亦應出五死一生。黑斑出十死一生。兩感傷寒最大忌。死期六日命難追。仲景云。熱雖甚不死。若兩感於寒而病者。必死。



難案盤桓諸書以發明其奧。因仲景方論以辨析其理。極裘裏風胃陰陽死生之說。究乘病輕重去取加減之意。坐變了無遺恨。誠仲景之忠臣。醫家之大法也。士大夫宦四方。每病無醫。予來鄰山。尤所歎息。欲示之教。難於空言。故刊此書。以爲楷式。使家藏其本。人誦其言。天橫傷生。庶乎免矣。成公當乙亥丙子歲。其年九十餘。則必生於嘉祐治平之間。國家長育人材。命醫立學。得人之效。一至於此。則天下後世凡所謂教養云者。可不深加之意也夫。開禧改元。五月甲子。縣陽張孝忠序。

傷寒明理論序

余嘗思歷代明醫。迴傍起死。祛邪愈疾。非曰生而知之。必也祖述前聖之經。才高識妙。探徵索隱。研究義理。得其旨趣。故無施而不可。且百病之急。撫急於傷寒。或死或愈。止於六七日之間。十日以上。故漢張長沙啟往昔之淪喪。傷橫天之莫救。撰爲傷寒論一十卷。三百九十七法。一百一十三方。爲醫門之規繩。治病之宗本。然自漢逮今。千有餘年。唯王叔和得其旨趣。後人皆不得其門而入。是以其間少於注釋。闕於講襲。自宋以來。名醫間有著述者。如龐安常作卒病論。朱肱作活人書。韓祇和作微旨。王寔作證治。雖皆互有闡明之義。然而未能盡張長沙之深意。聊撮成公家世儒醫。性識明敏。記問該博。謹述傷寒義。皆前人未經道者。指在定體分形析證。若同而異者明之。似是而非者辯之。釋戰慄有內外之診。論煩躁有陰陽之別。讀語鄭聲。令廬實之灼知。四逆與厥。使淺深之類明。始於發熱。終於勞復。凡五十篇。曰之曰明理論。所謂眞得長沙公之旨趣也。使習醫之流。讀其論而知其理。識其證而別其病。胸次了然而無惑。顧不博哉。余家醫業五十載。究旨窮經。自幼迄老。凡古今醫書。無不涉獵。觀此書義理燦然。不能默默。因序其略。歲在壬戌八月望日。錦峰山嚴器之序。

右注解傷寒論十卷。明理論三卷。論方一卷。聊撮成無已之所作。自北而南。蓋兩集也。予以紹熙庚戌歲入都。傳前十卷於醫者王光廷家。泊守荊門。又於襄陽訪後四卷得之。暨閒閒切。治病處方之要。舉不越此。古今言傷寒者。祖張長沙。但因其證而用之。初未有發明其意義。成公博極研精。深造自得。本

近得其宜矣。奇方之制大而數少。以取迅走於下。所謂汗雖不以奇。經曰汗者不以奇。下者不以耦。處方之制。無逾是也。然自古諸方。歷歲浸遠。難可考評。惟張仲景方一部。最爲衆方之祖。是以仲景本伊尹之法。伊尹本神農之經。醫軼之中。特爲樞要。參今法古。不越毫末。實乃大聖之所作也。一百一十二方之內。擇其醫門常用者。方二十首。因以方制之法明之。庶幾少發古人之用心焉。

傷寒明理論目錄

第一卷
發熱　惡寒　惡風　寒熱　潮熱　自汗
盜汗　頭汗　手足汗　無汗　頭痛　項強
頭眩　胸脅滿　心下滿　腹滿　少腹滿　煩熱
第二卷
虛煩　躁煩　懊憹　舌上胎　鼾　自利
咳　噦　嘔吐　悸　渴　筋惕肉瞤
戰慄　四逆　厥　鄭聲　讝語　短氣
第三卷
搖頭　瘈瘲　不仁　直視　鬱冒　動氣
自利　筋惕肉瞤　熱入血室　發黃　發狂　罹亂
畜血　勞復
第四卷
諸湯方論

傷寒明理論卷一

趙宋　金　聊攝　成無己　撰

發熱第一

傷寒發熱。何以明之。發熱者。謂怫怫然發於皮膚之間。熅熅然與煩躁相類而非。煩躁者。在內者也。潮熱之熱。有時而熱。不失其時。寒熱之熱。寒已而熱。相繼而發。至於發熱則無時而發也。有謂翕翕發熱者。有謂蒸蒸發熱者。此則輕重不同。表裏之區別備。所謂翕翕發熱者。謂若合羽所覆。明其熱在外也。故與桂枝湯發汗以散之。所謂蒸蒸發熱者。謂若蒸蒸之蒸。明其熱在內也。故與調胃承氣湯攻下以滌之。其發熱屬表者。卽風寒客於皮膚。陽氣怫鬱所致也。非發熱屬裏者。卽陽氣下陷。入陰中所致也。觀其熱所從來而汗下之證明其辨焉。若熱先自皮膚而發。達於表者。知邪氣之在裏也。若斯二者。爲邪氣在表。在裏而發熱也。惟其在表在裏。其發熱者。或始自皮膚而漸傳裏熱。或始自內熱而外連於表。蓋邪氣在表發熱者。則表熱裏不熱也。邪氣在裏發熱者。則裏熱甚而達於表也。其在半表半裏發熱者也。經雖云發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。然少陰病始得之。亦有反發熱者。蓋亦屬其表也。特與麻黃細辛附子湯發汗者。是已發熱。爲傷寒之當也。或陰陽俱虛。與其下利新汗後。又背惡

其發熱也。經云。脈陰陽俱虛。熱不止者死。下利發熱亦死。(內經云)汗出輒復熱而脈躁疾。不爲汗衰。狂言不能食。此名陰陽交。交者死也。斯亦發熱也。距可與尋常發熱一概而論耶。醫者更當明辨之。

惡寒第二

傷寒惡寒。何以明之。惡寒者。風寒客於榮衛之中也。惟其風寒客於榮衛。則酒淅然惡寒也。惟其榮衛之受風寒。則蒸蒸然不欲舒也。其惡寒者。非寒熱之寒也。又非惡風也。且惡風者。見風至則惡矣。得以居密室之內。幃帳之中。則坦然自舒也。至於惡寒者。則不待風而寒。雖身大熱而不欲去衣者是也。寒熱之熱。謂寒熱更作。熱至則寒無矣。其惡寒雖發熱而不欲去衣也。甚則至於向火被複而猶不能遏其寒也。所以然者。由陰氣上入陽中。或陽微或風虛。相搏之所致也。惡寒一切屬表。雖裏證悉具而微惡寒者。亦是表未解也。猶當先解其外。俟不惡寒爲外解。乃可攻裏也。經曰。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。謂如傷寒。或已發熱。或未發熱。必惡寒者。謂雖之以發熱。此則發於陽也。若惡寒而踡。脈沉細而緊者。此則發於陰也。在陽者可發汗。在陰者可溫裏。惡寒雖悉屬表。而在表者亦有虛實之別。若汗出而惡寒者。此表虛。無汗而惡寒者。則爲表實。表虛可解肌。表實可發汗。又有並稱背惡寒者。背者胸中之府。諸陽受氣於胸中而轉行於背。(內經曰)人身之陰陽者。背爲陽。腹爲陰。陽氣不足。陰寒氣盛。則背爲之惡寒。若風寒在表而惡寒者。則一身盡寒矣。但背惡寒者。陰寒氣盛可知也。經所謂少陰病一二日。口中和而背惡寒者。當灸之。處以附子湯者是矣。又或乘陰氣不足。陽氣內陷入陰中。表陽新虛。有背微惡寒者。經所謂傷寒無大熱。口燥渴心煩背微惡寒者。白虎加人參湯主之者是也。二者一爲陰寒氣盛。一爲陽氣內陷。又何以明之也。且口口口口口口能消耗津液。熱燥津液爲乾。故於太陽病則口燥舌乾而渴也。二者均是背惡寒。裏辨陰陽寒熱不同者。亦於口中潤燥可知。

惡風第三

傷寒惡風。何以明之。(黃帝鍼經曰)衛氣者。所以溫分肉。充皮膚。肥腠理。司開闔者也。風邪中於衛也。則必惡風。何者。以風則傷衛。寒則傷榮。爲風邪所中於分肉不溫而熱矣。皮毛不充而緩矣。腠理疎而不密。開闔失其司。則泄而不固。是以惡風也。是惡風惡寒二者。均爲表證。其惡風則比之惡寒而輕也。惡寒者。嗇嗇然增寒也。雖不當風而自然寒矣。惡風者。謂常居密室之中。幃帳之內。則舒緩而無所畏也。一或用扇。一或當風。淅淅然而惡者。此爲惡風者也。惡寒則有屬於陽者。有屬於陰者。及其惡風者。悉屬於陽。非若惡寒之有陰陽也。三陰之證。並無惡風者。以此也。惡風雖悉在表。而發散又自不同。若無汗而惡風者。則爲傷寒。當發其汗。若汗出而惡風者。則爲中風。當解其肌。裏證雖具。而惡風未罷者。又當先解其外也。又有發汗多亡陽。與其風淫。若有惡風之證。蓋以發汗多。漏不止。則亡陽。外不固。是以惡風也。必以桂枝加附子湯。溫其經而固其衛。風淫相搏。骨節疼煩。淫勝自汗而皮膚不密。是以惡風也。必以甘草附子湯。散其淫而實其衛。由是觀之。惡風屬乎衛者。可知矣。

寒熱第四

傷寒寒熱。何以明之。寒熱者。謂往來寒熱也。經曰。邪正分爭。往來寒熱者。言邪氣之入也。而正氣不爲之爭。則但熱而無寒也。乃有熱而寒者。謂其正氣與邪氣分爭。於是寒熱作矣。爭則氣鬱不發於外。而寒熱爭。爭甚則憤然而熱。故寒已而熱作焉。蓋乃寒熱之理也。或謂寒熱者。陰陽爭勝也。陽勝則熱。陰勝則寒。此陰陽之爭也。何則。蓋以寒爲陰。而熱爲陽。裏爲陰。而表爲陽。邪之客於表者。爲寒。邪與陽相爭則爲寒矣。邪之入於裏者。爲熱。邪與陰相爭則爲熱矣。其邪半在表半裏。外與陽爭而爲寒。內與陰爭而爲熱矣。表裏之不拘內外之不定。或出或入。由是而寒熱。且往且來也。是以往來寒熱。周半表半裏之證。邪居表多。則多寒。邪居裏多。則多熱。邪氣半在表。半在裏。則寒熱亦半矣。審其寒熱多少。見其邪氣淺深矣。小柴胡湯專主往來寒熱。而又立成諸加減法。亦爲邪氣在半表半裏。未有定處。往來不常。又寒熱如瘧。與夫發熱惡寒。皆似而非也。然寒熱如瘧者。作止有時者也。及往來寒熱。則作止無時。或往或來。日有至於三五發者。甚者十數發。與其據狀有以異也。至於發熱惡寒者。爲發熱時惡寒。非若此熱已而寒。寒已而熱者。雖然應往來寒熱。周半表半裏。當和解之。又有病至十餘日而結熱在裏。復往來寒熱者。亦可與大柴胡湯下之。不可不知也。

潮熱第五

傷寒潮熱。何以明之。若潮水之潮。其來不失其時也。一日一發。指時而發者。謂之潮熱。若日三五發者。即是發熱。非潮熱也。潮熱屬陽明。必於日晡時發者。乃爲潮熱。陽明者胃屬土。應時則土旺於未申。經曰。陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。蓋邪氣入胃。謂之入府。府之爲言聚也。若府庫之府焉。邪氣入於胃而不復傳。邪氣鬱而爲實熱。隨土而潮。是以日晡所發潮熱者。屬陽明也。推其屬陽明。故潮熱爲可下之證。經曰。潮熱者。實也。又曰。潮熱者。此外欲解也。可攻其裏焉。又曰。其熱不潮。未可與承氣湯。即此觀之。潮熱屬於胃者。昭然可見焉。雖然潮熱爲裏實可下之證。一或脈浮而緊。與其潮熱而利。或小便難。大便溏者。皆熱未全入府。猶帶表邪。當和解其外。外解已而小便利。大便鞕者。乃可攻之。或謂潮熱有屬太陽少陽者乎。少陽王於寅卯。太陽王於巳午。若熱於此時發者。爲邪未入胃。豈得謂之潮熱。必待日晡所發者。乃謂之潮熱。見其邪在胃也。遇疾值病詳而驗之。始見得真也。

自汗第六

傷寒自汗。何以明之。自汗者。謂不因發散而自然汗出者是也。(內經曰)陽氣衛外而爲固也。衛雖皮膚。肥實腠理。禁固津液。不得妄泄。汗者干之而出。邪氣干於衛。氣不能衛固於外。則皮膚爲之緩。腠理爲之疎。由是而津液妄泄。漉漉然出。謂之自汗也。如發熱自汗。即此觀之。潮熱屬於陽者。有屬於陰者。及其惡風者。悉屬於陽。非若惡寒之有陰陽也。三陰之證。並無惡風者。以此也。惡風雖悉在表。而發散又自不同。若無汗而惡風者。則爲傷寒。當發其汗。若汗出而惡風者。則爲中風。當解其肌。裏證雖具。而惡風未罷者。又當先解其外也。又有發汗多亡陽。與其風淫。若有惡風之證。蓋以發汗多。漏不止。則亡陽。外不固。是以惡風也。必以桂枝加附子湯。溫其經而固其衛。風淫相搏。骨節疼煩。淫勝自汗而皮膚不密。是以惡風也。必以甘草附子湯。散其淫而實其衛。由是觀之。惡風屬乎衛者。可知矣。

邪氣在裏而汗出之可緩也。傷寒自汗之證爲常也。設或汗出發潤。與其出之如油。或大如貫珠。看身出而不流。皆爲不治之證也。必手足俱周。遍身悉潤。發發然一時間許。煩熱已而身涼和。乃爲佳矣。此則陰陽氣和。水升火降。榮衛通流。邪氣出而解者也。（內經曰）陽之汗。以天地之雨名之。此之謂也。

盜汗第七

傷寒盜汗。何以明之。盜汗者。謂睡而汗出者也。自汗則不或睡。與不睡。自然而出也。及盜汗者。不睡則不能汗出。方其睡也。湊湊然出焉。覺則止而不復出矣。雖病盜汗者。皆其陽虛也。傷寒盜汗者。非若雜病之虛。是由邪氣在半裏半裏使然也。何者。若邪氣一切在表。干於衛則自然汗出也。此則邪氣侵行於裏。外連於表。及睡則衛氣行於裏。乘表中陽氣不緻。津液得泄。故但睡而汗出。覺則氣散於表而汗止矣。經曰。微盜汗出反惡寒者。表未解也。又陽明病。當作裏實。而脈浮者云。必盜汗。是猶有表邪故也。又三陽合病。目合自汗。是知盜汗。爲邪氣在半表半裏之間明矣。且自汗有爲之虛者。有爲之實者。其於盜汗之證。非若自汗有實者。悉當和表而已。不可不知也。

頭汗第八

傷寒頭汗。何以明之。頭者。諸陽之會也。邪拘諸陽。津液上湊。則汗見於頭也。邪熱內畜。蒸發腠理。遍身汗出者。謂之熱越。若身無汗。則熱不得越。熱蒸於陽。故但頭汗出也。何者。以三陰之經。皆上至頸。胸中而返。不循於頭。獨諸陽脈上循於頭爾。經曰。但頭汗出。身無汗。劑頸而返。小便不利。渴飲水漿。此爲瘀熱在裏。身必發黃。爲熱不得越而上達者也。又熱入血室。與其虛煩。或陽明被火。及水結胸。皆但頭汗出也。俱是熱鬱於內。而不得越者也。此數者。或吐或下。皆欲除其熱也。或謂頭汗之證。悉屬陽明。而爲裏熱也。而有不屬陽明屬表者乎。且邪但在表者。則無頭汗之證。必也塞溼相搏。與邪氣半在表半在裏者。乃有頭汗也。傷寒五六日已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩。及傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞕。脈細者。皆邪氣半在表半在裏。令頭汗出也。溼家下後。若額上汗出。但頭汗出。欲得被覆向火者。寒溼相搏。令頭汗出也。茲數者。皆不謂之逆。其小便不利。則惡見頭汗出也。溼家下後。亦惡見頭汗出也。茲二者。乃爲頭汗之逆者也。何則。以小便不利而成關格。若頭汗出。陽脫也。經云。關格不通。不得尿。頭撅汗者生。有汗者死。溼家下後。若額上汗出而微喘者。亦陽脫也。經云。溼家下之。額上汗出。小便不利者死。下利不止者亦死。脈經曰。陽氣上出。汗見於頭者。蓋陽脫也。則知可治而治。知其不可治而不治。皆得十全之上者。在於明辨而審的也。

手足汗第九

傷寒手足汗出。何以明之。四肢者。諸陽之本。而胃主四肢。手足爲之汗出。陽明爲津液之主。病則自汗出。其有自汗出者。悉屬陽明也。何以使之然也。若一身自汗出者。謂之熱越。是熱外達者也。但頭汗出者。是熱不得越而熱氣上達者也。及手足汗出者。爲熱聚於胃。是津液之傍達也。經曰。手足濈然汗出者。此大便必鞕也。手足濈濈汗出。大便難而讝語者。下之則愈。由此觀之。手足汗出爲熱聚於胃而可知矣。或謂熱聚於胃而手足爲之汗出。其寒聚於胃而有手足汗出者乎。經曰。陽明中寒者。不能食。小便不利。手足濈然汗出。此欲作痼瘕。卽

項強第十二

是中寒者也。且熱聚於胃。爲可下之證。其寒聚於胃。爲不可下。又何以明之。裏明於此二者。必曰。大便初鞕。後溏。以胃中冷。水穀不別故也。是以不可下者也。若大便難讝語者。爲陽明證具。則是可下之證。臨病之際。宜須兩審。

無汗第十

傷寒無汗。何以明之。腠理者。津液滲泄之所爲。腠文理縫會之中。爲理。津液爲風寒所干。外滲皮腠者。則爲自汗出。若塞邪中經。腠理緻密。津液內滲。則無汗。無汗之由。又有數種。如傷寒在表。及邪行於裏。或水飲內畜。與亡陽久虛。皆令無汗。其傷寒無汗。則腠理緻密也。風中於衛。則腠理開而自汗。寒中於榮。則無汗。謂腠理閉也。經所謂太陽病。惡風無汗而喘。及脈浮緊。無汗發熱。及不汗出而煩躁。陽明病。反無汗而小便利。二三日嘔而欬。手足厥。苦頭痛。鼻乾不得汗。脈浮無汗而喘。與其剛痙無汗。是數者。皆寒邪在表而無汗者也。其邪氣行於裏無汗者。爲邪氣在表。未發腠理。則汗出。邪氣內傳。不外泄發者。則無汗。經所謂陽明病。無汗小便不利。心中懊憹者。身必發黃。及傷寒發熱無汗。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。與夫三陰爲病。不得有汗。是數者。皆邪行於裏而無汗者也。其水飲內畜而無汗者。爲水飲散而爲津液。津液布滲而爲汗。既水飲內畜而不行。則津液不足而無汗。經所謂服桂枝湯。或下之仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝去桂。加茯苓白朮湯主之。是津液內滲而無汗者也。其陽虛無汗者。諸陽爲津液之主。陽虛則津液虛少。故無汗。經所謂脈浮而遲。遲爲無陽。不能作汗。其身必痺。陽明病。反無汗。其身如蟲行皮中之狀。此以久虛故也。皆陽虛而無汗者也。如是者。理之常也。又爲得爲異哉。一或當汗而不汗。服湯一劑。病證仍在。至於服三劑而不汗者。黃帝謂陽脈之極也。死。茲二者。以無汗爲眞病。距可與其餘無汗者。同日而語也。

頭痛第十一

傷寒頭痛。何以明之。頭痛謂邪氣外在經絡。上攻於頭所致也。（難經曰）三陽經受風寒。伏留而不去。則名厥頭痛。言三陽之經。上於頭爾。然傷寒頭痛者。太陽專主也。何者。以太陽之經起於目內眥。上額交巔上。入絡腦。經所謂太陽受病者。頭項痛。腰脊強。又曰。七日病衰。頭痛少愈。雖然陽明少陽亦有頭痛。不若太陽之專主也。蓋太陽爲病。屬表。而頭痛專爲主表證。雖有風寒之不同。必待發散而後已。太陽病頭痛。發熱身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。傷寒也。麻黃湯主之。太陽病頭痛發熱汗出惡風者。中風也。桂枝湯主之。雖有傷寒六七日不大便。頭痛有熱者。而與調胃承氣湯下之者。又云若小便清者。知熱不在裏。仍在表也。當與桂枝湯。以頭痛未去。雖不大便六七日。其小便清者。知熱不在裏。仍在表也。當與桂枝湯。以頭痛未去。雖不大便六七日。其小便清者。知熱不多。頭痛之證。惟厥陰之脈。循喉嚨之後。上入頏顙。連目系。上出額。與督脈會於巔。病亦有頭痛。經曰。乾嘔吐涎沫者。吳茱萸湯主之者。是矣。夫頭者。精明之府也。神明居之。小小邪氣作爲頭痛者。必曰發散而可也。其或痛甚入連於腦。而手足寒者。又爲眞病。豈能發散而已哉。嗚呼。頭痛爲外疾。猶有不可治者。又矧藏府之疾乎。

傷寒項強。何以明之。太陽脈起於目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。循肩髆內俠脊。抵腰中。經曰。太陽之病。項背強痛而惡寒。以太陽感受風寒。則經脈不利。而項爲之急。頸爲之強。喻寒頸項強急者。太陽表證也。必發散而解之可也。太陽病項背強。兒兒反汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。太陽病項背強。兒兒無汗惡風者。葛根湯主之。是皆發散之劑也。二者均是項背強而發散。又有輕重者。蓋發熱汗出惡風者。爲表虛。表虛者可解肌。無汗惡風者。爲表實。表實者可發汗。是以爲治不同也。桂枝加葛根湯方。亦是桂枝湯中加麻黃葛根。葛根深詳究之。無汗惡風爲表實。正可發汗。則於桂枝湯中加葛根麻黃爲當矣。汗出惡風爲表虛。表虛者可解肌。恐是桂枝湯中但加爲根而不加麻黃也。兒晉殊。兒引頸之貌。兒短羽鳥也。短羽之鳥。不能飛騰。動則先仲引其頭。爾項背強者。動亦如之。非若兒挼之兒而偃屈也。太陽傷寒。項背強。其或太陽中風。加之寒溼而成痙者。亦項強也。經曰。病者身熱足寒。頸項強急。惡寒時頭熱面赤。目脈赤。獨頭面搖。卒口噤背反張者。痙病也。金匱要略曰。太陽病。其證項背強。兒兒然脈反沉遲者。此爲痙。桂枝加栝蔞湯主之。雖項背強。然太陽病表證悉當發散。又有結胸病者。項亦強如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸圓主之。臨病之際。審其表裏可汗可下。隨證投湯。則萬全矣。

頭眩第十三

傷寒頭眩。何以明之。毘非毛而見其毛。眩非玄而見其玄。毘爲眼花。眩爲眼黑。眩也。運也。冒也。三者形俱相近。有謂之眩運者。有謂之眩冒者。運爲運轉之運。世謂之頭旋者是矣。冒爲蒙冒之冒。世謂之昏迷者是矣。少陽之爲病。口苦咽乾目眩。以少陽居表裏之間。表邪所傳。漸行於裏。表中陽虛。故時時目眩也。二陽併病。頭項強痛。或眩運眩冒者。以少陽與太陽併病。故眩陽併病。頭項強痛。或眩運眩冒者。責其虛也。傷寒有起則頭眩與眩冒者。翕發汗吐下後所致。是知其陽虛也。故（針經）有曰。上虛則眩。下虛則厥。眩雖爲虛。而風家亦有眩者。蓋風主運動故爾。傷寒陽明病。但頭眩不惡寒。故能食而欬。其人必咽痛。爲陽明中風。是風亦主頭眩也。諸如此者。皆非逆也。及其諸逆發汗劇者。言亂目眩者死。命將難全。嗚呼。病勢已成。可得半愈。及病勢已深。雖神醫其能已之耶。

胸脅滿第十四

傷寒胸脅滿。何以明之。胸脅滿者。謂胸脇間氣塞滿悶也。非心下滿者也。脅滿者。謂脅肋下氣脹填滿也。非脹滿者也。邪氣自表傳裏。必先自胸脇。已次經心脅而入胃。邪氣入胃。爲入府也。是以胸滿。多帶表證。脅滿者。當半表半裏證也。經曰。下後脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。又曰。太陽與陽明合病。喘而胸滿者不可下。宜麻黃湯。是胸滿屬表而須發汗者也。蓋胸中至表猶近也。及脅者。則更不言發汗。但和解而已。經曰。設胸滿脅痛者。與小柴胡湯。又曰胸滿不去者。小柴胡湯主之。本太陽病不解。傳入少陽者。脅下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。脈沉緊者。小柴胡湯主之。是知脅滿屬半表半裏明矣。大抵胸脅滿。以邪氣初入裏。未停留爲實。氣鬱積而不行。致生滿也。和解斯可矣。若邪氣留於胸中。聚而爲實者。非湧吐則不可已。故華陀曰。四日在胸吐之則愈。是邪氣已收斂而不散漫者。則可吐之。（內經曰）其高者因而越之。病在胸膈之上。爲高越之爲吐也。經曰。病在胸中當吐之發汗。若下之而煩熱胸中窒者。則以梔子豉湯吐之。若胸中痞鞕。氣上衝咽喉不得息者。此爲胸中有寒也。則以瓜蒂散吐之。二者均是吐劑。梔子豉湯

吐胸中虛煩客熱也。瓜蒂散吐胸中痰實宿寒也。若能審明藥劑之輕重。辨別邪氣之淺深。對證投湯。不爲效者。未之有也。

心下滿第十五

傷寒心下滿。何以明之。心下滿者。謂正當心下高起滿鞕者是矣。不經下後而滿者。則有吐下之殊。若下後心下滿者。又有結胸痞氣之別。經曰。病人手足厥冷。脈乍緊。邪結在胸中。心中滿而煩。飢不能食者。病在胸中。當須吐之。又曰。脈浮而大。心下反鞕有熱。屬藏者。攻之不令發汗。屬府者不令攻之。攻之利遂不止者死。利止者。經汗下而心下滿者。或吐之或下之。看其邪氣之高下。高者則因而越之。下者則因而錫之。要在泄其邪也。至於陽明病。雖心下鞕滿。又未可攻。經曰。陽明病心下鞕滿者。不可攻之。攻之利遂不止者死。利止者。是邪氣自表傳裏。至於心下。留結爲實者。則不可下。乃吐之可也。若未全爲實者。則不可下。故有此戒也。又邪氣在表。未應下而強下之。邪氣乘虛結於心下。實者。鞕滿而痛。爲結胸。虛者。滿而不痛。爲虛痞。經曰。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之不爲逆。必蒸蒸而振。却復發熱汗出而解。若心下滿而鞕痛者。此爲結胸也。但滿而不痛者。此爲虛痞。經爲痞。虛邪留滯。則但滿而不鞕痛也。結胸熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石鞕者。大陷胸湯主之。明其邪實可知矣。脈浮而緊而反下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。但氣痞耳。明其邪虛可知矣。病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。因作痞。表邪未罷。醫反下之。胃中空虛。客氣動膈。膈陽氣內陷。心中因鞕。則爲結胸。須陷胸湯圓攻之可也。傷寒中風。醫反下之。心下痞鞕而滿。醫見心下痞。謂病不盡而復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中空虛。客氣上逆。故使鞕也。須諸瀉心湯散可也。二者俱是心下滿鞕。一爲虛。一爲實。凡投湯者。大須詳審。結胸雖爲實邪。衆皆共知。當用陷胸湯圓下之。下之則死。卽是猶帶表邪。未全結實。下之重虛其虛。邪深結則死。設或結胸形證悉具。而加之煩躁者。又爲不治之疾。藥之所以能勝邪者。必待胃氣施布。藥力始能溫汗吐下之以逐其邪氣。邪氣勝。胃氣絕者。湯藥纔下。胃氣不能施布。雖神丹。其能爲效也。

腹滿第十六

傷寒腹滿。何以明之。腹滿者。俗謂之肚脹是也。華佗曰。傷寒一日在皮。二日在肌。三日在脅。四日在胸。五日在腹。六日入胃。入胃謂入府也。是在腹也。猶未全入裏者。雖腹滿爲裏證。故亦有淺深之別。經曰。表已解而內不消。非大滿。猶生寒熱。則病不除。是其未全入府。若大滿大實。堅有燥屎。自可除下之。雖四五日不能爲禍。謂之邪氣已入府也。傷寒邪入腹。是裏證已深。故腹滿。乃可下之者多矣。如經曰。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。發汗不解。腹滿痛者。急下之。本太陽病。腎反下之。因而腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。少陰病。腹滿不減。減不足言。當下之。金匱要略曰。腹滿時減復如故。此虛寒從下上也。當以溫藥和之。蓋虛氣留滯亦爲之脹。但比之實者。不至堅痛也。大抵腹滿。喜太陰證也。陽熱爲邪者。則腹滿而咽乾。陰寒爲邪者。則腹滿而吐食。不下。自利益甚。時腹自痛。太陰者。脾土也。治中央。故專主腹

滿之候。又發汗吐下之後。因而成腹滿者。皆邪氣乘虛內客爲之。而所主又各不同。經曰。發汗後腹脹滿。者。與朴生薑甘草半夏人參湯主之。傷寒吐後腹脹滿者。與枳朴生薑甘草半夏人參湯主之。傷寒下後心煩腹脹滿。臥起不安者。梔子與朴湯主之。三者有嘗温者。有嘗下者。有當吐者。何邪氣不一也。且發汗後腹滿當温之。邪氣在表。因發散則邪去胃爲津液之主。發汗亡陽。則胃氣虛而不能敷布。諸氣壅滯而爲脹滿。是當温散可也。吐後腹滿可下之。邪氣在胸者。則可吐之。吐之邪去則安。若吐後邪氣不去。加之腹脹滿者。是胸中之邪下傳入胃。擁而爲實。故生脹滿。當須下之可也。下後腹滿可吐者。邪氣在表。未傳入府而妄下之。邪自表乘虛而入。壅於胸中而爲虛煩。氣上下不得通利者。腹爲之滿。故當吐之可也。凡爲醫者。要識邪氣所起所在。審其所起。知邪氣之虛實。發汗吐下之不差。温補針灸之適當。則十全之功。自可得也。

少腹滿第十七

傷寒少腹滿者。何以明之。少腹滿者。臍下滿是也。少腹者。下焦所治。〔難經曰〕下焦者。當膀胱上口。主分別清濁。其治在臍下。邪氣自上而下至於下焦。結而不利。故少腹滿也。胸中滿。心下滿。皆氣爾。卽無物也。及腹滿者。又有燥屎爲之者。至於少腹滿者。非止氣也。必有物聚於此而爲之滿爾。所以然者。身半以上。同天之陽。消陽歸之。身半已下。同地之陰。濁陰歸之。清者在上而濁者在下。〔內經〕謂清陽出上竅。濁陰出下竅。當出不出。積而爲滿。是在上而滿者氣也。在下而滿者物也。所謂物者。溺與血爾。邪氣聚於下焦。則津液不得通。血氣不得行。或溺或血。留瀦於下。是生脹滿而痛也。若從心下至少腹。皆鞕滿而痛者。是邪實也。須大陷胸湯下之。若但少腹鞕滿而痛。小便不利者。則是畜血之證。小便不利者。則是溺澁之證。經曰。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。又曰。少腹鞕。小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。其小便利而少腹滿者。爲太陽隨經瘀血在裏。太陽自入府者也。經曰。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外未解者。尙未可攻。當先解外。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。桃仁承氣湯主之。是少腹鞕滿爲物聚於下可知矣。滲之利之。參酌隨宜。可爲上工。

煩熱第十八

傷寒煩熱。何以明之。煩者熱也。與發熱若同而異也。發熱者。怫怫然發於肌表。有時而已者是也。煩者爲煩而熱。無時而歇者是也。二者均是表熱。而時發時止也。故謂之煩熱。經曰。病人煩熱汗出則解。又曰。發汗已解。半日許。腹煩。脈浮數者。再與桂枝湯。又曰。服桂枝湯反煩不解者。先刺風池風府。卽與桂枝湯則愈。卽此觀之。煩爲表熱明矣。故又有煩瘥。卽是熱瘥。又有煩渴。卽是熱渴也。以煩爲熱。又何疑焉。至於胸中煩。心中煩。內煩。虛煩。皆以煩爲熱。設傷寒至六七日手足三部脈皆至大。而煩而口噤不能言。其人躁擾者。與脈和大煩自重。臉內際黃者。又皆爲欲解。所以言大煩者。以肌表大熱。則是邪熱欲去。泄達於外也。故爲欲解。〔內經曰〕謹熱陰陽。以意調之。

虛煩第十九

傷寒虛煩。何以明之。虛煩者。心中懊憹而煩也。有胸中煩。有心中煩。有虛煩。諸如此者。皆熱也。若止云煩者。表熱也。及其邪熱傳裏。故有胸中煩。心中煩。虛煩之別。三者要在觀其熱所從來。審其虛實。而治爲不同也。如不經發汗吐下而煩者。則是傳經之熱。不作腑實者。但多和解而已。故經曰。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔者。小柴胡湯主之。少陰病二三日。心中煩不得臥者。黃連阿膠湯主之。少陰病。胸滿心煩者。猪膚湯主之。是皆和解而微熱者也。若因吐下發汗後而煩者。則是內陷之煩。但多湯吐而已。發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹者。梔子豉湯主之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。心煩腹滿。臥起不安者。梔子厚朴湯主之。卽藥大下後。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。是皆取其吐而汤其熱者也。虛煩之狀。心中溫溫然欲吐。憒憒然無奈。欲嘔不嘔。擾擾亂亂。是名煩也。非吐則不能已。經曰。下利後更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。宜梔子豉湯。脈乍結心中滿而煩者。病在胸中。瓜蒂散。二者證均是煩也。藥均是吐也。而又輕重之不同。吐下發汗後。邪氣乘虛而入爲煩者。則謂之虛煩。與梔子豉湯則是吐劑之輕者。不因吐下發汗後。邪氣結於胸中。則成胸實。與瓜蒂散則是吐劑之重者。又陽回病不吐不下。心煩者。則是煩之實者也。與調胃承氣湯下之。傷寒二三日。心中悸而煩者。則是煩之虛者也。與小建中湯補之。煩爲熱也。悸而煩復爲主者。以悸爲虛。悸甚而煩故爲虛也。

少陽之邪入府者。煩而悸則爲熱也。大抵先煩而悸者。是爲熱也。先悸而煩者。是爲虛也。(內經曰)治病必先求其本。誠哉是言也。

煩躁第二十

傷寒煩躁。何以明之。煩爲擾擾而煩。躁爲憤躁之躁。合而言之。煩躁爲熱也。析而分之。煩也。躁也。有陰陽之別焉。煩陽也。躁陰也。煩爲熱之輕者。躁爲熱之甚者。經有煩琢。煩滿。煩渴。虛煩。皆以煩爲熱也。有不煩而躁者。傷佛佛然便作躁悶。此爲陰盛隔陽也。雖大躁欲於泥水中臥。但飲水不得入口者。是矣。所謂煩躁者。謂先煩漸至躁也。所謂躁煩者。謂先發躁而迤邐復煩者也。煩躁之由。又爲不同。有邪氣在表而煩躁者。有邪氣在裏而煩躁者。有因火劫而煩躁者。有陽虛而煩躁者。有陰盛而煩躁者。皆不同也。經曰。當汗不汗。其人煩躁。太陽中風。脈浮而緊。不汗出而煩躁。大青龍湯主之者。是邪氣在表而煩躁者也。病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁發作有時。此有燥屎也。是邪氣在裏而煩躁者也。太陽病以火熏之不得汗。其人必躁。太陽病二日反躁。火劫其背。令人大汗出。大熱入胃。躁煩者。火劫合煩躁者也。陽微發汗。躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯主之者。(發汗若下之。病仍不去。煩躁者。茯苓四逆湯主之者。陽虛煩躁者也。少陰病吐利手足。冷煩躁欲死者。吳茱萸湯主之者。陰盛而煩躁者也。諸如此者。證之常也。非逆也。設或結胸證悉具。煩躁者死。發熱下利厥逆躁不得臥者死。少陰病吐利躁煩。四逆者死。少陰病四逆惡寒而身蜷。脈不至。不煩而躁者死。少陰病病六七日。息高者死。是數者。又皆爲不治之證。嗚呼。煩躁爲常有之疾。復有諸不治之證。臨病者之側。又當熟審焉。

懊憹第二十一

傷寒懊憹。何以明之。懊者。懊惱之懊。憹者。憹悶之貌。卽心中懊憹。鬱鬱然不舒暢。憒憒然無奈。比之煩悶而甚者。懊憹也。由下後表中陽邪乘虛內陷。鬱而不發。結伏於胸心之間。故如是也。經曰。表未解。醫反下之。胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。又曰下之益煩。心中懊憹如飢。卽是陽氣內陷爲諸懊憹也。其治之法。或吐之。或下之。若發汗吐下後。虛煩不得眠。劇者必反覆顚倒。心中懊憹。與陽明病下之。其外有熱。手足溫而不結胸。心中懊憹。飢不能食。但頭汗出。二者爲邪熱鬱於胸中。當須梔子豉湯吐之。以湯其結熱也。陽明病下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。與陽明病無汗。小便不利。心中懊憹者。必發黃。二者爲邪熱結於胃中。當須大承氣湯。茵陳湯攻之。以滌其內熱也。識諸此者。吐下之不差。湯劑之適當。則無不愈者。一或當汗反吐。療熱以溫。則變證百出。逝出黃生者多矣。其爲醫者。請精究之。

舌上胎第二十二

傷寒舌上胎。何以明之。舌者心之官。法應南方火。本紅而澤。傷寒三四日已後。舌上有膜白滑如胎。甚者或燥。或澁。或黃。或黑。是數者。熱氣淺深之謂也。邪氣在表者。舌上卽無胎。及邪氣傳裏。津液結搏。則舌上生胎也。寒邪初傳。未全成熱。或在半表半裏。或邪氣客於胸中者。皆舌上胎白而滑也。經曰。舌上如胎者。以丹田有熱。胸上有寒。邪初傳入裏者也。陽明病脅下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。是邪氣在半表半裏者也。陽明病若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。

噦第二十四

傷寒噦者。何以明之。噦者。俗謂之欬逆者是也。飽者噯近於噦。噦飽者但胸喉間氣鬱塞不得下通。然而無聲也。若噦則吃吃然有聲者是也。噦者。咸金也。胃受穢故噦。噦也。飽也。若胃之病。反飲水。令汗大出。水得寒氣冷必相搏。其人卽飽。言胃氣虛竭也。傷寒大吐大下之後。極虛復極汗出者。其人外氣怫鬱。復與之水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。又胃冷不能食者。飲水則噦。卽是覩之。噦飽皆胃疾可知矣。經曰。跌陽脈浮。則爲氣飽。脈滑則爲噦。此爲醫咎。貴虛取實之過也。大抵妄下之後。胃虛氣逆。則成噦也。經曰。溼家若下之太早。則噦。本虛攻其熱。則噦。此爲熱必噦。諸如此者。皆下之後。胃虛而噦者也。然飽者正爲水寒相搏。必曰小青龍湯去麻黃加附子而可矣。主於噦者。則又熱氣擁鬱。氣不得通而成者也。輕者有和解之證。重者有攻下之候。經曰。有潮熱時時噦。與小柴胡湯者。卽是和解之證也。噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之則愈。卽可攻下之候也。傷寒至於噦。則病已極也。非若渴煩等輕緩之候。如太陽中風。以火劫發汗。陰陽俱虛。竭身體枯燥。但頭汗出。

瞤頸而還。腹滿微喘。口乾咽燥。或不大便。久則讝語。甚者至噦。是言其極也。又不尿腹滿加噦者不治。毋爲眞病。其若是者。雖有神醫之術。當斯脫絕之候。又何以措其手足哉。

欬第二十五

傷寒欬者。何以明之。欬者。謦欬之欬。俗謂之嗽者是也。肺主氣。形寒飲冷則傷之。使氣上而不下。逆而不收。衝擊腸咽。令喉中淫淫如痒。習習如梗。是令欬也。甚者。縮縮不已。連連不止。坐臥不安。語言不竟。動引百骸。聲聞四近矣。欬之由來。有肺寒而欬者。有停飲而欬者。有邪氣在半表半裏而欬者。雖同曰欬。而治各不同也。（內經曰）肺之令人欬。何也。皮毛者。肺之合也。皮毛先受寒氣。寒氣以從其合也。其寒飲食入胃。從肺脈上至於肺。肺寒則外內合邪。因而客之。則爲欬嗽者。是肺寒而欬也。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。小青龍湯主之。少陰病腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或欬者。眞武湯加五味子。細辛乾薑主之。二者是停飲而欬。與表寒相合而欬者。眞武湯所主。爲水飲與眞寒相合而欬者。又不可不知也。傷寒中風。往來寒熱。胸脅苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或欬者。小柴胡湯去人參。大棗生薑加乾薑五味子主之。少陰病四逆。其人或欬者。四逆散加乾薑五味子主之。二者是邪氣傳裏。而小柴胡湯所主爲陽邪傳裏。動肺而欬者。四逆散所主爲陰邪傳裏。動肺而欬者。又不可不識也。表寒也。裏寒也。協水飲則必動肺。以形寒寒飲則傷肺故也。陽邪也。陰邪也。自表傳裏則必動肺。以藏眞高於肺故也。欬爲肺疾。治之必發散而可矣。而又有不可發汗者。經曰。欬而小便利者。不可發汗。發汗則四肢厥逆冷。又曰。欬而發汗。跬而苦滿。腹中復堅。茲雖逆也。又脈散者爲心火刑於肺金。鬼賊相刑。必死。臨病之側。可不察之。

喘第二十六

傷寒喘者。何以明之。肺主氣。形寒飲冷則傷肺。故其氣逆而上行。衝衝而氣急。喝喝而息數。張口搖肩。搐身滾肚。是爲喘也。傷寒喘者。有邪氣在表。氣不利而喘者。有水氣之氣射肺而喘者。各不同也。喘家作桂枝加厚朴杏仁湯。太陽病頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。發汗後。飲水多。必喘。以水潠之亦喘。傷寒心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或喘者。小青龍湯去麻黃加杏仁主之。是欲發散水寒也。經曰。喘而汗出者。與葛根黃芩黃連湯以利之。汗出而喘者。與麻黃杏子甘草石膏湯以發之。二者如何而然也。且邪氣內攻。氣逆不利而喘者。因喘而汗出。見其邪氣在裏也。雖表未解。未可和之。若邪氣外盛。甕湯使氣不利而喘者。雖汗而喘不已。見其邪氣在表也。雖經汗下。亦可發之。此亦古人之與義。傷寒止於邪氣在表而喘者。心腹必滿而不堅。設或腹滿而喘。則又爲可下之證。經曰。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。爲因滿腹而喘矣。又或邪氣內盛。正氣欲脫。氣壅上逆。亦主喘也。經曰。直視讝語。喘滿者死。又汗出髮潤。喘不休者。此爲肺絕。身汗如油。喘而不休。此爲命絕。皆爲不治之喘也。省疾問病。更宜消息。

嘔吐第二十七

傷寒嘔吐。何以明之。嘔者。有聲者也。俗謂之噦吐者。吐出其物也。故有乾嘔而無乾吐。是以於嘔則曰食穀欲嘔。及吐則曰飲食入口卽吐。則嘔吐之有輕重可知矣。傷寒嘔有屬於熱者。有屬於寒者。至於吐家則悉言虛冷也。經曰。太陰之爲病。腹滿而吐食不下。自利益甚。時腹自痛。又不然。嘔有熱者。有寒者。有停飲者。有胃脘有膿者。皆當明辨之。嘔而發熱者。下急。鬱鬱微煩。大柴胡湯主之。者是邪熱爲嘔者也。膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐也。當溫之。與其乾嘔吐涎沫頭痛者。吳茱萸湯主之。是寒飲爲嘔者也。先嘔後渴者。此爲欲解。先渴家。是停飲嘔者。嘔家有癰膿。不須治。膿盡自愈。是胃脘有膿而嘔也。詰如此者。雖有殊別。大抵傷寒裹邪欲傳裏。裏氣上逆則爲嘔也。是以半表半裏證多云嘔也。傷寒三日三陽爲盡。三陰當受邪。其人反能食。云不嘔。不渴爲裏無熱。十裏云。嘔家之爲病。氣逆者必嘔。明矣。嘔家之爲病。氣逆者必散之。瘀飲者必下之。千金曰。嘔家多服生薑。此是嘔家聖藥。是要散其逆氣。逆而未收斂爲賀也。其嘔者氣虛也。二者停飲也。傷寒二三日心中悸而煩者。小建中湯主之。少陰病四逆。其人或悸者。四逆散加桂五分。是氣虛而悸者也。飲水多。必心下悸。是停飲而悸者也。其氣虛者。由陽氣內弱。心下空虛。正氣內動而爲悸也。其停飲者。由水停心下。心爲火而惡水。水既內停。心不自安。則內虛。邪氣交擊而令悸者。與氣虛而悸者。則又甚焉。太陽病發汗過多。其人若下之。身重心下悸者。不可發汗。發汗少陽病。不可吐下。吐下則悸而驚。少陽病胃和則愈。胃不和則煩而悸。是數者。皆汗後協邪者。與其氣虛而悸者。有須定其氣浮也。又飲水過多。水飲不爲宣布。留心下甚者則悸。金匱要略曰。嘔家用半夏厚朴湯。治其氣逆而未收斂爲賀也。其嘔悸飲。則傷肺。以形寒寒飲則傷肺故也。欬爲肺欬傳於胃則爲噦。益於皮膚則爲腫。潰於腸間則爲利下。不可緩之也。與茯苓甘草湯。後治其欬。不爾水潰於胃。必作利也。欬爲邪之深者。猶先治不深究之。

渴第二十九

傷寒渴者。何以明之。渴者。裏有熱也。傷寒之邪自表傳至裏。則必有名證。隨在皮二日在肉三日在肌四日在胸五日在腹六日入胃。其傳經者。又有證一二日發。頭項痛而腰脊強者。是矣。太陽傳陽明。則二三日發。身熱目疼鼻乾不得臥也。陽明傳少陽。則三四日發。胸脅痛而耳聾。此三陽皆受病。爲邪在表。而猶未作熱。故不言渴。至四五日。少陽傳太陰。經邪氣漸入裏。寒邪漸成熱。當是時也。津液耗少。故腹滿而嗌乾。至五六日。太陰傳少陰。是裏熱又漸深也。當此之時。則津液爲熱所搏。漸耗而乾。故口燥苦乾而渴。及至六七日。則少陰傳於厥陰。厥陰之爲病。其邪淺深而見焉。雖曰一日

消渴。爲裏熱已極矣。所謂消渴者。飲水多而小便少者是矣。謂其熱能消水也。所以傷寒病至六七日而渴欲飲水。爲欲愈之病。以其傳經盡故也。是以厥陰病云渴欲飲水。少少與之愈者是也。邪氣初傳入裏。熱氣散漫。未收斂成熱。熏蒸焦膈。搏耗津液。遂成渴也。病人雖渴。欲得飲水。又不可多與之。若飲水過多。熱少不能消。故復爲停飲諸疾。經曰。凡得時氣病。至五六日而渴欲飲水。飲不能多。勿多與也。何者。以腹中熱尙少。不能消之。卽更與人作病也。若大渴欲飲水。猶當依證與之。與之常令不足。勿極意也。言能飲一斗與五升。又曰。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。渴者宜五苓散。至於大渴欲飲水數升者。白虎湯加人參湯主之。皆欲潤其燥而生津液也。凡得病反能飲水。此爲欲愈之病。其不曉病者。但聞病飲水自差。小渴者。乃強與飲之。因成大禍。不可復救。然則悖動也。支結也。喘咳噎噦乾嘔。腫滿下利。小便不利。數者。皆是飲水過傷。而診病之工。當須識此。勿令誤也。

振第三十

傷寒振者。何以明之。振者。森然若寒。登然振動者是也。傷寒振者。皆責其虛塞也。至於欲汗之時。其人必虛。必蒸蒸而振。卻發熱汗出而解。振。近戰也。而輕者爲振矣。戰。爲正與邪爭。爭則爲鼓慄而戰。振但虛而不至爭。故止登動而振也。下後復發汗振寒者。謂其表裏俱虛也。亡血家發汗則寒慄而振者。謂其血氣或從口鼻或從目出。是名下厥上竭。亦是言發動其熱也。先熱而後厥者。熱伏於內也。先厥而後熱者。陰退而陽氣得復也。若始得之便厥者。則是陽氣不足而陰氣勝也。大抵厥逆爲陰所主。寒者多矣。而又有進退之別。經曰。病厥五日。熱亦五日。設六日當復厥。不厥者自愈。設熱四日厥反三日。復厥四日。厥少熱多。其病自愈。厥四日熱反三日。復厥五日。其病爲進。寒多熱少。陽氣退。故爲進也。病至厥陰傳經盡也。當是之時。陽氣勝陰。厥少熱多。其病則愈。若或陰氣反勝。陽不得復。爲陽寒復也。至於下利。則曰先厥後發熱而利。必自止。見厥復利。厥者復爲熱。爲陽氣得復而利。必自止。熱者便爲厥。是陰氣還勝也。故復下利矣。諸陽受氣於胸中。邪氣客於胸中。鬱鬱留結。則陽氣不得敷布。而手足爲之厥。經曰。手足厥冷。脈乍緊。邪結在胸中。心中滿而煩。飢不能食。病在胸中。當吐之者是矣。厥爲陰之盛也。若更加之惡寒而蹉者。陰氣之極也。則難可劑。經曰。少陰病惡寒身蹉而利。手足厥冷者不治。是厥冷之逆者。神丹其能生乎。

戰慄第三十一

傷寒戰慄。何以明之。戰慄者。形相類而實非一也。合而言之。戰慄非二也。析而分之。有內外之別焉。戰者爲陽陰之爭也。傷寒欲解。將汗之時。正氣內實。邪不能與之爭。則便汗出而不發戰也。邪氣欲出。其人本虛。邪與正爭。微者爲振。甚者則戰。戰退正勝而解矣。經曰。病有戰而汗出。因得解者何也。其人本虛。是以發戰者是也。邪氣外與正氣爭則爲戰。戰其愈者也。邪氣內與正氣爭則爲慄。慄爲甚者也。經曰。陰中於邪。必內慄也。表氣微虛。裏氣不守。故使邪中於陰也。方其裏爲虛從可知矣。又鄭聲者。重語也。正爲聲轉也。若聲重而轉其本音者亦是矣。昧者。殊不知此。安以重爲重壘之語。與讒語混而莫辨。遂止以身熱脈數煩渴便難而多言者爲鄭聲。如此則有失仲景之本意。兼鄭聲淫。則語以正之。則鄭聲別無證治者。是不與讒語爲類也。雖曰虛矣。止爲正氣虛而不全。故使轉聲而不正也。明者。臨此。幸詳究之。

讒語第三十五

傷寒四逆。何以明之。四逆者。四肢逆而不溫者是也。積涼成寒。積溫成熱。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。傷寒始者。邪在皮膚。當太陽陽明受邪之時。則一身手足盡熱。當少陰太陰受邪之時。則手足自溫。是表邪漸緩而欲傳裏也。經曰。傷寒四五日手足溫而渴者。小柴胡湯主之。是太陽之邪傳之少陽也。傷

寒脈浮手足自溫者。是爲繫在太陰。是少陽邪傳於太陰也。是知邪氣在半表半裏。則手足不熱而自溫也。至於邪傳少陰。爲裏證已深。雖未至厥而手足又加之不溫。是四逆也。若至厥陰。則手足厥冷矣。經曰。少陰病四逆。其人或欬或悸或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。方用柴胡枳實芍藥甘草四者。皆是寒冷之物。而專主四逆之疾。是知四逆非虛寒之證也。又有四逆諸湯亦治四逆。手足寒方用乾薑附子熱藥者。厥有旨哉。若手足自熱而至溫。從四逆而至厥者。傳經之邪也。四逆散主之。若始得之手足便厥而不溫者。是陰經受邪。陽氣不足。可用四邪湯溫之。大須識此。勿令誤也。四逆與厥相近而非也。經曰。諸四逆厥者。不可下。是四逆與厥有異也。吐利煩躁。見四逆者死。是惡見其四逆也。診視之間。熟詳究之。

厥第三十三

傷寒厥者。何以明之。厥者冷也。甚於四逆也。經曰。厥者。陰陽氣不相順接。便爲厥。厥者。手足逆冷是也。謂陽氣內陷。熱氣逆伏。而手足爲之冷也。經曰。傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前熱者後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。是知內陷者。手足爲厥矣。少陰病。但厥無汗而強發之。必動其血。未知從何道出。或從口鼻。或從目出。是名下厥上竭。亦是言發動其熱也。先熱而後厥者。熱伏於內也。先厥而後熱者。陰退而陽氣得復也。若始得之便厥者。則是陽氣不足而陰氣勝也。大抵厥逆爲陰所主。寒者多矣。而又有進退之別。經曰。病厥五日。熱亦五日。設六日當復厥。不厥者自愈。設熱四日厥反三日。復厥四日。厥少熱多。其病自愈。厥四日熱反三日。復厥五日。其病爲進。寒多熱少。陽氣退。故爲進也。病至厥陰傳經盡也。當是之時。陽氣勝陰。厥少熱多。其病則愈。若或陰氣反勝。陽不得復。厥多熱少。其病則逆。厥爲陰氣至也。熱爲陽寒復也。至於下利。則曰先厥後發熱而利。必自止。見厥復利。厥者復爲熱。爲陽氣得復而利。必自止。熱者便爲厥。是陰氣還勝也。故復下利矣。諸陽受氣於胸中。邪氣客於胸中。鬱鬱留結。則陽氣不得敷布。而手足爲之厥。經曰。手足厥冷。脈乍緊。邪結在胸中。心中滿而煩。飢不能食。病在胸中。當吐之者是矣。厥爲陰之盛也。若更加之惡寒而蹉者。陰氣之極也。則難可劑。經曰。少陰病惡寒身蹉而利。手足厥冷者不治。是厥冷之逆者。神丹其能生乎。

鄭聲第三十四

傷寒鄭聲。爲邪音也。孔子曰。惡鄭聲之亂雅樂也。又曰。放鄭聲。遠佞人。鄭聲淫。佞人殆。是謂鄭聲。爲不正之音也。傷寒鄭聲者。則其聲如鄭衛之音。轉不正也。經曰。虛則鄭。爲虛從可知矣。又鄭聲者。重語也。正爲聲轉也。若聲重而轉其本音者亦是矣。昧者。殊不知此。安以重爲重壘之語。與讒語混而莫辨。遂止以身熱脈數煩渴便難而多言者爲鄭聲。如此則有失仲景之本意。兼鄭聲淫。則語以正之。則鄭聲別無證治者。是不與讒語爲類也。雖曰虛矣。止爲正氣虛而不全。故使轉聲而不正也。明者。臨此。幸詳究之。

傷寒讝語。何以明之。讝者。謂妄有所見而言也。此皆眞氣昏亂。神識不清之所致。夫心藏神而主火。病則熱氣歸焉。傷寒胃中熱盛。上乘於心。心爲熱冒。則神昏亂而語言多出。識昏不知所以然。途言無次。而成讝妄之語。輕者睡中呢喃。重者不睡亦語言差謬。有讝語者。有獨語者。有狂語者。有譫語者。有亡陽讝語者。經曰。大熱入胃中。水竭躁煩。必發讝語。又腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便。久則讝語。是因被火劫讝語也。汗出讝語。此爲風也。須下之。過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實故也。是汗出讝語者也。下利讝語者。有燥屎也。小承氣湯主之。是下利讝語者也。下血讝語者。此爲熱入血室。當刺期門。隨其實而瀉之。是下血讝語者也。讝語有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚也。是謂燥屎在胃讝語者也。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。讝語遺尿。是三陽合病讝語者也。過經讝語者。熱也。當以湯下之。是過經讝語者也。發汗多亡陽讝語者。不可下。與柴胡桂枝湯和其榮衛。是以有通津液。後自愈。是亡陽讝語也。諸如此者。脈短則死。脈自和則愈。又身微熱。脈浮大者生。逆冷脈沉細不過一日死。實則讝語。氣收斂在內而實者。本病也。或氣上逆而喘滿。或氣下奪而自利者。皆爲逆也。經曰。直視讝語喘滿者死。下利者亦死。謂其正氣脫絕也。能知虛實之診。能識逆從之要。治病療病。則不失矣。

短氣第三十六

傷寒短氣。何以明之。短氣者。氣短而不能相續者是矣。似喘而非喘。若有氣上衝而實非氣上衝也。喘者。張口搖肩。搖身滾肚。謂之喘也。氣上衝者。復發氣時時上衝也。所謂短氣者。脈微而緊。緊則爲寒。微則爲虛。微緊相搏。則爲短氣。此爲短氣之虛者也。短氣有實爲實者。要當明辨之。經曰。缺陽而不搖肩。似呻吟而無痛者。短氣也。經所謂短氣者是也。短氣之氣短者。氣急而短促。謂之氣短者是也。短氣有實爲虛者。有虛爲實者。要當明辨之。經曰。缺陽脈微而緊。緊則爲寒。微則爲虛。微緊相搏。則爲短氣。此爲短氣之虛者也。短氣有潮熱。此外欲解。可攻裏也。此爲短氣之實者也。又有腸裏。又有腸裏者。要當審視之。經曰。短氣但坐。以汗出不徹故也。更發汗則愈。與其風濕相搏。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。甘草附子湯主之。是邪氣在表而短氣者也。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。十棗湯主之。與其太陽病。醫反下之。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞕。則爲結胸。大陷胸湯主之。是邪氣在裏而短氣者也。虛也。實也。在表也。在裏也。皆作短氣。又何以辨其虛實也。大凡心腹脹滿而短氣者。邪在裏而爲實也。腹濡滿而短氣者。邪在表而爲虛也。大抵短氣爲實。金匱要略曰。短氣不足以息者實也。又水停心下。亦令短氣。金匱要略曰。食少飲多。水停心下。微者短氣。卽此觀之。短氣之由亦衆矣。必審其形候。使的而不惑。必審其邪氣在表裏之不差。隨症攻之。了無不愈者矣。

搖頭第三十七

傷寒搖頭。何以明之。頭者。諸陽之會也。諸陽之脈。皆上於頭。諸陰脈皆至頸。胸中而返。陽脈不治。則頭爲之搖。傷寒搖頭有三。皆所主不同也。有曰搖頭言者。裏痛也。以裏有痛者。語言則劇。欲言則頭爲之戰搖也。有曰獨搖頭。卒口噤。背反張者。痙病也。以風盛於上。風主動搖故也。裏痛非邪也。痛使之然。痙病非逆也。風使之然。至於陽反獨留。形體如煙熏。直視搖頭者。又謂之心絕。蓋心藏神而爲陰之本。陽根於陰。陰根於陽。陰陽相根。則榮衛上下相隨矣。絕則神去而陰竭。陽無根者。則不能自主持。故頭爲之搖矣。王冰曰。滋苗者以固其根。伐下者必枯其上。內絕其根。外作搖頭。又何疑焉。心絕者。其病也。風盛裏痛者。邪氣也。觀其頭搖。又當明其臧否焉。

瘈瘲第三十八

傷寒瘈瘲。何以明之。瘈者。筋脈急也。瘲者。筋脈緩也。急者。則引而縮。緩者。則縱而伸。或縮或伸。動而不止者。名曰瘈瘲。俗謂之搐者是也。（黃帝內經曰）病筋脈相引而急。名曰瘈瘲。瘈、臥則緊。從則縱。瘲疾之縱者。謂若放縱之縱也。以急爲瘈。以緩爲瘲。理至明矣。瘈瘲焉。傷寒瘈瘲者。邪熱氣極也。熱盛則風。搏併經絡。風主動。故四肢瘈瘲而不寧也。故風溫被火者。曰發微黃色。劇者如驚癎。時瘈瘲。言其熱氣之劇盛也。傷寒病至於發瘈瘲者。疾勢已過矣。多難可制。（內

經曰。）太陽終者。戴眼。反折瘛瘲。絕汗乃出。大如貫珠。著身不流。是見其瘛瘲爲已過之疾也。又有四肢撅掣。爲四肢動而不止。似瘛瘲而無力。不得伸縮者也。此爲肝絕。瘛瘲之證雖已。若能以祛風滌熱之劑。折其大熱。則瘛瘲亦有生者。若妄加灼火。或飲發表之藥。則死不旋踵。經曰。一逆尚引日。再逆促命期。

不仁第三十九

傷寒不仁。何以明之。仁柔也。不仁。謂不柔和也。痛不知也。痛不知也。寒不知也。熱不知也。任其屈伸灸刺不知所以然者。是謂不仁也。由邪氣擁盛。正氣爲邪氣閉伏。鬱而不發。榮衛血氣虛少。不能通行。致斯然也。（內經曰）榮氣虛則不仁。（針經曰）衛氣不行。則爲不仁。經曰。榮衛不能相將。三焦無所仰。身體痹不仁。卽是言之。知榮衛血氣虛少。不能通行爲不仁者明矣。經曰。諸乘寒者則爲厥。鬱冒不仁。言此厥者。是正氣爲寒氣所乘爲厥氣也。非四肢逆冷之厥也。何者。蓋以鬱冒爲昏冒。不仁爲不知痛痒。得不爲尸厥之厥耶。經曰。少陰脈不至。腎氣微。少精血。奔氣促迫。上入胸膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相搏。令身不仁。此爲尸厥。其乘寒之厥。鬱冒不仁。爲可治。刺之而得痊濟者。實神醫之診也。且脾內證。當臍有動氣。經特曰。臍之四傍動氣。不可汗下。獨不言脾候當臍有動氣者。以脾者中州。爲胃以行津液。發汗吐下猶先動脾。況脾家發動氣者。詎可動之也。所以特不言之也。傷寒所以若外證爲形體不仁。此又爲命絕。雖越人其能起之歟。

直視第四十

傷寒直視。何以明之。直視者。視物而目精不轉動神。目者。心之使也。神所寓焉。肝之外候也。精神榮之竅。爲眼之睛。精爲睛子。筋之精爲黑睛。血之精之精與脈并爲系上屬於腦。五藏血氣調和。精氣氣。使神智不蹇。藏精之氣不上榮於目。則目爲之曰。蓋家不可發汗。汗出則額上陷脈急緊。直視不已。弱又發汗亡陽。則陰陽俱虛所致也。此雖錯逆。爲心絕。皆藏氣脫絕也。直視讝語。喘滿者死。下利者亦死。又劇者。發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。脈弦者生。濇者死。皆邪氣盛而正氣脫也。其是非直視也。此爲內實也。可用大承氣湯。大柴胡者形證相近。其爲工者。宜熟視之。

鬱冒第四十一

傷寒鬱冒。何以明之。鬱爲鬱結而氣不舒也。冒爲極而乘寒。則有之矣。經曰。諸乘寒者則爲厥。鬱冒俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。是知因虛乘寒。乃生鬱冒。今更略曰。新產婦人有三病。一者病痙。二者病鬱冒。三者大便難。不能食。大便堅。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。卽此觀之。鬱冒爲虛寒可知矣。又或

少陰病下利止而頭眩。時時自冒者。又爲死證。蓋謂其虛極而脫也。觀其鬱冒。幸無忽焉。

動氣第四十二

傷寒動氣。何以明之。動氣者。爲築築然動於腹中者是矣。藏氣不築然。謂之動氣。（難經曰）肝內證。臍左有動氣。按之牢若痛。心內證。臍上有動氣。按之牢若痛。是藏氣不治。腹中氣候發動也。動氣應減。是皆有動氣。按之牢若痛。腎內證。臍下有動氣。按之牢若痛。是藏氣兵氣虛。雖有表裏攻發之證。卽不可汗下。經曰。動氣在左。不可發汗。汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。是發汗而動肝氣者也。動氣在左。不可下。下之則腹內拘急。食不下。動氣更劇。雖有身熱。欲卽欲蹉。是下之而動心氣者也。動氣在上。不可下。下之則動氣在上。不可發汗。汗則氣上衝。正在心端。是發汗而肝氣者也。動氣在上。不可發汗。汗則氣上衝。正在心端。是發汗而動肺氣者也。動氣在下。不可發汗。汗則無汗。心中大煩。骨節苦煩。欲卽吐水。是發汗而動肺氣者也。動氣在下。不可下。下之則腹脹滿。卒起頭眩。食卽反吐。殼不得下。是發汗而動腎氣者也。動氣在下。不可發汗。汗則無汗。心中大煩。骨節苦煩。欲卽吐水。是發汗而動肺氣者也。動氣在右。不可下。下之則痛。目運惡寒。食則反吐。殼不得下。是發汗而動肺氣者也。動氣在右。不可發汗。汗則無汗。心中大煩。骨節苦煩。欲卽吐水。是發汗而動肺氣者也。動氣在右。不可下。下之則痛。目運惡寒。食則反吐。殼不得下。是發汗而動腎氣者也。動氣在下。不可發汗。汗則無汗。心中大煩。骨節苦煩。欲卽吐水。是發汗而動肺氣者也。動氣在右。不可下。下之則痛。目運惡寒。食則反吐。殼不得下。是發汗而動腎氣者也。動氣在下。不可下。下之則腹脹滿。卒起頭眩。食卽

語。或差後至年月日復發。此數者。皆腸胃有積結而須攻泄者也。內經有曰。大熱內結。注泄不止。熱宜塞有時者。是血結而不行者。須小柴胡湯散之。二者既有留邪。必須治之可也。若發熱經水適來。盡日而了。因通用下利雖有衰證。又不可發汗。以下利爲邪氣內攻。走津液而胃虛也。故經曰。下利不可攻其表。汗出必腹滿者是矣。大抵下利脫氣至急。五穀之中。此爲甚者。其或邪盛正虛。邪攻正氣下脫。多下利而死。何以言之。經曰下利十日餘行。脈反實者死。發熱下利至甚。厥不止者死。直視讝語下利者死。下利手足厥冷無脈者。灸之不溫。脈不還死。少陰病自利。復煩躁不得臥寐者死。此數者。皆邪攻正氣下脫而死者也。金匱要略曰。六府氣絕於外者。手足寒。五藏氣絕於內者。利下不禁。嗚呼。疾成而後變。雖神醫不可爲已。氣既脫矣。孰能治之。

筋惕肉瞤第四十四

傷寒筋惕肉瞤。何以明之。傷寒頭痛身疼。惡寒發熱者。必然之證也。其於筋惕肉瞤。非常常有之者。必待發汗過多。亡陽則有之矣。〔內經曰〕陽氣者。精則養神。柔則養筋。發汗過多。津液枯少。陽氣太虛。筋肉失所養。故惕惕然而跳。瞤瞤然而動也。太陽病脈微弱。汗出惡風者。不可服大青龍湯。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。卽是觀之。筋惕肉瞤。由發汗多亡陽。陽虛可見矣。茲雖逆也。止於發汗亡陽而表虛。治以溫經益陽則可矣。或因吐下發汗。表裏俱虛而有屯狀者。又非若但發汗後所可同也。經曰。傷寒吐下後。發汗虛煩。脈甚微。八九日心下痞鞕。脅下痛。氣上衝咽喉。眩冒。筋脈動惕者。久而成痿。此爲逆之甚者也。太陽病發汗。復下之後。表裏俱虛。復加燒針。因胸煩面色青黃。肩瞤者難治。茲爲逆之甚者也。發汗吐下。庸可忽諸。

熱入血室第四十五

傷寒熱入血室。何以明之。血室者。屋室也。謂可以停止之處。人身之血室者。榮血停止之所。經脈留行之處。卽衝脈是也。衝脈者。奇經八脈之一脈也。起於腎下。出於氣衝。並足陽明經。夾臍上行。至胸中而散。爲十二經脈之海。王冰曰。衝爲血海。言諸經之血。朝會於此。男子〔內經曰〕任脈通。衝脈盛。月事以時下者是也。王冰曰。陰靜海滿而去血。謂衝脈盛爲海滿也。卽是觀之。衝是血室。可知矣。傷寒之邪。婦人則隨經而入。男子由陽明而傳。以衝之脈與少陰之絡起於腎。女子咸汗。劇頭而還。小便不利。渴欲水漿。此爲邪熱在裏。身必發黃。黃家爲熱盛。而治法亦自有殊。傷寒八九日身如橘子色。小便不利。少腹滿者。茵陳蒿湯主之。此欲泄滌其熱也。傷寒身黃發熱者。梔子蘗皮湯主之。此欲解散其熱也。傷寒瘧熱在裏。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯主之。此欲解散其熱也。此數者。泄滌解散。乃爲之不同。亦皆祈火徹熱之劑也。一或身黃脈沉結。少腹鞕而小便自利。其人如狂者。又爲畜血在下焦。便之黃也。必須抵當湯下之而愈。黃家既是病之已極。是以有不治之者多矣。非止寸口近寧無脈。身氣出冷爲不治之疾。又若形體如煙熏。直視搖頭者。是爲心絕。環口黧黑。柔汗發黃。是爲脾絕。皆不治之診。醫者更詳視之。

發狂第四十七

傷寒發狂。何以明之。狂者。猖狂也。謂其不寧也。〔難經曰〕狂之始發也。少臥不饑。而自高賢也。自辨智也。自貴倨也。狂笑好歌樂也。妄行走不休也。狂家所起。皆陽盛致然。〔內經曰〕陰不勝其陽。脈留薄疾。并乃狂也。又曰。邪入於陽則狂。邪入於陰則癌。〔難經曰〕重陽者狂。重陰者癲。〔脈經曰〕陰附陽則狂。陽附陰則癲。〔病源曰〕陽邪併於陽則狂。陰邪併於陰則癲。卽諸經之狂爲陽盛也明矣。又陽明之病。惡人與火。開木音。則惕然而驚。心欲動。獨閉戶牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。其所上之處。皆非素能者。是謂陽邪併於陽明也。傷寒熱毒在胃。併於心藏。使神不寧而志不定。遂發狂也。傷寒至於發狂。爲邪熱至極也。非大吐下則不能已。又有熱在下焦。其人如狂者。經曰。熱入膀胱。其人如狂。謂之如狂。卽未

而愈耶。且胸脅滿如結胸。讝語是邪氣留結於胸脅而不去者。必刺期門。隨其胃而瀉之。寒熱如瘧。發作有時者。是血結而不行者。須小柴胡湯散之。二者既有留邪。必須治之可也。若發熱經水適來。盡日而了。因通用下利雖有衰證。又不可發汗。以下利爲邪氣內攻。走津液而胃虛也。故經曰。下利不可攻其表。汗出必腹滿者是矣。大抵下利脫氣至急。五穀之中。此爲甚者。其或邪盛正虛。邪攻正氣下脫。多下利而死。何以言之。經曰下利十日餘行。脈反實者死。發熱下利至甚。厥不止者死。直視讝語下利者死。下利手足厥冷無脈者。灸之不溫。脈不還死。少陰病自利。復煩躁不得臥寐者死。此數者。皆邪攻正氣下脫而死者也。金匱要略曰。六府氣絕於外者。手足寒。五藏氣絕於內者。利下不禁。嗚呼。疾成而後變。雖神醫不可爲已。氣既脫矣。孰能治之。

筋惕肉瞤第四十四

傷寒筋惕肉瞤。何以明之。傷寒頭痛身疼。惡寒發熱者。必然之證也。其於筋惕肉瞤。非常常有之者。必待發汗過多。亡陽則有之矣。〔內經曰〕陽氣者。精則養神。柔則養筋。發汗過多。津液枯少。陽氣太虛。筋肉失所養。故惕惕然而跳。瞤瞤然而動也。太陽病脈微弱。汗出惡風者。不可服大青龍湯。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。卽是觀之。筋惕肉瞤。由發汗多亡陽。陽虛可見矣。茲雖逆也。止於發汗亡陽而表虛。治以溫經益陽則可矣。或因吐下發汗。表裏俱虛而有屯狀者。又非若但發汗後所可同也。經曰。傷寒吐下後。發汗虛煩。脈甚微。八九日心下痞鞕。脅下痛。氣上衝咽喉。眩冒。筋脈動惕者。久而成痿。此爲逆之甚者也。太陽病發汗。復下之後。表裏俱虛。復加燒針。因胸煩面色青黃。肩瞤者難治。茲爲逆之甚者也。發汗吐下。庸可忽諸。

熱入血室第四十五

傷寒熱入血室。何以明之。血室者。屋室也。謂可以停止之處。人身之血室者。榮血停止之所。經脈留行之處。卽衝脈是也。衝脈者。奇經八脈之一脈也。起於腎下。出於氣衝。並足陽明經。夾臍上行。至胸中而散。爲十二經脈之海。王冰曰。衝爲血海。言諸經之血。朝會於此。男子〔內經曰〕任脈通。衝脈盛。月事以時下者是也。王冰曰。陰靜海滿而去血。謂衝脈盛爲海滿也。卽是觀之。衝是血室。可知矣。傷寒之邪。婦人則隨經而入。男子由陽明而傳。以衝之脈與少陰之絡起於腎。女子咸汗。劇頭而還。小便不利。渴欲水漿。此爲邪熱在裏。身必發黃。黃家爲熱盛。而治法亦自有殊。傷寒八九日身如橘子色。小便不利。少腹滿者。茵陳蒿湯主之。此欲泄滌其熱也。傷寒身黃發熱者。梔子蘗皮湯主之。此欲解散其熱也。傷寒瘧熱在裏。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯主之。此欲解散其熱也。此數者。泄滌解散。乃爲之不同。亦皆祈火徹熱之劑也。一或身黃脈沉結。少腹鞕而小便自利。其人如狂者。又爲畜血在下焦。便之黃也。必須抵當湯下之而愈。黃家既是病之已極。是以有不治之者多矣。非止寸口近寧無脈。身氣出冷爲不治之疾。又若形體如煙熏。直視搖頭者。是爲心絕。環口黧黑。柔汗發黃。是爲脾絕。皆不治之診。醫者更詳視之。

發狂第四十七

傷寒發狂。何以明之。狂者。猖狂也。謂其不寧也。〔難經曰〕狂之始發也。少臥不饑。而自高賢也。自辨智也。自貴倨也。狂笑好歌樂也。妄行走不休也。狂家所起。皆陽盛致然。〔內經曰〕陰不勝其陽。脈留薄疾。并乃狂也。又曰。邪入於陽則狂。邪入於陰則癌。〔難經曰〕重陽者狂。重陰者癲。〔脈經曰〕陰附陽則狂。陽附陰則癲。〔病源曰〕陽邪併於陽則狂。陰邪併於陰則癲。卽諸經之狂爲陽盛也明矣。又陽明之病。惡人與火。開木音。則惕然而驚。心欲動。獨閉戶牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。其所上之處。皆非素能者。是謂陽邪併於陽明也。傷寒熱毒在胃。併於心藏。使神不寧而志不定。遂發狂也。傷寒至於發狂。爲邪熱至極也。非大吐下則不能已。又有熱在下焦。其人如狂者。經曰。熱入膀胱。其人如狂。謂之如狂。卽未

至於狂。但以起不安爾。其或狂言。目反直視。又爲腎之絕。汗出輒復熱。狂言不能食。又爲失志死。若此則殆非藥石之所及。是爲異病焉。

霍亂第四十八

傷寒霍亂。何以明之。上吐而下利。揮霍而撩亂是也。邪在上焦者。但吐而不利。邪在下焦者。但利而不吐。若邪在中焦。胃氣不治。爲邪所傷。使陰陽乖隔。遂上吐而下利。若止嘔吐而利經止。得之吐利。必也上吐下利。煩擾煩亂。乃謂之霍亂。其與但稱吐利者。有以異也。傷寒吐利者。邪氣所傷。霍亂吐利者。飲食所傷也。其有兼傷寒之邪。內外不和者。加之頭痛發熱而吐利也。經曰。病發熱頭痛。身疼惡寒吐利者。此屬何病。答曰。此名霍亂。自吐下又利止。復更發熱也。是霍亂兼傷寒者也。是霍亂頭痛發熱。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者。理中圓主之。以其中焦失治。陰陽乖隔。必有偏之者。偏陽則多熱。偏陰則多寒。許仁則曰。病有乾霍亂。有濕霍亂。乾霍亂死者多。濕霍亂死者少。蓋吐利則所傷之物。得以出泄。雖霍亂甚則止於胃中水穀泄盡則止矣。所以死者少。及其乾霍亂而死多者。以其上不得吐。下不得利。則所傷之物不得出泄。擁閉正氣。陽隔陰陽。煩擾悶亂。躁無所安。喘脹。乾霍亂而死。嗚呼。食飲有節。起居有常者。豈得致霍亂耶。飲食自倍。腸胃乃傷。喪身之由。實自致爾。

畜血第四十九

傷寒畜血。何以明之。畜血者。血在下焦。結聚而不行。畜積而不散者是也。血菀於上而吐血者。謂之衄厥。留於下而瘀者。謂之畜血。此由太陽隨經瘀熱在裏。血爲熱所搏結而不行。畜於下焦之所致。經曰。太陽病。六七日表證仍在。脈微而沉。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞕滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經瘀熱在裏故也。大抵若傷寒。必先觀兩目。次看口舌。然後自心下至少腹。以手撫按之。覺有滿鞕者。則當審而治之。如少腹堅有鞕滿。便當問其小便。若小便不利者。則是畜血之證。可下瘀血。經曰。傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。又曰。太陽病身黃。脈沉結。少腹鞕。小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。皆須抵當圓下之愈。陽明證。其人喜忘。屎雖鞕。大便反易。其色必黑。亦是畜血之證。畜血於下。所以如狂者。經所謂熱結膀胱。其人如狂者是也。血瘀於下。所以喜忘者。（內經曰）血并於下。亂而喜忘者是也。二者若有其一。則爲畜血證明矣。畜血之證。又有輕重焉。如狂也。喜忘也。皆畜血之甚者。須抵當湯圓以下之。如外已解。但少腹急結者。則爲畜血之輕也。須桃仁承氣湯以利之。醫之妙者何也。在乎識形證。明脈息。曉虛實。知傳變。其於形證之明者。衆人所共識。又何以見其妙。必也形證之參差。衆人所未識。獨先識之。乃所以爲妙。且如病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。假令已下。脈數不解。合熱則消穀喜飢。至六七日不大便者。此有瘀血。抵當湯主之。當不大便。六七日之際。又無喜忘如狂之證。亦無少腹鞕滿之候。當是之時。與承氣湯下者多矣。獨能處以抵當湯下之者。是爲醫之妙者也。若是者。何以知其有畜血也。且脈浮而數。浮則傷氣。數則傷血。熱客於氣則脈浮。熱客於血則脈數。因下之後。浮數俱去。則已。若下之後數去。其脈但浮者。則榮血閒熱去而衛氣閒熱在矣。爲邪氣獨留心中則飢。邪熱不殺穀。胸熱發渴也。及下之後。浮脈去而數不解者。則衛氣閒熱去而榮血閒熱在矣。熱氣合并。迫血下行。胃虛協熱。消穀善飢。血至下焦。若下不止。則血得以去泄。必便膿血也。若不大便。六七日。則血不得出泄。必畜在下焦爲瘀血。是須抵當湯下之。此實疾證之奇異。醫法之玄微。能審諸此者。眞妙醫也。

勞復第五十

傷寒勞復。何以明之。勞爲勞動之勞。復爲再發也。是傷寒差後。因勞動再發者是也。傷寒新差後。血氣未平。餘熱未盡。勞動其熱。熱氣還經絡。遂復發也。此有二種。一者因飲食內傷。二者因飲食內傷。其勞動外傷者。非止強力搖體。持重遠行之勞。至於梳頭洗面則動氣。發悲思盧則勞神。皆能復也。況其過用者乎。其飲食內傷者。爲多食則遺食肉則復者也。（內經曰）熱病已愈。而時有遺者何也。以熱甚而強食之。病已衰而熱有所藏。因其穀氣留薄。兩陽相合。故有所遺。經曰。病已差。尚微煩。設不了了者。以新虛不勝穀氣。故令微煩。損穀則愈。夫傷寒邪氣之傳。自表至裏。有次第焉。發汗吐下自輕至重。有等差焉。又其勞復則不然。見其邪氣之復來也。必迎奪之。不待其傳也。經曰。大病差後勞復者。枳實梔子豉湯主之。若有宿食加大黃。且枳實梔子豉湯則吐之。豈待腹滿讝語之候。經曰。傷寒差後更發熱者。小柴胡湯主之。脈浮以汗解之。脈沉實者以下解之。亦是便要拆其邪也。蓋傷寒之邪。自外入也。勞復之邪。自內發也。發汗吐下。隨宜施用焉。嗚呼。勞復也。食復也。諸勞宜可及御內則死矣。若男女相易。則爲陰陽易。其不易自病者。謂之女勞復。以其內損眞氣。外動邪熱。眞虛邪盛。則不可治矣。昔皆不與後人爲鑒誡哉。

傷寒明理論卷四

傷寒明理藥方論

桂枝湯方

經曰。桂枝本爲解肌。若其人脈浮緊。發熱汗不出者。不可與也。常須識此。勿令誤也。蓋桂枝湯。本專主太陽中風。其於腠理微密。榮衛邪實。津液禁固。寒邪所勝者。則桂枝湯不能發散。必也皮膚疎緩。又自汗。風邪干於衛氣者。乃可投之也。仲景以解肌爲輕。以發汗爲重。是以發汗吐下而不與麻黃湯者。以麻黃湯專於發汗。其發汗吐下後。津液內耗。雖有表邪而止可解肌。故須桂枝湯小和之也。桂味辛熱。用以爲（君）。必謂桂猶主也。宣導諸藥爲之先導。是猶辛甘發散爲陽之意。蓋發散風邪。必以辛爲主。故桂枝所以爲君也。芍藥味苦酸微寒。甘草味甘平。二物用以爲（臣）（佐）者。（內經）所謂風淫所勝。平以辛。佐以苦。以甘緩之。以酸收之。是以芍藥爲臣。而甘草爲佐也。生薑味辛溫。大棗味甘溫。二物爲（使）者。（內經）所謂風淫於內。以甘緩之。以辛散之。是以薑棗爲使者也。薑棗味辛甘。固能發散。而此又不特專於發散之用。以脾主爲胃行其津液。薑棗之用。專行脾之津液而和榮衛者也。麻黃湯所以不用薑棗者。閒專於發汗。則不待行化而津液得通矣。用諸方者。請熟究之。

桂枝（君）三兩去皮　芍藥（臣佐）三兩　甘草（臣佐）三兩炙　生薑（使）三兩切　大棗（使）十二枚擘

右五味。㕮咀。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已須臾。歠熱稀粥一升餘。以助藥力。溫

覆令一時許。遍身漐漐。微以有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出。病差停後服。不必盡劑。若不汗更服。依前法。又不汗。後服小促役其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑。盡病證猶在者。更作服。若汗不出。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物。

麻黃湯方

本草有曰。輕可去實。卽麻黃葛根之屬是也。實爲寒邪在表。皮腠堅實。榮衛靜。津液內固之。表實非腹滿便難之內實也。聖濟經曰。汗不出而腠密。邪氣勝而中鬱。輕劑所以揚之。卽麻黃葛根之輕劑耳。麻黃味甘苦。用以爲(君)者。以麻黃爲經劑。而專主發散。是以爲君也。桂枝爲(臣)者。以風邪在表。又緩而腠疎者。則必以桂枝解其肌。是用桂枝爲臣。寒邪在經。表實而腠密者。則非桂枝所能獨散。必專麻黃以發汗。是當麻黃爲主。故麻黃爲君。而桂枝所以爲臣也。(內經曰)寒淫於內。治以甘熱。佐以辛苦者。茲是類歟。甘草味甘平。杏仁味甘苦溫。用以爲(佐)(使)者。(內經曰)肝苦急。急食甘以緩之。肝者。榮之主也。傷寒榮勝衛。則血脈不利。是專味甘之物以緩之。故以甘草杏仁爲之佐使。且桂枝湯主中風。風則傷衛。風邪併於衛。則衛實而榮弱。仲景所謂汗出惡風者。此爲榮弱衛強者是矣。故桂枝湯佐以芍藥。用和榮也。麻黃湯主傷寒。寒則傷榮。寒邪併於榮。則榮實而衛虛。(內經)所謂氣之所并爲血虛。血之所併爲氣虛者是矣。故麻黃佐以杏仁。用利氣也。著是之論。實處方之妙理。制劑之淵微。該通君子熟明察之。乃見功焉。

麻黃(君)三兩去節　桂枝(臣)二兩去皮　甘草(佐使)二兩炙　杏仁(佐使)七十枚去皮尖

右四味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。緩取微汗。并不須啜粥。餘如桂枝法將息。

大青龍湯

青龍東方甲乙木神也。應春而主肝。專發主之令。萬物出甲。開甲則有兩岐。肝有兩葉。以應木葉。所以謂之青龍者。以發散榮衛兩傷之邪。是應肝木之體耳。桂枝湯主中風。麻黃湯主傷寒。二者發散之純者也。及乎大青龍湯則不然。雖爲發汗之劑。而所主又不一。必也中風脈浮緊。爲中風見寒脈。是風寒兩傷也。傷寒脈浮緩。爲傷寒見風脈。是風寒兩傷也。風寒兼寒。寒兼風。乃大青龍湯專主之也。見茲脈證。雖欲以麻黃湯發汗以散寒。而不能去其風。則病不去。或欲以桂枝湯解肌以祛風。而不能已其寒。則病不去。病仍在茲。仲景所以特處大青龍湯以兩解之。麻黃味甘溫。桂枝味辛熱。寒則傷榮。必以甘緩之。風則傷衛。必以辛散之。此風寒兩傷。榮衛俱病。故以甘辛相合而爲發散之劑。表虛腠理密。則以麻黃爲主。是先麻黃後桂枝。茲麻黃爲(君)。桂枝爲(臣)也。甘草味甘平。杏仁味甘苦。苦甘爲助。(佐)麻黃以登表。太過味甘溫。生薑味辛溫。辛甘相合。(佐)桂枝以解肌。石膏味甘辛微寒。風陽邪也。寒陰邪也。風則傷陽。寒則傷陰。榮相陰陽爲風寒兩傷。則非輕劑所能獨散也。必須輕重之劑以同散之。乃得陰陽之邪俱已。榮衛之氣俱和。是以石膏爲使。石膏爲重劑而又專達肌表者也。大青龍湯發汗之重劑也。非桂枝湯之所同用之。稍過則又有亡陽之失。經曰。若脈微弱。汗出惡風者不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。又曰。一服汗者。停後服。若服汗多亡陽。遂虛。惡風煩躁。不得眠也。卽比觀之。

麻黃(君)三兩去節　甘草(臣)三兩炙　桂枝(臣)三兩去皮　芍藥(佐)三兩　生薑(佐)三兩切　杏仁(佐)四十枚去皮尖　大棗(佐)十枚擘　石膏(使)如雞子大碎

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉止之。一服汗者。停後服。若復服汗多亡陽。遂虛。一作逆。惡風煩躁。不得眠也。

又溫粉方

白朮　雜本　川芎　白芷　各等分

右揭羅爲細末。每末一兩。入米粉三兩。和令勻。粉撲周身。止汗。無蠶本亦得。

小青龍湯

青龍象肝本之兩岐。而主兩傷之疾。中風見寒脈。傷寒見風脈。則爲榮衛之兩傷。故以青龍湯主之。傷寒表不解。則麻黃湯可以發。中風表不解。則桂枝湯可以散。惟其表且不解。而又加之心下有水氣。則非麻黃湯所能發。桂枝湯所能散。乃須小青龍湯。始可祛除表裏之邪氣爾。麻黃味甘辛溫。爲發散之主。表不解應發散之。則以麻黃爲(君)。桂味辛熱。甘草味甘平。甘辛爲陽。佐麻黃表散之。用二者所以爲臣。芍藥味酸微寒。五味子味酸溫。二者所以爲(佐)者。寒飲傷肺。咳逆而喘。則肺氣逆。(內經曰)肺欲收。急食酸以收之。故用芍藥五味子爲(佐)。以收逆氣。乾薑味辛熱。細辛味辛熱。半夏味辛溫。三者所以爲(使)者。心下有水。津液不行。則腎氣燥。(內經曰)腎苦燥。急食辛以潤之。是以乾薑細辛半夏爲(使)。以散寒水逆氣。收寒水。散津液。通行汗出而解矣。心下有水氣。散行則所傳不一。故又有增損之證。若渴者。去半夏。加栝樓根。水畜則津液不行。氣燥而渴。半夏味辛溫。燥津液者也。去之則津液易復。栝樓根味苦微寒。潤枯燥者也。加之則津液通行。是爲渴所宜也。若微利去麻黃。加芫花。水氣下行。清入腸間則爲利。下利者不可攻其表。汗出必脹滿。麻黃專爲表散。非下利所宜。故去之。芫花味苦寒。酸苦爲沏泄之劑。水去利則止。芫花下水故加之。若噎者。去麻黃。加附子。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人卽餉。又曰。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。噎爲胃氣虛竭。麻黃發汗。非胃虛冷所宜。故去之。附子辛熱。熱則溫其氣。辛則散其寒。而噎者爲當。兩相佐之。是以祛散冷寒之氣。若小便不利。少腹滿。去麻黃。加附苓。水畜在下。焦不行。爲小便不利。少腹滿。凡邪客於體者。在外者可汗之。在內者下之。在上者可涌之。在下者可泄之。水畜下焦。滲泄可也。發汗則非所當。故去麻黃。而茯苓味甘淡。專行津液。內經曰。熱淫於內。以淡滲之。苓瀉行水。甘淡爲所宜。故加茯苓。若喘者。去麻黃。加杏仁。喘爲氣逆。麻黃發陽。去之則氣易順。杏仁味甘苦溫。加之以泄逆氣。金匱要略曰。其形腫者。故不內麻黃。乃內杏子。以麻黃發其陽。故喘逆形腫。標本之疾。加減所同。蓋其類矣。

麻黃(君)三兩去節　甘草(臣)三兩炙　桂枝(臣)三兩去皮　芍藥(佐)三兩　五味子(佐)半升　細辛(使)三兩　乾薑(使)三兩　半夏(使)半升洗

右八味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

大承氣湯方

664

承順也。傷寒邪氣入胃者。謂之入府。府之爲言聚也。胃爲水穀之海。榮衛之源。水穀會聚於胃。變化而爲榮衛。邪氣入於胃也。胃中氣鬱滯。糟粕祕結。壅而爲實。是正氣不得舒順也。〔本草曰〕通可去滯。洩可去壅。邪塞而不利。閉而不通。以湯蕩滌。使邪者利而閉者通。正氣得以舒順。是以承氣名之。王冰曰。宜下必以苦。宜補必以酸。言酸收而苦泄也。枳實苦寒。潰堅破結。則以苦寒爲之主。是以枳實爲君。厚朴味苦温。〔內經曰〕燥淫於內。治以苦温。洩滿除燥。則以苦温爲補。是以厚朴爲臣。芒硝味鹹寒。〔內經曰〕熱淫於內。治以鹹寒。人傷於寒。則於病熱。熱氣聚於胃。則謂之實。鹹寒之物以除消熱實。故芒硝爲佐。大黃味苦寒。〔內經曰〕燥淫所勝。以苦下之。熱氣內勝。則津液消而腸胃燥。苦寒之物以潤燥熱。故以大黃爲使。是以大黃有將軍之號也。承氣湯下藥也。用之尤宜審焉。審知大滿大實堅有燥屎。乃可投之也。如非大滿。則猶生寒熱而病不除。況無滿實者。而結胸痞氣之屬。由是而生矣。是以脈經有曰。傷寒有承氣之戒。古人亦特謹之。

枳實（君）炙五枚　厚朴（臣）半斤炙去皮　芒硝（佐）三合　大黃（使）四兩滌洗

右四味。以水一斗先煮二物取五升。去滓。內大黃更煮取二升。去滓。內芒硝更上微火一兩沸。分温再服。得下餘勿服。

大柴胡湯方

虛者補之。實者瀉之。此言所共知。至如緩緩輕重之劑。則又臨時消息焉。大滿大實堅有燥屎。非峻劑則不能瀉。大小承氣湯。峻所以泄堅滿者也。如不至大堅滿。邪熱甚而須攻下者。又非承氣湯之可投。必也輕緩之劑攻之。大柴胡湯緩。用以逐邪熱也。經曰。傷寒發熱。七八日。雖脈浮數者。可下之。宜大柴胡湯。又曰。太陽病經過十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。爲未解也。可大柴胡下之則愈。是知大柴胡爲下劑之緩也。柴胡味苦平。微寒。傷寒至於可下。則爲熱氣有餘。應火而歸心。苦先入心。折熱之劑。必以苦爲主。故以柴胡爲（君）。黃芩味苦寒。（內經曰）酸苦湧泄爲陰。泄實折熱。必以酸苦。故以枳實芍藥爲（佐）。半夏味辛温。生薑味辛温。大棗味甘温。辛者散也。散逆氣者。必以辛甘。辛甘者緩也。緩正氣者。必以甘。故半夏生薑大棗爲之（使）也。一方加大黃。以大黃有將軍之鋭。而功專於蕩滌。不加大黃。恐難攻下。必應以大黃爲（使）也。用湯者審而行之。則十全之功可得矣。

柴胡（君）半斤　黃芩（臣）三兩　枳實（佐）四枚炙　芍藥（佐）三兩　生薑（佐）五兩切　半夏（使）半升洗　大棗（使）十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。温服一升。日三服。

梔子豉湯方

〔內經曰〕其高者。因而越之。其下者。引而竭之。中滿者。瀉之於內。其有邪者。滇形以爲汗。其在皮者。汗而發之。治傷寒之妙。雖有變通。終不越此數法也。傷寒邪氣。自裏而傳裏。留於胸中。爲邪在高分。則可吐之。是越之之法也。所吐之證。亦自不同。如不經汗下。邪氣蘊鬱於膈。則謂之膈實。應以梔子豉湯吐之。梔子豉湯吐胸中虛煩者也。梔子味苦寒。〔內經曰〕酸苦湧泄爲陰。湧者吐之也。湧吐虛煩。應以梔子豉湯。必以苦爲主。是以梔子爲（君）。煩爲熱勝也。湧熱者。必以苦勝熱者。必以寒。香豉味苦寒。助梔子以吐虛煩。必以苦爲主。是以香豉爲（臣）。〔內經曰〕氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其所以爲治。依而行之。所謂良矣。

柴胡（君）半斤　黃芩（臣）以成微熱發表之劑。人參味甘温。甘草味甘。半夏味辛微温。邪氣傳裏。則裏氣不治。甘以緩之。是以甘物爲之助。故用人參甘草爲（佐）。以扶正氣而復之也。半夏味辛微温。邪初入裏。則裏氣逆。辛以散之。是以辛物爲之助。故用半夏爲（佐）。以順逆氣而散邪也。裏氣平正。則邪氣不得深入。是以三味佐柴胡以和裏。生薑味辛温。大棗味甘温。〔內經曰〕辛甘發散爲陽。表邪未已。迤邐內傳。既未作實。宜當兩解。其在外者。必以辛甘之物發散。故生薑大棗爲（使）。輔柴胡以和表。七物相合。兩解之劑當矣。邪氣自表未斂。爲實乘虛而凌。則所傳不一。故有增損以裁之。胸中煩而不嘔。去半夏人參。加括樓實。煩者熱也。嘔者氣逆也。胸中煩而不嘔。則熱聚而氣不逆。邪氣欲漸成實也。人參味甘。爲補劑。去之使不助熱也。半夏味辛。爲散劑。去之以無逆氣也。括樓實味苦寒。除熱必以寒。泄熱必以苦。加括樓實。以通胸中鬱熱。若渴者去半夏。加人參括樓根。津液不足則渴。半夏味辛性燥。滲津液物也。去之則津液易復。人參味甘而潤。括樓根味苦而堅。堅潤相合。津液生而渴自已。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥。宜通而塞爲痛。邪氣入裏。裏氣不足。寒氣乘之。則腹中痛。黃芩味苦寒。苦性堅而寒中。去之則中氣易和。芍藥味酸苦微寒。酸性泄而利中。加之則裏氣得通。而痛自已。若脇下痞鞕。去大棗加牡蠣。〔內經曰〕甘者。令人中滿。大棗味甘温。去之則痞者消而鞕者軟。若心下悸。小便不利者。去黃芩加茯苓。心下悸。小便不利。水畜而不行也。〔內經曰〕腎欲堅。急食苦以堅之。堅腎則水益竭。黃芩味苦寒。去之則畜水浸行。〔內經曰〕淡味滲泄爲陽。茯苓味甘淡。加之則津液通流。若不渴。外有微熱。去人參加桂。不渴則津液足。去人參。以人參爲去內之物也。外有微熱。則表證多。加桂以取汗。發散表邪也。若欬者去人參大棗生薑。加五味子乾薑。肺氣逆則欬。甘補中。則肺氣愈逆。故去人參大棗之甘。五味子酸温。肺欲收。急食酸以收之。氣逆不收。故加五味子之酸。生薑乾薑一物也。生若温而乾者熱。寒氣內淫。則散以辛熱。蓋諸欬皆本於寒。故去生薑加乾薑。是相假之以正温熱之功。識諸此者。小小變通。觸類而長焉。

柴胡（君）半斤　黃芩（臣）三兩　人參（佐）一兩　甘草（佐）三兩炙　半夏（佐）半升洗　生薑（使）三兩切　大棗（使）十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。温服一升。日三服。

梔子豉湯方

〔內經曰〕其高者。因而越之。其下者。引而竭之。中滿者。瀉之於內。其有邪者。滇形以爲汗。其在皮者。汗而發之。治傷寒之妙。雖有變通。終不越此數法也。傷寒邪氣。自裏而傳裏。留於胸中。爲邪在高分。則可吐之。是越之之法也。所吐之證。亦自不同。如不經汗下。邪氣蘊鬱於膈。則謂之膈實。應以梔子豉湯吐之。梔子豉湯吐胸中虛煩者也。梔子味苦寒。〔內經曰〕酸苦湧泄爲陰。湧者吐之也。湧吐虛煩。應以梔子豉湯。必以苦爲主。是以梔子爲（君）。煩爲熱勝也。湧熱者。必以苦勝熱者。必以寒。香豉味苦寒。助梔子以吐虛煩。必以苦爲主。是以香豉爲（臣）。〔內經曰〕氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其所以爲治。依而行之。所謂良矣。

右二味。以水四升。煮梔子。取二升半。去滓。內豉更煮。取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得快吐者止後服。

黃芩散

薛氏曰。四日在胸。則可吐之。此迎而奪之之法也。千金方曰。氣浮上部。壅心胸。胸中滿者吐之。則愈。此隨證治之之法也。大約傷寒四五日。邪氣客於胸中之時也。加之胸中煩滿。氣上衝咽喉不得息者。則爲吐證具。乃可投諸吐藥而萬全之功有之矣。黃芩味苦寒。(內經曰)。濕氣在上。以苦吐之。濕之氣。留於胸中。以苦爲主。是以黃芩爲君。赤小豆味酸溫。(內經曰)。酸苦湧泄爲陰。分湧腦實。必以酸爲使。是以赤小豆爲(臣)。香豉味苦寒。苦以湧泄。寒以勝熱。去上腦之熱。必以苦寒爲輔。是以香豉爲使。酸苦相合。則胸中痰熱湧吐而出矣。其於亡血虛家。所以不可與者。以黃芩散爲駛劑。重亡津液之藥。亡血虛家補養後復得利而解矣。

茵蔯(君)一分熬黃　赤小豆(臣)一分

右二味。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢七。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓取汁。和散溫頓服之。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與黃芩散。

茵蔯蒿湯方

王冰曰。小熱之氣。涼以和之。大熱之氣。寒以取之。發黃者。熱之極也。非大寒之劑。則不能徹其熱。茵蔯蒿味苦寒。酸苦湧泄爲陰。酸以湧之。苦以泄之。泄甚熱者。必以苦爲主。故以茵蔯蒿爲君。梔子味苦寒。苦入心而瀉勝熱。大熱之氣。必以苦寒之物勝之。故以梔子爲(臣)。大黃味苦寒。宜補必以酸。宜下必以苦。推除邪熱。必假將軍攻之。故以大黃爲(使)。苦寒相近。雖甚熱。大黃必赴除。分泄前後。復得利而解矣。

茵蔯蒿(君)六兩　梔子(臣)十四枚擘　大黃(使)二兩去皮

右三味。以水一斗二升。先煮茵蔯蒿減六升。內二味。煮取三升。去滓。分三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。則黃從小便去也。

白虎湯方

白虎西方金神也。應秋而歸肺。熱甚於內者。以寒下之。熱甚於外者。以涼解之。其有中外俱熱。內不得泄。外不得發者。非此湯則不能解之也。夏熱秋涼。暑暍之氣。得秋而止。秋之令曰處暑。是湯以白虎名之。謂能止熱也。知母味苦寒。(內經曰)。熱淫所勝。佐以苦甘。又曰熱淫於內。以苦發之。欲徹表熱。必以苦爲主。故以知母爲(君)。石膏味甘徹寒。熱則傷氣。寒以勝之。甘以緩之。熱勝其氣。必以甘寒爲助。是以石膏甘寒爲臣。甘草味甘平。粳米味甘平。脾欲緩。急食甘以緩之。熱氣內餘。消燥津液。則脾氣燥。必以甘平之物緩其中。故以甘草粳米爲之(使)。是太陽中暍。得此湯則頓除之。卽熱見白虎而蓋矣。立秋後不可服。以秋則陰氣半矣。白虎爲大寒劑。秋王之時。若不能食。服之而爲噦逆不能食。成虛羸者多矣。(蔡沂云立秋後至多矣四十二字疑後人所加)

知母(君)六兩　石膏(臣)一斤碎　甘草(使)二兩炙　粳米(使)六合

右四味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

五苓散方

苓。伏也。號令之令矣。通行津液。刮伐腎邪。專爲號令者。苓之功也。五苓之中。茯苓爲主。故曰五苓散。茯苓味甘平。猪苓味甘平。甘雖甘也。終歸甘淡。(內經曰)。淡味滲泄爲陽。利大便曰攻下。利小便曰滲泄。水飲內畜。須當滲泄之。必以甘淡爲主。是以茯苓爲(君)。猪苓爲(臣)。白朮味甘溫。脾惡溼。水飲內畜。則脾氣不治。益脾勝溼。必以甘爲助。故以白朮爲(佐)。澤瀉味鹹寒。(內經曰)。鹹味下泄爲陰。泄飲導溺。必以鹹爲助。故以澤瀉爲(使)。桂味辛熱。腎惡燥。水畜不行。則腎氣燥。(內經曰)。腎惡燥。急食辛以潤之。散溼潤燥。可以桂枝爲(使)。多飲煖水。令汗出愈者。以辛散水氣外泄。是以汗潤而解也。

茯苓(君)十八銖　猪苓(臣)十八銖去皮　白朮(佐)十八銖　澤瀉(使)一兩六銖　桂枝(使)半兩去皮

右五味。搗爲散。以白飲和服方寸七。日三服。多飲煖水。汗出愈。如法將息。

理中圓方

心肺在膈上爲陽。腎肝在膈下爲陰。此上下藏也。脾胃應土。處在中州。在五藏曰孤藏。屬三焦曰中焦。肓三焦獨治在中。一有不調。此圓專治。故名曰理中圓。人參味甘温(内經曰)脾欲緩。急食甘以緩之。緩中益脾。必以甘爲主。是以人參爲(君)。白朮味甘温(内經曰)脾惡濕。甘勝濕。温中勝濕。必以甘爲助。是以白朮爲(臣)。甘草味甘平(内經曰)五味所入。甘先入脾。脾不足者。以甘補之。補中助脾。必先甘劑。是以甘草爲(佐)。乾薑味辛熱。辛温而惡寒者。胃也。胃寒則中焦不治(内經曰)寒淫所勝。平以辛熱。散寒温胃。必先辛劑。是以乾薑爲(使)。脾胃居中。病則邪氣上下左右。無處不至。故又有諸加減焉。若勝下藥者。腎氣動也。去白朮加桂。氣壅而不泄。則築然動。白朮味甘。補氣。去白朮助氣。易散。桂辛熱。腎氣動者。欲作奔豚也。必服辛味以散之。故加桂以散腎氣。經曰以辛入腎。能泄奔豚氣故也。吐多者。去白朮。加生薑。氣上逆者。則吐多。朮甘壅。非氣逆者之所宜也。(千金方曰)嘔家多服生薑。此是嘔家聖藥。生薑辛散。是於吐多者加之。下多者。還用朮。氣泄而不收。則下多。朮甘壅補。使正氣收而不泄也。或曰。澤瀉則溏泄。朮專除濕。是於下多者加之。悸者加茯苓。飲聚則悸。茯苓味甘。滲泄伏水。是所宜也。渴欲得水者。加朮。津液不足。則渴。朮甘以補泄液。腹中痛者。加人參。虛則痛(本草曰)補可去弱。即人參羊肉之屬是也。寒多者。加乾薑。辛能散也。腹滿者去白朮。加附子(内經曰)甘者令人中滿。朮甘壅補。於腹滿家則去之。附子味辛。熱氣壅鬱。腹爲之滿。以熱勝寒。以辛散滿。故加附子(内經曰)熱者寒之。寒者熱之。此之謂也。

人參(君)　白朮(臣)　甘草(佐)炙　乾薑(使)各三兩

右四味。搗篩蜜圓如鷄子黃許大。以沸湯數合。和一圓。研碎温服之。日三四。夜二服。

四逆湯方

四逆者。四肢逆而不温也。四肢者。諸陽之本。陽氣不足。陰寒加之。陽氣不相順接。是致手足不温。而成四逆。此湯甲發陽氣。却散陰寒。温經暖肌。是以四逆名之。甘草味甘平(内經曰)寒淫於内。治以甘熱。却陰扶陽。必以甘爲主。是以甘草爲(君)。乾薑味辛熱(内經曰)寒淫所勝。平以辛熱。逐寒正氣。必先辛熱。是以乾薑爲(臣)。附子味辛大熱(内經曰)辛以潤之。開發腠理。致津液通氣也。暖肌温經。必憑大熱。是以附子爲(使)。此奇制之大劑也。四逆屬少陰。少陰者腎也。腎肝位遠。非大劑則不能達(内經曰)遠而奇耦。制大其服。此之謂也。

甘草(君)二兩　乾薑(臣)一兩半　附子(使)一枚生用去皮八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分温再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

眞武湯方

眞武。北方水神也。而屬腎。用以治水焉。水氣在心下。外帶表而屬陽。必應發散。故治以眞武湯。青龍湯主太陽病。眞武湯主少陰病。少陰腎水也。此湯可以和之。眞武之名得矣。茯苓味甘平。白朮味甘温。脾惡濕。腹有水氣。則脾不治。脾欲緩。急食甘以緩之。滲水緩脾。必以甘爲主。故以茯苓爲(君)。白朮爲(臣)。芍藥味酸微寒。生薑味辛温(内經曰)濕淫所勝。佐以酸辛。除濕正氣。是用芍藥生姜酸辛爲(佐)也。附子味

辛熱(内經曰)寒淫所勝。平以辛熱。温經散濕。是以附子爲(使)也。水氣内潰。至於散。則所行不一。故有加減之方焉。若欬者。加五味子細辛乾薑。欬者。水寒射肺也。肺惡寒。以辛潤之。細辛乾薑辛而潤也。若小便利者。去茯苓。茯苓專滲泄者也。若下利者。去芍藥。加乾薑。酸之性泄。去芍藥。以酸泄也。辛之性散。加乾薑。以散寒也。嘔者。去附子。加生薑。氣上逆則嘔。附子補氣。生薑散氣。兩不相損。氣則順矣。增損之功。非大智。孰能貫之。

茯苓(君)三兩　白朮(臣)二兩　芍藥(佐)三兩　生薑(佐)三兩切　附子(使)一枚炮去皮臍作八片

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服七合。日三服。

建中湯方

(内經曰)肝生於左。肺藏於右。心位在上。腎處在下。左右上下。四藏居焉。脾者。土也。應中央。處四藏之中。爲中州。治中焦。生育榮衛。通行津液。一有不調。則榮衛失所。育津液失所行。必以此湯温建中藏。是以建中名焉。膠飴味甘温。甘草味甘平。脾欲緩。急食甘以緩之。建脾者。必以甘爲主。故以膠飴爲(君)。甘草爲(臣)。桂辛熱。辛散也。潤也。榮衛不足。潤而散之。芍藥味酸微寒。酸收也。泄也。津液不逮。收而行之。是以桂芍藥爲佐。生薑味辛温。大散。味甘温。胃者衛之源。脾者榮之本(黃帝鍼經曰)榮出中焦。衛出上焦。故夾中焦。衛爲陽。不足者益之。必以辛。榮爲陰。不足者補之。必以甘。辛甘相合。脾胃健而榮衛通。是以薑棗爲(使)。或謂桂枝湯解表。而芍藥數少。建中湯温裏。而芍藥數多。殊不知二者遠近之制。皮膚之邪爲近。則制小其服也。桂枝湯芍藥佐桂。枝同用散。非與建中同體爾。必服之邪爲遠。則制大其服也。建中湯芍藥佐膠飴以建脾。非與桂枝同用爾。(内經曰)近而奇耦。制小其服。遠而奇耦。制大其服。此之謂也。

膠飴(君)一升　甘草(臣)一兩炙　桂枝(佐)三兩去皮　芍藥(佐)六兩　大棗(佐)十二枚擘　生薑(佐)三兩切

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。内膠飴。更上微火消解。温服一升。日三服。〇嘔家不用建中湯。以甜故也。

脾約圓方

約者。結約之約。又約束之約也。(内經曰)飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。是脾主爲胃行其津液者也。今胃強脾弱。約束津液。不得四布。但輸膀胱。致小便數而大便鞕。故曰其脾爲約。麻仁味甘平。杏仁味甘温(内經曰)脾欲緩。急食甘以緩之。麻仁杏仁潤物也。本草曰。潤可去枯。脾胃乾燥。必以甘潤之物爲之主。是以麻仁爲(君)。杏仁爲(臣)。枳實味苦。厚朴味苦温。潤燥者。必以甘臣以潤之。破結者。必以苦。苦以泄之。枳實厚朴爲(佐)。以散脾之結約。芍藥味酸微寒。大黃味苦寒。酸苦湧泄爲陰。芍藥大黃爲(使)。以下脾之結燥。腸潤結化。津液還入胃中。則大便柯。小便少而愈矣。

麻子仁(君)二兩　杏仁(臣)一升去皮尖熬別作脂　枳實(佐)半斤炙　厚朴(佐)一尺炙去皮　芍藥(佐)半斤大黃(使)一斤去皮

右六味。蜜和圓梧桐子大。飲服十圓。日三服。漸加以知爲度。

抵當湯方

人之所有者氣與血也氣爲陽氣流而不行者則易散以陽病易治故也血爲陰血畜而不行者則難散以陰病難治故也血畜於下非大毒駛劑則不能抵當其甚邪故治畜血曰抵當湯水蛭味鹹苦微寒〔內經曰〕鹹勝血血畜於下勝血者必以鹹爲主故以水蛭爲(君)虻蟲味苦微寒苦走血血結不行破血者必以苦爲助是以虻蟲爲(臣)桃仁味苦甘平肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之散血疼急是以桃仁爲(佐)大黃味苦寒瀉氣在下以苦泄之血亦渾類也蓄血逐熱是以大黃爲(使)四物相合而方劑成病與藥對藥與病宜雖苛毒重疾必獲全濟之功矣

水蛭(君)三十枚熬　虻蟲(臣)三十箇去翅足熬　桃仁(佐)三十箇去皮尖　大黃(使)三兩去皮酒浸

右四味剉如麻豆大以水五升煮取三升去滓溫服一升未利再服



傷寒標本心法類萃卷上

金　河間劉守眞編集

傷風

傷風之證。頭疼項強。肢節煩疼。或目痛肌熱。乾嘔鼻塞。手足溫。自汗出。惡風。其脈陽浮而緩。陰浮而弱。此爲邪在表。已上傷風之證。皆宜桂枝湯。第二次以解肌。傷寒汗出怕風。而加項強痛者。桂枝葛根湯。第三傷風及無汗者。雖已服桂枝湯。反煩不解。而無裏證者。先刺風池風府。卻與桂枝葛根湯服之。不若通用雙解散。五十一免致有桂枝麻黃之誤。傷風自汗白虎湯。二十二金匱方太陽病無汗而渴者。不可與白虎湯。

傷寒

傷寒之證。頭項病疼。腰脊強。身體疼急。惡寒不須發。無自汗。或致頭面目疼。肌熱鼻乾。或胸滿而嘔。手足指末微厥。脈浮數而緊者。邪在表。以上傷寒之證。皆宜麻黃湯。第一以發其汗。傷寒同風頭目痛。四肢拘倦。比金散。四十六不若通用天水散。四十九或雙解散之類。五十一甚佳。無使藥不中病而益加害也。○白虎合涼膈散。二十三乃調理傷寒之上藥。傷風甚妙。

中暑

中暑之證。身熱頭痛。背寒面垢。自汗煩燥。大渴口乾。倦怠而身不痛。或時惡寒。表裏通宜白虎。夏月感冒發熱。煩渴。五苓散。二十四桂枝甘露飲。三十四黃連香薷飲。五十二或雙解散。或裏熱甚。腹滿而脈沉可下者。大承氣湯下之。或三一承氣湯尤妙。半表半裏者。小柴胡涼膈天水散。

中濕

中濕之證。一身盡疼重者。發黃。陽節煩疼。發熱鼻塞。時或頭痛。腹大便利。脈沉而緩。以上中濕之證。先用雙解散。微微汗之。次用五苓散。或淡滲散。桂苓甘露飲。甘用甘露飲不愈。卻用黃連解毒則愈。問曰。若劑止土之甘。此屬土故以火劑燥土。其病則愈。

風寒俱中

風寒俱中之證。頭痛項強。肢體疼。手足溫。爲中風。反無汗惡寒。脈浮緊。爲傷寒也。或頭項疼。腰脊強。身體拘急。指末微厥。不自汗爲傷寒。反煩燥。而脈緩者。爲傷風也。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱傷。則表裏熱甚者。通宜以大青湯。或雙解散最妙。

內外傷寒

風寒暑濕。飢飽勞逸。憂愁思慮。悲恐怒。四時中外諸邪所傷。但覺身熱頭疼。拘倦強痛。無問自汗無汗。始得脈便沉而裏病表和者。內傷也。脈浮而表病裏和者。外傷也。病在身體四肢爲表。病在胸腹之內爲裏。病內傷通解散。外傷雙解散。內外一切所傷。通神散。然不若雙解散。以子和爲之三法至神。

一切汗候

裏證

凡裏證脈實而不浮。不惡寒。及惡風。身不疼。自汗體語。不大便。或咽乾腹滿者。可下之。不可汗也。以上之證。宜小承氣湯。大承氣湯。調胃承氣湯。選而用之。一法不問風寒暑濕。或表裏兩證俱不見。但無表證而有可下者。通用三乙承氣湯下之。此藥發峻效。使無表熱入裏而無結胸及痞之衆疾也。或熱結極深。而止熱不退者。或因大下後。漫熱利不止。而熱不退。脈弱氣虛。不可更下者。或諸濕熱內餘。小便赤澁。大便溏泄。頻併少腹而急痛者。必欲作痢也。通宜黃連解毒湯以解之。傷寒下之大過。胃中無熱。飲水無力。白虎散又有大下之後。其熱不退。再三下之。熱愈甚。若下之不止。其人脈微氣虛氣弱。不加以法。無可生之理。至此下之亦死。不下亦死。但用涼膈合解毒湯調之。陽熱退。陰脈漸生。爲之妙法。下之前後。無問日數。餘熱不解。小柴胡湯。汗下後。胃虛。大橘皮湯。汗下後。胸膈滿悶。赤茯苓湯。

在上涌之

胃病在膈者。當用瓜蒂散吐之。或裏證罷。邪熱入裏。結於胸中。煩滿而飢不能食。四肢微厥。而脈乍急者。宜瓜蒂散吐之。傷寒頭疼久不愈。令人瘈瘲。胸膈亦有宿痰故也。當先涌之。次以白虎湯加減。

在下泄之

胃病煮熱下焦。則承氣抵當之類泄之可也。

合病

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口燥面垢。譫語。遺尿。如慢發汗。則譫語益甚。下之則便厥。額上汗出。後必發黃。白虎湯。

兩感

兩感。謂一日太陽少陰兩證俱見。二日陽明與太陰俱病。三日少陽與厥陰俱病。前六經之證是也。小柴胡湯。涼膈散。五苓散。天水散。通聖散。雙解散。大柴胡湯。可選用之。熱勢甚。欲可下者。三乙承氣湯。或解毒湯。合承氣湯。

痙病

痙之爲病。發熱腹滿。口噤頭搖。舌瘖不語。項強背疼。腰身反強。或目痛。或目赤。或閉。或反目。或足溫。或妄行。其脈沉弦而遲。或帶緊者。無汗曰剛痙。有汗曰柔痙。通宜三乙承氣湯。合解毒下之。

頭疼

頭疼之證。無問風寒暑濕。雜病自汗頭疼。俱宜白虎湯。或加川芎荊芥尤妙。頭疼久不愈。必致喪明。宜先涌痰。次用白虎加減。風眩痰逆。喘嗽頭痛。半夏茯苓湯。頭痛肢體痛。黃連解毒湯。頭疼口乾。桂枝甘露飲。風痰喘嗽頭疼。白虎半夏橘皮湯。風熱頭疼。心煩昏憒。人參石膏湯。傷寒北熱頭疼。不臥散。

身疼

身疼之證。無問風寒。通解散。表熱甚頭項肢體疼痛。黃連解毒湯。傷寒瘟疫。通身疼痛。少力頭旋。腰腳麻重。嘔噦壯熱減食。三乙承氣減硝加貫衆紫河車。入金銀煎名銀煎散。中濕一身盡痛。五苓散。

腹脹滿痛

腹脹滿。脈沉者。以三乙承氣湯合解毒下之。諸腹滿實痛。煩渴譫妄。脈實數而沉者。無問日數。三乙承氣

下後不解

凡是裏證。法當下之。依法下之。其病又不解。或大下後。或再三下後。熱勢尚甚而不退。本氣盡損而不能

湯。少陽證腹中痛者。小柴胡去黃芩加芍藥湯。少陽證脇下痞鞕者。小柴胡去薑子加牡蠣。太陰證腹滿時痛。桂枝加芍藥痛甚加桂枝大黃。

往來寒熱

往來寒熱屬少陽。一日二三作。來往無期。用小柴胡湯主之。

潮熱

潮熱屬陽明。一日一發。日晡而作也。陽明裏熱極甚。或吐下後。不解大便五六日至十餘日。日晡潮熱。心胸煩熱而便鞕如痞狀。脈沉實者。三乙承氣湯。陽明少陽合病。下利日晡發熱如瘧者。大柴胡湯。通宜三承氣合解毒。

自汗

自汗者。不發表解。肌自出汗也。傷風自汗。桂枝湯。傷寒自汗。脈沉數而實。表裏俱熱者。三陽合病自汗者。厥逆自汗者。頭疼自汗者。傷寒自汗未解。半入於裏者。中暑自汗脈虛者。俱宜白虎湯。陰寒發汗不止。白虎湯加麻黃根浮麥。傷寒汗下後自汗脈虛熱不已。白虎加人參。若亡服之。汗止身涼。通仙之法也。

中暑自汗。白虎湯。後以澄澈湯調之。自汗多。宜武人參石膏湯。

自利并慎下

自利者。不經下藥攻裏而自利也。脈浮表不解自利。或小便不利者。五苓散。一切瀉痢腹作。桂苓甘露飲。溏溏內結而作痢者。黃連解毒湯。則自利清水。色純青心下痞痛。口燥者。皆濕熱相搏於腸胃之內而成下利者。三一承氣湯。當汗而反下。及不成結胸而但下利。清穀不化。表證在。表熱裏寒也。急以四逆湯溫裏。利止裏和。急以桂枝解表。或用巴豆熱藥下之。而協熱利不止。皆宜五苓散。止利兼解表。

小便不利

小便不利者。小便難而赤澀也。中暑并傷寒大發汗後。胃中乾。煩燥不得眠。脈浮。小便不利。微熱煩渴者。口乾煩渴。小便不利者。小便赤澀。通宜五苓散。桂苓甘露飲主之。

嘔吐

凡嘔吐者。火性上炎也。無問表裏。通宜涼膈散。傷寒雜病。一切嘔吐。調胃承氣湯。煩悶。乾嘔。黃連解毒湯。嘔吐煩渴者。桂苓甘露飲。五苓散。眩暈嘔吐者。白虎加半夏橘皮。傷寒嘔吐。四肢厥逆清冷。飢胃散。溫溫內蓄惡心嘔吐者。白虎合解毒湯。

吐瀉

吐瀉者。上吐下瀉亦名霍亂也。一切吐瀉霍亂。通宜五苓散。益元散。白虎散。吐瀉霍亂煩渴。并中外諸邪所傷而吐瀉腹滿痛悶者。並皆桂苓甘露飲。淡滲湯。

噦噦

大熱喘嗽而滿者。黃連解毒湯。或熱甚咳嗽悶亂。三乙承氣湯。少陽咳嗽頭疼者。秩苓半夏湯。咳嗽者。白虎湯加半夏桔梗。咳嗽不已。人參石膏湯。或宜武人參石膏湯。或宜五苓散。少陰病二三日口燥咽乾。三一承氣湯。或裏熱燥甚。傷寒怫鬱。留飲不散。煩渴不止。腹高起。痛不可忍。但嘔冷涎。大渴不能飲。飲亦不能止其渴。喘急悶亂。但欲死者。三乙承氣湯。熱不消。立止其渴。有若猶痛之人。須臾大汗而愈。至此往往多有不利而汗出。亦有藥力但隨汗之宜通。不利而愈。或汗吐下後。煩渴口乾。脈浮大。白虎湯加人參。煩燥多渴。涼膈散加滑石。

煩燥

傷寒煩燥多渴。涼膈散。加滑石。中暑傷寒汗後煩燥。五苓散。一切火熱。狂躁喘滿。黃連解毒湯。煩躁而渴。白虎散。或加滑石甚者加鼠汁。

懊憹　虛煩　不得眠

懊憹煩心。反復顛倒不得眠者。煩熱悸鬱於內而氣不能宣通也。或胸滿結痛。或煩。微汗出。虛煩者。梔子湯主之。或氣少者加甘草一錢。或嘔者及初慎以圓藥下者。加生薑半兩。凡懊憹虛煩者。皆用涼膈散甚佳。及宜湯澡手足。使心胸結熱宜散而已。心煩腹滿坐臥不安。梔子厚朴湯主之。或陽明病下之後。燥熱而懊憹者。三乙承氣湯。汗後煩燥不得眠。五苓散。或涼膈散。口燥呻吟。錯語不得眠。五苓散。黃連解毒湯。煩心者。涼膈散。少陽證胸中煩而不嘔者。小柴胡去半夏人參加瓜蔞實主之。

留飲

一切留飲不散。五苓散。桂苓甘露飲。黃連解毒湯。涼膈散。白虎湯。小陷胸湯。三乙承氣湯。選用傷寒表未罷。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。或嘔或利。或噎或小便不利。小腹滿或陽者。小柴胡湯。

痞

傷寒表裏俱熱。下證未全。法當和解。慎下之。甚則成痞。心下痞滿而不痛者。表未解也。當先桂枝解表已。而後用大黃黃連瀉心湯。攻痞也。或只用五苓散。使除表裏甚良。或痞惡寒而汗出者。或痞而煩。小便不利者。或痞留飲溫熱下利者。或已成痞。因藥尚不止。以其痞滿慎更下之。其痞轉甚。嘔噦下利。心煩躁者。無問痞脈浮沉。並宜生薑瀉心湯。調下五苓散頻服之。或痞不已。則後亦濕熱煩滿。或譫妄脈沉無他證者。宜大黃黃連瀉心湯。或小陷胸湯亦可。下早成痞。枳朮散。

結胸

結胸之證。有三。不按而痛者。名大結。按之而痛者。名小結。胸心下正仲頭汗出者。名水結胸也。汗下之後。不大便五六日。舌乾而渴。日晡少有潮熱。從心下至小腹鞕滿而痛不可近。而脈沉緊滑數。或但隔脈沉

緊者宜大陷胸湯或陷胸丸下之或脈浮者表未能也不可下下之則死宜小陷胸湯及小柴胡湯之類和解之表能者方可下之或結胸雖脈浮而裏熱勢盛須可下者宜三乙承氣湯分作三次約三時許服訖得利甚良雖未稍減脈必沉病微者止用三乙承氣半服接法而下之裏熱甚者以大陷胸湯大半服而下之或但結胸別無大段熱證但頭微汗出脈沉潛者水結胸也通宜大陷胸小結胸心下按之而痛甚用三乙承氣合解毒下之蓄悸頭狂三乙承氣湯發狂極甚投河入非者三下不已不可下攻便當涌之以瓜蒂散吐出痰涎宿物一升而愈後以甘露飲之類調之

發戰

凡熱病大汗將出而反寒戰者表之正氣與邪氣併甚於裏火熱亢極而反兼水化潤之反為寒戰脈微欲絕者三乙承氣湯或十棗湯下之凡欲作汗無問病之微甚或已經新下者或下證未全者但以涼膈散調之甚者黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沉實而有裏證者三乙承氣湯下之勢急者加黃連解毒湯或戰不快者或戰後汗出不快者或戰數次經大戰而汗不當者乃并之不甚而法之不違通宜三乙承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也

發厥

或表熱極甚而恐承氣不能退者或已下後而熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以致通身清冷痛甚不堪項背拘急目睛瞎昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利煩滿實痛頰窄悶亂喘急鄭聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利反致脈沉細而欲絕宿未明其造化之理而反謂其傷寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證候者或兩感熱勢甚者通宜解毒加大承氣湯下之熱不退者宜再下之然雖古人云三下之而熱未退即死矣亦有按法以下三五次利一二十行熱方退而得活者免致不下退其熱而必死也下後熱少退而未愈者極以致身冷脈微而昏冒將死者若急下之殘陰暴絕而死蓋陽氣後竭而厥逆解毒湯或二藥合服或白虎合涼膈散養陰退陽積熱漸以宣散則心胸溫煖脈漸以生至於脈復有力方可以三乙承氣湯下之或解毒加六一散調之愈後宜服退熱之藥白虎湯熱極厥深而諸藥下鮮竟不能利者不救必死黃連解毒湯更加甘遂末一錢匕下之

循衣摸床

陽明病脈遲汗出不惡寒身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安直視微喘三乙承氣湯

勞復食復

汗下後勞復柴胡飲子飲酒復劇黃連解毒湯或雙解加黃連在裏者三乙承氣解散半表半裏大柴胡湯小柴胡湯涼膈散解毒湯隨證用之食復三乙承氣湯

雖諸承氣湯不過者仲景曰寸脈浮滑者可用瓜蒂散吐之

發狂

傷寒發狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足三乙承氣湯加當歸黃連解毒湯調之譫妄發狂微緩以三聖散吐之後用涼膈散洗心散黃連解毒湯調之譫妄發狂糞垢上屋赴井投河皆為陽熱極甚用三乙承氣合解毒下之蓄悸頭狂三乙承氣湯發狂極甚投河入非者三下不已不可下攻便當涌之以瓜蒂散吐出痰涎宿物一升而愈後以甘露飲之類調之

發戰

凡熱病大汗將出而反寒戰者表之正氣與邪氣併甚於裏火熱亢極而反兼水化潤之反為寒戰脈微欲絕者三乙承氣湯或十棗湯下之凡欲作汗無問病之微甚或已經新下者或下證未全者但以涼膈散調之甚者黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沉實而有裏證者三乙承氣湯下之勢急者加黃連解毒湯或戰不快者或戰後汗出不快者或戰數次經大戰而汗不當者乃并之不甚而法之不違通宜三乙承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也

發厥

或表熱極甚而恐承氣不能退者或已下後而熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以致通身清冷痛甚不堪項背拘急目睛瞎昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利煩滿實痛頰窄悶亂喘急鄭聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利反致脈沉細而欲絕宿未明其造化之理而反謂其傷寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證候者或兩感熱勢甚者通宜解毒加大承氣湯下之熱不退者宜再下之然雖古人云三下之而熱未退即死矣亦有按法以下三五次利一二十行熱方退而得活者免致不下退其熱而必死也下後熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或尖下熱極以致身冷脈微而昏冒將死者若急下之殘陰暴絕而死蓋陽氣後竭而厥逆解毒湯或二藥合服或白虎合涼膈散養陰退陽積熱漸以宣散則心胸溫煖脈漸以生至於脈復有力方可以三乙承氣湯下之或解毒加六一散調之愈後宜服退熱之藥白虎湯熱極厥深而諸藥下鮮竟不能利者不救必死黃連解毒湯更加甘遂末一錢匕下之

循衣摸床

陽明病脈遲汗出不惡寒身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安直視微喘三乙承氣湯

勞復食復

汗下後勞復柴胡飲子飲酒復劇黃連解毒湯或雙解加黃連在裏者三乙承氣解散半表半裏大柴胡湯小柴胡湯涼膈散解毒湯隨證用之食復三乙承氣湯

672

傷寒標本心法類萃卷下

麻黃湯　一

麻黃六錢桂枝四錢甘草二錢杏仁七枚及弄.

右作二貼.水二鍾.煎八分.取汁.麻黃性熱.惟病人素虛寒者.乃用正方.夏至之後.服之必發斑黃.須加知母半兩.石膏一兩.黃芩一分.桂枝加減月令同.

桂枝湯　二

桂枝　芍藥各二錢半甘草一錢半

右作一貼.薑三片.棗一枚.煎服取微汗.倍加芍藥.名桂枝芍藥湯.加大黃名桂枝大黃湯.金匱方曰.太陽病自汗而小便數者.不可與桂枝湯.

桂枝葛根湯　三

桂枝　芍藥　甘草各二錢半生薑

右作二服.水煎取微汗.

葛根湯　四

葛根一兩四錢麻黃三錢生姜三錢桂枝大棗二枚炙甘草二錢大棗二枚

右作二貼.水煎服.衣覆取汗爲度.

升麻葛根湯　五

升麻　乾葛　芍藥　甘草各三錢

右作二服.水煎.若大段寒卽熱服.若熱卽溫服.身涼爲度.

大青龍湯　六

麻黃　石膏各四錢半桂枝一錢半甘草兩上杏仁三枚

右作二貼.薑三片.棗一枚.水煎取微汗.不可太過.恐亡陽.以溫粉撲之.

小青龍湯　七

半夏六分北五味一錢二分麻黃　芍藥　細辛　甘草　乾薑　桂枝各一錢八分

右作二貼.生薑四片.水煎.諸方皆不用生薑.

大柴胡湯　八

柴胡三錢黃芩一錢半將軍七錢芍藥錢半半夏一錢枳實二錢

右作一貼.生薑五片.棗一枚.煎.大柴胡合三乙承氣湯.合黃連解毒湯.合大承氣湯.

小柴胡湯　九

柴胡八錢黃芩　甘草　人參各三錢半夏二錢半

右五錢.生薑五片.棗一枚.煎.溫服.

一法.本方合涼膈天水.　一法.本方合涼膈散.　一法.本方合解毒湯.　一法.本方去人參大棗生姜.加五味子乾姜.　一法.本方去半夏人參.加括蔞實.

大承氣湯　十

大黃　芒硝各二錢厚朴四錢枳實三枚

右作一貼.水二鍾.先煎厚朴枳實.次下大黃.煎取八分.去滓.入硝.煎二三沸.放溫服.一法.本方加甘遂末一錢匕.

調胃承氣湯　十一

大黃三　芒硝二　甘草一錢半

右作一貼.水二鍾.煎溫服.

小承氣湯　十二

大黃三　厚朴一錢半枳實一錢

右作一貼.水二鍾.煎溫服.

三乙承氣湯　十三

大黃二　芒硝一錢半厚朴錢半枳實一錢甘草二錢

右作一貼水煎溫服。
一法本方減硝加黃柴河車入金銀煎名銀煎散。
一法本方加當歸蓼根名當歸承氣湯。

桃仁承氣湯　十四

桃仁去皮尖芒硝錢半　大黃二錢　桂　甘草各一錢半

右作一貼水煎空心服。

犀角地黃湯　十五

犀角　白芍藥　牡丹皮各五分　生地黃四錢

右作一貼水煎有熱加黃芩一錢發狂血證加大黃本方稱大黃血證內有。

大陷胸湯　十六

大黃二錢芒硝三錢半甘遂一分純小便黃

右作一貼水煎溫服未快再服惡勢不利以意斟之。

大陷胸湯　十七

大黃半兩芒硝二錢半葶藶三錢炒另研杏仁十二枚炒

右大黃末下葶藶杵羅研杏仁芒硝如泥圓如彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一鍾煎至半鍾溫服當一宿未利再服。

小陷胸湯　十八

半夏　黃連　括蔞實一枚四分用之二

右作一貼水煎溫服未利再服微利黃涎即愈。
一法本方合小柴胡湯。

抵當湯　十九

水蛭炒　蠐蟲各七個去足翅炒　杏仁七枚　大黃二錢半

右作二貼水煎再服。

抵當圓　二十

水蛭炒　蠐蟲各七個去足翅炒杏仁七枚大黃二錢半

右細末煉蜜作二圓用水二鍾煎一圓至六分溫服晬時血未下再服。

黃連解毒湯　二十一

黃連　黃芩　黃柏　梔子

每服五錢水煎溫服。
一法本方合大承氣湯。
一法本方加枳殼。

本方合三乙承氣湯。

一法本方加甘遂末一錢匕本方合調胃承氣湯。
一法本方合涼膈天水散。

白虎湯金匱方云太陽病無汗而渴者不可服　二十二

知母一兩半甘草一兩粳米一合石膏四兩

右五餐水煎溫服。

一法本方加蒼朮。
一法本方加人參蒼朮。
一法本方加半夏桔梗。
一法本方加人參白朮。
一法本方加麻黃根浮麥。

涼膈散　二十三

連翹一兩黃芩半兩梔子半兩甘草半兩朴硝一分薄荷

右五錢水煎入蜜少許。

一法本方合解毒湯
一法本方加滑石。
一法本方合天水散。
一法本方加桔梗枳殼。
一法本方加滑石調五苓散。

五苓散金匱方云，腸胃病汗多而渴者不可服　二十四

猪苓　茯苓　白朮各五銖桂心一分澤瀉一兩

右咸調成煎。

一法本方加生姜汁調服。

瀉心湯即五苓合瀉心元是也二十五

瓜蒂散稍剉炒　赤小豆等分又用茶少許二十六

右爲末豆豉半合水一鍾半煮汁半鍾調下一錢匕不吐加服。
頭痛加瓜蒂。胸痛蜘蛛。

三聖散見吐門二十七

食前先食豬汁半鍾後調藥服一半用鵝翎探引吐出如吐少更
半鍾立止。

梔子湯　二十八

大梔子七枚豆豉半合

右以水煎梔子至一盞半入豆豉煮至半盞溫服。

梔子蘗皮湯　二十九

大梔子十五枚黃蘗半兩甘草二錢半

右㕮咀水二鍾煎。

梔子厚朴湯　三十

大梔子七枚厚朴中兩枳實二錢

右咬咀水煎。

十棗湯　三十一

芫花　大戟　甘遂等分

右爲末。水一饒。浸十枚。劈開。煮汁半饒。調藥末半錢七。壯實者一錢七。

茵蔯湯　三十二

茵蔯一兩大戟中兩梔子十枚

右五錢。水煎。本方合陷胸湯。本方合大承氣湯。本方五分。陷胸湯三分。大承氣二分。

本方合解毒湯。

大黃黃連瀉心湯　三十三

大黃　黃連　黃芩等分

右五錢。水煎。

一法。加生姜甚良。

桂苓甘露飲即五苓散加寒水石石膏三十四

右爲末。或溫湯。或新水生姜湯調。或煎。

一方不用猪苓。　一方加甘草。

一方有人參藿香木香葛根滑石甘草。共一十三味。一名桂苓白虎散。

人參石膏湯　三十五

人參二錢中白虎中兩知母中兩黃芩二錢川芎中兩茯苓中兩半夏　山梔三錢甘草一錢石膏三兩

右咬咀。姜煎。

薛宣武人參石膏湯　三十六

人參二錢石膏一兩川芎二兩黃芩二錢茯苓　防風各三錢甘草五錢

右五錢。水煎。

半夏橘皮湯　三十七

半夏　陳皮　甘草　人參　茯苓　厚朴各二錢中葛根中兩

右五錢。姜五片。

茯苓半夏湯　三十八

茯苓　半夏　生姜各一錢。取汁。與同煎。用水一大盞。煎至四分。被汁。卻下生姜汁服。

右水煎。　一方加黃芩甘草陳皮各一錢。

大橘皮湯　三十九

陳皮　甘草各一兩人參二兩

右五錢。姜三片。

赤茯苓湯　四十

陳皮　甘草各一兩人參二兩半夏　白朮　川芎

右五錢。姜五片。

橘連散　四十一

橘連　枳殼等分

右爲末三錢。黃連煎湯調下。或黃連解毒湯調下。或瀉心湯調下。

白朮散　四十二

白朮　茯苓　人參　藿香各半兩甘草　葛根

右末。白湯調下二錢。熱加滑石。或加生姜。

四逆湯　四十三

甘草一錢乾姜一分附子中者半個

水煎。溫服。

五味子湯　四十四

五味子中兩麥門冬　人參　杏仁　陳皮二錢

右五錢。姜棗煎。

不臥散　四十五

川芎一兩半石膏七錢半藁本半兩甘草　人參　細辛各二錢半

右爲末。口噙水。漱良少時。飲白湯半碗。汗出而解。一方無人參　細辛。

川芎湯　川芎　藁本　蒼朮等分

右爲末。湯調三錢。須臾。嘔汗便解。

芫胡飲子

柴胡　人參　甘草　大黃　當歸　芍藥

右剉五錢。姜五片。水煎。　崔宣武加半夏五味子桔梗。

劉庭瑞方

柴胡　甘草二兩黃芩　當歸　芍藥一兩參

大勞熱五七分以爲度。

北金散　四十六

荊芥　麻黃　白芷　細辛　何首烏　菊花　防風　石膏　川芎　薄荷　全蝎　草烏

右爲末各等分每服一錢煎服或茶酒送下

調胃散　四十七

水銀　舶上硫黃

右研至黑服一錢米飲下重者二錢

通神散　阿勇有六神通解散於此加麻黃發汗益佳和劑方中總自散於此去其半滑石加川芎白芷乾葛亦妙方也　四十八

蒼朮　石膏四兩甘草　黃芩二兩滑石六兩

益元散　卽天水散　四十九

滑石六兩甘草一兩

右爲末水調或加蜜或葱豉湯調一名天水散一名六一散

通聖散　五十

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃　薄荷　麻黃　連翹　芒硝各半兩

石膏一兩黃芩　桔梗各一兩　滑石一兩　甘草二兩荊芥　白芷

右剉五錢薑五片水煎

雙解散　五十一

益元散　通聖散各半兩

右一兩薑葱豉水煎此藥雙解加減在通聖散註中

黃連香薷飲　五十二

香薷一兩厚朴半兩白扁豆二錢半香連三錢

右剉五錢入酒少許水煎冷服

治腰腳骨骱痛不止

用威靈仙煎酒食前溫服極妙

無憂丸　治一切食積氣積茶積酒積瀉痢氣痞腹脹膨悶肚腹疼痛

黑牽牛一斤取末　檳榔二兩銼末　豬牙皂角二兩三棱二兩各用好醋浸濕炙乾　莪朮二兩各用好醋浸濕炙乾

右同前藥晒乾爲末又用大角二兩煎湯打麵糊爲丸每服二錢半白湯送下茶亦可姜湯下

太乙神鍼

羌活　獨活　黃連各四兩爲末麝香二錢乳香二錢

右用三月三日艾四月八日亦可曬乾打茸入前藥末和勻用好白紙卷包前藥如筋大治風痺或在腰在脚灸七炷二七炷三七炷甚効

治風蝕牙疼方

防風去蘆草烏去尖細辛去葉巴豆去殼浦各等分

右各味等分爲細末擦牙痛處涎出立止切勿嚥下如食飲食以鹽湯漱漱飲無礙

神効追蝕取積蝕丸　虎王道高士洗道寧傳

梹榔半斤　樟柳根半斤　管仲半斤　大黃半斤三稜四兩醋煮　雷丸四兩醋煮　莪茂二兩醋煮　使君子四兩取肉　木香二兩　芫花一兩　苦楝根皮八兩　黑牽牛二斤半取頭末十兩爲衣　皂角

右梹榔至牽牛爲末外用皂角等三味濃煎汁爲丸如梧桐子大每服三錢重。

金刀如聖散　又名黑痧方

茅山蒼朮六兩米泔浸一日一夜　白芷二兩　川烏四兩去皮臍生用　防風四兩淨　細辛三兩去苗淨　白朮二兩　草烏四兩

本方用兩頭尖無則

川芎四兩　雄黃五兩另研細末入藥

右件俱各生用晒乾爲末用度

一切金瘡及多年惡瘡用自己小便洗過帖藥立効破傷風緊急用好酒調藥半錢或一錢服之蛇傷入粘白蠟少許調藥付之蝎螫傷用吐服蓋之汗也如汗不出再服或瀉出亦驗蝎處付藥可風狗咬傷處口嚼水洗淨將藥貼傷處

湯火傷瘡者以新汲水調藥付之

雷頭風并乾濕癬麻痺每服半錢服之立効

蘆荇丸　治小兒痞疾疳癖肚大腹脹面黃肌瘦脾胃不和積食積並皆治之

蘆荇　麥蘗　胡黃連各一兩　黃連五錢　薤青　肉豆蔻　木香

子五十箇取肉三稜　莪朮各六錢　梹榔八錢　史君子六十箇　陳皮

半神麴一兩半　乾蝦蟆

右爲細末薄荷豬膽汁爲丸粟米大每服一錢空心米湯下

無憂一名黑陽丹　專治五勞七傷四肢無力腳腿沉困骨節酸疼面目無光陽痿不起下元虛冷夢失精液服至十夜面目光滑二十夜老幼少年一月後陽道復原四十夜增進飲食至一百日萬病皆除冬不寒夏不熱鬚髮不白婦人服之強陰益子宮陰陽有益最有功効

川練子二兩牛膝酒浸一兩　梹榔一兩　菟絲子一兩另研酒浸　蛇床子一兩　乾姜五錢穿山甲一大片炙　蓮肉一兩心去　乳香三錢另研　沉香五錢另研　白檀香五錢另研　鹿茸炙一兩　巴戟一兩　大茴香一兩　仙靈脾皮三錢　破故紙五錢鳳眼草三錢　胡蘆巴二錢　人參一兩　澤瀉一兩　山藥一兩　五味子一兩　熟地黃二兩　麥門冬　白從蓉

45
42 B
676

茯苓　巳上各一兩　白芍藥五錢

右二十七味，除乳香沉香白檀香菟絲子四味另研爲細末，其餘二十三味，各搗爛爲細末，同前四味煉蜜爲劑，同搗一二百千杵，丸如梧桐子大，每服三十丸，漸至十九丸，好酒送下，以乾物歷之，作合之日再加丁香一錢。

資藥方和劑傷

貫衆三斤　麻油半斤　穿山甲　白芨二味各少許，微點薑節，麻四十九粒，研細，

定子藥

白礬一兩，火煅　信一兩，火煅　信五錢　乳香二錢　沒藥二錢　辰砂五分

麵糊爲定。

生肌散

龍骨火煅　赤石脂火煅各半兩　乳香　沒藥　海鰕硝　輕粉　全蝎洗焙乾各一錢　血竭三錢

黃丹一錢

右爲末，待搶頭落盡，此藥填滿在搶口上，以資藥貼之，一日廿草湯洗二次，資藥一二日一換。

追風托裏散

甘草　貫衆　當歸　芍藥　白芷　防風　川芎　官桂　瓜蔞仁　金銀花　桔梗

每服水酒共二鍾，煎至一鍾，空心服。

象牙丸

象牙五錢　蜂房三錢　蟬蛻三錢　木香三錢　沒藥一錢　乳香三錢　全蝎一支　姜蠶三錢

先將黃蠟半斤化開，待黑色過，卻將前藥爲細末，入蠟內攪勻，傾入水內，取出冷定，爲丸如棗大，每服空心一丸，溫酒化開，連三日三服，待藥從漏瘡出，隔三日再一服，第五日再服一丸，後下定子藥。

傷寒用藥加減賦

萬物之生也，人之最靈，四時有變兮百疾兆生，欲辨陰陽之證，必明天地之情，稽寒溫表裏之疑，式明標本，施汗下補吐之法，湔濟羣生，始而毫毛次傳腠腠，惡風自汗，乃桂枝之證，喘熱惡寒，則麻黃之候，陰陽俱虛而身必痒，各半同功，用大黃代寒熱共作而脈尚虛，一二共湊，桂枝麻黃各一，於是助以薑棗，雜以柴胡加五味，瓜蔞治煩渴未除，茯苓利小便不利，內寒者棄黃，外熱者防己，生姜止嘔，半夏療噦，用枳殼分緣酒疸留胸，有黃檗兮因衄血出鼻，或得人參以除煩，或取伏苓而愈悸，頭疼如破，慈白連鬚，咳逆欲利者甘草，炒棗去核，身痛則栀豉，豈二方之獨用，亦衆藥之同推，妙哉吾今精此，四十餘年活人之書，雖任陷胸證語發狂委將軍，郁大實，功先調胃，當知青龍十棗兮，水有表裏，三黃四逆兮，利有寒溫，下宜急而潮熱發悸，或裏以入而表未除，或小便澀而大便祕，必明大小柴胡，直祛前後承氣，結胸多渴，視侍

習醫要用直格通河間高尙先生劉守眞所述也守眞深明素問造化陰陽之理比嘗語予曰傷寒謂之大病者糸生在六七日之間經曰人之傷於寒也則爲病熱古今亦通謂之傷寒熱病前三日太陽明少陽受之熱傳熱壯於表汗之則愈後三日太陰少陰厥陰受之熱傳於裏下之則痊六經傳受自淺至深皆是熱證非有陰寒之病古聖訓陰陽爲表裏惟仲景深得其旨厥後朱肱奉議作活人書尙失仲景本意將陰陽字釋作寒熱此差之毫釐失之千里而中間誤罹橫天者蓋不可不知也予語守眞曰先生之論如此何不闢此說以暴耀當世以革醫流之弊反忍而緘言何邪守眞曰世之所集各異人情喜溫而惡寒恐論若不詳反生疑誚又曰欲編書十卷尙未能就故弗克早今太原書坊劉生鋟梓以廣其傳深有益於世如得行宮實迷不知信行者徑忽過明燈巨火正路昭然若有執迷而不知信行者固不足言而聰明博雅君子能於此者原始反終研精覃思則其所得又何待予之喋喋也

金河間劉完素著
江陰朱氏校刊本

習醫要用直格

十干

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

臟腑配合

甲膽手少陽 乙肝手厥陰 東方木也

丙小腸手太陽 丁心手少陰 南方火也

庚大腸手陽明 辛肺手太陰 西方金也

壬膀胱足太陽 癸腎足少陰 北方水也

戊胃足陽明 己脾足太陰 中央土也

凡先言者爲剛爲陽爲兄爲腑爲陰爲妹爲臟主於裏也

十二支

寅卯辰 巳午未 申酉戌 亥子丑

臟腑經絡配合

寅三焦手少陽 卯大腸手陽明 辰小腸手太陽

巳包絡手厥陰 午心手少陰 未肺手太陰

申膽足少陽 酉胃足陽明 戌膀胱足太陽

亥肝足厥陰 子腎足少陰 丑脾足太陰

手足三陰三陽者十三經絡之名也

手足經絡配天地四時

寅卯辰手三陽天陽春也 巳午未手三陰天陰夏也

申酉戌足三陽地陽秋也 亥子丑足三陰地陰冬也

合手表裏（合音苔人聲偏不音者並如字）

太陽少陰合 陽明太陰合 少陽厥陰合

足與足合 手與手合 如足太陽膀胱水合足少陰腎水陽明大腸金合足太陰脾土少陽三焦火合手厥陰心包絡相火太陽寒水之氣合手少陰君火之熱也

經絡病證

經者正經脈道之旁小絡如支絡絲絡之類也皆運行氣血之脈也各宗於本經焉

手太陰肺病則肺脹滿彭彭而喘欬缺盆痛欬喘上氣喘喝煩心胸滿臑臂內前廉痛甚則交兩手而瞀肩背痛而汗出虛則氣不能報息小便數變

十二經始於肺經故其序如此 喝（乙介切嚘聲也）

欬盆者肩前臑內前廉（臑音奴從肩至肘通名曰臑猶肘肘下曰臂臑內亦曰臂從肘至腕通名曰臂廉猶畔也）陷中也 臑臂手至腕也 瞀者莫眼黑也昏也言氣亂兩手推交而昏昏也（不能報息俗所云氣少不能接續也）

手陽明大腸病則齒痛頤腫虛則目黃口乾鼽衄喉痺腹中雷鳴氣常衝胸喘不能久立肩前臑痛大指次指不能爲用

（鼽音拙面秀骨頭目下起骨也鼽衄音求滿鼽出血也不能爲用言不能伸不能如意也）

足陽明胃經病則漉漉振寒善伸數欠或惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶而坐處欲登高而歌棄衣而走賁腸腹脹鬲不避親疏氣甚則身前皆熱消穀善饑尿色黃氣虛則身前皆寒慄胃中寒則腹脹

滿實胸脘當心而痛上支兩脇喉咽不通食飲不下狂癲溫淫汗出鼽衄口喎唇胗脛腫喉痺腹水腫脹膝腫痛循胸傍過乳衝腹伏兔髀外廉足跗上皆痛中指不能動

振動搖也　善伸自然不常能也　數欠頻呵欠也　心欲動也　閉戶獨臥人兼多貪音齊勇猛也　鄉向同嚮坎也　慄戰慄也　支持也　浮亂也　煩盲牝膀胱也　股髀脾肉也　伏兔膝上足陽胃脛骨也　跗音夫足跗而動脈

足太陰脾經病則舌本強食則嘔腹脹溏泄瘕水閉飲發中滿食減善噫身體皆重得後與氣快然而衰甚則肌肉痿足不收行善瘈脚下痛四肢不舉大小便不通虛則腹脹腸鳴飧泄食不化舌本痛不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏泄水下黃疸不能臥股膝內腫厥大指不用

本音袁　強去聲不通大便音假肚中水閉言水不利也　強柔也　痓痙病也　水閉宜通也　噫衣令切轉氣也　後與氣言下痿於爲切則不能食也　厥其也不能運用也　寒瘧俗言瘧痁也　不便不利便也　煩冤心亂不安也　瘈尺制切掣縱也　筋脚相拘也　筋音孫

手少陰心經病則胸中痛脇支滿脇下痛臑臂內前廉痛甚則嗌乾心痛渴而欲飲身熱肘痛煩心謬妄虛則善悲時眩仟胸腹脇下與腰背相引而痛目黃脇痛臑後廉痛掌中熱

諠音占氣見虛妄玄去聲眩仆音付卒然言也　妄而言也　眩暈昏亂也　仆而倒也

手太陽小腸經病則嗌乾頷腫不可回顧肩似拔脇似折虛則少腹控卵引腰脇上衝心痛耳聾目黃頰頷腫肩臑肘臂卵廉痛

嗌音亦氣系也　少腹臍下兩旁也　控引也　卵陰丸也

足太陽膀胱經病則顛頻腦中戶痛衝目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如裂虛則洒洒振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶牖向北戶而處甚則狂癲疾頭頂顱頂腦戶中痛目黃淚出鼽衄口喎唇胗脛腫喉痺腹水腫脹膝腫痛循胸傍過乳衝腹伏兔髀外廉足跗上皆痛中指不能動

振動搖也　善伸自然不常能也　數欠頻呵欠也　心欲動也　閉戶獨臥人兼多貪音齊勇猛也　鄉向同嚮坎也　慄戰慄也　支持也　浮亂也　煩盲牝膀胱也　股髀脾肉也　伏兔膝上足陽胃脛骨也　跗音夫足跗而動脈

足太陰脾經病則舌本強食則嘔腹脹溏泄瘕水閉飲發中滿食減善噫身體皆重得後與氣快然而衰甚則肌肉痿足不收行善瘈脚下痛四肢不舉大小便不通虛則腹脹腸鳴飧泄食不化舌本痛不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏泄水下黃疸不能臥股膝內腫厥大指不用

本音袁　強去聲不通大便音假肚中水閉言水不利也　強柔也　痓痙病也　水閉宜通也　噫衣令切轉氣也　後與氣言下痿於爲切則不能食也　厥其也不能運用也　寒瘧俗言瘧痁也　不便不利便也　煩冤心亂不安也　瘈尺制切掣縱也　筋脚相拘也　筋音孫

手少陰心經病則胸中痛脇支滿脇下痛臑臂內前廉痛甚則嗌乾心痛渴而欲飲身熱肘痛煩心謬妄虛則善悲時眩仟胸腹脇下與腰背相引而痛目黃脇痛臑後廉痛掌中熱

諠音占氣見虛妄玄去聲眩仆音付卒然言也　妄而言也　眩暈昏亂也　仆而倒也

手太陽小腸經病則嗌乾頷腫不可回顧肩似拔脇似折虛則少腹控卵引腰脇上衝心痛耳聾頰痛虛則目瞎瞎如無所見無所聞善恐如人欲捕之胸滿嘔逆洞泄狐疝遺尿癰甚

腋下曰脇脇下骨爲肋脇肋之下曰肷音區　忽忽昏亂眩頭目眩暈也　洞疾流也　狐疝言狐者疝氣之變　遺尿癃閉小便癃閉也　狐也化隱見往來不可測如狐而病疲憊也

內外八邪

外有風寒暑溼內有饑飽勞逸非奔逸之逸乃逸豫怠惰而生病也與勞相反故經曰勞者溫之逸者行之使氣血運行也西山記曰久勞則安閒以保其極力之處久逸則導引以宣積滯之氣故作役者諛也

內外病生四類

一者因氣變動而內成積聚癥瘕痕癖瘋狂癲癎之類也

癥音貞堅塊也　瘕音假血積也　痕音艮氣聚也　多喜曰癲多怒曰狂

二者因氣變動而外成癰腫瘡瘍癤疥痘疹掉眩浮胠目赤熇脹腫痛痒之類也

不因一時所傷而病乃久以漸積藏腑變動興矣而病者是曰因氣變動也藏腑和平卒然而即成病者是曰不因氣之變動也淺而大曰癰深而惡曰疽掉動搖也　熇音赤丹留毒火燔也

三者不因氣之變動而病生於內則留飲僻食饑飽勞損宿食霍亂悲恐想慕憂結之類也

僻邪也　霍亂上吐而下瀉也

四者不因氣之變動而病生於外則癘氣鬼魅蟲蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜墮斫射刺割捶撲打撮蹉拉閉抹風寒暑溼之類也

蜚去聲歇也通言歇所傷人

九氣

怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結

炅音桂熱也　人怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上也　人喜則氣和而志達榮衛通利故氣緩緩猶和也故令人氣散也　悲則心系急肺布葉舉而上焦

不通榮衛不散熱氣在中故令人氣消也　恐則精却則上焦閉閉則氣還還則下焦張故氣下行也　寒則腠理閉而氣不行故氣收也　炅者熱也熱則腠理開而榮衛通汗大泄故氣泄也　驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂也　勞則喘且內外皆越故氣耗也越散越也　思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結也結者滯而不通也

五邪

母乘子曰虛邪乘勝也克也　如心火熱乘脾土也

子乘母曰實邪　如肺金燥乘脾土也

妻乘夫曰微邪　如腎水寒乘脾土也

夫乘妻曰賊邪　如肝木風乘脾土也

自病曰正邪　如脾土自病溼也

五臟腑同法各以類推

五邪微甚

微實正虛賊從微至甚也

此亦大略之言細而推之各有微甚

十干夫婦配合成五運

甲己合爲土運　甲剛木克己柔土爲夫婦成土運

乙庚合爲金運　乙柔木嫁庚剛金

丁壬合爲木運　丁陰火配壬陽水

丙辛合爲水運　丙陽火娶辛柔金

戊癸合爲火運　戊陽土娶癸陰水

五運太過不及

陽剛夫爲太過　陰柔妻爲不及

此其略也凡六十四年而周甲子其中有歲運同司天克之曰天刑及年前大寒交氣曰反時位異運程爲夫婦者曰程德符皆非太過不及乃年運之氣也申子辰年寅初交巳酉丑年巳初交寅午戌年申初交亥卯未年亥初交氣也

十二支應六氣三陰三陽

六氣爲本三陰三陽爲標

子午少陰君火	暑	丑未太陰濕土
寅申少陽相火	王大熱	卯酉陽明燥金
辰戌太陽寒水		巳亥厥陰風木

六氣有餘不足

孟少仲平季多也

內經以寅申巳亥四孟爲一陰一陽也子午卯酉四仲爲一陰一陽也辰戌丑未爲三陰三陽也然陽爲先故主盧無變化輕微而少陰爲後故主形體安靜重濁而多也故風火動亂至陽爲先居孟未甚爲少寒濕肅靜至陰爲後居季已甚而爲多燥熱各得乎中故居仲而平也註曰氣有多少是言六氣形有胜

衰言五運也

六氣

寒暑燥濕風火

五運應五藏主病

諸風掉眩皆屬肝木　諸痛痒瘡瘍皆屬心火

諸濕腫滿皆屬脾土　諸寒收引皆屬腎水

諸氣膹鬱病疾皆屬肺金

膹悶亂也　鬱結滯塞也

六氣爲病

諸暴强直支病與戾暴急筋縮皆屬於風　乃厥陰肝胆之氣也

諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如鼓有聲癰疽瘡瘍瘡瘤氣結核吐下霍亂身熱惡寒戰慄鬱鬱善悲笑謔妄動鰋瞀血汗出皆屬於熱　少陰君火乃鎮心小腸之氣也

注泄也下迫後痛裏急痛也結核言凝肉結鞕如果中核也溢上出泄下出鰋血也　鰋音胜鼻出血也

諸痙强直積飲痞隔中滿霍亂吐下體重腑腫肉如泥而按不復起皆屬於濕也　太陰濕土乃脾與胃之氣也

痙其并切　似風狂病也一名曰痓尺至切　積飲水聚不散也痓苦　腸胃氣液血脉否閉不能運行謂之痞也水穀傳化阻隔失常則曰隔附音附

諸熱瞀瘈筋惕悸動搐掣瘈瘲暴病目眩躁擾狂越爲驚駭腑臟疼酸氣逆上衝禁慄如喪神守噦噫寫瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目眩不明暴注瞤瘈暴病暴死皆主於火也　少陽相火乃心包絡三焦之氣也

瘈尺至切　瘖音啞　狂躁亂發狂也禁慄寒戰如喪心神之守噫音衣帝瘈音制病也　瘈音契小兒病也

諸溢枯竭乾勁皴揭皆屬於燥　陽明燥金肺與大腸之氣也　諸病上下所出水液澄徹清冷瘈瘕癥瘕堅痞腹滿急痛下利青白食已不饑吐利腳穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒　太陽寒水乃腎與膀胱之氣也

論脉

三部九候

夫三部者寸關尺也寸應天爲上部胸應人爲中部尺應地爲下部九候者各浮於天沉於地中爲人也

脉位輕重

高骨旁動脉爲關

中指正按高骨之端是也俗不明其正理但以穩於下指而差高骨於頭中指之間如此則三指各差在本位之後半部耳或以頭指正在高骨或更在高骨之後者此不通脉之正理也便使心精了然既下指失其本位則亦無以知其爲何病也

關前至魚際爲寸是名陽位

一名寸口正在東關前堂骨後赤白肥肉際宛中骨縫陷中可容一豆者是乃名魚際者也

關後爲尺是名陰位

關後至本經於太陰所入爲合在肘內大約紋動處是名尺澤長一尺故名尺也陰陽兩者之間則名關三部長三寸以應三寸凡男左女右以中指與大指相接如關度中指上仄中節兩橫紋之際爲一寸凡取穴以此爲則而脉位之尺寸亦應此也凡寸脉主自心胷上至頭也而關脉主中心胃至臍也尺脉主下臍以至足也

脉息遲速

呼爲陽以應天脉再動以應春夏吸爲陰以應地脉再動以應秋冬

氣出爲呼入爲吸再兩次也動至也

或澗以太息而又一動者以應長夏脾土故一息四至五至皆爲和平

太息言呼吸或有長者也長夏六月也 平和言爲平人不病之脉

謂一歲四時五行俱備也五至以上曰數不滿四至曰遲數過備者死不及一至者亦死

正位以至酉四之氣也潛十二分金於右寸應酉至亥五之氣也又主左尺水周而復始也及夫男左女右爲夫婦故左寸君火克左寸之金左關木克右關之土左尺水克右尺之火及夫命門者右腎也屬水乃手厥陰心包絡之藏舉世皆言心包絡之藏有名而無形由不明理也夫三焦乃水谷傳化之道路自口至胃上口爲上焦下至胃下二腸分處爲中焦下至傳化出處爲下焦通曰三焦今俗妄言無形狀而空有名者誤也且如人從頭數至足皆不謂之人則亦安可言人無形狀耶全身而言之固名人也且血脉盡皆環貫臟腑運行周身如果無命門三焦之形體則何得氣血運行之道路耶

各淨於腑而沉於臟中而和緩者胸也

脉在肌肉以上曰浮在肌肉之下曰沉或以肺蓋皮毛心養血脉脾養肌肉肝養筋膜腎養骨髓以此浮沉而分五臟之脉者言脉可爲用則有失治病之道也

脉息遲速

呼爲陽以應天脉再動以應春夏吸爲陰以應地脉再動以應秋冬

氣出爲呼入爲吸再兩次也動至也

或澗以太息而又一動者以應長夏脾土故一息四至五至皆爲和平

太息言呼吸或有長者也長夏六月也 平和言爲平人不病之脉

謂一歲四時五行俱備也五至以上曰數不滿四至曰遲數過備者死不及一至者亦死

數爲熱遲爲寒過備八至之上也是以平人之息合病人之脉也故經曰常以不病調病人由是小兒八至爲和平十至有熱六至爲病寒也自六歲以下通曰以此二歲之法人小則脉如數長短亦然

七表

浮芤滑實弦緊洪此名七表爲陽少陽之數七

浮脉者輕手乃得重按之不見脉見諸陽爲表熱諸陰爲表寒

脉動於肌肉之上也浮屬陽爲病在表一名府病或傷風自汗脉浮爲表熱遲緩之陰者表寒

芤脉者浮大而輭按之中央虛兩邊實也

芤主熱甚失血寸芤則吐血微則鮮甚則俱出關芤則胸膈下血尺芤則大便血微則小便血甚則俱下

滑脉者不澁也多與實數相兼則爲病熱或亡液血衰雖熱而反濇也或滑兼遲則爲病寒平而滑者腎之本脉

實脉大而長浮沉皆得而數弦脉者輭虛而滑端直而長也弦主於風或如琴弦或如張弓者弦之太過也

緊者不緩也或如轉索或如切繩者緊之太過也

緊脉主痛多與實數相兼則爲熱痛或短緊微細陰脉相兼者寒痛也

洪脉者極大而數舉按者滑實熱之極甚者也

八裏爲陰象易少陰之數八 微沉緩澁遲伏濡弱也

微脉者有若無極細而輭也多兼於遲主於陰寒然或熱甚汗泄吐利氣而損虛者或陽厥極深者或熱極將死脉欲絕者脉亦有微沉緩澁遲伏濡弱諸陰脉見

也不寒便言爲寒須以標本明之

先病爲本根本也後病爲標梢末又爲病之氣爲本受病之臟腑經絡爲標世俗至此更不明其陽極熱證但以執其陰脈爲寒內外急救於陽則殘陰暴絕而反致死亡者不少也且察色聽聲問證切脈爲神聖功巧別病之四法而脈最爲下則安可執巧之一法而去其神聖功之三法耶及夫八裏之脈皆有此義以微脈居先故於此總而言之也

沉脈輕手不見重切之乃得動在肌肉之下其位屬陰爲病在裏一名臟病或畜於胸及膀胱者雖爲膀病其脈亦沉則皆宜下之由十二臟腑俱在裏而經絡皆在表也大抵但以浮爲表沉爲裏然雖臟爲陰主裏腑爲陽主表其於病脈之浮沉有所不拘也故太陰脾臟之病證雖而脈浮者桂枝攻於表也夫脈沉數爲裏熱沉遲爲裏寒餘脈皆倣此

或裏熱吐利氣液損虛損或陽厥極深或熱極將死者亦皆見諸陰脈沉切宜審之不可妄以施治

緩脈者緩而不急似遲而小疾緩而遲爲寒緩大而長爲熱

當傷風自汗或自汗過多亦爲遲緩熱更甚也

濇脈者澁而不滑也或如刀刮竹或濟而止住者濇之太過主液血衰

由汗泄吐利或血溢血泄或熱盛耗液而成燥也一曰濇主心痛血少故也以心養血

遲脈者一息四至以下也遲爲病寒然熱盛自汗吐利過極則亦爲遲也

氣液損虛故脈遲而不能數

四時平脈

春弦　夏洪一曰數一曰滿　秋毛一曰濇一曰浮　冬石一曰沉

六步主位平脈

初之氣自大寒日至春分厥陰風木之陽用事而氣微故曰冬至後日甲子少陽主然冬至甲子斯無常準以大約分之一月如在冬後即大寒交初氣之分也一歲六周甲子以應六氣下皆倣此一氣正月也二月也

脈乍大乍小乍短乍長時物及風木之象也

二之氣春分至小滿少陰君火之位陽氣猶正在兩陽合明之間故又云陽明主

脈弦也

三之氣小滿日至大寒少陽相火之位陽氣萬物皆盛故亦云太陽主

脈洪大而長天氣萬物人脈與造化同

四之氣大暑日至秋分太陰濕土之位天氣尚盛而夏後陰已用事故云太陰主此三陰三陽與六氣標本之陰陽異矣

脈緩大而長或云緊大而長者傳寫之誤也溼土主緩大而長燥金主緊細而短濇以萬物乾溼明可見焉時

溼土盛周膜開通汗液時泄故脈雖大長而力緩不能緊也　至秋後氣衰寒涼乍閉故雖微細而力緊也

五之氣秋分日以至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故又云少陰主也

脈緊細而微

終之氣一曰六之氣　小雪日以至大寒太陽寒水之位陰極而終盡天氣之所收隱故曰藏敦厚也　萬物收藏在內寒氣閉塞而層厥氣脈沉短以敦

液不能散越故脈沉短而反有力敦厚而如石也

凡四時六位平脈大退則時氣有餘而爲病

如春弦太過則風爲病

不及者氣衰而爲病

四時脈微見爲平此言過微也如秋脈微而兼夏脈之類也

反見他脈者他氣有餘而來爲病也

遲爲寒而數爲熱之類也

結代促

結脈者遲緩而時一止爲陰也主陰盛發燥煩滿或陽厥極深以至身冷脈微欲絕而緩弱時一止者亦胸煩燥此止爲熱極而非寒也皆須以標本明之

促脈者陽也數而時一止也主聚積氣痞憂思所成亦或熱劇失下則令脈促下之則平也

代脈者主緩弱而無力不能動因而復動病必危而死

跌陽脈

跌陽脈者胃土之脈也跌陽脈遲而緩者胃氣如經也動在足跌陽之經故曰跌陽一曰衝陽者陽明所過之原過者衝也　如經如本經之常脈

滑爲胃實緊爲脾强浮而滑者浮爲胃虛滑則爲噦浮而鼻中燥者必衄也沉爲胃實（上本下數爲消穀故也）數爲消穀故也緊則難治蓋四時五藏皆以胃爲本緊燥盛而土溼氣衰故曰難治浮而大者氣實血虛也（氣爲陽血爲陰故也）浮而滑者胃虛下利也（去液故滑）伏而滑者伏則吐逆不納（內故也）滑則氣不下食脈不出則身冷（微厥也）滑則微煩滑則厥逆（微厥也）弱則微煩滑則厥逆（微厥也）

太谿脈

太谿者腎水之脈也動於左足內踝下後跟骨下陷中足少陰腎水之胃故曰大浮也太谿脈則腎氣如絕也

死生脈候

陽病熱證不退反見陰脈者死（脈近於絕故也）汗後熱退而見陰脈者愈　陰陽證脈平愈　傷寒咳逆上氣脈散者死（形損故也）　脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不入形體不仁（不仁者不和也）　乍靜乍動命絕也　汗出髮潤喘不休者肺先絕也　陽反獨留體如烟熏直視搖頭心先絕也

唇吻（音稳）反青四肢鞕習者肝先絕也（鞕丑入切汗出也習水流不絕此也）言汗不止也環口黧黑柔汗發黃者脾先絕也（柔虛也）

渡便遺失狂言直視者腎先絕也（渡小便便大便）　寸口脈陰陽俱緊盛（寸口即氣口此言三部寸口前爲陽關後爲陰）　大汗出不解者死脈陰陽俱虛熱不止者死汗後身涼息微見陰脈而靜者愈身熱喘麤見陽脈而燥者死（汗不勝病也）　汗不解者病不可便言死也脈如調緊者當日死（諸作汗）　脈身微熱脈浮大手足温者生欲作大汗故也（俗作好汗）　脈長出者死陰衰欲絕而陽暴獨勝則脈暴出少間陰氣先絕則陽氣後竭而死矣　逆冷脈沉細者不過一日死（死證多矣以至危極則無越此矣）

傷寒直格卷上終

金　河間劉完素著

書醫要用直格

傷寒總評

傷寒六經傳受

經言寒傷形寒傷皮毛寒傷血寒傷榮然寒主閉藏而腠理閉密陽氣怫鬱不能通暢怫然內作故身熱燥而無汗故經曰人之傷於寒也則爲病熱又曰夫熱病皆傷寒之類也內經既直言熱病者言一身爲病之熱氣也以至仲景直言傷寒者言外傷之寒邪也以分風寒暑溼之所傷主療不同故只言傷寒而不通言熱病也其寒邪爲害至大故一切內外所傷俱爲受寒之熱病者通謂之傷寒也一名大病者皆以爲害之大也又春曰温病夏曰熱病秋曰溼病冬曰傷寒傷寒者是隨四時天氣春温夏熱秋溼冬寒爲名以明四時病之微甚及主療消息稍有不等大而言之則一也非爲外傷及內病有此異耳或云冬伏寒邪於肌膚骨肉之間至於春變爲温病夏變爲熱病秋變爲溼病冬變爲正傷寒病者及名冒其寒而內生怫熱熱微而不即病者以至將來陽熱變動或又感之而成熱病非謂伏其寒氣而反變寒爲熱也經曰冬傷於寒春必病温亦其義也亦有一時冒寒而便爲熱病者或感四時不正乖戾之氣或隨氣運興衰變動或內外諸邪所傷或因他病變成或因他人傳染皆能成之但以分門隨證治之耳經言此六經傳受乃外傷於寒而爲熱病之大畧主療之要法也

大法曰傷寒一日太陽受之故頭項痛腰脊強
此足太陽膀胱之經也故與經言五日足少陰腎水爲其表裏或言爲手太陽者誤也此六經之證也或以此直云傷寒不傳手經者亦誤也豈不詳熱論云五藏六腑皆受病又刺熱篇皆言五藏熱病但以熱病多於足經而其病甚少於手經而其病微且與足經微爲兼證汗下之治但分表裏故不單言手經而但寄於足經而已若針刺則本經補瀉各分五藏手足之經矣

二日陽明受之故身熱目疼鼻乾不得眠也
三日少陽受之故胸脇痛而耳聾
四日太陰受之故腹滿而咽乾
五日少陰受之故目燥舌乾而渴
六日厥陰受之則煩滿囊縮
或言傳手厥陰包絡相火則水火既濟而愈傳足厥陰肝經則土敗木賊而當死者妄說也此經言足厥陰肝經之證也

大法曰前三日三陽病在表故宜汗之
汗洩熱退身涼而愈
後三日三陰病在裏故宜下之
下退裏熱則佛熱宣通汗出氣和而愈也亦有內熱下盡無汗氣和而愈者也或者曰前三日寒在表者誤也此皆熱證也
或未愈者再經衰之七日太陽病衰自此以下皆言病自衰減頭項少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳能微聞十日太陰病衰身熱少愈腹滿如故十一日少陰病衰渴止不滿以言腹不復滿舌乾已而愈

十二日厥陰病衰囊縮少腹微下大氣皆去言大邪熱氣盡去病則瘳痊愈也矣
此亦大略言之耳傷寒傳受不必拘此但以明其證而如法治療耳

裏外傷

如得病脈便沉而裏病表和者內傷也脈浮而表病裏和者外傷也

病在卧位四肢爲表病　病在胸腹之內爲裏病

表裏證

身熱爲熱在表　言皮膚壯熱而反憎寒非謂自發熱燥也
引飲煩渴或小便黃赤爲熱在裏身熱飲水或小便黃赤爲表裏皆有熱身涼不渴小便清白則表裏皆無熱不言爲寒者蓋表裏熱微則亦有身表不熱而裏亦不渴故也
渾身疼痛拘急表熱惡寒而脈浮者皆爲熱在表也引飲譫妄腹滿實痛發熱而脈沉者皆爲熱在裏也胸脇病痛或嘔而寒熱往來脈在肌肉不浮不沉則邪熱半在表半在裏也
夫邪熱在表而淺邪微而畏正故病熱而反憎寒也則勝理益鬪而怫熱益加故也邪熱在裏而深邪甚則不畏於正物盛其極故不惡寒而反自惡熱也半在表半在裏進退無常則寒熱往來也寒多爲表多脈稍浮熱多爲裏多脈稍沉也諸病寒熱並同惟瘧疾反此由表之正氣與邪熱爭之於裏表氣虛而裏熱實亢則害承乃制故裏之火熱極甚而反兼寒氷水化制之故病熱極而反寒戰也臨汗而戰及諸戰皆然寒戰爲裏熱

表虛故也飲水而脈微不見也裏之正氣與邪氣并出於表則表熱裏虛是以煩熱汗出而脈浮也經以熱并於裏之陰分則爲陰勝而發寒熱并於表之陽分則爲陽勝而發熱也俗未知其爲表裏之陰陽而妄爲寒熱之本旨也夫傷寒之寒熱者謂寒爲表熱裏和故脈浮發熱爲裏熱表氣不虛故發熱而脈沉實也氣并不并故寒熱相反而有微甚也熱并則甚不并則微也

主療

傷寒表證當汗而不可下
反下之則畜熱內餘而成結胸或爲虛痞懊憹喘滿腹痛下利不止發黃驚狂斑出諸熱變證危而死矣
裏證當下而不可汗
反汗之則熱甚發黃驚狂斑出譫妄而喘悶亂危極而死矣
半在表半在裏則宜和解
相和通解表裏也
不可發汗吐下妄治之則有前諸證
在上則涌音傭吐也之
言病在膈上如胸滿而喔或眩脈關前緊甚者宜瓜蒂散吐之
在下者溲之
言蓄熱下焦則承氣抵當之類溲之皆臨病所在攻之
傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類亦佳
身熱惡寒無汗脈浮緊而數者

表不解半入於裏半尙在表者小柴胡湯主之或天水涼膈二藥各一服合同服之尤佳表裏之熱勢俱甚者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之

表雖未罷而裏證已甚若不下之則表熱更入於裏而裏熱危極宜以大柴胡大承氣下之雙除表裏之熱則免使但下裏熱而下後表熱乘虛又入於裏而生結胸及痞諸病之類也

表熱多裏熱少天水一涼膈半以和解也

前涼膈半服調天水一服上下同法

裏熱多表熱少未可下之者涼膈一天水半調之若甚者小承氣湯下之表證雖但有裏證者熱傳於裏也

調胃承氣湯下之但除裏熱也凡此諸可下之（胡氏言大柴氣諸下證）通宜三乙承氣下之善能開發峻效而使之無表熱入裏而成結胸及痞之衆病也

發汗不解下證前後別無異證者通宜涼膈散調之以退其熱便無熱甚危極也除此之外遠勝小柴胡湯兩感倣此而已

但瀉表裏微甚而以調之兩感謂一日太陽與少陽兩證俱見二日陽明與太陰三日少陽與厥陰俱病前六經之證是也

傷風自汗表病裏和者桂枝湯解肌

無汗爲傷寒不可服桂枝湯

有汗爲傷風不可服麻黃湯

半在表半在裏脈在肌肉而半入於裏白虎湯和解之病在裏脈當沉也大承氣湯下之　一法無問風寒裏證有汗無汗但有可下諸證或表裏兩證俱見而病日深俱目睛不了了者昏昧不（指明）或腹痛實痛者或煩渴或譫妄或狂

躁喘滿者或畜熱極深而將死者通宜大承氣湯下之或三乙承氣湯下之尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脈尙浮者宜此白虎湯再解之

或中暑大汗自出脈虛弱頭痛口乾倦怠煩燥或時惡寒或畏日氣無問表裏通宜白虎湯或裏熱甚腹滿而脈沉可下者宜大承氣湯或三乙承氣湯尤妙傷寒表熱極甚身疼頭疼不可忍或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚者

表熱勢甚而裏已有熱發表未開則陽熱暴甚故不宜汗之裏熱勢甚若吐下之則表之熱大乘虛而入反成結胸痞證則危極也

或大下後或再三下後熱勢尙甚而不能退本氣損虛而死寒溫諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不止熱不退者或因大下後濕熱利不止而熱不退脈弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澁大便溏泄類併少而急痛者必欲作痢也通宜黃連解毒湯以解之也

或裏熱極甚而忽承氣不能退者或以下後而熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以至陽氣佛鬱不能營通於身表四支以致通身清（一作冷）痛甚不堪項背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛燥渴虛汗嘔吐下利腹滿宜痛煩冤悶亂喘急鄭聲

鬱鬱滯不通鄭音聲連濁邪惡而不清雅也此乃熱勢過極而語音濁亂不能清利也俗反妄傳以爲寒極陰毒誤之甚矣

脈須疾數以其極熱畜甚而脈道不利及致脈沉細而欲絕俗未明其造化之理而反謂傳爲寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證候者

夫辨傷寒陰陽之異證者是以邪熱在表腑病爲陽邪熱在裏而臟病爲陰也俗乃妄言有寒熱陰陽之異證者誤之久矣且素問傷寒直云熱病誠非寒也其三篇名曰熱論刺熱篇評熱病篇及逐篇明言爲熱竟無寒理兼素問及靈樞諸篇運氣造化之理推之則明爲熱病誠非寒也寒病固有夫非汗病之謂也且造化爲汗液之氣者乃陽熱之氣所爲非陰寒之所能也以觀萬物熱極而出液明可知矣經曰夫人之傷於寒也則爲熱病熱病皆傷寒之類也又曰人之傷於寒也則爲熱病而死寒溫諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不止爲雜病經莫能爲汗病也況然既身內有陰寒者止爲雜病法曰身熱爲熱在表俗以水爲熱在裏其傷寒汗病本末身涼不渴小便不黃脈不數者未之有也雖仲景有四逆輩附之類熱藥是以治其本裏和誤以寒藥下之太早表熱未入於裏而寒下利不止及或表熱裏寒而自利者急以四逆湯攻裏利止裏和急以解於表也故仲景四逆湯証後復有承氣下熱之說也由是觀之傷寒汗病經直言熱病而不言其有寒無疑也經言三陰証者爲邪熱在臟在裏以臟與裏爲陰也宜下熱者也夫傷寒陰陽之別者但非表熱當汗而下之則死裏熱當下而汗之亦死故仲景曰桂枝下咽陽盛卽斃承氣入胃陰實卽亡死生之要在乎須臾視身之證不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺短者憒然不知病源爲始乃誤使病者殂沒然則已前

邪熱在表則汗之邪熱半在表半在裏則下之熱在上則吐之熱在下則泄之邪熱半在表半在裏則和解之豈分寒熱陰陽之虛實與陰陽汗病之證邪況朱奉議自言陰毒脈疾至七至八至以上疾不可數者陰毒已深也夫既云疾至八至已上疾不可數者正是陽熱極深之脈也豈是陰寒歟凡世俗所謂陰毒諸證以素問造化驗之皆陽熱亢極之證但畜熱極深在內而身表有似陰寒也經云亢則害承乃制言五行之道實甚過極則反似克其已者是爲兼化如萬物熱極反出水液以火煉金熱極而反似水是以水極而似水之化也五行皆然故肝熱甚則出泪心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾今傷寒爲作汗之病氣者乃陽熱怫鬱而否極復泰卽熱氣蒸蒸而爲汗出也如天時陽熱亢旱否極而泰則復爲雨也故欲雨則天乃鬱熱晴霽則天反涼人涼則病愈熱在病在故病寒者自是寒病非此汗病之氣也雖寒屬陰水而天地陰陽氣液相生之道則寒之化不能更生陰水也故古聖曰陽中生陰陰中生陽氣中生液液中生氣又曰積液生氣積氣生液又經曰氣和而生猶液然氣爲陽物故萬物之水液皆生於陽熱之氣如天氣陽熱極甚則萬物温潤而冬寒萬物乾燥由是言之旣爲作汗之病氣本熱非寒明矣故經又曰凡傷寒而成温病者先夏至日爲温病後夏至日爲暑病暑與其汗皆出止言邪熱隨汗皆出盡而愈也又經曰飲食飽甚汗出於胃爲穀精汗出於心爲血汗出於肝搖體勞苦汗出於脾此皆動亂勞苦而致陽

熱以爲汗出豈可反言作汗之病以爲陰寒耶今之俗醫不明陰陽變化之道而妄取陽主於生陰主於死而欲養於陽熱殊不知一身之內寒暑燥濕風火六氣渾而爲一兩停則和平一興一衰病以生也夫和平之常者温涼得所適當其陽和之氣如俗云人體温和是也然冬寒而人腠理閉密則身當温和夏熱則腠理開通而多汗出則身當微涼相反者病過與不及亦病其中藏腑陰分以爲根本則固守陽和之氣但當温和乃爲和平唯藏腑之氣各隨五行休因旺相死之時位而微有虛實不一也此之虛實乃自然之道而不爲病者然冬腎水陰至而寒復以天氣寒則腠理閉密而陽氣收藏固守於內則適當其平而以能內外適於外適當其平而以能內外之熱萬物皆然此陰陽否泰大道造化之理蓋莫大乎此也然雖秋冬否閉此以其肺腎陰王而得其所故康彊省病而病亦輕微也春夏開泰以其肝心陽王故肢體弱多病而病熱怫鬱則陽氣散越故病甚而多死亡及夫地理方位高下四時寒熱温涼安危之純陽豈謂熱耶此亦非特取寒氷爲陽是取寒氷之勁健整肅清則爲乾健之象耳夫寒熱之卦坎爲中男爲少陽之卦卽寒氷也離爲中女乃少陰之卦卽火熱也坎離水火爲夫婦而易以陽剛坎水寒者爲夫而陰柔離火熱者爲婦亦非以熱爲陽剛而寒爲陰柔也故易言陰陽者但以明其物象而非柔問論病寒熱陰陽之氣也設云乾爲寒者本非取乾陽爲寒但取寒之勁慄整像乾之道也俗又妄言人通而身面俱青此則畜熱之深也所以仲景言傷寒生則身温而死則身冷及病雖身熱未至於死將死熱極失下則厥厥深者熱亦深而厥微者熱亦微如

此則熱極而死者莫不身冷脈微而以至於絶也伶
末明其然直反妄曰陽在則生陽去則死又曰陽熱
變爲陰寒則死因以但欲養其陽熱而反致殘陰暴
絶則陽氣後竭而死者不爲少也俗醫未深明造化
又以妄爲傷寒得之勢惡陽勢暴甚而便畜熱以深
身冷厥逆手足無復温和者直以爲寒極而爲陰厥
以對陽厥及表裏熱勢俱甚而不審熱於內者以爲
陽毒以亂陰毒分爲寒熱陰陽之異誠曾不知傷寒
汗病便是熱病實無陰毒陰厥者也嗚呼病本熱甚
熱蘊於裏則陽氣陷下以至厥逆身冷或青而脈微
乃妄以寒極而內外急救其陽而反招其暴害因以
妄言必死之證間或彊實之人素本不衰及熱鬱佛
結兼衰微者偶中辛甘熱藥發散而腠理緩通佛熱
以隨汗泄而愈者遂以爲必死之病而救之以活反
恨往之死者救助其陽之不及因以互相譏議論但見
齊熱內結厥逆者或未厥者早以温之無用寒涼恐
成陰毒陰證而死俗醫治傷寒悞人多者無過於此
後學之士但以素問運氣自然造化之理原其標本
則明可見焉且以依法救人慎勿惑於衆人之言故
經曰謹熱陰陽無與衆謀又曰知逆與從正行無問
此其道也

或兩感勢甚者通宜解毒加大承氣湯下之熱不退者
宜再下之然雖古人皆云三下之熱未退卽死矣亦有
按法以下四五次利一二行熱方退而得活者免致不
下退其熱而必死也下後熱稍退而未愈者黃連解毒
湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以致
身冷脈微而昏冒將死者急下之則殘陰暴絶而死蓋

陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯
養陰退陽畜熱漸以宜散則心胸復暖脈漸以生至於
脈復而有力方可以三一承氣湯下之或解毒加大承
氣湯尤良後下後微熱不解涼膈散調之愈後常宜服
愈熱之藥屈發熱諸物

傷寒表證

夫傷寒之候頭項痛腰脊彊身體拘急表熱惡寒不煩
燥無自汗或頭面目痛肌熱鼻乾或胸滿而喘手足
末微厥脈浮數而緊者邪熱在表皆麻黃湯發汗之證
也或天水散之類甚佳無使藥不中效而益加害也

夫傷風之候頭痛項彊股節煩疼或目疼肌熱乾嘔鼻
鳴手足温自汗出惡風寒脈陽浮而緩陰浮而弱也前
曰陽關後曰陰此爲邪熱在表皆桂枝湯解肌之證也或汗出
憎風而加項背彊痛者宜桂枝湯加葛根湯也反無汗
者宜葛根湯雖已服桂枝反煩不解而無裏證者先刺
風池風府却與服之或服桂枝大汗出脈浮而洪大再
宜服之發汗後半日許復熱煩脈浮數者再宜桂枝湯
也當汗而反下之不成結胸而但下利清穀不化表證
尚在者表熱裏寒也

此言承氣寒藥下之者也或誤用巴豆熱藥下之而
脇熱利不止者或表裏皆熱自利或嘔者皆宜五苓
散止利兼解表也

急以四逆湯温裏利止裏和急以桂枝湯解表
或表熱裏和下利同法

或陽明病脈浮遲汗出微惡寒或太陰病腹滿而脈浮
或宜汗入下之但氣上衝而脈浮者並宜桂枝湯也

脈反沉實者大承氣湯下之
或下之早而心下痞汗出惡寒脈浮者表未解也先仟
枝以解表而後以大黃黃連瀉心湯以攻其痞也太陽
病不解而畜血下焦者見畜血門先桂枝解表已而以下血
也

宜桃仁承氣湯或抵當圓攻之

俱中風寒

頭項痛肢體疼手足温爲中風也反無汗惡寒脈浮緊
者爲陰寒也或頭項痛腰脊彊身體拘急指末微厥不
自汗爲傷寒也反煩燥而脈緩者爲傷風也風則傷衛
而寒則傷榮

萬物必以陰求陽陽求陰陰陽相應則爲和平故榮者陰氣也寒加之則傷耳故又曰寒傷血血亦陰也衛陽氣也風亦陽也故風加之則傷耳故曰熱傷氣氣爲陽也經言陰寒主於閉藏而陽熱主於開泄故寒傷榮則腠理閉密佛熱內作燥熱而無汗故脈數浮而緊也風傷衛則腠理開泄而自汗也故脈浮而緩以邪熱泄越故脈不能實陽明主於肌肉故自汗多而脈反遲也熱乃陽中之至陽故傷熱氣則大汗自出病雖爲熱脈不能實而虛弱也然佛熱痞閉無汗者故當病也其汗泄通泰而亦病者蓋泰極則否也夫人氣和而爲汗如天地氣和而爲雨過多則涸久不雨則旱有無多少貴乎應時興衰失常則災害至矣萬事皆然

榮衛俱傷則表裏熱甚也宜大青龍湯

小青龍湯治傷寒表未罷心下有水氣

表雖未罷而已有熱入於裏佛鬱於胃則飲食水液不能傳化宣行畜積不散而爲此非裏熱大實煩渴引飲過多停積而爲病者

乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者

水不得泄宜散滌腸胃臟腑故熱而渴或噎或喘或小便不利少腹滿而喘也水液不能宣行則溼熱甚其於腸胃故或利也

小柴胡湯治傷寒中風其病半在表半在裏脈在肌內不沉不滑筋脈拘急

身體疼痛寒熱往來惡寒爲表熱發熱爲裏熱寒熱往來者邪半在表半在裏也進退不已而言無常也

或嘔或欬胸脇痞滿硬痛下之前後無問日數及汗後餘熱不解或無問傷寒雜病蒸熱作發并兩感可和解者並宜服之

涼膈散一名翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未全或復未愈將或燥熱怫結於內而煩心懊憹不得眠者反無問傷寒雜病大人小兒臟腑積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉痺目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡疫實不利欬唾稠粘睡卧不安譫語狂妄腸胃澁燥便尿閉結一切風熱壅滯風疹瘡癬及傷寒陽明胃熱發斑下證未全者或誤服煖藥過多爲諸熱證并酒毒兼小兒痲疹瘡瘡未出及驚風積熱傷寒不能辨別者或熱甚瘡瘡已出未快者或熱極黑陷將死者

小兒疹瘡未出誤以熱藥發汗致使陽熱怫鬱密出不快多致黑陷而死因以世俗多痲疹藥以誤小兒諸病多矣亦不知古人所留涼膈之方通治風驚積熱傷寒熱病縱誤是痲瘡亦使熱勢稍退而稀少出快早得痊安也若用此最爲妙也

閻孝忠集小兒方論未達錢氏本意不明造化之理反重言疹病黑陷爲寒及曰凡痲疹始終不可服涼膈之藥後人因之反致熱甚黑陷而死者不可勝計也閻公豈不詳自所編錢氏方治痲疹黑陷用牛李青及百祥圓凡寒藥下之而多得痊愈者而不救則必死然則瘡疹之爲熱病豈不明哉況經曰諸痛瘡瘍皆屬於心及夫痲瘡黑陷無不腹滿喘喝嘶聲而小便赤澁不通豈不是熱極乎況痲疹本因熱而生病勢轉甚也豈能反爲寒者也

並兩感諸證三陽三陰傳變俱有並宜服之或傷寒熱極將死陰氣衰殘則不宜下下之則陰氣暴絕陽氣後竭而死矣

餘熱不解或無問傷寒雜病蒸熱作發并兩感可和解者並宜服之

涼膈散一名翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未全或復未愈將或燥熱怫結於內而煩心懊憹不得眠者反無問傷寒雜病大人小兒臟腑積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉痺目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡疫實不利欬唾稠粘睡卧不安譫語狂妄腸胃澁燥便尿閉結一切風熱壅滯風疹瘡癬及傷寒陽明胃熱發斑下證未全者或誤服煖藥過多爲諸熱證并酒毒兼小兒痲疹瘡瘡未出及驚風積熱傷寒不能辨別者或熱甚瘡瘡已出未快者或熱極黑陷將死者

小兒疹瘡未出誤以熱藥發汗致使陽熱怫鬱密出不快多致黑陷而死因以世俗多痲疹藥以誤小兒諸病多矣亦不知古人所留涼膈之方通治風驚積熱傷寒熱病縱誤是痲瘡亦使熱勢稍退而稀少出快早得痊安也若用此最爲妙也

閻孝忠集小兒方論未達錢氏本意不明造化之理反重言疹病黑陷爲寒及曰凡痲疹始終不可服涼膈之藥後人因之反致熱甚黑陷而死者不可勝計也閻公豈不詳自所編錢氏方治痲疹黑陷用牛李青及百祥圓凡寒藥下之而多得痊愈者而不救則必死然則瘡疹之爲熱病豈不明哉況經曰諸痛瘡瘍皆屬於心及夫痲瘡黑陷無不腹滿喘喝嘶聲而小便赤澁不通豈不是熱極乎況痲疹本因熱而生病勢轉甚也豈能反爲寒者也

並兩感諸證三陽三陰傳變俱有並宜服之或傷寒熱極將死陰氣衰殘則不宜下下之則陰氣暴絕陽氣後竭而死矣

惟宜養陰退陽以至脈浮而有力而後以三乙承氣陽微下之下後未愈者更以涼膈散調之雖愈後猶宜少少服之庶邪熱不致再作也

白虎湯治傷風自汗桂枝證表未解半入裏可以和解者

脈在肌肉而不可下者也

或中暑自汗脈虛弱者

熱傷氣而反自汗大出故脈不能自實而反虛弱

或傷寒自汗脈滑數而實表裏俱熱

脈沉浮皆得有力而數身熱頭痛煩渴腹滿小便赤口燥面垢諸語遺尿如誤發汗則譫言益甚下之則便溺上出汗後必發黃

或厥逆自汗者是謂熱越言自汗如或裏熱而脈厥者或下證未全者兼和解兩感傷寒此方最解頭痛并止自汗無問中暑傷寒風熱雜病及傳染時疫本非外傷風寒脈便不浮而自汗頭痛欲作汗病者並宜服之

無問四時但隨證詳而用之他藥倣此

五苓散　治中暑并傷寒大發汗後胃中乾須燥不得眠脈浮小便不利後熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐名曰水逆或攻痞不解或口乾煩渴小便不利或痛尚不解自利或小便不利者

凡用五苓散證無問脈之沉浮或一切留飲不散以此散水止渴并解兩感太陽少陽俱病

經言六經病證者是也

或一切吐瀉霍亂無問寒熱及小兒瀉驚風無問急慢皆宜服之

桂苓甘露散 一名桂苓白朮散 治傷寒中風冒暑飲食內外一切所傷傳受溼熱內甚或頭痛口乾或吐瀉煩渴或小便赤澁大便急痛或瀉痢間作并一切溼熱霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿痛悶或中外諸邪所傷而并吐瀉者溼熱之時尤宜服之

并治小兒驚風

白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損及氣弱久痢保哀老兼酒膈嘔噦

四逆湯 治傷寒表熱未入於裏誤以寒藥下之太早其表熱本未入而因裏寒下利不止或表熱裏寒自利不止者急以四逆溫裏

脈浮不渴小便清白不溫完穀不化者是也或雜病寒溺之色者須臾容其飲食萬物之色也或下後協熱利不止者喎乾煩渴也證不宜溫也宜五苓之類散其溼熱也惟裏寒者可以溫之止其寒瀉

利止裏和表證尚在者急以桂枝湯解表也或雜病寒飲嘔吐者或寒溼泄瀉者

然雖雜病若溼熱吐瀉者不宜此方雖亦有溼熱病閉之微者誤中辛熱開發而劾甚者強劫不開則佛

熱病轉加也惟裏寒可通用四逆湯也

茯苓半夏湯 治傷寒雜病一切嘔吐或喘欬頭痛者

半夏茯苓湯 治傷寒雜病嘔噦風眩疾逆欬喘頭痛并風熱反胃吐食諸證

黃連解毒湯 治傷寒雜病并酒燥熱毒煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得眠凡一切大熱狂燥喘滿及陽厥極

甚者熱內深俗妄傳為陰毒者是勢體痛不可忍脈洪躁裏有微熱不可汗者或溼熱內甚或欲作痢者

大便溏數而少急痛小便赤或澁者必欲作痢也

或已利溼勢甚者并服本方及下之前後寒涼諸藥不能退其溼勢之甚者兩感諸證同法

兩感者一日太陽與太陰俱病則頭痛口乾而煩渴二日陽明與太陰俱病則耳聾攣縮而厥通宜此方以退表裏諸熱宋氏不明此許熱證妄言前三日是為病寒以四逆湯急溫裏而後以桂枝湯急解表大誤人也此二方皆不可用但隨表與裏熱勢微甚以退其熱使無致熱極而死者是也若勢甚宜下者加大承氣湯下之或熱結極深而諸藥數下畢竟不能利不救必死者此法頭下甘遂末一錢以下之吐利同效或但自熱結胸中心胸高起腹雖不滿而但喘急悶結譫妄昏冒陽脈沉數而緊者尤宜此法急以下

吐愈佳

瓜蒂散 治表證罷邪熱入裏結於胸中煩滿而饑不能食微厥而脈乍緊者宜以吐之

諸可下證

大柴胡湯 諸服小柴胡湯證後病不解表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解下心痞鞕嘔吐下利（已上屬太陽）或陽明病多汗或少陰病下利清水心下痛而口乾或太陰病腹滿而痛或無表裏證但發熱七

八日雖脈浮而數或脈在肌肉實數而滑者及兩感諸證可微下者雙除表裏之熱者並宜此劑

大承氣湯 治大小二柴胡證後表裏俱熱病勢更甚者或陽明脈遲汗出不惡寒

陽明生肌肉熱甚自汗多故脈不能數而反遲也裏熱更甚故不惡寒而反微熱也

身重氣短腹滿而喘有時潮熱

惡寒為表熱當汗而不可下發熱為裏熱當下而不可汗

或手足心濈然汗出者濈阻立切和

今言唯手心足心氣似和然而汗出也

此大便已鞕也或吐下後不解不大便五六日至十餘日日晡潮熱不惡寒獨語如見鬼狀剌者脈則不識人循衣摸牀惕然而安微喘此陽明裏熱極甚也

足陽明胃經外肌肉為十二經之長內為五臟之本六腑之大源故陽明胃病雖為腑病其脈沉數而實者皆當下之也然陽明熱甚則大便自黃赤變褐以至於黑者難治也凡潮熱譫語不能食者則大便燥糞能食者但鞕耳舊云陽中有燥糞非在於胸耳

證在足陽明也燥糞實非在於胸耳

或陽明病下之後心胸燥熱而懊憹煩燥者亡液故也或煩熱汗出則解復如瘧狀日晡發熱而脈沉實者宜以下也

脈浮虛者桂枝湯主之

或六七日不大便自了了瞞不和無表裏證大便難身微熱者或小便不利大便乍難乍易時發微熱喘胃不能臥者有燥糞也或三部脈皆平心下鞕或脈大而

緊者或下利脈滑而數者或下利脈遲而滑者遲由熱泄不止而致之實非寒也

或少陽病二三日口燥咽乾者或自利清水色純青心下痞痛口燥者皆溼熱相搏於腸胃之內而成下利也然熱則鬱結溼則痞閉故水液不結

浸潤於外則腸胃之外燥熱太甚而煩渴不止腸胃之內溼熱鴻也本因熱鬱而留飲以成溼也

或諸腹滿實痛煩渴譫妄脈實數而沉者無問日數並宜大承氣下之或裏熱燥甚腸胸怫鬱留飲不散煩渴正胸腹高起痛不可忍但嘔冷涎大渴反不能飲飲亦不能止其渴喘急悶亂但欲死者熱服下咽立止其渴有若無病之人須臾大汗而愈至此往往多未利而汗出亦有藥力但隨汗之宣通則不利而愈者也

小承氣湯　治傷寒日深恐有燥屎欲知之法少服小承氣湯腹中轉失氣（謂動轉失泄之氣也）有燥屎也乃可攻之不轉失氣者必初鞕後溏未可攻之攻之則脹滿不能食也欲飲水而噦其後發熱者大便復鞕而少也宜小承氣和之若腹大滿不通與小承氣湯微和胸氣勿大泄也或陽明多汗津液外出腸胃燥熱大便必鞕而譫語脈滑疾或發汗吐下後微煩小便數大便因鞕者或下利譫語者多復有燥屎也通宜小承氣湯下之或得病二三日脈弱無太陽少陽證煩心心下鞕至四五日雖然食少少與小承氣湯和之令小安

調胃承氣湯　治諸發汗和解吐後不惡寒但發熱而或蒸蒸然者或日深心下溫溫欲吐而胸中滿痛大便及潠腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者（先蘇佃切）先此時者先於此時之前已曾自極吐下而復此證也

或日深裏熱譫語法當承氣下之誤以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之以致真陰損虛則邪熱轉甚其裏者為正因而協熱下利不止脈反調和也（協胡叔切和也合也）

今言病本為熱而又與辛熱大毒峻藥下之則兩熱協和相合而熱甚下利不止也下利脈當微厥而其鞕實攻之故脈反適當其調和也言有熱利不止而脈反平或滑實大而緊者也

或裏裏和而下之太早表熱乘虛入裏而或不成結胸但為熱利不止心下滿鞕成痛煩渴咽乾脈滑數而或實者或諸腹滿實痛者

或煩渴譫妄者小便赤澁大便或鞕或熱泄脈滑實而緊甚也並宜調胃承氣湯下之

三一承氣湯　通治大小調胃三承氣湯證

大法表證罷熱傳於裏則宜下之熱除即愈宜調胃承氣也此失下熱極則危而死矣表病裏和則當汗之熱泄身涼即愈若反下之則表熱乘虛入裏而成結胸之類諸病也或表熱半傳於裏半尚在表則不可汗下宜小柴胡之類和解之也或表裏兩證熱勢俱甚而和解不能已者雖邪熱半在裏半在表法當寒熱往來以其表裏熱勢俱甚故亦不惡寒而俱惡熱也宜柴胡湯微下之通除表裏之熱也或誤用調胃承氣則止能攻裏不能除其表熱或用小承氣多攻裏少除表則表熱乘虛入裏皆能為害也其大柴胡證勢更甚者宜大承氣下之設未全愈而胡證復作者或蒸蒸然者或日深心下溫溫欲吐而胸中滿痛大便之微淺邪熱入之於裏以其導樸枳實之類泄閉結風暴傷酒食煩心悶亂脈數滯而不能成其結胸之類諸病也故活人書言攻裏先此時者先於此時之前已曾自極吐下而復此證甚而個仆卒中或一切暴瘖

不語失音或畜熱內甚陽厥極深脈反沉細而欲絕者或表之冲和正氣與邪氣并之於裏則裏熱亢甚而陽極似陰反爲寒戰脈微而絕者或風熱燥甚客於下焦而大小便澁滯或不通者也

風本能勝溼土火熱能耗水液因而成燥燥則緊斂堅結滯不通故風熱燥甚於下焦則燥糞結硬腹又緊斂者其燥糞不能相離并膀胱燥鬱不能滲泄故不通也愼不可用銀粉巴豆大毒燥熱圓藥下之反生燥熱而耗其陰液也故傷寒下熱古皆禁之最宜三一承氣湯兼用下取法

或產婦胎死不下者也

風熱燥溼緊斂則產戶不得自然開通也其證逆脈弦數而牆面赤或青或變五色腹滿急痛喘悶胎已不動者是也手足溫而脈滑者止爲難產但宜滑胎催生愼不可下也

及雨感表裏熱甚欲可下者並宜三一承氣加甘草是也或下食積及急攻結滯者調下輕粉一字滯下目疾口瘡咽喉病瘍斑疹加涼膈散下死胎加益元散

十棗湯　治太陽中風下痢嘔逆表證仍在乾嘔氣短不惡寒欲發汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引下痛者兼下水腫腹脹并酒積食積一切腸垢積滯疫癖堅積或畜熱心腹暴痛或瘧氣久不已者或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰而反無戰表氣入裏而陽厥極深故脈微而欲絕也并風熱燥甚結於下焦大便不通或實熱腰痛者及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐斑疹熱毒不能了絕者宜以下之

瘀血下證瘀於頑切積也又音於

桃仁承氣湯　治太陽病不解而循經熱結在膀胱其人如狂血自下者愈表不解者先以桂枝湯解表已而但小腹急結者乃以下之　或言少腹凡下皆作小腹也腹下爲小腹小腹兩旁謂之少腹其少腹者誤也臍上爲抵當圖　治傷寒裏熱小腹滿當小便不利今反利者有畜血也宜以下之

抵當湯　治太陽日深表證仍在循經而熱微而沉不結胸而發狂者熱在下焦少腹當鞕滿小便自利血下乃愈宜以攻之或太陽病身黃脈沉者循經而畜熱下焦也少腹鞕滿小便不利爲無血小便自利如狂者瘀血證也或陽明畜熱內甚而喜忘喜許記切或狂大便雖鞕而反易不難也其色黑者有畜血也或下食積及急攻結滯者調下輕粉一字滯下目疾口瘡咽喉病瘍斑疹加涼膈散下死胎加益元散

茵陳湯　治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致溼熱相搏而身體發黃

或言寒熱相搏而發黃者誤也則如萬物溼熱甚則自生黃色也本傷寒熱極失下或誤汗之溫之灸之熨之或誤服銀粉巴豆大毒熱藥下之反以亡液損其陰氣邪熱轉甚或下之太早熱入裏不成結胸但以發黃者或失寒涼調治或熱勢本惡雖按法治之而不能退其熱勢之甚者或下後熱勢不退皆能發黃也大抵本因熱鬱極甚留飲不散溼熱相搏面於黃也

候但頭汗出身無汗剂頸而還小便不利渴飲水漿者身必發黃也

懊熱在表燥而無汗溼熱在裏氣甚不能散越於外則溼熱之氣鬱甚而上行以至頭面陽極之分則溼熱蒸爲微汗而頸下無汗然溼熱不能自然宣通散越於周身故溼熱鬱之極甚而面目遍身發黃色也故白虎湯證遍身自汗出者仲景謂之散越不發黃也小便不利者溼熱發黃之證也或小便自利或狂或大便黑者瘀血證也發黃亦有譫妄者本所不言以黃證未明故不須言也

宜茵陳湯調下五苓散以利小便退其溼熱也以大黃

茵陳湯利大小便也

結胸

汗下之後不大便五六日舌乾而渴口舖小有潮熱從心至少腹鞕滿而痛不可近脈尚沉緊滑數或但關脈沉緊者通宜大陷胸湯或丸下之或脈浮者表未罷也不可下之宜小陷胸湯及小柴胡之類和解未罷者方可下之或結胸雖脈浮而裏熱勢惡須可下者宜三一承氣湯一服分作三次約三時許服乾得利甚良雖未利稍減脈必衝沉病微者止用三一承氣湯半服按而下之裏熱甚者以大陷胸湯大半服而下之

謂有前藥之力也然須二方中甘遂反甘草或勢惡者故意以甘草擊甘遂使開發峻疾而爲效速矣故世方及活人書雙圓子亦直用甘草甘遂也

或但結胸別無大段熱證但頭微汗出脈沉潛者水結胸也通宜大陷胸湯小結胸者心下按之而痛脈浮而滑別無大段熱證也

此亦下之早而熱結心胷也但以熱微於大結胷而甚於痞但熱之微甚也俗未明之又以妄謂但結胷無大熱證爲寒實結胷殊不知素問明言熱病而實非寒也及夫臟結陰結陽結者經以熱結於腑而腑爲陽是名陽結熱結於臟而反爲陰是名陰結一名臟結也然熱結於腑則微而易治熱結於臟則微而難治故病厥微而是結於臟則深而當病甚故厥深而難治矣或厥結熱極深而至身冷脈微而欲絕者表之熱證反不見也俗未知本熱極而致反言陰寒臟結本亦病熱極俗又妄加熱藥反絕陰而暴死十無一生因以世傳臟結便爲死病也若以素問六氣脈證標本驗之則明可見其熱證也留飲不散而成頭汗而脈沉潛反附於骨者積飲以成水結胷及水結胷者通宜小陷胷湯也

痞

傷寒表裏俱熱下證未全法當和解誤下之早則成痞心下痞滿而不痛按之轉虛也

然須裏之陰分已受熱入而爲病是謂病發於陰或熱微下證未全則不任轉瀉誤下之早則裏之微熱除去之外反爲熱入所損虛而表熱故虛入裏雖不能成結胷亦作痞也俗醫妄謂陰寒之作痞下之早而成痞者誤也然病既已爲陰寒何得更言發於陰也既言其陰寒畢竟不可下何得言其下之早也既言早則病熱發於陰也故此之邪熱病之表於陽分而裏和未有邪熱反以下之太早則裏乃極虛而表之全熱大入於裏此失之至大故成結胷而病熱尊還也痞則誤之小故爲熱勢輕微也小結胷者微於大結胷而甚於痞亦下之早而熱結心胷也但以熱微於大結胷而甚於痞但熱之微甚也俗未明之又以妄謂但結胷無大熱證爲寒實結胷殊不知素問明言熱病而實非寒也及夫臟結陰結陽結者經以熱結於腑而腑爲陽是名陽結熱結於臟而反爲陰是名陰結一名臟結也然熱結於腑則微而易治熱結於臟則微而難治故病厥微而是結於臟則深而當病甚故厥深而難治矣或厥結熱極深而至身冷脈微而欲絕者表之熱證反不見也俗未知本熱極而致反言陰寒臟結本亦病熱極俗又妄加熱藥反絕陰而暴死十無一生因以世傳臟結便爲死病也若以素問六氣脈證標本驗之則明可見其熱證也留飲不散而成頭汗而脈沉潛反附於骨者積飲以成水結胷及水結胷者通宜小陷胷湯也

痞

傷寒表裏俱熱下證未全法當和解誤下之早則成痞心下痞滿而不痛按之轉虛也

然須裏之陰分已受熱入而爲病是謂病發於陰或熱微下證未全則不任轉瀉誤下之早則裏之微熱除去之外反爲熱入所損虛而表熱故虛入裏雖不能成結胷亦作痞也俗醫妄謂陰寒之作痞下之早而成痞者誤也然病既已爲陰寒何得更言發於陰也既言其陰寒畢竟不可下何得言其下之早也既言早則病熱發於陰也故此之邪熱病之表於陽分而裏和未有邪熱反以下之太早則裏乃極虛而表之全熱大入於裏此失之至大故成結胷而病熱尊還也痞則誤之小故爲熱勢輕微也小結胷者微於大結胷而甚於痞亦下之早而熱結心胷也但以熱微於大結胷而甚於痞但熱之微甚也俗未明之又以妄謂但結胷無大熱證爲寒實結胷殊不知素問明言熱病而實非寒也及夫臟結陰結陽結者經以熱結於腑而腑爲陽是名陽結熱結於臟而反爲陰是名陰結一名臟結也然熱結於腑則微而易治熱結於臟則微而難治故病厥微而是結於臟則深而當病甚故厥深而難治矣或厥結熱極深而至身冷脈微而欲絕者表之熱證反不見也俗未知本熱極而致反言陰寒臟結本亦病熱極俗又妄加熱藥反絕陰而暴死十無一生因以世傳臟結便爲死病也若以素問六氣脈證標本驗之則明可見其熱證也留飲不散而成頭汗而脈沉潛反附於骨者積飲以成水結胷及水結胷者通宜小陷胷湯也

痞

傷寒表裏俱熱下證未全法當和解誤下之早則成痞心下痞滿而不痛按之轉虛也

然須裏之陰分已受熱入而爲病是謂病發於陰或熱微下證未全則不任轉瀉誤下之早則裏之微熱除去之外反爲熱入所損虛而表熱故虛入裏雖不能成結胷亦作痞也俗醫妄謂陰寒之作痞下之早而成痞者誤也然病既已爲陰寒何得更言發於陰也既言其陰寒畢竟不可下何得言其下之早也既言早則病熱發於陰也故此之邪熱病之表於陽分而裏和未有邪熱反以下之太早則裏乃極虛而表之全熱大入於裏此失之至大故成結胷而病熱尊還也痞則誤之小故爲熱勢輕微也小結胷者微於大

以謂陰毒必死之證救之以活致使世俗愈惑而惟恨救之不及誤人多矣殊不知但以退熱潤燥散結則氣液宣行而愈也故經曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣脈也然氣通和卽津液宣行也故經曰氣和而生津液相盛而神自生

或胸滿結滯或頭微汗出虛煩者梔子湯主之或少氣者加甘草一錢或加嘔者及初誤以圓藥下之者加生薑半兩凡懊憹虛煩者皆用涼膈散甚佳及宜湯滌等足使心胸結熱宣散而已

梔子厚樸湯　治心煩腹滿坐卧不安

金　河間劉完素著

習醫要用直格

諸證藥石分劑

麻黃散

麻黃一兩半去節湯泡云黃汁焙乾秤　桂枝一兩削去皮宜桂是也　甘草半兩炙　杏仁二十粒湯浸去皮尖雙仁者下並同法

右劑如麻豆大每服五錢七七匙也作匙抄也　水一盞半煎至八分濾去滓溫服滓阻史切聚也作也衣覆以取微汗或溫病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之每分二錢半也

益元散一名天水散一名太白散

滑石六兩白好者　甘草一兩

右爲細末每服三錢蜜多許溫水調下或無蜜亦可每時日三服或欲冷飲者新井泉調下亦得解利發汗煎蔥白豆豉湯下每服水一盞蔥白五寸豉五十粒同煎至六分濾去滓熱服併二三十粒煮取汁七分調併三四服以效爲度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解多服無害但有益耳本世傳名太白散俗悪性寒愈易得之賤物而不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之乃凡人之仙藥也何可缺歟　夫傷寒當汗則不可下當下則不可汗且如誤服此藥則汗自不出而裏熱亦獲不效亦有裏熱便得宣通而愈者也或半在表半在裏可和解而不可吐下發汗者若服此藥多愈或不愈亦小減加涼膈散和解尤佳

或自當汗解者更加蒼朮粗末三錢同煮豉煎湯調服尤良或孕婦不宜滑石麻黃桂枝灌發汗劑用

甘草一兩蒼朮二兩同爲粗末每服四錢水一盞蔥白五寸豉五十粒同煎至六分濾去滓熱服併二三服取微汗是名通毒散非孕婦亦可服或太白散加麻黃二兩去節如法煎服世云神白散　或通毒散加麻黃與蒼朮等分去節濟衆云青龍散　或青龍也或解利兩感前涼膈調下益元散四錢　或下乳用猪肉麪羹粥飲湯之類調下四錢不拘時候日三服及宜食肉麪羹粥　催產溫香油漿調下五錢併二三服以產爲度　或死胎不下者煎三乙承氣湯温服前後俱下而胎下可活產母也凡雜產或死胎不下皆由風熱燥澁緊飲結滯而不能舒緩故產戶不得自然開通也此藥力至則結滯頓開而產矣後慎不可溫補而反生燥熱也俗未知產後亡液損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而爲諸熱證由不讀素問不知造化故不識證候陰陽反以妄爲產諸虛百損便爲虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見煩渴者不令飲水本雖善心爲害多矣豈治病之道但以隨本如法治之而已矣此藥泛常多用然須爲效至大而俗以病異藥同將謂妄行反招侮慢今以黃丹加令桃紅色名曰紅玉散　加青黛令輕碧色名碧玉散　加薄荷葉一分名雞蘇散主瘵不殊收效則一俗目懵然何能別此可遠妄晦可顯玄功後之學者其究心焉

桂枝湯

桂枝去皮　芍藥　甘草炙等分三分爲末

石劑如麻黃大每服八錢水一盞半煎三片棗三枚擘破煎至七分令去滓溫服續後啜熱稀粥溫覆令遍身微汗或暖也及初夏可加黃芩一兩名陽旦湯大熱之分及素有熱人可再加知母半兩石膏一兩爲末或更加升麻一分禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物等桂枝證反下之不成結胸及痞但腹滿證在者本方倍加芍藥大實痛者更加大黃半兩服弱自利者不加

桂枝加葛枝湯

桂枝　芍藥　甘草各二分　葛枝一兩三錢

石劑如桂枝湯服謂如桂枝湯劑煎服也下倣此

葛枝湯

葛根一兩　麻黃泡去黃汁焙乾秤三分　桂枝去皮　芍藥　甘草炙各半兩

右如桂枝湯服

大青龍湯

麻黃如前製　石膏爲末各三分　桂枝一分半　甘草炙一分　杏仁十枚湯去皮尖雙仁

右劑如麻豆大抄五錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎至半盡濾去滓溫服令身汗淫未潤再服

小青龍湯

麻黃如前製　半夏湯洗　芍藥　細辛　乾薑　甘草炙　桂枝去皮三分　五味子

右劑麻豆大每服八錢水一盞半生薑四片煎至七分絞汁溫服　渴者去半夏加栝蔞根三錢　微利去麻黃加芫花彈子大　嘔者去麻黃加附子一錢炮以開佛熱結滯　小便不利少腹滿者去麻黃加杏仁製如前法此方燥渴茯苓四錢　喘者去麻黃加杏仁製如前法此方燥至溫散其水以潤腸胃臟腑之燥以開發佛熱結滯

小柴胡湯

柴胡去苗秤二兩　黃芩六錢泡五七次　半夏六錢泡五七次　甘草　人蔘各三分

右劑加麻豆大抄五錢生薑三片棗三枚切煎至半盞濾去滓溫服日三小兒一服作三服諸藥法同

涼膈散一名連翹飲子

連翹一兩　山梔子　大黃各半兩　黃芩各半兩　甘草半兩　樸硝一分

右爲粗末每服二三錢水一盞蜜少許或無蜜亦可舊用竹葉或亦不須煎至七分濾去滓溫服熱甚者可服四錢亦有可服一二十錢者　治咽喉并涎嗽加桔梗一兩荊芥穗半兩咳而嘔者本方加半夏半兩每服生薑三片煎　朝服血者加當歸芍藥各半兩生地黃一兩淋者加滑石四兩茯苓一兩風弦者加川芎防風桔梗各半兩酒蒸者加爲末一兩

斑疹瘡瘡加荊芥穗赤芍藥川芎防風桔梗各半兩

三歲兒可服七八錢或熱甚黑陷腹滿喘急小便赤澀而將死者此一服更加大承氣湯約以下之得利立甦

凡言加者皆自本方加也但加者每服五七錢以意加減調理　兩感傷寒下證前後以退表裏之熱者煎本方四五錢調下益元散三四錢其本方皆能治此諸證但加卽爲效也

白虎湯

知母一兩半　甘草炙一兩　粳米一合　石膏四兩爲末

右劑麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服無時日三四服熱甚者服七八錢至十餘錢或眩或嘔或咳者加半夏半兩陳皮半兩每服用生薑三片煎服　或傷寒發汗不解脈浮者加蒼朮半兩名曰蒼朮白虎湯　或發汗或下後煩渴口乾或脈洪大或微惡寒者或不可下者或除可者之藥外並宜加人參半兩以調之名人參白虎湯

五苓散

猪苓去黑皮　茯苓　白朮各半兩　澤瀉一兩　桂去粗皮一分

右爲細末每服二三錢熱湯調下或生薑湯調下愈妙或加滑石二兩甚或嘔嗽咳煩心不得眠者更加阿膠半兩炒

桂苓甘露飲一名桂苓白朮散

桂半兩　茯苓　白朮各半兩　甘草炙　澤瀉　石膏　寒水石各一兩　滑石二兩製加

右爲極細末熱湯調下三錢欲冷飲者新水調下或生薑湯調下先良小兒服一錢

白朮散

白朮半兩　茯苓去皮　甘草炙一兩半

右爲細末白湯調下三錢若煩渴者加滑石二兩病甚者爲粗末每服一兩半水一大升煎至七合絞汁

人蔘　藿香葉淨各　木香一分　葛根一兩

放冷從意續續飲之小兒尤宜

四逆湯

甘草炙　乾薑各一分　附子半個生去皮臍

凡用附子以半兩重者佳小者力弱大者性惡非稱病人之有則也

右剉麻豆大用水兩盞煮至一盞絞汁分溫二服强實人二劑作三服或畜熱極深者手足厥冷則不宜此方當以下之也

茯苓半夏湯

茯苓去皮生薑取汁各半夏一錢

右剉麻豆大用水一盞煎至四分絞汁下薑汁溫服未利再服

半夏橘皮湯

半夏泡如法　陳皮湯浸去瓤　甘草炙　人參各半分　茯苓　黃芩去腐心各一分為粗末

右剉麻豆大用水三盞生薑一分切煎至一盞半絞取汁分四服作一日食後溫服

黃連解毒湯

黃連去須　黃蘗　黃芩　大梔子各半兩

右剉麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞取汁溫服無時日三四以效為度每一二服效或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三枚全用厚樸二錢劉茯苓去皮劉水一盞半生薑三片煎至半盞絞汁溫服名曰半夏黃連解毒湯或欲急下者本方如大承氣湯一服生薑煎如前法以利為度　一法為細末水研如小豆大溫水下二十丸治積熱勞欬瀉痢

甚良

瓜蒂散

瓜蒂　赤小豆等分

右為細末以香豉半合豆也豉水一盞煮取汁半盞調下一錢匕不吐加服得快吐乃止虛人不宜

大柴胡湯

柴胡去苗　大黃各半兩　黃芩　芍藥各一分　半夏二十銖　枳實三枚生用小者是也

枳實不去穰為效甚速下並同

右剉麻豆大分作三服每服水一盞半煎至半盞絞取汁溫服未利再服

大承氣湯

大黃　芒硝揉碎有芒頭者亦得　枳實各半兩　厚樸去皮炙各一兩

加甘草一兩是名三乙承氣湯

右剉麻豆大分一半用水一盞半生薑三片煎至一盞分納硝煎一二沸絞去滓熱服

凡煎藥須慢火煎沸即下火為一沸或言煎至幾分亦如此法煎不可强火耗去其水也

凡病熱鬱甚而令服寒藥則病能拒藥多不能下故經曰寒因熱用未利再服熱甚者此一劑都作一服熱勢甚者亦可併此二劑為一服劑分劑為一料方得利而效者臨時消息以利為度　消息謂損益多少也

凡用藥多少倣於此耳

小承氣湯

大黃半兩　厚樸三錢　枳實三枚

右剉如麻豆大分作二服每用水一盞生薑三片煎至半盞絞取汁熱服未利再服或微下者一劑分作二服或和胃氣不欲利者一劑分為四五服

調胃承氣湯

甘草　大黃　芒硝各半兩

右剉如麻豆大分一半用水一大盞煎至半盞絞去滓納硝煎一二沸熱服不利再服

十棗湯

芫花慢火炒變色　大戟　甘遂各等分

右為散細末用水一盞肥棗十枚切開煮取汁半盞調下半錢匕强實人服一錢匕以意加減快利為度

桃仁承氣湯

桃仁湯去皮尖雙仁用板槌碎　桂去皮　甘草各三錢　芒硝半兩　大黃六錢

右剉如麻豆大分作三服每服用水一盞煎至半盞下硝絞取汁熱服日三以微利為度

抵當圓

水蛭炒　蝱蟲炒各七枚　桃仁八粒　大黃一錢

右為細末蜜和作二圓用水一小盞煮一圓至六分溫服晬時血未下者再服

抵當湯

水蛭炒　蝱蟲炒去翅足各十枚　桃仁七枚　大黃一錢

右剉如麻豆大分作二服每用水一盞煮半盞絞去滓溫服未下再服蛀之吉丁結二切蝱地蟲莫庚切

茵陳湯

茵陳蒿去莖一兩一名山茵陳　川大黃半兩　山梔子七枚

小者十枚

右剉如麻豆大用水二盞半慢火煮至一盞絞取汁温服六分未利再服四分以利爲度勢甚者作一服未利再作以意加減當下如爛魚肚及膠膠等物及小便多出金色如皂角汁或見證將欲發黃者此一劑分作四服每服調下五苓散三錢凡治發黃無越此法也

世俗有傳烙黃而或愈者此強實之人素本中氣不衰而及淫熱鬱之微者烙之而誤中強刼開發得開氣血宣通卽作汗而愈或體質本虛淫熱結甚則刼發不開而反致死者不爲少矣莫若仲景法對證以藥致之則免致强刼不開而反誤人生命也及夫近世妄傳有寒極陰黃而內外極救其陽爲害多矣設若病微而誤中開發得愈亦以鮮矣而傷生者不可勝言也大抵凡諸黃者有二一則濕熱氣而黃猶物昔然又如麥秀而鮐雨淫熱過極則黃亦者也及水勞而天氣淫熱則草木腐死而色變黃昏或病血液衰則虛燥熱太甚而身面痿黃者猶亢旱而草木萎黃也夫病燥熱而黃者當退熱潤燥而已此傷寒淫熱極甚而發黃者開結退熱雙利大小腑以除水淫則利和而愈也勢於梔切今作陰

結胸而發黃者同陷胸湯各半服下之或誤服巴豆熱毒圓藥下之及損陰氣遂協熱利不止而發黃者同大承氣各半服下之亦有協熱利不止更或結胸而發黃者用茵陳五分同陷胸湯三分大承氣二分以下之或兩感發黃者本方加黃連解毒湯一服急下之或頭微汗小便利而微黃者淫熱微也宜此栀

子蘗皮湯

大山梔子十枚　甘草一錢　黃蘗半兩

右剉如麻豆大此劑則作二服每服水三盞煮至一盞絞取汁分三次作一日服

大陷胸湯

大黃芒硝各三錢　甘遂末三字

右剉如麻豆大一劑分作二服每服用水一盞煮大黃至六分內消煎一二沸絞汁一字七半温服未快利再服熱惡不利者以意加服

天陷胸湯

大黃半兩　芒硝一分　葶藶三錢微炒　杏仁十二箇草灰炒色變

右大黃爲細末下葶藶杵再羅研杏仁消如泥和圓如彈子大每服一圓入甘遂末三字七白蜜半匙水一盞煮至半盞温服當一宿許乃下未利再服

小陷胸湯

半夏四錢湯洗全用不剉　生薑二錢切　栝蔞實大者半箇悕剉其殼子則不剉或但用其中子者非也

右以水三盞煮栝蔞取汁一盞半內餘藥煮至一盞絞取汁一盞分兩次温服以効爲度

大黃黃連瀉心湯

大黃　黃連　黃芩各一分

薑一分甚良

梔子湯

大梔子七枚剉碎　豆豉半合

右以水兩盞煮梔子至一盞半內豉煮至半盞絞汁湯服

凡加者皆用梔子先煮

或吐者止後服　凡諸梔子湯皆非吐人之藥以其燥熱鬱結之甚而藥頓攻之不能開通則鬱發而吐因其吐發開鬱結則氣通津液寬行而已故不須

再服也

梔子厚樸湯

大梔子七枚　厚樸半兩炙去粗皮　枳實二枚

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞温服

泛論

凡傷寒熱病下後熱不退下證尚在者再三下之以熱退爲度雖熱退尚未痊愈者隨證調之凡下之前後或大汗將出或大汗已出俗言如汗是言大汗或汗後煩渴及諸吐瀉雜病一切煩渴者須以細細飲之渴未止者頻頻時與但不可過多以成留飲不散者也留飲一名水畜經曰無飲

夫留飲謂水液留積斉聚於內而不滋潤傳化者也夫腸胃燥熱太甚則結滯而氣液不能宣通故雖飲而難以止其煩渴也若以頓飲過多則水漿過極而腸胃燥熱沸鬱轉以加其水煙焰閉故成留飲而心腹滿痛或爲吐瀉也

設若不與飲之則燥熱轉甚危而死矣

夫腸胃之燥溼猶地最勞適當其宜皆不可過與不及凡治病之道以調六氣陰陽使無偏傾各守其常平和而已嗟夫世俗或以妄爲冷水寒藥水損脾胃隔却大汗但令中外俱熱而欲望其作大汗者或大汗欲出腸胃燥熱煩渴及汗已出反慮水却大汗不與水者或氣弱久虛煩渴者或吐瀉煩渴者或羸嬉

煩渴皆以妄爲氣虛不可飲水也此乃未知古人云渴欲飲水爲熱在裏也若夫正氣與邪熱并甚於裏大熱亢極而反兼水化制之故反寒慄也化謂造化之化也

經曰少陰所至爲驚或惡寒戰慄謹妄謂少陰君火熱氣之所至而爲此等之病也又經曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火注云熱之內作然禁俗作噤鼓振搖而動也言禁冷振慄反寒戰也經曰亢則害承乃制謂五行之道微者當其本此實其道亢則反兼勝已之化以制其甚老子云天之道其猶弓乎高者抑之斯其道也經云水曰靜順謂靜而自已無爲但順物之氣味也及方圓不與物爭乃至柔順者也水本寒寒極則水氷如地而能載物又經曰氷雪霜雹是水寒亢極而反似冱水之土化是謂兼化也故病寒極者反堅滿也夫土主溼霧雨而安靜雨溼極甚則飄零散落是反兼風木制其土溼也故經言痙爲溼極而反似風強病也木主生榮而主於春其氣溼其本風風大則反涼而毀折是兼金化制其本也故風病過極則中外燥濡皮膚鼓掲反氣運行之燥濡而筋脉愈緩是反兼金化也　金主於秋而屬於火是也經言大汗者非謂邪熱自汗大出者也乃陽氣佛鬱結後得開通發散宣通則蒸蒸而爲汗出是

謂大汗言大病佛熱邪毒之氣鬱極通發以爲汗出故曰大汗也故經曰大氣皆去病得已矣

汗之正氣與邪熱并甚於裏大熱亢極而反兼水化制之故反寒慄也化謂造化之化也

經曰少陰所至爲驚或惡寒戰慄謹妄謂少陰君火熱氣之所至而爲此等之病也又經曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火注云熱之內作然禁俗作噤鼓振搖而動也言禁冷振慄反寒戰也經曰亢則害承乃制謂五行之道微者當其本此實其道亢則反兼勝已之化以制其甚老子云天之道其猶弓乎高者抑之斯其道也經云水曰靜順謂靜而自已無爲但順物之氣味也及方圓不與物爭乃至柔順者也水本寒寒極則水氷如地而能載物又經曰氷雪霜雹是水寒亢極而反似冱水之土化是謂兼化也故病寒極者反堅滿也夫土主溼霧雨而安靜雨溼極甚則飄零散落是反兼風木制其土溼也故經言痙爲溼極而反似風強病也木主生榮而主於春其氣溼其本風風大則反涼而毀折是兼金化制其本也故風病過極則中外燥濡皮膚鼓掲反氣運行之燥濡而筋脉愈緩是反兼金化也　金主於秋而屬於火是也經言大汗者非謂邪熱自汗大出者也乃陽氣佛鬱結後得開通發散宣通則蒸蒸而爲汗出是也俗以帶下直言冷病及惡寒戰慄便爲陰寒者俗醫未知此也天　道造化病微必當其本化寒見水化熱見火化也病甚者反似勝已之化如寒極反似濕土熱極反似寒水之化也噬夫百病之極甚有其狀反似於已之相反者俗醫不求其病之本氣而百端揣度莫知眞源不得已而但隨兼化之虛象妄爲其治反助其病而害於生命多矣以至舉世皆云病至危極之時則陰陽反變而無能辨別也殊不知但以運氣造化之理推之則設若千變萬化而歸其要則一也何得有難易之二耶故經曰夫標本之爲道要而博小而大可以言一而知百病之害經又曰善言始者必念於終善言近者必知其遠是則至數而道不惑所謂明矣故老子曰不窺牖見天道不出戶見天下其出彌遠其知彌少蓋知要與不知要也古聖曰反常合道謂古聖天理大道合同而常俗之心則有相反者也然古聖道不離於俗而入俗也又云俗自離道者常俗莫能合於道也夫俗則有相而道本無形者正如五行之變化微則守常而本化自見乃有相之俗是化以自見也甚則反似勝已之化乃無相而反常合道是謂變以其取變於本化之相而反見勝已之化也變化之道多端此則微甚外相之變化也故仙經曰大道似不肖厚德若不足即藏其本相於內而反變化勝已之化於外無相乃反常合於道者也却以道眼觀之則求其內也若但以俗眼觀其外則逐相而遷何由得其要也故聖經所論天地變化與道合同而俗無所慊但隨俗心致使後人皆由俗見編集方論有乖其理祇合俗心致使後人皆由

說反自以爲明而聖經之妙理嘗然罔究病者無辜竟罹橫夭吁可痛者且如經言陽勝則熱陰勝則寒俗直謂陽熱之氣勝則發熱陰寒之氣勝則發寒者皆經之本旨也此言表裏之陰陽正氣之虛實害正氣勝者爲不病而不勝者爲病也故經曰陰陽勝則陽病陽勝則熱陰勝則寒是謂表陽之正氣爲不病裏陰之正氣衰而爲受病也裏陰之正氣衰而爲受病者也此皆熱在表裏陰陽之部分者也然病勝在裏爲陽勝陰虛下之則愈汗之即死者是也表熱裏和則病當惡寒爲陰勝陽虛汗之則愈下之即死者是也故熱在表爲陰虛而言惡寒之寒則爲寒也熱在裏爲陽勝陰虛而言惡寒之寒則爲熱也故傷寒表熱裏寒謂之發熱發熱之熱則爲熱也故傷寒表熱裏和則病當惡寒爲陰勝則發熱而當下之又經曰重寒則熱重熱則寒者非謂病寒而極重反變也此重言當有兩重惡寒則反惡寒而惡熱謂表熱惡寒爲一寒也若裏之陽和正氣又出之於表則又當有一重惡寒是謂重寒不惡寒而爲發熱也若表之正陽之氣與邪熱并入於裏則爲兩重發熱則不發熱而後禁慄寒戰反言陽和衛氣并之於表陽分則病氣之勝爲陽勝也此亦病氣與衛氣并甚於裏之陰分則爲陰勝也此表裏之陰陽正氣之與邪熱相併而以言爲虛實也然邪熱在於表則惡寒而熱與裏之衛氣并之於表則反煩熱也邪熱獨在於裏則發熱而表之正氣與邪熱并之於裏則反惡寒戰也此亦病氣與衛氣并甚於裏之陰分則爲陰勝爲陽勝也此亦陽火熱氣以爲病也反寒冷者亦病熱極而反似寒水者也故病寒戰者多有燥裏也及夫平人冒寒而戰慄者寒主害戰者多有燥裏也及夫平人冒寒而戰慄者寒主閉藏而外冒於寒則裏熱怫鬱而表之陽和衛氣以外寒遏入於裏則陽并於陰而寒戰也夫恐極而戰慄者經言五志過極則勞傷本藏恐爲腎故經曰恐則氣腎然腎傷而虛則心火自甚而熱也又經曰恐則氣下然陽主出行舒榮故心火之志喜則身心放肆而陰主收藏故腎水之志恐則身心收斂也夫恐則腎虛心實而熱正氣收藏陷下於裏亦是陽并於陰而寒戰也夫酒噤而戰者腸胃酒熱未散身表酒力已消則陽熱易爲斎熱入裏故但胃於寒則陽并於陰而寒戰也夫欲汗而寒戰者傷寒日深表證罷斎熱於裏則發熱也若表裏之正氣并入裏則火熱無極而反寒戰也陰分陽熱之氣逆極而後出之陽則煩

也又曰陽勝則外熱陰勝則內寒此言併者也夫表裏陰陽之分受其邪熱之所在其沖和正陽之衛氣又爲邪熱相并而爲病之所正氣轉實而不虛故經言勝也　故經癉論云陽氣并於陰當是之時陽虛而陰實外無氣故先寒慄也陰氣逆極則後出之陽陽氣復併於外則陰虛而陽實故先熱而渴又曰并於陽則陽熱易爲斎熱入裏故但胃於寒則陽并於陰而寒戰也夫欲汗而寒戰者傷寒日深表證罷斎熱於裏則發熱也若表裏之正氣并入裏則火熱無極而反寒戰也陰分陽熱之氣逆極而後出之陽則煩躁而大汗作也

世所謂交陽者非陰寒交熱以爲陽熱也乃怫熱斎之於裏而鬱極迺發則交傳出之於表之陽分是謂交陽而後作汗也或怫鬱過極而不能交出於表者是鬱極不發否極不泰即正氣衰殘陰氣先絶則陽氣後竭而死矣夫欲汗而脉忽沉細而或不見者陽表正氣并入於裏故也交陽而燥亂昏冒者裏熱鬱極迺發而欲出以怫鬱而陽之氣極不能出故氣亂則神背而燥擾也

凡欲作汗無問病之微甚或以經新下者或下證未全者恒以涼膈散調之甚者宜黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脉沉實而有下證者三一承氣湯下之勢惡者加黃連解毒湯下之或已戰不快者或戰後汗出不快者或微戰數次經大戰而汗不出者乃并之不甚而病之不速也通宜三一承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也　大法曰脉浮至一二日汗不能出者宜証鬱發之不峻病已三一

承氣湯微下之凡此諸可下者或得利而汗便出者或服藥而怫鬱頓然開發先汗出而後利者或利性但隨汗出泄則氣和而愈更不利者談不快爽不過而死者止由裏熱極甚而不能開發也故常以寒涼或下愊熱免致但以其作汗而爲邪熱耗絕陰氣而死也或不戰而汗出者衆不能盡而陽不并陰也或戰而無汗而愈者津液已衰以經發汗吐利或自汗吐利亡液過多則津液竭竭無由作津但氣和而愈也

或不戰無汗而愈者陽不并陰則不戰津液已衰故無汗而已也

世俗未知而直以惡寒戰慄名陽熱氣虛陰寒實勝因而爲治誤人多矣

受汗

夫大汗將出者愼不可限其煩熱而外用水溼及風涼制其熱也

陽熱開發將欲作汗而出者若爲外風涼水溼所薄則怫熱反入於裏而不能出泄病多危極而死宜亦不可恨其汗遲而厚衣窒覆欲令大汗快而早出也

怫熱已甚而鬱極迺發其發之微則順甚則逆順則發易逆則發難病已怫熱作發而煩熱悶亂宜以厚衣迺覆太過則陽熱暴然太甚陰氣轉衰而正氣不榮則無由開發即燥熱喘滿危而死矣

汗後

雙解散

普解風寒暑溼饑飽勞逸憂愁思慮悲怒驚恐四時中外諸邪所傷憎寒身熱頭疼拘倦強痛無問自汗無汗增寒發熱渴與不渴有甚傷寒疫癘汗病兩感風氣維病一切舊病作發三日裏外並宜服之設若

感之勢甚本難解者常服三兩日間亦漸減可並無所損或裏熱極甚腹滿實痛煩渴譫妄須可急下者以大承氣湯下之三一承氣湯亦妙也或下後未愈或證未全或大汗　後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱勞復或感他人病氣汗毒傳染或中瘴氣馬氣羊氣一切穢毒并瘀毒酒食一切藥毒及墜墮打撲傷損疼痛或久新風眩頭疼中風偏枯破傷風洗頭風風癇病或婦人產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘諸證無問日數但服之周身中外氣血宣通病皆除愈是防風通聖散加天水散各一半

防風　川芎　薄荷葉淨　大黃　芒硝別研各半兩　石膏別研　白朮　甘草四兩炙　黃芩各一分

右爲麤末每服五錢六錢水一大盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞濾汁去滓温服無時日三四服以効爲度常服三錢水一中盞煎六分絞汁温服不拘時兼夜四服設痊愈後更宜常服使病不再作新病不生並無過竟緩緩數數乃平人常服之仙藥也凡人已衰老則腎水眞陰損虛即風熱燥毒精血涸竭枯槁而死但以此藥扶補滋潤者也嗟夫世俗反以妄傳中年以上火氣漸衰止是虛冷更無熱病誤服熱毒之劑害人無數豈知識病之法全憑勝證以別寒熱陰陽虛實豈可以中年上下爲則耶此藥除孕婦及產後月事經水過多并泄瀉者不宜服或治雜病亦宜治風熱極妙一名通解散

風散一名通解散

傷寒傳染論

夫傷寒傳染之由者因開大汗穢毒以致神狂氣亂邪熱暴甚於內作發於外而爲病也則如西山記曰近秋氣而觸眞氣錢仲陽云步履叢穢之處無使近於嬰兒若聞其氣則令兒急驚風搐也孫眞人云乘馬遠行至暮當沐浴更衣然後方可近於嬰兒使不聞馬汗氣毒不然則多爲天吊急驚風搐也故剝死馬者感其毒氣而成馬氣丁黃之疾皆由聞其毒氣之所作也故聖惠方一法大汗出則懸藥於戶辟其大汗穢毒無使傷於人也世以艾灸席隔者皆其義也多染親屬婁戚侍奉之人勞役者由其神氣性弱易爲變亂故也何以知傳染脈不浮者是也若誤以熱藥解表不惟不解其病反甚而危殆矣其治之法自汗宜以蒼朮白虎湯無汗宜滑石涼膈散熱散而愈其不解者適其表裏微甚隨證治之而與傷寒之法皆無異也

傷寒直格卷下終



劉河間傷寒醫鑒

元　平陽馬宗素撰

天道有週世而興。亦有過時而廢。此古今之常理。出於自然者也。且謂儒書衰滅以後。邪說蜂起。以治亂六經之道。紅紫亂朱。無以折衷。孝武皇帝舉用俊茂。罷黜百家之非。而六經之道始明。自漢而降。註述繁錯。醫書尤甚。況醫乃人之司命。所係尤重。殆非小智所能及也。惟昔黃帝岐伯。雜疑答問。上窮天道。下極地理。中盡人性。垂法萬世。以爲生民之壽域。是以名曰素問。於是守眞劉先生。恐斯文將墜於地。民罹橫天。於是分天地陰陽。剛柔消長之理。察人生風氣血脈寒熱之宜。遂一擬一篇。無不引素問。先標受病之本源。所處方用藥。注書有四焉。一者明天地之造化。論運化之盛衰。目之曰要旨論。一部計三萬六千七百五十三字。一者分君臣之佐使。定奇耦之逆從。又作宣明論一部。計八千九百零三字。一者又註傷寒六經傳受直格。一部計一萬七千零九字。又取至眞要論一篇。病機氣宜之說。著玄機原病式一帙。計二萬餘言。又先生歸世之後。恐庸醫不知樞要。於宣明論內。又集緊切藥方六十道。分爲六門。亦名直格。通計八萬餘言。可謂勤矣。守眞曰。自昔以來。惟仲景註述還文。立傷寒九十七法。合一百一十二方。了後學者莫能宗之。謂如人病傷風。則用桂枝解肌。傷寒則用麻黃發汗。傷風反用麻黃。則致強項牽痛。傷寒反用桂枝。則作慢驚發斑。或誤服此二藥。則必死矣。故仲景因桂枝下咽。陽脈即數。永氣入胃。陰盛則亡。是也。守眞爲此慮。恐麻黃桂枝之誤。遂處雙解散。無問傷風傷寒。內外諸邪。皆能治療。從下證錯汗者。亦不爲害。如此革誤人之弊。已不少矣。仲景處大承氣湯。小承氣湯。調胃承氣湯。三一承氣以總之。又慮仲景所著之書。文深義奧。後學難通。遂發其枝蔓。撮其本根。十去七八。將三百九十七法。一百一十二方。刪三十二藥而總之。使人易於檢閱。一見此書。對形見影。了無礙礙。得之對證用藥。人可自療。況醫家者流。業此者乎。兼仲景除傷寒之外。亦無雜病之論。是已備於仲景書也。故守眞首論傷寒之治證。故一切內外所傷。俱有受汗之病。名曰熱病。通謂之傷寒。今春溫夏熱。秋涼冬寒。是隨四時天氣所感輕重。及主療消息不等。合而言之。則一也。冬伏寒邪。藏於肌肉之間。至春變爲溫病。夏變爲暑病。秋變爲濕病。冬變爲正傷寒。冬固其氣而內生慊熱。微而不病者。以至將來陽熱極動。或又感之而成熱病也。經曰。冬傷於寒。春必病溫。亦其義也。然其陰證者。止爲雜病。終不爲汗病。由是傷寒汗病。直言熱病。不言其有寒也。三陰證者。邪熱在臟裏。以臟爲裏。爲陰。當下者是也。素問三篇。刺熱評熱。衆雜病論熱。不說其寒。非無謂者也。熱論之外。素問更無說傷寒之證。熱論云。熱病者。皆傷寒之類也。又云。人之傷於寒也。則爲熱病。注云。寒者多氣也。多時嚴寒萬類深藏。固密不傷。於寒觸冒之者。名曰傷寒。傷於四時之氣。皆能病。以傷寒爲毒者。最爲殺厲之氣。中而卽病。名曰傷寒。不卽病者。寒毒藏於肌肉間。久而不去。變爲熱病。故曰熱病者。傷寒之類也。古聖訓陰陽爲表裏。此一經大節目。惟仲景深得其旨趣。厥後朱肱編活人書。將陰陽二字釋作寒熱。此差之甚也。中間誤權橫天。嗟之何及。素問言人之臟腑陰陽。臟者爲陰。腑者爲陽。又四時陰陽。靈有經紀。內外之應。皆表裏。其信然乎。六合爲一合。厥陰少陽爲一合。少陰太陽爲一合。手足之脈。是謂六合。表裏者。諸陽脈皆爲表。諸陰脈皆爲裏。以此驗之。是守眞之言不誣矣。然恐俗人不悟朱肱活人書之謬。且略舉傷寒六經傳受一端而明之。肱書云。傷寒中病時。勝理寒。便入陰經。脈不微細。不經三陽也。三陰中寒。微則下理中湯。稍厥或下利。卽乾姜甘草湯。若陰毒已深。病勢困重。六脈俯骨取之方有按之則無。於臍中用葱熨法。或灸艾三五百壯以來。手足不溫者。不可治也。守眞曰。前三日三陽病在表。故當汗之。後三日三陰病在裏。故當下之。六經傳受。皆是熱證。非有陰寒之病也。素問云。傷寒未滿三日者。可汗而已。其滿三日者。可泄而已。由此言之。守眞之說。正合素問。肱書失之遠矣。又如身冷脈微。陽厥極深一證。肱書云。病人身冷脈沉細而疾。或時鄭聲。指甲面色青黑。陰毒已深。若服涼藥則渴轉甚。躁悶急。須急服辛熱之藥。如得手足溫。更服前熱藥。助之。若陰氣散。陽氣來。卽漸減熱藥而調之。守眞曰。傷寒下後熱不退。畜熱在內。陽厥極深。以至陽氣怫鬱。不能營通於身表四肢。以至遍身清冷。若急下之。真陰暴絕。陽氣後竭。面立死。不下亦死。此際當以涼藥。或解毒養陰退陽。俱欲畜熱漸散。則心胸復暖。脈自漸生。至於脈復有力。方可三一承氣湯下之。守眞復慮熱有兩感說。復以素問證之曰。亢則害。承乃制。此則正謂陽厥極深。不能營運於四肢。以至身冷脈微也。此略舉一二端耳。餘者之謬。自可觸類。夫肱書豈於當世。亦一代之名醫。其誤謬猶若是。況其餘碎

雖不經之說。何可盡信。至論小兒如閻孝忠曰。凡小兒痘疹常乳毋慎口。不可令饑。及受風冷。歸腎變黑而難治。春夏病爲順。秋冬病爲逆。冬月腎旺盛寒。多歸腎變黑。若妄下之則內虛多歸於腎。此則直以痘疹爲寒。守眞云。閻孝忠不詳錢氏本方。斑疹黑陷。牛李濟百祥丸。寒藥下之。多變痙。不救必死。爲熱。豈不明哉。經云。諸痛癢瘡。皆屬心火。及斑疹黑陷。無不腹滿喘急。小便赤澁不通。豈非熱極使然耶。此閻孝忠所以失錢氏之意也。守眞如此分別。可謂醫者之龜鑑也。學者當詳其說。無妄謂傷寒有陰毒之證。便投姜附之藥。使實實虛虛。損不足益有餘。以此誤人。不亦冤哉。每觀乎城翁公序曰。譬如有行冥冥迷路不知其往。遇明燈炬火。正路昭然。此醫鑑之所作也。然世俗惡寒好熱。蓋亦有說。守眞云。病勢輕微。以熱藥強劫開發。誤中而獲効者有矣。如中酒有熱毒。而復飲熱酒以投之。令鬱結得開。而氣液宣通。此謂以熱治熱。亦有痊者。世俗惑於病輕而易痊。謂大疾亦然。殊不知不中則反爲害也。熱病以熱藥治之者。譬如騶主得佞臣縱恣。禍及滅亡。更不覺佞臣之惡。惟其同好之可樂。使熱勢轉甚。以至陽厥身冷。脈微。反陽爲陰。雖死不悟。至於諸熱變證。十損八九。眞不皆然也。如下利不止。瘕熱在裏。若使火艾灼烙。無不悅者也。此世俗好寒惡熱。所以滋厥害之失也。又守眞云。病勢熱甚。而依法治之不退者。或失寒涼。或因失下。或發烙灸。使熱極而妄爲陽厥。切不可用銀粉巴豆性熱大毒熱燥丸藥下之。反耗損陰氣。而衰竭津液。使熱勢轉甚。而懊憹喘滿。結胸腹痛。下利不止。血溢。血澁。或爲淋閉。發狂。譫妄。熱證蜂起。不可勝舉。由此爲瘕瘕。堅積之疾。誤人必多。然則世俗亦不知醫者之過。未盡究守眞之奇效。容開守眞之言曰。正治者以寒治熱。以熱治寒。病證輕微。可如此治之。若病重危。則當從反治之法。其反治者。亦名從治。蓋藥四肢逆冷。腹臍築痛。身如被杖。脈沉疾。或吐或利。當急灸脾下。服以辛熱之藥。令陽復而大汗矣。守眞曰。人之傷寒。則爲熱病。古今一同。通謂之傷寒。病前三日。巨陽陽明。少陽受之。熱在於表。汗之則愈。後三日。太陰少陰厥陰受之。熱傳於裏。下之則愈。六經傳受。由淺至深。皆是熱證。非有陰寒之證。古聖訓陰陽爲表裏。惟仲景深得其意。厥後朱肱編活人書。特失仲景本意。將陰陽二字。釋作寒熱。此差之毫釐。失之千里矣。

素問熱論云。黃帝問曰。熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。皆以六七日之間。其愈以十日以上者何。不知其解。願聞其故。岐伯曰。巨陽者諸陽主氣也。人之傷寒也。則爲病熱。熱雖甚不死。其兩感於寒而病。必不能免於死矣。帝曰。願聞其狀。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛。腰背所以得固也。然十救其十。亦不爲醫之功。以謂人之有命也。如身冷脈微。終不省者。蓋熱在內。證以涼藥調治。無有不愈。又如忠形不至。有經年終不曉療熱在裏。設以承氣寒藥下之。無有不死。雖得痊愈。尙不免於畏惡。病勢大藥力小。而致死者。亦不知杯水救車薪之火爲非。只指爲用涼藥之過。此二者無他。存於世人是非不明。而惡寒好熱也。

論脈證

活人書。陰毒脈疾七至八至以上。疾不可數者。正是陰毒已深也。六脈沉細而疾。尺部斷小。寸口脈或大。若誤服涼藥。則渴轉急。有此之證者。便急服辛熱之藥一日。或二日便安。若陰毒漸深。其候沉重。四肢首

尾。厥冷。腹痛轉甚。或咽喉不利。心下脹滿結硬。燥渴。盡汗不止。六脈但沉細而疾。一息七至以來。有此證者。速於氣海關元二穴。灸三二百壯。以手足和煖爲効。仍兼服正陽散。

素問脈要精微論。長則氣治。短則氣病。數則心煩。大則病進。（注曰。數故心煩也。）又云。陰盛發躁。人迎一盛病在少陽。二盛病在太陽。三盛病在陽明。四盛病已上爲格陽。（註云。謂人迎脈於寸口一倍。餘盛同法。）三盛謂大於平常之脈三倍也。四倍以上爲關格之脈。人盡不能極於天地之精氣。則死矣。

論六經傳受

活人書。太陰少陰厥陰。皆屬陰證也。少陰者腎也。厥陰者肝也。太陰者脾也。何謂太陰。太陰者胸脇脹。何謂少陰。少陰者腎之經。主脈微細。主心煩欲寐。或自利而渴者。何也。謂中病時。腠理寒。使入陰經。不經三陽也。蓋氣入於大腸。則發熱而惡寒。入於少陰。只惡寒而不發熱也。三陰中寒。微則理中湯。厥。或中寒下利。卽乾薑甘草大段重者。四逆湯。無脈者通脈四逆湯。何謂厥陰者。肝之經也。厥陰之爲病。氣隨愈。餘皆做此。然正治之法。猶君刑臣過。逆其臣性而刑之。故病熱不甚。治之以寒。逆其病氣而病自愈矣。反治之法。猶臣諫君。非順其君性而以悅之。其始則從。其終則逆。可以諫君去其邪而歸於正。王冰曰。病水猶人火。火得草則熾。得木則燔。得水而滅。病火猶救焚火。然溫而熾。得水而燔。以人火不繞逐之。則其火自滅耳。此謂良醫之治法也。夫逆治從治。皆是逆性之藥。病人豈有不惡者。是藥病相爭。其氣甚不死。其兩感於寒而病。必不能免於死矣。帝曰。願聞其狀。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛。腰背所以得固也。然十救其十。亦不爲醫之功。以謂人之有命也。如身冷脈微。終不省者。蓋熱在內。證以涼藥調治。無有不愈。又如忠形不至。有經年終不曉療熱在裏。設以承氣寒藥下之。無有不死。雖得痊愈。尙不免於畏惡。病勢大藥力小。而致死者。亦不知杯水救車薪之火爲非。只指爲用涼藥之過。此二者無他。存於世人是非不明。而惡寒好熱也。

日可下而已。

論汗下

活人書云。陽明證宜下。少陰證宜温。又云。少陰病一二日口中和。其背惡寒者。宜蓽茇并四逆湯。又云三陽證宜下。三陰證宜温。少陰病發熱脈沉。麻黄附子湯主之。少陰證二三日常見少陰證無陽者。宜麻黄附子湯主之。又云。發於陽也。麻黄桂枝湯主之。

論濕發黄

活人書云。一身盡痛。發熱身黄。小便不利。大便反快者。此名中濕。風雨襲虚。山澤蒸氣。人多中濕。濕留關節。須身體煩痛。其脈沉緩。內中濕也。主一身盡痛。發熱身黄。小便不利。又云。以寒濕在表不解。爲不可下也。可以茯附湯主之。

守眞云。發黄者。陽明裏熱極甚。煩渴熱鬱。留飲不散。以濕熱相搏而體發黄也。或言寒濕搏而發黄者。色及苔滑也。本傷寒失下。或誤汗之。温之。灸之。或服銀粉巴豆大寒鉛丹。熱藥下之。反以亡液。損其陰氣。邪熱轉甚。或下太早。熱入以成結胸。但發黄者。或失下。寒涼調治。或熱極本惡。雖按法治之。而不能退其熱勢之甚者。或下後熱不退。皆能爲發黄也。大抵本因熱鬱極甚者。留飲不散。濕熱相搏。而以茯附湯主之誤矣。

素問平人氣象論云。食已如饑者。胃疸。則是胃熱也。熱則消穀。食已如饑。目黄者疸。陽怫於上。熱積胸中。陽氣熾上。故目黄也。

素問通評虚實論云。足之三陽。從頭走至足。然久厥逆而不下。以致怫積於上焦。故爲黄疸。

論不得眠

活人書云。下後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大汗者。乾薑附子湯主之。

守眞云。夫傷寒病懊憹煩心。反復顛倒。不得眠者。燥熱怫鬱於內。而氣液不得宣通也。以梔子豉湯主之。

素問刺熱篇云。肝熱甚。小便先黄。腹痛多臥。身熱。熱靜則狂言及驚。脇滿痛。手足躁。不得眠也。

論嘔吐

活人書云。無陽則厥。無陰則嘔。却言少陰下利。脈微者。與白通湯。利不止。厥逆無脈乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。又云。膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐。各温之。宜四逆湯主之。

守眞云。嘔者。火氣炎上之象也。故胃熱甚則嘔也。又云。吐酸。肝木之味也。由火盛制金。不能平木。肝木日甚。故爲酸也。則如飲食則喜酸也。或言酸爲寒者。則如酒苦性熱。發於心火。故飲之則令人色赤。氣粗。脈洪大而數。語謔妄歌唱悲笑。喜怒如狂。胃昧健忘。煩渴嘔吐。皆熱證也。其吐必酸。宿熱可明矣。

論濕熱不利

活人書云。傷寒下利多種。須辨陰陽。勿令差互。大抵傷寒下利多種。須看脈與外證。下利脈大者虚也。脈微弱者。爲自止。寒毒入胃。脐下必塞。腹脹滿。大便黄白。或青或黑。或下利清穀。濕毒氣盛。則下利膿血。或如爛肉汁也。得之寒毒入胃。四逆理中湯。白通湯加附子四逆湯。皆治寒下膿血者。桃花湯地榆散主之。

守眞云。下利膿血者。如世之殺肉果菜。濕氣甚則自然腐爛潰發。化爲水。故食於腹中。或人濕熱邪氣。則自然化爲膿血水。其熱爲赤。熱屬心火故也。其濕爲黃。濕屬脾土故也。燥屬爲白。屬於肺金故也。濕熱甚者。更以熱性之藥治之。本是寒性之藥。反熱佐而服之。所謂病氣熱甚。藥氣寒。寒攻不入。寒熱交爭。則其病轉加也。故用寒藥反熱佐而服之。令藥氣與病不相逆忤。其藥性寒。熱服下咽之後。熱證既消。寒性乃發。由是病氣隨愈。其餘皆倣此。然正治之法。猶君刑臣過。逆其臣性而刑之矣。故熱病不甚治之以寒。逆其病氣而病自除矣。反治之法。猶臣謀君非。順其君性而以說之。其始則從。其終則逆。可以謀君去其邪而歸於正也。

素問至眞要大論云。寒者熱之。熱者寒之。從者逆之。順者從之。王冰註云。病微猶救人火。得龍而焫。得木而燔。可以水滅之。故逆其性氣而抶之。病之氣微。而攻之以寒。病溫猶救焚。得水而焫。可以水折之。以溫攻之。適足以光焰指天。物卻方止矣。識其性者。反常之理。以人火逐之。則焰灼自消。炎光撲滅。然逆之謂以寒攻熱。以熱攻寒。從之謂熱難入。從其性用。不必皆同。是以下文曰。逆者正治。從者反治。從少從多。視其事也。此之謂乎。

論霍亂

活人書云。霍亂嘔吐而利。熱多而渴。寒多而不渴。理中丸主之。吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷。四逆湯主之。吐利已汗出而厥。四肢拘急不解。脈微欲絕者。通脈四逆湯。豬膽汁湯主之。

錢氏吐瀉門難。廣親七太尉七歲。病吐瀉。是時七月。其證全不食。而昏睡。睡覺而悶亂。吸氣乾嘔。大便或有或無。不渴。衆醫以驚治之。疑睡故也。

錢氏曰。先補脾。後退熱。石膏湯。次日又以水銀硫黃末。生薑水調一字。八月十五已後。吐瀉身冷無陽也。不能乳。乾嘔。瀉清褐水。常補脾益黃散主之。不可下。

守眞云。吐下霍亂。三焦爲水穀傳化道路。熱甚則傳化失常。而吐瀉霍亂。火性燥動故也。或云。熱無吐瀉。只是寒。此說誤也。

素問至眞要大論云。諸病嘔吐酸。暴注下迫。轉筋。小便渾濁。腹脹大。如鼓。有聲如鼓。難垣據鬱溜氣結。核。吐下霍亂。皆屬於火。

論好用寒藥

活人書云。傷寒論家方論不一。獨伊尹仲景之書。猶六經也。其餘諸子百家。時有一得之要。不可爲法。況有好涼藥者。附子硫黃笑而不喜用。雖隆冬使人服三黃丸之類。又有好熱藥者。如大黃芒硝則畏而不敢用。雖盛暑觸人炙病服金液之類。非不知罪福。蓋緣偏見所趨然也。又云。近時用小柴胡湯。不問陰陽表裏。凡傷寒之家。皆令服此藥。蓋不可輕用。雖不若大柴胡湯之矣。然熱病不甚治之以寒。逆其病氣而病自除矣。反治之法。猶臣謀君非。順其君性而以說之。其始則從。其終則逆。可以謀君去其邪而歸於正也。

素問至眞要大論云。寒者熱之。熱者寒之。從者逆之。順者從之。王冰註云。病微猶救人火。得龍而焫。得木而燔。可以水滅之。故逆其性氣而抶之。病之氣微。而攻之以寒。病溫猶救焚。得水而焫。可以水折之。以溫攻之。適足以光焰指天。物卻方止矣。識其性者。反常之理。以人火逐之。則焰灼自消。炎光撲滅。然逆之謂以寒攻熱。以熱攻寒。從之謂熱難入。從其性用。不必皆同。是以下文曰。逆者正治。從者反治。從少從多。視其事也。此之謂乎。

論小兒斑疹

活人書云。小兒斑疹。與傷寒相類。頭痛身熱足冷。脈數。疑似之間。只與升麻解肌湯治。斑子已發未發。皆可服。但不可下。斑疹發熱在表。尤不可轉瀉。世人不學。乃云。初發以藥利之。宜其毒也。誤矣。又云。疹豆已出。不可陳。轉出得已定。或膿血大甚。却用陳利。亦非也。大抵斑疹首尾不可下。小兒身熱耳尻冷。咳嗽面黑者。慎勿下。更時月輕重。故春夏爲順。秋冬爲逆。冬月腎旺。又盛寒。病多歸腎。腎變黑。無問何時。十難救一。又曰斑疹始出。未有他證。不可下也。但當用平和之藥。頻與乳食。不受風冷耳。如斑疹三日不出。不快者。即微發之。微發不出。即加藥發之。加藥不出。即大發之。後不多。若及脈平無證者。即斑疹稀少。不可更發也。腎旺盛。脾土不剋水。故脾虛寒戰。則難治矣。所以百祥丸者。瀉腸胱之腑。腑若不實。腦自不盛也。何以不瀉腎曰。腎主虛不受瀉。故二服不效。反加寒而死矣。

守眞云。小兒斑疹未出。誤以熱藥汗。致陽氣轉甚。則重密出不快。多致黑陷而死。恐是斑疹未敢服藥以誤小兒。諸病多矣。亦不知古人留涼瀉之藥。通治瘡風積熱。設是斑疹。使熱少退而稀少。出快得痊除愈也。若用涼膈散爲妙耳。閻孝忠集。小兒論。未達錢氏本意。不明造化之理。及妄言黑陷爲寒。及云斑疹終始不可服涼瀉之藥。後人因之。反致熱甚黑陷而死者。閻公豈不詳錢氏本方。治斑疹黑陷者。牛李昔百祥丸寒藥之而多獲痊可。不救必死。爲熱豈不明哉。夫斑疹黑陷者。無不腹滿喘急而小便赤而不通。豈非熱極者也。豈能反爲寒邪。治之法。其反治者。亦名從治。所謂從順於病之氣也。是故經曰。以熱治熱。以寒治寒。然以熱治熱。非謂病



傷寒心要

病在裏。脈沉細者。無問風寒暑濕。或表裏證俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痞滿譫語煩躁。畜熱內蓄。但是脈沉者。並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗。解以白虎湯。（直指云。夏至後宜用此湯。又至後不用白虎。宜平局方云。立秋後不用白虎湯。又至後不用平。却用許學士之耳。）

白虎解後。以五苓合天水調之。多進數服。無妨。或服服滿脈沉者。亦當承氣合解毒徹下之。

或發汗之後。熱不解。脈尚浮者。十六白虎加蒼朮再解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此證。以致身冷脈微。昏憒將死。切不得以寒藥下之。誤下即死。又一證虛腎妄言是陰厥。便欲易換。用玄武四逆溫熱之劑投之。下咽立死。殊不知此證。乃陰耗陽竭。陰氣極弱謂之耗。陽厥極深謂之竭。蓋熱悶將欲絕者。當此之證。寒劑熱劑。俱不可投。但進涼膈解毒十七以發陰退陽。宣散蓄熱。脈氣漸生。得大汗而愈。有無汗氣和而愈者。

未愈。却解毒合承氣十八下之。次以解毒涼膈天水合而爲一。十九調和陰陽。洗滌腸腑。則其他別證自不生矣。

有大下之後。熱不退。再三下之。熱愈盛。若下之不愈。脈微。氣虛力弱。不加以法。則無可生之理。若輟而不下。亦死。發者到此。活人殺人一彈指間。其不至手足失措者幾希矣。（直指云。傷寒汗後。汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎加蒼朮湯再解之。又按餘論云。傷寒下後自汗。虛熱不已。白虎加蒼朮人參。一服如神。汗止身涼。此通變之法也。如此。則汗下之後。熱不退。乐問有汗無汗。均宜白虎加蒼朮解之。又加人參亦妙。仍服涼膈解毒調之。）

病在裏。脈沉細者。無問風寒暑濕。或表裏證俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痞滿譫語煩躁。畜熱內蓄。但是脈沉者。並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗。解以白虎湯。（直指云。夏至後宜用此湯。又至後不用白虎。宜平局方云。立秋後不用白虎湯。又至後不用平。却用許學士之耳。）

白虎解後。以五苓合天水調之。多進數服。無妨。或服服滿脈沉者。亦當承氣合解毒徹下之。

或發汗之後。熱不解。脈尚浮者。十六白虎加蒼朮再解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此證。以致身冷脈微。昏憒將死。切不得以寒藥下之。誤下即死。又一證虛腎妄言是陰厥。便欲易換。用玄武四逆溫熱之劑投之。下咽立死。殊不知此證。乃陰耗陽竭。陰氣極弱謂之耗。陽厥極深謂之竭。蓄熱悶將欲絕者。當此之證。寒劑熱劑。俱不可投。但進涼膈解毒。十七以發陰退陽。宣散蓄熱。脈氣漸生。得大汗而愈。有無汗氣和而愈者。

未愈。却解毒合承氣十八下之。次以解毒涼膈天水合而爲一。十九調和陰陽。洗滌腸腑。則其他別證自不生矣。

有大下之後。熱不退。再三下之。熱愈盛。若下之不愈。脈微。氣虛力弱。不加以法。則無可生之理。若輟而不下。亦死。發者到此。活人殺人一彈指間。其不至手足失措者幾希矣。（直指云。傷寒汗後。汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎加蒼朮湯再解之。又按餘論云。傷寒下後自汗。虛熱不已。白虎加蒼朮人參。一服如神。汗止身涼。此通變之法也。如此。則汗下之後。熱不退。乐問有汗無汗。均宜白虎加蒼朮解之。又加人參亦妙。仍服涼膈解毒調之。）

夫傷寒者。前三日在表。法當汗。可用雙解散。連進數服必愈。若不解者。病已傳變。後三日在裏。法當下。殊不知下之太早。則表乘虛入裏。遂成結胸、虛痞、懊憹、斑疹、發黃之證。輕者必危。危者必死。但當以平和之藥。宣散其表。和解其裏。病勢或有汗而未愈。或無汗而愈。當用二小柴胡涼膈天水三藥合而服之。

病若半在表。半在裏。法亦當和解。三小柴胡涼膈主之。

若裏熱微者。則當微下。四大柴胡合解毒湯主之。熱勢未退。又以大柴胡合三一承氣下之。兩除裏表之熱。病至七八日。裏證已甚。表熱漸微。脈雖浮數。則以三一承氣合解毒下之。

其病胸膈滿悶。或喘或嘔。陽厥緊甚者。七可用瓜蒂散涌之。

汗吐下三法之後。別無異證者。涼膈散調之。

病熱已去。微熱者。以益元散服之。無令再病。此傷寒治法之大要也。

或傷風自汗。脈浮緩者。十雙解去麻黃以汗之。

其病半表半裏。十一白虎湯和解之。

病在裏。脈沉細者。無問風寒暑濕。或表裏證俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痞滿譫語煩躁。畜熱內蓄。但是脈沉者。並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗。解以白虎湯。（直指云。夏至後宜用此湯。又至後不用白虎。宜平局方云。立秋後不用白虎湯。又至後不用平。却用許學士之耳。）

白虎解後。以五苓合天水調之。多進數服。無妨。或服服滿脈沉者。亦當承氣合解毒徹下之。

或發汗之後。熱不解。脈尚浮者。十六白虎加蒼朮再解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此證。以致身冷脈微。昏憒將死。切不得以寒藥下之。誤下即死。又一證虛腎妄言是陰厥。便欲易換。用玄武四逆溫熱之劑投之。下咽立死。殊不知此證。乃陰耗陽竭。陰氣極弱謂之耗。陽厥極深謂之竭。蓄熱悶將欲絕者。當此之證。寒劑熱劑。俱不可投。但進涼膈解毒。十七以發陰退陽。宣散蓄熱。脈氣漸生。得大汗而愈。有無汗氣和而愈者。

未愈。却解毒合承氣十八下之。次以解毒涼膈天水合而爲一。十九調和陰陽。洗滌腸腑。則其他別證自不生矣。

有大下之後。熱不退。再三下之。熱愈盛。若下之不愈。脈微。氣虛力弱。不加以法。則無可生之理。若輟而不下。亦死。發者到此。活人殺人一彈指間。其不至手足失措者幾希矣。（直指云。傷寒汗後。汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎加蒼朮湯再解之。又按餘論云。傷寒下後自汗。虛熱不已。白虎加蒼朮人參。一服如神。汗止身涼。此通變之法也。如此。則汗下之後。熱不退。乐問有汗無汗。均宜白虎加蒼朮解之。又加人參亦妙。仍服涼膈解毒調之。）

夫傷寒者。前三日在表。法當汗。可用雙解散。連進數服必愈。若不解者。病已傳變。後三日在裏。法當下。殊不知下之太早。則表乘虛入裏。遂成結胸、虛痞、懊憹、斑疹、發黃之證。輕者必危。危者必死。但當以平和之藥。宣散其表。和解其裏。病勢或有汗而未愈。或無汗而愈。當用二小柴胡涼膈天水三藥合而服之。

病若半在表。半在裏。法亦當和解。三小柴胡涼膈主之。

若裏熱微者。則當微下。四大柴胡合解毒湯主之。熱勢未退。又以大柴胡合三一承氣下之。兩除裏表之熱。病至七八日。裏證已甚。表熱漸微。脈雖浮數。則以三一承氣合解毒下之。

其病胸膈滿悶。或喘或嘔。陽厥緊甚者。七可用瓜蒂散涌之。

汗吐下三法之後。別無異證者。涼膈散調之。

病熱已去。微熱者。以益元散服之。無令再病。此傷寒治法之大要也。

或傷風自汗。脈浮緩者。十雙解去麻黃以汗之。

其病半表半裏。十一白虎湯和解之。

婦人證治皆然。惟孕婦三四月并七八月不用硝。其餘月分用之無妨。

小兒減劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙。後之學者。其慎實之。

〔第一〕健解散

防風通聖散

防風去蘆川芎　當歸婦　赤芍藥
石膏　黃芩去腐桔梗一兩甘草二兩
右爲散。每服三錢。水一盞。薑三片。煎六分。溫服。大黃芒硝麻黃三味對證。旋入自利。去大黃芒硝。自汗去麻黃。

天水散　益元　六一
滑石六兩甘草一兩
右爲末。每服三錢。溫蜜水調。暑月冷水亦可和解。傷寒傷風發汗。蔥白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。調四五錢。并三服。解利爲度。加薄荷尤妙。

通聖合益元
右七兩和勻。每服三錢。水一盞半。蔥白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。調四

〔第二〕小柴胡湯

小柴胡湯

北柴胡三兩黃芩　人參　半夏
右爲散。每服五錢。

涼膈散

連翹二兩梔子　大黃　薄荷
右爲散。每服三錢。水一盞。煎七分。入蜜少許。

〔第三〕涼膈。合小柴胡。

〔第四〕大柴胡。合黃連解毒湯。

大柴胡湯

柴胡去苗大黃中兩黃芩　白芍藥一兩甘草　芒硝
右爲散。分三服。水一盞半。生薑三片。大棗一枚。煎半盞。溫服。

黃連解毒湯

黃連　黃檗　黃芩　梔子等分
右爲散。每服半兩。水一盞。煎五分。溫服。

〔第五〕大柴胡合三一承氣湯。

三一承氣湯

大黃　芒硝　厚朴　枳實各半兩甘草一兩
右剉。每服二錢半。水一大盞。薑三片。煎六分。入硝。再煎一二沸。

〔第六〕承氣合解毒湯。

〔第七〕瓜蒂散。

瓜蒂　赤小豆等分
右爲末。豆豉湯調下一錢。未吐再服。

〔第八〕涼膈散。

〔第九〕益元散。

風

〔第十〕健解散。

〔第十一〕白虎湯。

知母四兩甘草一兩粳米一合石膏四兩
右剉。每服五錢。水一盞。煎六分。溫服。

〔第十二〕承氣合解毒湯。

暑

〔第十三〕白虎湯。

〔第十四〕五苓散合天水散。

五苓散

豬苓　茯苓去皮官桂一分澤瀉一兩白朮一錢　活人書三分宣明論中錄
右細末

〔第十五〕承氣合解毒湯。

〔第十六〕白虎湯加蒼朮。

〔第十七〕涼膈合解毒湯。

〔第十八〕解毒合承氣湯。

〔第十九〕解毒涼膈天水合。

結胸

大陷胸湯

大黃　芒硝三錢甘遂三字七
右剉四錢。水一盞。煎。大黃六分。內消再煎。一二沸內甘遂。溫服。未利。再與。

小紹胸湯

半夏四錢生薑切　黃連二錢枯梗實各中錢

右剉。水三鍾煎枯梗至鍾半。內黃煎至一鍾。分作兩服。

大陷胸丸

大黃半兩芒硝二錢　杏仁十二枚去皮尖

右大黃爲末研。芒硝杏仁爲脂。圓如彈子大。甘之來三字。蓝半匙。水一盞煎半盞。溫服一丸。一宿乃下。未利再與。

〔第二十一〕小柴胡合小紹胸湯。

〔第二十二〕承氣湯。

大黃酒炒　芒硝研冲　厚朴去皮炙　枳實各中

右剉如麻豆大。分一半用水一碗半。生薑三片。煎至六分。納硝煎。一二沸。放去滓。熱服。

〔第二十三〕解毒湯。

發斑

〔第二十四〕涼膈散加薑蜜。

發黃

〔第二十五〕茵蔯湯調五苓散。

茵蔯湯

茵蔯一兩　大黃半兩　梔子十箇

右剉。水二盞煎一盞。溫服。利爲度。

〔第二十六〕茵蔯合承氣。

煩心不睡

〔第二十七〕梔子豉湯。

梔子七箇　豆豉二合

右水二盞。先煮梔子盞半。內豉煮半盞。

〔第二十八〕五苓空腸煎。涼膈加枯梗枳殼。

剛柔二痙

〔第二十九〕承氣合解毒湯。

汗後煩渴

〔第三十〕涼膈減桂　五苓　甘露　蓋口

甘露飲

茯苓　寒濕　甘草　石斛　寒水石二兩　白朮　桂枝　猪苓半兩　滑石四兩

右爲末。每服三錢。湯調。或煎汲水。蜜湯尤妙。

右共十八方。如無大承氣。係第五三一承氣代之亦妙。通三十九件藥味。調理傷寒。曲盡其妙。百發百中。後之學者。詳辨慎施。書而用之。起沉痾於指掌。筮奇功以活人。方知其妙也。

新增病後四方

小半夏湯。治汗下後嘔吐不已。

半夏五兩　赤茯苓三兩

右剉。每服半兩。水二盞煎至一盞。投蓝汁更煎一二沸。

五味子湯。治汗下後氣閉咳嗽。

五味子半兩　麥門冬　人參　杏仁

陳皮　生蓝一錢　數子二枚

右剉。每服二錢。水二錢煎一錢。作二服。

大橘皮湯。治汗後胃虛。

陳皮　甘草一兩　人參二兩

右剉。每五錢。水盞半。蓝二片。煎至一盞。溫服。

赤茯苓湯。治胸膈痞悶。頭痛已得汗者。

陳皮　甘草　人參　半夏　川芎　白朮等分

右剉。每服五錢。水盞半。蓝三片。煎一盞。溫服。

傷寒心要餘論

五臟六腑。應五運六氣。凡病微則當其本化。甚則兼其鬼賊之化。亢則害。承乃制。微則是其本經本臟之本化。遊化之化也。病甚則如金賓不能制木。木則生火。木火者皆陽也。故風火多變化。則風熱相搏賊其命也。

臟腑之氣。應乎三陰三陽。實則行乎本化之氣瀉之。衰則行其勝已之氣瀉之。是爲殺其鬼賊也。

如諸陽畜熱。以涼膈合解毒服之。解散梅鹽。

如瀉火熱解毒調胃承氣是也。

如吐法用二仙散。

如調理傷寒。白虎涼膈合服解之。

傷寒三日以裏。速逆雙解。如無汗必是傳變。待三四日之間。以小柴胡解表裏之熱。仍間服白虎涼膈。熱七八日之間。欲下而表證猶在。以大承氣湯、大柴胡湯雙行并煎。攻裏發表。最爲穩當。若是溫熱內甚

自利者。止涼膈。卻進解毒。間白虎服之。或惡心乾嘔吐者。白虎大作一劑。調解毒末五錢服之即止。大小便不通。併有腹痛不能忍者。以無灰酒煎朴硝三兩。熱服即愈。亦按從治之法也。熱中伏寒下之已。或大承氣湯加木香瀉之尤妙。

傷寒久下。始病時。又誤服麻黃熱劑。大甚必致熱極。或有陽厥極深。身冷厥微。陽極似陰之證。庸醫以爲陰證是也。須當急救其陰。以白虎涼膈日進三服。厥氣漸生。身體漸温。然後以大承氣下之。夫大承氣救急之妙劑。如涼膈吐逆不利。宜令熱服。開其鬱結。利而即愈也。亦按從治之法也。

如傷寒汗下之後。自汗虛熱不止。於白虎湯加人參黃芪一服如神。汗止身涼。此法至妙。不容詳述。

如赤白痢。先服黃連阿膠丸。次服解毒湯。

傷寒挾瘀。破傷風。與傷寒治法一同。但以雙解涼膈白虎瀉心。此理傷寒之妙劑。

孕婦臨月可服。產元涼胎產後仍服。如血不盡。則以涼膈與四物合煎調理。經血甚者。大承氣合四物。乃滿中有補也。

涼膈同四物。名玉燭散。婦人產後之妙劑。

涼膈四物合大承氣湯。名三和湯。

大承氣合四物治婦人一切血積血熱等疾。加紅花尤妙。初生小兒。五七日有熱證。不得已。只以益元散。時時灌之。如小兒夜啼。用涼膈調之。肚餓隔宿服。

凡瘡瘍癰疽。涼膈加當歸治之。

707



傷寒證脈藥截江網

明 餘杭節菴陶 華述

傷寒

傷寒之病。非比雜科。乃大方脈之首務也。其間脈理精深。艮震無常。死生反掌。甚所難明。苟或有得治傷寒者。未免羊質虎皮。然則名醫盧隆。而實德則病矣。余早年肓學。昏昏如蠟燭。後得漢長沙張仲景先師治法所得石函遺著。名曰遺芳。秘玩而誦之。以開茅塞。手足舞蹈不自知也。數試數驗。豈不珍重哉。節恐吾老悖亦猶前之昏學。臨病無措。故將遺旨廻手得心訣法。纂以成集。名曰傷寒證脈藥截江網。存與朝夕備覽。以省己之愆。原夫傷寒之脈。浮大動數滑爲陽。沉澁弱弦微爲陰。其弦緊浮滑沉澁六者爲殘賊之脈。故諸脈作病。春弦、夏洪、秋毛、冬石、土緩爲四季之正脈。浮、沉、遲、數爲客主。左爲人迎、右爲氣口。呼出心肺爲陽。吸入腎肝爲陰。一呼一吸爲一息。寸口爲陽。尺澤爲陰。中爲關界。陽主氣。陰主血。血爲榮。氣爲衛。寒則傷榮。風則傷衛。理自然也。所謂傷寒之病。從皮入。先以皮膚肌肉。次入筋骨腸胃。專以浮、中、沉、遲、數。辨其陰陽寒熱。及表裏虛實。而斷之矣。諸浮爲在表。輕手于皮膚之上便得之。曰浮。諸重手于肌肉之下。筋骨之間。方得之。曰沉。屬陰。諸遲爲在臟。屬寒。諸數爲在腑。屬熱。陰陽寒熱虛實。用在有力無力中分。有力者爲陽爲熱爲實。無力者爲陰爲寒爲虛。雜病以弦爲陽。傷寒以弦爲陰。雜病以緩爲弱。傷寒以緩爲和。傷寒以大爲病進。以緩爲邪退。緩爲胃脈。有胃氣曰生。無胃氣曰死。傷寒病中有神脈。如脈中有力。即爲有神。神者氣血之先也。兩手無脈曰雙伏。一手無脈曰單伏。必有正汗也。寸口陽脈中。或見沉細者。但無力者爲陽中伏陰。尺部脈陰中。或見沉數者。爲陰中伏陽。寸口數大有力。爲重陽。尺部微而無力爲重陰。寸口細微如絲爲脫陽。尺部細微無力爲脫陰。寸脈浮而有力。主塞邪表實。宜汗。浮而無力。主風邪表虛。宜實。尺脈沉而有力。主陽邪在裏爲實。宜下。無力。主陰邪在裏爲虛。宜温。寸脈弱而無力。切忌發吐。尺脈弱而無力。切忌汗下。初按來疾去遲。名曰內虛外實。去疾來遲。名曰內實外虛。尺寸俱同。名曰緩。緩者和而生也。汗下後。脈靜者生。躁亂身熱者死。乃邪氣勝也。温之後。脈來欵止者。正氣脫而不復生也。純弦之脈。名曰負。負者死。按之解索。名曰陰陽離。離者死。陰病見陽脈者生。陽病見陰脈者死。

傷寒標本論治

病之有標本。猶草之有根苗。拔茅須連其茹。治病必求其本。標本不明。處方何據。所謂瞑目夜行。撫途路而可見矣。原夫六氣爲本。三陰三陽經爲標。病氣爲本。臟腑經絡受病爲標。先受病爲本。次受病爲標。且如尺寸俱浮者。太陽受病也。其經標本。膀胱小腸也。膀胱寒水爲本。其脈循脊上連風府。故頭疼脊強。小腸爲標。主發熱。其正多月時。在本者麻黃湯。在標者桂枝湯。餘月改用冲和湯也。尺寸俱長者。陽明受病也。其經標本。大腸與胃也。大腸爲標。燥金爲本。大腸與肺爲表裏。但發熱解肌湯。本脈絡鼻循目。故目痛鼻乾不眠。虛則汗解。實則大柴胡承氣選用。尺寸俱弦者。少陽受病也。其經標本。三焦與膽也。三焦相火本也。遊行乎一身。故微熱。足膽標也。其脈循脇絡耳。故耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。緣髭無出入之路。故從中治。證用小柴胡和解散而愈。其經有三禁。汗、下、吐。是也。尺寸俱沉者。太陰受病也。其經標本。肺與脾也。肺標脈循咽。脾本濕土。故腹滿咽乾。當得本治。宜泄。大柴胡承氣也。尺寸俱微沉者。少陰受病也。其經標本心與腎。君火爲本。心苗舌。故舌燥。標腎脈循肺。主口乾。故口乾舌燥。故在標者因身冷治。主姜附也。在本者宜下。三乙承氣。看微甚而用之。尺寸俱微緩脈陰受病也。其經標本。肝與心包絡也。風木爲本。下循陰器。故蹇縮。標心包絡。繫舌。故舌卷。大抵温之四逆輩。其四經。并前三經中。若有陽分傳來者。下之庶不誤也。

論傷寒正治逆治反攻寒熱辨

寒熱異假。不可不知。正治逆治。豈可不辨。假如熱病服寒藥。熱不退。後用熱藥而熱方退。假如寒病服熱藥而寒不退。後用寒藥而寒方退者。此爲從治也。從治者反攻也。治熱病以寒藥而愈者。逆治也。逆治者正治也。且反攻之法。人亦難曉者多。如寒病服寒藥而愈者。此陽極變陰。熱極反得水化也。熱病服熱藥而愈者。此陰極變陽。寒極反得火化也。蓋物極則反也。

論傷寒用藥法則

標本逆從之旣明。五劑之藥須用識。且如表汗用麻黃。無葱白不發。吐痰用瓜蒂。無豆豉不湧。去實熱用大黃。無枳實不通。温經用附子。無乾姜不熱。甚則以泥清水加葱白煎之。竹瀝無姜汁。不能行經絡。蓋導

無皂角。不能通祕結。非半夏姜汁。不能止嘔吐。非人參竹葉。不能止虛煩。非小柴胡。不能和解表裏。非五苓散。不能通利小便。非天花粉乾葛。不能消渴解肌。非人參麥門冬五味。不能生脈補元。非犀角地黃。不能止上焦之瘀血。非黃芪桂枝。不能實表固虛汗。非茯苓白朮。不能去濕助脾。非茵陳不能除黃疸。非承氣不能制定發狂。非枳桔不能除痞滿。非陷胸不能開結胸。非姜活冲和。不能治四時之感冒。身疼。非人參敗毒不能治。春瘟。非四逆不能救陰厥。非人參白虎不能化斑。非理中烏梅不能治蛔厥。非桂枝麻黃。不能除冬月之惡寒。熱隨汗解。非姜附湯。不能止陰寒之泄利。非大柴胡不能急用加減小青龍。分表裏而可汗下。此傷寒用藥之大法也。

傷寒統論受病之由

夫傷寒者。冬時天氣嚴寒。水冰地凍。而成殺厲之氣。正乃腎與膀胱。坎水用事。體虛觸冒之人。中而即病。曰傷寒。不即病者。乃寒毒藏于肌膚。此因腎水涸竭。春木無以發生。熱不能發泄。鬱蒸于內。遇感而發。至春變爲溫病也。雖曰傷寒。實爲熱病。非時行之氣。春應發而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。此非其時而有其氣。是一歲之中。長幼病皆相似者也。是時行不正之氣。非緣厲之氣。緣厲者疫病也。疫病者乃春分至秋分前。天有暴寒。皆爲時行之寒疫也。又有四時春變爲溫病。至夏變爲熱病。熱病重於溫病也。雖曰傷寒。實爲熱病。非時行之氣。春應發而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。此非其時而有其氣。是一歲之中。長幼病皆相似者也。是時行不正之氣。非緣厲之氣。緣厲者疫病也。疫病者乃春分至秋分前。天有暴寒。皆爲時行之寒疫也。又有四時之正氣者。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣嚴烈。此四時之正氣也。然正氣亦能爲病。春傷于風。夏必飧泄。夏傷于暑。秋必痎瘧。秋傷于濕。冬必咳嗽。冬傷于寒。春必溫病。總曰傷寒病。自外而入。或入于陽。或入于陰。非但始于太陽。終于厥陰。或有太陽傷者。或有傳至一二經而亡者。或有始終只在一經者。或有越經而傳者。或有入太陽不作變熱。便入少陰而成陰證者。或有直中陰經而成寒證者。緣經無明文。故多妄治。若三陽傳至三陰之陰證。外雖有厥冷。內有熱邪耳。若不發熱。四肢便厥。惡寒者。此是直中陰經之陰證也。蓋先起三陽氣分。傳入三陰血分。則熱深厥亦深矣。此亢則害。承迺制者歟。熱極反兼寒化也。先熱後厥者。傳經陰證也。故宜四逆湯溫之。

傷寒無陰證辨

傷寒無陰證。人傷于寒。則爲病熱。熱病乃汗病也。造化汗被胃腸氣也。冬時腎水用事。爲傷寒者。其風傷于榮衛。使人毫毛畢直。皮膚閉而爲熱。初入太陽。脈浮緊。腰脊強直。按至皮膚之上。下手便得。厥來浮緊有力。無汗爲傷寒表證。寒則傷榮血。冬用麻黃湯開發。換理表汗。除邪厥寒淨緩無力。有汗怕風爲傷風。風則傷衛氣。多用桂枝湯。充塞腠理。止汗散邪。其餘月時雖無惡寒。爲重也。消三時感寒。無汗。以羌活冲和。去地黃加紫蘇藿香。以發散之。有汗。用加減羌活湯。如用桔梗湯。止汗退邪。必加涼藥于中。免班出黃生之患。此謂無伐天和也。若將冬時正傷寒之藥。通治非時感寒熱。定爲害矣。

論傷寒難拘日數辨

假如一日至十三日。若有一毫頭痛惡寒者。每日如此。不論日數多少。尚有表證未解。亟用微汗。不可攻

裏。若攻下之。則爲結胸等證也。

一二日惡寒皆除。便覺胸中滿悶疼痛。大便閉。渴而不惡寒。反怕熱。熱入裏也。大柴胡承氣下之。切不可拘于日數。并始太陽終厥陰之論也。

二三日邪傳陽明。胃身熱目痛。鼻乾不眠。按至皮膚之下。肌肉之間。厥來微洪而長者。屬半表半裏。渴而無汗。葛根湯。渴而有汗。人參白虎湯。微微惡寒者。桂枝湯。若無頭疼惡寒。而反怕熱。便閉。燥渴。狂言。譫語。揭去衣被。揚手擲足者。此爲熱邪傳入陽明之本。脈來沉數有力。正宜承氣湯下之。泄去胃中實熱。燥屎而愈也。

三四日邪傳少陽。膈胸痞而耳聾。寒熱。嘔而口苦。按至半陰半陽。及脈來弦數者。是半表半裏也。緣膈無出入之路。用小柴胡。其邪有三禁。汗下吐也。蓋陽明與少陽三經。不從乎中治也。中者半表半裏。兩陽交中。名曰少陽也。

四五日邪傳太陰脾。腹滿咽乾。口燥而渴。按至筋骨之間。脈來沉而有力者。桂枝大黃湯。若不渴自利。身無熱。脈來沉緩無力者。四逆湯溫之也。

五六日邪傳少陰腎。口乾口燥。重指按至筋骨之間。脈來沉而有力者。正用大柴胡承氣下之。若發渴自利。渴水不多。腹脹者。亦當下之。俱是陽邪傳入陰經之陰證也。若有一時初起。不入太陽。竟入太陰。無頭疼身熱。便見四肢厥冷。怕寒。或腹痛自利。小便清白。脈沉無力。或脈全無者。此是直中陰經之陰證也。非是三陽傳來。急用附子理中湯溫之。脈沉有二。陰陽寒熱虛實。用在有力無力中分。有力爲熱。無力爲寒。又有少陰太陽二證相併。脈沉無力。當無熱。今反有熱。如不頭痛者。陰證反陽也。麻黃細辛湯。身發熱。脈當浮大。今反沉細。若有頭痛者。陽證反陰也。四逆湯主之。

六七日邪傳厥陰肝。煩渴。舌縮。舌卷耳聾。身不熱。大便閉。按至筋骨之間。脈實紋而有力。正用承氣下之。此邪從三陽傳入三陰。外有厥冷。內有邪熱耳。如脈微而無力。腹痛自利。不渴。四肢厥冷怕寒者。眞陰寒證也。附子理中湯溫之。口中出沫流涎者。亦寒也。茱萸理中湯主之。

傷寒陽厥陰厥辨

陽厥。脈沉而有力。腹痛後重。大便糊粘。小便赤澀。或大便不通。必是先熱後發厥也。其四肢雖冷。上不過肘。下不過膝。此熱深陽厥也。承氣湯下之。陰厥。脈沉而無力。口不渴。四肢痛甚。及大便滑利。小便清白。而身怕寒。面如刀刮。四肢厥冷。上過乎肘。下過乎膝。此陰厥也。四逆湯治之。兩陽交證。名曰厥陰也。大抵三陰無傳經。胃實熱。可下也。又有傷寒兩感。寒病爲巨陽老陰也。

看傷寒證證內外須知

大抵傷寒先須識證。察得陰陽表裏。虛實寒熱。親切。復審汗吐下溫和解之法。治之庶無差誤。先看兩目。次看口舌。後以手按其心胸至小腹。有無痛滿用藥。如目皆黃。必爲欲愈之病也。眼胞忽赮。目睛直視。必難治也。開目欲見人。屬陽。閉目不欲見人。屬陰。目睛不明。神水已竭。不能照物者。亦難治也。

次看口舌。上有白胎者爲熱。見黃胎者爲熱甚。見黑胎及生芒刺者。必死。

後按其心胸有痛而滿悶者。亦宜攻下之。爲表邪尚在少陽部分。只用小柴胡湯加枳殼桔梗等藥。如其心下滿痛甚者。已經下矣。爲結胸。正用陷胸湯。看微甚而用之。陷胸宜從緩治。結胸證。須臾手足厥冷者死也。

如小腹覺有硬痛。當按其痛。更問其小便通利若何。如通則知畜血下焦。宜破瘀血用桃仁承氣湯。蓋黑物爲好。如小便不通。則知津液留結。宜五苓散。如木通山梔治之。

但發熱惡寒。頭痛腰脊強。脈浮。不拘日數。即是太陽表證。浮緊有力。無汗。爲傷寒。宜發汗。浮緩無力有汗。爲傷風。宜實表。

但見肢痛。咽乾而渴。身無熱。手足温。脈沉有力。明是熱邪傳來太陰裏證。宜當下之。如肢痛。自利不渴。是太陰自受陰也。宜當温之。

但見口燥咽乾而渴。妄語。怕熱。大便閉。或微利清水而大渴。脈沉有力。明是熱邪傳來少陰裏證。不拘日數。即宜下之。如肢痛。泄利。嘔吐。怕寒。手足厥冷。不渴。脈沉無力。此是少陰直中。自受內寒。陰證。急用温之。

但見舌卷囊縮而渴。身不熱。外雖四肢微冷。內有實熱。脈來沉緩有力。或大便閉實。明是熱邪傳來厥陰之證。即宜下之。如肢痛。泄利。嘔吐。怕寒。四肢厥冷。小便清利。脈微無力。此是厥陰自中其寒證也。急宜温之。俱照前六經中用藥。其一切躁渴。大便閉。發狂。譫語。腹滿。微厥。斑血證。脈來有力者。俱是從三陽邪熱傳入三陰裏證。宜當下之。輕重用藥無疑。如寒當急温之。不可緩也。有傷寒一日傳二經爲兩感。三日傳盡必死。再傳止于六日。夫兩感發于表者。麻黃葛根湯也。攻裏者。調胃承氣湯也。如未盡善。須問病者有無痛處。大小便通利。若胸痛者爲結胸。不痛者爲痞氣。乃因下早而成也。未經下者。非結胸也。乃表邪傳至胸中。症雖痛悶。尚有表邪未及乎腑。正屬少陽部分。用小柴胡湯加枳殼以治之。如未效。以本方加小陷胸湯。服之而愈。痛甚者。大陷胸湯下之。

論傷寒傳足不傳手之誤

傷寒傳足不傳手。此謬言也。人之一身無非血氣。且風行水動。氣行血流。豈夜間證而運行不息。豈有不傳手經哉。何所據也。冬月腎水用事。天氣嚴寒。則足少陰太陰正司受傷。三經最多。其次是少陽厥陰。肝膽繼冬而施春令。蓋風木起于大寒之次。即正當十二月中至春分。方行温令。故風寒傷之。足陽明太陰脾胃中土。中土無定位。無成名。寄旺于四時。寒熱之氣。皆能傳也。其邪亦歸于胃。其手之經主于足。故不傷也。若言傷足不傷手。正理也。若言傳足不傳手。非理也。

論傷寒六經變正法

夫六經傳變所由。必須緊記。頭不釋手可也。且如鄭聲者。手足鄧重。冷而爲虛也。譫語有虛有實。虛則失血亡陽。實則內熱便閉。脾約者。大便硬而小便利。水穀不化。讀寒也。久利不止曰腸癖。傷寒十三日不好。曰過經。吐長蚘曰蚘厥。陰厥發燥曰陰燥。手足冷者。爲之厥。指頭微寒情之緩。汗吐下温不好曰壞證。又

若何爲逆。逆面有四。或發青。或發黑。或變爲風搐。或變爲温疫。此四者是也。發汗出不止曰漏風。亦爲亡陽。大下損血過亡陽。陽證汗出不止曰亡陽。大抵皆無汗。其有汗者。曰亡陽。三月至夏方發。爲晚發。多感寒而寒發者。曰温病。非時暴寒伏于少陰之經。明痛下利。名曰胥傷。寒發汗後身灼熱者。曰風温。名中暍。感四時不正之氣。老幼相似者。爲疫癘。病癒後必發者。曰勞復。病癒後多食而發者。曰食復。病癒後發熱者。曰遺熱。吐利交作曰霍亂。鼻中出血曰衄。逆心中懊憹不安而悶者。曰嘔。大便挾塞下利曰腸垢。大便堅硬曰結。心振寒而動曰悸。渴欲水而吐曰水逆。心中懊憹皮膚不知痛癢者曰不仁。振握而動曰肉瞤筋惕。臍下有動氣曰奔豚。上有吐者曰湧之。下利者曰逆之。手足躁擾者曰煩。飛四肢風病曰末疾。厥而下利。當不食。及能食者曰除中。三陰無合病。三陽俱病者曰合病。二陽先病。後一陽自病曰併病。洩泄之所曰溲曰理。婦人之中二曰理也。

論傷寒見證識病法

傷寒之病。從表入裏。裏必地外見證之由所屬。必相審。治療無誤也。且如頭痛項強者。太陽證也。頭搖者。裏病也。頭汗者。裏有瘀血。必發黃也。面戴陽者。下虛也。面慘不光。傷寒也。面光不慘。傷風也。面上乍黑乍白。唇口生瘡。狐惑也。面如錦紋者。陽毒也。口難言。血少也。舌上有白胎黃胎。內熱也。或黑者。熱極也。鼻燥。漱水不下。或目瞑。漏血也。目睛黃。小腸熱也。懊憹者。胃虛也。喜噩如狂。蓄血也。肉瞤筋踠。汗下虛也。身如被杖。陰毒也。一身盡痛。多脈。或微細難轉者。風濕也。身目俱黃。濕熱瘀病也。身如蟲行。表虛也。背惡寒。陰虛也。上實下虛也。舌上生瘡。上實下虛也。舌上生瘡。熱盛也。利者熱盛也。又手胃心因汗多而血虛也。腹滿手足温者。邪入厥陰也。

論傷寒有證見之必死法

夫傷寒死證。一一須明。生死不明。將何措手。非惟有干名節。亦且投藥無用。且赤斑者五死五生。黑斑者十死一生。陽證見陰脈者死。發少陽汗。違厥陰血者。厥鴟而死。發左右逼氣汗者。譫過六七日死。太發濕家汗。或痙熱而強者死。發熱發少陽汗。譫語者死。發温家汗。爲重暍者死。兩感傷寒者死。有汗不爲汗疫。爲陰陽交者死。結胸證悉具煩躁者死。狂言不食者死。發安者。口膿厥而死。結胸舌上生胎。爲膿結者死。咳逆不止者死。舌卷囊縮者死。少陰吐利煩躁四逆者死。結胸證煩躁悉具者死。少陽與陽明合病。下利脈長大。名曰負。負者死。目亂無神。氣無精者死。男子病新瘥。婦人與之交。曰陽易。婦人病新瘥。男子與之交。曰陰易。男子陰腫小腹痛。婦人裏急逆腰股腫痛。婦人裏急逆腰股腫。婦人病新瘥。男子與之交。曰陰易。男子陰腫小腹痛。婦人裏急逆腰股腫痛。四肢拘急。爲女勞復者死。厥利本不能食。反能食。爲除中者死。傷寒七八日大發熱。汗出不止。如貫珠。此本氣衰者死。爪甲青。爲陽衰者死。循衣摸床。嚂而不休。衝氣絕者死。柔汗爲冷。汗出發黃者。乃脾絕也。死。瘈口黎黑。厥絕也。死。直視搖頭。心絕也。死。面黑遺尿。腎絕也。吻反青。乃肝絕也。死。瘈如鼻衄。肺絕也。死。身體如疆。正氣脫也。死。喘而不休。邪氣勝也。死。水漿不下。胃氣絕也。死。形憒不仁。榮衛不行也。死。乍靜乍

亂者死也。

論婦人傷寒與男子不同治法

且夫天地陰陽各有分位。傷寒雜病豈無各科。男婦何可同治也。男子調氣爲主。女子養血爲先。女子血畜。則血室不畜。二氣和平。一有凝結。水火相刑。凡氣口緊盛者。卽宜下。人迎緊盛者卽宜汗。但婦人左關浮緊者不可下。當發汗以救血室。榮衛得和。津液得行。汗出而解。凡婦人經水適斷。證則明了。舌則謬語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上中二焦。言無犯胃氣者。謂不可下也。以小柴胡湯主之。若行陽運則熱入胃。令津液燥。中焦上焦不榮。成血結胸。須針期門可也。但婦人傷寒。發熱惡寒。四肢拘急口燥舌乾。經脈凝滯。不得往來。以桂枝紅花湯。

若傷寒口燥咽乾。不思飲食。以黃芩芍藥湯。

若傷寒喘急煩燥。戰而作寒。陰陽俱虛。不可下也。以小柴胡湯主之。若傷寒經水適來。邪乘虛而入。證則明了。舌則謬語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯上中二焦胃氣者。宜小柴胡湯。

若傷寒證後猶有餘熱不去。謂之遺熱。宜地黃湯主之。

論妊婦傷寒又與前證有易法

黃帝內經曰。有故無殞也。大積大聚不可犯也。損其太半而止。過則殺也。且妊婦傷寒。保胎宜阿膠散。大妊婦傷寒。仲景無治法。最宜避忌諸藥。不可以尋常例視之。凡妊婦用安胎飲。散寒邪。以白朮湯。

妊婦增寒壯熱。宜發其汗。以芎藥湯。

妊婦或中時行酒淅寒熱。作寒振慄而悸。如瘧者。宜蘇木湯。

妊婦傷熱。嘿嘿欲眠。不欲食。臍下痞。嘔逆。漿氣及產後病傷風。熱入胞宮。寒熱如瘧。幷經水適來適斷。病後勞復。餘熱不解。以黃芪湯。

妊婦頭目眩疼。壯熱心躁。以旋覆花湯。

妊婦發斑。以梔子大青湯。

產後傷寒與胎前有別法

且產婦始生。氣血俱虛。外失衛護。內無主持。最宜調養。設受風寒。豈能救治。故與胎前不同。且產後十數日不解。頭痛惡寒。時時有熱。心下堅。乾嘔汗出。以陽旦湯。

產婦忘津液。大便多秘。或譫語煩燥。宜服神功丸。

產婦頭疼身熱。兼腹內拘急痛疼。以桂心牡礪湯。

產婦傷風發熱。而赤而喘。頭痛。以竹葉防風湯。

明 徐杭節庵陶 華述

傷寒一提金

一提金啓蒙

余謂初學醫者。先熟藥性。次明經絡。再識病名。然後講解脈理。以證其所生病。證脈相同。藥無不應。病家云發熱惡寒。頭項痛。腰脊強。則知病在太陽經也。身熱目痛。鼻乾不得眠。則知病在陽明經也。胸脅痛。耳聾。口苦。舌乾。往來寒熱而嘔。則知病在少陽經也。腹滿。咽乾。手足自温。或自利。不渴。或腹滿時痛。則知病在太陰經也。引衣蹈臥。惡寒。或舌乾口燥。則知病在少陰經也。煩滿。囊縮。則知病在厥陰經也。潮熱。自汗。譫語。發渴。不惡寒。反惡熱。揭去衣被。揚手擲足。或發斑黃。狂亂。五六日不大便。則知病在正陽明胃腑病也。設若脈證不明。誤用麻黃。令人汗多亡陽。誤用承氣。令人大便不禁。誤用姜附。令人失血發狂。正爲寒涼耗其胃氣。辛熱損其汗液。燥熱助其邪熱。庸醫殺人。莫此爲甚。傷寒之邪。實無定體。或入陽經氣分。則太陽爲首。其脈必浮。輕手便得。或入陰經血分。則少陰爲先。其脈必沉。重手方得。浮而有力無力。是知表之虛實。沉而有力無力。是知裏之寒熱。中而有力無力。是知表裏緩急。脈有浮沉虛實。證乃傳變不常。治之之法。先分表裏寒熱陰陽虛實。標本先病爲本。次病爲標。先以治其急者。此爲上工。問證以知其外。察脈以知其內。全在活法二字。不可拘於日數。但見太陽證在。直攻太陽。但見少陰證在。直攻少陰。但見其寒。直救其寒。但見三證具。便作主張。不必悉具。當如何處治。此爲活法。若同面異者明之。似是而非者辨之。在表者汗之散之。在裏者利之下之。在上者因而越之。下陷者升而舉之。從乎中者和解之。直中陰經者温補之。若解表不開。不可攻裏。日數雖多。但有表證而脈浮者。尚宜發散。此事不明。攻之爲逆。經云一逆尚引日。再逆促命期。若表證解而裏證具者。不可攻表。日數雖多。但有裏熱證而脈沉實者。急當下之。此事不明。融如反掌。經云邪熱未除。復加燥熱。抱薪積火矣。如直中陰經。真寒證。然無熱惡寒。不渴。急宜温補。切禁寒涼。此事不明。殺人甚速。經云非徒無益而反害之。陰證似陽者温之。陽證似陰者下之。陰厥者温之。湯熱發黃者利之下之。血證發黃者清之者分輕重下之。陰毒者分緩急温之。陽狂者下之。陰厥者温之。結胸者解之下之。太陽證似少陰者温之。少陰證似太陽者汗之。衄血者解之止之。發喘者汗之下之。咳嗽者利之解之。直傷寒者大汗之大下之。咸胃暴寒者微汗之微下之。勞力感寒者温散之。温極病者微解之大下之。此經常之大法也。有病一經已用熱藥。而又用寒藥。如少陰證。用白虎湯四逆散寒藥者。庸俗狐疑詎能措手哉。嗚呼。能詳傷寒之證名。而得傷寒之方脈。如此親切。乃爲良醫。是知寒藥治少陰。乃傳經熱證也。是知熱藥治少陰。乃直中陰經之寒證也。辯名定經。則脈識證。驗證用藥。真知在表而汗。真知在裏而解。壞證也。新發者始病也。老者血氣衰。少者血氣壯。緩者病之輕。急者病之重。寒藥熱服。熱藥涼服。其中和之劑。温而服之。戰汗分爲四證。要知邪正盛衰。類傷寒四證。照常法則治之。雖云發蒙。實登仲景之梯階也。余雖專傷寒科。必出乎庸俗訪誕之醫萬萬。且余一生所著肺腑家秘訣句方法。俱已備載發揮。窺我門牆者雖有多人。然片言不繁之要。不得再四經目講明。故述啓蒙提法。脈要貫珠數。一一開註。明白所示。自宜謹愼深密。勿授受於非人。毋輕泄於澆薄。莫負我之用心耳。

一提金六經證治提法

太陽經見證法

頭項痛。腰脊強。發熱惡寒。惡心。是足太陽膀胱經受證。假如先起惡寒者。本病已後發熱者。標病。若有一在頭痛。惡寒。身熱。不拘日數多少。便宜發散。自然熱退身涼。有何變證。

診脈法

脈浮緊有力。爲傷寒。

脈浮緩無力。爲傷風。

辯證法

表虛自汗者。爲風傷衛氣。宜實表。

表實無汗者。爲寒傷榮血。宜發表。

用藥法

冬月正傷寒用升陽發表湯。卽加減麻黃湯。

冬月傷風。用疎邪實表湯。卽加減桂枝湯。

春秋無汗。用羌活冲和湯發表。有汗用加減冲和湯實表。

夏月無汗。用神朮湯。有汗用前加減冲和湯。

陽明經見證法

目痛。鼻乾。不眠。微惡寒。是足陽明胃經受證。假如先起目痛。惡寒。身熱者。陽明經本病。已後潮熱。自汗。譫語。發渴。大便實者。正陽明胃腑標病。本宜解肌。寒宜急下。只看消息用之。

辯證法

目痛。鼻乾。微惡寒。身熱。病在經。

潮熱。自汗。譫語。發渴。便實。不惡寒。病在腑。

診脈法

脈見微洪。爲經病。

脈見沉數。爲腑病。

用藥法

微惡寒。自然目眶痛。鼻乾。不眠者。用柴葛解肌湯。卽加減葛根解肌湯。渴而有汗不解者。如神白虎湯。卽加減白虎湯。

潮熱。自汗。譫語。發渴。揭去衣被。揚手擲足。斑黃狂亂。不惡寒。反怕熱。大便實者。輕則大柴胡湯。重則三承氣選用。俱在祕方六一順氣湯內加減治之。

少陽經見證法

耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。是足少陽膽經受證。假如先起惡寒。身熱。耳聾。脅痛者。本病。已後嘔而舌乾。口苦者。標病。緣膽無出入。傷在半表半裏之間。止宜小柴胡一湯加減。和解表裏。治之。再無別湯。本方自有加減法。此經有三禁。不可汗、下、吐也。若治之得法。有何壞證。常須識此。宜當審焉。

辯證法

耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。是足少陽膽經受證。假如先起惡寒。身熱。耳聾。脅痛者。本病。已後嘔而舌乾。口苦者。標病。緣膽無出入。傷在半表半裏之間。止宜小柴胡一湯加減。和解表裏。治之。再無別湯。本方自有加減法。此經有三禁。不可汗、下、吐也。若治之得法。有何壞證。常須識此。宜當審焉。

診脈法

脈見弦數。本經證。

用藥法

耳聾、脇痛、寒熱、嘔而口苦。舌乾者。用柴胡雙解飲。卽加減小柴胡湯。

太陰經見證法

腹滿。自利。津不到咽。手足溫者。是足太陰脾經受證。假如先起腹滿。咽乾者。本病。已後身目黃。標病。內有寒熱所分。不可混治。臨病之際。用在得宜。

辯證法

腹滿。咽乾。發黃者。屬腑熱。

自利。不渴。或嘔吐者。屬臟寒。

診脈法

脈見沉而有力。宜當下。

脈見沉而無力。宜當溫。

用藥法

腹滿。咽乾。手足溫。腹痛者。桂枝大黃湯。卽加減桂枝湯。身目黃者。茵陳大黃湯。卽加減茵陳湯。

自利。不渴。或嘔吐者。加味理中飲。卽加減理中湯。重則回陽救急湯。卽加減四逆湯。

少陰經見證法

舌乾口燥。是足少陰腎經受證。假如先起舌乾。口燥者。本病。已後譫語。大便實者。標病。至陰經。則難拘定法。或可溫而或可下。因分疏中者寒證。傳經者熱證。是其發前人之所未發也。

辯證法

大要口燥。舌乾。渴而譫語。大便實者。知其熱。須詳嘔吐。瀉利。不渴。或惡寒。腹痛者。別其寒。

診脈法

脈見沉實有力。宜當下。

脈見沉遲無力。宜當溫。

用藥法

口燥。咽乾。渴而譫語。大便實。或遺溺硬痛。或下利純清水。心下硬痛者。俱是邪熱氣湯。分輕重下之。卽承氣湯有加減法。無熱。惡寒。厥冷。蜷臥。不渴。或腹痛。嘔吐。瀉利。沉重。或陰毒。手指甲唇青。嘔逆絞痛。身如被杖。面如刀刮。戰慄者。俱是寒邪中裏便然。急用回陽救急湯溫之。卽四逆湯。有加減法。

厥陰經見證法

頰滿。蠱挛者。是足厥陰肝經受證。假如先起消渴。頰滿者。本病。已後舌卷。蠱縮者。標病。亦有寒熱兩端。不可概作熱治。

辯證法

頰滿。蠱挛。消渴者。屬熱。

口吐涎沫。不渴。厥冷者。屬寒。

但覺不暢清便必自愈。

診脈法

脈沉實者宜當下。

脈沉遲者宜當温。

脈浮緩者病自愈。

用藥法

消渴煩滿舌卷縮大便實手足乍冷乍温者急用六乙酌氣湯下之即承氣湯有加減法口吐涎沫或兩脚厥冷不温過乎肘膝不汗小腹絞痛嘔逆者急用萊菔四逆湯温之即回陽救急湯自有加減法

一提金脈要

或人問曰治傷寒先明脈證脈證不明取方無法脈證既明工中之甲夫脈之一字實先天後天之造化交泰降至春分冬月發者爲正傷寒表證見者用辛熱之藥大發汗裏證見者用寒涼之藥急攻下此與非時傷寒不同治方論開的本樞法中不再錄

提金質珠數

交泰分至夏至前有頭疼發熱不惡寒而渴者爲温病用辛涼之藥微解肌不可大發汗裏證見者用寒涼之藥急攻下若誤下之禾必爲害誤汗之變不可言當須識此三月後得此證者爲晚發治法同表證不與冬時正傷寒同治法裏證治相同方論開在的本樞法中不再錄

交夏至後有頭疼發熱不惡寒而渴此名温病愈加熱者名熱病止用辛涼之藥微解肌不宜大發汗裏證見者止用大寒之藥急攻下表證不與正傷寒同治法裏證治相同方論開在的本樞法中不再錄

及秋至霜降前有頭疼發熱不惡寒身體痛小便短者名温病亦用辛涼之藥加燥劑以解肌亦不宜大發汗裏證見者用寒涼藥急攻下表證不與正傷寒同治法裏證治相同方論開在的本樞法中不再錄

其春夏秋三時有患頭疼身熱亦有惡寒者即是感冒非時暴寒之輕非比冬時正傷寒之重俱用辛涼之劑小發汗若裏證見者用寒涼之藥急攻下表證不與正傷寒同治法裏證治相同方論開在的本樞法中不再錄

俱是沉脈妙在指下有力無力中分有力者主熱邪在裏爲裏實宜和解前之所云陰陽表裏虛實寒熱俱在浮中沉三脈有力無力中分有力者爲陽爲實爲熱無力者爲陰爲虛爲寒若浮沉中之不見則委曲而求之若隱若見則陰陽伏匿之脈也三部皆然或曰君之了然非庸俗所能識也其三脈中有進退焉有伏脈焉有可解不可解焉有燥至焉有燥亂焉請備言其所由答曰脈大者爲病進大則邪氣勝而正氣無權若先起頭疼發熱惡寒已後傳裏頭疼惡寒皆除而反怕熱發渴譫語或潮熱自汗大便不通或揭去衣被搔手擲足或發斑黃狂亂此爲陽經自表傳入陰經之熱證俱當攻裏下之設或當下失下而變出手足乍冷乍温者因陽極發厥即陽證似陰名陽厥急當下之又有失於汗下或本陽證誤投熱藥使熱毒入深陽氣獨盛陰氣暴絕登高而歌棄衣而走罵詈叫喊燥渴欲死面赤眼紅身發斑黃或下利赤黃六脈大名陽毒發斑證用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣如大便實者又當大寒之藥下之此與發狂不同治方論開在的本樞法中不再錄

若初病起無頭疼無身熱就便怕寒厥冷嘔吐瀉利不渴譫妄沉重戰慄脈沉細此爲直中陰經與寒證不從陽經傳來當用熱藥温之如寒極而手足厥冷過乎肘膝者因寒極發厥名陰厥急當救裏温之此與陽厥不同治又有初病起外感寒邪內傷生冷內既伏陰內外皆寒或本真陰誤投涼藥使陰氣獨盛陽氣暴絕以致病起手足厥冷腰背強重頭眼眶痛嘔吐煩悶下利腹痛身如被杖六脈沉細湯飲

予雖白首無窮生平仰慕不意邂逅幸獲開予茅塞正謂鑽鼠而發千鈞之弩甚所不當可謂切而磋琢

不下。已後毒氣漸深。入腹攻心。咽喉不利。腹痛轉甚。心下脹滿。結硬如石。燥渴欲死。冷汗不止。或時鄭聲。指甲面色青黑。速灸關元氣海。須臾大熱之劑溫之。此名陰毒。令陽氣復而大汗解矣。

一傷寒失於汗下。或因汗下後虛。令人氣逆。不相接續者。名短氣。分虛實治之。此與喘證不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒失於汗下。或因飲水過多。令人搖肩擺肚。氣逆上者。名發喘。分表裏水氣治之。此與短氣不相類。若夏月大發熱。頭疼。燥渴。背惡寒。微汗。脈虛無力。口齒燥者。名中暑。用寒涼之劑清之。方論開在雜證中。不再錄。

若病人。身微熱。煩燥。面赤戴陽。欲坐臥於泥水井中。脈來沉細無力。此陰盛燥。名陰燥。當用辛熱之藥溫之。不宜涼劑。誤用之。其燥急渴甚。必死矣。若病人身冷。脈沉細而疾。雖煩燥。不欲傾水入口者。此名陰盛格陽。亦用大熱之劑溫之。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒失於汗下。使熱邪傳裏。燥渴譫語。小水自利。大便黑。小腹硬痛。或身黃。是下焦畜血。如狂證。此與陽狂不同。治宜下盡黑物。則愈。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒初得病。與表熱。但狂言。煩燥不安。精采不與人相當。此因熱結膀胱。其人如太陽經之裏證也。自有太陽經之裏藥治。不與陽狂同治法。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒小水不利。大便實。小腹滿。燥渴譫語。怕熱。身目黃。此名濕熱發黃。輕則疎利。重則大下。此與血證發黃不同治。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒失於汗下。血熱不散。故成發斑。大抵不宜發汗。輕則化之。重則下之。起於胸腹。先紅後赤者。曰發斑。起於手足。先紅後黃者。曰蛟迹。臨病之際。宜詳審焉。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒少陰證。惡寒發熱。無頭疼。誤以大發汗。使血從耳目口鼻中出者。名陰血。多不治。此與鼻衄陽血不同治。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒有頭疼。發熱。惡寒。脈沉。此名太陽脈似少陰。當辛溫之劑散之。與少陰證不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒無頭疼。止則發熱。惡寒。脈沉。此名少陰證似太陽。當辛溫之劑散之。與太陽證不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒熱在胃口。與谷氣併。熱氣上蒸。無物。名乾嘔。分誉熱水氣治之。此與賊證不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒頭疼。惡寒。身熱者。名表熱。以辛散之。與裏熱不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒頭疼。身熱。惡寒者。名表惡寒。當辛甘散之。此與裏惡寒不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒無頭疼。身熱而惡寒。厥冷。踡臥。不渴。或吐瀉。腹痛。嘔惡不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒差後。交接淫慾。無病人反得病者。名陰陽易。宜清涼解毒之劑治之。此與女勞復不相類。方論開在的本提法中。不再錄。

一傷寒差後。交接淫慾。自病復發者。名女勞復。與前陰陽易同治法。方論開在的本提法中。不再錄。

傷寒瑣言

明 錢杭節菴陶 華逸

傷寒瑣言序

醫之爲道何道也曰君子之道也苟非存心有恆者可輕議哉何則夫藥之性能生人亦能殺人蓋操之不得其要則反生爲殺矣惟君子則然心不苟故其爲業必精及其臨病必詳以審故能化悲痛爲歡忻小人之性忽以貪貪則惟利是圖忽則輕忽視人命逮及臨病則誇以略不察病之虛實輒投瞑眩之藥不殺人也幾希吾固爲君子之道也予晚年得子方逾弱冠柔軟多病習懶不能自強必非能受此道者日夜痛心懼失吾發之後有病委之庸醫足可以傷生之道一旦夭扎祖宗之祀事絕矣豈爲人父之道哉某今年七十有七衰邁殊甚桑榆之日豈能久照日夜用心以纘成傷寒明理續編論法雖略備非有師承口訣不能融會貫通于心又著瘟言一卷文雖鄙俚然言簡意到其中包括仲景不傳之妙皆世所未嘗聞見剖露肺肝以發其蘊奧實升高之梯階常寶之如珠玉潛心玩繹搜索以盡厥旨有疑輒問不可因循務期日進高遠司馬溫公曰達則爲良相不達則爲良醫豈非君子之道乎汝宜服膺此訓敬愼而行之他日倘能以斯道濟人亦君子也若存心不古以吾言爲妄誕反以斯道殺人負吾之用心非吾之子也

傷寒瑣言

辯張仲景傷寒論

客有過予而問之曰甚矣傷寒之深奧桂枝麻黃二湯之難用也服之而愈者纔一二不愈而變重者皆不得其要則反生爲殺矣惟君子則然心不苟故其爲業必精及其臨病必詳以審故能化悲痛爲歡忻小人之性忽以貪貪則惟利是圖忽則輕忽視人命逮及臨病則誇以略不察病之虛實輒投瞑眩之藥不殺人也幾希吾固爲君子之道也予晚年得子方逾弱冠柔軟多病習懶不能自強必非能受此道者日夜痛心懼失吾發之後有病委之庸醫足可以傷生滅性孟子云不孝有三無後爲大有子多病不傳之以濟生之道一旦夭扎祖宗之祀事絕矣豈爲人父之道哉某今年七十有七衰邁殊甚桑榆之日豈能久照日夜用心以纘成傷寒明理續編論法雖略備非有師承口訣不能融會貫通于心又著瘟言一卷文雖鄙俚然言簡意到其中包括仲景不傳之妙皆世所未嘗聞見剖露肺肝以發其蘊奧實升高之梯階常寶之如珠玉潛心玩繹搜索以盡厥旨有疑輒問不可因循務期日進高遠司馬溫公曰達則爲良相不達則爲良醫豈非君子之道乎汝宜服膺此訓敬愼而行之他日倘能以斯道濟人亦君子也若存心不古以吾言爲妄誕反以斯道殺人負吾之用心非吾之子也

無缺疑正誤之言。以致將冬時傷寒之方。通解溫
也。我朝宋景濂學士。嘗嘆傷寒論。非全書。得其旨
之經。此經行身之後。自頭貫脊。乃有頭疼脊強惡
諸陽之主氣。猶四通八達之衢。治之一差。其變有
發散爲陽者。是也。若以此湯通治春溫夏熱之病。
太陽經也。一經而有二藥之分。又何耶。曰。在經雖
汗。脈浮緊。蓋浮爲在表。緊爲惡寒。有寒則見。無寒
汗出。表和而愈矣。曰。緊脈固爲寒矣。脈之緩者。亦
風。不能衛護腠理疎而汗泄。所以脈見浮緩也。脈
腠理閉而汗止。表和而愈。又有桀衛俱傷者。二湯
證也。曰。溫暑既無方法。治之則將奈何。脈證與傷
在人身中伏藏歷二三時之久。天道大變。寒化爲
熱。人在氣交之中。亦隨天地之氣而化。靚仲景以卽病
甚。蓋冬時爲正傷寒。天氣嚴凝。風寒猛烈。觸冒之者。惡寒殊甚。其餘時
寒爲甚也。雖四時皆有傷寒。治之不可一概論也。冬時氣寒。腠理微密。非辛甘溫不可。故以桂枝等湯以
之傷寒與溫暑時令爲病之名。豈無異哉。治之之
溫之方乎。今無其方者。蓋散亡之也。經既稱變爲熱。則已改易冬時之寒爲溫熱矣。方亦不容不
隨時改更也。夫溫病欲出。值天時和煦。自內達表。
脈反見於右關。不浮緊而微數。曰。惡寒否乎。曰。傷寒自
冬月風寒而成。外則有惡寒惡風之證。既名爲溫。
則無此證矣。曰。然則子之言。何所據乎。曰。據乎經耳。經
曰。太陽病發熱不惡寒而渴者。溫病也。不惡寒。則
疼惡寒。脈浮緊者。何也。曰。此非冬時所受之寒。乃
脈浮之證。未若冬時之甚也。宜辛涼之藥。通其內
不同。既聞命矣。敢問傷寒之在三陽。則爲熱邪。既
逆散涼藥。以治四逆。大承氣湯以治少陰。其故又
陰證與直中陰經之陰證。混同立論。所以溫疫至
於陰。或入於陽。皆無定體。非但始太陽終厥陰也。
者。亦有不罷再傳者。或有間經而傳者。或有傳至
者。或有初入太陽。不作發熱。便入少陰而成眞陰
妄治之失。若夫自三陽傳次三陰之陰證。外雖有
則直中陰經之寒證也。自叔和立說之混。使後人
分。則熱入深矣。熱入既深。表雖厥冷。與熱邪也。經
傳經之陰證也。經云。厥深熱亦深。厥微熱亦微。是
但寒無熱。此則直中陰經之寒證也。急宜四逆輩

陰也。尙何疑哉。又有日傳二經。爲兩感者。傳經未終而斃矣。病有標本。治有逆從。豈可概論之乎。曰。陰證
之不同。已聞命矣。昔巖劉守眞書云。傷寒無陰證。人傷於寒則爲熱病。熱病乃汗病也。造化汗液。皆陽氣
也。徧考內經、靈樞諸篇。並無寒證。陰證乃雜病也。叔和誤入之耳。守眞高明之士。亦私淑仲景者。而議論
之異。又何耶。曰。雖守眞之明達。蓋亦因傷寒論以桂枝麻黃湯通治寒暑之誤。而有是說。故可嘆云。天道
溫熱之時。用桂枝湯必加涼藥於其中。免致黃生斑出之患。若知此湯自與冬時卽病之傷寒說。不與通
時之溫暑設。則無此論矣。況其晚年悟道。著病機氣宜保命集。其中羌活湯辛涼之藥。以治非時傷寒。其
妙如神。足可補仲景之遺亡。何其高哉。夫內經言傷寒。卽爲熱病。而無寒者。語其常也。仲景之論有寒有
熱者。言其變也。合常與變而無遺者也。所謂道並行而不悖。面反相爲用也。此其所以爲醫家萬世之準
繩標的也歟。客唯而退。遂請著其說于右云。

治傷寒用藥大略

凡證有頭疼惡寒。皆是傷寒。無則皆否也。何則。蓋傷寒則惡寒。傷食則惡食。理固然也。但在冬時惡寒爲
甚。蓋冬時爲正傷寒。天氣嚴凝。風寒猛烈。觸冒之者。惡寒殊甚。其餘時月。雖有惡寒。亦微。未若冬時之惡
寒爲甚也。雖四時皆有傷寒。治之不可一概論也。冬時氣寒。腠理微密。非辛甘溫不可。故以桂枝等湯以
治之。然風與寒常相因。寒則傷榮。惡寒頭痛。脈浮緊而無汗。則用麻黃湯。開發腠理以散邪。得汗卽愈。風
則傷衛。頭痛惡風。脈浮緩而自汗。則用桂枝湯。充實腠理以散邪。汗止卽愈。經云。辛甘發散爲陽者。是也。
若夫榮衛俱傷。又非此二湯所可擬也。予亦有代之者。蓋
則無此證矣。曰。然則子之言。何所據乎。曰。據乎經耳。經
多時爲正傷寒。天氣嚴凝。風寒猛烈。觸冒之者。必宜用辛溫散之。其非
病非因外來。渴則明其自內達表。曰。春夏之病。亦有頭
疼惡寒。脈浮緊者。何也。曰。此非冬時所受之寒。乃
涼之劑通表裏。和之則愈矣。若以冬時所用桂枝辛溫之藥通治之。則
湯是也。兼能代大青龍湯爲至穩。嗚呼。一方可代三方。危峻之藥如坦
此則少陽陽明二經。在乎半表半裏肌肉之間。脈亦不浮不沉。外證在
脈似洪而長。以葛根湯、解肌湯、升麻湯之類治之。在少陽則胸脅痞而
而和之。（本方有加減法。）此二經不從標本從乎中治。余嘗以小柴胡湯加葛根芍藥。治少陽陽明合病。如拾芥。但
不使世俗知此奇妙耳。過此不已。則傳陽明之本爲入裏。大便作實。其
實。其外證悉能。謂無頭痛惡寒也。脈見
浮實不浮。證語惡寒。六七日不大便。口燥咽乾而渴。輕則大柴胡湯。重則三乙承氣湯選用。或曰。邪既入
裏而作實。無非大黃芒硝之類除下之。何其用方之雜還也。余曰。傳來非一。治之乃殊耳。病有三焦俱傷
者。則猝滿燥實俱全矣。則宜大承氣湯。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以泄滿。芒硝鹹寒以潤燥軟堅。大黃
苦寒以泄實去熱。病漸愈矣。凡在中焦則有燥實堅三證。故用調胃承氣湯。枳實厚朴以傷上焦虛無氣。氣輕清之元氣。調胃之名。於此立矣。上焦受傷。則爲痞實。用小承
氣湯。枳實厚朴除痞。大黃以泄實去芒硝。則不傷下焦血分之眞陰。謂不伐其根也。若夫大柴胡湯則有
表邪尙未除。而裏證又急。不得不下。只得以此湯通表裏而緩治之。猶有老弱及血氣兩虛之人不宜用。

此三陽之邪在裏爲患。春夏秋有不頭痛噁寒而反渴者。此則溫病也。暑病亦然。比之溫病猶加熱也。治宜加減小柴胡湯。蓋此湯春可治溫。夏宜治暑。秋能潤肺。又宜升麻葛根湯、解肌湯、敗毒散。中暑而渴者。小柴胡石膏湯。人參白虎湯。若渴微甚而用之無不效。經曰。發熱不惡寒而渴者溫病也。若夫陰證則別有法。不在此例矣。

傷寒言證不言病

夫傷寒言證不言病者。厥有旨哉。證之一字。有明證、見證、對證、之義存焉。如婦以證姦。誠以證憑刀以證殺。不容辭而無所逃其情矣。且人之心肝脾肺腎。在人身中。藏而不見者。若夫口鼻耳目。則露而共見者也。五臟受病。人焉能知之。蓋有病中。必形諸外。肝有病則目不能視。心有病則舌不能言。脾有病則口不知味。肺有病則鼻聞不香。腎有病則耳不聽聲。以此言之。則證亦親切矣。況風寒之中人。受之必有經絡部分。一或傷之。本經之證見矣。更能以脈參之。庶無差忒矣。吾故曰。傷寒言證耳。如太陽傷寒。爲表之表。其經行身之後。從頭下至足。則頭項痛。腰卽強之證。見於項背也。惡寒證亦在表。蓋傷寒惡寒。傷風惡風。太陽爲寒水之經。凡見惡寒。便爲在表。最爲的當。傳至陽明之經。則不惡寒。便不宜發表。如有一毫頭痛惡寒。尙在太陽。便是表證未罷。不可攻裏。故戒曰。發表不開。不可攻裏。此非不明。殺人至速。又曰。凡嘔者不可下。經曰。嘔多雖有陽明證。不可攻。攻之爲逆。心下硬者不可下。切宜仔細。陽明經爲表之裏。其經行身之前。夾鼻絡於目。故目痛鼻乾不眠。少陽經行身之側。爲半表半裏。始於目銳背。循脅絡於耳。交於腮中。兩耳正中。故胸脅痛而耳聾。此三經病之易見。蓋如此。便當膠脈以參之。若太陽經。則有二證。一爲傷寒。一爲傷風。脈浮緊惡寒無汗。爲有寒。表受寒邪。而未入裏。宜麻黃湯。辛甘溫之劑以發之。（冬用正傷寒湯。三時用羌活湯。）此皆有惡寒頭痛。爲在太陽。則脈微洪而長。按之皮膚之下。肌肉之間。此非表非裏。而爲在經。或渴用葛根湯以解肌。少陽經則脈弦數不浮不沉。在乎半表半裏之間。宜小柴胡湯以和之。（有加減法。）此二經者。不從標本。從乎中治也。中之下。卽肌肉之下。筋骨之間也。脈按之沉數有力。則爲熱入陽明之本。宜大柴胡湯、三承氣湯。若燥結微甚而下之。前之所云惡寒頭痛。俱並治。脈不浮而沉實有力。此爲表證罷而裏證具。宜泄去其胃中實熱而愈矣。若老弱產虛。或都發汗。必須下者。皆用大柴胡湯。脈若沉遲微弱無力。則又爲陰證也。宜溫而不宜下也。謹之。

厥分寒熱辯

或曰。人之手足。乃胃土之末。凡脾胃有熱。手足必熱。脾胃有寒。手足必冷。理之常也。惟傷寒乃有厥深熱亦深。厥微熱亦微之論。何邪。曰。胃寒則手足冷。胃熱則手足熱。此病之常也。若夫極則變。不可以常道拘也。蓋亢則害承。乃制火氣亢極。反兼水化。故有此象耳。陰陽反覆。病之逆從。未可以常理論也。凡經言厥逆、厥冷、厥寒、手足寒冷、等語。皆變文耳。不可以論輕重。若言四肢。則有異也。亦未可純爲寒證。若厥冷直至臂脛以上。則爲直寒無疑矣。急用姜附等藥溫之。少緩則難療矣。謂其寒上過乎肘下過乎膝。非內有眞寒達於四肢而何。然更當與脈幷所發之證參之。庶乎其無誤也。凡看傷寒。不可以厥逆便斷爲寒。必須以脈兼證參之。方知端的。如手足厥逆。發之以腹痛、腹滿、泄利清白、小便亦清。口不渴。惡寒戰慄。而如刀刮。皆寒證也。若腹痛後重。泄利黏粘。小便赤澁。渴而好飲。皆熱證也。宜詳審之。

傷寒用浮中沉三脈法

夫傷寒治之得其綱領。不難也。若求之多歧。則支離破碎而難矣。何謂也。脈證與理而已。予嘗以浮中沉三脈詳而治之。無所遁其情也。既云傷寒。則寒邪自外入內而傷之也。其入則有淺深次第。自表達裏。以此推之。而不難也。若夫風寒之初入。必先太陽寒水之經。此經本寒標熱。更有惡風、惡寒、頭疼、脊強之證。寒營皮毛。是爲表證。若在他經。則無此證矣。脈若浮緊無汗。爲傷寒。以麻黃湯發之。得汗爲解。浮緩有汗。爲傷風。用桂枝湯。散邪止汗。爲解。若無頭痛、惡寒。脈又不浮。此爲表裏俱病。而在中。中者何。表裏之間也。乃陽明少陽之分。脈不浮不沉。在乎肌肉之間。謂皮膚之下也。然亦有二焉。若徽洪而長。卽陽明脈也。外證亦然。亦有二焉。若目痛、鼻乾、不得眠。用葛根湯以解肌。脈弦而數。少陽脈也。其證胸脅痛而耳聾。如見此證。此脈。以小柴胡湯和之。蓋陽明少陽不從標本。從乎中治也。過此則邪入裏爲熱實。脈不浮而沉。沉則以指按至筋骨之間方是。若脈來沉實有力。外證則不惡風寒。而反惡熱。譫語大渴。六七日不大便。明其熱入裏而腸胃燥實也。輕則大柴胡湯下之。重則三承氣湯選用。大便通而熱愈矣。若脈來沉遲無力。此爲陰證。便當看外證如何。輕則理中湯。重則姜附四逆湯以溫之。今將浮中沉三脈。列圖于後。可熟玩之。

浮

浮初排指於皮膚之上。輕手按之便得。曰浮。此脈寒邪初入足太陽經。病在表之標。可發而去之。雖然。治傷寒以脈大浮數動滑爲陽。沉澁弱弦微爲陰。然脈理精深。初學未能識察。予謂傷寒之中人。由淺入深。先自皮膚肌肉。次入腸胃筋骨。以浮中沉三脈候之。似乎無所遁乎其情矣。列爲三圖。圖下就註證治之法。則陰陽表裏易見。使因脈以知證。緣證以明治。以此達彼。由粗入精。亦可以爲初學之階梯也。欲究其至極。必須潛心熟玩仲景之書。庶幾可以入道矣。

中

中按至皮膚之下。肌肉之間。略重按之乃得。謂之半表半裏證也。然亦有二焉。蓋少陽陽明二經。不從標本從乎中也。

長而有力。此爲陽明證。有頭疼、眼眶痛、鼻乾、不得眠。發熱無汗。葛根湯、解肌湯。若渴而有汗不解。或經汗過不解而渴。白虎湯、或加人參。無汗不渴。並不可服。則爲大忌。

弦而數。此爲少陽經。其證胸脅痛而耳聾。或往來寒熱而嘔。俱用小柴胡湯。加減法。若兩經合病。則脈弦而長。此湯加葛根芍藥。

沉

沉。重手按至肌肉之下。筋骨之間方得。此爲沉脈。亦有二焉。陰陽寒熱。在沉脈中分。若沉而有力。則爲陽爲熱。沉而無力。則爲陰爲寒也。

沉數有力。則爲陽明之本表解。熱入於裏。壅塞頭痛悉除。反發惡熱。欲揭衣被。揚手擲足。譫妄狂躁。口燥咽乾。五六日不大便。輕則大柴胡湯。重則三承氣湯選用。

沉遲無力爲寒。外證無熱不渴。反怕風寒。或面上惡寒。甚如刀刮。或腹滿脹痛。泄利。小便清白。或大小腹痛。皆爲陰證。輕則理中湯。重則四逆姜附湯。

傷寒至沉脈。方分陰陽。仔細體認。下藥不可造次。倘有差失。咎將歸已。凡診脈須分三部九候。每部必先浮診三候。輕輕手在皮膚之上。候脈來三動。是也。中診三候。沉診三候。三而三之。而成九候。然後知病之淺深表裏。以爲處治之標的。豈可忽略於脈。而欲求病之所在乎。明脈識證。辨名定經。得乎心而應乎手。如此而治。有枉死者。吾不信也。若脈證不明。處方無法。狂妄行醫。視人命如草芥。他日不受天殃。吾亦不信也。

結胸解

結胸之證。昔見俗醫不問昏下與未下。但見心胸滿悶。便與枳桔湯。便呼爲結胸。蓋本朱奉議之說也。有頻頻與之。反成真結胸者。殊不知結胸。乃下早而成。未曾經下者。非結胸證。雖滿悶。倘爲在表。正屬少陽部分。爲半表半裏之間。只消小柴胡加枳殼以治。如未效。則以本方對小陷胸湯。一服豁然。其妙如神。祕之不與俗人言之耳。若因下早而成者。方用陷胸湯丸。分淺深從緩而治之。不宜太峻。上焦乃清道。至高之分。若過下。則傷元氣也。愼之。脊論仲景傷寒論結胸條云。病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。因作痞滿。所以成結胸者。以下太早故也。及成氏注釋曰。發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。再三熟嚥。不能不致疑於其間。蓋無熱惡寒者。寒邪直中陰經之真寒證也。非陽經傳至陰經之病也。若誤下之。不死則危矣。豈可以瀉心湯寒熱相參之藥治之而愈乎。豈反輕如結胸者乎。詳此。恐言榮衛陰陽也。風腐陽。陽邪傷衛。頭疼發熱。微盜汗出。反惡風者。當服桂枝湯。止汗散邪。醫者不達而下之。衛氣重傷。胸中結硬。經又云。結胸證。脈浮大者。不可下。下之即死。結胸證悉具。而煩躁者亦死。蓋衛出上焦清道。受傷不爲不重也。故用陷胸湯峻利之藥以下之。寒爲陰。陰邪傷榮。當以麻黃湯發表。誤下之而成痞滿。宜瀉心湯以理痞。蓋榮出中焦。黃連能瀉心下之痞。邪下於胸。不犯清道。則元氣不傷。故輕於結胸耳。若陰經自中之寒。以瀉心湯理之而愈者。則吾不信也。夫以藥驗證。愚見如此。然未敢以爲必當。俟明哲證之。

傷寒寒熱論

趙嗣眞曰。明理論云。往來寒熱者。邪正之分也。邪氣之入者。正氣不與之爭。則但熱而無寒。若邪正分爭。於是寒熱作也。蓋以寒邪爲陰。熱邪爲陽。裏分爲陰。表分爲陽。邪之客於表也。邪之入於裏也。爲熱邪與陰爭。則爲熱矣。若邪在半表半裏之間。外與陽爭。而爲陰。內與陰爭。而爲熱。表裏之不拘內外之無定。由是寒熱且往且來。日有至於三五發。甚者十數發也。若以陰陽二氣相勝。陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。此則論雜病陰陽二氣自相乘勝。然也。非可以語傷寒。斯論爲精切深合仲景之意。蓋不唯釋疑活人。將而已也。又按河間言惡寒爲寒在表。或身熱惡寒爲熱在皮膚。寒在骨髓者。皆誤也。而活人書亦以此爲表裏言之。故趙氏曰。詳仲景論止分皮膚肉筋骨五者。案問以爲五臟之合。主於外而充於身者也。唯曰臟曰腑。方可言表裏。可見皮膚即骨

膈之上外部浮淺之分骨膈卽皮膚之下內部深沉之分與經絡屬表臟腑屬裏之例不同況仲景出此例證於太陽篇首其爲表證明矣是知虛弱素寒之人感邪發熱熱邪浮淺不勝沉寒故外祛而欲得近衣此所謂熱在皮膚寒在骨膈藥用辛溫至於非盛素熱之人或酒客虛感邪之初寒未變熱陰邪閉且伏熱陰凝於外熱畜於內故內煩而不得近衣此所謂寒在皮膚熱在骨膈藥用溫涼必矣一發之餘表解裏和此仲景不言之妙若以皮膚爲表骨膈爲裏則麻黃湯證骨節疼痛其可名爲有表復爲有裏之證耶然仲景傷寒一書人但知爲方家之祖而未解作秦漢文字觀故於大經大法之際反有疑似而後世賴其餘澤者往往類輯傷寒方論其間失其本義及穿鑿者亦有之矧以雜病爲論但引其例者乎

論傷寒少陰病發熱而反用藥不同

趙嗣眞曰譯仲景發汗湯劑各輕重不同如麻黃湯、桂枝湯、柴胡湯、大青龍湯、小青龍湯、葛根湯、麻黃附子甘草湯、麻黃附子細辛湯、麻黃附子湯、桂枝加附子湯、桂枝加芍藥湯、桂枝加大黃湯、桂枝加厚朴杏子湯、桂枝加葛根湯、桂枝加桂湯、桂枝去芍藥湯、桂枝去芍藥加附子湯、桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯、桂枝去桂加茯苓白朮湯、桂枝甘草湯、桂枝甘草龍骨牡蠣湯、桂枝甘草湯、桂枝人參湯、桂枝加芍藥生薑人參湯、桂枝加芍藥大黃湯、桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯、桂枝加黃芪

有可疑者。如白虎湯。仲景既云表不解者。不可與之白虎加人參湯證。一曰惡風。一曰惡寒。豈非表不解而復用白虎。何耶。蓋惡風曰微。則但見於背而不至甚。於惡寒曰時。時則時或作寒而不常。是表證已輕。非若前證。脈浮沉。發熱無汗。全不解者。此則加之大熱大渴。所以用白虎而無疑也。又曰。仲景論太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脈微緩者。為欲愈。若脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可便發汗更下更吐也。面色反有赤色者。未欲解也。以其不能得小汗出。其身必痒。宜桂枝麻黃各半湯。仲景之意。蓋以得病之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。十六字。為自初至今之證下文。乃是已後。擬病防變之辭。當分作三截看。若其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脈浮緩。為欲愈。此一節。乃表和無病而脈微者。邪氣微緩也。陰陽同等。脈證皆向安之兆。可不待汗而欲自愈。若脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更汗更下更吐之。此一節。宜溫之。若面色反有赤色者。未欲解也。以其不能得小汗出。其身必痒。宜桂枝麻黃各半湯。此一節。必待汗而愈也。活人書不詳文意。却將其人不嘔。清便欲自愈九字本是愈之證。反以他證各半湯汗之。又將不可汗吐下證及各半湯證。語句並脫。略而不言。取此證而用彼藥。汗其所不當汗。何也。若是可見仲景文法多如此。學者必須反覆詳玩。熟觀其意。其例自見。則治不差。故趙氏嗣真曰。仲景之書。一字不同。則治陽虛證之者。可不於片言隻字以求其意歟。

溫病辨

問曰。傷寒溫病。可以脈辨。答曰。溫病於冬時感寒所得也。至春變為溫病耳。傷寒汗下不愈而過經。其證尚在而不除者。亦溫病也。經曰。溫病之脈。行在諸經。不知何經之動。隨其經之所在而取之。

如太陽證頭疼惡寒。汗下後過經不愈。診得尺寸俱浮者。太陽病溫也。

如身熱目疼。汗下後過經不愈。診得尺寸俱長者。陽明病溫也。

如胸脅痛。汗下後過經不愈。診得尺寸俱弦者。少陽病溫也。

如腹滿嘔乾。診得尺寸俱沉細。過經不愈。太陰病溫也。

如口燥舌乾而渴。診得尺寸俱沉。過經不愈者。少陰溫病也。

如煩滿囊縮。診得尺寸俱微緩。過經不愈者。厥陰病溫也。

是故隨其經而取之。隨其證而治之。如發斑乃溫毒也。

治溫大抵不宜發汗。過時而發。不在表也。已經汗下。亦不在表也。經曰。不惡寒而反渴者。溫病也。明其熱自內達外。無表證明矣。

凡暑傷寒。且要識各經中死證死脈。最切須一一理會過。免致臨病疑惑。但見死證。便以脈參之。如果有疑。切莫下藥。雖至殺人。亦不可治。倘有差失。咎將歸於己矣。

雜病諸病方法　前引

死生脈候

陽病熱證不退。反似陰脈。凶。

汗後熱退。陰脈搖。

陰陽諸證。脈平吉。

傷寒咳逆上氣。脈散者。凶。

脈浮而滑。身汗如油。喘息不休。水漿不入。身體不仁。乍靜乍喘者。死。汗出發潮。喘不休者。肺先絕也。

陽反獨留。體如煙熏。直視搖頭。心先絕也。

唇吻反青。四肢厥冷。汗出。肝先絕也。

環口黧黑。虛汗發黃。脾先絕也。

三部緊盛。大汗出。不解者。死。

陰陽尺寸俱虛。熱不止者。死。

身熱喘急。見陽脈而躁者。死。

汗後微熱不解。未可言死。如轉索者。即日死也。

譫語微熱。脈浮大。手足漐。欲汗出。脈暴出者。死也。

陰衰欲絕。而陽暴獨勝。則脈出。一日陰氣先絕。陽氣後竭。死。

逆冷脈沉細者。一日死。

死證雖多。至於危極處。無過死也。

凡看傷寒。初學後生。不可輕易治之。治其病之可曉者。缺其不可曉者。胸中證不明白。有一毫疑惑。不可強治。故君子不強其所不能。若不盡力。私於親故。惑見利而動。輕易玩弄。親人命如草芥。非君子之用心也。謹而敬懼。毋怠毋忽。

初得傷寒一二日。頭痛惡寒。皆除。便覺胸中連臍腹注悶疼痛。脈沉有力。坐臥不安。上氣喘足不候他證。便可用下藥。若頭項強痛。惡寒發熱。每日如此。不可以日數多少。病尚在太陽經。正宜發汗。要在隨所見者。表裏而治之。不必拘於日數也。若煩渴欲飲水。由內水消竭。欲得外水自救耳。大渴欲飲一升。止與一半。常令不足。不可過飲。若過飲水。重則為水結之證。射於肺為喘為咳。留于胃一噫為噦。溢於脾為腫。蓄於下焦為癃。皆飲水之過也。病若二十餘日以上。有下證者。止宜大柴胡湯。恐承氣大峻。蓋傷寒過經。則正氣多虛故也。

病七八日未得汗。大便閉。發黃生斑。譫語而渴。越婢桃仁湯主之。

病八九日已經汗下。脈尚洪數。兩日如火。五心煩熱。狂叫欲走。三黃石膏湯主之。

病五六日。但頭汗出。身無汗。際頸而還。小便自利。渴飲水漿。此瘀血證也。宜犀角地黃湯、桃仁承氣湯。若上下俱實。用犀角地黃湯治上。桃仁承氣湯治中。抵當湯丸治下也。

病六七日。別無剤対證候。忽然冒昧。不知人事。六脈俱靜。或至無脈。此欲汗勿攻之。如久旱將雨。六合陰

721

晦雨後蔬物皆蹙換陽之吉兆也夫今人治傷寒一二日間不問屬虛屬實便用桂枝湯之類以汗之三五日後不問在裏在裏便以承氣湯之類以下之多致內外俱虛諸變蜂起大抵病人虛實表裏不同所以邪之傳變有異豈可以日數爲準蓋有卽傳者有傳一二經而止者有始終只在一經者不必拘始太陽終厥陰也

傷寒無出於仲景者但文字深奧非淺學可彷彿況其發揮頗多管人作金書詮次其中不可曉處十有四五苟未能統之有宗會之有元未易窺測臨病之際不能無惑必須破的而後用又恐病危有所不逮既不可不救又不可失之苟且今備此數事以備緩急之用非博雅通醫之所尙

已上略引東垣先生引舉

陰證

初病無熱更四肢厥冷或胸腹中滿或嘔吐腹滿痛下利脈細無力此自陰證受寒卽眞陰證非從陽經傳來便宜溫之不宜少緩經云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也治宜四逆湯凡腹滿痛皆是陰證只有微甚不同治難一概腹痛不大便桂枝芍藥湯腹痛甚桂枝大黃湯若自利腹痛小便清白便當溫理中四逆若微甚用輕者五積散重者四逆湯

無脈者通脈四逆湯便陰退而陽復也

陰毒並手足指甲皆青脈沉細而急者四逆湯無脈者通脈四逆湯陰毒傷寒服藥不效斑爛皮膚手足皮俱脫艾可炙二三百壯仍用溫和補氣之藥通其內外以復陽氣若俱不效死證也

凡傷寒陰證人皆可曉及至反常則不能矣如身不發熱手足厥冷好靜沉默不渴泄利腹痛脈沉細人共知爲陰證矣至於發熱面赤煩燥不安揭去衣被飲冷脈大入皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣必須服脈下藥至爲切當不問浮沉大小但指下無力按至筋骨全無力者必有伏陰不可與涼劑急與五積散一服通解表裏之寒隨手而愈但更有沉寒之甚須用姜附以退之祕之勿泄脈雖洪大按之無力者重按全無便是陰證

太陽傷風有汗脈浮緩

治太陽無汗發熱頭痛惡寒脊強脈浮沉又治非冬時天有暴寒中人亦頭痛惡寒發熱通宜此湯治之以代麻黃湯用太陽經之神藥也

羌活錢半	防風壹錢	荊芥錢半	黃芩壹錢	川芎壹錢	白芷壹錢	甘草壹錢	生地黃錢半

細辛可多

右水二鍾煎至八分熱服溫被蓋覆取微汗濕七司天加蒼朮一錢半天久雜雨亦加如渴加石膏三錢知母壹錢不渴不加

太陽傷風有汗脈浮緩

治太陽病項背強急無汗惡風脈帶弦浮而發熱又治太陽與陽明合病必自利此湯並主之

羌活壹錢	防風壹錢	白芷半壹錢	黃芩壹錢	白芷壹錢	甘草壹錢	生地黃錢半

右如前煎法若一服汗還未止加黃芪壹錢伍分芍藥壹錢仍未止以小柴胡加桂枝芍藥各壹錢

葛根湯

葛根壹錢	甘草貳錢	麻黃貳錢去節	桂枝貳錢	黃芩壹錢	芍藥壹錢	麻黃伍分壹錢

右水貳鍾姜四片棗貳枚煎服微覆取汗

解肌湯

治瘟病天行頭痛壯熱春感青邪發熱而渴不惡寒

葛根貳錢	桂枝貳錢	黃芩壹錢	芍藥壹錢	麻黃伍分壹錢	甘草壹錢

急下急溫

凡言急下蓋病熱已迫將有變也非若他病尙可少緩如少陰腎水主口燥咽乾而渴乃熱邪內炎腎水將絕故當急下以救將絕之水如腹脹不大便土勝水也亦當急下陽明屬土汗多熱盛急下以存津液腹滿痛以爲土實急當下之熱病日不明熱不已者死目睛不明腎水已竭不能照物則已危矣須急下之少陰急溫有二證內寒已甚陽和之氣欲絕宜急溫之無疑也少陰病得之二三日口燥咽乾急下之大承氣湯

少陰病自利欲絕青色心下必痛口燥咽乾急下之大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便急下之大承氣湯

陽明病發熱汗多胃汁乾急下之大承氣湯汗出不解腹滿痛急下之大承氣湯

少陰病脈沉微急溫之四逆湯

諸方

羌活沖和湯

治太陽無汗發熱頭痛惡寒脊強脈浮沉又治非冬時天有暴寒中人亦頭痛惡寒發熱通宜此湯治之

羌活壹錢	防風壹錢半	白芷半壹錢	黃芩壹錢	白芷壹錢	甘草壹錢	生地黃錢半	川芎	

右如前煎法若一服汗還未止加黃芪壹錢伍分芍藥壹錢仍未止以小柴胡加桂枝芍藥各壹錢

葛根湯

治太陽病項背強急無汗惡風脈帶弦浮而發熱又治太陽與陽明合病必自利此湯並主之

葛根壹錢	甘草貳錢	麻黃貳錢去節	桂枝貳錢	黃芩壹錢	芍藥壹錢	麻黃伍分壹錢

右水貳鍾姜四片棗貳枚煎服微覆取汗

解肌湯

治瘟病天行頭痛壯熱春感青邪發熱而渴不惡寒

葛根貳錢	桂枝貳錢	黃芩壹錢	芍藥壹錢	麻黃伍分壹錢	甘草壹錢

右水貳鍾。煮貳枚。煎服。如不解。再取汗。

獨活散

治傷風濕熱等病。

羌活　獨活　枳殼　防風　黃芩　麻黃湯他
甘草炙　茯苓　荳荊子　細辛各壹錢　石膏貳錢　人參　甘菊花

右水貳鍾。生姜三片。薄荷五葉。同前煎法。

敗毒散

治傷風。濕疫。風濕。頭目昏眩。四肢疼痛。增寒壯熱。項強。目暗疼。諸風眩拘急。

羌活　獨活　前胡　柴胡　川芎　枳殼　桔梗　茯苓
人參　甘草

右各等分。水貳鍾。如常煎服。

六神湯解散

麻黃貳兩　甘草炙兩　黃芩貳兩　石膏貳兩　滑石貳兩　蒼朮肆兩

治時行三日前。加葱白香豉煎服。而汗之立效。中病即止。不可強劑。

小柴胡湯

治太陽病。十日已去。脈細而嗜臥。外雖已解。說胸滿痛。與服之。若脈浮者。麻黃湯。傷寒五六日中風。來往寒熱。胸脅苦痛。默默不欲食。心煩喜嘔。或煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脅下痞硬。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱者。此湯主之。血氣弱。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。結於胸下。邪正分爭。往來寒熱。休作有時。默默不欲食。臟腑相連。其痛必下。邪高痛下。致使嘔也。此湯主之。服柴胡湯已渴者。屬陽明。以法治之。傷寒五六日。身熱惡風。頭項強。脅下滿。手足濕而渴者。此湯主之。傷寒陽脈濇。陰脈弦。腹中急痛。先與小柴胡湯。嘔不止。心下痞鞕。或下利。不欲食。大便堅。或小便不利。或渴。或不渴。或咳。或煩。或小柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與小柴胡湯。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而痛者。此爲結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者。此爲痞氣。柴胡不中與之。宜半夏瀉心湯。已上編太陽經。陽明病發潮熱。大便溏。小便自可。胸脅不利者。與此湯服之。陽明病。脅下硬滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與服之。上焦得通。津液得下。胃氣因和。濈然汗出而解。陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹部滿。脅下及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得臥。一

身發汗。濕鍼譫語。小柴胡湯證罷。此爲壞證。知犯何逆。以法治之。已上編太陽經。後更發熱。此湯主之。若脈浮者。以汗解之。屬陽易。後勞復脈證。

黃芩壹兩半　若腹中痛。去芩。加芍藥壹兩半。
若心下悸。小便不利。去芩。加茯苓壹兩。

人參壹兩半　若不渴。外有微熱者。去參。加桂枝壹兩半。
溫鍼得微汗愈。若咳者。去參。加五味子壹兩半。

大棗陸枚　加牡蠣貳兩。
若腹下硬痛。去棗。

柴胡肆兩。　甘草壹兩半。

右每服七八錢。生薑四片。棗三枚。水一鍾。煎服。

麻黃湯

治傷寒中風。頭痛。增寒。壯熱。骨體疼痛。發熱惡寒。鼻中乾。不得臥。兼治及暴熱之頃。忽然變寒。身體疼痛。頭重如石。

麻黃　升麻　甘草　芍藥　葛根各等分。

右每服七八錢。煎如常法。若老人去芍藥。加柴胡茯苓人參各一錢。

積散

治陰經傷冷。脾胃不和。感冒寒邪。

茯苓肆兩　肉桂　人參　川芎各貳兩。　厚朴　半夏
乾薑各參兩。　甘草貳兩　枳殼炮炒　桔梗拾貳兩　陳皮

右十六味。除枳殼肉桂陳皮外。共餘並一處。生搗爲粗末。用酒拌勻。臘令黃色不得焦。攤冷。入枳殼肉桂陳皮一處和勻。每服五錢。水二鍾。姜三

黃石膏湯

治傷寒發熱。脈大如滑數。表裏皆實。陽盛佛鬱。醫者不達。已發其汗。病不退。又復下之。大便堅。小便不利。五心煩熱。兩目如火。鼻乾而赤。舌燥齒黃。大渴過經。已成壞證。亦有錯治諸溫而成此症者。又八九日。已經汗下。脈洪數。身體壯熱。拘急沉重。欲治其內。由表未解。欲發其表。則裏證又急。趨退不能措手。待斃而已。殊不知熱在三焦。閉澁經絡。津液枯涸。榮衛不通。遂成此症耳。

黃芩肆兩半　黃連　黃栢各柒錢　麥二合　麻黃
梔子三十箇

欲走。三黃石膏湯主之。

陽毒傷寒。皮膚斑爛。身如漆。血兩目如火。十指皮俱脫。煩渴燥急不寧。庸醫不識。莫能措手。命在須臾。三黃石膏湯主之。婦人血風證。因崩漏大脫血。或前後去血。因而溷燥。其熱未除。循衣摸床。撮空閉目。不省人事。揚手擲足。搖動不寧。錯語失神。脈弦浮而虛。內有燥熱之極。氣粗鼻乾而不潤。上下逆燥。此爲難治。宜服生地黃黃連湯。

治男子去血多者。有此證。其妙不可勝言也。

川芎　生地黃　川歸各等錢　赤芍藥　梔子　黃芩　黃連各等錢

防風當歸

右每服五錢。水煎清飲。徐徐呷之。脈實。可再加大黃下之。

大承氣湯。氣藥也。自外而之內者用之。生地黃黃連湯。血藥也。自內而之外者用之。氣血合病。循衣摸空。治同。自氣而之血。血而復之氣者。大承氣湯下之。自血而之氣者。生地黃黃連湯主之。二者俱不大便。此是承氣湯對子。又與三黃石膏湯相表裏。是皆三焦胞絡虛火之用也。病既危急。只得以此湯降血中之火耳。不但婦人用之。男子去血過多。而有此證者。皆宜服之。無不效。予故表而出之。

傷寒脈浮滑。當汗。麻黃湯。若脈在筋骨之間。半表半裏。當和解。小柴胡湯。在筋骨之間當下。承氣湯。若又在筋骨之下。謂之陰證矣。其法理中。當用附子之類。

傷寒頭痛。發熱。耳聾。脅痛。或往來寒熱如瘧。此方治之。名和解散。

柴胡貳錢　黃芩壹錢　人參壹錢　半夏壹錢　甘草壹錢

右水二鍾。生姜三片。棗子二枚。煎八分。不拘時服。如嘔逆加姜九片。陳皮一錢。如頭痛惡寒。加羌活防風各一錢。寒熱間作加桂枝等。各一錢。夏月中暑。發熱頭痛。加黃連一錢。春天溫病時行。加生地黃川芎麻一錢。獲疾。或先寒後熱。先熱後寒。加川芎山尖梔鄉半錢。各蚤未發時煎服。傷寒惡寒頭項強。發熱前方冲和湯內去細辛蒼朮。加白朮二錢。



傷寒家祕的本

明 錄杭節菴陶 華述

傷寒總論

治傷寒。業擅專門。誠爲重寄。論死生。易如反掌。利莫苟圖。雜證綫可取方。傷寒專在活法。所傷寒有活人青。明現論。指掌圖。傷寒論。其中有論缺方者。有方失論者。有脈無證者。有證無法者。非仲景之全書。緣其歷年已久。遺失頗多。王叔和以斷簡殘篇。而補方遺論。成無己順文註釋。而集成全書。所以遺禍至今而未已也。較今庸俗治傷寒。一二日不問在經在腑。而便用柴胡之類和之。五六日不問在表在裏。而便用承氣之類下之。以致內外俱虛。變證蜂起。大抵病人表裏俱實不同。邪之傳變有異。豈可以日數爲准。蓋風寒初中人無常。或入於陰。或入於陽。事無定體。非但始太陽終厥陰論也。或有自太陰始。日傳一經。六日傳至厥陰。邪氣衰不傳而愈者。或有不能再傳者。或有即傳者。或有間經而傳者。或有傳至二三經而止者。或有始終只在一經者。或有越經而傳者。或有初入太陽不作鬱熱。便入少陰。而成真陰證者。或有直中陰經。而成寒證者。或有證變者。或有脈變者。或有取證不取脈者。或有取脈不取證者。緣經無明文。後人有妄治之失。況前人立法之弊。使後人蒙害者多矣。夫庸黃桂枝二湯仲景立治多時正傷寒之方。今人通治非時暴寒溫暑之誤。又將傳經。陰證與直中陰經之陰證混同立論。豈爲善乎。暴寒溫暑。必有別方。直中傳陰。必有活法。今皆亡失而無微也。古人之書。引領後進。誨不盡意。寔不盡言。說其大槩。雖博古而通今。皆在得其傳。受須活潑潑地。此活法者。如珠走盤。但見太陽證者。宜直攻太陽。但見少陰。直攻少陰。此活法也。仲景又云。日數雖多。但有表證而脈浮者。尤宜汗之。日數雖少。但有裏證而脈沉者。尤宜下之。此先賢之確論也。切不可執定一二日發表。三四日和解。五六日方下。此庸醫執死法也。務俾審脈驗證。辨名定經。一一親切無疑。方可下手。寔知其爲表邪而汗之。寔知其爲裏邪而下之。寔知其爲直中而溫之。如此而汗。如彼而下。又如彼而溫。桂枝承氣。投之不差。表附理中。發而必當。七劑少差。死證立見。可不深思而熟慮哉。仲景取方立論。甚嚴曰。可汗。曰少與。巳急下與。先溫其裏。乃攻其表。先解其表。乃攻其裏。得其綱領者。不難也。如響應聲。如影隨形。見病者則曰識心通。見醫人則接談無盧。不得其傳者。實難也。見病者與手無措。見醫人則汗顏緘默。此猶繩鋸斧斤。正謂名舉盧隆。而實德則病矣。嗟夫。常病用常法。誰人不知。設有咸胃非時暴寒而誤認作正傷寒者。有勞力感寒而誤認作真傷寒者。有雜證類傷風。而誤認作傷寒治者。有直中陰經。頭疼身痛。而誤認作傷寒治者。有如狂而證。而誤認作傳經之熱證者。有溫熱病而誤認作正傷寒治者。有如狂而認作發狂者。有血證發黃而誤認濕熱發黃者。有蓄血證而誤認作發斑者。有動陰血而認作鼻衄者。有譫語而認作狂言者。有獨語而認作鄭聲者。有女勞復而認作陰陽易者。有寒濕而認作發喘者。有宿滿而認作結胸者。有心下硬痛下利純清水。而俗呼爲漏底者。有痞病而誤認乾嘔者。有併病而認作合病者。有正陽陽明腑病而認作陽明經病者。有太陽證無脈而便認死證者。有裏惡寒而認作表惡寒者。有表熱而誤作裏熱者。有陰發燥而認作陽證者。有少陰病發熱而認作太陽證者。有標本全不曉者。此變作終世不相認者比比然乎。胸中若不曉脈訣明論方得法。但同庸俗一槩妄治。此殺人不用刃耳。非惟救人功大。亦且陰騭匪輕。吾老矣。傷寒專科。實得仲景先師厥旨。雖無萬金之功。十中可生八九。曾著有書。不能盡心刻骨。因今老萬後恐繼業者不知其傳。中玷名行。遂將一生所奇脈訣語句。并家祕不傳之妙。及一提金、殺車槌法。逐一語釋于後。論註證而證註脈。脈註法而法註方。再三叮嚀。吾後子孫不必集閱方書。親別論。則繁亂而莫知其源。必須熟記。久則自然精貫。不與庸醫伍。不使時醫笑。可也。謂宜珍藏受授。謹之慎之。毋怠毋忽。故戒。

傷寒祕要脈證指法與庸書大略同

傷寒治法。得其綱領者如拾芥。若求之多岐。則支離破碎。如涉海問津矣。蓋脈證與理而已。傷寒之脈。以浮大動數爲陽。沉濇弱弦微爲陰。然脈理精深。今人何能到此田地耶。夫脈者非血非氣。乃營行之道路。實先天後天之大造。無所窮盡。叔和脈云。指下難明者。但言其概也。今人誇談通曉者。但能言而不能行也。吾老矣。以浮中沉三脈候而治之。察其陰陽表裏虛實寒熱。如見其肺肝然。無所逆。其情矣。既云傷寒。則寒邪自外入內而傷之。其入則有淺深次第。自表達裏。先入皮膚肌肉。次入筋骨腑臟。以此推之。而不雜也。原風寒初入。或先太陽寒水之經。此經本寒標熱。便有惡風惡寒。頭疼發熱。蓋寒鍾皮毛。是爲表證。若在

他經則無此證矣脈若浮緊無汗爲傷寒用麻黃湯發之得汗爲解脈若浮緩有汗爲傷風用桂枝湯以
散邪汗止爲解若無頭疼惡寒脈又不浮此爲表證罷而在中中者卽半表半裏之間也乃陽明少陽之
分脈又不浮不沉在乎肌骨之間謂皮膚之下然則有二焉若微洪而長陽明脈也外證目痛鼻乾不
眠用葛根以解肌脈弦而數少陽脈也其證胸脇痛而耳聾寒熱嘔而口苦如見此證此脈便以小柴胡
和之若陽明少陽二經不從標本從乎中也過此邪入裏爲熱實脈不浮而沉沉則按之筋骨之間乃是
若是脈來洪實有力外證則不惡風寒而反惡熱譫語大渴或潮熱自汗或揚手擲足揭去衣被五六日
不大便明其熱入裏而陽胃燥實也經則大柴胡湯重則三承氣湯迭用大便通而熱愈矣若脈來沉遲
無力此爲直中陰經其寒證之陰脈其證無頭痛無身熱初起怕寒手足厥冷或戰慄蜷臥不渴發之順
痛嘔吐泄瀉或口出涎沫面如刀刮者乃陰經自中之寒不從陽經傳入故不作傳經熱證治例更當看
外證如何經則理中湯重則姜附四逆以溫之其中緊要關節皆再表而出之太陽者陽證之表陽明者
陽證之裏少陽者二陽三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總而謂之陰證然三陰俱是沉脈妙在指下
有力無力中分有力者爲陽爲實爲熱無力者爲陰爲虛爲寒最爲切當其三陽經證前論已云不再多
於脈而欲求病之所在乎切脈謂之巧得心應指自然神妙有枉死者此吾所不信也若不明脈證狂
妄行醫視人命如草芥他日若不受大咎吾亦不信也

辯脈雖浮亦有可下者脈雖沉亦有可汗者

夫脈浮當汗脈沉當下固其宜也其脈雖浮亦有可下者謂邪熱入腑大便難也大便不難其脈雖沉亦有可汗者謂少陰病身有熱也假若身不發熱豈敢汗乎此取證不取脈也

論風傷衛氣寒傷榮血辯

蓋風則傷衛氣寒則傷榮血者緣氣本屬陽風屬陽陽則從陽故傷衛衛氣陽主開泄當令自汗故用桂枝
湯辛甘溫之劑以實表血本屬陰寒屬陰陰則從陰故傷榮血陰主閉藏當令無汗故用麻黃湯輕揚之
劑以發表正所謂水流濕而火就燥雲從龍而風從虎各從其類者是也

用藥寒溫辯

夫發表之藥用溫攻裏之藥用寒溫寒之藥用熱者表既有邪則爲陽熾陰涸溫之乃所以爲陽陽有所
助而長回陰邪所由以消故用辛甘溫之劑發散爲陽此指發表之藥用溫者明矣裏既有邪則爲陰盛
陽病寒之乃所以助陰而抑陽陽受其抑則微而寒陰所由以長故用酸苦之劑以助陽抑陰此指溫經之
藥用寒者明矣陰經自受寒邪則爲臟病主陽不足而陰有餘故用辛熱之劑以助陽抑陰此指溫經之
藥用熱者明矣表有邪不汗之其邪何從而去裏有邪不下之其邪何從而出總有寒不溫之其寒何從
而除此三者所謂用藥寒溫辯也

正傷寒及溫暑濕寒勞力感冒時疫治各不同論

夫傷寒二字蓋冬時天氣嚴寒以水冰地凍而成殺厲之氣人觸犯之卽時病者爲正傷寒乃有惡寒頭
疼發熱之證故用麻黃桂枝發散表中寒邪自然熱退身涼有何鈐證如或頭疼惡寒表證皆除而反見

弦而數此爲少陽經脈其證胸脇痛而耳聾寒熱嘔而口苦俱用小柴胡湯本方自有加減法或兩經合
病則脈弦而長此湯加葛根芍藥緣膀胱無出入有三禁止宜和解表裏

論沉脈形狀指法主病

沉重手按至肌肉之下筋骨之間此爲沉脈亦有二焉陰陽寒熱在沉脈中分無人知此皆祕訣耶
沉數有力卽爲陽明之本表證解而熱入于裏惡寒頭疼悉除反惡怕熱欲揭衣被揚手擲足譫語狂妄
燥渴或潮熱自汗五六日不大便輕則大柴胡湯重則三承氣迭用
沉遲無力爲寒外證無頭疼無身熱不渴初起怕寒厥冷嘔吐兼或腹痛吐瀉或戰慄面如刀刮或口吐
白沫冷涎皆是陰經自中直寒證輕則理中湯重則姜附四逆湯溫之
傷寒至沉脈方分陰陽仔細體認下藥不可造次倘有差失咎將歸已凡診脈須分三部九候每部必先
浮診三候輕生於皮膚之上候三動也中診三候脈重指於皮膚之下肌肉之上候三動也沉診三候重
手於肌肉之下筋骨之上候三動也三三而成九候然後知病之淺深表裏以爲處治之標的豈可忽略
於脈而欲求病之所在乎切脈謂之巧得心應指自然神妙有枉死者此吾所不信也若不明脈證狂
妄行醫視人命如草芥他日若不受大咎吾亦不信也

辯脈雖浮亦有可下者脈雖沉亦有可汗者

夫脈浮當汗脈沉當下固其宜也其脈雖浮亦有可下者謂邪熱入腑大便難也大便不難其脈雖沉亦有可汗者謂少陰病身有熱也假若身不發熱豈敢下乎其
脈雖沉亦有可汗者謂少陰病身有熱也假若身不發熱豈敢汗乎此取證不取脈也

論風傷衛氣寒傷榮血辯

蓋風則傷衛氣寒則傷榮血者緣氣本屬陽風屬陽陽則從陽故傷衛衛氣陽主開泄當令自汗故用桂枝
湯辛甘溫之劑以實表血本屬陰寒屬陰陰則從陰故傷榮血陰主閉藏當令無汗故用麻黃湯輕揚之
劑以發表正所謂水流濕而火就燥雲從龍而風從虎各從其類者是也

用藥寒溫辯

夫發表之藥用溫攻裏之藥用寒溫寒之藥用熱者表既有邪則爲陽熾陰涸溫之乃所以爲陽陽有所
助而長回陰邪所由以消故用辛甘溫之劑發散爲陽此指發表之藥用溫者明矣裏既有邪則爲陰盛
陽病寒之乃所以助陰而抑陽陽受其抑則微而寒陰所由以長故用酸苦之劑以助陽抑陰此指溫經之
藥用寒者明矣陰經自受寒邪則爲臟病主陽不足而陰有餘故用辛熱之劑以助陽抑陰此指溫經之
藥用熱者明矣表有邪不汗之其邪何從而去裏有邪不下之其邪何從而出總有寒不溫之其寒何從
而除此三者所謂用藥寒溫辯也

正傷寒及溫暑濕寒勞力感冒時疫治各不同論

夫傷寒二字蓋冬時天氣嚴寒以水冰地凍而成殺厲之氣人觸犯之卽時病者爲正傷寒乃有惡寒頭
疼發熱之證故用麻黃桂枝發散表中寒邪自然熱退身涼有何鈐證如或頭疼惡寒表證皆除而反見

譫語。怕熱燥渴。大便閉者。以法下之。大便通而熱愈有何怪證。其餘春夏秋三時。雖有惡寒身熱頭疼亦微。卽爲感冒。非時氣寒之辨。非比冬時氣正傷寒爲重也。如冬感寒不卽病。伏藏於肌膚至春夏時。其伏寒各隨時氣改變爲溫病。旣變之後。不得復言其爲寒矣。所以仲景有云。發熱不惡寒而渴者。其理可見。溫病也。暑病亦然。比之溫病尤加熱也。不惡寒則病非外來。渴卽明其熱自內達表。無表證明表。治溫暑大抵不宜發汗。過時而發。不在表也。其狀寒至夏。又感暑寒。變爲暑病。暑病者。卽熱病也。取夏火當權而言暑字。總其溫熱二證。從多時伏寒所化。總曰傷寒。所發時旣異。治之不可混也。若言四時俱是正傷寒者。非也。此三者皆用辛涼之劑以解之。若劑多時正傷寒之藥通治之。定殺人矣。辛涼者。荊活冲和湯是也。雖能代大青龍湯。治傷寒見風。傷風見寒爲至穩。一方發熱以其無頭疼。故名少陰病。當無熱。今反寒。邪在表。但皮膚閉而爲熱。卽在裏無熱。故用麻黃細辛以發表間之熱。附子以溫少陰之經。假使寒邪在裏。則外必無熱。當見吐利厥逆等證。而屬正少陰四逆湯證也。以此觀之。表邪浮淺發熱之反。尤輕正氣衰微。脈沉之反爲重。此四逆爲裡。不爲不重於麻黃附子細辛湯也。可見熱附配麻黃。發中有補生附配乾姜。補中有發。所謂太陽少陰脈沉發熱。雖同而受病有無。面疼與用藥自別。故併言之耳。若誤治之。其死必矣。

傷寒陰陽寒熱二厥辯

陰陽二厥。治之一差。死證立判。夫陽厥者。先自三陽經氣分。內感寒邪。必於頭疼發熱惡寒。已後傳遞三陰血分。變出四肢厥冷。作溫大便燥實證。語發渴。揚手擲足。不避寒。反怕熱。脈沉有力。此皆傳經熱證。謂之陽厥。陽極發厥者。卽陽證似陰。外雖有厥冷。內有熱邪。耳聾因大便結實失下。使血氣不通。故手足作冷。作溫也。如火煉令熱極。命反化水。水寒極而成冰。反能載物。厥微熱亦微。四逆散。厥深熱亦深。大承氣正謂亢則害其物。承乃制其極也。若醫人不識。疑是陰厥。而進熱藥。如抱薪救火。奚失陰厥者。因三陰經血分自受寒邪。初病無身熱。無頭疼。就便惡寒。四肢厥冷。直至膝肘以上。過乎肘膝。不溫。引衣蹈臥。不渴。或腹痛吐瀉。或戰慄面如刀刮。口吐涎沫。脈沉遲無力。此爲陰經直中。與陰寒證。不從陽經傳入。謂之陰厥也。輕則理中湯。重則四逆湯溫之。勿令誤也。

傷寒結胸痞滿辯 幷見項背中

傷寒結胸者。今人不分。曾下與未下。便呼爲結胸。便與枳桔湯。反成其結胸者有之。殊不知乃因下早而成。未經下者。非結胸也。乃表邪傳至胸中。未入于腑者。雖滿悶。尙爲在表。正屬少陽部分。只消小柴胡加枳桔以治其悶。如未效。則以本方對小陷胸湯一服。豁然。其妙如神。祕之。豈與俗人言之耳。若因下早而成者。方可兩陷胸湯分淺深。從緩而治之。不宜太峻。此乃清道至高之分。若過下之。則傷元氣也。太陽證發熱惡寒。頭疼無汗。此寒傷榮血。當服麻黃湯發散。腎者不達。而誤下之。榮血重傷。而成疼滿。太陽證頭疼惡寒。發熱自汗。此風傷衛氣。當服桂枝湯散邪。實表。腎者不達。而誤下之。衛氣重傷。而成結胸。蓋言榮衛陰陽也。若言寒熱陰陽證者。則誤之甚矣。治法又錄于後條。

傷寒伏陰脈大論四藥之誤

夫病身不熱頭不痛初熱怕寒四肢厥冷腹痛嘔吐泄瀉蹈以沉默讝語脈來沉遲無力人皆非知爲陰證必矣至於發熱面赤煩燥揭去衣被脈大人皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣殊不知陰證不分熱與不熱須憑脈下藥至爲切當不問脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰不可與涼藥服之必死急與五積散一服通解表裏之寒隨手而愈若內有沉寒必須委附以温之一切忌發泄脈雖洪大按之無力重按全無者陰脈也若將伏陰之證而誤作熱證用涼藥治之則渴愈盛而躁愈急豈得效乎此取脈不取證也

傷寒伏脈辯

夫頭疼發熱惡寒或一手無脈兩手全無者庸俗以爲陽證得陰脈便呼爲死證不治殊不知此因寒邪不得發越便爲陰伏故脈伏必有邪汗也當攻之又有傷寒病至六七日以來別無刑赴證候或脅沉胃昧不知人事六脈俱歸或至無脈此欲正汗也勿攻之此二者便如久旱將雨六合陰晦雨後焦物皆甦換陽之吉兆正所謂欲雨則天氣熱晴霽天乃反涼理可見也當攻者發汗冬用麻黃湯三時用荒活冲和湯勿攻者止汗五味子湯各有治法當謹記之

傷寒言證不言病論　詳見項目中

言證不言病者深有理哉夫證之一字有明發見證對證之義存且如婦證姦而賊證盜刃證殺而病對證不得辭而無逃其情矣人之心肝脾肺腎雖藏而不見若夫耳目口鼻舌則露而共見者也五臟受病人焉知之蓋有諸中必形諸外肝病則目不能視心病舌不能言脾病口不知味肺病則鼻不聞香臭腎病則耳不聽聲以此言之其證最親切矣其太陽經受病證出頭疼身熱惡寒一或傷之本經之證見矣脈此首經論之餘經不言可知吾故曰傷寒言證不言病耳

傷寒傳足不傳手經論　詳見項目中

傳足不傳手者此庸俗之謬論也豈有是哉人之充滿一身無非血氣所營晝夜循環運行不見豈有止行足而不行手乎況風寒之中人先入榮衛吾故明其所由蓋傷寒者乃冬時感寒即病之名冬乃坎水用事其氣嚴凝深冽水冰地凍在時則足太陽少陰正司其令觸冒之者則二經受病其次則足少陽厥陰繼冬而施春令面爽受傷者蓋風木之令起于大寒節正當三月至春分後方行温令故風寒亦能傷之足陽明太陽中土也與冬時無預而亦受傷者土無定位無成名無專氣寄旺於四時終始於萬物則四時寒熱温凉之氣皆能傷之也況表邪傳裏必歸於胃而爲燥屎用水氣下之胃氣和矣手之六經主於夏秋故不傷也足之六經蓋受傷之方分境界也若言傷足不傷手則可以爲傳足不傳手則不可也設或不傳氣逆作喘何經而來如謂不然仲景設有桂枝麻黃乃肺經藥也豈虛言哉

急下急温論　四項書五看

急下急温者蓋病勢危篤所有變也非若常病可緩如少陰口燥舌乾而渴因邪熱內消腎水將絕固當急下以救腎家將絕之水少陰病自利純清水心下硬痛口燥渴者急下之少陰病胆腹硬痛或過胸痛

不大便土膏水也急下之陽明汗多熱盛恐胃汁乾急下以存津液陽明病腹滿痛爲十實急下之熱病目不明熱不止者多死目暗不明腎水已竭不能照物則已危矣急宜下之五者俱大承氣湯少陰急温有二證內寒已極陽和之氣欲絕急温之少陰腦上有寒飲乾嘔不可吐急温之反逆湯此急救之功也

傷寒標本論

夫傷寒標本不明如醫者夜行無路可見也原標者病之梢末本者病之根本先受病爲本次受病爲標標本相得先以治其急者此良法也假如先起頭痛惡寒就爲本已後發熱就爲標此受病之標本也將此一件推之餘皆倣此又脈之標本者假如浮沉爲本虛實爲標此脈之標本也

治傷寒看證法則

凡看傷寒先觀兩目或赤或黃赤爲陽證六脈洪大有力躁渴者輕則三黃石膏湯重則大承氣黃爲瘟證如小水不利或赤澁小腹脹滿不痛渴而大便實脈來沉實有力者爲蓄熱發黃輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小水清白爲愈黃自退矣趨十開在殺車槌方前次看口舌有無胎狀如見滑白色者邪未入裏屬半表半裏證宜小柴胡和解舌上黃胎看胃脘有邪熱也宜下之調胃承氣湯大便燥實脈沉有力而大渴者方可下便不實脈不沉微渴者未可下尤宜小柴胡湯舌上黑胎生芒刺者是腎水赶於心火十有九死急用大承氣下之無疑矣此邪熱已極也趨法開在殺車槌方前已後以手按其心胸至小腹有無痛處若按之當心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實脈來沉實有力爲結胸證急用大陷胸湯加枳桔下之量元氣虛實宜從緩治若按之胸雖滿悶不痛何爲在裏未入乎腑乃邪氣填乎胸中只消小柴胡加枳桔以治其悶如未效本方對小陷胸一服如神若按之當心下服滿而不痛者宜瀉心湯加枳桔是寒滿也以手按之小腹若痛而小水不利大便黑鞕以身背證安燥渴腹沉實者爲蓄血桃仁承氣下蠆黑物則愈若按之小腹脹滿不硬痛小水不利面潤證也五苓散加減利之不可大利恐耗竭津液也若按小腹邊臍硬痛渴而小水短赤大便實者有燥屎也大承氣下之方法備開殺車槌方前

再倣問其大小便通利若何有何痛處及服過何藥方知端的務使一一明白證脈相對應得下藥無差

凡看傷寒若見吐蛔者雖有大熱忌下涼藥犯之必死蓋胃中有寒則蛔上膈大凶之兆人皆未知急用炮乾姜理中湯一服加烏梅二箇花椒十粒服後待蛔定却以小柴胡湯和解熱蓼蛔則酸則靜見苦則安矣

凡治傷寒若頻渴欲飲水者因內水消竭欲得外水自救大渴欲飲一升正可與一碗當令不足不可太過若恣飲過盛使水停心下則爲水結胸等證射于肺爲喘爲咳留於胃爲噫爲噦溢於皮膚爲腫當於下焦爲癃滲於腸間則爲利下皆飲水多之過也又不可不與又不可強與經云若還不飲非其治強飲須教別病生正此謂也

凡治傷寒若經十餘日已上尚有表證宜汗者與羌活冲和湯微汗之十餘日若有裏證宜下者可與大柴胡湯下之蓋傷寒過經正氣多虛恐麻黃承氣太峻誤用麻黃令人亡陽誤用承氣令人不禁故有此

戒若表證尚未除而裏證又急不得不下者只得以大柴胡湯下之不傷元氣如其年壯力強者不在禁例從病調宜

凡治傷寒二脈弱而無力者切忌發吐供宜小柴胡和之

凡治傷寒若汗下後不可便用麥芪大補宜用小柴胡加減和之若大補使邪氣得補而熱愈熾復生他證矣所謂治傷寒無補法也如曾經汗下後果是虛弱之甚脈沉遲無力者方可用甘溫之劑補之此爲良法其外力感寒之證不在禁補之例看消息用之

凡治傷寒與傷寒俱有熱若誤治之害矣傷寒則外惡寒而脈浮緊傷寒則不惡寒而脈虛此爲不同治經云脈浮身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯加石膏知母或人參白虎湯大久淫雨濕令大行若此白虎湯若元氣素弱而傷重者用清暑益氣湯治之

傷寒表裏見證治例活法

凡治傷寒若見頭痛惡寒發熱腰項脊強脈浮者即是表證不拘日數多少便用解表藥無疑

凡治傷寒若見耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脈見弦數者即是半表半裏證不拘日數多少便用和解藥無疑

凡治傷寒若見頭疼惡寒惡風及見怕熱燥渴譫語揭去衣被揚手擲足發狂斑黃或潮熱自汗大便不通小水短赤或胸中連臍腸注悶疼痛脈沉有力或上氣喘促即是傳裏熱證不拘日數多少便用通利下藥無疑

凡治傷寒若見初病起無頭疼無身熱就便怕寒四肢厥冷或腹痛吐瀉或口吐白沫或流冷涎或戰慄而如刀刮引衣蹉臥不渴脈來沉遲無力即是直中陰經眞寒證急用熱藥溫之無疑要在隨所見證表裏而治之切莫亂投湯劑不可拘於日數若非深得仲景之意豈能至此耶

三陰無傳經論

凡傷寒邪熱自三陽傳至三陰臟腑入裏爲盡無所復傳故言無傳經也如再傳者足傳手經也

發熱

身熱發熱爲表熱是風寒熱於皮肌搏鬱於外表熱而裏不熱也無汗脈浮緊宜發表有汗脈浮緩宜解肌蒸蒸發熱者爲裏熱是陽邪入陷於陰中裏熱而表不熱也脈沉實而渴者宜下之若表熱未罷邪氣傳裏裏未作實則表裏俱熱脈必弦數宜和解少陰脈沉反發熱者是未離于表也麻黃附子細辛湯如特熱煩渴小便赤脈浮大者此爲表裏俱具五苓散利之其陰陽俱盛熱不止者汗下後復大熱脈煩亂者下利熱不止者皆死也

頭痛

頭痛有寒有邪入足太陽經上攻于頭此表證也頭痛脈浮緊無汗惡寒可發汗頭痛脈浮緩有汗惡寒宜解肌如前時令用葛陽明病不惡寒反惡熱五六日不大便胃實燥渴熱氣上攻於頭目脈實者酌胃承

氣下之少陽頭痛者小柴胡和之濕家鼻塞頭痛者瓜蒂散搐鼻黃水出即愈痰涎頭痛胸滿寒熱者瓜蒂散吐之厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之三陽雖有頭疼不若太陽專主也三陰無頭痛惟厥陰有頭痛者是脈係絡于頂巔也若痛連於胸手足俱青獨其頭痛必死矣

項強

項強者太陽感邪表證也無汗脈浮緊宜發汗葛根湯有汗脈浮緩宜解肌桂枝湯結胸項強大陷胸湯寒濕項強則成痙例載後條

惡寒

惡寒者乃寒邪客於榮衛凡病初淅惡寒維一切諸表病在脈陰陽所分若發熱惡寒或一頭疼一強脈浮緊者邪入太陽表證也宜汗之照時令用藥若無熱惡寒憎惡脈沉遲無力者寒邪入足少陰裏證也宜溫之四逆湯經云發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰或有下證悪其而微惡寒者大柴胡下之其少陰病惡寒而蹈手足厥冷煩燥脈不至者死也

惡風

惡風者風邪傷衛腠理不密由是惡風惡風屬於陽非比惡寒乃有陰陽所分若發熱惡寒脈沉遲無力者寒邪入足少陰裏證也宜溫之四逆湯經云發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰或有下證悪其而微惡寒者大柴胡下之其少陰病惡寒而蹈手足厥冷煩燥脈不至者死也

惡風者風邪傷衛腠理不密由是惡風惡風屬於陽非比惡寒乃有陰陽所分若發熱惡寒脈浮緩者當解肌隨時用藥惡風發熱憎寒者桂枝湯加減和之若大汗後大渴大熱脈洪大者白虎湯主之

背惡寒

背惡寒者陽氣不足陽氣屬陰氣盛者口中和附子湯陽氣內陷者口乾燥白虎湯二者俱背惡宜審治之

寒熱

往來寒熱者陰陽相勝邪正分爭也屬少陽半表半裏證蓋陽不足則陰邪出表而與之爭故陰勝而爲寒陰不足則陽邪入裏而與之爭故陽勝而爲熱邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半表半裏則寒熱相半作往作來而間作也小柴胡爲主往來寒熱寒多者加桂熱多者加大黃是其大法也太陽證八九日如瘧狀一日二三度發不嘔清便脈浮緩者爲自愈不浮緩爲未愈柴胡桂姜湯病至十餘日熱結在裏大渴大便實往來寒熱大柴胡湯若往來寒熱胸脇滿而不痛者半表半裏證未入乎腑小柴胡加枳桔婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷爲熱入血室亦用小柴胡治之

潮熱

潮熱者屬正陽明胃腑旺於未日一日一發日晡而作如潮水之有信也專主胃中實熱燥糞便然宜下之如熱不潮大便不實而脈浮表證尚在者未可與承氣湯候大便硬而燥渴與夫自汗諂語潮熱者彙

似瘧

似瘧者。一名瘧狀。作止有時。非若寒熱往來之無定也。太陽證似瘧。脈浮洪。桂枝湯不暢滑便。一日二三發。脈厥陰脈浮緩。發不補。爲自愈。如脈不浮。及面赤色有熱者。以其不能得小汗。身必痒。用桂麻各半湯。病不煩喜嘔。壯熱往來。心下悸。小便不利。小柴胡加茯苓湯發汗後。解半日許。脈浮數者。可更發汗。桂枝湯汗後。奪煩夜靜。不嘔渴。無表證。脈微沉。乾姜附子湯。大汗後六七日不大便。煩而不解。腹滿痛者。有燥屎也。大承氣湯下之。止汗下後。心下痞滿。氣上衝。頭身振搖而煩者。茯苓白朮湯爲要也。

煩燥

煩爲擾亂而煩。燥爲憎惡而燥。謂先煩漸生燥也。有陰陽虛實之別。心熱則煩。陽實陰虛。浮熱則燥。陰實陽虛。煩爲熱輕。燥爲熱重。所謂煩燥者。先發煩而後發燥也。太陽中風不得汗煩燥者。此邪在表而煩燥也。若活沖和湯。大便不通六七日。邊脾痛煩燥發作。有時而渴者。此爲燥屎。乃邪氣在裏而煩燥也。若承氣湯。太陽不得汗。樞以火劫取汗。火熱入胃。叫令煩燥也。小柴胡加牡蠣湯。陽微發汗。燥不眠。與大下後復發汗。晝日不得眠。至夜安靜身無熱者。此爲陰盛拒陽也。欲於泥水井中臥。飲水不得入口者。是也。四逆湯其結胸煩燥悉具。及吐利四逆而煩燥。下利厥逆而煩燥。惡寒蹈臥厥不出而煩燥者。梔子豉湯爲不治也。

懊憹

懊憹者。心胸煩悶不舒之貌。蓋表證誤下。正氣內虛。陽邪內陷於心胸之間。重則爲結胸也。邪在心胸則宜吐。熱結胃腑則宜下。發汗吐下後。虛煩不得眠懊憹者。與夫頭汗出。小便不利。心中懊憹者。必發黃。茵陳湯利之。舌上白胎。但不食。虛煩不眠。頭汗出懊憹者。梔子豉湯也。

身體痛

身體痛者。雖曰太陽表邪未解。又有溫經發汗不同。如發熱惡寒。頭疼身體痛。脈浮緊者。表未解也。冬月麻黃湯。餘月宜活沖和湯汗之。或下利。脈沉。身痛如被打者。爲陰寒證。宜四逆湯溫之。發汗後身痛。脈沉遲。桂枝湯與人參湯。下利煩滿身疼痛。先溫其裏。四逆湯。後攻其表。桂枝湯。一身盡痛。發熱而黃。七八日熱結在裏。有瘀血也。桃仁承氣湯下之。如身重痛者。陽明有風也。葛根湯主治也。

拘急

拘急者。手足不能自如。屈伸不便。如僵臥惡風之貌。四肢諸陽之本。因發汗亡陽。陽虛而有此證。自汗盜汗。小便數。心煩惡寒。起臥拘急。芍藥甘草湯。太陽病發汗。遂漏不止。惡風小便難。拘急者。桂枝加附子湯。吐利後汗出。發熱惡寒。拘急手足厥冷者。四逆湯溫之也。

咳嗽

咳者。俗呼爲嗽。肺爲邪氣逆不下。有肺寒面赤。有停飲面赤。有半表半裏面赤。各治不同。太陽病身熱赤熱者。不經汗吐下。則爲煩熱。與發熱有異也。經曰。病人煩熱。汗出則解。如未作腸實。但當和解微熱而嗽。乾嘔微嘔而利。小青龍湯。身涼咳嗽。乾嘔微利。心下滿引脇痛。十棗湯。四肢重痛。腹疼下利。茲嗽或嘔。

眞武湯少陰病玆啞四逆腹痛下利或悸四逆散加五味子乾姜少陽病往來寒熱胸滿痛滿而玆小柴胡湯玆而嘔滿噦急大半夏湯也

噦

噦者有邪在表而噦有邪在裏而噦有水氣而噦在表者心腹滿而不堅外證無汗法當汗之在裏者心腹脹滿外證有汗法當下之水氣噦者心下悸仲景部尖麻黃加杏仁湯太陽陽明合病脈促有汗而噦者爲根黃芩湯治之經云噦而汗出宜利之汗不出而噦宜發之其或直視譫語汗出如油噦而不休死證也

氣逆

氣逆者氣自腹中時逆上衝也因太陽病下之表邪乘虛傳裏裏不受邪則氣逆上行而邪在表也當汗之桂枝湯不上衝者勿與之厥陽客熱上衝此熱在裏而氣上也大柴胡湯下之病緩脈緊少氣氣逆上衝欲吐者竹葉石膏湯有助氣因發汗而氣上半根湯二者皆正氣虛而邪氣逆也

短氣

短氣者呼吸不相接續也大抵心腹滿而短氣者邪在裏而爲實宜下之承氣湯心腹滿而短氣者邪在表而爲虛也宜解之桂枝湯食少飲多水停心下短氣小便不利惡風不欲去衣邪氣在表甘草附子湯太陽證誤下之短氣煩燥爲結胸者大陷胸湯治也

口乾

口乾者邪熱灸胃消耗津液故少陰證口燥咽乾急下之口乾燥水不欲嗽水若見表證鼻鼾爲邪熱在經繞陽明血氣俱多經中熱甚迫血妄行犀角地黃湯口乾身大熱有惡寒者人參白虎湯若無表證加之胸腹滿如狂者又爲蓄血證桃仁承氣湯少陽口乾小柴胡和之也

渴

渴者裏有熱也津液爲熱所耗傷寒傳至厥陰爲消渴者謂飲水多而小便少乃熱能消水也脈浮而渴屬太陽小青龍去半夏加天花粉有汗而渴屬陽明人參白虎湯便實者宜當下之脈沉而渴屬少陰大承氣湯至於厥陰又熱之極矣但當下之無疑矣太陽無汗喜渴忌白虎宜小柴胡湯陽明汗多而渴戒五苓宜竹葉石膏湯先嘔後渴此爲欲解當與水解先渴後嘔爲水停心下亦茯苓湯小便不利而渴五苓散發黃頭汗出小水不利而渴者茵陳五苓散中景厥盡身熱而渴者白虎湯爲要也

胸脇滿

胸脇滿者腹內氣塞滿悶也非心下滿脇滿者脇肋下脹滿也非腹中滿蓋證邪傳裏必先胸次腹入胃是以胸滿多帶表證宜微汗惟脇滿多帶半表半裏小柴胡加枳桔和之胸中痰實者吐之大陷胸湯可也

結胸

結胸者蓋太陽證自汗當服桂枝湯而誤用承氣下之而成結胸不按自痛連脇腹邊手不可近者大結胸大陷胸湯按之方痛心下硬小結胸小陷胸湯懊憹煩渴心下痛者熱結胸少與大陷胸湯懊憹滿悶身無熱者寒結胸三物白湯心下悸仲景汗出無大熱爲水結胸小半夏茯苓湯若未經下者非結胸也屬半表半裏證宜小柴胡枳桔以和之已經下者爲結胸也結胸脈浮大者未可下猶帶表證若結胸證煩燥悉具者必死矣

痞

痞者因太陽證當服麻黃湯而誤用承氣下之而成痞滿此因虛邪留滯若欲下之必待表證悉而後可宜小柴胡加枳桔湯若惡寒汗出痞滿者附子瀉心湯服後小便不利者五苓散表未解心下妨悶者曰支結柴胡桂枝湯表未解而數下之遂協熱而利心下痞硬爲表裏俱病桂枝人參湯爲當也

腹滿

腹滿者邪入太陰脾土也當痛爲裏實須下之承氣湯時減者爲裏虛當溫之理中湯若表解內不消非大滿猶生寒熱亦未可下是邪全未入腑若大滿大實堅有燥屎雖日數少亦當下之無邪已入腑也太陽證下因時腹滿而痛桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯陽明病發熱腹滿微喘口乾不大便小柴胡湯嘔而小便難加茯苓三陽合病腹滿身重難轉側證語口中不仁小柴胡湯太陰腹滿吐定不可枳實理中湯少陰咽乾腹滿不大便急下之大承氣湯下利腹滿身痛先溫其裏四逆湯後解其表桂枝湯汗後腹滿當溫厚朴半夏生姜人參湯吐後腹滿少與調胃承氣湯下後腹滿而悸氣邪則腹滿而咽乾陰寒爲邪則腹滿而吐利食不下若曾經吐汗下後腹滿者治各不同也

腹痛

腹痛者總邪氣與正氣相搏則爲腹痛如陽邪傳裏而痛者其痛不常當以辛溫之劑和之小建中湯陰寒在內而腹痛者則痛無休時當欲作利也以熱劑溫之附子理中湯有燥屎宿食而痛者則痛而不大便腹滿而硬痛也大承氣下之少陰下利清穀腹欲絕腹痛者通脈四逆湯兼小便不利者與武湯實痛而關脈實者桂枝大黃湯經云諸痛爲實則痛隨利減之法也

小腹滿

小腹滿者膀胱下滿也若胸滿心下滿腹中滿胃爲邪氣而非物今小腹滿則爲留血之形小便不利此乃溺澀之證滲利之劑宜分兩途太陽病不解熱結膀胱其人如狂小腹急滿結痛者桃仁承氣湯下蓄黑物則愈太陰身黃脈沉小腹滿小水不利者五苓散利之小便當白爲愈病人素有痛氣逆在脇肋痛引入陰筋者名臟結死也

嘔吐

嘔者擊物俱有而旋出吐者無聲有物而頓出有聲無物爲乾嘔也較之輕重則嘔甚於吐矣蓋表邪傳裏裏氣上逆則爲嘔也大抵邪在半表半裏則多嘔及裏熱而嘔吐者俱用小柴胡湯故經云嘔多雖有

陽明證不可攻攻之爲逆若太陽少陽合病而嘔者黃芩加半夏湯太陽陽明合病當自利若不利而嘔者葛根半夏湯三陽俱熱而嘔但用小柴胡湯先嘔後渴此爲欲解當與水解先渴後嘔爲水停心下茯苓湯若陽明證發熱汗出心煩痞硬下利嘔吐大柴胡湯若胃冷脈沉遲不食小便利者半夏理中湯加姜汁利而見厥逆者難治以其虛寒之甚也

乾嘔

乾嘔者空嘔而無物出也大抵熱在胃脘與穀氣併熱氣上蒸心下痞結則有此證太陽汗出乾嘔桂枝湯主自汗也少陰下利乾嘔麥門冬湯主下利也厥陰吐涎沫乾嘔吳茱萸湯主涎沫也邪去嘔自止又有水氣二證太陽表不解心下有水氣身熱乾嘔者微喘或自利小青龍湯不發熱只惡寒腦痛欬而利乾嘔者亦水氣也十棗湯腦上有寒飲乾嘔者腦少陰四逆湯也

噦

噦即乾嘔之甚者非比乾嘔則有聲濁惡而長者有物而無物也蓋因胃氣本虛因汗下太過或恣飲冷水水寒相搏虛逆而成也又有熱氣擁鬱上下不得通而噦者輕則和解陳利重則溫散噦而腹滿大便不利先用半夏生姜湯次用小承氣小便不利者猪苓湯噦不止者乾姜橘皮湯溫病有熱欬飲冷水作噦茅根乾葛湯噦家若不尿而噦者則病篤矣

氣逆

氣逆者俗謂乞忒是也氣發聲於咽喉則速止氣然連續數聲然而短促不長古謂之噦非也噦與乾嘔無異但其聲濁惡而長比之乞忒大有遲延矣若將乞忒案爲噦與欬逆誤人多矣若便實脈本有力者少與承氣湯微利之因當下失下熱氣入口于肺故耳若便軟脈來無力瀉心湯因胃氣而衝逆故耳脈散者難也

下利

下利者傷寒下利多噴於熱熱邪傳裏裏虛協熱亦爲下利三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身涼無熱此其大略耳夫自利清穀不渴小便色白微寒厥冷惡寒脈沉遲無力此皆寒證也若渴欲飲水溺色如常泄下黃赤發熱後重此皆熱證也寒者理中四逆湯熱者小柴胡猪苓湯寒因直中陰經熱因風邪入胃水來傷土故令瀉下或濕或攻或固下焦或利小便隨證施治但不宜發汗耳若汗之便邪氣內攻復泄其津液胃氣轉虛必成脹滿也太陽陽明合病下利葛根湯太陽少陽合病下利乾嘔脈實者承氣湯太陽表未解數下之遂協熱利心下痞者桂枝人參湯太陰自利不渴與夫厥逆無脈而利者四逆湯少陰咽痛下利胸滿心煩者猪膚甘桔湯渴而自利純清水心下硬痛口乾燥者此不可溫急用大承氣湯下之無疑矣傷寒結得下利滑穀身疼痛者急當救裏四逆湯清便自調急當救表桂枝湯下利讝語脈沉有力爲有燥屎急當下之大承氣湯腸鳴腹痛下利脈沉遲無力急當溫之小建中湯寒毒下利而穀陽者下盡也附子理中湯若夫下利讝語目直視下利厥冷燥不眠下利發熱厥而自汗

熱入血室

熱入血室者衝脈爲血之海卽血室也男女均有此血氣亦均有此衝脈得熱血必妄行在男子則爲下血讝語因邪熱傳入正陽明腑在婦人則爲寒熱似瘧邪乃隨經而入客爲熱入血室太陽不解熱結膀胱其人如狂而血自下者愈用桂枝湯陽明下血讝語胸滿如結胸夜則如見鬼此爲熱入血室小柴胡湯下無血其人如狂小腹急結小便自利大便反夫下利無表裏證脈數不解消穀易飢多日不大便此爲瘀血桃仁承氣湯少陰病下利濃血或腹滿如魚腦者桃花湯主之

四逆

四逆者手足厥冷不溫謂之四逆邪在裏則手足熱邪在半表裏則手足溫至於邪傳少陰則手足冷逆也然自熱而致溫由溫而致厥乃傳經之邪輕則四逆散重則承氣湯下之若初起得病便厥者輕則理中湯重則四逆湯溫之此爲陰經受邪乃陽不足而陰有餘也若或惡寒厥逆躁臥煩燥吐利而脈不至者皆惡候也

不大便

不大便者因發汗利小便過多耗損津液以致腸胃乾燥蓋邪熱傳入正陽明裏證最多惟見發渴讝語脈實狂妄潮熱自汗小水赤甚心腹脹滿硬痛急用三承氣湯選而下之大便通而熱愈矣倘脈浮表證尚在或帶嘔者知邪未全入解尤在半表裏間尚用小柴胡和之候大便硬實不得不下者只得以大柴胡下之若陽明汗多或已經發汗利小便而大便不通者此津液枯竭宜蜜導通之

讝語

讝語者經云邪氣盛則實精氣奪則虛故實則讝語虛則鄭聲胃中實熱上乘於心心爲熱胃則神識昏迷妄有所見而言也輕則睡中呢喃重則不睡亦語有讝語者有獨語者有語言不休者有言亂者此數者見其熱之輕重也大抵熱入於胃水涸糞燥必發讝語爲實也有被火劫取汗而讝語者有下利清穀不渴讝語者此爲虛也或脈來沉實洪數有力大便不通小水赤澀渴讝語狂妄腹中脹滿硬痛或潮熱自汗或下利純清水心腹硬痛者皆裏證邪熱燥屎也俱大承氣下之下後利不止與夫嘔滿氣逆而上衝自利氣脫而下奔皆爲逆也其三陽合病身重脈實難轉口中和而垢遺尿白虎湯或大便結大熱乾嘔錯語呻吟不眠犀角解毒湯初得病無熱狂言煩燥不安精采不與人相當與五苓散三錢以新汲水探吐一法用桂苓湯狂言漱水不欲嚥大便黑小水不利身黃脹滿此因當下失下是瘀血讝語桃仁承氣下盡黑物則愈婦人經水適來適斷結得寒熱此爲熱入血室讝語桃仁承氣下盡黑物則愈矣

鄭聲

鄭聲者如鄭衛之音轉不正也蓋汗下後若病久本音失而正氣虛則語散不知高下乃精氣奪之候其

脈微細。大小便自利。小柴胡湯也。

小便不通

小便不利者。邪氣聚於下焦。結而不散。甚則小腹硬滿而痛。此小便不通也。大抵有所不利者。行之取其滲利也。若引飲過多。下焦多熱。或中濕發黃。水飲停滯。皆以利小便爲先。惟汗後亡津液。胃中乾。與陽明心下悸頭眩。身瞤筋惕振擗地者。眞武湯。吐汗下後。虛而脈沉數。心下痞。腸鳴氣衝咽喉不得息。身振搖筋肉惕。久則成痿。茯苓白朮桂枝甘草湯是也。

小便赤澁

小便難者。陰虛也。陽必湊之。由膀胱受熱。故小便赤澁而不能流利也。又有雖不大便五六日。而小便少者。但初硬後溏。不定。或硬攻之。必溏。候小便多屎定硬。方可攻之。乃胃中水穀少。便雖通而不多。如豬苓當歸四逆湯是也。

小便自利

小便自利者。爲津液偏滲。大便必硬。宜藥下之。太陰當發身黃。其小便自利者。則濕熱內泄。不能發黃。惟血證小腹急而如狂。小水自利者。腎與膀胱虛而不能約制水液。桃仁承氣下之。若自汗小便數者。雖有表證。不可用桂枝。謂其走津液也。若誤服之。得厥者。以甘草乾薑爲治也。

舌胎

舌上白胎者。以丹田有熱。胸中有寒。謂其寒邪初傳入裏也。小柴胡湯。舌乃心之苗。色應南方火邪在表。則未生胎。邪入裏。津液結搏。則舌上生胎而滑。熱氣漸深。其舌胎燥而澁。熱炙于胃。其胎爲之黃矣。宜承氣湯下之。若舌上黑色胎者。則熱已深。病已篤。經曰。熱病口中乾舌黑者。乃腎水刑於心火也。脈浮陰陽俱緊。口中氣出。舌中乾燥。蹉臥足冷。鼻中濈出。舌上滑胎。勿妄治也。到七八日以來。徵發熱。手足溫者。此爲欲解也。及或大發熱者難治。設有惡寒者。小柴胡加乾姜服之。

臟結

臟結者。臟氣閉結而不復流布也。外證如結胸狀。但欲食腹滿如故。下利舌上白胎者爲異。其脈寸浮關沉緊。痛引陰筋。脇腹脹痛者。難治也。

咽痛

咽喉不利而痛。或成瘡不納穀食。皆邪熱毒氣上衝而痛。甘桔苦酒湯。咽喉不利。吐膿血。手足厥冷不止者。難治。升麻六物湯主之。

頭眩

頭眩者。少陽半表裏之間。表邪傳裏。表中陽虛故頭眩。又有汗下後而眩冒者。亦陽虛所致。少陰下利止時頭眩。時時自冒。此虛極而脫也。太陽病若下之因復發汗。以此表裏俱虛。其人必冒。冒家汗自出而愈。

發斑

發斑者。大熱則傷血。熱不散。裏實裝虛。熱乘虛出於皮膚而爲斑也。輕則如豹子。甚則如錦紋。或本關陽。

發黃

發黃者。濕熱交併。民多病癉者。單陽而無陰也。太陰脾土濕熱所蒸。色見於外必發黃。濕氣勝。則如薰黃而暗。熱氣勝。則如橘黃而明。傷寒發黃。熱勢已極。且與蓄血大抵相類。但小便不利。大便實者爲發黃。輕則五苓散。重則茵蔯湯。小便不利。大便黑者爲蓄血。輕則犀角地黃湯。重則桃仁承氣湯。濕家爲病。一身盡痛。發熱身如薰黃。小便不利者。五苓散。小便自利無黃者。瓜附湯。煙煤搖頭直視。環口黎黑。巢氏體發黃者。此皆眞臟絕也。

誤投熱藥或當汗不汗當下不下或汗下未解皆能致此有兩證一曰溫毒即冬時觸寒至春而發汗下不解邪氣不散故發斑也一曰熱病即多時溫毒或乖厥氣過春蒸熱而發也慎不可發汗若汗之重令開泄更增斑爛也然而斑之方萌與蚊迹相類發斑多見於胸膈蚊迹只見於手足陽脈洪大病人昏憒先紅後赤者斑也脈不洪大病人自靜先紅後黃者蚊跡也其或大便自利或短氣燥屎不通熱斑如菓實狀盧醫不能施其巧矣凡汗下不解足冷耳聾煩悶欲嘔吐下部井口有瘡者黃連橘皮湯陽毒斑如錦紋而赤咽痛脈洪大不知人者三黃石膏湯便實燥渴者調胃承氣下之發斑通用升麻犀角湯熱多者玄參升麻黃連一物湯治也

發狂

發狂者陽而狂熱毒所深併入於心遂使神不寧志不定始得少臥不饑譫語妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋屬醫不避親踈皆謂陽亢盛不大下之何能止也若因當汗不汗瘀熱在裏下焦蓄血如狂者小便必自利大便黑雖時如狂未至於狂耳須桃仁承氣下之重陽即陽毒脈洪大而赤咽痛潮熱發斑如錦紋或下利黃赤陽毒升麻湯不効者三黃石膏湯大便實者調胃承氣湯下之太陽病不解熱結膀胱其人如狂而血下者愈者外不解與桂枝湯外已解但小腹急結與夫脈沉身黃脣燥漱水小水自利者亦是血證如狂輕則犀角地黃湯重則桃仁承氣下之若狂言直視便溺自遺與汗後大熱躁燥狂言不能食此爲虛也

肉瞤筋惕

肉瞤筋惕者非常常有之陽氣者精則養神柔則養筋發汗過多津液涸少陽氣偏枯筋肉失所養故惕惕然動瞤瞤然跳也非溫經助陽之藥何有愈乎故散眞武湯以救之因汗吐下後表裏俱虛有此證者逆之甚也

拂鬱

拂鬱者乃陽氣蒸越形於頭面膚之間聚而不散也其證有分別如大便硬而氣短燥渴者實也大柴胡湯下後有此證欲水而嗽者胃虛也桂枝人參湯加茯苓初得病發汗不徹併於陽明納自徹汗出面色赤者陽氣拂鬱也解肌湯或汗不徹其脈浮緊者與麻黃湯或小便不利時有徹熱大便乍難拂鬱不得臥此有燥屎作實也承氣湯下之是也

瘧後昏沉

瘧後昏沉或半月以來或十餘日終不惺惺錯語少神或寒熱似瘧或潮熱此因發汗不徹餘熱在心胞絡間故也知母麻黃湯微汗之若胃口有熱煩煩而嘔者竹葉石膏湯加生姜治也

勞復食復

病新瘥後因勞動再發爲勞復緣其血氣未平餘熱未盡一或勞之熱氣遂還于經絡而復發也小柴胡湯加減治之表者汗之裏者下之病新瘥後而多食復發者爲食復緣土虛不能勝穀氣如水浸墻壁水

退土尙未堅合其損穀則愈輕則消化重則吐下如蹶脈實大熱燥渴譫語煩痛大便實急下之不可緩也

動氣

動氣者腦氣不調築築然跳動隨所主而形見於臍之左右上下也其人先有痞氣而後感於傷寒腎人不知患有痞積在內妄施汗下吐法致動其氣故曰動氣凡汗吐下豈可輕舉之乎可見傷寒所以宿外證爲當者蓋不在脈之可見必待問證之可得又有眞氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚以其走痛衝突如奔豚皆不宜汗下通用理中去白朮加桂綠白朮燥腦閉氣故去之桂能泄奔豚故加之然而獨不言當臍有動氣者脾爲中州以行津液妄施汗下必先動脾氣是以不言而喻也左右上下尙不宜汗下何況中州之氣豈敢輕動之乎

傷寒霍亂

霍亂者上吐下利揮霍擾亂也及邪氣飮食所傷邪在中焦既吐且利邪在上焦吐而不利邪在下焦而不吐俱用正氣散加半夏生姜汁治之如吐利不止者理中湯如其上下不絕腹痛甚而頭疼發熱者桂枝大黃湯此爲乾霍亂死者多因其所傷之邪不得出擁塞正氣陰陽隔絕先用吐法也

不仁

不仁者謂不柔和痛痒不知針火不知是也諸虛乘寒爲寒冒胃不仁血氣虛弱不能周流於一身於是正氣爲邪氣所伏故肢體頑麻不仁厥如死屍用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯入姜汁發成身體如油汗不休喘而直視水漿不入者此爲命絕也

陰陽易

陰陽易者如換易之易以其邪毒之氣而交相易換也男子病新瘥婦人與之交動淫慾而反得病者婦人病新瘥男子與之交動淫慾而反得病者其候身重氣乏小便渾痛不能舉足不能移四肢拘急百節解散眼中生花熱氣衝胸在男子則陰腫人小腹攻刺在婦人則裏急連腰脊重引腹內痛若手足厥逆之甚也不能舉其脈雖經者皆不治也其不因易而自病復發爲之女勞復通用逍遙散之加減治也

不眠

不得眠者陽盛陰虛則晝夜不得眠蓋夜以陰爲主陰氣盛則自閉而臥安若爲陽所勝故終夜煩擾而不得眠所謂陰虛則與夜爭也汗出鼻乾不得臥者邪在表乾葛解肌湯若胃有燥屎大熱錯語及大汗胃中乾不得眠者邪在裏也用大承氣下之胃不和則臥不安故宜滌熱和胃也若汗下後虛煩不得眠梔子豉湯咳而嘔心煩悶不眠者水氣也豬苓湯下後復熱晝日煩燥夜則安靜無大熱者乾姜附子湯吐下後心中懊憹不眠者梔子豉湯陽勝陰狂言不眠亂夢心煩之氣者酸棗湯陰勝陽則驚悸昏沉大熱乾嘔錯語呻吟不眠者犀角地黃湯治之汗出脈虛不眠者小建中湯主也

天癸氣者，晝則行陽，夜則行陰，行陰則寤，陽氣虛，陰氣盛，則目瞑，故多眠，乃邪傳于陰，而不在陽也，昏昏閉目者，陰自盛也，默默不言者，陰至靜也，太陽病十餘日，脈浮細嗜臥者，外已解，神將復也，設胸滿脇痛，鼻乾不眠者，風熱內攻，不干乎裏，故熱氣伏於裏則喜睡，不得汗者，小柴胡湯，脈浮者，先活冲和湯，多用麻黃湯，少陰病，欲吐不吐，欲嘔不嘔，心煩多寐，五六日自利而渴，小便白者，四逆湯，若復煩熱不得臥者，不治，二陽合病，欲眠目合，則汗諸語者，則有熱也，小柴胡湯加大黃蜜少許微利之，

狐惑

狐惑者，猶豫不決，進退之義也，有濕蝕皆虫證，腹中有熱，食入無多，腸胃空虛，三虫求食，而食入五臟，其候四肢沉重，惡聞食氣，默默欲眠，目閉舌白，齒晦面目，間赤白黑色，易無常，重食下部，爲狐，下脣有瘡，其咽乾，虫食臟，爲惑，其聲啞，二者通用，黃連犀角地黃湯加桃仁，趣入穴而食之，厥陰消渴，氣上衝心，飢不欲食，食卽吐蚘，既曰胃寒，復有消渴，蓋熱在上焦，而中下焦則但寒而無熱，又有大便黃證，並用理中湯加大黃蜜少許微利之，

百合

百合者，百脈一宗，衆皆受病，所謂無復經絡傳次也，大病虛勞之後，臟腑不平，變成此證，似寒無寒，似熱無熱，欲食不食，欲坐不坐，欲行不行，口苦便赤，藥入卽吐利，其脈微數，每尿則頭痛者，六十日愈，不頭痛，但漸然惡寒者，四十日愈，若尿快，然頭眩者，二十日愈，俱用百合知母地黃湯也，

蚘厥

蚘厥者，厥陰病人，素有寒，妄發其汗，或汗後身熱，以致胃中虛冷，飢不能食，食卽吐蚘，乍靜乍煩，蚘或上或止，蚘聞食卽出也，治法在前，

傷風見寒傷寒見風

熱盛而煩，手足自温，脈浮而緩，此傷風見寒也，不煩少熱，四肢微厥，脈浮而緩，此傷寒見風也，二者爲衆病，法雖用大青龍湯，此湯峻險，不可輕用，須風寒俱盛，又加煩燥，方可與之，不若先活冲和湯爲神藥也，

痙

痙者，先太陽中風，重感於寒，無汗爲剛痙，中風重感於濕，有汗爲柔痙，俱身熱足寒，頸項強急，惡寒，頭面赤，目脈赤，獨摇卒口噤，背反張，手足拳搐，皆痙病也，傷風頭痛，常自汗出，而嘔，若汗之必發痙，大發濕家汗，亦作痙，新産血虛，汗出當風，亦成痙，若脈沉而遲，或緊或散于指外者，皆死證也，有汗加減冲和湯，無汗者，先活冲和湯，口噤咬牙者，大承氣湯下之，

痓病

痓病者，痓則急而縮，痙則緩而伸，熱則生風，風主乎動，故筋脈相引而伸縮，傷寒至此證，可謂死矣，能以去風滌熱之劑，間有生者，是其幸也，治法俱病同，

風温

風温尺寸俱浮，若傷于風，因時傷熱，風與熱搏，卽爲風温，其外證四肢不收，身熱自汗，頭垂喘息，發汗昏瞶，或體重不仁，惧不可汗，汗之則譫語，煩燥，撮目亂，無睛光，病在少陰，厥陰二經，麥煎湯，小柴胡，選用，未醒者，柴胡桂枝湯，發汗復身，灼熱，知母葛根湯，渴者，瓜蔞根湯，脈浮身重，防己黃芪湯也，

濕温

濕温寸濇而弱，尺小而急，柔傷于濕，因時中暑，濕與熱搏，卽爲濕温，其狀胸腹滿，固痛壯熱，妄言自汗，兩經疼惱，怠惡寒，若發其汗，使人不能言，耳聾不知痛處，其身青而色變，是腎殺人，且濕温在太陰，苦兀白虎湯加桂，濕氣勝，一身盡痛，發熱身黃，小便不利，大便盡快，五苓散加茵陳，無虛，白利，附子理中湯也，

風温

風濕脈浮，先傷濕而後傷風也，其證肢體煩痛，不能轉側，額上微汗，惡寒不欲去衣，大便難，小便利，熱至日晡而劇，治法但微解肌，若正發汗，則風去濕在，非徒無益，而又害之，先活冲和湯，咽乾，小便不利者，五苓散，外不熱，內不渴，小便利，尤附湯，緩弱，昏迷，腹滿，身重，自汗失音，下利不禁，白虎湯加白朮，去甘草，身體痛，微喘惡風，杏仁湯，熱而煩渴者，小柴胡加天花粉，若誤下之，小便必不利，五苓散，中濕，小便不利，一身盡痛，身黃，大便快，茵陳五苓散，大小便俱利，無黃者，尤附湯，身痛鼻塞，小建中湯加黃芩也，

温毒中暍

温毒者，冬月感寒毒異氣，至春始發也，表證未能，毒氣未散，故有發斑之候，心下煩悶，嘔吐咳嗽，後必不利，寸脈洪數，尺脈實大，爲病則重，以陽氣盛故耳，通用玄參升麻湯也，

中暑脈虛而伏，身熱面垢，自汗煩燥，大渴，毛發，背惡寒，昏倦，身不痛，與傷寒諸證大不同矣，內外俱熱，口燥煩渴，四肢微冷，而不痛，用白虎湯，痰逆惡寒，橘皮湯，熱悶不惡寒，竹葉石汗湯，頭痛惡心，煩燥，五苓散，中暑用小柴胡加香薷最良，脈遲，洒然毛發，口齒燥，人參白虎湯，宻亂，煩燥，大渴，腹痛，厥冷，轉筋，黃連香薷湯治爲要也，須頓冷服之，如熱服，反爲吐瀉矣，

戰慄

戰慄者，陰陽相爭，故身爲之戰搖也，邪與正氣外爭爲戰，內與正氣爭爲慄，正勝邪得汗而解，邪勝正途成寒證矣，在表者，先活冲和湯，在內者，人參理中湯，此陰經目中之眞寒者，用之俾經戰慄者，大柴胡湯治之是也，

735

明理續論序

昔朱肱奉議著傷寒百問。書成經進。授醫博士。其書付諸刊行。道遇豫章名醫宋道方。因就質之。宋爲指瑕數十條。肱悶然自失。由是書鬻不刊。事見續易簡方雙鍾李知先。又爲歌括八韻二書。吾鄉先輩例以爲活人之書。按魏志佗傳云。出書一卷。此書可以活人。則活人之名所由始。而仲景傷寒論是也。朱李二公雖知有仲景之書。不能窺其闖奥。未足以充活人之名。正統改元。余避京師。遇臨江劉志養先生。授書一卷。指摘百問亦數十條。擴以南歸。呈之松江趙景元先生。奉議之書。固未盡善。而劉公所駁似爲大察。前人無議爲也。且仲景之書流傳既久。魚魯實多。微辭奥旨之互見。殘簡斷篇之後先。朱公既未知其文。又不知其證候。然自漢魏以來。高人逸士所著。不傳于今者。何可勝數。因出示諸書。曰郭白雲傷寒補亡。龐安常卒病論。韓祇和微旨。楊仁齋傷寒類書。王實證治。常器之楊大授。凡此數種。皆有功于仲景。而東南醫流所未見也。景元亦自編一書。曰傷寒類例。久未之成。不以示人。庚寅冬。予病足。不出戶庭數月。因觀成無己明理論。止五十證。辨究詳明。惜其未備。於是乃集所見所聞。比類附例。揭酌而損益之。遂成一書。名曰明理續論。姑以自備遺亡。非敢傳諸人也。雖朱公百問稍平生之物。尙不免後人之紛紜言之。予寡何人。乃以數月而有所成。蓋賴古人之成訓。有以啓發之。初學醫之士。或有所得焉。當有知予心者。乃記其所由於卷首云。

傷寒明理續論

傷寒三陰三陽脈證論

傷寒汗下溫之法。最不可輕。據脈以驗證。問證而對脈。太陽者、陽證之表也。陽明者、陽證之裏也。少陽者、三陽三陰之間。太陰、少陰、厥陰、又居於裏。總謂之陰證也。發于外則太陽爲之首。發于內則少陰爲之先。太陽惡寒而少陰亦惡寒。但太陽之脈多浮。少陰之脈沉細。與其他證狀亦自異也。發熱惡寒。身體疼痛。或自汗。或無汗。是爲表證。可汗。不惡寒。反惡熱。口燥咽乾。壯熱。腹滿。小便如常。而大便祕結。是爲裏證。可下。厥冷囊縮。自利煩燥。而無身熱頭疼。是爲陰證。可溫。浮洪緊數。此表病之脈。沉實滑數。此裏病之脈。微細緩。若此陰病之脈。在表者、邪傳於榮衛之間。在裏者、邪入于胃腑之內。胃腑之下。少陽居焉。若傳之陰。則爲邪氣入臟矣。榮與衛俱爲表也。亦均可汗也。然有汗者爲傷風。風傷衛氣。則以桂枝助陽而汗之。輕重汗者爲傷寒。寒傷榮氣。則以麻黃湯助陽而汗之。蓋榮衛固爲表也。胃腑亦可以爲表也。然以腑臟而分之。則表者榮衛之所行。裏者胃腑之所主。而臟則又深于裏者矣。審脈問證。辯明定經。眞知其爲表邪。則汗之。眞知其爲裏邪。則下之。眞知其爲陰證。則溫之。表有邪則爲陽虛。陰經受邪則爲臟病。而溫裏之藥。熱如此而汗。如彼而下。又如彼而溫。桂枝、承氣、投之不差。姜附理中。發而必中。大抵治傷寒有法。投劑少差。死生立見。古人處方立

論曰可汗、曰可下、曰可溫、曰和解、曰少與、曰急下、與夫先溫其裏乃發其表、先解其表乃攻其裏、謂知命者、若網在綱、有條不紊、論至于此、則知古人之立論甚嚴而汗下溫之法、亦不可輕也、信夫經曰、傷寒六七日、目中不了了、睛不和、無表證、脈雖浮、亦有可下者、少陰病二三日、無裏證、亦有可汗者、陰證四逆、法當用溫、而四逆散性寒、豈可用哉、曰醫在九流之中、非聞機之士、不足爲詰也、脈雖浮而亦可下者、無表證、謂六七日不大便、借使大便不難、其脈輕下之乎、少陰病亦有發汗者、少陰本無熱、反發熱而表猶未解、故用溫藥、微取其汗也、借使身不發熱、其脈輕汗之乎、四逆散用枳、柴一寒一熱、病主四逆、固不侔矣、然傷經之邪、與陰經受邪初病便厥者不同、四逆散用藥寒、主先陽後陰也、四逆湯用藥熱、主陽不足而陰有餘也、若張氏之論曰、數多、則曰日數雖多、但有表證而脈浮者、猶可發汗、曰數雖少、若有裏證而脈沉實者、卽須下之、此日數之不可拘也、至如陽極發厥、陰極發燥、陰證似陽、陽證似陰、差之毫釐、繆以千里、可不深思而熟慮也哉、

陰陽虛實用藥寒溫辯

傷寒一書、所謂陰陽虛盛、則精微之義、不無辯析於其間、四十八難曰、病之虛實、出者爲虛、入者爲實、蓋表之真陽既虛、故陰邪以盛出而乘陽、是以脈浮于外、其病在表、法當汗之、當其陰邪出表、脈浮于外之時、不可自咸、以爲陽脈盛也、裏之真陰既虛、故陽邪以盛入而乘陰、是以脈入于內、其病在裏、法當下之、當其陽邪入裏、脈實于內之時、不可自惑、以爲陰脈盛也、是說非古人之立言也、蓋使人知如此之爲陰盛則抑陰而助陽、陰甚則抑陽而助陰、如彼之爲陽盛則抑陽而助陰、如此之爲陰盛則抑陰而助陽、如桂枝湯之類是也、陽盛則邪入于內者、攻裏之藥、當性寒以抑陽氣、如承氣湯之類是也、或曰、陰出而乘于外、是陽之不足也、陽病則當有以發表而汗之、何哉、是大不然、陰邪傳于外、不汗之則邪何由而去、桂枝之性溫、溫之乃所以助陽、陽有所助而長、則陰邪之所由以消、辛甘發散爲陽者此也、張氏所謂承氣入胃陰盛乃亡者、正恐陰盛出外而誤以承氣下之、安得而不亡、或者有陽入而承于內、是陰之不足也、陰病則當有以溫發而下之、何哉、是又不然、陽邪入于內、不下之則邪從何而出、承氣之性寒、寒之乃所以抑陽、陽受其抑則微、而與陰之所由以長、酸苦湧泄爲陰者此也、張氏所謂桂枝下咽陽盛則斃、正恐陽盛入內而誤以桂枝汗之、又安得而不死、觀古人發表之藥多溫、攻裏之藥多寒、則知陰陽盛則斃、正恐陽非止於汗下設矣、所以爲用藥寒溫設也、

六經用藥格法

太陽膕膀胱水、非發汗不能愈、亦有桂枝麻黃以助陽祛邪、此膀胱寒水之經、有標本之作、風寒初客仍在表、宜用辛溫之劑以發散之、若無頭痛惡寒、或非冬時、皆不可用、

陽明胃非通泄不能瘥、必用大黃芒硝以疎利陽熱、此胃裏證已罷、頭痛惡寒已除、則熱屬陽明之本矣、宜承氣湯寒劑以泄熱、若惡寒未除、則爲表寒邪尚在、不可下也、冬時亦宜用、不可拘忌、

少陽膽腑、無出入之道、柴胡半夏能利能汗、消解血熱、黃芩佐之、

汗下溫正法

太陰脾土、惟惡寒濕、非乾姜白朮不能燥濕也、

少陰腎水、惟惡寒燥、非附子不能溫潤、

厥陰肝木、藏血榮筋、非芍藥甘草不能滋養、此用藥經常之道也、

陰陽虛盛用藥寒溫辯

夫傷寒發表攻裏之藥、寒熱殊途、用之一差、死生反掌、所以越人、仲景、深致意於其間也、難經云、傷寒陽虛陰盛、汗之則愈、下之則死、陽盛陰虛、汗之則死、下之則愈、且寒邪之傷人也、有淺深焉、淺者汗之、深者下之、此古今不易之定法也、方其風寒初客皮毛之間、陰氣乃盛、附寒腠理、身中陽氣已虛、不能與御、遂有惡風惡寒之證見焉、當此之時、止宜桂枝湯、辛甘溫之藥、助陽抑陰而發之、陰邪既散、表氣冲和而愈、經云、辛甘發散爲陽者是也、不知用此而反以承氣湯苦寒之藥下之、表裏俱傷、不亡何待、表邪既罷、寒作爲熱、陽陷入深而盛於裏、則津液消耗、腸胃燥澁、而臟腑之真陰虛矣、陰氣既虛、卽譫妄狂躁、煩渴惡熱之病而作也、當此之時、宜用承氣湯苦寒之劑、扶陰抑陽而泄去熱氣、陽邪卻退、胃中真陰來復、表氣和平而愈、內經所謂酸苦湧泄爲陰者是也、不知用此、乃以桂枝辛熱之藥助邪伐正、安有不斃者乎、所以仲景云、桂枝下咽、陽盛則斃、承氣入胃、陰盛乃亡、良以此矣、嗚呼、此論誠爲傷寒汗下之樞機乎、俗醫不能達此爲妙、昧于陰陽虛盛之道、悖逆此理而不殺人也幾希、經云、發表不遠熱、攻裏不遠寒、豈虛語哉、

三陰三陽脈證

經云、尺寸俱浮大者、陽受病也、當一二日發、以其脈上連風府、故頭項痛腰脊強、傷寒則發熱惡寒、傷風則鼻塞惡風、然傷風有汗、傷寒無汗、

尺寸俱長者、陽明受病也、當二三日發、以其脈夾鼻絡于目、故身熱目疼鼻乾不得臥、又曰、不惡寒而作渴、皆爲在經、不惡寒反惡熱、自汗出大便難、

尺寸俱弦者、少陽受病也、當三四日發、以其脈循脅絡於耳、故胸脅痛而耳聾、口苦、咽乾、目眩、往來寒熱而嘔、此三經受病未入于腑者、可汗而已、

尺寸俱沉細者、太陰受病也、當四五日發、以其脈布胃中絡于嗌、故腹滿而咽乾、或腹痛手足溫、自利不渴、

尺寸俱沉者、少陰受病也、當五六日發、以其脈貫腎絡于肺繫舌本、故口燥舌乾而渴、惡寒、時時腹痛、又咽痛三證、

尺寸俱微緩者、厥陰受病也、當六七日發、以其脈循陰器絡于肝、故煩滿而囊縮、唇青舌捲筋急、或渴不欲食、卽吐蛔、此三經皆受病也、已入於腑者、可下而已、此皆自陽經傳來者、故宜下而去之、非若陰經自中之寒、此則爲真陰證矣、當用四逆湯發溫之、

太陽傷風自汗惡風桂枝湯。傷寒無汗惡寒麻黃湯。陽明不惡寒反惡熱自汗者、大便難。大柴胡湯、小承氣湯。汗不止者胃汁乾。急下之。大承氣湯。無汗惡寒。爲表未解。桂枝湯。無汗脈浮面喘麻黃湯。

少陽證病。屬小柴胡湯。

太陰自利不渴爲臟寒。理中湯、四逆湯。胸中脹滿。枳實理中丸。服滿脈浮。桂枝湯。脹滿時痛。桂枝加芍藥湯。痛甚。桂枝加大黃湯。

少陰脈沉。口不乾。舌不燥。皆惡寒。小便清白。四逆湯。始得病。脈沉。反發熱。麻黃附子細辛湯。口燥咽乾而渴。急下之。大承氣湯。六經中惟此一經難治。大要以口燥而渴知其熱。脈沉而遲別其寒。

厥陰脈微浮爲欲愈。不浮爲未愈。小建中湯。厥浮緩如蝦狀。桂枝麻黃各半湯。厥沉短者盛必縮。爲毒氣入臟。承氣湯下之。利不止者四逆湯。

傷風見寒傷寒見風脈證

熱盛而煩。手足自溫。脈浮而緊。此傷風見寒脈也。不煩少熱。四肢微厥。脈浮而緩。此傷寒見風脈也。二者爲榮衛俱病。法用大青龍湯。然不可輕用。須風寒俱盛。又加煩燥。方可與之。

一法以桂枝麻黃湯尤穩。今改羌活湯。

三陽合病

本太陽病。若汗若下若利。小便無津液。胃中燥。轉屬陽明。是爲脾約。若惡寒。用升麻葛根、不惡寒反惡熱。大便難。白虎湯。證語者。調胃承氣湯下之。喘而胸滿者。不可下。麻黃湯。太陽少陽。頭項強急。脅下硬滿。目眩。往來寒熱。小柴胡湯。

少陽陽明。本少陽病。因爲發汗利小便後。胃中燥。大便難。屬調胃承氣湯。

正陽陽明。乃本經風盛氣實也。大柴胡湯、大小承氣湯、選用之。

三陽合病。腹滿。身重。譫語。遺尿。口中不仁。屬白虎湯。口乾舌燥。不仁。背惡寒同太陽陽明。少陽陽明、正陽陽明、無表證者。俱可下。惟惡寒者。爲太陽陽明合病。未過經。爲屬表。可發汗。桂枝麻黃各半湯。蓋在經則汗。過經則下也。

太陽陽明併病

本太陽病發汗則汗出不徹。因轉出陽明。續自微汗出。不惡寒。是併歸陽明也。

太陽證尚在。桂枝麻黃各半湯。太陽證也。大小承氣湯。陽明證也。

春溫變熱

溫熱病者。冬時感寒。偶不即發。寒毒藏於肌膚。至春變爲溫病。夏變爲暑病者。熱又甚於溫也。溫病發於春三月。夏至前是也。發熱咳嗽。頭疼。身痛。口燥渴。脈浮弦。熱甚者。小柴胡湯。熱微者。升麻葛根湯。解肌湯。微熱不渴。小柴胡加桂枝。渴者加五味。渴者去半夏加栝蔞。人參。脈實煩渴者。大柴胡湯微利之。以利寸脈洪數。尺脈實大。爲病則重。以陽氣盛故耳。治法。通用玄參升麻湯。黑苔主之。詳見發斑條中。

溫毒中暍

溫毒者。冬月或寒毒異氣。至春始發也。表證未能毒氣不散。故有發斑之證。心下煩悶。嘔逆咳嗽。後必下利。寸脈洪數。尺脈實大。爲病則重。以陽氣盛故耳。治法。通用玄參升麻湯。黑苔主之。詳見發斑條中。

中暑脈虛而伏、身熱背惡寒、面垢、自汗、煩燥、大渴、毛聳惡寒、皆昏倦息、而身不痛、與傷寒諸證不同矣。內外俱熱、口燥煩渴、四肢微冷、而身不痛、用白虎湯。痰逆惡寒、橘皮湯。熱回不惡寒、竹葉石膏湯。頭痛、惡心煩燥、心下不快、小便不利、五苓散。下消暑丸。中暑用小柴胡湯最良。脈乳遲、腠理開、漉然毛聳、口齒燥、白虎加人參湯。霍亂、煩燥、大渴、腹痛、四肢冷、脚轉筋、以黃連香薷湯。

發熱

夫發熱而熱者、表熱也。有蒸蒸而熱者、裏熱也。其屬表者、風寒客於皮膚、邪氣憑藉于外、表熱而裏不熱也。其屬裏者、陽氣下陷、入於陰中、裏熱甚而逆表也。其在半表半裏者、以表熱未能邪氣傳裏、裏未作實、則表裏俱熱而但輕于純在裏也。太陽厥陰、皆不發熱、惟少陰反有發熱之證。或其脈沉、或下利、手足冷爲異耳。雖然、傷寒發熱、病之常也。脈陰陽俱盛、熱不止者、汗後復發熱、脈燥疾下利者、皆不易治。其可例視之乎。

太陽病、發熱、頭疼、惡寒、有汗、桂枝湯。惡寒、無汗、麻黃湯。此爲質急下之、大承氣湯。脈浮數者、大柴胡湯。

傷寒六七日、中不了了、無表裏證、大便難、身微熱、此爲實急下之、大承氣湯。脈浮數者、大柴胡湯。

陽明病、發熱、汗出、脈浮數實者、調胃承氣湯。脈浮桂枝湯。汗多者、胃汁乾、急下大承氣湯。

中風發熱、六七日不解而煩、有表裏證、渴欲飲水、水入即吐、名曰水逆、五苓散。脈浮而大、其人發熱、煩渴、小便赤、表裏俱見、五苓散。

少陽發熱、脈弦細而嘔、小柴胡湯。

少陰反發熱、有二病、脈沉者、麻黃附子細辛湯。下利厥逆、裏寒外熱、厥不出者、通脈四逆湯。

脈浮發熱、無汗而渴、表未解也、小柴胡湯加人參括蔞湯。壯熱頭痛、心中煩者、梔子黃芩湯。汗下後有熱、大汗則損氣、氣損則陽微、故脈虛而惡寒。大下則傷血、血傷則陰弱、故脈濇而發熱。誤汗、誤下、皆有此耳。且陰以陽爲主、陽以陰爲根、下之亡陰矣。陰無所主、邪氣搏之、血虛乃發熱也。

太陽病發汗、遂發熱惡寒、小柴胡湯。蒸蒸而熱者、胃實、調胃承氣湯。

下後陰弱而發熱、是爲內熱、竹葉石膏湯。若脈浮則汗之、麻黃湯。脈實則下之、大柴胡湯。大下後、身熱不去、心中結痛者、未欲解、梔子豉湯。發汗又復下之、惡寒發熱無休止時、小建中湯。

傷寒以圓藥下之、身熱不去、微煩者、梔子乾薑湯。

下後身熱不去、心中結痛者、梔子豉湯。瘥後勞復發熱、小柴胡湯。脈浮者、當汗解、柴胡桂枝湯。脈沉者、當下解、調胃承氣湯。

下利腹反痞滿者、生姜瀉心湯。小便不利、麥門冬湯。食復發熱、梔子豉湯。加大黃。病後虛羸、微熱不去者、竹葉石膏湯。

頭痛

大凡頭痛屬三陽、乃邪氣上攻也。太陽專主頭痛、陽明、少陽亦有之。三陰結上不過頭、惟厥陰循喉嚨之後、上連目系、頂顛、故有頭痛、乾嘔、吐涎沫之證。却無身熱、亦與陽證不同。雖然、風濕在少陰、濕在太陰、其經從足走至胸中而還、及頭痛過於陰器、是又不可拘也。若雨感于寒、太陽、少陰俱病、則頭痛、口乾、煩滿而渴、與夫頭痛極甚、又連于胸、手足寒者、則爲真頭痛、不可治矣。

太陽病、頭痛、發熱、惡寒、無汗、麻黃湯。有汗、桂枝湯。已發汗、未發汗、頭痛如破者、葛根葱白湯。

太陽病、下之、脈細數者、頭痛未止、連翹葱白湯。

陽明頭痛、不惡寒、反惡熱、六七日不大便、胃實氣攻於上也、少與調胃承氣湯。

少陽頭痛、脈弦發熱、小柴胡湯。

濕家頭痛、鼻塞、瓜蒂末納鼻中、黃水出立愈。

痰涎、頭痛、胸滿、寒熱、脈緊、瓜蒂散吐之。

厥陰頭痛、乾嘔、吐涎沫、吳茱萸湯。

頭痛、收熱、心煩、梔子黃芩湯。

天行勞復、頭痛、四肢痛、葱頭湯。

項強

項背強者、太陽表邪也。發散則解、結胸項強、有下之證、寒濕項強則成痙。見本條、臨病宜審。

太陽病項強、無汗惡風、爲表實、葛根湯。項背強、發熱汗者、惡風、爲表虛、桂枝加葛根湯。誤下、太陰結胸項強。

大陷胸丸一法、類與理中丸。若損甚者、兼與四逆湯。項強、脊下滿、身熱、惡風、手足溫而渴、小柴胡湯。

陰毒初得病、項背強、咽痛、心腹痛、短氣、厥逆、吐利、身如被杖、附子湯。陰毒甘草湯、正陽湯。天行復作熱、至晚則腰痛、頭項強、身重、葛根生姜豉湯。

惡風

惡風者、見風則怯密室之中、無所惡也。風傷衛、衛虛則腠理不密、由是而惡矣。惡風、惡於陽。非比惡寒有陰陽之別。若無汗而惡寒者、爲傷寒。當發其汗。汗出而惡風者、則爲中風。當解其肌。不可更發汗。若裏證甚而惡風未罷者、尤當先解其表。三陽風濕、皆有此證。不可不辨。

太陽中風、陽浮陰弱、惡風自汗、發熱鼻鳴、乾嘔、桂枝湯。

頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼、惡風無汗而喘、麻黃湯。發汗太過、衛虛亡陽、遂漏不止而惡風者、法當用濕、桂枝附子湯。

小便難、四肢微急、難以屈伸、治與上同。

若吐、若下後、七八日不解、表裏俱熱、時惡風、大渴、舌乾燥而煩、白虎加人參湯。

汗不止、必惡風、煩燥不得臥、先防風白朮牡蠣湯。次小建中湯。風濕惡風、不欲去衣、骨節煩疼、不得屈伸、

汗出短氣。小便不利。或身微腫。甘草附子湯。
脈浮身重。汗出惡風。防己黃耆湯。

惡寒

惡寒者。不見風亦惡寒。身雖熱。亦不欲去衣被。其風寒客于榮衛。陰氣上入陽中。則洒淅而惡寒也。經曰。發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。謂如或已發熱。或未發熱。必先惡寒而繼之以發熱。此則發於陽也。若初病惡寒而倦。脈沉細而緊。此則爲熱發於陰也。在陽則發汗。在陰則溫裏。或下證悉具而惡寒者。是裏猶未解。當先解表而後攻裏。若少陰病惡寒而倦。手足厥冷。自利。躁煩。脈不至者。又爲不治之證。

太陽病。發熱或未發熱。惡寒有汗。桂枝湯。無汗。麻黃湯。
病發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。無陽也。不可發汗。越婢湯。
陽明病。固宜下。微惡寒者。保與太陽合。病在經。固表可發汗。麻黃湯。若脈遲、汗多、微惡寒者。裏未解也。雖陽明證。可桂枝湯。
少陽病。頭汗出、微惡寒。柴胡桂枝湯。
發熱汗出後惡寒而嘔。但心下痞者。五苓散。發汗後惡寒者、虛也。芍藥附子甘草湯。
惡寒脈微而復利。正亡血也。四逆湯加人參。汗後惡寒。脈細數浮遲。嘔不止。理中丸。
大下後復發汗。心下痞而惡寒。表未解也。當先解表。桂枝湯。後攻痞。三黃瀉心湯。
太陽病。下後脈促胸滿者。桂枝去芍藥。若微惡寒者。桂枝加芍藥附子湯。
少陰病。脈沉細惡寒者。四逆湯。

若下利惡寒而倦。手足溫者。小建中湯。若惡寒而倦。時時自煩。不欲厚衣。大柴胡湯。
熱多寒少。陽乘陰也。若尺脈遲。爲血少。先以黃耆建中湯養其榮衛。脈不
亡血家不可發汗。汗之則寒慄而振。小柴胡湯、芍藥湯。
脈弱者不可發汗。汗之則寒慄不能自還。當歸四逆湯。

似瘧

似瘧。一名瘧狀。作止有時。非若寒熱往來無定也。
太陽似瘧。脈伏洪。桂枝湯。清便自可。不嘔。一日二三度發。桂枝、麻黃各半湯。
陽明似瘧。頗熱汗出。日晡發熱。脈浮。桂枝湯。脈實。承氣湯。
婦人熱入血室。其血必結。亦如瘧狀。小柴胡湯。
熱多寒少。陽乘陰也。若尺脈遲爲血少。先以黃耆建中湯養其榮衛。脈不
湯、遲用之。
厥陰脈浮緩。鑑不縮。必發熱惡寒似瘧。爲欲愈。桂枝麻黃各半湯。溫瘧。其
時嘔。白虎湯加桂。渴者。柴胡加人參括蔞湯。

無汗

無汗寒邪中經。腠理閉密。津液內滲而無汗也。若風暑濕干之。則自汗出
太陽常熱。無汗頭痛。麻黃湯。
項背強兀兀無汗。葛根湯。
剛痙發熱。惡寒無汗。葛根湯。或小續命湯。
脈浮。發熱無汗。表不解者。麻黃湯。汗不止。白虎湯。

渴欲飲水。無表證者。白虎加人參。陽明反無汗。脈浮而喘者。麻黃湯。若無汗。小便不利。心中懊憹。身必發黃。五苓散加茵陳。

自汗

衛氣者。所以肥腠理而固津液者也。衛爲邪所干。不能衛護於外。由是而汗出焉。且自汗者。有表裏虛實之分。若自汗出。惡風寒。爲表未解。當解肌以致汗泄。惡風與汗後惡寒。皆爲表虛。必用溫劑。若汗出不惡風寒。則爲表解裏未和。從下之。設或汗出髮潤。如油如珠。凝而不流。皆不可治也。

太陽中風。自汗。脈浮緩。桂枝湯。

汗出而渴。小便難。五苓散。不渴者。茯苓甘草湯。

自汗出。小便雖。仰用桂枝。惟加芍藥甘草。

自汗出。小便不數。心煩。微惡寒。脚攣急。桂枝附子。

陽明汗多而渴。發熱譫語。大便硬。調胃承氣湯。

太陽病發汗。途漏不止。惡風寒。桂枝附子湯。

若小便自利而汗出。爲津液少。不可攻利。宜蜜導煎通之。若汗多者。胃汁乾。急下之。大承氣湯。

汗多而渴。勿用五苓散。

汗不止。無他證者。溫粉撲之。服桂枝湯。大汗出。煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參。

下後。不可更用桂枝湯。

若汗而喘。無大熱者。麻黃杏仁甘草石膏湯。

諸陽經絡循於頭。三陰則至項而還。頭汗者。邪搏諸陽。則汗見於頭也。若遍身汗者。爲之熱越。而陽氣上騰。津液上腠。故但頭汗耳。夫表虛則不可下。內溫則不宜汗。頭汗之證。更不可再汗也。其或發汗。若下之。病仍不解。而煩燥者。茯苓四逆。大下後。六七日不大便。不解。腹滿痛者。有燥屎。大承氣湯。

瘀血在裏。與夫熱入血室。虛煩水結。皆令頭汗。此爲熱鬱於內。而上達。或吐或下。以去其邪。設或小便不利。內外濕格。而頭汗。則爲陽脫。誤下濕家。額上汗出而喘。小便雖。小便利。亦爲陽脫。二者皆不療矣。百問其或結胸證具。而煩燥吐利。四逆湯。煩燥下利。發熱厥逆。煩燥不得眠。惡寒燥鬱。脈不出。而燥者。皆爲不裏實裏虛。故頭汗不可下。發黃頭汗。及項而止。小便雖。引水潠。此濕也。茵陳蒿茵陳五苓散。

心結胸。心悗滿。無大熱。頭汗出。半夏茯苓湯。

煩燥

太陽中風。脈浮緊。熱而惡寒。身疼痛。不汗出而煩燥。大青龍湯。

譫語頭汗。是爲血熱。風陽明。用承氣湯。若心中懊憹而頭汗者。梔子豉湯。

得病二三日。脈弱。無太陽證。柴胡湯。

證煩燥。心下硬。能食。小承氣湯微和之。心中悸而煩燥者。小建中湯。

惡風自汗。脈濡弱而煩燥者。皆宜用此法。

但發熱六七日。渴欲飲水者。五苓散。無熱。但狂言煩燥者。五苓散。水調服。探吐之。

陽明病。不大便。續膈痛。煩燥。承氣湯下之。

少陽吐利。厥逆。煩燥欲死。吳茱萸湯。

厥逆。脈沉。自利。煩燥。不得眠。黃連雞子湯、黃連阿膠湯。

手足汗

四肢者。諸陽之本。熱聚於胃。則津液傍達于手足也。蘊熱則燥煩證語。挾寒則水穀不分。是又承氣、理中之不同。

陽明病。手足漐漐汗出。譫語。大便難。與承氣湯。

陽明中寒。不能食。小便不利。手足汗出。大便初硬後溏。水穀不分。與理中湯。一法用豬苓湯。

下後復發汗。晝則煩燥不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱。乾姜附子湯。

發汗若下之。病仍在不去。煩燥者。茯苓四逆湯。

陰極發燥。或陰毒火邪。投熱藥反劇者。不可用涼藥。燥甚。仍與熱劑。用四逆湯證。

懊惱

懊惱者。心中懊憹。憹憹。鬱悶不舒之貌。蓋由表證誤下。正氣內虛。陽邪內陷。結於心胸之間。甚則爲結胸也。邪在心胸則宜吐。熱結胃腑則宜下。不可拘也。發汗吐下之後。虛煩不得眠。甚則反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯。吞上白胎。肌不能食。煩不眠。頭汗。懊憹。上同。

短氣煩燥。咽乾。胸中懊憹。大陷胸湯。

陽明病下之後。懊憹而煩。中有燥屎。宜承氣湯。

陽明無汗。小便不利。心中懊憹者。必發黃。宜茵陳蒿湯。

身痛

身痛、太陽表證也。雖曰表邪未解。而有發汗溫經先後之不同。自利脈沉爲陰病。身痛其身重者。屬乎陽明。爲有風也。又有陽邪內行。不榮於表。是又不可不知。

太陽身痛。脈浮緊。無汗。麻黃湯。或尺脈遲爲無血。先用小建中湯。候尺脈浮。却用麻黃湯。

下利。脈沉。身痛。宜四逆湯證。

發汗後。身痛。脈沉遲。桂枝芍藥人參湯。

一身盡痛。發熱。面黃七八日後。結熱在裏。乃攻其表。溫裏四逆湯。攻表桂枝湯。

發亂後。身痛不休。桂枝湯。

濕家身疼痛。不可發汗。發汗則成痙。葛根桂枝湯。

凡中濕身痛。有本條。

四肢拘急

拘急者。手足不能自如。屈伸不便。如踡臥惡風之貌。四肢者、諸陽之本。蓋因發汗亡陽陽虛。是有其證也。

傷寒脈自汗出。小便數。心煩惡寒。脚攣急。芍藥甘草湯。小便難者。桂枝加附子。

太陽病發汗。遂不止。惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。桂枝加附子湯。

吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷。四逆湯。

咳嗽

咳者。證款。俗謂之嗽。肺主氣。肺爲邪所乘。氣逆而不下也。故令咳嗽。有肺寒而咳者。有停飲而咳者。有邪在半表半裏而咳者。治各不同。其水咳二證。不可不辨。小青龍、太陽之表水也。十棗湯。太陽之裏水也。真武湯。水證之水氣也。蓋水與表寒相合而咳。則小青龍當汗之。水與裏寒相合而咳。則真武湯溫之。裏證無不愈矣。

短氣

短氣者、呼吸短促而不能相續也。千金方云。少氣不足以息也。金匱要略曰。短氣不足以息者。實。大抵心腹脹滿而短氣者。邪在裏面爲實。心腹濡滿而氣短者。邪在表面爲虛。又有停水心下。亦令短氣。隨證攻治。

太陽病。身熱。咳嗽。乾嘔。喘而利。小青龍湯。有加減法。惡寒身痛。只依本方。身涼咳嗽。乾嘔爲利。心下痞滿。引胷下痛。十棗湯。

四肢痛重。腹痛下利。咳嗽或嘔。真武湯。有加減之法。少陽病。寒熱往來。胸脅硬滿而痛。咳嗽。小柴胡湯。有加減之法。

少陽咳嗽。四逆湯。腹痛下利。咳嗽。中滿而嘔。大半夏湯。

喘

傷寒發喘。有邪在表者。有邪在裏者。有水氣者。在表者、心腹濡而不堅。外證無汗。法當汗之。在裏者、心腹脹滿。外證有汗。法當下之。其水氣者、心下怔忡。是以有青龍湯之證。或注喘。特病之常也。其或直視譫語。汗出髮潤。身汗如油。皆不可治。

太陽病無汗而喘。麻黃湯

陽明病。汗出不惡寒。短氣。腹滿。潮熱而喘。小承氣湯。

太陽、陽明合病。喘而胸滿。不可下。宜麻黃湯。

誤下太陽。利不止。脈促。有汗而喘。葛根麻黃黃芩湯。

無汗而喘。麻黃杏仁甘草石膏湯。

水氣喘咳。乃太陽汗後。飲水多而水停心下。小青龍湯去麻黃加杏仁。小腹痛者。去麻黃加茯苓。陰病喘促者。反陰丹。

氣逆

氣逆者、氣自腹中時時上衝也。蓋因太陽病下之。表邪乘虛傅裏。裏不受邪。則氣逆上行。仍在表也。當復汗之。厥陰客熱。氣上衝心。此熱在裏而氣上也。若病如虛羸少氣。氣逆欲吐者。又動氣發汗而氣上衝者。此正氣虛而氣逆也。當依法調治之。脈沉緊者。不可汗。

太陽病下之後。其氣上衝者。可與桂枝湯。不上衝者。不可與之。病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈浮微。胸中痞硬。氣上衝咽喉。不得息。此爲胸中寒。瓜蒂散吐之。脈微者不可吐。吐則心口逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動經。身爲振搖。茯苓白朮桂枝甘草湯。

發汗。氣上衝者。桂枝加桂湯。

奔豚病後。虛羸少氣。氣逆吐者。竹葉石膏湯。

短氣

短氣者、呼吸短促而不能相續也。千金方云。少氣不足以息也。金匱要略曰。短氣不足以息者實。大抵心腹脹滿而短氣者。邪在裏面爲實。心腹濡滿而氣短者。邪在表面爲虛。又有停水心下。亦令短氣。隨證攻治。

風濕相搏。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。其邪在表。甘草附子湯。

食少飲多。水停心下。短氣。小半夏湯。

身涼。乾嘔。短氣。汗出不惡寒。此表解裏有水。十棗湯。誤下太陽。短氣煩燥。心中懊憹。便爲結胸。大陷胸湯。及丸。

又須湯吐之也。

乾

太陽病下後。脈促胸滿。桂枝去芍藥湯。病在於胃。氣芍藥入桑。故去之。

陽明病。喘而胸滿。猶帶表證。不可下。與麻黃湯。麻黃杏仁甘草石膏湯。

胸脅俱滿。或脅下硬痛。或嘔吐。舌上白胎。或不大便。並屬小柴胡湯。

傷寒五七日。往來寒熱。胸脅若滿。默默不欲食。心煩喜嘔。或脅下痞硬。柴胡加牡礪湯。

傷寒七八日。下之。胸滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡痛。不可轉側。柴胡加龍骨牡礪湯。胸中痰實。瓜蒂散吐之。胸膈不快。塡滿閉塞。唇青手冷。脈細沉。少情緒。或腹痛。此名太陰。

結胸

經曰。病發於陽而反下之。熱入。因作結胸。註曰。發熱惡寒者。發於陽也。外證項強。心下滿硬而痛是也。此爲實邪在裏。法當下之。若脈浮大。若表證。若水氣塡。不可下。亦有不因下而心下硬滿者。經曰。病人手足默默乍緊。邪結胸中。心滿而煩。飢不欲食。當吐之。是則病在胸中也。經曰。陽明病。心下硬滿。不可下。下之利不止而死。是則邪氣自表傳裏。留於心下。未全爲實。法當吐之。故有此戒。其或結胸證具而煩燥者。不治。

結胸寸脈浮。關尺皆沉緊。宜下。若脈浮大。或有表證。先用小柴胡湯。表已解。下之。

腹痛硬。不可大陷胸湯。或太峻用丸。

小結胸。按之而痛。心下硬。小陷胸湯。

熱實結胸。懊憹煩渴。心下痛。少與大陷胸湯。

寒實結胸。無熱證。三物白散。枳實理中丸。

痞

經曰。病發於陰而反下之。因作痞。註云。無熱惡寒者。發於陰也。輕於結胸者。心下滿而不痛。按之則濡。是其虛邪留滯。故但滿而不痛也。惟枳桔最良。欲攻之。只從表證解而後可。

痞者。關脈多沉。枳實理中丸、半夏瀉心湯。關脈沉者。三黃湯瀉其肝。若惡寒者。附于瀉心湯。服此湯。痞不去。煩渴。小便不利。五苓散。

下後復汗。心下痞而惡寒。表不解。不可攻痞。先與桂枝湯。表解乃攻痞。三黃湯。

表未解而心下妨悶。曰支結。柴胡桂枝湯。胸脅滿而微結。小柴胡湯加乾姜、牡礪。表證未能。因攻之。脅熱而利。心下硬。爲表裏俱病。桂枝人參湯。

下利。心下痞硬。乾噎食臭。腹鳴。甘草瀉心湯、生姜瀉心湯。治法通用桂枝人參湯。若下利不止。則治下焦。

陽毒

大熱大渴。黑奴丸。中暑發渴。白虎加人參湯。

赤石脂禹餘糧湯。又不止。只利小便。五苓散。
發熱不解。嘔吐不利。心下痞硬。大柴胡湯。吐汗下後。證氣痞硬。旋覆代赭湯。
若咳逆氣虛。用四逆湯。
胃寒。先宜理中丸。後用旋覆代赭湯。

腹滿

脾爲中央之土。所以腹滿多屬太陰也。常病者爲表實。從下之。時減者爲裏虛。當溫之。若解表內不消。非大滿。尤生寒熱。未可下。是邪全未入腑。若大滿大實。兼有燥屎。雖得之四五日。亦爲可下。謂邪已入腑也。大抵陽熱爲邪。則腹滿而咽乾。陰邪爲寒。則腹滿而吐利。食不下。若雖經吐下後而腹滿者。治法又各不同。是又不可不知也。

太陽誤下。因時腹滿而痛。桂枝加附子湯。痛甚。桂枝加大黃湯。
陽明發熱。腹滿微喘。口苦咽乾。或不大便。譫語者。並小柴胡湯。嘔而小便難。加茯苓。
三陽合病。腹滿身重。難以轉側。譫語。口中不仁。小柴胡湯。有汗。白虎湯。
太陰腹滿。吐食不下。枳桔理中丸。
少陰病六七日。腹脹滿。不大便。急下之。大承氣湯。
腹滿痛者。脾不勝水。水與氣搏皮肉之間。腸中漉漉有聲。小半夏茯苓湯。加桂枝。下利腹滿。身疼痛。先溫其裏。四逆湯。後攻其表。桂枝湯。
發汗後腹滿。當溫。厚朴半夏生姜人參湯。吐後腹滿。當下。少與調胃承氣湯。下後腹滿。宜梔子厚朴湯。腹脹滿者。陰陽不和。桔梗半夏湯。

腹痛

邪氣入裏。與正氣相搏。則爲腹痛。蓋陽邪傳裏而痛者。其痛不常。當以辛溫之劑和之。陰寒在內而痛者。則痛無休時。欲作利也。當以熱劑溫之。有燥屎宿食爲痛者。其痛不常。當以辛溫之劑和之。陰寒在內而痛者。諸痛爲實。痛隨利減。此皆爲裏證。而所治各不同矣。又當隨證施治。
傷寒四五日。腹中痛。若轉氣不趨小腹者。此欲自利也。四逆湯。
少陰腹痛。四逆或咳或悸。或小便不利。或瀉利下重。并四逆散。
下利苦穀。脈微欲絕。通脈四逆湯。腹痛。小便不利。真武湯。
胸中熱。胃中有邪氣。腹痛欲嘔吐者。黃連湯。
大便實痛者。關脈實。腹滿不大便。桂枝加大黃湯。大小承氣湯。選用之。

小腹滿

小腹滿者。臍下滿是也。若胸滿、心下滿、腹滿、皆爲邪氣而非物。今小腹滿。皆爲有物而非氣。小便利者。則爲畜血之形。小便不利者。乃是瘀積之證。瀉利之劑。宜分兩途。經曰。病人素有痞氣。連在臍傍。痛引小腹。入陰筋者。名臟結也。死。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。小腹急結。桃仁承氣湯。
太陽病六七日。表證在脈。微沉。不結胸。發狂。小腹硬滿。小便自利。抵當湯。
太陽病。目黃。脈沉結。小腹硬。小便不利者。五苓散。陰陽易。小腹痛。燒裩散。
病者手足厥冷。真武湯。不結胸。小腹滿。按之痛者。此冷結在膀胱關元。宜灸關元穴。

嘔吐

嘔者、雜物俱出諸也。吐者、無聲而但出物者也。故仲景復重言乾以別之。則嘔爲有物明矣。乾猶空也。但空嘔而無所出耳。然嘔吐俱有物出。較之輕重。則嘔甚於吐。蓋表邪搏裏。裏氣上逆。故嘔。裏邪傳表。表氣下降。故吐。雖得之四五日。亦爲可下。謂邪已入腑也。大抵陽熱爲邪。則腹滿而咽乾。陰邪爲寒。則腹滿而吐利。食不下。若雖經吐下後而腹滿者。治法又各不同。是又不可不知也。
嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。以其虛甚也。
吐者亦有之。故經曰。嘔多雖有陽明證。不可攻之。爲其氣逆未收。故爲實也。設或嘔而脈弱。小便復利。身微熱而見厥者。難治。以其虛甚也。
惟熱而見厥者。難治。以其虛甚也。
太陽少陽合病。自利而嘔。黃芩加半夏生姜湯。
太陽陽明合病。當自利。若不利但嘔。葛根加半夏湯。
傷寒胸中熱。胃中有邪氣。腹痛。氣逆。欲嘔吐者。黃連湯。
太陽病。發熱汗出。心下煩悸。痞硬不利。嘔吐。大柴胡湯。
三陽發熱而嘔逆。小柴胡湯。嘔而渴者。猪苓湯、五苓散。
先嘔後渴。此爲欲解。宜與水解。先渴後嘔。而水停心下。赤伏苓湯。
少陰病。又吐。但欲寐。五六日自利而渴。小便色白。四逆湯加生姜。
少陰病。或咳或悸。身痛自利。真武湯去附子加生姜。腳上寒伏。乾嘔。吐涎沫。四逆湯。
若吐利。手足厥冷。煩燥甚者。吳茱萸湯。
食穀欲嘔者。屬陽明也。上同。得湯反劇者。屬上焦。橘皮湯、小柴胡湯。似嘔似噦似噎。心下憒憒。大橘皮湯。
汗下後關脈遲緩而吐。爲胃寒。理中丸。
發汗後。虛煩嘔吐。竹葉石膏湯。加生姜汁。服經汗下。食氣膈塞。食入即吐。乾姜黃芩黃連人參湯。
汗後水藥不入口者。四逆半夏茯苓湯。金匱要略曰。諸嘔吐。穀不下。半夏湯。嘔吐而病在膈上。後水者。十棗湯。

乾嘔

乾嘔者、嘔而無物出也。大抵熱在胃脘。與穀氣并。熱氣上蒸。心下痞結。則有此證。太陽汗出乾嘔。桂枝湯。
主自汗也。少陰下利乾嘔。姜附湯。主下利也。厥陰吐沫乾嘔。吳茱萸湯。主涎沫也。邪去則吐自止矣。若有

傷寒表不解而心下有水氣乾嘔發熱或自利小青龍湯主之。
溫病有熱飲水暴冷枇杷茅根湯。

下利

傷寒表邪傳裏裏虛助熱則自下利又有不應下而便攻之內虛協熱亦爲下利。
利自太陽下利乎足溫少陰厥陰下利身涼無熱此大概也自利清穀此皆寒渴欲飲水溺色如常泄下赤黃發熱後重凡此皆熱蓋因風邪入胃水來侮土故令暴下或溫或攻或清下焦或利小便隨證施治但不宜發汗耳邪氣內攻復泄其津液胃氣轉虛必成脹滿若夫下利證語而自直視下利厥噦不得眼下利發熱厥而自汗下利厥冷無脈炙之不溫而脈不出下利日數十行其脈反實皆爲不治之證五者最忌者也。
太陽陽明合病下利頭目痛鼻乾脈浮葛根湯。
太陽少陽合病下利頭痛胸滿乾嘔脈浮弦黃芩湯嘔甚加半夏生姜。
少陽陽明合病下利身熱胸脅滿乾嘔往來寒熱脈長大而弦弦而爲負負者死長大不弦爲順大承氣湯下之。
滑而數爲有宿食亦從下之太陽病未解而欲下之逐熱而利心下痞硬表裏不解者桂枝人參湯。
太陰自利不渴四逆湯理中湯或附湯。
少陰下利不渴胃虛飲水自救脈微者白通湯。
厥逆無脈者白通加豬膽汁湯四逆湯。
少陰下利渴而嘔止煩不得眠者豬苓湯。
少陰下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯。
自利清水心下必痛口中乾燥此不可溫宜用下大承氣湯。
傷寒醫下之續得下利清穀身痛者急當救表宜四逆湯清便自調急當救裏宜四逆湯通脈之白虎湯。
胃熱利自腹垢脅下必熱便下垢膩亦黃或渴黃芩湯白頭翁柏皮湯。
胃寒利自呴滿脅下必冷腹脹滿便中清白或滿穀四逆湯理中湯寒毒下利而發陽者下證也下利發語有燥屎也脈不微細小承氣湯。
若胸滿煩大橘皮湯。
胃氣塞者吳茱萸理中湯溫中湯。
金匱要略曰噦逆者橘皮竹茹湯主之。
噦不止者橘皮乾姜湯半夏生姜湯退陰散子宜消息用之。
溫病熱未除重被暴寒入胃繼結不散逆噦梓皮飲子。
溫病有熱飲水暴冷作噦茅根葛根湯。

溫病胃冷變噦茅根橘皮湯。
溫病有熱飲水暴冷枇杷茅根湯。

下利

傷寒表邪傳裏裏虛助熱則自下利又有不應下而便攻之內虛協熱亦爲下利。
利自太陽下利乎足溫少陰厥陰下利身涼無熱此大概也自利清穀此皆寒渴欲飲水溺色如常泄下赤黃發熱後重凡此皆熱蓋因風邪入胃水來侮土故令暴下或溫或攻或清下焦或利小便隨證施治但不宜發汗耳邪氣內攻復泄其津液胃氣轉虛必成脹滿若夫下利證語而自直視下利厥噦不得眼下利發熱厥而自汗下利厥冷無脈炙之不溫而脈不出下利日數十行其脈反實皆爲不治之證五者最忌者也。
太陽陽明合病下利頭目痛鼻乾脈浮葛根湯。
太陽少陽合病下利頭痛胸滿乾嘔脈浮弦黃芩湯嘔甚加半夏生姜。
少陽陽明合病下利身熱胸脅滿乾嘔往來寒熱脈長大而弦弦而爲負負者死長大不弦爲順大承氣湯下之。
滑而數爲有宿食亦從下之太陽病未解而欲下之逐熱而利心下痞硬表裏不解者桂枝人參湯。
太陰自利不渴四逆湯理中湯或附湯。
少陰下利不渴胃虛飲水自救脈微者白通湯。
厥逆無脈者白通加豬膽汁湯四逆湯。
少陰下利渴而嘔止煩不得眠者豬苓湯。
少陰下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯。
自利清水心下必痛口中乾燥此不可溫宜用下大承氣湯。
傷寒醫下之續得下利清穀身痛者急當救表宜桂枝湯。
厥逆無脈者白通加豬膽汁湯四逆湯。
少陰下利不渴胃虛飲水自救脈微者白通湯。
胃熱利自腹垢脅下必熱便下垢膩亦黃或渴黃芩湯白頭翁柏皮湯通用之白虎湯。
胃寒利自呴滿脅下必冷腹脹滿便中清白或滿穀四逆湯理中湯寒毒下利而發陽者下證也下利發語有燥屎也脈不微細小承氣湯。
若胸滿煩大橘皮湯。
胃氣塞者吳茱萸理中湯溫中湯。
金匱要略曰噦逆者橘皮竹茹湯主之。
噦不止者橘皮乾姜湯半夏生姜湯退陰散子宜消息用之。
溫病熱未除重被暴寒入胃繼結不散逆噦梓皮飲子。
溫病有熱飲水暴冷作噦茅根葛根湯。

便膿血

婦人則爲寒熱似瘧。皆爲熱入血室。逼血下行。則血熱而利也。挾血之脈。乍澁乍數。或伏或沉。血熱交併。則脈洪盛。大抵男多於左手。女多於右手見之。又有陰寒爲病。下利便膿血者。乃下焦虛寒。腸胃堅固。清濁不分。而利下膿血也。二者一爲挾血。一爲陰寒。臨病宜精別焉。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。而血自下者。愈。不愈。用桂枝湯。明理論。抵當湯。

陽明病。下血譫語。胸脅滿。如結胸。夜則見鬼。此爲熱入血室。小柴胡湯。

少陰病。下利。便膿血者。桃花湯。

腹滿身熱。下如魚腦。曰濕毒。桃花湯、地楡散、黃連阿膠湯、

下後無表裏證。脈數不解。散消穀易飢。多日不大便。此爲瘀血。桃仁承氣湯、抵當湯。或小柴胡湯加桃仁、大黃。

下焦畜火。其人如狂。小腹急結。小便必利。抵當丸。

四逆

手足不溫。謂之四逆。邪在裏則手足熱。邪在表裏之間則手足溫。至於邪傳少陰。則手足有逆冷之證。與厥陰又相遠也。然自熱而至溫。自溫而至厥。乃傳經之邪。輕則四逆散。重則承氣湯下之。非若得病手足便逆而不溫者。四逆湯溫之。則爲陰經受邪而陽氣不足也。其或吐利煩燥。厥逆踡臥。皆屬少陰。又爲不治之證。

少陰病。四逆。其人或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。滿。或利下重。並四逆散。

初病以來。厥冷四逆。即四逆湯。

手足逆冷。大便閉。小便赤。或大便黑色。脈沉而滑。此爲陽證。以白虎湯、葛者、大承氣湯。

厥逆

陽氣伏藏。陰氣越出。陰陽不相順接。所以厥也。若先熱而後厥者。乃熱邪伏於內也。先厥而後熱者。乃陰退而陽得復也。

若始得病便厥者。是陽不足而陰勝也。熱浮於內者。其脈沉而數。狂言發汗。露手揚衣。燥不得眠。或大便閉。初便厥者。其脈沉遲而弱。醒醒而靜。惡寒引衣。或下利清穀也。其或惡寒踡臥。煩燥下利。不知人。皆爲惡候。故曰逆也。

先發熱而後厥者。揚手擲足。煩燥飲水。畏熱。頭汗。大便閉。小便赤。怫鬱昏悶。當下。失下血氣不通。所以謂大便難也。皆因發汗、利小便、耗其津液。以致腸胃乾燥。而熱深則厥者。此也。大柴胡湯、小承氣。選而用之。

熱深則厥者。此也。大柴胡湯、小承氣。選而用之。

初病便厥。足蹙惡寒。引衣自蓋。不渴。大小便自利。默默而惕惕。諸四逆選用之。

傷寒厥而心下悸者。宜先治悸。茯苓桂甘湯。後治厥。四逆湯。吐利厥逆。煩燥欲死者。吳茱萸湯、當歸四逆湯。仍灸大谿。

不大便

不大便。謂大便難也。皆因發汗、利小便、耗其津液。以致腸胃乾燥。而則爲不大便。津液偏勝。故使大腸亦難也。若下若發汗。小便數。大便硬者。與宜大便自利。不大便者。亦津液內竭。宜蜜導煎通之。經曰。其脈浮而汗。小便利。不大便者。亦津液內竭。大便雖。小便少。不轉失氣。此內無燥屎也。但初硬後溏。陽明脈浮。或經發汗。若利小便。津液內竭。大便自難者。不可攻之。無陰陽強大便數。能食。不大便。此爲實。名曰陽結也。宜金液丹。

不大便六七日。繞臍煩燥。發作有時者。此爲屎硬。不得大便。小柴胡湯。若不了了。得屎而解。其脈沉而遲。不能食。身體重。大便反難。名曰陰結也。宜金液丹。

陽明者。下之則硬。汗多。極發其汗。則亦硬。並小柴胡湯。

病。脅下硬滿。不大便而嘔。舌上白胎。小柴胡湯。

病。六七日。腹脹。不大便。急下之。大承氣湯。

傷寒。胃中熱盛。則神識昏迷。妄語。鄭聲。虛則鄭聲。虛則譫語。身熱汗多。便難。或潮熱。諸承氣湯選用之。發汗多。亡陽譫語。爲有燥屎。脈不微細。小承氣湯。

陽明裏證。大便難。或自利。不止者。不治。

傷寒。胃中熱盛。上乘於心。爲熱甚。則神識昏迷。妄語。身自和。不可下。柴胡桂枝湯。

陽明病。譫語。發汗多。亡陽。譫語。身熱汗多。便難。或潮熱。諸承氣湯和之。謂津液內竭也。又有不大便。譫語。爲有燥屎。脈不微細。小承氣湯。

發汗

若始得病。便厥者。是陽不足而陰勝也。熱浮於內者。其熱在裏。輕者、重語。重者、不睡。亦語。亦有譫語者。有獨語。有語言亂者。凡此見面言也。輕者、睡中呢喃。重者、不睡。亦語。亦有譫語者。有獨語。有語言亂者。有言亂者。有言不休者。有言亂者。凡此見面言也。輕者、睡中呢喃。重者、不睡。亦語。亦有譫語者。有獨語。有語

小便不利小便難附

邪氣聚於下焦結而不散甚則小腹硬滿而不痛此小便所以不通大抵有所不利者行之所以滲泄也若飲水過多下焦畜熱或中濕發黃水飲停留皆以利小便爲先惟汗後亡津液胃汁乾與陽明汗多者則以利小便爲戒設或小便不利而見其汗者乃爲陽脫關格之疾矣

飲水過多下焦畜血熱小便不利脈浮者用五苓散脈沉者豬苓湯

太陽病身黃脈沉者豬苓湯

太陽病身黃脈沉結小腹硬小便不利者爲亡血也五苓加茵陳

爲亡血也五苓加茵陳茯苓

少陰病四逆或小便不利四逆散加茯苓

陽明病無汗小便不利心下懊憹者身必發黃五苓散加茵陳經曰虛則小便難陰虛者陽必淩之由勝陰也少陰之脈循喉嚨挾舌本少陰咽痛脈浮遲厥冷或吐利亦屬少陰並不可汗下用桔梗湯豬肩湯

脫受熱致小便赤澁而不流利也又曰難不大便也六七日而小便少者但初硬後澁未定或硬攻之必甚者半夏散逐脈四逆湯去芍藥加桔梗汗不止蓋本濕粉撲之咽中生瘡不能言語瘥不出者苦酒湯

溏縱小便多屎定硬方可攻之乃胃中有穀不別雖遍而不能也

若傷寒六七日大下後寸脈沉遲尺脈不至咽喉不利唾血膿手足厥利不止者難治宜麻黃升麻湯

陽明中風脈浮弦大身黃鼻乾氣短腹滿潮熱時噦心脅痛小便難小柴胡茯苓

腎傷寒一證乃非時暴寒伏於少陽之經頭痛腰痛脈微窮初咽痛以傷寒後必下利咽痛半夏桂枝湯

太陽病小便利者以飲水多必有心下悸茯苓白朮甘草湯

小便自利小便數遺溺附

陽毒咽痛見發斑條咽中閉塞爲扁湯口瘡赤爛蜜浸黃柏噙咽痛甚者升麻六物湯

小便自利者爲津液漏滲大便必硬宜以藥微下之其陽明自汗者復發其汗使津液內竭屎雖硬尤不可攻縱使大便難蜜導煎導之太陰當發身黃其小便自利者則濕熱內泄不能發黃惟血證則腹急而如狂腎與膀胱虛則不能約制水液二者皆小便自利若腎與膀胱虛而挾熱熱則水道澁則小便不快故澁痛而數起也若自汗而小便數者雖有表證又不可用桂枝謂亡走津液也

太陽病小便自利以飲水多心下悸茯苓桂枝茯苓甘草湯

太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒脚攣急小便數課服桂枝湯得之便厥與甘草乾姜湯甘草芍藥湯

脈浮自汗小便數胃不和讝語者少與調胃承氣湯陽明脈浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁相搏大便則難其脾爲約宜麻仁湯

少陰四逆小便自利或色白爲虛寒四逆湯或真武湯去茯苓既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈浮欲絕者四逆湯

舌上白胎黑結附

經曰舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒謂寒氣初傳入裏也舌乃心之官法應南方火色本紅乃邪氣在表舌則無胎又邪氣在裏津液結搏則舌上生胎而滑熱氣漸深其舌胎燥而澁熱聚於胃其舌胎爲之黃矣若胎黑色則熱已深病已極篤經曰舌熱病口乾舌黑者死乃腎水刑於心火也

脈陰陽俱緊曰中氣出唇口乾燥卷舌冷鼻中鼾出舌上滑胎者勿妄治也到七八日以來其人微發

熱手足溫者此爲欲解或八日已上反大發熱者此爲難治設使惡寒者必欲嘔也小柴胡湯加生姜腹內痛者必欲利也理中湯

太陽誤下胃中空虛客熱動膈懊憹舌胎梔子豉湯少陽病脅下硬滿不大便而嘔舌上白胎小柴胡湯

陽明病舌上生胎五苓散舌黃者當下之金匱要略曰舌黃者未可下黃自去也

臟結者臟氣祕結而不流布也一息不運機械窮一臟不結窮壞剋臟其可結乎外證如結胸狀但欲食如故時時下利爲異耳其脈寸浮關沉而緊陰筋引臍腹俱痛是也病人脅下素有痞連臍結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也刺開元灸之亦可仍與小柴胡湯加生姜

咽痛

咽喉不利或痛或發不可納食皆毒氣上衝所致經曰太陽病下之脈緊者必咽痛以太陽之邪搏於少陰也少陰之脈循喉嚨挾舌本少陰咽痛脈浮遲厥冷或吐利亦屬少陰並不可汗下用桔梗湯豬肩湯

甚者半夏散逐脈四逆湯去芍藥加桔梗汗不止蓋本濕粉撲之咽中生瘡不能言語瘥不出者苦酒湯

若傷寒六七日大下後寸脈沉遲尺脈不至咽喉不利唾血膿手足厥利不止者難治宜麻黃升麻湯

腎傷寒一證乃非時暴寒伏於少陽之經頭痛腰痛脈微窮初咽痛以傷寒後必下利咽痛半夏桂枝湯

陽毒咽痛見發斑條咽中閉塞爲扁湯口瘡赤爛蜜浸黃柏噙咽痛甚者升麻六物湯

頭眩

少陽居表裏之間表邪傳裏裏中陽虛故頭眩也又有發汗吐下後而眩者亦陽虛所致也若少陰病下利止而頭眩時自冒者此虛極而脫而風家亦有眩者風主運動故也其或諸逆發汗劇者言亂目眩而死也

太陽病若下之因復發汗以此表裏俱虛其人必眩冒胃家汗自出而愈

陽明病但頭眩不惡寒故能食咳茯苓白朮甘草桂枝湯

少陽之爲病口苦咽乾目眩小柴胡湯

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地真武湯

吐汗下後虛煩脈微沉緊心下痞脅下動氣咽喉眩冒身痛筋脈動惕久而成痿茯苓桂枝白朮甘草湯

痿用括蔞湯

吐衄

經絡熱盛迫血妄行出於鼻者爲衄血也是雖熱其邪尤在經然亦不可發汗經曰以桂枝、麻黃治衄非治衄也乃欲散其經中邪氣耳衄血故爲欲解若衄不止而頭汗出其身無汗及發熱汗不至足者又爲惡證當明辨之

太陽證衄血及服桂枝湯後致衄者爲欲解也屬犀角地黃湯衄不止茅花湯無汗能食者即欲衄黃芩

湯。

鮫家不可發汗。汗出必額上陷。脈緊急。直視不能眴。不得眠。芍藥地黃湯。

陽明病。渴欲漱水不嚥者。必鮫。黃芩芍藥湯。

不因下而自利加鮫者。麻黃升麻湯。脈浮大。欲發熱。下利。鼻鮫。乾嘔者。黃芩芍藥。鮫煩而復渴欲飲水。水則如蒿黃而暗。熱氣勝。則如橘黃而明。傷寒至於發黃。熱勢已極。且與畜血大抵相類。小便不利爲發黃。小便自利爲畜血也。設或寸口無脈。鼻出冷氣。與夫形如煙熏。搖頭直視。環口黧黑。皆發黃。是皆眞臟氣絕也。

少陰病。但厥無汗。強發之。必動其血。或從口鼻。或自目出。名下厥上竭。爲難治。當歸四逆湯。仍灸太谿、太陰交、涌泉。一法用黑錫丹。

吐血

諸陽受熱。其邪在表。當汗不汗。致使血毒入臟。結瘀於內。遂成吐血。凡見眼閉目紅。神昏語短。眩冒遂妄。煩燥漱水。狂躁譫語。鼻鮫唾紅。背冷足寒。四肢厥逆。胸腹急滿。大便黑利。小便頻數。皆瘀血證也。不必悉其但見一二便作血證主張。初得此病。急宜用藥。至於陸續不已。經數時而腹痛者。此又難於料理也。經曰。服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。犀角地黃湯。大下後。寸脈沉遲。尺脈不至。咽喉不利。唾膿血者。麻黃升麻湯。此有兩證。一陽毒。一陰毒。陽毒用升麻湯。陰毒用甘桔湯。加半夏、生姜。

血熱者。黃連阿膠湯。地黃、柏皮湯。三黃瀉心湯。

脈浮發熱。反灸之。必咽燥吐血。救逆湯。

咽喉閉塞。不可發汗。發熱則吐血。氣欲絕。手足厥冷。踡臥不能自溫。當歸四逆湯。

心悸

心悸者。築築然動。怔忡不能自安者。是也。其證有二。一者氣虛。一者停飲。其氣虛者。陽氣內弱。心中空虛而爲悸。又有汗下之後。正氣內虛。亦令人悸。與氣虛而悸者。則又甚也。法當定其氣悸也。其停飲者。由飲水過多。停留心下。心火畏水。不能自安而爲悸也。治法。必先分水氣。雖有餘邪。亦先治悸。免使水氣散走。而成他證也。

傷寒二三日。心中悸而煩。小建中湯。經云。先煩而悸者。此爲熱。先悸而煩者。此爲虛。故宜建中湯。

太陽病。小便利者。以飲水多。故心下悸。茯苓桂枝白朮甘草湯。小便少者。必裏急。猪苓湯。

陽明病。壯熱來往。心下悸。小便不利。心煩喜嘔。小柴胡湯。

太陽病。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯。

發汗後。其人臍下悸。欲作奔豚。茯苓桂枝白朮甘草湯。

太陽病。發汗不解。仍發熱。心下悸。頭眩。肌惕瞤動。振振欲擗地。眞武湯。

少陽病。耳聾目赤。胸滿而煩。妄加吐下。則悸而驚。與小建中湯。有熱者、小柴胡湯。

少陰病四逆。其人或悸。四逆散加桂枝。心下有水氣。厥而悸。當先治水。茯苓甘草湯。不然。水入胃中。必不利也。

傷寒脈結代。心動悸。炙甘草湯。

發黃

內經曰。濕熱相交。民多病擾。瘟者、單陽而無陰也。太陰脾土。爲濕熱所蒸。則雖見於外。必發身黃。濕氣勝。則如蒿黃而暗。熱氣勝。則如橘黃而明。傷寒至於發黃。熱勢已極。且與畜血大抵相類。小便不利爲發黃。小便自利爲畜血也。設或寸口無脈。鼻出冷氣。與夫形如煙熏。搖頭直視。環口黧黑。皆發黃。是皆眞臟氣絕也。

傷寒。脈阻在裏。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯。

太陽中濕。發黃。身熱頭痛。目黃汗出。濕在裏。五苓散、梔子蘗皮湯。

濕家之爲病。一身盡痛。發熱。身難如似熏黃。小便不利。五苓散。小便自利。茯苓附湯。身煩痛。麻黃湯加蒼朮。

脈浮身重。汗出惡風。防己黃芩湯。

陽明病。脈遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如鼓。穀疸湯、五苓散加茵陳。

經曰。服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。犀角地黃湯。大下後。寸脈沉遲。尺脈不至。咽喉不利。唾膿血者。麻黃、升麻湯。此有兩證。一陽毒。一陰毒。陽毒用升麻湯。陰毒用甘桔湯。加半夏、生姜。

血證發黃如狂。小便多。大便黑。犀角地黃湯、桃仁承氣湯、抵當湯。選用之。

黃疸。脈浮滑緊數。頭面汗出。渴欲水漿。小便不利。茵陳蒿湯。調五苓散。

初發黃。以瓜蒂末口嚥水搐鼻中。黃水出。愈。

發狂

難經曰。重陰者狂。重陽者狂。傷寒熱毒在胃。併入于心。遂使神不寧而志不定也。故發狂。始則少臥不飢。妄語妄笑。甚則登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。皆獨陽亢極。熱之所致。非大下之。不能定也。故宜大下之。不能止也。亦有當汗不汗。瘀熱在裏。下焦蓄血如狂者。小便不利。時如狂。未至于狂耳。若夫狂言直視。便溏自遺。其與汗後大熱。脈燥。狂言。不食。又爲可虛也。

重陽卽陽毒。脈數。實。狂走錯語。煩燥乾嘔。面赤咽痛。潮熱發狂。或下利黃赤。陽毒升麻黃芩湯。

時行熱病發狂。黑奴丸。經曰。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。面血自下者。愈。若外不解。與桂枝湯。外已解。但小腹急結。桃仁承氣湯。

血證如狂。脈微。身黃。唇燥嗽水。無寒熱。小腹滿。小便不利。大便黑。犀角地黃湯。甚者、桃仁承氣湯、抵當丸。取下黑物爲效。

筋惕肉瞤

內經曰。陽氣者、精則養神。柔則養筋。發汗過多。津液枯少。陽氣偏虛。筋肉失所養。故惕然而跳。瞤然而動。非溫經助陽不可也。張氏故特設眞武湯以救之。或因發汗吐下後。表裏俱虛而有此狀者。此又逆之甚矣。

太陽病發汗不解發熱心悸瞤眩身瞤欲擗地眞武湯

發汗過多或虛弱人微發汗或傷風自汗若藥有熱者去附子應發而腹中左右有動氣者並不可汗汗之則筋惕肉瞤或頭眩汗出不止其後最逆先宜防風白朮牡蠣湯次服小建中湯振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯久而成痿者通用心下痞滿者枳桔湯加茯苓甘草

多眠汗下附雜亂

夫衛氣者晝行於陽夜行於陰行陽於寤在陽也昏昏閉目陰自閉也默默不言者陰主靜也經曰太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也鼻乾不得汗嗜臥者風熱內攻不于乎表故熱也見盜汗其胃熱亦嗜臥也風溫狐惑太陽病十日脈浮細嗜臥者外雖已解設胸滿脅痛鼻乾不得汗者小柴胡湯脈但浮者麻黃湯少陰病但欲寐尺寸俱沉細者四逆湯

少陰病欲吐不吐心煩多寐尺寸俱沉細者四逆湯

少陰病欲吐不吐心煩多寐五六日自利而渴者四逆湯

其溫毒亂死者少乾霍亂死者多若上不得吐下不得利所傷之物不得出泄經閉正氣陰陽脈隔噤脈而死素問食飲有節起居有常安得有霍亂也霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水五苓散寒多不欲水者理中湯吐利汗出脈微惡寒手足厥冷治拘急四逆湯腹滿而痛四肢拘急轉筋下利理中湯加附子宜桂加減詳見本方

吐利止身痛不休桂枝湯既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯吐利止但汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁

陰陽易陰陽交

凡男子陽易婦人陰易者病新差而勞復也其候身重氣上小腹絞痛頭不能舉足不能行四肢拘急自節解散眼中生花手足拳攣其脈離經者不可治或發衝精髓竭奔豚少氣手足不能舉者面死吁外傷六氣內傷七情其爲害若是耶

燒裩散、雞屎白朮湯、竹皮湯、乾姜湯、青竹茹湯、當歸白朮湯、宜選用之

陰陽交者溫病不得發汗汗之復生大熱狂言不食其脈燥疾是也皆不治若脈浮數表證尤在可再汗之若脈沉實則爲胃實又從汗下之後復發汗下之若利止必結胸未止三四日復下必協熱而利結胸心煩不得眠黃連阿膠湯

拂鬱

拂鬱者陽氣蒸越形於面而體膚之間紫赤而不散

痿瘓

痿瘓者痿則急而縮瘓則緩而伸熱則生風風主乎動故筋脈相引而伸縮傷寒至於痿瘓可謂危矣能以祛風清熱之劑減其大勢即有可治者治法與痙同

戰慄

戰慄者陰陽爭戰故身爲之搖也邪氣外與正氣爭則爲戰邪氣內與正氣爭則爲慄戰者正氣勝故有得汗而解者慄則不戰而但鼓頷遂成寒逆此陰氣內熱正不勝邪宜姜附四逆湯加灼艾以禦之經曰陰中于邪必內慄也又云邪中下焦陰氣爲慄是膝逆冷便溺妄出皆此類耳方在惡寒條四逆湯甘草乾姜湯若復躁而不得臥者不治

時行兩感

時行者春應發而反大寒夏應熱而反大涼秋應涼而反大熱冬應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此即時行之氣春感寒邪在肝升麻葛根解肌湯夏感寒邪在心調中益氣湯射香湯半夏桂枝甘草湯秋感濕邪在肺白虎加蒼朮發黃茵陳五苓散冬感寒邪在腎名曰多溫括蔞湯溫疫通用人參敗毒散升麻葛根湯從春分以後至秋分節前天有變寒者皆爲時行寒疫宜用辛溫藥發散

傷寒兩感半屬于陰半屬于陽臟腑俱受病一日太陽少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明太陰受病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽厥陰俱病則耳聾鑒縮而厥水漿不入口不知人者六七日死長沙無治法但凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同後人以意消息謂如下利不止身體疼痛當先救裏與四逆湯清便自調與桂枝湯然治有先後之說

太陽先受病在表先解表少陰先受病在裏先救裏先表者裏不可緩也先裏者表亦不可緩也此通權變之論也

不得眠

陽盛陰虛則晝夜不得眠蓋夜以陰爲主陰氣盛則目閉而臥安若陰爲陽所勝則終夜煩擾而不得眠也所謂陰虛則夜爭者是也汗出鼻乾不得臥則邪在表也若胃有燥屎與大熱錯語反大汗胃中汁乾而不得臥則爲邪在裏也胃不和則臥不得安故宜散熱和胃若汗吐下後煩不得眠又從痞子破湯以汤之至于少陰病熱煩于內而不得眠又宜扶陰散熱若邊後不得眠者則熱氣與諸陽相併陰氣未復也有汗下太過陽氣暴虛而不得眠者若無熱證又宜□附湯以太陽病二三日不能臥但欲起心下結脈微弱者此本有寒今反下之若利止必結胸未止必協熱而利白頭翁湯

少陰利下數而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯此停水也若二三日心煩不得眠黃連阿膠湯病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也大承氣湯

下之後復發汗晝則煩燥不得眠夜則安靜不嘔不渴無表裏證脈沉微身無大熱者乾姜附子湯

吐下汗後心中懊憹煩不得眠梔子豉湯陽勝陰則狂眠亂夢心煩乏氣者酸棗湯陰勝陽則懼怖昏沉大熱乾嘔呻吟錯語不得眠犀角解毒湯中風汗出脈濡而弱厥而且寒躁不得眠小建中湯煩燥竹葉石膏湯

搓後飲酒煩惡乾嘔口燥呻吟錯語不得眠犀角解毒湯

發斑

大熱則傷血血熱不散裏實表虛熱氣乘虛出于皮膚而爲斑也輕則爲疹子甚則爲錦紋或病本屬陽誤投熱藥或當汗不汗當下不下或汗下未解皆能致此大抵有兩證一者溫毒卽疫時發汗下不解邪氣不散故發斑也一者熱病卽多時溫煖乖戾之氣過春暄熱而發斑也不可誤汗若發其汗重令開泄更加斑爛也然而斑之方萌如蚊跡類焉發斑多見于胸腹蚊跡只在于手足陽脈洪大病人皆憒先紅後赤者斑也脈不洪大病人自靜先紅後黃者蚊跡也其或大便自利拂鬱氣短燥屎不通又如果實醬者雖盛扁復生亦不能施其巧凡汗下不解煩悶咳嗽嘔吐足冷不溫便是發斑之候

時氣發斑大青四物湯猪膽雞子湯

發斑通用升麻湯犀角地黃湯

熱多者玄參升麻湯黃連一物湯青木香一物湯

凡赤斑五死一生黑斑不救

不仁

不仁謂不柔和也經曰諸虛承寒則爲鬱冒不仁蓋其血氣虛少不能週流於身是爲邪氣所伏故肌體頑麻不知痛痒寒過厥如尸而鬱且冒也設或脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁又此爲命絕也

經曰少陰脈不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰旅與陰相動人之身不仁此尸厥以鬱冒不仁爲可刺之而得瘥者實神醫之診也甘草乾姜湯桂枝芍藥湯加乾姜桂枝麻黃各半湯宜消息選用之

霍亂

霍亂者上吐下利揮霍而撥亂者是也邪在上焦吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦既吐且利然胃氣爲邪氣所傷陰陽乖隔途上吐而利也乃謂霍亂其餘但稱吐利者有以異也故以乾霍亂死者多濕霍亂死者少吐利期所傷之物得以泄出胃中水穀盡也其證則有異焉大便硬而氣短者實也汗下後而得噦者虛也當詳究之

太陽初得病發汗不徹併于陽明結自微汗出面色赤者陽氣拂鬱也解肌湯

動氣在上發汗則氣上衝心桃根湯動氣在下發汗則心中大煩骨節疼痛目瞤食入卽吐先宜大橘皮湯後與小建中湯動氣在左不可下下之則腹滿拘急身雖熱反欲卷先宜甘草乾姜湯後與小建中湯或汗久不徹其脈浮緊與麻黃湯

動氣在左發汗則心中大煩骨節疼痛目瞤食入卽吐先宜大橘皮湯後與小建中湯動氣在左不可下下之則腹滿拘急身雖熱反欲卷先宜甘草乾姜湯後與小建中湯或汗久不徹其脈浮緊與麻黃湯

動氣在右發汗則厥而渴心若煩飲則吐先宜五苓散後與竹葉石膏湯

動氣在上發汗則氣上衝心桃根湯動氣在下發汗則心中大煩骨節疼痛目瞤食入卽吐先宜大橘皮湯後與小建中湯動氣在左不可下下之則腹滿拘急身雖熱反欲卷先宜甘草乾姜湯後與小建中湯或汗下後虛熱又復下之其人拂鬱復與之水因而成噦此胃中寒也桂枝人參湯加茯苓甘草瀉心湯

蝕厥狐惑

蝕厥陰陰病人素有寒妄發其汗或汗後身有熱又復汗之以致胃中虛冷飢不欲食食卽吐蝕而乍靜乍煩者蝕或上而或下也蝕聞食臭必出所以食卽吐蝕也蝕厥先用理中丸次用烏梅丸若誤下之利不止用四逆湯

狐惑失盥皆蝕證也蓋腹中有熱入食無多腸胃空虛故三蟲來食面食人之五臟也其候四肢沉重惡聞食氣默默欲眠目不能閉嘿嘿暗暗而后聞赤白黑色變易無常蟲食下部爲狐下唇有瘡其咽乾蟲食其臟爲惑上唇有瘡其聲啞治蟲通用桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散無陽者用金液丹陰陽爲病消渴氣上衝心飢不欲食食卽吐蚘曰胃寒復有消渴之證蓋染其上焦而中焦則但寒無熱矣又有大便難一證並用理中湯加大黃入蜜少許微利之

百合病

百合者百脈一宗舉身皆受病無復所謂經絡傳次也大病虛勞之後臟腑不平變而成此其狀似寒無寒似熱無熱欲食不食欲臥不臥欲行不行口苦便赤藥入卽吐利也其脈微數每尿則頭痛六十日愈頭痛者但渴渤然惡寒者四十日愈若尿則快然但頭眩者二十日愈百合知母湯百合地黃湯滑石代赭湯雞子湯百合洗方可選用之

不仁

不仁謂不柔和也經曰諸虛承寒則爲鬱冒不仁蓋其血氣虛少不能週流於身是爲邪氣所伏故肌體頑麻不知痛痒寒過厥如尸而鬱且冒也設或脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁又此爲命絕也

經曰少陰脈不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰旅與陰相動人之身不仁此尸厥以鬱冒不仁爲可刺之而得瘥者實神醫之診也甘草乾姜湯桂枝芍藥湯加乾姜桂枝麻黃各半湯宜消息選用之

霍亂

霍亂者上吐下利揮霍而撥亂者是也邪在上焦吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦既吐且利然胃氣爲邪氣所傷陰陽乖隔途上吐而利也乃謂霍亂其餘但稱吐利者有以異也故以乾霍亂死者多濕霍亂死者少吐利期所傷之物得以泄出胃中水穀盡也其證則有異焉大便硬而氣短者實也汗下後而得噦者虛也當詳究之

痓後昏沉

傷寒瘥後半月以來十餘日終不愧悩錯語少神或寒熱似瘧或潮熱頗赤醫以風溫治之非也是由發汗不透寒熱在心包絡間也

瘥後昏沉不醒知母麻黄湯取微汗胃腑有熱虚煩面嘔竹葉石膏湯加生姜嘔吐不已隔上有寒理中丸

瘥後從腰以下有水牡蠣澤瀉散

產後日莩微煩以其病方瘥強與穀食不消也損殺則愈矣

傷寒四證類玄出指掌圖

痰證

外證增寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息但身不疼項不強若涎多者亦隱隱頭疼脈有寸浮者亦有寸伏者以意參之柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯氣上衝者瓜蒂散吐之

傷食

亦頭疼惡寒身熱但左手脈平和右手脈緊盛知爲食也大橘皮湯二陳湯心腹滿痛大柴胡湯下之胸滿嘔吐瓜蒂散吐之

虛煩

譫虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛爲異耳表既虛不可汗裏不實不可下叔和云虛煩有熱不可攻

腳氣

傷寒傳足不傳手所以寒濕之氣發于足則陷傷寒其證頭疼身熱肢節痛大便祕或嘔但初病時起于腳膝屈弱不能移動爲異耳感於寒所患必冷越婢小續命湯入生姜汁最妙感於暑所患是熱小續命去附子減桂一半腳腫木瓜散檳榔散大便祕脾約丸

小便自利

太陽身黄小便當不利今反自利其人如狂血證也抵當湯

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反自利爲有血也抵當丸下之尿血延胡索湯

延胡索　朴硝二兩

爲末每服四錢水一盞煎八分濾服

陽明自汗應小便不利而反自利津液內竭也屎雖硬不可攻宜蜜導煎豬膽汁法

少陰四逆小便自利虛寒也四逆湯及其武湯去茯苓小便祕或赤知內有熱也小便自利其人如狂小腹滿知不爲熱乃畜血也若陽明津竭自利與夫少陰自利乃胞寒不禁可不溫乎

熱入血室

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸脅滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室當

刺期門隨其實而瀉之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上中二焦必自愈

婦人中風七八日續得寒熱發作經水適斷此爲熱入血室其血必結故如瘧狀小柴胡湯



殺車槌法

明 徐杭節菴陶 華述

吾專傷寒。深明奧旨。脉正則道合神機。用藥則隨手取應。的本經論。全備發明。殺車槌法。世之罕有。永爲養生之寶矣。今將祕驗三十七方就註三十七槌法。二十條煎法。二十條劫病并製解法。名殺車槌也。實爲我師傳不傳之妙。我後子孫。一字不可輕露。莫與俗人言。爰使庸醫見爾。宜謹愼珍藏。毋違我之致囑也。

劫病法

一、傷寒發狂奔走。人難制伏。先於病人處。生火一盆。用艸一碗傾於火上。其煙冲鼻入內。卽安。方可察其陽狂陰燥。親切用藥無差。若初起頭疼、發熱、惡寒。方除。已後。登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。罵詈叫喊。大渴欲死。脉來有力。乃因邪熱傳裏。陽盛發狂。當用寒藥下之。此爲陽狂。凡見吞酸、嘈雜者不治。若病起無頭疼。身微熱。面赤戴陽。煩燥。脉來沉微無力。欲坐臥於泥水中。乃因寒熱而發燥。卽陰證似陽。當用熱藥温之。此爲陰燥。凡見厥冷、下利、譫語者不治。醫者不看脉。以虛陽上攻而燥。誤爲實熱。反與涼藥。使渴盛燥急。則氣消成大害矣。須詳脉來有力無力。此爲良法。

一、傷寒熱病。熱邪傳裏。亢極無解。用黃連煎水一盞。放非中頓冷。浸青布。搭在胸中。徐徐換之。待熱勢稍退。卽除。不可久漬。夏天用此法。冬天不宜用。

一、傷寒服藥吐出不納者。隨用竹管重搪內關後。將生姜自然汁半盞熱飲。其吐卽止。大凡服寒藥熱飲。熱藥寒飲。中和之劑温和服之。如要取汗。雖辛甘之劑。亦宜熱服。如要止汗。雖辛甘温之劑。亦宜温服。此爲良法。

大便結實。頑渴屬燥屎痞急。用寒藥下之。若食積痛。同治法。若小腹硬痞。小水自利。大便黑。身目黃者。屬蓄血痛。亦用寒劑加行血藥下盡黑物。則愈。此三者。皆痞隨利減之法也。若欲水愈加作痛。屬寒痞。當用温藥和之。和之不已。而或四肢厥冷。腹痛嘔吐瀉利。急用熱藥救之。須詳脉來有力無力。此爲良法。

傷寒直中陰經。眞寒證。甚重而無脉。或吐瀉脫元而無脉。將好酒姜汁各半盞。與病人服之。其脉來者可治。當察其陰用藥。不拘脉浮沉大小。但指下出見者生。如用此法。脉不至者必死。又當問病人有何疼痛處。若有痛證。要知痛甚者脉必伏。宜隨病制宜。如無痛證。用此法而脉至者。此爲青兆。尤當問病人。若平素原無正取脉。須用覆手取之。脉必見也。此屬反關脉診法。與正取法同。若平素正取有脉。後因病診之無脉者。亦當覆手取之。

一、傷寒舌上生胎。不拘滑白黃黑。俱用非水浸青布片。於舌上洗淨後。用生姜片子時時浸水刮之。其胎自退。凡見舌生黑胎芒刺者。必死。此熱毒入深。十有九死。是腎水竭心火也。若發黃者。用生姜時時遍身擦之。其黃自退。若心胸脇下有邪氣結實。滿悶硬痛。又法用生姜一勉。搗濃去汁。炒微燥。帶潤。用絹包。於患處款款熨之。稍可。又將渣和均前汁。炒乾再熨。許久。豁然寬快。俱爲良法。

一、傷寒鼻衄。應流。久不止者。將山梔炒黑色爲細末。吹入鼻內。外將水紙搭於鼻沖。其血自止。若點滴不成流者。其邪在經。未解。照後祕方用藥。不在此法。

一、傷寒熱邪傳裏。服藥後。煩躁發狂。譫語者。不治。若病起無頭疼。身如被杖。腹中絞痛。嘔逆。沉重不知人事。四體堅冷如石。手指甲唇青。藥不得入口。六脉沉細。或無脉。欲絕者。將葱縛一握。切去根葉。取白三寸許。搗如餅。先用射香半分。填於臍中。後放葱餅臍上。以火熨之。連換二三餅。稍醒。灌入生姜汁。煎服回陽救急湯。如不醒。再炙關元氣海二三十壯。使熱氣通其內。逼邪出於外。以復陽氣。如用此法。手足不温。汗不出。不省人事者。必死也。此爲良法。

一、傷寒熱病。熱邪傳裏。亢極無解。用黃連煎水一盞。放非中頓冷。浸青布。搭在胸中。徐徐換之。待熱勢稍退。卽除。不可久漬。夏天用此法。冬天不宜用。

一、傷寒吐血不止。用韭汁磨京墨呷下。其血見黑必止。如無韭汁。用鷄子清亦可。正謂赤屬火而黑屬水也。

一、傷寒直中陰經。眞寒證。或陰毒證。身如被杖。腹中絞痛。嘔逆。沉重不知人事。四體堅冷如石。手指甲唇青。藥不得入口。六脉沉細。或無脉。欲絕者。將葱縛一握。切去根葉。取白三寸許。搗如餅。先用射香半分。填於臍中。後放葱餅臍上。以火熨之。連換二三餅。稍醒。灌入生姜汁。煎服回陽救急湯。如不醒。再炙關元氣海二三十壯。使熱氣通其內。逼邪出於外。以復陽氣。如用此法。手足不温。汗不出。不省人事者。必死也。此爲良法。

一、中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末撚紙燒煙沖入鼻中有嚏可治隨用吐痰法將皂莢末五分半夏白礬各三分爲細末姜汁調服探吐後服導痰湯加減治之無嚏不可治此爲良法

一、治乾霍亂不得吐者用滾湯一碗入皂莢末三分攪一攪調服探吐莫與米湯設若與之即死是殺氣反助邪氣也

一、中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌入稍醒後服加味理中飲爲效如不飲酒人止用姜汁灌之依法調治此證冬月甚有之餘月幾希矣

製藥法

一、用附子去皮臍先將鹽水姜汁各半盞用沙鍋煮七沸後入黃連甘草各半兩再加童便半盞再煮七沸住火良久撈起入磁器盛貯伏地氣一晝夜取出曬乾以備後用無毒害頂圓辭正一兩一枚者佳此爲良法

一、用川大黃須錦紋者佳剉成飲片用酒拌均燥乾以備後用不傷陰血如年壯實熱者生用不須製之此爲良法

一、用麻黃去節先滾醋沙略浸片時撈起以備後用庶免太發如冬月嚴寒腠理至密當生用者不須製之此爲良法

一、用茱萸將鹽水拌均炒燥以備後用庶無小毒此爲良法

解藥法

一、用附子後身目紅者乃附毒之過用雞蛋搗水磁汁二大盞入黃連甘草各半兩煎至八分飲之以解附毒其紅即除如解遲必血從耳目口鼻出者必死無疑用雞蛋子搗水取汁亦可此爲良法如無雞蛋子用澄清泥漿水亦可也

一、用大黃後瀉利不止者用烏梅二箇炒粳米一撮乾姜三錢人參炒白朮各半兩用附子皮一錢半甘草一錢升麻少許燈心一握水二大鍾去滓後入炒陳壁土一匙調服即止取土氣以助胃氣也此爲良法

一、用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升連骨牡蠣粟本防風各一兩研爲細末遍身撲之隨後秘方用藥免致亡陽而死爲良法

煎藥法

一、用發汗藥先煎麻黃一二沸後入餘藥同煎

一、用止汗藥先煎桂枝一二沸後入餘藥同煎

一、用和解藥先煎柴胡一二沸後入餘藥同煎

一、用下藥先煎滾水入枳實一二沸後入餘藥同煎

一、用溫藥先煎乾姜一二沸後入餘藥同煎

一、用行血藥先煎桃仁一二沸後入餘藥同煎

一、用利水藥先煎豬苓一二沸後入餘藥同煎

一、用止瀉藥先煎炒白朮一二沸後入餘藥同煎

一、用消渴藥先煎天花粉一二沸後入餘藥同煎

一、用止痛藥先煎白芍藥一二沸後入餘藥同煎

一、用發黃藥先煎茵陳一二沸後入餘藥同煎

一、用發斑藥先煎青黛一二沸後入餘藥同煎

一、用發狂藥先煎石膏一二沸後入餘藥同煎

一、用嘔吐藥先煎半夏一二沸後入餘藥同煎

一、用勞力感寒藥先煎黃芩一二沸後入餘藥同煎

一、用感冒傷寒藥先煎荊芥一二沸後入餘藥同煎

一、用暑證藥先煎香薷一二沸後入餘藥同煎

一、用風病藥先煎防風一二沸後入餘藥同煎

一、用服如雷鳴藥先煎煅生姜一二沸後入餘藥同煎

一、用溫證藥先煎蒼朮一二沸後入餘藥同煎

秘用三十七方兼註三十七樓法

升麻發表湯　即麻黃湯自有加減法

治冬月正傷寒頭痛發熱惡寒脊強脈浮緊無汗爲表證此是太陽膀胱經受邪當發汗以頭如斧劈身如火熾者宜用此湯

麻黃　桂枝　甘草

升麻　川芎　防風

羌活

本經發熱惡寒頭痛無汗面喘者本方加乾葛去升麻

本經發熱惡寒身體痛者本方加蒼朮芍藥去杏仁

本經惡寒發熱身疼面赤者以其不得小汗出故也本方去白芷杏仁加柴胡芍藥

本經頭痛發熱惡寒胸中飽悶者本方加枳殼桔梗

本經感寒深重服湯不作汗者宜再服至二三劑而汗不出者死本經汗後不解者宜再服盡證輕重用麻黃升麻分多寡爲當

水二鍾姜三片葱白二莖樓法加江西豆豉一撮煎之熱服取汗如神宜厚被覆首凡中病即止不得多服多則反加別病矣

疎邪實表湯　卽桂枝湯自有加減法。
治冬月正傷風。頭痛發熱。惡寒。脊強脈浮緩。自汗。爲表證。此足太陽膀胱經受邪。當發散邪。無汗者不可汗下吐也。止有小柴胡一湯。隨病加減。再無別湯。

桂枝　赤芍藥　甘草　防風
川芎　羌活　白芷　柴胡　黃芩　半夏
如汗不止。如苦者。喘。加柴胡、杏仁。　人參　陳皮　芍藥
胸中飽悶。加枳殼、桔梗。
水二鍾。姜三片。棗二枚。煎法加藿佈二匙煎之。溫服羌活沖和湯。以代桂枝、麻黃、青龍各半等湯。此太陽經之神藥也。
治春夏秋非時感冒。暴寒頭痛。發熱惡寒。脊強無汗。脈浮緊。此足太陽膀胱經受邪。是表證。宜發散。不與冬時正傷寒同治法。此湯非獨治三時暴寒。春可治溫。夏可治熱。秋可治濕。治雜證亦有神也。祕之。不與俗人言之耳。
痛俗知此奇妙耳。本方自有加減法。備開于後。

羌活半錢　防風壹錢　蒼朮壹錢
白芷壹錢　甘草壹錢　川芎壹錢
細辛伍分不可多　黃芩壹錢
生地黃錢錢　川芎壹錢
如胸中飽悶。加枳殼、桔梗。去生地黃。
夏月本方加石膏、知母。名神朮湯。如服此湯後。不作汗。本方加蘇葉。喘而惡寒身熱。本方加杏仁、生地黃。
汗後不解。宜再服。汗下兼行。加大黃釜底抽薪之法。其春夏秋感冒。非時傷風。亦有頭痛。惡寒。身熱。脈浮緩。自汗。宜暫裘。本方去蒼朮。加白朮。汗不止。加黃耆。卽加減沖和湯再不止。以小柴胡加桂枝芍藥一錢。

桂枝　赤芍藥　甘草　黃芩
如神。　白芷壹錢　柴胡　桔梗
水二鍾。姜三片。棗二枚。煎至一鍾。槪法加葱白搗汁五匙。入藥再煎。一二沸。如發汗。用熱服。止汗。用溫服。

本經無汗。惡寒甚者。去黃芩。加麻黃。冬月宜加。春宜少。夏秋去之。加蘇葉。
本經有汗而渴者。治法開在如神白虎湯下。
水二鍾。姜五片。棗二枚。槪法加石膏。米一錢。煎之。熱服。

柴葛解肌湯　卽葛根湯。本湯自有加減法。

本經腹滿。不惡寒而嘔者。加大腹皮。去甘草。
水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。臨服。槪法入柿餅。磨水二匙。熱服。

治足陽明胃經受證。目疼。鼻乾。不眠。頭疼。眼眶痛。脈來微洪。宜解肌。屬陽明經病。其正陽明腑病。別有治法。

加味理中飲　卽理中湯。本方自有加減法。

治足太陰脾經受證。自利。不渴。手足溫。身無熱。脈來沉而無力。此屬臟寒。

柴胡　乾葛　甘草　黃芩
芍藥　羌活　白芷　桔梗
本經無汗。惡寒甚者。去黃芩。加麻黃。冬月宜加。春宜少。夏秋去之。加蘇葉。

乾姜　白朮　人參
肉桂　陳皮　茯苓
厥陰消渴。氣上衝心。飢不欲食。食卽吐蚘。腹痛。大便實者。本方加大黃釜少許利之。

甘草
白朮
桔梗
黃芩
半夏
芍藥
甘草
本經嘔吐者。入半夏、姜汁。
本經證。小便不利者。加茯苓。
本經證。心下飽悶未經下者。非結胸。乃表邪傳至胸中。未入乎腑。設邊滿悶。尙爲在表。只消小柴胡加枳、桔。未效。就以本方對小陷胸加枳、桔一服豁然。其妙如神。祕之。祕之。不與俗人言之耳。
本經與陽明合病。本方加葛根、芍藥。如拾芥。
婦人熱入血室。加當歸、紅花。
男子熱入血室。加生地黃。
老婦人傷寒。無表證。其熱勝者。本方加大黃。甚者加芒硝。
水一鍾。姜一片。棗二枚。槪法入生艾汁三匙。煎之。溫服。
桂枝大黃湯　卽桂枝湯內加大黃。本方自有加減法。
治足太陰脾經受證。腹滿而痛。咽乾而渴。手足溫。脈來沉而有力。此因邪熱從陽經傳入陰經也。

桂枝　赤芍藥　甘草　大黃
枳實　柴胡　人參　茯苓
本經腹滿。不惡寒而嘔者。加大腹皮。去甘草。
本經腹滿時減者。依本方去甘草。
本經嘔吐者。入半夏、姜汁。
本經證臥沉重。利不止。少加附子。

利後身體痛者急溫之加附子
自利腹痛者入木香磨姜汁調服取土氣以助胃氣
水二鍾姜一片棗二枚煎之臨服攪法入炒陳壁土一匙調服
茵陳將軍湯　即茵陳湯本方自有加減法
治足太陰脾經腹滿身目發黃小水不利大便實發渴或頭汗至頸而還脉來沉重者宜用
大黃　茵陳　厚朴　黃芩　山梔　枳實　甘草
大便自調者去大黃厚朴加大腹皮利小便
導赤散　即五苓散本方自有加減法
治小水不利小腹滿或下焦熱或引飲過多或小水短赤而渴脉沉數者以利小便爲先惟汗後亡津液與陽明汗多者則以利小便爲減
茯苓　豬苓　澤瀉　桂枝　滑石　山梔　甘草
白虎
中濕身目黃者加茵陳　水結胸證加木通燈心如小水不利而見頭汗出者乃陽脫也
得病起無熱但譫語煩燥不安新采不與人相當此湯治之
水二鍾姜一片燈心二十莖攪法入鹽二字調服
六乙順氣湯
以代大承氣小承氣調胃承氣大柴胡三乙承氣湯大陷胸等湯之神藥也舉世無人知此奇妙耳祕之
莫與俗人言本方自有加減法備開
此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱證語揭衣狂妄揚手擲足班黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬邊脾疼痛等證悉皆治之效不盡述
大黃　枳實　厚朴　黃芩　芒硝　芍藥
三黃石膏湯
此湯治陽毒發斑身黃如金朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞證表裏皆熱欲發其汗病熱不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治溫證而成此證者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沉重欲治其內由表未解欲發其表則裏證又急趨起不能措手待斃而已殊不知熱在三焦閉塞經絡津液榮衛不通遂成此證又治汗下後三焦生熱脉洪證語不休晝夜喘鼻身時加躁身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神人所不識
石膏半斤碎　黃芩　黃連
山梔壹拾箇　麻黃　香豉貳合
水二鍾姜三片棗一枚攪法入細茶一撮煎之熱服

者愈
結胸證心下硬痛手不可近燥渴證語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗凡傷寒過經及老弱并血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或有表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱傳裏結實須看熱氣淺深用藥令之旋覆俗醫不分當急下可少與宜微和胃氣之險一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣余謂傷寒之邪傳來非一治之則殊坪病有三焦俱傷者則痞滿燥實堅全俱宜大承氣湯厚朴菁溫以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦則有燥實堅三證故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛無氣溫之元氣調胃之名自此然矣上焦受傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒硝不傷下焦血分之真陰謂不伐其根本也若夫大柴胡湯則有裏證尚未除而裏證又急不得不下者只得以此湯通表裏而緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人亦宜用此故經云轉藥就緊有芒硝者緊也大承氣最緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方爲轉藥蓋爲病輕者設也仲景又云湯藥傷寒熱結皆用湯液切禁丸藥不可不知也
右先將水二鍾煮三沸後入藥煎室八分攪法臨時服入鐵銹水三匙調服立效取鐵性沉重之義最能墜熱開結有神此千金不傳之祕若非吾之子孫承繼焉肯泄露玄機故戒耳
如神白虎湯　即白虎湯本方自有加減法
治身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪宜用
石膏　知母　甘草　粳米
山梔　麥門冬　五味子
心煩者加竹茹一團如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此藥爲大忌水二鍾粳一枚姜一片攪法加淡竹葉十片煎之熟服
人參

三黃瓦勝湯

此湯治陽毒發斑。狂亂妄言。大渴叫喊。目赤。脉數。大便燥實不通。上氣喘急。舌卷縮。難治者。擺以此湯劫之。三黃石膏湯內去麻黃豆豉加大黃、芒硝是也。水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。趁法臨服入苦酒一匙調服。

二味調服即安

沖和靈寶飲

治兩感傷寒。起於頭痛。惡寒。發熱。口燥舌乾。以陽先受病多者。以此湯探之。中病即愈。

羌活　防風　川芎　生地黃
細辛　黃芩　柴胡　甘草
乾葛　白芷　石膏

水二鍾。煨生姜三片。棗二枚。趁法入黑豆一撮煎之。溫服。取微汗爲愈。如不愈。裘證多而甚急者。方可用麻黃、葛根爲解表。如裘證多而甚急者。先以調胃承氣爲攻裘是也。

如以陰經自中病發熱。下利。身疼痛。脉沉細無力。不渴。惓臥悸重者。又當先救裘溫之。回陽救急湯。是分表裘實熱而治。此其機變大法也歟。古云兩感難爲死證。猶有可救之理。及用藥先後寒熱之劑。若發表攻裘一誤。則枉死者多矣。良可痛哉。深可惜哉。予將不傳之妙。秘驗之方。盡吐露。非惟救人有功。亦且陰騭匪輕。謹之慎之。毋忽毋忽。

桃仁承氣對子　卽桃仁承氣湯。本方自有加減法。

桃仁　桂枝　芒硝　大黃
芍藥　柴胡　青皮　當歸
甘草　枳實

水二鍾。姜三片。煎之。臨服。趁法入蘇木煎汁三匙調服。

消斑青黛飲

治邪熱傳裘。裘實表虛。血熱不散。熱氣乘於皮膚而爲斑也。輕則如疹子。重則如錦紋。重者則斑爛皮膚。或未屬陽。誤投熱藥。或當下不下。或下後未解。皆能致此。不可發汗。重令開泄。更加斑爛也。然而斑之方萌。與蚊迹相類。發斑多見於胸腹。蚊迹只在於手足。陽脉洪大。病人昏憒。先紅後赤者。斑也。脉不洪大。病人自靜。先紅後黃者。蚊迹也。其或大便自利。拂鬱氣煩。燥屎不通。又如果實鬱者。盧醫復生。不能施其巧矣。凡汗下不解。足冷耳聾。煩悶欲嘔。便是發斑之候。

石膏　知母　甘草　玄參
生地黃　山梔　柴胡　升麻
犀角　黃連　芍藥　人參
大青

水二鍾。姜三片。煎之。臨服。趁法入射香三豆調服。中病以手足溫和卽止。不得多服。多則反加別病矣。如後止。

治邪熱傳裘。裘實表虛。血熱不散。熱氣乘於皮膚而爲斑也。輕則如疹子。重則如錦紋。重者則斑爛皮膚。或未屬陽。誤投熱藥。或當下不下。或下後未解。皆能致此。不可發汗。重令開泄。更加斑爛也。然而斑之方萌。與蚊迹相類。發斑多見於胸腹。蚊迹只在於手足。陽脉洪大。病人昏憒。先紅後赤者。斑也。脉不洪大。病人自靜。先紅後黃者。蚊迹也。其或大便自利。拂鬱氣煩。燥屎不通。又如果實鬱者。盧醫復生。不能施其巧矣。凡汗下不解。足冷耳聾。煩悶欲嘔。便是發斑之候。

犀角　升麻　甘草　人參
大便實者。去人參。加大黃。
若水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。趁法臨服入苦酒一匙調服。

生地芩連湯

此湯治鼻衄成流。久不止者。或熱毒入深。吐血不止者。宜用。

黃芩　山梔　桔梗
生地黃　黃連　柴胡
芍藥　犀角　如無升麻代之。

外用劫法。水紙搭於鼻沖。

如去血過多。錯語失神。撮空閉目。不知人事者。同治法。

水二鍾。棗二枚。煎至八分。趁法臨服入茅根搗汁。磨京墨調飲。如無茅根。以藕搗汁亦可。

加味犀角地黃湯

此湯治煩燥。激水不下咽者。屬上焦有瘀血。宜用。

犀角　生地黃　牡丹皮
甘草　桔梗　陳皮
當歸

水二鍾。姜二片。煎之。臨服。趁法入生藕節搗汁三匙。溫服。

回陽救急湯　卽四逆湯本方自有加減法。

治寒邪直中陰經。真寒證。初病起。無身熱。無頭疼。止惡寒。四肢厥冷。戰慄。腹疼。吐瀉。或手指甲唇青。或口吐涎沫。或至無脉。或脉來沉遲。面無力者。宜用。

熟附子　乾姜　人參
白朮　肉桂　陳皮
茯苓　半夏

水二鍾。姜二片。煎之。臨服。趁法入生薑汁三匙。溫服。

治寒邪直中陰經。真寒證。初病起。無身熱。無頭疼。止惡寒。四肢厥冷。戰慄。腹疼。吐瀉。或手指甲唇青。或口吐涎沫。或至無脉。或脉來沉遲。面無力者。宜用。

甘草　芒硝　大黃
五味　青皮　當歸

水二鍾。姜三片。煎之。臨服入射香三豆調服。中病以手足溫和卽止。不得多服。多則反加別病矣。如後止。

此湯治陰盛格陽。陰極發燥。微渴。面赤。欲坐臥於泥水井中。脉來無力。或脉全無欲絕者。宜用。

甘草　知母
生地黃　山梔
黃連　柴胡
芍藥　如無升麻代之。

外用劫法。水紙搭於鼻沖。

如去血過多。錯語失神。撮空閉目。不知人事者。同治法。

水二鍾。棗二枚。煎至八分。趁法臨服入茅根搗汁。磨京墨調飲。如無茅根。以藕搗汁亦可。

加味犀角地黃湯

此湯治煩燥。激水不下咽者。屬上焦有瘀血。宜用。

犀角　生地黃　牡丹皮
甘草　桔梗　陳皮
當歸

水二鍾。姜二片。煎之。臨服。趁法入生藕節搗汁三匙。溫服。

回陽救急湯　卽四逆湯本方自有加減法。

治寒邪直中陰經。真寒證。初病起。無身熱。無頭疼。止惡寒。四肢厥冷。戰慄。腹疼。吐瀉。或手指甲唇青。或口吐涎沫。或至無脉。或脉來沉遲。面無力者。宜用。

熟附子　乾姜　人參
白朮　肉桂　陳皮
茯苓　半夏

水二鍾。姜二片。煎之。臨服。趁法入射香三豆調服。中病以手足溫和卽止。不得多服。多則反加別病矣。如後止。

此湯治陰盛格陽。陰極發燥。微渴。面赤。欲坐臥於泥水井中。脉來無力。或脉全無欲絕者。宜用。

甘草　芍藥
川芎　紅花

熟附子　乾姜
麥門冬　五味子
面戴陽者下盧也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗愈效
柴胡百合湯
此湯治猩後昏沉發熱渴而錯語失神及百合勞復等證
柴胡　人參　甘草　陳皮
知母　百合　黃芩　生地黃
渴加天花粉　胸中煩燥加山梔
有微頭疼加葛根、川芎　嘔吐入姜汁炒半夏
胸中飽悶加枳殼、桔梗
食復者加枳實、黃連甚重大便實者加大黃
胸中虛煩加竹茹、竹葉
猩後乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黃連、犀角　咳喘者加杏仁、百合宜加麻黃
心中懸惕爲血少加當歸、茯苓、遠志
虛汗者加黃耆　脾倦加白朮
如聖飲
治剛柔二痙頭搖口噤身反張手足攣搐頭面赤項強急與痰癎同治法
葛根　防風　川芎　白芷
柴胡　芍藥　甘草　當歸
烏藥　半夏　黃芩
有汗是柔痙加白朮、桂枝　無汗是剛痙加麻黃、蒼朮
水二鍾姜三片煎之臨服入姜汁、竹瀝溫服
溫經益元湯
治圍汗後大虛頭眩振振欲擗地并肉瞤筋惕及因發汗大多衝虛亡陽汗不止或下後利不止身疼痛者併宜治之
熟地黃　人參　白朮　黃耆
甘草　白芍藥　當歸　生地黃
白茯苓　陳皮　肉桂

如他圍加枳殼去地黃　如瘦人去芍藥有熱去附子利不止加炒白朮、升麻、陳壁土去當歸、地黃嘔者加姜汁製半夏　渴者加天花粉
汗後惡風寒腸裏虛去附子、肉桂、生地黃加桂枝膠飴　水二鍾姜三片棗一枚煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗愈效
溫服
逍遙湯
治有思傷寒邊後血氣未平勞動助熱復還於經絡因與婦人交接淫慾而無病人反得病者謂之陰陽易予曾見香出數寸而死者多矣此證最難治必宜此湯
人參　知母　竹葉　如卵縮腹痛倍加黃連
甘草　滑石　生地黃　韭根
柴胡　犀角
水二鍾棗二枚姜三片煎之槌法臨服入燒褌灰半錢半調服有黏汗出爲效不黏汗出再服以小水利陰頭腫即愈
升陽散火湯
此湯治有思人叉手冒胸寒衣摸床譫語昏沉不醒人事俗醫不識見病便呼爲風證而因風藥誤人死者多矣殊不知汗熱乘於肺金元氣虛不能自主持名曰撮空證小便利者可治小便不利者不可治
人參　當歸　柴胡
黃芩　甘草　白朮
陳皮　茯神
有痰者加姜汁、炒半夏　大便燥實譫語發渴加大黃泄漏者加升麻、炒白朮
水二鍾姜三片棗二枚槌法入金箔飾煎之熱服
再清散
治思頭疼發熱項背強寒無汗用發汗藥二三劑汗不出者庸醫不識此證不論時令逢以麻黃重藥及火劫取汗誤人死者多矣殊不知陽虛不能作汗故有此證名曰撫陽證
黃耆　人參　桂枝
熟附　細辛　羌活
川芎　煨生姜
甘草
防風

芍藥
麥門冬
治有思心下硬痛下利純清水譫語發渴身熱庸醫不識此證但見下利便呼爲陰虛傷寒而便用熱藥

止之就如抱薪積火誤人死者多矣殊不知此因熱邪傳裏胃中燥屎結實此利非內寒而利乃曰逐自欲湯藥而利止直急下之名曰結熱利證身有熱者宜用此湯身無熱者用前六乙順氣湯

大黃　芒硝　枳實　厚朴
甘草　人參　當歸

年老氣血虛者去芒硝

水二鍾姜三片棗子二枚煎之後再加桔梗一沸熱服食後

調榮養衛湯　即補中益氣湯

治有患頭疼身熱憎寒微渴識然汗出身作痛脚腕酸疼無力沉倦脉容淫而無力庸醫不識因見頭疼憎寒發熱便呼爲正傷寒而大發其汗所以轉變重而害人者多矣殊不知勞力內傷氣血外感邪宜少辛甘溫之劑則愈名曰勞力感寒證故經云勞者溫之損者溫之溫能除大熱正此謂也有下證者大柴胡下之則愈

人參　黃耆　生地黃
川芎　陳皮　甘草
細辛　防風　白芍

元氣不足者加升麻少許須知元氣不足者至陰之下求其升口渴加天花粉知母噦噦加杏仁去升麻汗不止加芍藥去升麻細辛胸中煩熱加山梔竹茹乾嘔者加姜汁炒半夏胸中飽悶加枳殼桔梗去生地黃甘草黃者白朮少許掇盛者加瓜蔞仁貝母去防風細辛腹痛去芎朮加芍藥乾姜和之其因血虛內傷有痼處或大便黑加桃仁紅花去芍辛羌防黃者白朮太甚者加大黃下盡瘀血則愈後撮本方去大黃調理

當歸　生地黃
陳皮　甘草
桂心　乾姜
人參　柴胡

水二鍾姜三片棗二枚撮法入葱白一莖煎之溫服三貼後去桃仁紅花乾姜桂心加白朮茯苓加味導痰湯

導赤各半湯

治患傷寒後心下不硬腹中不滿大小便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中獨語一二句曰赤唇焦有患怕寒壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫庸醫不識指爲傷寒治之誤人多矣殊不知此因內傷七情以致痰迷心竅神不守舍神出舍空容則痰生也名曰挾痰如鬼祟痰證類傷寒與此同治法

赤芍藥　甘草
桂心　乾姜　枳殼
人參　柴胡　桃仁泥

殊不知元氣虛弱是無根虛火泛上名曰戴陽證

熟附　甘草　乾姜
五味　麥門冬　黃連
葱　艾

水二鍾姜一片棗二枚煎之臨服槌法入童便三匙頓冷服

桂苓飲

治有患初得病無熱證語煩燥不安精采不與人相當庸醫不識呼爲狂發誤用下藥死者多矣殊不知此因熱結膀胱名曰如狂證

猪苓　澤瀉　桂枝
白朮　知母　黃柏
薤葉

水二鍾姜三片煎至一鍾槌法再加滑石末一錢煎三沸溫服取微汗爲效

當歸活血湯

治有患無頭疼無惡寒止則身熱發渴小水利大便黑口出無倫語庸醫不識呼爲熱證而用涼劑誤人多矣殊不知因傷心脾二經使人昏迷沉重故名換血如鬼祟

當歸　赤芍藥　甘草
桂心　乾姜　枳殼
人參　柴胡　桃仁泥

水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙調服

加味導痰湯

治患怕寒壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫庸醫不識指爲傷寒治之誤人多矣殊不知此因內傷七情以致痰迷心竅神不守舍神出舍空容則痰生也名曰挾痰如鬼祟痰證類傷寒與此同治法

茯苓　半夏　南星
黃芩　白朮　陳皮
桔梗　黃連　瓜蔞仁

水二鍾姜三片棗二枚煎之臨服槌法入竹瀝姜汁溫服

加減調中飲

治食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣口脉緊盛但身不痛此與爲異耳經云飲食自倍腸胃乃傷輕則消化

人參　甘草
知母　山梔

頂則吐下此良法也

蒼朮　厚朴
白朮　山查
草菓　黃連
腹中痛加桃仁　痛甚大便實熱加大黃下之去山查、草菓、神曲、乾姜
心中兀兀欲吐者與乾薑黃同吐法用滾水一碗入鹽一撮皂莢末五分探吐
水二鍾姜一片煎之搶法臨服入木香磨取汁調飲即效

加減絳命湯

治脚氣類傷寒頭疼身熱惡寒支節痛便祕嘔逆脚軟屈弱不能轉動但起於脚膝耳禁用補劑及淋洗

防風　芎藭　白朮　川芎
防己　桂枝　甘草　麻黃
蒼朮　羌活

暑中三陽所患必熱脉來數去附子、桂枝、麻黃加黃芩、黃連
寒中三陰所患必冷脉來澁加附子
起於濕者脉來弱加牛膝、木瓜
起於風者脉來浮加獨活　元氣虛加人參少許大便實者加大黃
水二鍾棗二枚姜一片煙心二十葉煎之搶法入姜汁調之溫服

芩連消毒湯

治天行大頭病發熱惡寒頭項腫痛脉洪取作瘍火治之其喉痺者亦照此方治之

柴胡　甘草　桔梗　川芎
黃芩　荊芥　黃連　防風
羌活　枳殼　連翹　射干
白芷

先加大黃利去一二次後依本方去大黃加人參、當歸調理
水二鍾姜三片煎至一鍾鼠黏子一撮再煎一沸搶法入竹瀝姜汁調服

六神通解散

治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用沖和湯不愈後服此湯

麻黃　甘草　黃芩　石膏
滑石　蒼朮　川芎　羌活
細辛

陳皮　甘草
神曲　枳實
乾姜

水二鍾姜三片搶法入豆豉一撮葱白二莖煎之熱服取汗中病卽止

傷寒論翼

柯琴纂

序

清　柯琴纂　琴字韻伯，慈溪人。

昔在軒岐，明天運，立人道，覩造物之本原，列生成之形狀，以爲列象布形者，皆在五行，流行出入者，卽在三氣。故曰其生五，其氣三，人在氣交之中，稟有經絡，藏府肢體，與天同而實異，則又爲之別列人躬，定其表裏，曰三陽爲表，三陰爲裏，顯其體用，又曰太陽爲開，陽明爲闔，少陽爲樞，太陰爲開，少陰爲樞，厥陰爲闔，由是六經列而三氣從，三氣定而六經顯，內以蘊其性情，外以布其營衛，源源本本，條分縷析，萬病之所出入，舍六經其將誰以哉，後世不明斯旨，一切強索之於病形之名，若巢氏之分列病源，不推病由，務多名目，孫眞人之立方命名千金，欲著奇驗，所重在方，下至陳無擇三因，約其所致，而不明所抵，雖以劉河間之高明，而作原病式，亦但知有者求之，而未悟無者求之之理，夫六經者，元氣營衛之所體要，寒熱虛實之所考徵，舍茲而往，則經絡表裏，爲閫爲樞之道，流散無窮，何病能察而得其一致耶，仲景先師天縱之聖，起而傳述開發一本內經，特拈六經以鈐百病，的是綱以定準則，爲辨脈以著參攷，因著爲傷寒雜病論十六卷，于今尙存，序文斯可徵矣，自叔和臆味，不思尋其所集，務欲自鳴，眞蒐採刪輯，遺以傷寒名論，竟失其原文，且述內經熱病論以概之，謂七日爲目傳一經，六經爲傷寒而設，自此而後，叔和傷寒之病亦多矣，非眞傷寒之多也，卽金匱中雜病亦盡指爲傷寒也，是則活人書傳，而仲景之活法廢，全生集出，而後學之生機絕矣，今世錮於邪說，反以仲景爲難讀，不知仲景書，皆叔和改頭換尾，刪削補湊，非本來面目也，冠脈法序例於前，集可汗不可汗等於後，列痙濕暍於太陽之首，霍亂勞復等於厥

陰之外。雜部見於六經之中。是一部王叔和之書矣。至林億等較正諸本之異同。而不得仲景原集。惑於傷寒論之命名。又妄編三百九十七法。一百一十三方之數。以附會叔和所定之傷寒。由是欲知仲景之道。更不可得。咸無已信古篤好。作註論兩書。矯然特出。惜乎生於林億之後。欲爲仲景功臣。無由得其真傳。故註仲景書。而仲景書旨多不合。作明理論。而傷寒之理反不明。因不得仲景傷寒雜病合論之旨。故不能辨叔微三方鼎立之謬。反集於註。開疑端以待後人。豈非爲三百九十七法等說所誤乎。由是方中行有條辨之作。而仲景之規矩繩墨更加敗壞。名爲翻叔和之所偏。實以滅仲景之活法也。盧子由作疏鈔金鍼。不編林億之數目。不宗許氏之三綱。意其有見。而又以六經上配六氣。增標本形層本氣化氣等說。仲景之法又何堪如此擾亂哉。近日作者蜂起。尙論愈奇。去理愈遠。條辨愈新。古法愈亂。連牀充棟。總不出三百九十七與三大綱之迷途。卒景六經。反茅塞而無辨。不深可惜耶。原夫仲景之六經。爲百病立法。不專爲傷寒一科。傷寒雜病治無二理。咸歸六經之節制。六經中各有傷寒。非爲寒中獨有六經也。因讀者精神不生。令作者之妙義湮沒。治傷寒者但拘傷寒之名。而不究其中論雜病之理。治雜病者。以傷寒論爲無關於雜病。而置之罔聞。將參贊化育之書。悉歸狐疑之域。豈其爲斯道疑之學者欲入仲景門。當先明六經之路。披諸家疑幛。破叔和重圍。則其中紛紜雜沓。迎刃而解。若無潛心體察功夫。漫視遠聽。描模影響。不見仲景面目。何由而得其心法哉。愚於仲景書悉心有年。愧未能深究其蘊。猶見此中微理。敢略陳固陋。名曰傷寒論翼。不兼標雜病者。恐人未知仲景合論之旨。以雜病二字爲不足觀耳。其當與否。自有能辨之者。康熙甲寅春日慈溪柯琴序。

傷寒論翼卷上

全論大法第一

按仲景自序言作傷寒雜病論合十六卷。則傷寒雜病未嘗分兩書也。凡條中不冠傷寒者。卽與雜病同義。如太陽之頭項強痛。陽明之胃實。少陽之口苦咽乾目眩。太陰之腹滿吐利。少陰之欲寐。厥陰之消渴氣上撞心等症。是六經分司之提綱。非專爲傷寒一證立法也。觀五經提綱皆指內證。惟太陽提綱爲寒邪傷表立。五經提綱皆指熱證。惟太陰提綱爲寒邪傷裏立。然太陽中外發熱。而亦惡寒。太陰傷熱。亦腹痛而吐利。俱不離太陽主外太陰主內之定法。而六經分症皆兼傷寒雜病也明矣。因太陽主表。其提綱爲外感立法。故叔和將仲景之合論全屬傷寒。不知仲景已自明其書不獨爲傷寒設。所以太陽篇中。先將諸病線索。逐件提清。比他經更詳也。其曰太陽病或已發熱、或未發熱、心惡寒、體痛、嘔逆、脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。是傷寒另有提綱矣。此不特爲太陽傷寒之提綱。卽六經傷寒總綱亦不外是。觀仲景獨於太陽篇。別其名曰傷寒、曰中風、曰中暑、曰濕病、曰濕痹。而他經不復分者。則一隅之舉。可以尋其一貫之理也。其他結胸、藏結、陽結、陰結、痙熱、發黃、熱入血室、譫語如狂等症。或因傷寒。或非傷寒。紛紜雜沓。離之中。正可以思傷寒雜病合論之旨矣。蓋傷寒之外。皆雜病。病名多端。不可以數計。故立六經而分司之。傷寒之中最多雜病。內外夾雜。虛實互呈。故將傷寒雜病而合參之。正以

合中見離陽之清濁。此挈要法也。叔和不知此旨。謂痙濕暍三種宜應別論。則中風溫病何得與之合論耶。以三症爲傷寒所致。溫病與傷寒相似。故此見之。則中風非傷寒所致。咸當屬於厥陰。何得另立篇目。叔和分太陽、陽明、霍亂是肝邪爲患。陰陽易。攝後勞復。皆傷筋動血所致。咸當屬於厥陰。何得另立篇目。叔和分太陽三證於前。分厥陰諸證於後。開後人分門類症之端。豈知仲景約法。能令百病兼該。于六經。而不能逃六經之外。只在六經上求根本。不在諸病名目上尋枝葉。乃叔和以私意紊亂仲景之原集。於勞復後重集可發汗不可發汗諸篇。如弱反在關。濇反在趺。微反在上。滿反在下。不知如何名反。豈濇弱微滿等脈。有定位乎。此類姑不悉辨。其云大法春夏宜發汗。冬宜吐。秋宜下。設未值其時。當汗不汗。當下不下。必待其時耶。而且利水清火溫補和解等法。概不言及。所以令人稱仲景止有汗吐下三法。實由于此。夫四時者衆人所同受。病者因人而異。汗吐下者因病而施也。立法所以治病。非以治時。自有此大法之謬。後人因有隨時用藥之迂論。論麻黃桂枝湯者。謂宜于冬月嚴寒。而三時禁用。論白虎湯者。謂宜于夏。而大禁秋分後與立夏之前。夫必先歲氣。毋伐天和。寒熱溫涼之逆用。爲平人欲食調理之常耳。仲景因症立方。豈隨時定劑哉。當知仲景治法。悉本內經。按岐伯曰。調治之方。必別陰陽。陽病治陰。陰病治陽。定其中外。各守其鄉。外者外治。內者內治。從外之內者治其外。從內之外者調其內。從內之外而盛于外者。先調其內。後治其外。從外之內而盛于內者。先治其外。後調其內。中外不相及。則治主病。微者調之。其次平之。盛者奪之。寒熱溫涼衰之。以屬隨其攸利。此大法也。仲景祖述靈樞。遺意章昭。著本論所稱發熱惡寒。發於陽。無熱惡寒。發於陰者。是陰陽之別也。陽病製白虎承氣以存陰。陰病製附子茱萸以扶陽。外者用麻桂以治表。內者用硝黃以治裏。其于表虛裏實。表熱裏寒。發表和表。攻裏救裏。病有淺深。治有次第。方有輕重。是定其中外。各守其鄉也。太陽陽明併病。小發汗。太陽陽明合病。用麻黃湯。是從外之內者治其外也。陽明病發熱汗出不惡寒。反惡熱。用梔豉湯。是從內之外者調其內也。發汗不解蒸蒸發熱者。從內之外而盛于外。調胃承氣先調其內也。表未解而心下痞者。從外之內而盛于內。當先解表。乃可攻痞。是先治其外後調其內也。中外不相及。是病在半表半裏。大小柴胡湯治主病也。此卽所謂微者調之。其次平之。用白虎梔豉小承氣之類。盛者奪之。則用大承氣陷胃抵當之類矣。所云觀其脈症知犯何逆。以法治之。則寒熱溫涼。衰之以屬。隨其攸利之謂也。若分四時以拘法。限三法以治病。遇病之變遷。則束手待斃矣。且汗下吐之法。亦出於岐伯。而利水清火調補等法。悉具焉。其曰有邪者清。形以爲汗。在皮者汗而發之。謂者散而瀉之。此汗家三法。中滿者瀉之于內。血實者宜決之。是下之二法。高者因而越之謂吐。下者引而竭之謂利小便。憤悱者按而收之。是清火法。氣虛宜壅引之。是調補法也。夫邪在皮毛。猶未傷形。故仲景製麻黃湯。急汗以發表。邪入肌肉。是已傷其形。故用桂枝湯。歠稀熱粥以解肌。是清形以爲汗。若邪正交爭。內外俱實。寒熱互呈。故製大青龍。于麻桂中加石羔以瀉火。是散而瀉之也。吐劑有梔豉瓜蒂。分胸中虛實之相殊。下劑有大小承氣調胃抵當。分氣血淺深之不同。利水有猪苓茵蔯武靈熱之緜絕。清火有石羔芩連輕重之差等。陽氣虛。加人參于附子與茱萸中以引陽。陰氣虛。加人參於白虎瀉心中以引陰。諸

法并然。質之岐伯。纖蕊不爽。前聖後聖。其揆一也。愚更有議焉。仲景言平脈辨症。爲傷寒雜病論。是脈與症亦未嘗兩分也。夫因病而平脈。則平脈即在辨症中。病有陰陽。脈合陰陽。發熱惡寒發于陽。無熱惡寒發于陰。是病之陰陽也。當列全論之首。大、浮、動、滑、數、名陽。沉、濇、弱、弦、微、名陰。是脈之陰陽也。此條當爲之綱。叔和既云搜採仲景舊論。錄其證候診脈。是知叔和另立脈法。從此搜採耳。試觀太陽篇云。脈浮者病在表。脈浮緊者。法當身疼痛。脈浮數者。法當汗出愈。諸條。脈法不入辨脈平脈篇。是叔和搜採未盡。納道仲景舊格也。由此推之。知寸口脈浮爲在表。及寸口脈浮而緊。脈浮而數。諸條。皆從此等處採出。脈有陰陽。結陽結條。未始不在陽明中風中寒之間。酒漸惡寒而發熱者。未始不在少陽寒熱往來之部。脈陰陽俱緊者。未必非少陰之文。陰陽相搏條。未必不在傷寒脈結代之際。設仲景另集脈法。或有上下之分。諒無平辨之別矣。名平名辨。皆叔和搜採之說。仲景所云各承家技者是也。世徒知序例爲叔和之文。而不知仲景之費。皆係叔和改換。獨爲傷寒立論。十六卷中。不知遺棄幾何。而六經之文夾雜者亦不少。豈猶然仲景舊集哉。如疑余見之謬。請看序例所引內經。莫不增句易字。彼倘敢改岐伯之經。況乎仲景之論耶。欲識眞仲景者。逐條察其筆法。知玅工記自不合于周官。楮先生大不作于太史矣。世皆以金匱要略爲仲景雜病論。則有若之似聖人。惟曾子爲不可強乎。

六經正義第二

按仲景自序云。雖未能盡愈諸病。其留心諸病可知。故于諸病之表裏陰陽。分爲六經。令各得所司。消理脈症之異同。寒熱之虛實。使治病者只在六經中下手。行汗吐下和解溫補等法。而無失也。夫一身之病俱受六經。統圍者。猶周禮分六官而百職舉。司天分六氣而萬物成耳。傷寒不過是六經中一症。叔和不知仲景之大經。是經界之經。而非經絡之經。妄引內經熱病論作序例。以冠仲景之書。而混其六經之證治。六經之理因不明。而仲景平脈辨症能盡愈諸病之權衡廢矣。夫熱病之六經。專主經脈爲病。但有發表之與裏之實熱。並無裝裏之虛寒。雖因于傷寒。而已變成熱病。故竟稱熱病而不稱傷寒。要知內經熱病。即溫病之互名。故無惡寒症。但有可汗可泄之法。並無可溫可補之例也。觀溫病名篇。亦稱評熱病論。其義可知矣。夫叔和不于病根上講求。但于病名上分解。故序例所引內經。既背仲景之旨。亦舛岐伯之意也。夫仲景之六經。是分六區地面所該者廣。難以脈爲經絡。而不專在經絡上立說。凡風寒濕熱內傷外感。自表及裏。有寒有熱。或虛或實。無乎不包。故以傷寒雜病合爲一書。而總名爲傷寒雜病論。所以六經提綱各立一局。不爲經絡所拘。非爲傷寒盡定也。然仲景既云撰用素問。嘗於素問之六經廣求之。按皮部論云。皮有分部。脈有經紀。其生病各異。別其分部左右上下。陰陽所在。諸經始終。此仲景創六經部位之原。又曰陽主外。陰主內。故仲景以三陽主外。三陰主內。又曰在陽者主內。在陰者主出以溫于內。故仲景又以陽明主內。少陰亦有反發熱者。故仲景于表劑中用附子。是問其滲也。又曰少陰之陰名曰極傷。其入于經也。從陽部注于經。其出者從陰部注于骨。故仲景製麻黃附子湯。治發熱脈沉無裏症者。是從陽部注經之義也。製附子湯。治身體骨節痛。手足寒。背惡寒。脈沉者。是從陰內注於骨之義也。內陰陽雖合論。

知爲何地所起。發于其境。便衛之本境。移隔鄰郡。卽兩路夾攻。如邪入太陽地面。卽汗而散之。猶陳利兵于要害。乘其未定而擊之也。邪之輕者在衛。重者在營。尤重者在胸膈。猶寇之淺者在關外。深者在關上。尤深者在關內也。是麻黃爲關外之師。桂枝葛根爲關上之師。大小青龍爲關內之師矣。凡外寇不靖。內地盜賊必起而應之。因立兩解法。故有大小青龍及桂枝麻黃加減諸方。如前軍無紀。致內亂蜂起。當重內輕外。因有五苓十棗陷胸瀉心抵當等湯也。邪入少陽地面。宜雜用表裏寒熱攻補之品。爲防禦解利之法。如偏僻小路。利于短兵。不利于矛戟。利于守備。不利於戰爭也。邪之輕者入脾理。重者入募原。尤重者入脾胃。小柴胡、腠理之劑也。大柴胡、募原之劑也。小建中、半夏瀉心、黃芩、黃連四湯。少陽脾劑也。柴胡加芒硝牡蠣二方。少陽胃劑也。如太陽少陽有合併病。是一軍犯太陽。一軍犯少陽矣。用柴胡桂子湯。是兩路分擊之師也。甚至三陽合病。是三面受敵矣。法在獨取陽明。陽明之地廣濟。則太少兩路之陽邪。不攻自解。但得內寇寧。而外患自息。此白虎之所由奏捷耳。若陽邪不戢于內地。用大承氣以急下之。是攻賊以護主。若陰邪直入於中宮。用四逆湯以急救其裏。是強主以逐寇也。陽明爲內地。陽明界上。卽太陽少陽地面。邪入陽明之界。近太陽地面。雖不犯太陽。太陽之師不得坐視而不救。故陽明之營衛病。卽假麻黃桂枝等方以汗之。邪近少陽地面。雖不入少陽。少陽之師不得高壘而無戰。故陽明之腠理病。卽借柴胡以解之。是知陽明之失守。非太陽之不固。卽少陽之無備。所以每每兩陽相合而爲病也。若邪已在陽明地面。必出師痛擊。以大逐其邪。不使少留。故用梔豉瓜蒂之吐法。以迅掃之。若深入內地。不可復驅。則當清野千里。使無所擄掠。是又白虎得力處也。若邪在內廷。又當清宮除盜。此三承氣所由取勝。如荷陳猪苓輩。又爲失紀之師立法矣。太陰亦內地。少陰亦內地。少陽少陰陽明。雖外通三陽。而陰陽既已殊途。心腹更有膈膜之藩蔽。故寒水之邪。從太陽外腑者輕。由少陰內受者重。風木之邪。自少陽來侵者微。因厥陰上襲者甚。如本經正邪轉屬陽明而爲實。猶師老勢窮。可下之而愈。如陽明實邪。轉屬本經而成虛。則邪盛正衰。溫補挽回。若甚難。蓋太陰陽明。地面雖分。並無阻隔。陽明猶受敵之通衢。甲兵所聚。四戰之地也。太陰猶倉廩重地。三軍所依。亦盜賊之巢穴也。故元氣有餘。則邪入陽明。元氣不支。則邪入太陰。在陽明地面。則陳師鞠旅。可背城借一。取勝須臾。在太陰地面。則焚舟積蓄。倉廩空虛。拷腹之士無能禦敵耳。厥陰之地。相火遊行之區也。其平氣則爲少火。若風寒燥濕之邪。一入其境。悉化爲熱。卽是壯火。其少火爲一身之生機。而壯火爲心腹之大患。且其地面通達三焦。邪犯上焦。則氣上撞心。心中疼熱。消渴口爛咽痛喉痺。逼入中焦。則手足厥冷。脈微欲絕。飢不欲食。食卽吐蚘。移禍下焦。則熱利下重。或便膿血。爲害非淺。猶破屋之師矣。仲景製烏梅丸方。寒熱並用。攻補兼施。通理氣血。調和三焦。爲平治厥陰之主方。總總皆內地之大師也。其與之水以治消渴。茯苓甘草湯以治水。炙甘草湯以復脈。當歸四逆以治厥。是閫出銳師。分頭以救上焦之心主。而安神明也。用白虎承氣瀉濟胃。而平中焦之熱實。白頭翁四逆散。清脾而止下焦之熱利。是分頭以救腹中之陰。而扶胃腧之元氣耳。胃爲一府。而分陰陽二經。少陰一經。而兼陰陽兩藏者。皆爲根本之地故也。邪有陰陽兩途。藏分陽陰二氣。如陽邪犯少陰之陽。卽身體骨節痛手足反發熱心煩欲渴咽痛。陽邪犯少陰之陰。則腹痛自利或便膿血。陰邪犯少陰之陽。則身體骨節痛手足逆冷背惡寒而身蜷臥。陰邪犯少陰之陰。則惡寒嘔吐下利清穀煩躁欲死。仲景製麻黃附子細辛。黃連阿膠。甘草桔梗。猪膚。半夏。苦酒等湯。緩陽邪犯少陰之陽也。其製桃花猪苓等湯。緩陽邪入少陰之陰也。附子。吳茱萸四逆等湯。緩陽邪犯少陰之陽也。通脈四逆茯苓四逆乾姜附子等湯。緩陰邪入少陰之陰也。少陰爲六經之根本。而外通太陽。內接陽明。故初得之而反發熱。與八九日而一身手足盡熱者。是少陰陽邪從及太陽地面也。自利純清水。心下痛口燥舌乾者。少陰陽邪陵陽明地面也。出太陽。則用麻黃附子甘草湯。以附子入陽明。則全任大承氣而不設緩制。猶兵家用鷁導。與用本部不同法也。其陰邪侵入太陰。則用理中四逆。加人尿猪胆等法。亦猶是矣。嗟乎不思仲景之所以安能見病知源也哉。

合併啓微第三

病有定體。故立六經而分司之。病有變遷。更求合病併病而互參之。此仲景立法之盡善也。夫陰陽互根。氣雖分而神自合。三陽之庭便是三陰。三陰之表則是三陽矣。如太陽病而脈反沈。便合少陰。少陰病而反發熱。便合太陽。陽明脈遲。卽合太陰。太陰脈緩。則合陽明。少陽細小。是合厥陰。厥陰微浮。是合少陽。雖無合併之名。而有合併之實。或陽得陰而解。陰得陽而解。或陽入陰而危。陰亡陽而逆。種種脈證不可枚舉。學者當於陰陽兩症中察病勢之合不合。更於三陽三陰中審其症之併不併。于以陰病治陽。陽病治陰。扶陽抑陰。瀉陽補陰等法。用之恰當矣。三陽皆有發熱症。三陰皆有下利症。如發熱而下利。是陰陽合病。太陽少陽合病。必自下利。用葛根黃芩等湯者是也。陰盛者屬陰經。則下利爲實熱。如太陽陽明合病。陽明少陽合病。太陽少陽合病。陰陽合病。陽盛者屬陽

風寒辨惑第四

風寒二氣有陰陽之分。又相因爲患。蓋風中無寒。卽是和風。一夾寒邪。中人而病。故得與傷寒相類。亦得以傷寒名之。所以四時皆有風寒。而多月爲重也。傷寒中風。各有重輕。不在命名。而在見症。太陽篇言中風脈症者二。一曰太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。一曰太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大靑龍湯主之。以二症相較。陽浮見寒之輕。浮緊見寒之重。汗出見寒之輕。不汗出見寒之重。嗇嗇淅淅見風寒之輕。翕翕發熱見寒之輕。身疼見風之重。自汗乾嘔見煩之輕。不汗煩躁見煩之重也。言傷寒脈症者二。一曰太陽病或未發熱。或已發熱。必惡寒體痛嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。一曰傷寒脈浮自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反以二症相較。微惡寒見必惡寒之重。體痛見脚攣急之輕。自汗出小便數心煩。見傷寒之輕。或未發熱。見發熱之輕。必先嘔逆。見傷寒之重。脈浮見寒之輕。陰陽俱緊見寒之重。中風傷寒。各有輕重如此。今人必以傷寒爲重。中風爲輕。但知分風寒之中傷。而不辨風寒之輕重。于是有傷寒見風中風見寒之遁辭矣。夫風爲陽邪。寒爲陰邪。雖皆因於時氣之咸。而各不失其陰陽之性。故傷寒輕者。全似中風。獨脚攣不是。蓋腰以上爲陽。而風傷於上也。中風重者。全似傷寒而煩躁不是。蓋寒邪氣欲解。躁煩是陽爲寒鬱而邪轉盛。故傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳。是指熱傳本經。不是傳陽明之經絡。陽明無所復傳。始雖惡寒。二日自止。是指寒傳本經。不是傳少陽之經絡。傷寒二三日。陽明少陽症不見者。爲不傳。皆指熱傳本經。不是二日傳陽明。三日傳少陽之謂。太陽病至七日以上自愈者。以行其經盡故也。言七日當來復之辰。太陽一經之病當盡。非日傳一經。七日復傳太陽之謂。若復傳則不當曰盡。若日傳一經。則不當曰行其經矣。若欲再作經。是太陽不能而併病陽明。使經不傳。是使陽明之經不傳太陽之熱。非再傳少陽之謂也。太陽與陽明少陽。地位相近。故太陽陽盛而不能。使轉屬陽明。陽已衰而不能。使轉繫少陽。若陽明則轉繫太陰。陽虛則轉入少陰。陽逆則轉入厥陰矣。陽明萬物所歸。故六經皆得轉屬而陽明無所復傳。是知陽明無轉屬少陽之症。陽明太陰俱屬于胃。胃實則太陰轉屬陽明。胃虛則陽明轉屬太陰矣。少陰與二陰地位相近。受太陰之寒則吐利清穀。受厥陰之熱則咽痛便血也。厥陰爲陰之盡。亦如陽明之無所復傳。然陰出之陽。則熱多厥少。陰極亡陽。則熱少厥多。此卽中風輕者煩輕。中風重者煩躁。傷寒重者躁煩。傷寒輕者微煩。微煩則惡寒亦微。是微陽足以勝微寒。故脈浮不緊矣。如本論所云。凡欲自解者。必當先煩。乃有汗而解。以脈浮不緊。故知汗出解也。若不待自解。而妄攻其表。所以亡陽。因陽微故耳。凡傷寒見煩。則寒氣欲解。躁煩是陽爲寒鬱而邪轉盛。故傷寒一日。若躁煩者。爲欲傳六七日躁煩者。爲陽去入陰也。因病人所禀之陽氣有不同。而受邪之部位。陰陽更不合之陽。其熱發於肌肉。故蒸蒸發熱。少陽爲半表半裏之陽。其熱發于膀胱。時開時閉。故往來寒熱。此三陽發熱之差別也。太陰爲主陰。無熱可發。因爲胃行津液。以灌四旁。故得主四肢。而熱發于手足。所以太陰傷寒。手足自温。太陰中風。四肢煩疼。斗少陰爲封蟄之本。若少陰不藏。則坎陽無蔽。故有始受風寒而脈沉發熱者。或始無表熱八九日來熱入膀胱。致一身手足盡熱者。厥陰當兩陰交盡。一陽之初生。其傷寒也。有從陰而先厥後熱者。從陽而先熱後厥者。或陽進而熱多厥少。或陽退而熱少厥多。或陰陽和而厥與熱相應者。是三陰發熱之差別也。太陽爲父。多陽盛之病。如初服桂枝而反煩解。半日許而復煩。下之而脈仍浮。氣上衝。與不汗出而煩躁。服藥微除。而煩躁發衄者。皆陽氣重故也。少陰爲雌。多亡陽之病。如下利清穀。手足厥逆。脈微欲絕。惡寒蜷臥。吐利汗出。裏寒外熱。不煩而躁。皆亡陽故也。又內經病形篇云。邪中于陰。則下太陽。中于面。則下陽明。中于頰。則下少陽。其中膺背兩脇。亦中其經。故本論太陽受邪。有中項中背之別。中項則頭項強痛。中背則背強几几也。陽明有中面中膚之別。中面則目痛鼻乾。中膚不可治。中風者寒可溫而風不可以熱治也。風爲陽邪。故中風者雖在少陰。每多陽症。傷寒爲陰邪。故傷寒者雖在太陽。每多陰症。太陽經多中風症。陽從陽也。少陰經多傷寒症。陰從陰也。夫風者善行而數變。故則曾中痙證也。少陽有中頰中脇之別。中頰則口苦咽乾。中脇則脇下痞硬也。此岐伯中陽溜經之義。又

云邪中于陰。從忤脂始。自經及藏。藏氣實而不能容。則邪還于府。故本論三陰皆有自利症。是寒邪還府也。三陰皆有可下症。是熱邪還府也。此岐伯中陰溜府之義。六經之部位有高下。故受邪之日有遠近。遠近適其至所。卽此義也。按本論傳字之義。各各不同。必牽強爲傳經。則謬。傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳。是指熱傳本經。不是傳陽明之經絡。陽明無所復傳。始雖惡寒。二日自止。是指寒傳本經。不是傳少陽之經絡。傷寒二三日。陽明少陽症不見者。爲不傳。皆指熱傳本經。不是二日傳陽明。三日傳少陽之謂。太陽病至七日以上自愈者。以行其經盡故也。言七日當來復之辰。太陽一經之病當盡。非日傳一經。七日復傳太陽之謂。若復傳則不當曰盡。若日傳一經。則不當曰行其經矣。若欲再作經。是太陽不能而併病陽明。使經不傳。是使陽明之經不傳太陽之熱。非再傳少陽之謂也。太陽與陽明少陽。地位相近。故太陽陽盛而不能。使轉屬陽明。陽已衰而不能。使轉繫少陽。若陽明則轉繫太陰。陽虛則轉入少陰。陽逆則轉入厥陰矣。陽明萬物所歸。故六經皆得轉屬而陽明無所復傳。是知陽明無轉屬少陽之症。陽明太陰俱屬于胃。胃實則太陰轉屬陽明。胃虛則陽明轉屬太陰矣。少陰與二陰地位相近。受太陰之寒則吐利清穀。受厥陰之熱則咽痛便血也。厥陰爲陰之盡。亦如陽明之無所復傳。然陰出之陽。則熱多厥少。陰極亡陽。則熱少厥多。此卽少陽往來寒熱之變局也。按本論云。太陽病發熱汗出惡風。脈緩者爲中風。又云太陽中風。脈浮緊不汗出而煩躁。又云陽明中風。脈弦浮大不得汗。合觀之。不得以無汗爲非中風矣。本論云太陽病或已發熱。必惡寒體痛嘔逆。脈陰陽俱緊者。名傷寒。而未嘗言無汗。又云太陽病頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。此不冠以傷寒。又不言惡寒。又云傷寒脈浮自汗出。微惡寒。合觀之又不得以有汗爲非傷寒矣。人但據桂枝條之中風自汗。而不究傷寒亦有自汗者。但據麻黃條之傷寒無汗。而不究中風亦有浮緩。中風脈浮緩。而不知傷寒亦有浮緊者。知三陽脈浮。三陰脈沉。而不知三陰皆有浮脈。三陽亦有沉脈者。總是據一條之說。不理會全書耳。當知麻黃湯大靑龍湯。治中風之重劑。桂枝湯葛根湯。治中風之輕劑。傷寒可通用之。非主治傷寒之劑也。世皆推桂枝爲中風主劑。而不敢以大靑龍湯爲中風之劑者。是惑於中風見寒。傷寒見風之謬。不敢以麻黃湯爲中風之劑者。是泥于有汗爲中風。無汗爲傷寒之謬也。風爲陽邪。四四日亦具四時之氣。氣運更有變復淫勝之不同。故有麻黃桂枝葛根。靑龍等法。當知四時俱有中風。傷寒不得拘泰傷于風多傷于寒之一說矣。太陽經多中風方。如麻黃桂枝葛根大靑龍湯是也。少陰經多傷寒方。如麻黃附子細辛、眞武、附子、茱萸、白通四逆、通脈等湯是也。中風諸方。可移治傷寒。傷寒諸方。可移治中風。中風者寒可溫而風不可以熱治也。風爲陽邪。故中風者雖在少陰。每多陽症。傷寒爲陰邪。故傷寒者雖在太陽。每多陰症。太陽經多中風症。陽從陽也。少陰經多傷寒症。陰從陰也。夫風者善行而數變。故

脈症皆不可拘自變者觀之其症或自汗鼻鳴或無汗而喘或不汗出而煩躁或下利嘔逆或渴欲飲水或往來寒熱或口苦咽乾或短氣腹滿鼻乾嗜臥或目赤耳聾胸滿而煩或四肢煩疼種種不同其脈或浮緩或浮緊或弦而浮大或陽微陰濇或陽微陰浮亦種種不同自不變者觀之惟浮是中風之主脈緊是中風之定症蓋風脈變態不常而浮爲眞體風症變幻多端而惡風其眞情也仲景廣設諸方以曲盡其變耳夫寒之傷人有三早晚霧露四時風雨冬春霜雪此天之寒氣也幽居暴室磚地石塔大江深澤遠谷高山地之寒氣也好飲寒泉寒食生冷酢嗜瓜菓誤服冷藥人之寒氣也此義最淺傷寒諸書莫之或及而以冬寒春溫時疫之三症拖之何不求致病之因而歸時令之變耶夫寒因爲冬氣三時豈必無寒第寒有輕重傷亦有輕重不拘定于冬溫固爲非氣而三時亦病溫且溫隨時而發者多因冬月傷寒所致者少不可謂必然之道也即冬時病濕亦因其人陰虛而發豈冬時之嫉氣即有毒以傷人乎若時行疫氣正天地溫熱之毒如涼風一起疫邪自散豈遇寒而反重耶疫與寒如風馬牛不相及何得以寒冠時行之疫若爲暴寒所折而病即是三時之傷寒勿得妄以疫名之矣謂三四月陽氣尚弱爲寒折而病也溫病症治散見六經請類推之如傷寒發熱不渴服湯已渴者是傷寒溫病之關也寒去而熱重七八月陽氣已盛爲寒折而病熱微此叔和之莫須有也夫病寒病熱當審其人陰陽之盛衰不得拘天氣之寒熱天氣之寒熱傷人必因其人陰陽之多少元氣之虛實爲輕重不全視時令之陰陽爲轉移也所以仲景製方全以平脈辨症爲急務不拘于受病之因不拘于發病之時爲施治如夏月盛暑而傷寒吐利多有用姜附吳萸而始効隆冬嚴寒而病溫多有用石羔硝黃而熱乃解者謂麻黃桂枝二湯只宜于冬月之正傷寒三時不可輕用其失豈不多乎夫開口言傷寒二字顧名思義耶寒傷于表法當溫散寒傷于裏法當溫補仲景治傷寒只有溫散溫補二法其清火涼解吐下等法正爲溫暑時疫而設所以治熱非以治寒治熱在于內非治寒傷于表也今傷寒家皆曰仲景治溫治暑必另有法治今遺失而無徵傷寒只有汗吐下三法將溫補正法置之不用反曰治傷寒無補法于是人傷于天地之寒者輕傷于醫師之法者重死于寒食之內傷者少死于寒藥之內傷者多耳

溫暑指歸第五

內經論傷寒而反發熱者有三義有當時即發熱者曰人傷于寒則爲病熱也有過時發熱者曰冬傷于寒春必病溫也有隨時易名者曰凡病傷寒而成溫者先夏至日爲病暑也夫病溫病暑當時即病者不必論論凡病傷寒而成者其病雖由于冬時之傷寒而根實種于其人之營火內經曰藏于精者春不病溫此明冬傷于寒春必病溫之源先夏至日爲病暑申明冬不藏精夏必病溫之故夫人傷于寒則爲病熱其恆耳此至春夏而陽氣足以禦之但知身着寒而不爲寒所病然裘寒雖不得內侵而虛陽亦不得外散仍下陷入陰中故身不知熱而亦不發熱所云陽病者上行極而下也冬時行收藏之令陽不遽發寒愈久則陽愈匿陽日盛則陰日虛若寒日少而蓄熱深則陰火應春氣而病溫若寒日多而蓄熱淺則陰火應夏

氣而病暑此陰消陽長從內而達于外也叔和不知此義謂寒毒藏于肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病夫寒傷于表得熱則散何以能藏設無熱以禦之必深入府藏何以只藏于肌膚且能藏者不能變何以時換而變其所藏乎不知原其人之自傷而但咎其時之外傷祇知傷寒之因不究熱傷之本妄擬寒毒之能變熱不知內陷之陽邪發見其本來之面目也又謂辛苦之人春夏多溫熱病者皆因冬時閉塞所致而非時行之氣不知辛苦之人勤搖筋骨凡動則爲陽往往觸寒即散或因飢寒而病者有之或因勞倦而發熱者有之故春夏之時辛苦之人因虛而感時行之氣者不少矣若夫春夏之溫熱由冬時觸寒所致者徧在飽煖淫慾之人不知持滿靜以入房以慾竭其精以耗散其眞陽陽虛不能統精失守而按之虛故遺禍至于春夏也內經論溫之脈症治法甚詳學者多不得要領仲景獨發熱而渴不惡寒者爲提綱悉溫病之底蘊合內經多不藏精之旨矣熱論以口燥舌乾而渴屬少陰少陰者對熱之本精之虛也少陰之表名曰太陽太陽根起于至陰名曰陰中之陽故太陽病當惡寒此發熱而不惡寒是陽中無陰矣而即見少陰之渴太陽之根本悉露矣于此見逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉孤陽無附而發爲溫病也溫病症治散見六經請類推之如傷寒發熱不渴服湯已渴者是傷寒溫病之關也寒去而熱罷即傷寒欲解症寒去而熱不解是溫病發見矣如服桂枝湯大汗出後大煩渴不解猶用白虎加人參預保元氣于清火之時是凡病傷寒而成溫者之正治法也因所傷之寒邪隨大汗而解所成之溫邪隨大汗而發焉得無虛設不加參則熱邪因白虎而解安保寒邪不因白虎而來乎是傷寒者當補治病必求其本耳如服柴胡已渴者屬陽明也以法治之夫柴胡湯有參甘苓浙皆生津之品服之即已反渴是微寒之劑不足以解溫邪少陽和火直走陽明也是當用白虎加人參法若柴胡加參之法非其治矣夫相火寄甲乙之間故肝膽爲發溫之源腸胃爲市故陽明爲成溫之藪陽明始雖惡寒二日自止即不惡寒而反惡熱此亦病傷寒而成溫之一徵也若夫溫熱不因傷寒而致者只須扶陰抑陽不必補中益氣矣且溫邪有淺深治法有輕重如陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之猪苓湯治溫在裏不得越身體發黃渴欲飲水小便不利者茵陳湯主之少陰病得之二三日口燥咽乾者大承氣湯急下之厥陰病下利欲飲水者白頭翁湯主之此仲景治溫之大略也夫溫與暑不藏精者此爲自傷其病重若再感方士之異氣此三氣相合而成溫疫也溫熱利害只在一人溫疫移害蔓延鄰里今人不分溫熱溫疫俱名溫病令人惑聞而譁言之因于醫之害豈淺炎炎哉又可溫疫論程郊倩熱病註俱有至理可傳恐不復贅餘義詳見方論

瘧濕異同第六

六氣爲病皆能發熱然寒與熱相因著與濕相繼獨燥與濕相反風寒溫暑皆因天氣而濕病多得之地氣燥病多得之內因此病因之殊同也內經病機十九條其分屬六氣者火居其八風寒濕各居其一燥症獨無著諸瘧項強皆屬于濕恐昏疑其爲屬燥今本論有瘧濕之分又曰太陽病發汗太多因致瘧則瘧之屬燥無疑也夫瘧以狀命名因血虛而筋急耳六氣爲患皆足以致瘧然不熱則不燥不燥則不成

痙。穴經皆有痙病。須審部位以別之。身之後者屬太陽。則凡頭項強急。項背几几。脊強反張。腰似折。脾不可以曲。腳如結。皆其症也。身之前者屬陽明。頭面動搖。口噤齒齲。缺盆絀痛。腳攣急。皆其症也。身之側屬少陽。口眼喎斜。手足牽引。兩脇拘急。手足不遂。皆其症也。若腹內拘急。因吐利而四肢拘急。是太陰痙。惡寒踡臥。尻以代踵。脊以代頭。俯而不能仰者。是少陰痙。帶丸上升。宗筋下注。少腹裏急。陰中拘攣。髓腔拘急者。厥陰痙也。若痙之挾風寒者。其症發熱。無汗而惡寒。氣上沖胸。而小便少。其脈必堅緊。其狀必強直。面口噤。此得之天氣。內經所云諸暴強直。皆屬于風者是也。其勢勁猛。故曰剛痙。病因外來。當逐邪而解外。痙有挾本邪而爲患者。其邪從內出。故發熱汗出而不惡寒。其脈沉遲。其狀則項強几几。此得之地氣。內經所云諸痙項強。皆屬於濕者是也。其勢柔弱。故名柔痙。病因于內。當滋陰以和內。要知屬風之痙。不因風而因熱。屬濕之痙。不因濕而因燥。治風若葛根。治濕若栝蔞根者。非以治風。實以生津。非以治濕。實以潤燥耳。夫痙之始也本非正病。必夾雜于他病之中。人之病此者。世醫悉指爲風。所以不明其理。誨醫者必于他症中審察而豫防之。如頭項強痛。即痙之一端。是太陽之血虛。故筋急也。今人但知風寒不惜津液。所以發汗太多。因致痙者多矣。夫痙本有由來。一經妄治。即奇形畢見。項背強几几。是痙之徵兆。故用葛根。身體強。是痙狀已著。故用栝蔞根。臥不著席。脚攣急。口噤齒齲。是痙之極甚。故用大黃芒硝。無非取多津多液之品。以滋養營血。不得與常汗嘗下者同例也。觀傷寒脈浮自汗心煩惡寒。而見脚攣急。是痙勢已成。便當滋陰存液。不得仍作傷寒主治。故與桂枝湯則厥。與芍藥甘草湯。其脚即伸。此明驗矣。第以表症未除。不得用承氣。若讝語者。少與調胃承氣。是又與不着席者。與大承氣同一機發也。凡痙之爲病。因外邪傷筋者少。因血虛筋急者多。如誤作風治。用辛散以助陽。則真陰愈虛。用燥劑以驅風。則血液愈涸。故痙得之暴起者少。妄治而致者多。虛而不補。不死何待。非參芪歸地調和營衛。未易平痙。而奏提也。內經曰諸濕腫滿。皆屬於脾。又曰濕勝則濡泄。此指濕傷于內者言也。又曰地之濕氣。感則害人皮肉筋骨。又曰因于濕。首如裹。此指濕傷于外者言也。若濕而兼熱。則大筋弛長而爲拘。小筋弛長而爲痿。即痙之變見矣。陽明篇有濕熱發黃之症。叔和不爲別論。獨取太陽之風濕相搏者。何遺數條。亦搜採之疎失也。內經曰身半以上者。風中之也。身半以下者。濕中之也。中陽則溜于經。中陰則溜于府。又曰陽受風氣。陰受濕氣。故傷于風者上先受之。傷于濕者下先受之。皆風濕對言。本論則風濕合言也。風濕相合。即陰陽相搏。上下內外交病矣。所以身體煩疼不能轉側。骨節疼痛不能屈伸。小便不利。大便反快也。內經曰風濕之傷人也。血氣與邪并客於分腠之間。其脈堅大。故曰實。濕之中人也。皮膚不收。肌肉墜緊。榮血澹衛氣去。故曰虛。此又以濕家虛實因風寒而分也。本論傷寒發汗。寒濕在裏不解。身目爲黃。與陽明之熱不得越。於熱在裏。身體發黃者。當下不當下。亦以寒濕濕熱分虛實矣。內經以風寒濕三氣合而名痹。本論又合風寒濕熱四氣而名濕痹。當知痹與痙皆由濕發。夫同一濕也。濕去燥極則爲痙。久留而著則爲痹。痹爲實。痙爲虛。痙痹異形。虛實亦殊。切不得妄以痙屬風。亦不得因于濕。竟視痙爲濕矣。痙濕餘義。詳內經註及本論註中。

平脈準繩第七

上古以三部九候決死生。是徧求法。以人迎寸口。趺陽辨吉凶。是扼要法。自難經獨取寸口之說行。人迎趺陽不參矣。氣口成寸。爲脈之大會。死生吉凶係焉。今所傳者只此耳。自有脈經以來。諸家繼起。各以脈名取勝。泛而不切。漫無指歸。夫在診法取其約。於脈名喜其繁。此仲景所云馳競浮華。不固根本者是也。仲景立法。只在脈之體用上推求。不在脈之名目上分疏。故以陰陽爲體。則以浮大動滑數爲陽之用。沉濇弱弦遲爲陰之用。以表裏爲體。則以浮爲表用。沉爲裏用。以藏府爲體。則以數爲府用。遲爲藏用。如以浮沉爲體。則以浮沉中各有遲數爲用。以浮爲體。則以大動滑數爲用之變。以沈爲體。則以濇弱弦遲爲用之變。以此得之地氣。內經所云諸痙項強。皆屬於濕者是也。其勢柔弱。故名柔痙。病因于內。當滋陰以和內。要知屬風之痙。不因風而因熱。屬濕之痙。不因濕而因燥。治風若葛根。治濕若栝蔞根者。非以治風。實以生津。非以治濕。實以潤燥耳。夫痙之始也本非正病。必夾雜于他病之中。人之病此者。世醫悉指爲風。所以不明其理。誨醫者必于他症中審察而豫防之。如頭項強痛。即痙之一端。是太陽之血虛。故筋急也。今人但知風寒不惜津液。所以發汗太多。因致痙者多矣。夫痙本有由來。一經妄治。即奇形畢見。項背強几几。是痙之徵兆。故用葛根。身體強。是痙狀已著。故用栝蔞根。臥不著席。脚攣急。口噤齒齲。是痙之極甚。故用大黃芒硝。無非取多津多液之品。以滋養營血。不得與常汗嘗下者同例也。觀傷寒脈浮自汗心煩惡寒。而見脚攣急。是痙勢已成。便當滋陰存液。不得仍作傷寒主治。故與桂枝湯則厥。與芍藥甘草湯。其脚即伸。此明驗矣。第以表症未除。不得用承氣。若讝語者。少與調胃承氣。是又與不着席者與大承氣同一機發也。凡痙之爲病。因外邪傷筋者少。因血虛筋急者多。如誤作風治。用辛散以助陽。則真陰愈虛。用燥劑以驅風。則血液愈涸。故痙得之暴起者少。妄治而致者多。虛而不補。不死何待。非參芪歸地調和營衛。未易平痙。而奏提也。內經曰諸濕腫滿。皆屬於脾。又曰地之濕氣。感則害人皮肉筋骨。又曰因于濕。首如裹。此指濕傷于內者言也。又曰地之濕氣。感則害人皮肉。如浮而弱。浮而濇。浮而弦。浮而遲者。此陽中有陰。其人陽虛。而陰脈伏于陽脈中也。將有亡陽之變。當以扶陽爲急務矣。如沉而大。沉而滑。沉而動。沉而數。此陰中有陽。其人陰虛。而陽邪下陷于陰脈中也。將有純陽必陽盛陰虛之病矣。此爲半表半裏。必陰盛陽虛之病矣。此爲半表半裏。未易平痙。而奏提如浮而弱。浮而濇。浮而弦。浮而遲者。此陽中有陰。其人陽虛。而陰脈伏于陽脈中也。將有亡陽之變。當以扶陽爲急務矣。如沉而大。沉而滑。沉而動。沉而數。此陰中有陽。其人陰虛。而陽邪下陷于陰脈中也。將有陰竭之患。當以存陰爲深慮矣。此爲側看法。如浮大動滑數之脈。體雖不變。然始爲有力之強陽。終爲無力之微陽。知陽將絕矣。沉濇弱弦遲之脈。雖喜變而爲陽。如忽見浮大動滑數之不長。餘燼之易滅也。是爲微底看法。更有其陰其陽之看法。如凡陰病見陽脈者生。陽病見陰脈者死。陽病見陰脈則死也。成註只據傷寒立言。觀凡字則知脈法不專爲傷寒設。亦不是接承上文。擴充之。見仲景活法矣。脈以胃氣爲本。玩名陽名陰。見此等脈狀。尚是陰陽之名。而非陰陽之實。因胃氣有虛。則陰陽偏重。較之平脈有餘名陽。不足名陰。耳此陽病兼外傷六氣言。陰病兼內傷精氣言。若專指傷寒之陰症陽症。則淺矣。陽脈指胃腧之真陽。內經所謂二十五陽者是也。陰病見陽脈。是胃氣來復。五藏神和之氣發見。故主生。內經所云。別于陽者。知病起時也。陰脈指五藏之真陰。因胃腧之陽不至。于手太陰。五藏之真陰來見也。陽病見陰脈。是脈無胃氣。故主死。內經所云。別于陰者知死生之期也。要知沉濇弱弦遲。是病脈不是死脈。其見于陽病最多。陽病浮大動滑數之脈。多陰極假陽。未必即可生。

之機也。若藏厥脈至。如肝脈之中外急。心脈堅而搏。肺脈大而浮。腎脈如彈石。脾脈如屋漏。皆反見有餘之象。豈可以陽脈名之。經曰邪氣來也。緊而疾。穀氣來也。徐而和。則又不得以遲數論陰陽矣。仲景表裏藏府之法。則又以浮沉遲數爲大綱。浮沉是審起伏。遲數是察至數。浮沉之間。遲數寓焉。凡脈之不浮不沉而在中。不遲不數而五至者。謂之平脈。是有胃氣。可以神求。不可以象求也。若一見浮沉遲數之象。斯爲病脈。浮沉遲數。本不可以表裏藏府分。今既有陰陽之可名。即以陽表陰裏。府陽藏陰。定其爲陰陽所在耳。試觀脈之浮爲在表。應病亦爲在表。然浮亦有裏症。或表邪初陷。或裏邪欲出。究竟不離于表。故主表其大綱也。沉爲在裏。應病亦在裏。沉脈亦有表症。或陽病見陰而危。或陰出之陽而愈。究竟病根于裏。故主裏其大綱也。數爲陽。陽主熱。而數有浮沉。浮數應表熱。沉數應裏熱。雖數脈多有病在藏者。然其由必自府。蓋六府爲陽。陽脈繫其府。故主府其大綱也。遲爲陰。陰主寒。而遲有浮沉。浮遲應表寒。沉遲應裏寒。雖遲脈多有病在府者。然其根必自藏。蓋五藏爲陰。陰脈繫其藏。故主藏其大綱也。脈狀種種。總該括于浮沉遲數。然四者之中。又以獨浮獨沉。獨遲獨數爲準。則而獨見何部。即以其部定表裏藏府之所在。病無遁情矣。然陰陽之十脈。表裏藏府之四診。皆指脈之體用而言。而診法之體用。則又以病爲體而脈爲用矣。請以浮脈言之。其他可類推。如脈浮者病在表。則必有發熱惡寒之表症。然浮有不同。有但浮者。其三部皆同。息數無遲數。其氣象亦無沿濡動弦大小。此太陽之脈體然也。因風寒在表而巨陽之陽獨之。內無太過不及之病。故見此象。此病脈中之平脈。故可用麻黃湯發汗而頓解。然此脈不可多得。所以發熱即有發熱之脈象。惡寒即有惡寒之脈象。如寸口脈浮而緊。是浮爲風象。緊爲寒象也。此爲陽中有陰。乃陽脈之變見矣。然寒不協風。則元府不開。寒在皮毛。精氣足以衛外而爲固。雖受寒而不傷。寒去而身自和矣。若風不夾寒。但能鼓動衛氣。使元府不閉。皮膚受邪。肺氣不清而已。不能深入于營。而發熱惡寒頭項骨節俱痛。惟風夾寒邪。其勢始猛。此風則傷衛。寒則傷營。初非有二義也。衛氣不能衛外。反內擾營氣而爲煩。營氣不得交通內迫于骨節而作痛。營衛俱病。發熱所由來耳。如脈浮而數。爲陽中見陽。是陽脈之正局。然不得即認爲陽脈有餘。實因陽氣不足。反見有餘之象也。夫脈爲血府。實由氣行。長則氣治。短則氣病。弦脈象長。數脈象短。脈數因于氣之不足。則數爲虛。虛寒相搏于營衛。衛氣不足以禦之。此惡寒所由來也。上條陽中有陰。而反微其發熱。此條陽中見陽。而反微其惡寒。是互文以見意。此二條皆常發汗而與但浮者不同。故又云脈浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲。不可發汗。以營氣不足。血少故也。可知用麻黃湯專治寒傷營者。背仲景法矣。又云脈浮數者。法當汗出而愈。若尺中脈微。此裏虛不可發汗。則又見脈浮數者。不得竟用麻黃湯。又云傷寒解半日許復煩。脈浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。則所云須表裏實。津液自和。便自汗出愈者。爲猒稀熱粥示法耳。夫人之尺脈。如樹之有根。不拘浮數浮緊。皆據尺脈以審虛實。此又仲景自作浮。在表之註疏矣。十脈中無緊脈。即弦之轉旋。當知按之不移。是靜爲陰之體。轉索無常。是動爲陽之用。故浮中見緊者。係在中風。與傷寒之陰陽俱緊者殊矣。緊又與數相似。緊見于法象。數見于至數。然緊以氣來之長。反

得爲陰中有陽之實脈。數以氣來之短。反得爲陽中有陰之虛脈也。若脈浮而大。是陽中見陽。此兩陽合明之脈。然脈浮不遲大。必至三日乃大。是陽明內熱外見之脈。此浮不得仍爲在表。當知大爲病進。故見心下反鞕。即攻之不令發汗耳。若脈浮而遲。面熱赤而戰慄者。是陽中見陰。故面見假熱。通身見眞寒。此因遲爲在藏。故無陽不能作汗。而浮爲在表。則又當用滑形爲汗之法矣。遲因浮而從表。浮因大而從裏。浮兼數而反虛。緊入浮而成實。則表理藏府陰陽虛實之間。悉屬定不定法也。餘義見六經病解。

傷寒論翼卷下

太陽病解第一

仲景六經各有提綱一條。猶大將立旗鼓。使人知有所向。故必擇本經至當之脈症而標之。讀書者須緊記提綱。以審病之所在。然提綱可見者祇是正面。讀者又要看出底板。再細玩其四旁。參透其隱曲。則良法美意始得了然。如太陽總綱。提出脈浮。頭項強痛。惡寒八字。是太陽受病之正面。讀者要知三陽之脈俱浮。三陽俱有頭痛症。六經受寒。俱各惡寒。惟頭項強痛。是太陽所獨也。故見頭連項強痛。如是太陽受病。蓋太陽爲諸陽主氣。頭爲諸陽之會。項爲太陽之會。故也。如脈浮惡寒發熱。而頭不痛。項不強。便知非太陽病。如但頭痛不及於項。亦非太陽定局矣。如頭項強痛。反不惡寒。脈反沉。不可謂非太陽病。或溫邪內發。或吐後內煩。或濕流關節。或病關少陰。法當救裏者也。因當浮不浮。當惡不惡。故訓之反所謂看出底板法者。以此。前篇以一日太陽二日陽明七日復傳之說拘之。故至今不識仲景所稱之太陽病。太陽病有身疼身重。腰痛。骨節疼痛。鼻鳴。乾嘔。嘔逆。煩躁。胷滿。背強。咳。渴。汗出。惡風。無汗而喘等症。仲景以其或然或否。不可拘定。故散見諸節。而不入提綱。又太陽爲巨陽。陽病必發熱。提綱亦不言及者。以初受病者或未發故也。其精細如此。故診者於頭項強痛之時。必須理會此等兼症。更細審其惡風惡寒之病情。有汗無汗之病機。已發熱未發熱之病勢。以探其表症之虛實。是從旁細看法也。即於此處辨其有

汗是桂枝症。無汗是麻黃症。無汗煩躁是大青龍症。乾嘔發熱而咳是小青龍症。項背強几几是葛根症。用之恰當。效如桴鼓。前混以桂枝主風傷衛。麻黃主寒傷營。大青龍主傷寒見風中風見寒。分三綱鼎立之說以拘之。所以埋沒仲景心法。又敗壞仲景正法。

脈浮只論得脈體之正面。診者當於浮中審其脈勢之強弱。脈息之遲數。脈氣之緊緩。脈象之滑澁弦芤。故太陽一經。有但浮、浮弱、浮緩、浮緊、浮遲、浮數、散見於諸條。或陽浮而陰弱。或陰陽俱緊。或陰陽俱浮。或尺中遲。或尺中脈微。或寸緩關浮尺弱。必細細體認。以消息其裏之虛實。此是仲景索隱法。若謂脈緊是傷寒。脈緩是中風。脈緊有汗是中風見寒。脈緩無汗是傷寒見風。夫既有傷寒中風之別。更有傷寒中風之渾。使人無下手處矣。豈可爲法乎。凡見脈浮遲浮弱者。用桂枝。浮緊浮數者用麻黃。不必於風寒之分。但從脈之虛實而施治。是仲景活法。亦是仲景定法。

今傷寒皆以膀胱爲太陽。故有傳是不傳手之謬。不知仲景書只宗陰陽大法。不拘陰陽之經絡也。夫陽後人妄謂仲景方治表而不及裏。曷不於藥性一思之。

太陽主表。爲心君之藩籬。猶京師之有邊關也。風寒初感。先入太陽之界。惟以得汗爲急務。自汗面解。猶外表裏兩解之劑矣。如大青龍用石膏以治煩躁。小青龍用五味乾姜以除咳嗽。皆於表劑中即兼治裏。

陰散之可手。推之可萬。心爲陽中之太陽。故更稱巨陽以尊之。又中身而上名曰廣明。太陰之前名曰陽明。廣明亦君主之尊稱。廣明居陽明之上。故六經分位。首太陽。次陽明。又腰以上爲陽。膀胱位列下焦之極底。其經名爲足太陽。以手足陰陽論。實陰中之少陽耳。以六腑爲陽論。與小腸之太陽同爲受盛器耳。不得混膈膜之上爲父之太陽也。仲景以心爲太陽。故得外統一身之氣血。內行五藏六府之經隧。若膀胱爲州都之官。所藏精液。必待上焦之氣化。而後能出。何能外司營衛。而爲諸陽主氣哉。岐伯曰。聖人南面而立。前曰廣明。後曰太衝。太衝之地。名曰少陰。是心腎爲一身之大表裏也。膀胱與腎爲表裏。第足經相絡之一義耳。且表裏亦何常之有。如太陽與少陽俳病。刺肺俞肝俞。豈非肝居膀外。爲少陽之表。肺居心外。爲太陽之表耶。少陰病一身手足盡熱。以熱在膀胱。必便血。夫在膀胱而仍稱少陰病。是知膀胱屬腰以下之陰。得爲少陰之府。不得爲六經之太陽。故不稱太陽病。又太陽不解。熱結膀胱。其人如狂。以太陽隨經。瘀熱在裏。熱在下焦。下血乃愈。蓋太陽位最高。故太陽病以頭項強痛爲提綱。此云熱結在下焦。是太陽膀胱之根底。而非主表之太陽。爲大青龍。汗在胸中。是解散內擾之陽氣。小青龍汗在心下。是驅逐內蓄之水氣。其治水有三法。乾嘔而咳。水入即吐。是水氣在上焦。在上者汗而發之。小青龍五苓散是也。心下痞鞕。鞕滿而痛。是水氣在中焦。中滿者瀉之於內。用十棗湯大陷胸是也。熱入膀胱。小便不利。是水氣在下焦。在下者引而竭之。桂枝去桂加茯苓朮是也。

太陽之根即是少陰。緊則爲寒。本少陰脈。太陽病而脈緊者。必無汗。此雖太陽能衛外而爲固。合汗不出。亦賴少陰能藏精而爲守。故不得有汗也。人但知其爲表實。而不知其裏亦實。故可用麻黃湯。而無患。若脈陰陽俱緊而反汗出者。是陽不固而陰不守。雖解亡陽。而陰不獨存。曰此屬少陰者。是指太陽轉屬少陰。而非少陰本病。

太陽陽虛不能主外。內傷其陰之氣。便露出少陰之底板。少陰陰虛不能主內。外傷太陽之氣。便假借太陽之面目。所以太陽病而脈反沉。用四逆以急救其裏。少陰病而表反熱。用麻辛以微解其表。此表裏雖相應之機也。

經始。且大腸接胃。俱稱陽明。小腸通膀胱。俱稱太陽。傷則俱傷。何分手足。如大便鞕是大腸病。豈專主胃。而不涉離中之陽耶。

傷寒一日太陽受之。即見煩躁。是陽氣外發之機。六七日乃陰陽自和之際。反見躁煩。是陽邪內陷之兆。所云陽去入陰者。指陽邪下陷言。非專指陰經也。或入太陽之府而熱結膀胱。或入陽明之府而胃中乾燥。或入少陽之府而脅下痞滿。或入太陰而暴煩下利。或入少陰而口舌乾燥。或入厥陰而心中疼熱。皆入陰之謂。後人惑於傳經之謬。因不知有入陰轉屬等義也。

陽明病解第二

按陽明提綱以裏證爲主。雖有表症。仲景意不在表。爲有諸中而形諸外也。或兼經病。仲景意不在經。爲標在經而根於胃也。太陰陽明同處中州。而太陰爲開。陽明爲闔。故陽明必以闔病爲主。不大便固闔也。不小便亦闔也。不能食食難用飽。初欲食反不能食。皆闔也。種種闔病。或然或否。故提綱獨以胃實爲主。胃實不覺指燥糞堅難。只對下利言。下利是胃家不實矣。故汗出解後。胃中不和而下利者。不稱陽明病。如胃中虛而不下利者。便屬陽明。即初轉後溏。水穀不別。雖死而不下利者。總爲陽明病也。蓋陽明太陰同爲倉廩之官。而所司各別。胃司納。故以陽明主實。脾司輸。故以太陰主利。同一胃府。而分治如此。是二經所由分也。按陽明爲傳化之府。當更實更虛。食入胃實而腸虛。食下腸實而胃虛。若但實不虛。斯爲陽明病根矣。胃實不是陽明病。而陽明之爲病。悉從胃實上得來。故以胃家實爲陽明一經總綱也。然致實之由。最宜詳審。有實於未病之先者。有實於病之後者。有風寒外束熱不得越而實者。有妄汗吐下重亡津液而實者。此只舉其病根在實。而勿得以胃實即爲可下之症。

身熱汗自出。不惡寒。反惡熱。是陽明表症之提綱。故胃中虛冷。亦得稱陽明病。因其表症如此也。然此爲內熱發外之表。非中風傷寒之表。此時表寒已散。故不惡寒。裏熱閉結。故反惡熱。只因有胃家實之病根。即見此身熱汗自出之外症。不惡寒反惡熱之病情。然此但言病機發見。非即可下之症也。必讀語、潮熱、煩躁、脹痛、諸症兼見。纔可下耳。

太陽總綱示人以正面。與太陽之表同。又當看出陽明之表與太陽不同矣。如陽明病脈遲。汗出多。微惡寒者。是陽明之桂枝症。陽明病脈浮無汗而喘者。是陽明之麻黃症。本論云病得之一日。不發熱而惡寒者。即此是也。後人見太陽已得此脈症。便逆陽明不應有此脈症。故有身重此處當指梔子豉湯主之句。若發汗三段。因不用此方而妄治所致。仍當梔子豉湯主之。仲景但於結句一見。是省文法也。後人竟認梔豉湯爲汗下後救逆之劑。請問未汗下前。仲景何法以治之乎。要知陽明頭痛。又與太陽迥別矣。本論云陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。鼻乾不得臥。是名曰瘧。瘧者必寒熱。此頭痛身熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時。而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。則陽明頭痛。又與太陽迥別矣。本論云陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。鼻乾不得臥。是名曰瘧。瘧者必寒熱。此頭痛身熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時。而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。

今傷寒書以頭痛分三陽。陽明之痛在額裏。固然也。然陽明主裏。頭痛非其本症。內經曰傷寒一日巨陽受之。以其脈連風府。故頭項痛。七日太陽病裏頭痛少愈也。二日陽明受之。其脈夾鼻絡於目。故身熱目疼。鼻乾不得臥。是內經以頭痛屬太陽不屬陽明矣。仲景有陽明頭痛症二條。一曰陽明病反無汗。而小便利。二三日嘔而咳。手足厥者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。頭不痛。此頭痛在二三日而不在得病之一日。且因於嘔欬而不因於外邪也。一曰傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。則陽明頭痛。又與太陽迥別矣。本論云陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。鼻乾不得臥。是名曰瘧。瘧者必寒熱。此頭痛身熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。

汗而喘者。是也。內熱之表。在一二日後。其症身熱汗自出。不惡寒反惡熱。是也。表因風寒外束。故仲景亦用麻桂二湯汗之。表因內熱外發。故仲景更製梔子豉湯。因其勢而吐之。後人認不出陽明表症。一二日既不敢用麻桂。二三日來又不知用梔豉湯。不識仲景治陽明之初法。所以廢棄仲景之吐法。必待熱深實極。以白虎承氣投之。是養虎遺患也。

六經傷寒。惟陽明最輕者。以陽明爲水穀之海。穀氣足以勝邪氣。陽明居兩陽合明之地。陽氣足以禦陰氣也。陽明受邪一日。惡寒與太陽同。二日便不惡寒反惡熱。故內經曰二日陽明受之。以陽明之症在二日見。非謂陽明之病在太陽交也。仲景曰傷寒三日陽明脈大。要知陽明傷寒在一日二日即寒去而熱生。三日見陽明之大脈。則全無寒氣。便是陽明之病熱。而非復前日之傷寒。始雖由於傷寒。今不得再稱傷寒。以傷寒之劑治之矣。

陽明之惡寒二日自止。固與他經不同。其惡寒微。又不若太陽之甚。陽明在肌肉中。蒸蒸發熱。但熱無寒。與太陽翕翕發熱。寒束於皮毛之上者不同。陽明自汗。太陽雖自汗而出之不利。有執持之意。故其狀曰發潮。陽明自汗多。有涉漏搖動之狀。故名曰濈濈。太陽之脈浮而緊者。熱必不解。陽明病脈浮而緊者。必潮熱。太陽脈但浮者。必無汗。陽明脈但浮者。必盜汗出。二經表症表脈不同如此。

今傷寒書以頭痛分三陽。陽明之痛在額裏。固然也。然陽明主裏。頭痛非其本症。內經曰傷寒一日巨陽受之。以其脈連風府。故頭項痛。七日太陽病裏頭痛少愈也。二日陽明受之。其脈夾鼻絡於目。故身熱目疼。鼻乾不得臥。是內經以頭痛屬太陽不屬陽明矣。仲景有陽明頭痛症二條。一曰陽明病反無汗。而小便利。二三日嘔而咳。手足厥者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。頭不痛。此頭痛在二三日而不在得病之一日。且因於嘔欬而不因於外邪也。一曰傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時。而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。則陽明頭痛。又與太陽迥別矣。本論云陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。鼻乾不得臥。是名曰瘧。瘧者必寒熱。此頭痛身熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。

汗而喘者。是也。內熱之表。在一二日後。其症身熱汗自出。不惡寒反惡熱。是也。表因風寒外束。故仲景亦用麻桂二湯汗之。表因內熱外發。故仲景更製梔子豉湯。因其勢而吐之。後人認不出陽明表症。一二日既不敢用麻桂。二三日來又不知用梔豉湯。不識仲景治陽明之初法。所以廢棄仲景之吐法。必待熱深實極。以白虎承氣投之。是養虎遺患也。

六經傷寒。惟陽明最輕者。以陽明爲水穀之海。穀氣足以勝邪氣。陽明居兩陽合明之地。陽氣足以禦陰氣也。陽明受邪一日。惡寒與太陽同。二日便不惡寒反惡熱。故內經曰二日陽明受之。以陽明之症在二日見。非謂陽明之病在太陽交也。仲景曰傷寒三日陽明脈大。要知陽明傷寒在一日二日即寒去而熱生。三日見陽明之大脈。則全無寒氣。便是陽明之病熱。而非復前日之傷寒。始雖由於傷寒。今不得再稱傷寒。以傷寒之劑治之矣。

陽明之惡寒二日自止。固與他經不同。其惡寒微。又不若太陽之甚。陽明在肌肉中。蒸蒸發熱。但熱無寒。與太陽翕翕發熱。寒束於皮毛之上者不同。陽明自汗。太陽雖自汗而出之不利。有執持之意。故其狀曰發潮。陽明自汗多。有涉漏搖動之狀。故名曰濈濈。太陽之脈浮而緊者。熱必不解。陽明病脈浮而緊者。必潮熱。太陽脈但浮者。必無汗。陽明脈但浮者。必盜汗出。二經表症表脈不同如此。

今傷寒書以頭痛分三陽。陽明之痛在額裏。固然也。然陽明主裏。頭痛非其本症。內經曰傷寒一日巨陽受之。以其脈連風府。故頭項痛。七日太陽病裏頭痛少愈也。二日陽明受之。其脈夾鼻絡於目。故身熱目疼。鼻乾不得臥。是內經以頭痛屬太陽不屬陽明矣。仲景有陽明頭痛症二條。一曰陽明病反無汗。而小便利。二三日嘔而咳。手足厥者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。頭不痛。此頭痛在二三日而不在得病之一日。且因於嘔欬而不因於外邪也。一曰傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。則陽明頭痛。又與太陽迥別矣。本論云陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。鼻乾不得臥。是名曰瘧。瘧者必寒熱。此頭痛身熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時而因於不大便。即內經所云膕腨而頭痛。非因於風寒也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛症。

汗而喘者。是也。內熱之表。在一二日後。其症身熱汗自出。不惡寒反惡熱。是也。表因風寒外束。故仲景亦用麻桂二湯汗之。表因內熱外發。故仲景更製梔子豉湯。因其勢而吐之。後人認不出陽明表症。一二日既不敢用麻桂。二三日來又不知用梔豉湯。不識仲景治陽明之初法。所以廢棄仲景之吐法。必待熱深實極。以白虎承氣投之。是養虎遺患也。

六經傷寒。惟陽明最輕者。以陽明爲水穀之海。穀氣足以勝邪氣。陽明居兩陽合明之地。陽氣足以禦陰氣也。陽明受邪一日。惡寒與太陽同。二日便不惡寒反惡熱。故內經曰二日陽明受之。以陽明之症在二日見。非謂陽明之病在太陽交也。仲景曰傷寒三日陽明脈大。要知陽明傷寒在一日二日即寒去而熱生。三日見陽明之大脈。則全無寒氣。便是陽明之病熱。而非復前日之傷寒。始雖由於傷寒。今不得再稱傷寒。以傷寒之劑治之矣。

陽明之惡寒二日自止。固與他經不同。其惡寒微。又不若太陽之甚。陽明在肌肉中。蒸蒸發熱。但熱無寒。與太陽翕翕發熱。寒束於皮毛之上者不同。陽明自汗。太陽雖自汗而出之不利。有執持之意。故其狀曰發潮。陽明自汗多。有涉漏搖動之狀。故名曰濈濈。太陽之脈浮而緊者。熱必不解。陽明病脈浮而緊者。必潮熱。太陽脈但浮者。必無汗。陽明脈但浮者。必盜汗出。二經表症表脈不同如此。

治陽明內熱之表有三法。如熱在上焦者用梔子豉湯吐之。上焦得通。津液得下。胃家不實矣。熱在中焦者。用白虎湯清之。胃火得清。胃不實矣。熱陷下焦者用猪苓湯利之。火從下洩。胃家不實矣。要知陽明之治表熱。卽是豫治其裏。三方皆是潤劑。所以存津液。而不令胃家實也。後人因循升麻葛根之謬。竟不察仲景治陽明表症之法。

太陽以心胸爲裏。故用辛甘發散之劑。助心胸之陽而開玄府之表。不得用苦寒之劑。以傷上焦之陽也。所以宜汗而不宜吐。陽明以心胸爲表。當用酸苦湧泄之劑。引胃脘之陽而開胸中之表。不得用溫散之劑以傷中宮之津液也。故法當吐而不當汗。陽明當吐而反行汗下溫鍼等法。以致心中憒憒恍惚。煩躁詀語舌胎等症。然不離陽明之表。太陽當汗而反吐。便見自汗出不惡寒。飢不能食。嚼食暮吐。不欲近衣。欲食冷食等症。此爲太陽傳屬陽明之表。皆是梔子豉症。蓋陽明以胃實爲裏。不特發熱惡熱汗出。身重目疼。鼻乾。悶之表。一切虛煩虛熱。如口苦咽乾舌胎。喘滿不得臥。消渴而小便不利。凡在胃之外者。悉屬陽明之表。但除胃口之熱。使解胃家之實。此梔子豉湯爲陽明解表和裏之聖劑也。

按傷寒脈浮自汗出微惡寒。是陽明表症。心煩小便數。腳攣急。是陽明裏之表症。斯時用梔豉湯吐之。則胃陽得升。惡寒自能。心煩得止。汗自不出矣。上焦得通。津液得下。小便自利。其腳自伸矣。反用桂枝發表。所以亡陽。其咽中乾煩躁吐逆。是梔子生薑豉湯症。祇以亡陽而厥急。當回陽。故改用甘草乾薑陽復後。仍作芍藥甘草以和陰。少與調胃承氣以和裏。皆因先時失用梔豉。如此挽回費力耳。

按仲景云病如桂枝症。則便不得鑒定爲太陽中風。凡惡風惡寒發熱而汗自出者。無論太陽陽明。中風傷寒。皆是桂枝症矣。太陽病頭項強痛。而此云頭不痛。項不強。便非太陽症。內經曰邪中於膂。則入陽明。此云胸中痞。氣上衝咽喉。不得息。是陽明受病無疑也。雖外症象桂枝。而病在胸中。不在營衛。便不是桂枝症。故立瓜蒂散。所謂在上者因而越之也。此與前條本陽明病。仲景不冠以陽明者。以不關於胃實。而未見不惡寒之病情耳。

上越中清下奪。是治陽明三大法。發汗。利小便。是陽明經兩大禁。然於風寒初入陽明之表。卽用麻黃桂枝發汗者。是急於除熱而存津液。與急下之法同。若脈浮煩渴小便不利。用猪苓湯利小便者。亦以清火而存津液。而又曰汗多者不可與猪苓湯。要知發汗利小便。是治陽明權巧法門。非正治法。

陽明之病在熱實。宜無溫補法矣。而食穀欲嘔者。是胃口虛塞。故不主內熱也。然胃口雖虛。胃中猶實。仍不失爲陽明病。與吳茱萸湯散胃口之寒。上焦得通。津液得下。胃氣因和。則溫補又陽明之從治法。若胃口虛熱者。卽白虎加參。是陽明又有涼補法也。此二義又是治陽明權巧法門。

本論云傷寒三日三陽爲盡。三陰當受邪。其人反能食不嘔。此爲三陰不受矣。蓋陽明爲三陰之表。故三陰皆看陽明之轉旋。三陰之不受邪者。緣胃爲之敵其外也。胃氣和則能食不嘔。故邪自解。而三陰不病。胃陽虛。邪始得入三陰。故太陰受邪。腹滿而吐。食不下。少陰受邪。欲吐不吐。厥陰受邪。飢不欲食。食卽吐蚘。若胃陽亡。則水漿不入。而死。要知三陰受邪。關係不在太陽少陽。而全在陽明。

少陽病解第三

少陽處半表半裏。司三焦相火之遊行。仲景特揭口苦咽乾目眩爲提綱。是取病機立法矣。夫口咽目三者。皆藏府精氣之總竅。與天地之氣相通者也。不可謂之表。又不可謂之裏。是表之入裏。裏之出表處。正所謂半表半裏也。三者能開能闔。闔開之可見。闔之不見。恰合爲樞之象。苦乾眩者。皆相火上走空竅而爲病。風寒雜症咸有之。所以爲少陽一經總綱也。如目赤兩耳無聞。胸滿而煩。只舉得熱症中之半表半裏。故提綱不與焉。

少陽之表有二。脈弦細頭痛發熱。或嘔而發熱者。少陽傷寒也。耳聾目赤。胸滿而煩者。少陽風寒之表。既不得用麻黃桂枝之發汗。亦不得用瓜蒂梔豉之吐。若發汗則譫語。吐下則悸而驚。是少陽之和解。不特在半表而始宜也。少陽初感風寒惡寒發熱。與太陽同。不得爲半表。惟寒熱不齊。各相迴避。一往一來。勢若兩分。始得謂之半表。耳聾熱往來有三義。少陽自受寒邪。陽氣尙少。不能發熱。至五六日變熱內發。始得與寒氣相爭。而往來寒熱。一也。或太陽傷寒過五六日。陽氣已衰。餘邪未盡。轉屬少陽。而往來寒熱。二也。若風爲陽邪。少陽爲風藏。一中於風。便往來寒熱。不必五六日而始見。三也。太陽之身寒。在未發熱時。如已發熱。雖惡寒而身不再寒。陽明之身寒。惡寒。祇在初得之一日至二日。則惡寒自能。便發熱而反惡熱。惟少陽之寒熱有往而復來之義。寒來時便身寒惡寒。而不惡熱。熱來時。便身熱惡熱。而不惡寒。與太陽之如瘧。發熱惡寒而不惡熱。陽明之如瘧。潮熱惡熱而不惡寒者。不侔也。蓋少陽爲樞陽。如日初出。寒留於半表者。不遽散。熱出於半裏者。未卽舒。故見此象耳。然寒爲欲去之寒。而熱爲新感之熱。寒固爲虛寒。而熱亦非實熱。故小柴胡湯只治熱而不治寒。與補其虛而不攻其實也。

小柴胡爲半表設。而其症皆屬於裏。蓋表症旣去其半。則病機偏於向裏矣。惟往來寒熱一症。尙爲表邪未去。故獨以柴胡一味主之。其他悉屬裏症藥。凡裏症屬陽者多實熱。屬陰者多虛寒。而少陽爲半裏。偏于陽偏于熱。雖有虛有實。不盡屬於虛也。仲景又深以裏虛爲虛。故于半表未解時。便用人參以固裏。寒熱往來。病情見於外。若喜不欲。情得得于內。看若喜欲若字。非眞嘔。眞滿。不能飮食也。看往來二字。卽見有不寒熱時。寒熱往來。胸脇苦滿。是無形之表。心煩喜嘔。默默不欲飮食。是無形之裏。其或胸中煩而不嘔。或渴或腹中痛。或脇下痞鞕。或心下悸。小便不利。或咳者。此七症皆偏于裏。惟微熱爲在表。皆屬無形。惟脇下痞鞕爲有形。皆風寒遁症。惟脇下痞鞕爲少陽。總是氣分爲病。非有實熱可據。故皆從半表半裏之治法。

少陽爲遊部。其氣遊行三焦。循兩脇。轆轆理。是先天眞元之氣。所以謂之正氣。正氣虛不足以固勝理。邪

因膀理之開得入少陽之部少陽主膽爲中正之官正氣雖虛不容邪氣內犯必與之相搏搏而不勝所以邪結脇下也往來寒熱即正邪相爭之象更實更虛所以休作有時邪實正盛所以默默不欲飲食仲景于裘症不用人參此因正邪分爭正不勝邪故用之扶元氣元氣強主以逐蕩也若外有微熱而不往來寒熱是風塞之裘未解不可謂之半表當小發汗故去人參加桂心煩與嘔雖逆氣有餘而正氣未虛不可益氣故去人參如太陽汗後身痛而脈沈遲與下後協熱利而心下鞕是太陽之半表裏症也表雖不解裏氣已虛故參桂兼用是知仲景用參皆是隨保元氣耳

更有脈症不合柴胡者仍是柴胡症本論云傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脈結者此爲陽微結半在裏半在表也脈雖沈緊不得爲少陰病者陰不得有汗今頭汗出故可與小柴胡湯此條是少陽陽明併病而脈症俱是少陰五六日又少陰發病之期若謂陰不得有汗則少陰亡陽亦有反汗出者然亡陽與陰結其別在大便亡陽則咽痛吐利陰結則不能食而大便反鞕也亡陽陽結其別在汗亡陽者衛氣不固汗出必偏身陽結者熱邪鬱閉汗祇在頭也陽結陽微結之別在食陽明陽盛故能食而大便鞕此爲純陽結少陽陽微故不能食而大便鞕此爲陽微結故欲與柴胡湯必究其病在半表然微惡寒亦可屬少陰但頭汗出始可屬少陽故反覆講明頭汗之義可與小柴胡而勿疑也所以然者少陽爲樞少陰亦爲樞故見症多相似必于陰陽表裏辨之眞而審之確始可一劑而奏此少陰少陽之疑似症又柴胡症之變局也少陽主人身之半表半裏脇居一身之半故脇爲少陽之樞而小柴胡爲樞機之劑也岐伯曰中於脇則入少陽此指少陽自病然太陽之邪欲傳屬少陽少陽之邪欲歸併陽明皆從脇傳如傷寒四五日身熱惡寒頭項強脇下滿者是太少併病將轉屬少陽之機也以小柴胡與之所以斷太陽之來路如陽明之病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者是少陽陽明併病此轉屬陽明之始也以小柴胡與之所以開陽明之出路若據次第傳經之說必陽明始傳少陽則當大便鞕而不當溏當曰胸脇始滿不當曰滿不去矣又陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者此雖已屬陽明而少陽之症未罷也蓋少陽之氣遊行三焦因脇下之阻隔令上焦之治節不行水精不能四布故舌上有白胎而嘔與小柴胡轉少陽之樞則上焦氣化始通津液得下胃家不實而大便自轉矣身濈然而自汗解者是上焦津液所化故能開發腠理蒸潤充身澤毛若霧露之溉與胃中邪熱蒸蒸而自汗不解者不同

東垣云少陽有不可汗吐下利小便四禁然柴胡症中口不渴身有微熱者仍加桂枝以取汗下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出寒熱往來者用柴胡桂枝乾薑湯汗之下後胸滿煩驚小便不利譫語身重者柴胡龍骨牡蠣湯中用大黃茯苓以利二便柴胡症具而反下之心下滿而痛痛者大陷胸湯下之腎以丸藥下之而不得利已而微利胸脇滿而嘔日晡潮熱者小柴胡加芒硝下之是仲景於少陽經中已備汗下利小便法也若吐法本爲陽明初病胸中實不得息不得食不得吐而設少陰病飲食入口即吐心下溫溫欲吐復不能吐亦是胸中實當吐之若水飲實於胸中雖是有形面不可爲實故不可吐何則少陽之喜嘔嘔而發熱便見中氣之虛但熱而不實故用人參以調中氣上焦得通津液得下胃氣因和故少陽之嘔與譫語不併見所以嘔者是少陽本症譫語是少陽壞症然本渴而飲水嘔與但欲嘔而胸中痛微溏者又非柴胡症是嘔中又當深辨也

按嘔渴雖六經俱有之症而少陽陽明之病機在嘔渴中分渴則轉屬陽明嘔則仍在少陽如傷寒嘔多雖有陽明症不可攻之因三焦之不通病未離少陽也此兩陽之併合病已過少陽也夫少陽始病便見口苦咽乾目眩先已津液告竭矣故少陽之病最易轉屬于陽明所以發汗即胃實而譫語故小柴胡中已具戒渴之症方中用參苓甘棗皆生津液之品以預防其渴腫之反渴是和火熾盛津液不足以和胃即轉屬陽明之機也

少陽妄下後有二變實則心下滿而鞕痛爲結胸用大陷胸湯下之虛則但滿而不痛爲痞用半夏瀉心湯和之此二症皆從嘔變因不用柴胡令上焦不通津液不下耳

本論云傷寒中風有柴胡症但見一症即是不必悉具者言往來寒熱心煩喜嘔及或爲諸症中凡有一者即是半表半裏故曰嘔而發熱者是柴胡主症此外兼見胸脇滿鞕風寒不全在表未全入裏者皆可用故症不必悉具而方有加減法也然柴胡有疑似症不可不審如脇下滿痛本渴而飲水嘔者柴胡不中與也又但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡症如此詳明所云但見一症便是者又當爲細辨矣

太陰病解第四

按熱病論云太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿嗌乾此熱傷太陰之標自陽部注經之症非太陰本病也仲景立本病爲提綱因太陰主內故不及中風四支煩疼之表又爲陰中至陰故不及熱病嗌乾之症太陰爲開又陰道虛太陰主脾所生病脾主濕又主輸故提綱主腹滿時痛而吐利皆是裏虛不固濕勝外溢之症也脾虛則胃亦虛食不下者胃不主內也要知胃家不實便是太陰病

脾胃同處中故腹滿爲太陰陽明俱有之症在陽明是熱實爲患在太陰是寒濕爲害陽明腹滿不敢輕下者恐胃家不實即轉屬太陰耳世拘陽明傳少陽之謬反昧傳太陰之義

熱病腹滿是熱變太陰之經有嗌乾可證病在標也寒濕腹滿是寒生至陰之藏有自利可證病在本也脾經有熱則陰精不上輸於肺故嗌乾脾藏有寒則脾不能爲胃行其津液故下利夫陽明之當下固本病而太陰之下症反在標病可以見陰陽異位之故又以見陰從陽轉之義也

參中陰溜府之義知熱邪不遽入至陰雖熱在太陰之經而實仍在陽明之胃可知下症只在陽明太陰本無下法

腹滿亦兩經之症不大便而滿痛或繞臍痛者爲實熱屬陽明下利而腹滿時痛者爲虛寒屬太陰寒濕是太陰本症濕熱又傷寒所致之變症也其機關在小便小便不利則濕熱外見而身黃小便自利非暴煩下利而自愈即大便雖不便所以然者脾胃相連此脾家實則腐穢自去而成太陰之開若胃實則

地道不通而轉陽明之閾矣。叔和但知有三陽。不知有太陰陽明症。序例謂太陰受病。脈當沈細。不知沈細是太陰本病之脈。不是熱病嘔乾之脈。蓋脈從病見。如太陰中風則脈浮。不從藏之陰而從風之陽也。然浮爲麻黃湯脈。而用桂枝者。以太陰是裏之表症。桂枝湯是裏之表藥。因脾主肌肉。是宜解肌耳。太陰傷寒脈浮而緩者。亦非太陰本病。蓋浮爲陽脈。緩爲胃脈。太陰傷寒脈不沈細。而反浮緩。是陰中有陽。脈有胃氣。所以手足自温。而顯脾家之實。或發黃便鞕而轉屬陽明。此脈症在太陰陽明之間。故曰繫。若太陰之虛實見矣。

少陰病解第五

少陰一經兼水火二氣。寒熱雜居。爲病不可提摸。其寒也症類太陰。其熱也症似太陽。故仲景以微細之病脈。欲寐之病情。爲提綱。立法於象外。使人求法於病中。凡症之寒熱。與寒熱之眞假。倣此義以推之。眞五經提綱皆是邪氣盛則實。惟少陰提綱。是指正氣奪則虛者。以少陰爲人身之本也。然邪氣之盛。亦因正氣之虛。故五經皆有可温可補症。正氣之奪。亦由邪氣之盛。故少陰亦有汗吐下症。要知邪氣盛而正氣已虛者。固本卽所以逐邪。正不甚虛而邪氣實者。逐邪卽所以護正。此大法也。

太陰脈浮爲在表。當見四肢煩疼等症。沈爲在裏。當見腹痛吐利等症。表有風熱。可發汗。宜桂枝湯。裏有寒邪。當温之。宜四逆輩。太陽面脈沈者。因於寒。寒爲陰邪。沈爲陰脈也。太陰面脈浮者。因于風。風爲陽邪。浮爲陽脈也。當知脈從病變。不拘于經。故陽經有陰脈。陰經有陽脈。世謂脈在三陰。則俱沈。陰經不當發汗者。未審此耳。太陰中風。陽微陰濡而長者。爲欲愈。要知濡與長不是並見。濡本病脈。濡而轉長。病始愈也。與少陽喜嘔者同。嘔者主出。陽主外也。寐者主入。陰主內也。喜嘔是不得嘔。欲寐是不得寐。皆在病人正氣已虛者。固本卽所以逐邪。正不甚虛。而邪氣實者。逐邪卽所以護正。此大法也。

少陽爲陽樞。少陰爲陰樞。弦爲木象。弦而細者。是陽之少也。微爲水象。微而細者。陰之少也。微爲水象。微而細者。是陽之少也。微爲水象。微而細者。陰之少也。

太陰中風。四支煩疼。太陰傷寒。手足自温。此指表熱言也。熱在四肢。則身體不熱可知。蓋太陰主內。表當無熱。惟四肢爲諸陽之本。脾爲胃行津液以灌四旁。故得主四肢。則四肢之温熱。仍是陽明之陽也。且曰自温。便見有時不温。有時四逆矣。

內經云人有四肢熱。逢風而如炎如火者。是陰氣虛而陽氣盛。風者陽也。四肢亦陽也。兩陽相搏。是人當肉熘。此卽太陰中風症。要知太陰中風。與三陽不同。太陰之陰。名曰關藏。故陽邪不得深入。雖病在四關。久而不愈。脾液不足以充肌肉。故肉熘。世人最多此症。其有手足心熱者。亦中風之輕者耳。然太陰中風。因陰虛而陽浚之。外風爲內熱所致。但當滋陰以和陽。不得驅風而增熱也。

三三日無裏症者不作

太陰是陽明之裏。陽明不惡寒。故太陰雖吐利腹痛。而無惡寒症。少陰是太陽之裏。太陽惡寒。故少陰吐利必惡寒。陰從陽也。太陰手足温者。必暴煩下利而自愈。是太陰藉胃院之陽。少陰吐利。亦必手足温者。有伏陽矣。須審其病爲在裏而禁汗。不得拘沈爲在裏而不發汗也。發熱脈沈者。是病爲在表。以無裏症。故可發汗。若脈浮而遲。表熱裏寒。下利清穀。是遲爲無陽。病爲在裏。又不得拘浮爲在表而發汗矣。要知陰中有陽。沈亦可汗。陽中有陰。浮亦當温。若八九日一身手足盡熱。是自裏達表。陽盛陰虛。法當滋陰。又與二三日無裏症者不作。

太陰是太陽之裏。太陽惡寒。故太陰雖吐利腹痛。而無惡寒症。少陰是太陽之裏。太陽惡寒。故少陰吐利必惡寒。陰從陽也。太陰手足温者。必暴煩下利而自愈。是太陰藉胃院之陽。少陰吐利。亦必手足温者。有伏陽矣。須審其病爲在裏而禁汗。不得拘沈爲在裏而不發汗也。發熱脈沈者。是病爲在表。以無裏症。故可發汗。若脈浮而遲。表熱裏寒。下利清穀。是遲爲無陽。病爲在裏。又不得拘浮爲在表而發汗矣。要知陰中有陽。沈亦可汗。陽中有陰。浮亦當温。若八九日一身手足盡熱。是自裏達表。陽盛陰虛。法當滋陰。又與二三日無裏症者不作。

內經云人有四肢熱。逢風而如炎如火者。是陰氣虛而陽氣盛。風者陽也。四肢亦陽也。兩陽相搏。是人當肉熘。此卽太陰中風症。要知太陰中風。與三陽不同。太陰之陰。名曰關藏。故陽邪不得深入。雖病在四關。久而不愈。脾液不足以充肌肉。故肉熘。世人最多此症。其有手足心熱者。亦中風之輕者耳。然太陰中風。因陰虛而陽浚之。外風爲內熱所致。但當滋陰以和陽。不得驅風而增熱也。

少陰脈微不可發汗之象如此

少陰脈微不可發汗。亡陽故也。脈細沈數。病爲在裏。不可發汗。然可汗之機亦見於此。夫微爲無陽。數則發熱。脈沈者。是病爲在裏。以無裏症。發熱脈沈者。是病爲在表。以無裏症。故可發汗。若脈浮而遲。表熱裏寒。下利清穀。是遲爲無陽。病爲在裏。又不得拘浮爲在表而發汗矣。要知陰中有陽。沈亦可汗。陽中有陰。浮亦當温。若八九日一身手足盡熱。是自裏達表。陽盛陰虛。法當滋陰。又與二三日無裏症者不作。

太陰是陽明之裏。陽明不惡寒。故太陰雖吐利腹痛。而無惡寒症。少陰是太陽之裏。太陽惡寒。故少陰吐利必惡寒。陰從陽也。太陰手足温者。必暴煩下利而自愈。是太陰藉胃院之陽。少陰吐利。亦必手足温者。有伏陽矣。須審其病爲在裏而禁汗。不得拘沈爲在裏而不發汗也。發熱脈沈者。是病爲在表。以無裏症。故可發汗。若脈浮而遲。表熱裏寒。下利清穀。是遲爲無陽。病爲在裏。又不得拘浮爲在表而發汗矣。要知陰中有陽。沈亦可汗。陽中有陰。浮亦當温。若八九日一身手足盡熱。是自裏達表。陽盛陰虛。法當滋陰。又與二三日無裏症者不作。

少陰一經兼水火二氣寒熱雜居爲病不可提摸其寒也症類太陰其熱也症似太陽故仲景以微細之病脈欲寐之病情爲提綱立法於象外使人求法於病中凡症之寒熱與寒熱之眞假倣此義以推之眞

少陰一經兼水火二氣。寒熱雜居。爲病不可提摸。其寒也症類太陰。其熱也症似太陽。故仲景以微細之病脈。欲寐之病情。爲提綱。立法於象外。使人求法於病中。凡症之寒熱。與寒熱之眞假。倣此義以推之。眞

少陰病解第五

少陰一經兼水火二氣寒熱雜居爲病不可提摸其寒也症類太陰其熱也症似太陽故仲景以微細之病脈欲寐之病情爲提綱立法於象外使人求法於病中凡症之寒熱與寒熱之眞假倣此義以推之眞

少陰一經兼水火二氣。寒熱雜居。爲病不可提摸。其寒也症類太陰。其熱也症似太陽。故仲景以微細之病脈。欲寐之病情。爲提綱。立法於象外。使人求法於病中。凡症之寒熱。與寒熱之眞假。倣此義以推之。眞

少陰病解第五

少陰一經兼水火二氣寒熱雜居爲病不可提摸其寒也症類太陰其熱也症似太陽故仲景以微細之病脈欲寐之病情爲提綱立法於象外使人求法於病中凡症之寒熱與寒熱之眞假倣此義以推之眞

少陰一經兼水火二氣。寒熱雜居。爲病不可提摸。其寒也症類太陰。其熱也症似太陽。故仲景以微細之病脈。欲寐之病情。爲提綱。立法於象外。使人求法於病中。凡症之寒熱。與寒熱之眞假。倣此義以推之。眞

少陰病解第五

少陰一經兼水火二氣寒熱雜居爲病不可提摸其寒也症類太陰其熱也症似太陽故仲景以微細之病脈欲寐之病情爲提綱立法於象外使人求法於病中凡症之寒熱與寒熱之眞假倣此義以推之眞

少陰一經兼水火二氣。寒熱雜居。爲病不可提摸。其寒也症類太陰。其熱也症似太陽。故仲景以微細之病脈。欲寐之病情。爲提綱。立法於象外。使人求法於病中。凡症之寒熱。與寒熱之眞假。倣此義以推之。眞

復少陰本脈。故轉太陰而自解。脈沈細數。是象陽脈。故入陽經而爲患。然熱雖甚不死。亦陰得陽則解之變局也。

六經皆有煩躁。而少陰更甚者。以真陰之虛也。蓋陽盛則煩。陰極則躁。煩屬氣。躁屬形。煩發于內。躁見于外。是形從氣動也。先躁而後煩。是氣爲形役也。不躁而時自煩。是陽和漸回。故可治。不煩而躁。是五藏之陽已竭。惟魄獨居。故死。故少陰以煩爲生機。躁爲死兆。

傷寒以陽爲主。不特陰症見陽脈者生。亦陰病見陽症者可治也。凡蹉陷、四逆、吐利交作、純陰無陽之症。全賴一陽來復。故反煩者可治。手足反溫反發熱者不死。

太陽少陰皆有身痛骨節痛之表。水氣爲患之裏。太陽則脈浮緊而身發熱。用麻黃湯發汗。是振警衛之陽以和陰也。少陰則脈沈而手足寒。用附子湯溫補。是扶坎宮之陽以配陰也。太陽之水屬上焦。小青龍汗而發之。陽水當從外散也。少陰之水屬下焦。真武湯溫而利之。陰水當從下泄也。

陰陽俱緊。與太陽傷寒脈相似。夫緊脈爲寒。當屬少陰。然病發于陰。不當有汗。反汗出者。陰極似陽。陰虛厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面赤者。是下虛而格陽也。吐利煩作。手足不能藏。精所致也。亡陽之前。已先亡陰矣。陽無所依。故咽痛嘔吐。見虛陽之不歸。陰不能藏。故下利不止。發躁也。岐伯曰陰病治陽。陽病治陰。定其中外。各守其鄉。此即仲景治少陰之大法也。

見真陰之欲脫也。則附子湯用三白以滋陰。參附以回陽。爲少陰反本還原之劑。

腎主五液。入心爲汗。少陰受病。液不上升。所以陰不得有汗。仲景治少陰之表。于麻黃細辛中加附子。是升腎液而爲汗也。若真陰爲邪熱所逼。則水隨火越。故反汗出。仲景治少陰之裏。附子湯中任人參。是補腎液而止汗也。

厥陰病解第六

脈陰陽俱緊。口中氣出傖。是少陰經文。王氏集之脈法中。故諸家議論不一。夫少陰脈、絡肺、主鼻、故鼻中涕出。少陰脈絡舌本。故舌上胎滑。少陰大絡注諸絡。以溫足脛。故足冷。此症不名亡陽者。外不汗出。內不吐利也。口中氣出。唇口燥乾。鼻中涕出。此爲內熱陰陽脈緊。舌上胎滑。蹉臥足冷。又是內寒。此少陰爲病。故見寒熱相持之症。而口舌唇鼻之半表半裏。恰與少陽之口苦咽乾目眩相應也。勿妄治者。恐陰陽相持。則清火溫補等法用之不當。宜靜以待至七日來復。微發熱。手足溫。是陰得陽則解也。若八日以上。反大發熱。乃加吐利。即是亡陽。若其人反加惡寒。寒甚於表。上焦應之。必欲嘔矣。若加腹痛。是寒甚於裏。中焦受之。必欲利矣。當此陰盛急當扶陽。應不爲假熱所惑而妄治。

但欲寐。即是不得眠。然但欲寐是病。乃問而知之。不得眠是病形。可望而知之。欲寐是陰虛。不眠是煩火內發也。要知少陽厥陰同一相火。相火鬱于內。是厥陰病。相火出于表。爲少陽病。少陽病渴之機。胸脇苦滿。即氣上撞心之兆。心煩即移熱之初。不欲食是飢不欲食之根。喜嘔即吐蚘之漸。故少陽不解。轉屬厥陰而病危。厥陰病發。轉屬少陽而欲愈。如傷寒熱少厥微。指頭寒不欲食。至數日。熱除欲得食。其病愈者是已。太陰提綱。是內傷寒。不是外感。厥陰提綱。是溫病而非傷寒。要知六經各有主症。是仲景傷寒雜病合論之旨也。

諸經傷寒無渴症。太陽不惡寒而渴。是溫病矣。惟厥陰傷寒。肝木鬱而不得出。熱甚于內。欲竊非氣以宣火。故渴欲飲水。若不惡寒。當作溫病治之。要知溫乃風木之邪。是厥陰本病。消渴是溫氣之本病之變。內經所謂熱病皆傷寒之類。此正其類矣。

入於府者。下之則腹已。宜于急下者。六七日來。陰虛已極。恐土實於中。心腎不交耳。若自利純清水。心下痛口燥舌乾者。是土燥火炎。脾氣不濡。胃氣反厚。水去而殺不去。故宜于急下。

少陰爲性命之根。少陰病是死生關。故六經中獨于少陰歷言死症。然少陰半表半裏。陰陽俱緊。反汗出而咽痛。吐利者。此陰極以陽。腎陽不歸。爲亡陽症也。若可證。若初受傷寒。其機甚微。脈微細。但欲寐。口中和。皆惡寒。人已皆不覺。其爲寒極生熱。腎陽鬱極而勝。復太過也。其腹痛下利小便不利者。有水火之分。若四肢沈重。疼痛。爲有水氣。是陽虛而不勝陰也。若便膿血與泄利下重者。此爲火鬱。是陽邪陷入陰中也。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面赤者。是下虛而格陽也。吐利煩作。手足逆冷。煩躁欲死者。是陰極而發躁也。岐伯曰陰病治陽。陽病治陰。定其中外。各守其鄉。此即仲景治少陰之大法也。

厥陰病解第六

太陰厥陰皆以裏症爲提綱。太陰爲陰中至陰而主寒。故不渴。厥陰爲陰中之陽。而主熱。故消渴也。太陰主濕土。土病則氣陷下。濕邪入胃。故腹痛自利。厥陰主相火。火病則氣上逆。火邪入心。故心中疼熱也。太陰腹滿而吐。食不下。厥陰肌不欲食。食即吐蚘。同是食不下。太陰則滿。陰厥陰則飢。同是一吐。太陰則吐食。而脈不至者死。同是吐利。手足不逆冷。反發熱者不死。煩躁四逆者死。同是嘔吐。汗出小便數少者可治。自利煩躁不得臥者死。蓋陰陽互爲其根。陰中無陽則死。獨陰不生。故也。

厥陰消渴。即以水飲之。所以順其欲。然少與之。可以平亢火。多與之反以益陰邪。當量其消與不消。恐水漬入胃耳。

渴欲飲水。與飢不欲食對看。始盡厥陰病情。

手足厥冷。脈微欲絕。是厥陰傷寒之表藥。夫陰寒如此。而不用姜附者。以相火寄於肝經。雖寒而藏不寒。故先厥者後必發熱。手足愈冷。肝脈愈熱。故厥深熱亦深。所以傷寒初起。脈症如此者。不得遽認爲虛寒。妄投姜附以遺患也。

厥者必發熱。熱與厥相應。熱深厥亦深。熱微厥亦微。此四症是厥陰傷寒之定局。先熱後厥。厥熱往來。厥多熱少。熱多厥少。此四症是厥陰傷寒之變局。皆因其人陽氣多寡而然。如太陽傷寒。亦有已發熱未發熱之互詞也。

內經之寒熱二厥。因於內傷。與本論因外邪者不同。內經熱厥只在足心。是腎火起湧泉之下也。本論熱厥因熱在肝經。而手足反寒。故曰厥深熱亦深。內經之寒厥有寒無熱。本論之寒厥。先厥者後必發熱。熱勝則生。寒勝則死。此內傷外感之別。

厥陰有晦朔具合之理。陰極陽生。故厥陰傷寒。反以陽爲主。熱多厥少。是爲生陽。故病當愈。厥多熱少。是爲死陰。故病爲進。其熱氣有餘者。或便膿血。或發癰膿。亦與內經熱厥不同。

陰氣起於五指之裏。陽氣起於五指之表。氣血和調。營衛以行。則陰陽相貫。如環之無端也。厥陰無陽。厥陰病則陰陽不順接。故手足逆冷。若熱少厥微。而指頭寒。知病可愈。手足反溫者。雖下利必自愈。此陰陽自和而順接也。若脈微煩躁。灸厥陰。厥不還者死。是陰陽之氣絕矣。

本篇諸四逆厥者不可下。又曰厥應下之而反發汗者。必口傷爛赤。二義不同。當理會上下文。蓋諸四逆是指虛寒症言。故曰虛家亦然。應下之。是單指熱厥言。故曰厥深熱亦深。若發汗只能引火上升。不能逐熱外散。故令口傷。若手足厥冷。脈微欲絕。此時外寒切迫。內熱未起。又當發汗。

厥而脈微欲絕。是傷寒初起之脈。所謂不可下者是已。脈滑而厥。是內熱閉鬱之脈。所謂厥應下之是已。下之是下其熱。非下其實。泄利下重者。四逆散。欲飲水數升者。白虎湯。此厥陰之下藥。所以下無形之邪也。若以承氣下之。利不止矣。

凡脈浮爲在表。沈爲在裏。厥陰中風。其脈既沈。其症亦爲在裏。此熱利下重。是有火氣。故以白頭翁湯主之。以治風。連本爲輔。以清火。佐秦皮利嘔逆。是有水氣。厥陰中風。熱利下重。是有火氣。故以白頭翁湯爲主。以治風。連本爲輔。以清火。佐秦皮以升九地之風。則肝木欣欣向榮矣。下利而渴。欲飲水。是厥陰之消渴亦中風之煩所致也。下利脈沈弦。是沈爲在裏。弦爲風。脈弦而大。是風因火動。故利未止。微弱數者。是風少火微。故爲自止。雖發熱不死者。陰出之陽也。下利有微熱汗出。見中風本症。裏症出表。則風從外散。故令自愈。欲愈之脈。當微浮。若寸脈反浮數。風去而熱不去。尺中自濇者。熱傷陰絡。肝血不藏。必便膿血也。

厥陰中風之脈。與他經不同。凡脈浮爲風。此云不浮爲未愈。是厥陰中風。脈反沈矣。此本猶陰處。風入地中。本體不舒。故未愈。微浮是風行地上。草木發陳。復厥陰風木之常。故愈也。

厥陰中風之熱利。是裏有熱。傷寒亦有協熱利。是裏有寒。又與厥利不同。厥利只不厥。便發熱而利。汗出不止。是外熱內寒。故謂之有陰無陽。要知內經之否卷蟄縮。是有陽無陰。故熱雖甚而可治。厥陰下利。有因厥而利者。有協熱而利者。有內熱而利者。總屬於熱。乃相火挾風木而爲患也。陰陽易之爲病。本於厥陰之慾火。始也。因肝火之動。致傷少陰之精。繼也。少陰之精不藏。厥陰之火不藏。火上行逼心。故反汗出。氣上撞心。心不受邪。因而越之。故嘔中痛而喉爲痺耳。若發熱而利。汗出不止者。

死。是陽虛外亡。爲有陰無陽。與少陰亡陽同義。若肝火內行而入脾。火土合德。必無汗而利自止。若發熱而利不止。此肝火內陷。血室不事。故便膿血。若發熱下利。甚至厥不止者死。是土敗木賊。諸陽之本絕也。

厥陰傷寒。有乘脾乘肺二症。疑似難明。最當詳辨。一曰傷寒。腹滿譫語。寸口脈浮而緊。此肝乘脾也。名曰縱。刺期門。夫腹滿譫語。似胃家實。然脈浮緊而不潮熱。非陽明脈也。脈法曰。脈浮而緊者。名曰弦。此弦爲肝脈矣。內經曰。諸腹脹大。屬於熱。又曰。肝氣盛則言。是腹滿由肝火而譫語。乃肝氣所發也。木旺則侮其所勝。直犯脾土。故名縱。一曰傷寒發熱。嗇嗇惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。此肝乘肺也。名曰橫。刺期門。夫發熱惡寒。似太陽之表。未經大汗而大渴。非轉屬陽明。未經妄下而腹滿。非轉屬太陰。且既不痛。胃不實。不下利。斷非三經症矣。要知發熱惡寒。是肺病。肺虛而肝火乘之。脾畏木邪。水精不上歸於肺。故大渴。肺不能通調水道。故腹滿。是侮所不勝。寡於畏也。故名橫。一縱而乘脾。一橫而乘肺。總是肝有亢火。當瀉無補。必刺期門。隨其實而瀉之。慕原清則三氣皆順。表裏豁解矣。此非汗吐下滑利諸法所可治。故宜針。

傷寒陽脈濇。陰脈弦。腹中急痛者。此亦肝乘脾也。故先與小建中安脾。繼與小柴胡疏木。要知小建中是桂枝湯加芍藥以平肝。加飴糖以緩急。爲厥陰傷寒。驅邪發表。和中止痛之神劑也。不差者。中氣虛而不振。邪尚留連。繼以小柴胡補中發表。令木邪直走少陽。使有出路。所謂陰出之陽則愈也。仲景有一症而用兩方者。在大陽先麻黃繼桂枝。是先外後內法。在厥陰。先建中後柴胡。是先內後外法。亦是令厥陰轉爲少陽之機。

傷寒厥而心下悸者。此亦肝乘肺也。雖不發熱惡寒。亦木實金虛。水氣不利所致。被腹滿者。是水在中焦。故刺期門以瀉其實。此水在上焦。故用茯苓甘草湯以發其汗。此方是化水爲汗。發散內邪之劑。卽厥陰治厥之劑也。

厥陰中風之脈。與他經不同。凡脈浮爲風。此云不浮爲未愈。是厥陰中風。脈反沈矣。此本猶陰處。風入地中。本體不舒。故未愈。微浮是風行地上。草木發陳。復厥陰風木之常。故愈也。

凡脈浮爲在表。沈爲在裏。厥陰中風。其脈既沈。其症亦爲在裏。此熱利下重。是有火氣。故以白頭翁湯爲主。以治風。連本爲輔。以清火。佐秦皮利嘔逆。是有水氣。厥陰中風。熱利下重。是有火氣。故以白頭翁湯爲主。以治風。連本爲輔。以清火。佐秦皮以升九地之風。則肝木欣欣向榮矣。下利而渴。欲飲水。是厥陰之消渴亦中風之煩所致也。下利脈沈弦。是沈爲在裏。弦爲風。脈弦而大。是風因火動。故利未止。微弱數者。是風少火微。故爲自止。雖發熱不死者。陰出之陽也。下利有微熱汗出。見中風本症。裏症出表。則風從外散。故令自愈。欲愈之脈。當微浮。若寸脈反浮數。風去而熱不去。尺中自濇者。熱傷陰絡。肝血不藏。必便膿血也。

厥陰中風之熱利。是裏有熱。傷寒亦有協熱利。是裏有寒。又與厥利不同。厥利只不厥。便發熱而利。汗出不止。是外熱內寒。故謂之有陰無陽。要知內經之否卷蟄縮。是有陽無陰。故熱雖甚而可治。厥陰下利。有因厥而利者。有協熱而利者。有內熱而利者。總屬於熱。乃相火挾風木而爲患也。陰陽易之爲病。本於厥陰之慾火。始也。因肝火之動。致傷少陰之精。繼也。少陰之精不藏。厥陰之火不藏。火上行逼心。故反汗出。氣上撞心。心不受邪。因而越之。故嘔中痛而喉爲痺耳。若發熱而利。汗出不止者。

所以少腹裏急。陰中拘攣。熱上衝胸。眼中生花。身重少氣。頭重不欲舉。皆厥陰相火爲害。頓令無病之人。筋脈形氣爲之一變。此卽溫疫傳染。遘禍他人之一症也。

制方大法第七

凡病有名有症。有機有情。如中風、傷寒、溫暑、濕痙等類。此爲名也。外有頭痛、身熱、腰痛、內有喘咳、煩渴、吐利、腹滿。所謂症也。其間在表在裏。有汗無汗。脈沈脈浮。有力無力。是其機也。此時惡寒惡熱。苦滿苦嘔。能食不欲食。欲臥不得臥。或飲水數升。或漱水不欲嚥。皆病情也。因名立方者。粗工也。據症定方者。中工也。於症中審病機。察病情者。良工也。仲景製方。不拘病之命名。惟求症之切當。知其機得其情。凡中風傷寒雜病。宜主某方。隨手拈來。無不合法。此謂從不執方也。今談仲景方者。皆曰桂枝湯治中風。不治傷寒。麻黃湯治傷寒。不治中風。不審仲景此方。主何等症。又不察仲景何症用何等藥。只在中風傷寒二症中相較。若龍白虎命名上數衍。將仲景活方活法。爲死方死法矣。

仲景立方精而不雜。其中以六方爲主。諸方從而加減焉。凡汗劑皆本桂枝。吐劑皆本梔豉。攻劑皆本承氣。和劑皆本柴胡。寒劑皆本瀉心。溫劑皆本四逆。渾而數之爲一百十三方者。未之審也。

六經皆有主治之方。而他經有互相通用之妙。如桂枝麻黃二湯。爲太陽營衛設。而陽明之病在營衛者。亦用之。合是症便用是方。方各有經。而用可不拘。是仲景法也。仲景立方。只有表裏寒熱虛實之不同。而無傷寒雜病中風之分別。且風寒有兩湯迭用之妙。表裏有二方更換之奇。或以全方取勝。或以加減奏功。世人論方不論症。故反以仲景方爲難用耳。桂枝汗劑中第一品也。麻黃之性直達皮毛。生姜之性橫散肌肉。故桂枝佐麻黃。則開元府。而逐衛分之邪。令無汗者有汗而解。故曰發汗。桂枝舉生姜。則開腠理而驅營分之邪。令有汗者復汗而解。故曰解肌。解肌者解肌肉之邪也。正在營分。何立三綱者。反云麻黃主營。桂枝主衛耶。麻黃湯不言解肌。而肌未嘗不解。桂枝湯不言解肌。與發汗對講。前人論方不論藥。祇以二方爲談柄。發汗分深淺之法。不得以發汗獨歸麻黃。不得以解肌而屬之不用也。

凡風寒中人。不在營衛。卽入腠理。仲景製桂枝湯調和營衛。製柴胡湯調和腠理。觀六經症。仲景獨出桂枝症。柴胡症。卽見二方任重。不可拘於經也。惟太陽統諸陽之表氣。六經表症。屬於太陽。故柴胡湯得與桂枝湯對待於太陽之部。桂枝本爲太陽風寒設。凡六經初感之邪。未離營衛者。悉宜之。柴胡本爲少陽半表設。凡三陽半表之邪。逗留腠理者。悉宜之。仲景一書最重二方。所以自爲桂枝註釋。又爲小柴胡註釋。桂枝有疑似症。柴胡亦有疑似症。桂枝有壞病。柴胡亦有壞病。桂枝症能。桂枝不中與汗。隨症治法。仍不離桂枝方加減。柴胡症能。柴胡不中與汗。隨症治法。救逆。仍不出柴胡方加減。麻黃湯症。熱全在表。桂枝之自汗。大青龍之煩躁。皆從裏熱。仲景於表劑中。使用寒藥。以清裏熱。自汗是煩之兆。躁是煩之徵。汗出則煩得外泄。故不躁。宜用微寒酸苦之味以和之。汗不出則煩不得泄。故躁。宜用大寒堅重之品以清之。大青龍石羔是裏藥。今人見入表劑中。不審表中有裏。因生疑畏。當用不用。至熱併陽明。而斑黃狂亂。是不任大青龍之過也。仲景於太陽經中。用石羔以清胃火。是預保陽明之先著。加姜棗以培中氣。又慮大

青龍柴胡俱是兩解表裏之劑。小青龍重在裏症。小柴胡重在表症。故小青龍加減。麻黃可去。小柴胡加減。柴胡獨存。蓋小青龍重在半裏之水。小柴胡重在半表之熱也。

小青龍治傷寒未解之水氣。故用溫劑。汗而發之。十棗湯治中風已解之水氣。故用寒劑。引而竭之。此寒水風水之異治也。小青龍之水動而不居。五苓散之水留而不行。十棗湯之水縱橫不羈。大陷胸之水痞鞕堅滿。眞武湯之水四肢沈重。水氣爲患不同。所以治法各異。

林檉云。瀉心本名理中。黃連人參湯。蓋瀉心療痞。正是理中處。當知仲景用理中有寒熱兩法。一以扶陽一以益陰也。

邪在營衛之間。惟汗是其出路。故立麻黃桂枝二方。邪在胸腹之間。惟吐是其出路。故立瓜蒂梔豉二方。瓜蒂散主胸中痞鞕。治在上焦。梔豉湯主在腹滿而喘。治兼中焦。猶麻黃主皮膚。桂枝湯之主肌肉也。瓜蒂散峻劑也。猶如麻黃之不可輕用。梔豉湯輕劑也。猶桂枝湯之可更用而無妨。故太陽表劑多從桂枝加減。陽明表劑多從梔豉加減。陽明用梔豉。猶太陽用桂枝。既可用之以驅邪。卽可用之以救逆。令人但知汗爲解表。而不知吐亦爲解表。知吐中便能發散之說。不知所以當吐之義。故於仲景大法中取其汗下。遺其吐法耳。

少陽爲樞。不全在裏。不全在表。仲景本意重裏。而柴胡所主又在半裏。故必見半表。病情乃得。從柴胡加減。如悉入在裏。則柴胡非其任矣。故柴胡稱解表之方。

小柴胡雖治在半表。實以理三焦之氣。所以稱樞機之劑。如胸滿胸中煩。心煩。心下痞。喜嘔。渴咳。是上焦無開發之機也。腹滿腦下痞鞕。不欲飲食。是中焦廢轉運之機也。小便不利。是下焦失決瀆之任也。皆因邪氣與正氣相搏而然。用人參扶三焦之正氣。壯其樞耳。

四逆爲太陰主方。而諸經可以互用。在太陰本經。固本以逐邪也。用於少陰。和土以生木也。用于太陽。益火以扶元陽也。推陽明胃實。少陽相火非所宜耳。

少陰病四五日腹痛。小便不利。下利不止。若四肢沉重疼痛者。爲下焦水鬱。用眞武湯。是引火之法。若便膿血者。爲下焦火鬱。用桃花湯。是升陽散火法。此因坎中陽虛。不得以小便不利作熱治。

少陰病二三日。心中煩不得臥者。病本在心。法當遊離中之眞水。隨其勢之潤下。故君黃連之苦寒以泄之。四五日小便不利。下膿血者。病本在腎。法當升坎中之少火。順其性之炎上。故佐乾姜之苦溫以發之。此伏明之火。與升明之火不同。

少陰心煩欲寐。五六日欲吐不吐。自利而渴。小便色白者。是下焦虛寒。不能制水。宜眞武湯以溫下焦之腎水。

下利六七日。欬而嘔渴心煩不眠。是上焦虛熱。水精不布。宜豬苓以通上焦之精液。

厥陰下利。用白頭翁湯。升陽散火。是火鬱發之也。製烏梅丸以收火。是曲直作酸之義。佐苦寒以和陰。主溫補以存陽。是肝家調氣法也。烏梅丸。治傷寒之厥利。與久利。故半夏溫補。白頭翁湯。主中風之熱利。與下重。故專於涼散。

小柴胡爲少陽主方。烏梅丸爲厥陰主方。二方雖不同。而寒溫互用。攻補兼施之法相合者。以藏腑相連。經絡相貫。風木合氣。同司相火故也。其中皆用人參。補中益氣。以固本逐邪。而他味俱不相礙者。因陰陽異位。陽宜升發。故主以柴胡。陰宜收降。故主以烏梅。陽主熱。故重在寒涼。陰主寒。故重用辛熱。陽以動爲用。故湯以蕩之。其症變幻不常。故柴胡有加減法。陰以靜爲體。故丸以緩之。其症有定局。故烏梅無加減法也。

仲景下劑只重在湯。故曰醫以丸藥下之。非其治也。觀陷胸抵當二丸。仍用水煮。是丸復化爲湯。化而運澤服。則勢力更猛於湯散矣。當知仲景方以錄兩分計數者。非外感方。丸藥如梧桐子大。每服十丸者。不是治外感法。

手足厥逆之症。有寒有熱。有表有裏。四逆散解少陰之裏熱。當歸四逆散厥陰之表寒。通脈四逆。挽少陰眞陽之將亡。茯苓四逆。留太陽眞陰之欲脫。四方更有輕重淺深之別也。

仲景製方療病。隨立方禁於後。使人受其功。不蹈其弊也。如用發表藥一服。汗不出者。不可與桂枝。若脈微弱。汗出惡風者。不可服大青龍。脈浮發熱無汗。表不解者。不可與白虎。諸亡血虛者。不可用瓜蒂。病人舊微溏者。不可與梔子湯。陽明病汗出多者。不可與猪苓湯。外未解其熱不溯者。未可與承氣。嘔家不可用建中。觀種種方禁。當知仲景立方愼重之心也。

桂枝湯發表攻裏之方。各有緩急之法。如麻黃湯大承氣汗下之急劑也。桂枝即發表之緩劑。其用桂枝諸法。皆調胃承氣。胃家實則二腸俱實矣。若三分之則調胃承氣。胃家之下藥。小承氣。小腸之下藥。大腸小腸皆屬於胃。胃家實則二腸俱實矣。若三分之則調胃承氣。胃家之下藥。小承氣。小腸之下藥。大承氣。大腸之下藥。戊爲燥土。庚爲燥金。故加芒硝以潤之也。桂枝加大黃。太陽轉屬陽明之下藥。桂枝加芍藥。太陽轉屬太陰之下藥。凡下劑兼表藥者。以未離於表也。柴胡加芒硝湯。少陽轉屬陽明之下藥。大柴胡下少陽無形之邪。柴胡加芒硝。下少陽有形之邪。桂枝加芍藥。下太陰無形之邪。三物白散。下太陰有形之邪也。下劑之輕者。只用氣分藥。下劑之重者。兼用血分藥。酸苦涌泄。下劑之輕者。故芍藥枳實爲輕劑。鹹苦涌泄。下劑之重者。故大黃芒硝爲重劑。

仲景用攻下二字。不專指大便。此與桂枝湯欲攻其表。此指發汗言。表解者乃可攻之。指利水言。有熱屬裏者攻之。指清火言也。寒濕在裏不可下。指利水言。以有熱故也。當以湯下之。指清火言也。

扶弱。附子理中丸是已。重可鎮怯。禹餘糧代赭石是已。濕可調燥。黃連阿膠湯是已。燥可去濕。麻黃連翹赤小豆湯是已。寒能勝熱。白虎黃連等湯是已。熱可制寒。白通四逆諸湯是已。

病在虛實相間。表裏夾雜時。藥力所不能到者。仲景或針或灸以治之。自後世針藥分爲兩途。刺者勿藥。藥者勿刺。豈知古人刺藥相須之理。按岐伯治風厥。表裏刺之飲之服湯。故仲景治太陽中風。服桂枝湯。反煩不解者。刺風池風府。復與桂枝而愈。陽明中風。刺之小差。如外不解。脈弦浮者。與小柴胡。脈但浮無餘症者。與麻黃湯。吾故曰仲景治法悉本內經。前聖後聖。其揆一也。



素問玄機原病式序

夫醫教者。源自伏羲。流于神農。注于黃帝。行于萬世。合于無窮。本乎大道。法乎自然之理。孔安國序書曰。伏羲神農黃帝之書。謂之三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。蓋五典者。三墳之末也。非無大道。但專明治世之道。三墳者。五典之本也。非無常道。但以大道爲體。常道爲用。天下之能事畢矣。然而玄機奧妙。聖意幽微。浩浩乎不可測。使之習者。雖賢智明哲之士。亦非輕易可得而悟矣。洎乎周代。老氏以精大道。專爲道教。孔子以精常道。專爲儒教。由是儒道二門之教著矣。歸其祖則三墳之教一焉。儒道二教之書。比之三墳之經。則言象義理。昭然可據。而各得其一意也。故諸子百家。多爲著述。所宗之者。庶博知焉。嗚呼。余之醫教。自黃帝之後二千五百有餘年。漢末之難有南陽太守張機仲景。恤於生民多被傷寒之疾。損害精天。因而輒考古經。以述傷寒卒病方論一十六卷。使後之學者。有可依據。然雖所論未備諸病。仍爲道要。若能以意推之。則思過半矣。且所述者衆。所習者多。故自仲景至今。甫踰千歲。凡著述醫書。過往古者八九倍矣。夫三墳之書者。大聖人之教也。法象天地。理合自然。本乎大道。仲景者。啚聖也。雖仲景之書未備聖人之教。亦幾於聖人。文亦玄奧。以致今之學者。尚爲難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。況仲景之書。復經太醫王叔和撰次。道方唐開寶中節度使高繼沖編集進上。雖二公操心用智。自出心意。廣其法術。雜於舊說。亦有

可取。其間或失仲景本意。未符古聖之經。愈令後人學之難也。況仲景之世。四升乃唐宋之一升。四兩爲之一兩。向者人能勝毒。及多咬咀湯劑。有異今時之法。故今人未知其然。而妄謂時世之異。以爲無用。而多不習焉。唯近世朱奉議多得其意。遂以本仲景之論。而兼諸書之說。編集作活人書二十卷。其間亦有未合聖人之門多。其方衆。其言直。其類辯。使後學者易爲尋檢施行。故今之用者多矣。然意者往往但相背而已。由未知陰陽變化之道。所謂未極假令。金極似火。火極似水。水極似土。土極似木者也。故經曰。亢則害承乃制。謂已亢過極。則反似勝己之化也。俗未之知。認假作是。以陽爲陰。失其意也。嗟夫。醫之妙用。倘在三墳。概夫經所著通者。必欲和於後人。非但務衡而已。昔仁人之心也。非不盡其善也。鮮矣。豈欲自涉非道而亂聖經。以惑人志哉。自古如斯。聖狀義書。卦非聖人孰能明其意。況萬餘言。至周文王方始立象演卦。而周公述爻。後五百餘年。孔子以作十翼。而易書方完。然後易爲推究。所習者衆。而注說者多。其間或所見不同。而互有得失者。未及於聖。竊窺道教故也。易學體乎五行八卦。儒教存乎三綱五常。醫教要乎五運六氣。其門三。其道一。故相須以用。而無相失。蓋本教一而已矣。若忘其根本。而求其華實之茂者。未之有也。故經曰。夫五運陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。可不通乎。仙經曰。大道不可以籌算。道不在數。故也。可以籌算者。天地之數也。若得天地之數。則大道在其中矣。經曰。天地之至數。始於一而終於九。數之可十。推之可百。數之可千。推之可萬。萬之不可勝數。然其要一也。又云知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。又云至數之機。迫迮而微。其來可見。其往可追。敬之者昌。慢之者亡。無道行私。必得天殃。又云治不法天之紀。地之理。則災害至矣。又云不知年之所加。氣之興衰。虛實之所起。不可以爲工矣。由是觀之。則不知運氣而求醫。無失者鮮矣。今詳內經素問。雖已校正。故誤音釋。往往尙有失古聖之意者。愚依舊之。未必不曰爾何人也。敢言古昔聖賢之非。嗟夫。聖人之所爲。自然合於規矩。無不中其理者也。雖有賢哲。後之學者。有可依據。然雖所論未備諸病。仍爲道要。若能以意推之。則思過半矣。且所述者衆。所習者多。故自仲景之後。有缺錄七一卷。而不得自然之理。亦豈能盡善而無失乎。況經秦火之殘文。世本稀少。故自仲景至今。甫踰千歲。凡著述醫書。過往古者八九倍矣。夫三墳之書者。大聖人之教也。法象天地。理合自然。本乎大道。仲景者。啚聖也。雖仲景之書未備聖人之教。亦幾於聖人。文亦玄奧。以致今之學者。尚爲難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。況仲景之書。復經太醫王叔和撰次。道方唐開寶中節度使高繼沖編集進上。雖二公操心用智。自出心意。廣其法術。雜於舊說。亦有

可取。其間或失仲景本意。未符古聖之經。愈令後人學之難也。況仲景之世。四升乃唐宋之一升。四兩爲之一兩。向者人能勝毒。及多咬咀湯劑。有異今時之法。故今人未知其然。而妄謂時世之異。以爲無用。而多不習焉。唯近世朱奉議多得其意。遂以本仲景之論。而兼諸書之說。編集作活人書二十卷。其間亦有未合聖人之門多。其方衆。其言直。其類辯。使後學者易爲尋檢施行。故今之用者多矣。然意者往往但相背而已。由未知陰陽變化之道。所謂未極假令。金極似火。火極似水。水極似土。土極似木者也。故經曰。亢則害承乃制。謂已亢過極。則反似勝己之化也。俗未之知。認假作是。以陽爲陰。失其意也。嗟夫。醫之妙用。倘在三墳。概夫經所著通者。必欲和於後人。非但務衡而已。昔仁人之心也。非不盡其善也。鮮矣。豈欲自涉非道而亂聖經。以惑人志哉。自古如斯。聖狀義書。卦非聖人孰能明其意。況萬餘言。至周文王方始立象演卦。而周公述爻。後五百餘年。孔子以作十翼。而易書方完。然後易爲推究。所習者衆。而注說者多。其間或所見不同。而互有得失者。未及於聖。竊窺道教故也。易學體乎五行八卦。儒教存乎三綱五常。醫教要乎五運六氣。其門三。其道一。故相須以用。而無相失。蓋本教一而已矣。若忘其根本。而求其華實之茂者。未之有也。故經曰。夫五運陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。可不通乎。仙經曰。大道不可以籌算。道不在數。故也。可以籌算者。天地之數也。若得天地之數。則大道在其中矣。經曰。天地之至數。始於一而終於九。數之可十。推之可百。數之可千。推之可萬。萬之不可勝數。然其要一也。又云知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。又云至數之機。迫迮而微。其來可見。其往可追。敬之者昌。慢之者亡。無道行私。必得天殃。又云治不法天之紀。地之理。則災害至矣。又云不知年之所加。氣之興衰。虛實之所起。不可以爲工矣。由是觀之。則不知運氣而求醫。無失者鮮矣。今詳內經素問。雖已校正。故誤音釋。往往尙有失古聖之意者。愚依舊之。未必不曰爾何人也。敢言古昔聖賢之非。嗟夫。聖人之所爲。自然合於規矩。無不中其理者也。雖有賢哲。後之學者。有可依據。然雖所論未備諸病。仍爲道要。若能以意推之。則思過半矣。且所述者衆。所習者多。故自仲景之後。有缺錄七一卷。而不得自然之理。亦豈能盡善而無失乎。況經秦火之殘文。世本稀少。故自仲景至今。甫踰千歲。凡著述醫書。過往古者八九倍矣。夫三墳之書者。大聖人之教也。法象天地。理合自然。本乎大道。仲景者。啚聖也。雖仲景之書未備聖人之教。亦幾於聖人。文亦玄奧。以致今之學者。尚爲難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。況仲景之書。復經太醫王叔和撰次。道方唐開寶中節度使高繼沖編集進上。雖二公操心用智。自出心意。廣其法術。雜於舊說。亦有

幷其要辭理祕密。難粗論述者。別撰玄珠。以陳其道。凡所加字。皆朱書其文。使今古必分。字不雜糅。然則豈但僕之言哉。設若後人或怒王冰林億之輩。言僞有訛謬者。弗去其註而惟攻其經。則未必易知而過其意也。然而王冰之註善則善矣。以其仁人之心而未備聖賢之意。故其註或有失者也。由是校正改誤者。往往證當王冰之所失。其間不見其失而不以改證者。不爲少矣。雖稱正改誤而或自失者亦多矣。嗚呼。不唯註未盡善而王冰濫移加減之經。亦有臆說而不合古聖之意者也。雖言凡所加字皆朱書其文。既傳于世。卽世文皆爲墨字也。凡所改易之間。或不中其理者。使智者以理推之。終莫得其眞。豈知未遠眞理而不識其僞所致也。近世所傳之書。若此說者多矣。然而非其正理而求其眞意者。未之有也。但略相背而已。雖今之經與註。皆有舛訛。比之僞者。則亦易爲辨矣。若非全元起本及王冰次註。則林億之輩。未必知若是焉。後之知者多因之也。今非先賢之說者。僕且無能知之。蓋因諸僞說而方入其門。就覩既久而粗見得失。然諸僞失而今有得者。非謂僕之明也。因諸僞說之所得者。以意類推而得其眞理。自見其僞。亦皆古先聖賢之道也。僕豈生而知之者哉。夫別醫之得失者。但以類推運氣造化之理而明可知矣。觀夫世傳運氣之書多矣。蓋舉大綱乃學之門戶。皆歌頌鈐閫而已。終未備其體用。及互有得失。而惑人志者也。況非其人。百未得於經之一二。而妄撰運氣之書。傳於世者。是以矜己惑人而莫能彰驗。致使學人不知其美。俾聖經妙典日遠日疎。而習之者鮮矣。悲夫。世俗或以謂運氣無徵。而爲惑人之妄說者。或但言運氣爲太道玄機。若非生而知之。則莫能學之者。由是學者寡而知者鮮。設有攻其本經而復有註說雖寫之誤也。況乎造化玄奧之理。未有比物立象以詳說者也。僕雖不敏。以其志慕蓋道。而究之以久。略得其意。情乎天下尚有未若僕之知者。蓋乎所見而輒伸短識。本乎三墳之墾經。兼以衆賢之妙論。編集運氣要妙之說。十萬餘言。九篇三部。勒成一部。命曰內經運氣要旨論。備見聖賢經之用矣。然妙則妙矣。以其妙道乃爲對病臨時處方之法。猶恐後學未精貫者。或難施用。復宗仲景之書。率參聖賢之說。推夫運氣造化自然之理。以垂傷寒雜病脈證方論之文一部三卷十萬餘言。旨曰醫方精要宜明論。凡有世說之誤者。詳以此證明之。庶令學者眞僞自分。而易爲得用。且運氣者得於道同。蓋明大道之一也。觀夫醫者唯以別陰陽虛實提爲樞要。識病之法。以其病氣歸于五運六氣之化。明可見矣。謹率經之所言。二百餘字。兼以語辭二百七十七言。統歸五運六氣而已。大凡明病陰陽虛實。無越此法。雖已非載前之二缺。復慮世俗多出妄說。有違古聖之意。令特舉二百七十七字。獨爲一本。名曰素問玄機原病式。遂以比物立象。詳論天地運氣造化自然之理。二萬餘言。仍以救證世俗謬說。雖不備舉其誤。其意足可明矣。雖未備論諸疾。以此推之。則識病六氣陰陽虛實。幾于備矣。蓋未運氣言象之意。而得其自然神妙之悟理。易曰。書不盡言。言不盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。老子曰。不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。蓋由規矩而取方員也。夫運氣之道者。猶諸此也。嗟夫。僕勉述其文者。非但欲以美於己而非於人。矜於名而尚於利也。但貴學者易爲曉悟而行無枉錯耳。如通舉內經運氣要旨論及醫方精要理明論者。欲令智者求其備也。其間或未臻其理者。幸以將來君子以改正焉。但欲同以宣揚古聖之妙道。而普救後人之生命爾。

素問玄機原病式例

五運主病

諸風掉眩。皆屬（肝木。）

諸痛痒瘡。皆屬（心火。）

諸濕腫滿。皆屬（脾土。）

諸氣膹鬱。病悉屬（肺金。）

諸寒收引。皆屬（腎水）。

六氣爲病

諸暴強直。皆屬（風。）是厥陰風木。乃肝脈之氣也。

諸轉反戾。水液渾濁。皆屬於（熱。）手少陰君火。乃心脈之氣也。

諸病胕腫。痛酸。注下。重著。小便渾濁。腹脹大。皆屬於（濕。）是太陰濕土。乃脾胃之氣也。

寒熱。瘧。血溢。血泄。衄蓄。身熱。悉寒。慄。驚惑。悲笑。謑妄。呼罵。及毒。

諸禁強直。積飲。脇中滿。霍亂。吐下。體重。腑腫。肉如泥按之不起。皆屬於（火。）手少陽相火之熱。乃心包絡之氣也。

諸熱瞀瘈。暴病暴盲。目赤。腫痛。疼痛。氣逆。衝上。禁慄如�素問玄機原病式　一　四

諸澁枯澁。乾勁皺揭。皆屬於（燥。）手陽明經金。乃肺即大腸之氣也。

諸病上下所出水液。澄徹清冷。嘐瘧痼疝。堅痞腹滿急痛。下利清白。食已不飢。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。皆屬於（寒。）足太陽寒水。乃腎與膀胱之氣也。

右正文二百七十七字。散見於素問及王太僕註。劉守眞撮其要以述此編。

素問玄機原病式

金　河間處士劉完素守眞述

五運主病

諸風掉眩。皆屬（肝木）

掉。搖也。眩。昏亂旋運也。風主動故也。所謂風氣甚而頭目眩運者。由風木旺。必是金衰不能制木。而木復生火。風火皆屬陽。多爲象化。陽主乎動。兩動相搏。則爲之旋轉。如春分至小滿爲二之氣。乃君火之位。自大寒至春分七十三日爲初之氣。乃風木之位。故春分之後。風火相搏。則多起飄風。俗謂之旋風是也。四時皆有之。由五運六氣。千變萬化。衝激擊搏。推之無窮。安得失時而便謂之無也。但有微甚而已。人或乘車羅馬。登舟環舞而眩運者。其動不正而左右紆曲故（經曰。）曲直動搖。風之用也。眩運而嘔吐者。風熱甚故也。

諸痛痒瘡。皆屬（心火）

人近火氣者。微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而爲瘡。皆火之用也。或痒疼如針輕刺者。猶飛進火星灼之然也。痒者美疾也。故火旺于夏。而萬物莽鮮榮美也。炎之以火。消之以潤。而痒轉甚者。微熱之所使也。因而痒去者。熱令皮膚縱緩。腠理開通。陽氣得泄。熱散而去故也。或反熱皮膚痒而以冷水沃之不去者。寒能收斂。腠理閉密。陽氣鬱結。不能散越。怫熱內作故也。痒得痛而痒去者。爬令皮膚辛辣而屬金化。辛能散。故金化見則火力分而解矣。或云。痛爲實。痒爲虛者。非謂盡爲寒也。正謂熱之微甚也。或疑瘡瘍皆屬火熱。而反腐爛出膿水者何也。猶穀肉果菜。至于熱極。則腐爛而消爲汙水也。濕而腐爛者。水之化也。所謂五行之理。過極則勝己者反來制之。故火熱過極則反兼於水化。又如腎能固物。令不腐爛者。鹹寒水化。制其火熱。使不過極。故得久固也。萬物皆然。

諸濕腫滿。皆屬（脾土）

地之體也。土熱極甚。則蒸鬱風濕。物濕亦然。故長夏屬土。則應物隆盛也。

諸氣膹鬱病喘。皆屬（肺金）

膹。謂膨滿也。鬱。謂奔迫也。喘。謂手足痿弱。撫力以運動也。大抵肺主氣。氣爲陽。陽主輕清而升。故肺居上部。病則其氣膨滿奔迫。不能上升。至於手足痿弱。不能收持。由肺金本燥。燥之爲病。血液衰少。不能營養百骸故也。（經曰。）手指得血而能攝。掌得血而能握。足得血而能步。故秋金旺則寒氣發鬱。而草木萎落。病之象也。萎猶痿也。

諸寒收引。皆屬（腎水）

收斂引急。寒之用也。故冬寒則拘縮矣。

六氣爲病

風類

諸暴強直。支痛繞戾。裏急筋縮。皆屬於（風）陳陰風木。乃肝膽之氣也。

暴。卒也。虐。害也。頑勁有力而不柔和也。直。筋勁強也。支痛。支持也。堅固支持。筋緊不柔而痛也。繞戾。繞縮也。戾。乖戾也。謂筋縮裏急。乖戾失常而病也。然燥金主於緊斂。短縮勁切。風木爲病。反見燥金之化。由亢則害。承乃制也。況風能勝濕而爲燥也。亦十月風病勢甚而成筋緩者。燥之甚也。故諸風甚者。皆屬於燥。

熱類

諸病嘔。嘔。吐酸。暴注下迫。轉筋。小便渾濁。腹脹大。皺皰瘡瘍。瘡疹。瘍。瘡氣。結核。吐下霍亂。禁慄。腫脹。鼻塞。鼽。衄。血溢。血泄。淋。蓄身熱。惡寒戰慄。驚惑悲笑。譫妄。妄。衄血汗。皆屬於（熱）手少陰君火之熱。乃濕心小腸之氣也。

嘔。胃脘熱甚則爲嘔。火氣炎上之象也。

吐酸者。肝木之味也。由火盛制金不能平木。則肝木自甚。故爲酸也。如飲食熱。則易於酸矣。或言吐酸爲寒者。誤也。又如酒之味苦而性熱。能養心火。故飲之則令人色赤氣和。脈洪大而爽。語澁譫妄。歌唱悲笑。喜怒如狂。冒昧健忘。煩渴嘔吐。皆熱證也。其吐必酸。爲熱明矣。況熱則五味皆厚。（經曰。）在地

爲化。化生五味。脾屬土也。然土旺勝水不能制火。則火化自甚。故五味熱食。則味皆厚也。是以肝熱則口酸。心熱則口苦。脾熱則口甘。肺熱則口辛。腎熱則口鹹。或口淡者。胃熱也。胃屬土。土爲萬物之母。故胃爲一身之本。淡爲五味之本。然則吐酸嘈吞酸。故俗醫主於溫和脾胃。豈知（經言）人之傷於寒也。則爲病熱。蓋寒傷皮毛。則腠理閉密。陽氣鬱結不通暢也。則爲熱也。故傷寒身表熱者。熱在表也。宜以麻黃湯汗之。大便不黑者易治。黑者難治。諸痢同法。然辯別色黑亦有爲熱者。由火熱過極。則反兼水化制之。故色黑也。如傷寒陽明病熱極。則口燥潮熱。甚則不識人。循衣摸床。獨語如見鬼狀。法當大承氣湯下

頭目昏重口苦舌乾咽嗌不利小便赤澁大便祕滯脈皆面數者皆熱證也凡帶下者亦多有之果皆病寒豈能若此（經曰）亢則害承乃制謂亢過極則反衰勝己之化制其甚也如以火鍊金熱極則反寒水又如六月熱極則物反出液而濕潤林木流津故肝熱甚則出淚心熱甚則出汗脾熱甚則出涎腑熱甚則出涕腎熱甚則出唾亦猶煎湯熱甚則沸溢及熱氣蒸蒸于物而生津者也故下部任脈溫熱甚者津液湧溢而爲帶下也且見俗醫治白帶下者但依近世方論而用辛熱之藥病之微者雖或誤中能令鬱結開通氣液宣行流濕潤燥熱散氣和而愈甚其或劇甚而鬱結不能開通者舊病轉加熱證新起以至于死終無所悟良若以辛苦寒藥按法治之使微者甚者皆得鬱結開通濕去燥除熱散氣和而愈無不中其病而免加其害且如一切怫熱鬱結者不必止以辛甘熱藥能開發也如石膏滑石甘草葱豉之類寒藥皆能開發鬱結以其本熱故得寒則散也夫辛甘熱藥皆能發散者以力強開衝也然發之不開者病熱轉加也如桂枝麻黃類辛甘熱藥攻表不中病者其熱轉甚也是故醫用之者須加寒藥不然則恐熱甚發汗者用辛甘熱藥苟不中其病尚能加害況裹熱鬱結不當發汗而誤以熱藥發之不開者乎又如傷寒表熱怫鬱操而無汗發令汗出者非謂辛甘熱藥開陽能令汗出也由怫熱鬱結開通則熱蒸而自汗出也不然則平人表無怫熱者服之安有如斯汗出也其或傷寒日深表熱入裏而誤以辛甘熱藥汗之者不惟汗不能出而又熱病轉加古人以爲當死者也又如表熱服石膏知母甘草滑石葱豉之類寒藥汗出而解者及熱病半在裏半在裏服小柴胡湯寒藥能令汗而愈者熱甚服大柴胡湯下之更甚者小承氣湯調胃承氣湯大承氣湯下之發黃者茵陳蒿湯下之結胸者陷胸湯丸下之此皆大寒之利藥也反能中病以令汗出而愈然而中外怫熱鬱結燥而無汗豈但由辛甘熱藥爲陽能開發汗出也況或病微者不治自然作汗而愈者也所以能令作汗之由者但怫熱鬱結復得開通則熱蒸而作汗也凡治上下中外一切怫熱鬱結者法當倣此隨其淺深察其微甚適其所宜而治之慎不可惡如發表但以辛甘熱藥而已大抵人既有形不能無病有生不能無死然而病者當按法治之其有病已危極未能取效者或已衰老而眞氣傾竭不能扶救而死者此則非醫者之過也若陰陽不審標本不明誤投湯藥實虛虛而致死者誰之過歟且如酒之味苦而性熱能發心火久飲之則腸胃怫熱鬱結而氣液不能宣通令人心煩悶亂胸滿不能多食穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故喜嘔而或下氣也膜窄水穀衰少則陽氣自甚而又洗嗽勞動兼湯漬之則陽氣轉甚故多嘔而或昏眩也俗云酒隔病耳夫表裏怫熱鬱結者得暖則稍得開通而愈得寒則轉閉而病加由是喜暖而惡寒今酒隔者苦欲冷酒或酒不佳或不甚而強飲者腸胃鬱結轉閉而滿悶不能下也或素欲興者或熱欲醉酒者或喜飲者能令鬱結開通善多飲也因而過醉則陽氣益甚而陰氣轉衰酒力散則鬱結轉甚而病加矣天中酒熱毒反熱飲以復投者令鬱結得開而氣液皆復得宣通也凡酒病者必須續續飲之不然則病甚不能飲鬱結不得開故也

凡鬱結甚者轉惡寒而喜暖所謂亢則害承乃制而陽極反似陰者也俗未明之因而妄謂寒病裹以熱藥攻之或鬱者鬱結開通而不再結氣和而愈也甚者稍得開通而藥力強則鬱結轉甚也甚減即微其加卽甚俗無悟但云藥至卽稍減藥去卽病加推恨藥小未能盡除因而恣心服之以至怫熱太甚則中滿腹脹而腸腫也若小便澁而濕熱內甚者故發黃也猶物濕熱者蒸之而發黃也世俗多用巴豆大毒熱藥以治酒隔者以其辛熱能開發腸胃之鬱結也微者結散而愈甚者鬱結不開怫熱轉甚而病加也恨其滿悶故多服以利之或得結滯開通而愈者以其大毒性熱然雖鬱結得開余亡血液指其陰氣故或結後怫熱再結而病轉甚者也因思得利時愈而復利之如前之說以利三五次間則陰氣衰殘陽熱太甚而大小便赤澁發黃腹脹腫滿也或濕熱內甚而時復溏泄也或但飲食而怫熱鬱結亦如酒病轉成水腫者不爲少矣終不知怫熱內作則脈必沉數而實法當辛苦寒藥治之結散熱退氣和而已或勞甚鬱結不能開通者法當辛苦寒藥下之熱退結散而無鬱結也所謂結者怫鬱而氣液不能宣通也非謂大便之結硬耳或云水腫者由脾土衰虛而不能制其腎水則水氣妄行而脾主四支故水氣遊走四支身面俱腫者似是而實非也夫治水腫服脹以辛苦寒藥爲右而大利其大小便也（經曰）中滿者治之于內然則豈爲脾土之虛也此說正與素問相反（經曰）諸濕腫滿皆屬脾土（又云）太陰所主附腫（又云）勝濕則濡泄甚則水閉附腫皆所謂太陰脾土濕氣之實甚也又（經曰）諸腹脹大皆屬于熱（又云）諸附腫疼酸驚駭皆屬于火（又曰）熱勝則附腫皆所謂心火實熱而安得言脾虛不能制腎水之實甚乎故諸水腫者濕熱之相兼也如六月濕熱太甚而庶物隆盛水腫之象明可見矣故古人制以辛苦寒藥治之蓋以辛散結而苦燥濕以寒瀉熱而隨其利濕去結散熱退氣和而已所以妄謂脾虛不能制其腎水者但謂數下致之又多水液故也豈知巴豆熱毒耗損腎水陰氣則心火及脾土自甚濕熱相搏則怫鬱痞隔小便不利而水腫也更宜下之者以其辛苦寒藥能除濕熱怫鬱痞隔故也亦由傷寒下之太早而熱入以成結胸者更宜陷胸湯丸寒藥下之又如傷寒誤用巴豆熱毒下之而熱勢轉甚更宜調胃承氣湯寒藥下之者也若夫世傳銀粉之藥以治水腫而愈者以其善開怫鬱痞隔故也慎不可過度而加害爾況銀粉亦能傷牙齒者謂毒氣感於腸胃而精神氣血水穀能勝其毒故毒氣循經上行而至齒齦嫩薄之分則爲害也上下齒縫者手足陽明胃之經也凡用此藥先當固濟側或云陰水偏身而又惡寒正是寒者非也（經言）少陰所至爲惡寒戰慄悲笑謬妄謂少陰有火熱氣之主也詳見下文惡寒戰慄論中

脅脊也熱氣甚則濁亂昏昧也

鬱佛鬱也結滯壅塞而氣不通暢所謂熱甚則腠理閉密而鬱結也如火煉物熱極和合而不能相離故熱鬱則閉塞而不通暢也然寒水主于閉藏而今反屬熱者謂火熱亢極則反兼水化制之故也

腫脹熱勝於內則氣鬱而爲腫也陽熱氣甚則腹脹也火主長而茂形貌彰顯升明舒榮智腫脹之象也鼻塞窒塞也火主膜腫腫脹故熱客陽明而鼻中膜脹則窒塞也或謂塞主閉藏妄以鼻塞爲寒者謬也

蓋陽氣甚於上而側臥則上竅通利而下竅閉塞者謂陽明之脈左右相交而左脈注于右竅右脈注

于左竅。故風熱鬱結病偏于左。則右竅反塞之者也。俗不知陽明之脈左右相交。注于鼻孔。但見側臥則上竅通利。下竅窒塞。反疑爲寒爾。所以否塞之道者。象其肺金之氣縮也。

鼽者。鼻出清涕也。夫五行之理。微則當其本化。甚則兼其鬼賊。故（經曰。）亢則害。承乃制也。（易曰。）燥萬物者莫熯乎火。以火煉金。熱極而反化爲水。及身熱極則反汗出也。水懦柔順而寒極則反冰如地也。土主濕陰。雲雨而安靜。土濕過極。則反爲驟注烈風。雨淫清也。木主温和而生榮。風大則反激而毀折也。金主清涼。秋涼極而萬物反燥也。皆所謂過極則反衰鬼賊之化。制其甚也。由是肝熱甚則出涕。心熱甚則出汗。脾熱甚則出涎。肺熱甚則出涕。腎熱甚則出唾也。（經曰。）鼻熱者出濁涕。凡痰涎諸睡稠濁者。火熱極甚。銷爍致之然也。或言鼽爲肺寒者誤也。彼但見鼽窒鼻塞則甚。遂以爲然。豈知寒傷皮毛。則腠理閉密。熱極怫鬱而病愈甚也。

勞者。陽熱怫鬱于於足陽明而上熱甚。則血妄行爲鼻衄也。

血溢者。上出也。心發於血。故熱甚則血有餘而妄行。或謂喘吐紫凝血爲寒者。誤也。此非冷疑。由熱甚銷爍以爲燔濁。而熱甚則水化制之。故亦發黑而爲紫也。

因而成鬲。不爲少矣。可不慎歟。

血泄。熱客下焦而大小便血也。

淋。小便澁痛也。熱客膀胱。鬱結不能滲泄故也。或曰。小便澁而不通者爲熱。遺尿不禁者爲冷。豈知熱甚旋溺澁失。不能收禁也。（經曰。）目得血而能視。耳得血而能聽。手得血而能攝。掌得血而能握。足得血而能步。腦得血而能滿。脈得血而能氣。夫血隨氣運。氣血宣行。則其中神自清利。而應機能爲用矣。（又曰。）血氣者人之神。不可不謹養也。故諸所運用時習之。則氣血通利而能爲用。閉塞之則氣血鬱結之微甚。有不川之大小焉。是故目鬱則不能視色。耳鬱則不能聽聲。鼻鬱則不能別香臭。舌鬱則不能知味。至如筋攣骨痺。諸所出不能爲用。皆熱甚鬱結之所致也。故仲景論少陰病熱極曰漫便道失。狂言目反有視者。腎先絕也。（靈樞經曰。）腎主二陰。然水衰虛而怫熱客其部分。二陰鬱結。則痛痺而神無所用。故漫使遺失而不能禁止。然則熱證明矣。是故世傳方論。雖曰冷淋。復用檢皮黃芩遠志多伏苓通草雞蘇鬱金仁梔子之類寒藥治之。而已。其說雖妄。其方乃是由不明氣運變化之機。宜乎於地之內外乎。其地中寒燠者。（經言。）火熱主於出行。寒水主於閉藏。故天氣熱則地氣通泄而出行。故地中寒也。猶人汗出之後。體涼。天氣寒則地凝凍而閉塞。氣難通泄。故怫鬱而地中煖也。（經言。）要藥也。蓋醇酒益智之性。雖熱而茴香之性温。滑石之性寒。所以能開發鬱結。使氣液宣通。熱散而愈也。

閟。俗作祕。大便澁澀也。熱耗其液。則糞堅結。而大腸燥澀緊斂故也。謂之風熱結者。謂火甚制金不能平木。則肝木自旺。故也。或大便溏而閟者。燥熱在于腸胃之外。而温熱在內故也。義同泄痢後重之義。見下迫論中。

身熱惡寒。此熱在表也。邪熱在表而淺。邪畏其正。故病熱而反惡寒。或言身熱惡寒爲熱在皮膚。寒在骨髓者。皆誤也。仲景法曰。無陽病寒不可發汗。又言身熱惡寒。麻黃湯汗之。汗泄熱去。身涼即愈。然則豈有寒者歟。又如熱生瘧脈猶鴻而證寒者。亦由邪熱在於表也。雖閒。不可汗之。故仲城曰。患瘧者汗之則作。宜大法煩燥多渴。欲寒惡熱。爲病熱也。亦有亢則害。承乃制之。則病熱甚而反覺其冷者也。雖覺其冷。而病爲熱。實非寒也。其病熱鬱甚而反惡寒。得寒轉甚而得煖少愈者。謂發則腠理疎通。而陽氣得散。怫熱少退故少愈也。其寒則腠理閉密。陽氣怫鬱而熱轉甚。故病加爾。上下中外。周身皆然。俗因之妄謂寒病。誤以熱藥投之。爲害多矣。假令或因熱藥以便怫熱稍散而少愈者。藥力亟則病反甚也。其減則微。其加則甚。俗無所悟。但云服之而愈效。力薄而病加。因而加惡服之。由是諸熱病皆生矣。陽熱發則鬱甚于上。故多昏悶。耳聾鳴。上棄麵疾。上熱甚而下熱微。俗難復云。腎水衰弱。不能制心火。妄云虛熱也。抑不知養水瀉火則宜以寒。反以熱藥欲養腎水而令勝退心火。因而成鬲。不爲少矣。可不慎歟。

戰慄動搖。火之象也。陽動陰靜。而水火相反。故厥逆禁固。屈伸不便。爲病寒也。慄者。寒冷也。或言寒戰。及脾寒者。未明變化之道也。此由心火熱甚亢極而戰。反象水化制之。故寒慄也。然寒慄者。由火甚假水實非寒氣有寒氣也。故以大承氣湯下之。多有燥盛下後熱退。則戰慄愈矣。或平人胃極寒而戰慄者。由寒主閉藏。而陽氣不能散越。則怫熱內作故也。如冬寒而地中反煖也。或云。冬陽在內而陰在外。故地上寒而地中煖。夏則反此者。乃眞理也。假令冬至爲地陰極而生陽。上升至夏。則陽在上而陰在地中者。當地上熱而地中寒可也。豈何夏至爲天陽極而生陰。下降至冬。則人地反煖。地上反寒歟。或曰。冬後陽升而出。則陰降而入。夏後陽降而入。則陰升而出者。乃妄意也。如冬至子正一陽生而得其復。至于巳則陰絕而六陽備。是故得其純乾（三純乾。）夏至午正則一陰生而得垢（三垢。）至于亥則陽絕而六陰備。是故得其純坤（三純坤。）至則陽復也。然子後面南。午後面北。乾卦之爻。則子後陽升。午後陰降明矣。安得反言冬後陰降而夏後陽降耶。所謂四時天氣者。皆隨運氣之興衰也。然歲中五運之氣者。風暑燥濕寒各主七十三日五刻。合爲期歲也。歲中六部之主位者。自大寒至春分屬木。故温和而多風也。春分至小滿屬君火。故暄煖也。小滿至大暑屬相火。故炎熱也。大暑至秋分屬土。故多濕陰霪雨也。秋分至小雪屬金。故涼而物燥也。小雪至大寒屬水。故寒冷也。然則豈由陰陽升降於地之內外乎。其地中寒燠者。（經言。）火熱主於出行。寒水主於閉藏。故天氣熱則地氣通泄而出行。故地中寒也。猶人汗出之後。體涼。天氣寒則地凝凍而閉塞。氣難通泄。故怫鬱而地中煖也。（經言。）人之傷於寒也。則爲病熱。又如水本寒。寒極則水冰。如地而水下之水反不寒也。冰厚則水温。但閉藏之道也。或大雪加冰。閉藏之甚。則水大温而魚乃死矣。故子正一陽生而至于正月寅。則三陽生而得泰（三地天泰。）者。通利而非否塞也。午正一陰生而至於七月中。則三陰生而得否（三天地否。）者。否塞而非通泰也。然而否極則泰。泰極則否。故六月泰極則地中至寒。十二月否極則地中至煖。然則地中

寒燥明可見焉。故知人之冒於寒而內爲熱者。亦有之矣。或問曰。人多陽在內而熱。夏陰在內而寒。若五運六氣。與夫一身之氣。皆隨四時何也。答曰。俗已誤之久矣。夫一身之氣。皆隨四時旺而爲笑也。以手自搔而不笑者。不癢不癢故也。然羞慚而癢者。心火之化也。人失信志則羞慚。若水爲寒也。餘候皆然。誠乎人極恐而戰慄者。由恐則心火皆故也。志與信者。腎水之化也。但癢而不羞。羞而不癢。皆不能爲笑。若多言也。言爲心聲。猶火搖而鳴。故心火熱則多言。猶醉而心熱。故多言之徵也。若熱甚則譫妄。自汗發悸。咬牙哆然。所謂腎則發痛不能寢行。手足而氣鬱于內。是故裏熱發也。夫上善若水。下愚如火。故六欲七情上善遠之。而下愚近之。甚夢中喜怒哀樂。好惡愛之七情非分。而過其不可勝者。寐則內熱鬱甚故也。凡人夢者。乃俗云夢中之夢。離道愈遠。夢之覺者。尙爲道之夢也。故成道是爲大覺。則六欲七情莫能干也。古人言夢者。神迷也。病熱而能遷七情者。水衰道遠故也。

妄、虛妄也。火爲陽。故外清明而內昏昧。其主動亂。故心火熱甚。則腎水衰而志不精一。虛妄見聞而自爲問答。則神志失常。如見鬼神也。或以鬼神爲陰而見之。則爲陰極脫陽而無陽氣者。妄意之言也。衄、血汗血出也。汗者渴也。心火熱極。則血有餘。熱氣上甚。則爲血溢。熱勢亢極。則血燥而汗濁。害承乃制。則色兼黑而爲紫也。

濕類

諸痙強直積飲、痞、隔、中滿霍亂吐下、體重、腑腫。肉如泥按之不起。皆屬於濕。痙強直。筋勁強直而不柔和也。土主安靜故也。陰極曰柔。陽極曰剛。剛極亢則害承乃制。故濕勝極則反兼風化制之。然兼化者。虛象而實非風也。

積飲。留飲積蓄而不散也。水得燥則消散。得濕則不消。以爲積飲也。土濕主否故也。痞、與否同。不通泰也。謂精神榮衛血氣津液出入流行之紋理閉密而爲痞也。隔、阻滯也。謂腸胃隔絕而傳化失其常也。

中滿濕爲積飲痞隔而土主形體。位在中央。故中滿也。

霍亂吐下。濕爲留飲痞隔。而傳化失常。故甚則霍亂吐瀉也。

體重。輕清爲天。重濁爲地。故土濕爲病。則體重宜也。

腑腫肉如泥按之不起。泥之象也。土過濕則爲泥。濕爲病也。積飲痞隔。中滿霍亂吐下。體重故甚則腑腫矣。

火類

諸熱瞀、瘈、暴瘖、冒昧、躁擾狂越、驚駭、驚哭、腑腫、疼酸、氣逆衝上。瘈、傑如喪神宇、嘔、嘔、瘈瘲、嗌痛、耳鳴、及聾、瞀、昏也。如酒醉而心火熱甚。則神濁味而昏昏也。嘔涌溢食不下。目昧不明。暴注瞤瘈。暴病暴死皆屬于火。少陽相火之熱。乃心包絡之相火也。

失志。或以輕手搔人頸腹腋脇股膕足跌。令人痒而笑者。由動亂搔擾。火之用也。神順清謐。水之化也。皮腐彰顯之分。屬于火也。嫩薄隱藏之分。屬于水也。以火用搔其水分。使人懶然失志而痒。則水衰火旺而爲笑也。以手自搔而不笑者。不癢不痒故也。然羞慚而痒者。心火之化也。人失信志則羞慚。若水衰火實故也。志與信者。腎水之化也。但痒而不羞。羞而不痒。皆不能爲笑。若化微不能變幽故也。

趣、動也。惕、跳動瘛、火之體也。

燥、猛也。金肺主擊。故五行惟金謂金曰燥于乾。乾爲天。天爲陽。爲健。爲動。金本燥。爲澀。爲收。爲斂。爲勁。燥猛也。金肺主擊。故五行惟金謂金曰燥于乾。乾爲天。天爲陽。爲健。爲動。金本燥。爲澀。爲收。爲斂。爲勁。氣逆衝上。火氣炎上故也。

切、峭刻深。故諸能鳴者。無越此也。凡諸發語聲者。由其形氣之鼓擊也。鼓擊者。乃能動之用也。所謂物

禁慄如喪神守。慄、戰慄也。禁、冷也。又發見君火化中。禁俗作噤。如喪神守者。

失保守形體之神也。

寒則能鳴者。水實制火。火不制金也。其或火旺水衰。熱乘金肺而神濁氣鬱。則暴瘖無聲也。故（經言）

嚏、鼻中肉痒而氣噴作于嗌也。鼻爲肺竅。痒爲火化。心火邪熱干于陽明。發于鼻而痒則嚏也。或故以物

搔之。痒而嚏者。搔痒屬火故也。或視日而嚏者。由日爲五藏神華。太陽真火見耀于目。則心神躁亂而

發熱于上。則鼻中痒而嚏也。傷寒病再經汗而成嚏者。由火熱已渫而虛。熱爲痒。痒發鼻則嚏也。或風

熱上攻。頭鼻壅滯。脈浮而無他證者。內藥鼻中。得嚏則氣滯開通而愈也。或有痛處。因嚏而痛。其不可

忍者。因嚏之氣攻衝結痛。而不得通利故也。

嗢、嬉、瘍。若火化同。

噦、痢、痢不仁也。俗作閉。猶閉塞也。火主腫脹。故熱客上焦。而咽嗌腫眼也。

耳鳴有聲非妄聞也。耳爲腎竅。交會手太陽少陽（陽一作足厥陰少陰少陽之

客其經絡。衝于耳中。則破其聰戶。隨其脈氣。微甚而作諸音聲也。（經言）陽氣上甚而躁。故耳鳴也。

尊之爲病。俗醫率以標悍燥烈之藥制之。往往謂腎水虛冷故也。夫豈知水火之陰陽。心腎之寒熱。羣衞

之盛衰。猶權衡也。一上則必一下。是故高者抑之。下者舉之。此平治之道也。夫心火本熱。虛則寒。夫腎

水本寒。衰則熱矣。腎水既少。豈能反爲寒病耶。（經言）足少陰腎水虛。腰股痛發胭腨。股膝不便。煩冤足痿清厥。意不樂。大便難。善恐心惕。如人將捕。口苦舌乾。咽腫上氣。嗌乾及痛。煩心心痛。黃疸。腸澼下血。舂臀股肉後廉痛。痿厥嗜臥。足下熱而痛。（經又曰）有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍于腎。腎者水藏也。骨熱而體虛。故發骨痿。注言陽氣內伐。謂伐腹中之陰氣也。水不勝火。以熱舍于腎中也。（經又曰）骨痿者。生于大熱也。（又曰）腎熱者。色黑而齒槁。凡色黑齒槁之人。必身瘦而耳焦也。所以然者。水虛則火實而耳焦也。所謂六字之氣。應于水本寒。衰則熱矣。腎水既少。豈能反爲寒病耶。（經言）足少陰腎水虛。則腹滿身重。濡泄趨痿。流水腰股痛發胭腨。股膝不便。煩冤足痿清厥。意不樂。大便難。善恐心惕。如人將捕。口苦舌乾。咽腫上氣。嗌乾及痛。煩心心痛。黃疸。腸澼下血。舂臀股肉後廉痛。痿厥嗜臥。足下熱而痛。以此見腎虛爲病。皆是熱乾及痛。煩心心痛。黃疸。腸澼下血。舂臀股肉後廉痛。痿厥嗜臥。足下熱而痛。以此見腎虛爲病。皆是熱證。（經又曰）有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍于腎。腎者水藏也。骨熱而體虛。故發骨痿。注言陽氣內伐。謂伐腹中之陰氣也。水不勝火。以熱舍于腎中也。（經又曰）骨痿者。生于大熱也。（又曰）腎熱者。色黑而齒槁。凡色黑齒槁之人。必身瘦而耳焦也。所以然者。水虛則火實而耳焦也。所以然者。水虛則火實而熱。亢極則害承乃制。故反兼水之黑也。腎水衰少。不能潤澤。故黑乾焦槁也。齒耳腦腎。皆甚也。如瘍瘍熱極無液。則肉乾焦而色黑也。然則水衰爲熱明矣。豈可反言寒耶。故仙經以息爲六字之氣。應于三陰三陽。藏府之六氣。實則行其本化之字瀉之。虛則行其勝己之字瀉之。是爲殺其鬼賊也。所謂六字之氣者。肝呼。心呵。相火稀。脾呼。肺咽。腎本吹也。故吹去腎寒。則生熱。呵去心熱。則生寒。故曰春不呼。夏不咽。秋不吁。冬不呵。四時常有噓。謂三焦無不足。八節不得吹。謂腎狀難得實。然以吹驗之。吹去腎水寒氣。則陽熱暴甚。面目惧昏眩。虛爲熱證明矣。豈可反言腎虛爲而以熱藥養水邪。況水少不能勝火。又服熱藥。弥無損歟。（經言）以寒治熱。謂寒養水而瀉火。以熱治寒。言以熱治熱。謂病氣熱甚。能與寒藥爭。而寒藥難下。故反熱服。順其病熱。熱病既泄。寒性乃發。則病熱除愈。如承氣湯寒藥反以熱服之類是也。傷寒同法。（經曰）寒因熱用。熱因寒用。亦是治熱類也。

驚、駭、驚擾愕也。若火義同。

腑、熱勝肉而陽氣僞滯故也。

故治病之道。瀉實補衰。平而已矣。或謂病熱爲火實水虛。反言腎虛爲冷。心迷正理。不敢用對證寒藥。誤以食前服其助陽熱藥。欲令下部水勝。退上焦心火。食後依服大寒之藥。亦難解其勢之甚也。況以微涼之藥而退火熱。豈知十會不及一損也。病本熱而無寒。又得熱藥。則病熱轉甚。食後雖服大寒之藥。亦難解其勢之甚也。況以微涼乎。豈不詳熱藥證中。止言治寒助熱。安有養水瀉火之言哉。（經言）五藏以平爲期。及夫一法無問五藏生剋興衰。一槩言熱爲實。寒爲虛者。通言陽氣之興衰也。假令下部寒者。謂下焦火氣之虛也。故以熱藥補之。非助腎水之藥爾。由水虛不能反爲寒也。凡諸疾之所起也。不必藏府興衰變動相乘而病。或間曰。醫既治熱。或服乾蝎生薑附子醇酒之類辛熱之物而愈者。何也。答曰。欲以開發玄府。而令天破無聞。則聽戶玄府閉絕耳而聾無所聞也。故一法香浸針砂酒。以磁石附耳。欲導其氣。令通泄也。耳中鬱潛通泄也。故養生方言。藥中其效則如開百扉。藥音由陽氣開衝耳中也。凡治聾者。適其所宜。若熱證已退而聾不已者。當以辛熱發之。三兩服不愈者。則不可久服。恐熱極而成他病耳。若聾有熱證相兼者。宜以退風散熱涼藥調之。熱退結散而愈。然聾甚閉絕亦爲難矣。愼不可攻之過極。反傷正氣。若非其病不可服其藥。飲食同法。當所宜者。過度則反傷正氣。病已則止藥。欲求不病。無損而已矣。故（經云）大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。常毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。勿令過度。反傷其正。不盡行復如法。故曰必先歲氣。無伐天和。無責胃。無虛虛而張。天殃無致邪。無失正。絕人長命。帝曰。其久病者。有氣從而不康。病去而瘠。奈何。岐伯曰。昭乎哉。聖人之問也。化不可代。時不可違。夫經絡以通。氣血以復。復其不足。與衆齊同。養之和之。靜以待之。謹守其氣。無使傾移。其形乃彰。生氣乃長。命曰聖王。故大要曰。無伐化。無違時。必養必和。待其來復。此之謂也。

于氣味平和無毒之物。但以調其氣爾。氣修道者。以內事爲功。外事爲行。非服餌而望成於道也。故仙經又曰。服餌不備五味四氣而偏食之。久則府藏偏傾而生其病矣。然則豈可誤服熱藥而求其益。所謂毒者。由水衰火實。熱鬱乎上。而使聰戶玄府無窮。神氣不得通泄也。其所驗者。仙經言。雙手閉耳如破甖。是謂鳴天破也。由脈氣流行而閉之于耳。氣不得泄。衝破耳中。故聞之也。或有藥潛。則天破微聞。天破無聞。則聽戶玄府閉絕耳而聾無所聞也。故一法香浸針砂酒。以磁石附耳。欲導其氣。令通泄也。或問曰。聾既熱。或服乾蝎生薑附子醇酒之類辛熱之物而或愈者。何也。答曰。欲以開發玄府。而令耳中鬱潛通泄也。故養生方言。藥中其效則如開百扉。藥音由陽氣開衝耳中也。凡治聾者。適其所宜。若熱證已退而聾不已者。當以辛熱發之。三兩服不愈者。則不可久服。恐熱極而成他病耳。若聾有熱證相兼者。宜以退風散熱涼藥調之。熱退結散而愈。然聾甚閉絕亦爲難矣。愼不可攻之過極。反傷正氣。若非其病不可服其藥。飲食同法。當所宜者。過度則反傷正氣。病已則止藥。欲求不病。無損而已矣。故（經云）大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。常毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。勿令過度。反傷其正。不盡行復如法。故曰必先歲氣。無伐天和。無責胃。無虛虛而張。天殃無致邪。無失正。絕人長命。帝曰。其久病者。有氣從而不康。病去而瘠。奈何。岐伯曰。昭乎哉。聖人之問也。化不可代。時不可違。夫經絡以通。氣血以復。復其不足。與衆齊同。養之和之。靜以待之。謹守其氣。無使傾移。其形乃彰。生氣乃長。命曰聖王。故大要曰。無伐化。無違時。必養必和。待其來復。此之謂也。

嘔涌證食不下。火氣炎上。胃脘熱甚。則傳化失常。故也

目昧（其具切）不明。曰赤腫痛。腦膜胥瘍。皆爲熱也。及目膜。俗謂之眼黑。亦爲熱也。然平白目無所見者。熱氣鬱之甚也。或言目昧爲肝腎虛冷者。誤也。是以妄謂肝主於目。腎主童子。故妄言目昧爲虛而冷也。然腎水冬陰也。虛則當熱。肝木春陽也。虛則當本腎陰肝陽。豈能同虛而爲冷者哉。或通言肝腎之中。陰實陽虛。而無由目昧也。俗妄謂肝腎之氣衰少而不能至於目也。不知（經言）熱甚目瞑。目瞑眼黑也。豈由寒耶。又如仲景言傷寒病熱極。則不識人。乃目青也。正理曰。由熱甚怫鬱於目。而致之然也。然皮膚之汗孔也。謂泄氣液之孔竅也。一名氣門。謂泄氣之門也。一名腠理者。無物不有。人之藏府皮毛肌肉筋膜名鬼神門者。謂幽冥之門也。一名玄府者。謂玄微府也。然玄府者。無形之門戶也。夫氣者。形之主神之母。三才之本。骨髓爪牙。至于世之萬物。盡皆有之。乃氣出入升降之道路門戶也。夫氣不足以長發萬物。由是氣化則物生。氣變則物易。氣甚卽物壯。氣弱卽物衰。氣正卽物和。氣亂卽物病。氣絕卽物死。（經曰）出入廢則神機化滅。升降息則氣立孤危。故非出入則無以生長化收藏。是以升降出入。無器不有。人之眼耳鼻舌身意神識。能爲用者。皆由升降出入之通利也。有所閉塞者。不能爲用也。若目無所見。耳無所聞。鼻不聞臭。舌不知味。筋痿骨痺。齒槁毛墮。落皮膚不仁。腸不能滲泄者。悉由熱氣怫鬱。玄府閉密而致。氣液血脈榮衛精神不能升降出入故也。各隨鬱結微甚而察病之輕重也。故知熱鬱于目無所見也。故曰

微昏者。至近則轉難辨物。由目之玄府閉小也。隔纖視物之象也。或視如蠅翼者。玄府有所閉合著也。或目昏而見黑花者。由熱氣甚而發之於目。亢則害承乃制。而反出其泣。氣液昧之以其至近。故雖視而亦見如黑花也。及衝風泣而目暗者。由熱甚而水化制之也。故（經言）厥則目無所見。夫人厥則陽氣并于上。陰氣并于下。陽氣并于上則火獨光也。陰氣并于下則足寒。足寒則腫也。夫一水不勝五火。故目皆而青。是以衝風泣下而不止。失風之中於目也。陽氣內守於睛。是火氣熾目。故見風泣下。

暴注。卒瀉。若火襲同。

瞤瘛。惕跳動也。火主動。故反熱則脈洪大而長。瞤瘛之象也。況脈者心火之所發也。

暴病暴死。火性疾速故也。斯由平日衣服飲食。安處動止。精魂神志性情好惡。不循其宜而失其常。久則氣變興衰而爲病也。或心火暴甚。而腎水衰弱不能制之。熱氣怫鬱。心神昏冒。則筋骨不用。卒倒而無所知。是爲傷仆也。甚則水化制火。熱甚而生涎。至極則死。微則發過如故。至微者但眩暈而已。俗云暗風。風。由火甚制金不能平木。故風木自甚也。或風熱甚而筋惕。瞤攣傴仆。口出涎沫。俗云風癲病也。欲知病有兼風者。陰陽變化之道也。故陰陽相搏。剛柔相雖。五行相錯。六氣相盪。變而爲病。則無窮矣。大法云。

所謂。是爲傷仆也。甚則水化制火。熱甚而生涎。至極則死。微則發過如故。至微者但眩暈而已。俗云暗風。由火甚制金不能平木。故風木自甚也。或風熱甚而筋惕。瞤攣傴仆。口出涎沫。俗云風癲病也。欲知病有兼風者。陰陽變化之道也。故陰陽相搏。剛柔相雖。五行相錯。六氣相盪。變而爲病。則無窮矣。大法云。

暴注。卒瀉。若火襲同。

瞤瘛。惕跳動也。火主動。故反熱則脈洪大而長。瞤瘛之象也。況脈者心火之所發也。

暴病暴死。火性疾速故也。斯由平日衣服飲食。安處動止。精魂神志性情好惡。不循其宜而失其常。久則氣變興衰而爲病也。或心火暴甚。而腎水衰弱不能制之。熱氣怫鬱。心神昏冒。則筋骨不用。卒倒而無所知。是爲傷仆也。甚則水化制火。熱甚而生涎。至極則死。微則發過如故。至微者但眩暈而已。俗云暗風。由火甚制金不能平木。故風木自甚也。或風熱甚而筋惕。瞤攣傴仆。口出涎沫。俗云風癲病也。欲知病有兼風者。陰陽變化之道也。故陰陽相搏。剛柔相雖。五行相錯。六氣相盪。變而爲病。則無窮矣。大法云。

衆于胸膈。熱燥以爲痰涎。初虛世言。涎者。乃徧身之脂脈津液也。然陽實陰虛。而風熱太甚。以勝水濕。因而成燥。肝主于筋。而風氣自甚。又燥熱加之。液還聚于胸膈。則筋太燥也。然燥金主于收斂。動則緊濇。故爲病筋脈勁強緊急。而口噤也。或破傷中風亦同。但以從微至甚。而不偏枯也。夫破傷中風之偏枯。故不能也。損其有餘者。平調是故能之矣。故瘦者脈理疎通。而多汗泄。血液衰少。而爲燥熱。故多爲勞嗽之疾也。俗以爲卒暴病甚。而爲熱勞。徐久病微。而爲冷勞者。是以遲緩爲言。而病非冷也。識其證候。爲熱明矣。但熱有微甚而已。或言肥人多中風。由氣虛非也。所謂膝理緻密。而多鬱滯。氣血難以通利。若陽熱又甚。而鬱結。故卒中也。故瘦人反中風者。由暴然亡液。損血過極故也。瘦人反中風者。由暴然亡液。損血過極故也。肥人反勞者。由暴然亡液。損血過極故也。

陽熱太甚。而鬱結不通故也。所謂中風口噤。筋脈緊急者。由陽熱暴甚于內。亢則害承乃制。津液涸耗。

風熱勝濕而爲燥。乃燥之甚也。然筋緩不收而痿弱。故諸腦髓病痿。皆屬金肺。乃燥之化也。如秋深燥甚則草木搖落而不收。病之象也。是以手得血而能握。足得血而能步。夫燥之爲病。血液衰少也。而又氣血不能通暢。故病然也。或云筋燥有力則爲實熱。筋緩不收則爲虛寒。者或謂寒主收引。而熱主弛緩。則筋變爲寒。筋緩爲熱者。皆誤也。凡治諸風方通言主療筋脈攣縮。豈分寒熱虛實之異耶。但有微甚而已。故諸筋變。雖勢惡而易愈也。諸筋緩者。雖以平復明可知也。或云中風爲肝木實甚。則大急腦腑脫泄。若脾胃土氣虛損。則土受肝木鬼賊之邪而當死也。當以溫脾補胃。令其土實。肝木不能剋。乃爲燥因而病麻。則宜以濕風散熱活血。養液潤燥。通氣之涼藥調之。則麻自愈也。麻不榮王也。涸無水液也。乾不滋潤也。勁不柔和也。春秋相反。燥濕不同。故也。大法身表熱爲熱在衷。渴飲水爲熱在裏。身熱飲水。表裏俱有熱。身涼不渴。表裏俱無熱。經所不取。火化渴者。謂渴非特爲熱。如病塞吐利亡液過極。則亦燥而渴也。雖病風熱而液尚未衰。則亦不渴。豈可止言渴爲熱而否爲寒也。夫燥渴之爲病也。多屬于熱。故（易曰）燥萬物者莫熯乎火。今言渴爲燥。則亦爲燥則亦偏矣。如大法身涼不渴爲表裏俱無熱。故不言爲寒也。謂表裏微熱。則亦有身不熱而不渴者。不亦宜乎。

痙揭皮膚皸裂也。乾爲天而爲燥金坤爲地而爲濕土。天地相反。燥濕異用。故燥金主於緊斂。所以秋脈緊細而微。濕土主於縱緩。所以六月其脈緩大而長也。如地濕則縱緩滑澤。乾則緊斂燥揭。即可見焉。俗云痙揭爲風者。由風能勝濕而爲燥也。（經言）厥陰所至爲風府爲噫嗌。由風勝濕而爲燥也。所謂寒月甚而暑月衰者。由寒能收斂。腠理閉密。無汗而燥。故病甚也。熱則皮膚緩縱。腠理疎通。而汗潤。故病衰也。或以水濕皮膚而反喜痙揭者。水濕自招風寒。故也。

寒類

諸病上下所出水液。澄徹清冷。撇瘕瘤瘤。堅痞腹滿急痛。下利清白。食已不飢。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。胥屬於（寒）（即太陽寒水。乃腎與膀胱之氣也。）

澄徹清冷。謂而不渾濁也。水體清淨而其氣寒冷。故水穀不化。而吐利清冷。水液爲病寒也。如天氣寒則渴水自澄清也。

瘕。腹中堅硬。按之應手。謂之瘕也。堅惠方謂瘕。猶徵也。然水體柔順而令反堅硬如地。亢則害承。乃制也。故病濕過極。則爲痙。反兼風化制之也。風病過極則反燥。筋脈勁急。反兼金化制之也。病燥過極則類渴。反兼火化制之也。病熱過極而反出五液。或爲戰慄。寒反兼水化制之也。其爲治者。但當瀉其過甚之氣。以爲病本。不可反誤治其兼化也。然而兼化者。乃天機造化抑高之道。難在測知。而造化之道在其中矣。夫五行之理甚而無以制之。則造有自然之理。亦非顯形而有氣也。病雖爲邪。而造化之道在其中矣。夫五行之理甚而無以制之。則造化息矣。如風木旺而多風。風大則反涼。是反兼金化制其木也。大涼之下。天氣反溫。乃火化承乎金也。亙火熱極而體反出液。是反兼水化制其火也。因而濕蒸雲雨。乃土化承乎水也。雨濕過極而兼熱風。乃木化制其土也。濕驟之下。秋氣反涼。乃金化承乎木也。涼極而萬物反燥。乃火化制其金也。因而以爲多寒。乃水化承乎火也。寒極則水凝如地。乃土化制其水也。凝凍極而起東風。乃木化承土而周歲

燥類

諸經枯涸乾勁皴揭。皆屬於（燥）（即陽明燥金。乃陽與大腸之氣也。）

也。凡不明病之標本者。由未知此變化之道也。

瘕腹中雖硬而忽聚忽散。無有常準。故聖惠方云。瘕猶假也。以其病瘕未成癥也。經注曰。血不流而凝滯。故血內流而成瘕也。一云。腹內結病也。（經曰）小腸移熱於大腸。爲虛瘕。爲沉。注曰。小腸熱色移入大腸。兩熱相搏。則血溢而爲伏瘕也。血瀉不利。則月事沉滯而不行。故云虛瘕爲沉。虛與伏同。瘕一爲疝。傳寫誤也。然則（經言）瘕病。亦有熱者也。或陽氣鬱結。怫熱壅滯而堅硬不消者。非寒癥瘕也。宜以脈證別之。

類疝少腹控卵。脈急絞痛也。寒主拘縮故也。寒極而主化制之。故腫滿也。（經言）丈夫癪疝。謂陰氣連少腹急痛也。故言婦人少腹腫。皆肝足厥陰之脈也。經注曰。寒氣聚而爲疝也。又按（難經言）五藏皆有疝。但脈急也。注言脈急者。非急數而洪也。由緊脈主寒象也。然寒則脈當短少而遲。今言急者。非急數而洪也。由緊脈主痛。急爲痛甚。病寒雖急。亦短小也。所以有疝而脈緊急者。脈爲心之所發也。凡六氣爲痛。則心神不寧。而緊急不得舒緩。故脈亦從之而見也。欲知何氣爲其痛者。適其緊急相兼之脈而可知也。如緊急洪數。則爲熱痛之類也。又（經言）脾傳之腎。病名曰疝瘕。少腹煩寃而痛。出白蘞。注言少腹痛。溲出白液也。一作客熱內結。銷爍脂肉。如蟲之食。故名白蘞也。然經之復言熱爲疝瘕。則亦不可止言爲寒。當以脈證別之。

堅痞腹滿急痛。寒主拘縮。故急痛也。寒極則血脈凝泣而反兼土化制之。故堅痞而腹滿也。或熱鬱于內。而腹滿堅結痛者。不可言爲寒也。

下利清白水寒。則清淨明白也。

食已不飢。胃熱則消穀善飢。故病寒則食雖已而不飢也。胃腸潤澤而無燥熱故也。或邪熱不殺穀而腹熱脫滿。雖數日不食而不飢者。不可言爲寒也。由陽熱太甚而變結。傳化失常。故雖不食而亦不飢。亦猶病熱雖甚而無困倦。病愈而始困無力。由胃熱之氣去也。

吐利腥穢。腸胃寒而傳化失常。我子能制鬼賊。則已當自賤。故寒勝火炎金旺。而吐利腥穢也。腥者。金之臭也。由是熱則吐利酸臭。寒則吐利腥穢也。亦猶飯熟熱則易酸。寒則水腥也。

鼎仲不便。厥逆禁固。陰水主于清淨。故病寒則四肢逆冷而猶止堅固。舒泰不便利也。故多脈沉短以救之。而反耗陰氣而衰竭津液。使燥熱轉甚而爲閉懣喘滿結胸腹痛下利不止。血溢血泄。或爲淋閉病之象也。或病寒尚微。而未至于厥逆者。不可反以爲熱。或熱甚而成陽厥者。不可反以爲病寒也。然發黃發狂譫妄。諸熱變證不可勝舉。由此爲破瘀攻堅積之藥。非下熱養陰之藥也。

陰厥者。元病脈候皆爲陰證。身涼不渴。脈遲細而微。未嘗見于陽證也。其陽厥者。元病脈證皆爲陽證。熱極而反厥。時復反溫。雖厥而亦煩渴譫妄。身熱而脈數也。若陽厥極深而至於身冷。反見陰脈微欲絕者。止爲熱極而欲死也。俗皆妄謂變成陰病。且曰陰陽寒熱反變而不可測也。仍取陽主于生。陰主于死之說。急以火艾熱藥溫其表裏。助其陽氣。十無一生。俗因之以爲必死之證。致使舉世大懼。陰證而疑似陰者。急以溫之。唯恐救之不及。而反招暴脫。豈知熱病之將死者。無有逃于此證也。殊不知一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。陰陽以平爲和。而偏爲疾。萬物皆以負陰抱陽而生。故孤陰不長。獨陽不成。陽氣極甚而陰氣極甚。則陽氣怫鬱。陰陽偏頗。而不能宣行。則陽氣奔四支。則手足厥冷。謂之陽厥。故仲景曰。熱深則厥亦深。熱微則厥亦微。又曰厥當下之。下後厥愈。爲以除其裏之熱也。故病熱甚則厥。又以失下。則熱甚而反爲陰證。非反變爲寒病爾。夫病之傳變者。謂中外上下經絡臟腑部分而傳受。爲病之邪氣也。非寒熱陰陽之反變也。注曰。陰陽平則和。偏則病。假令陽實陰虛爲病熱也。若果變而爲寒。則比之熱氣過去。寒欲生時。陰陽平而當愈也。豈能反變之爲寒病歟。然雖（癌論）言陰勝則寒。陽勝則熱者。謂惡氣與邪熱并之于表。則爲邪熱并之于裏。則爲陰勝而寒慄也。由表氣虛而裏氣熱。亢則害。承乃制。故反戰慄也。大抵本熱非病。病熱極而反化爲水。雖化爲水止爲熱極而爲金汁。實非寒也。故不惡寒而反惡熱也。表裏進退不已。故爲寒熱往來也。此氣不并于表裏。故單于裏而寒熱微也。邪熱在裏面深。邪甚無提。物惡裏極。故不惡寒而反惡熱也。表裏進退不已。故爲寒熱往來也。此氣不并于表裏。故單于裏而寒熱微也。

皆熱傳于表裏之陰陽。而非病氣寒熱之陰陽反變也。或病熱而寒攻過極。陽氣損虛。陰氣暴甚。而反爲寒者。雖亦有之。因藥過度而致之。非自然寒熱之反變也。夫六氣變亂而爲病者。乃相兼而同爲病。風熱燥同多兼化也。寒濕性同多兼化也。性異而兼化者有之。亦已鮮矣。或制甚而兼化者。乃虛象也。如火熱甚而水化制之。反爲戰慄者。大抵熱甚而非有寒氣之類也。故渴爲熱飲也。又如以火煉金。熱極而反化爲水。雖化爲水止爲熱極而爲金汁。實非寒也。或操熱太甚。譬于胸腹而脈脈漏飲也。又如以火熱甚而水化制之。反爲戰慄者。大抵熱甚而非有寒氣之類也。故渴爲熱飲也。又如以火煉金。熱極而反化爲水。雖化爲水止爲熱極而爲金汁。實非寒也。或操熱太甚。譬于胸腹而脈脈漏飲也。

胃鬱結。飲冷過多而痞隔不通。留飲不能傳化。浸潤而寒極者。于胃中燥熱太甚。譬于胸腹而脈脈漏飲也。胃鬱結。飲冷過多而痞隔不通。留飲不能傳化。浸潤而寒極者。于胃中燥熱太甚。譬于胸腹而脈脈漏飲也。

煩渴不已。反令胃腦冷痛。嘔噦漿水。而水漿難下。欲止其渴。而強飲于水。則滿煩渴不已。反令胃腦冷痛。嘔噦漿水。而水漿難下。欲止其渴。而強飲于水。則滿

如火熱甚而水化制之。反爲戰慄者。大抵熱甚而非有寒氣之類也。故渴爲熱飲也。又如以火煉金。熱極而反化爲水。雖化爲水止爲熱極而爲金汁。實非寒也。或操熱太甚。譬于胸腹而脈脈漏飲也。

湯熱服下咽。而腸胃鬱結。脈脈即得汗。通而留飲傳化浸潤。則寒濕散于腸胃之外。得其潤澤。熱退而止。不強飲之。則煩渴不可以忍。令人煩寃悶絕。而但欲死。若誤治之。即死。不治亦爲難已。每用大承氣湯熱服下咽。而腸胃鬱結。脈脈即得汗。通而留飲傳化浸潤。則寒濕散于腸胃之外。得其潤澤。熱退而

煩渴滿痛。嘔噦遂止。須臾得利而已矣。然而病諸氣者。必有所因。病本熱而變爲寒者。實亦鮮矣。大凡陽實則脈當實數。而身熱煩渴。熱甚則爲陽厥。至極則身冷脈微而假陰證。以至脈絕而死。故陽病草

陰脈者死。謂其脈近乎絕也。病雖熱甚而不已。則必須厥冷而脈微。以至身冷脈絕而死矣。或病本熱勢太甚。或按法治之不已者。或失其寒藥調治。或因失下。或誤服熱藥。或誤灸間者烙爍炙。以使熱極而爲陽厥者。以承氣湯之類寒藥下之。熱退而寒得宣通。則厥愈矣。慎不可用銀粉巴豆性熱大毒丸藥下之。而反耗陰氣而衰竭津液。使燥熱轉甚而爲閉懣喘滿結胸腹痛下利不止。血溢血泄。或爲淋閉病之象也。或病寒尚微。而未至于厥逆者。不可反以爲熱。或熱甚而成陽厥者。不可反以爲病寒也。然發黃發狂譫妄。諸熱變證不可勝舉。由此爲破瘀攻堅積之藥。非下熱養陰之藥也。古人謂治傷寒者。用銀粉巴豆之類丸藥下之。則如劍刃入也。及晉有陽厥而尚不下。以至身冷脈微而假陰證。

病者。用銀粉巴豆之類丸藥下之。則如劍刃入也。及晉有陽厥而尚不下。以至身冷脈微而假陰證。

反誤以熱藥投之。病勢轉甚。身冷脈微而欲絕。唯心胸微煖。脅冒不知人事。而不能言。主病者。或汲以熱藥急救其陽。恐陽氣絕而死也。答曰。此因熱極失下。反又溫補而致之者。又以熱藥急救其陽。恐陽氣絕而死也。答曰。此因熱極失下。反又溫補而致之者。又

氣暴絕。陽氣亦竭而死。陽氣何由生也。或又曰。何不急下之。答曰。此陽勝伏陰。而陰欲先絕。則陽氣暴絕。陽氣亦竭而死。陽氣何由生也。或又曰。何不急下之。答曰。此陽勝伏陰。

陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。陰陽以平爲和。而偏爲疾。萬物皆以負陰抱陽而生。故孤陰不長。獨陽不成。陽氣極甚而陰氣極甚。則陽氣怫鬱。陰陽偏頗。而不能宣行。則陽氣奔

789

但不令轉瀉。若得陰氣漸生。則可救也。宜用涼膈一服。則陰氣可以漸生。何以知之。蓋以候其心胸溫煖漸多。而厥漸生。爾終日三服。其厥主至沉數而實。身表復煖而唯厥逆。與水藥似有時瞑人之間。證雖安而舌強難言。方以調胃承氣湯下之。獲汗而愈。所謂塞藥反能生厥。而令身煖者。由陽實陰虛。欲至于死。身冷厥微。今以寒藥養陰退陽。而復不至於死故也。大凡治病必先明其標本。標上首也。本根元也。故（經言）先病爲本。後病爲標。標本相傳。先以治其急者。又言六氣爲本。三陰三陽爲標。故病氣爲本。受病經絡臟腑。謂之標也。夫標本微甚。治之逆從。不可不通也。故（經言）知逆與從。正行無問。明知標本。萬舉萬當。不知標本。是謂妄行。陰陽之逆從。標本之謂道也。斯其理歟。



素問病機氣宜保命集

劉完素述

明者。當自傳焉。時大定丙午閏七月中元日。河間劉完素守真述。

夫醫道者。以濟世爲良。以愈疾爲善。蓋濟世者。源乎術。愈疾者。使乎法。故法之與術。悉出內經之玄機。此經固不可力而求。知而得也。況軒岐問答。理非造次。奧藏金丹寶典。深隱生化玄文。爲修行之經路。作達道之天梯。得其理者用如神聖。失其理者似隔水山。其法玄妙。其功深遠。固非小智所能窺測也。若不訪求師範而生穿鑿者。徒勞皓首耳。餘二十有五。志在內經。日夜不輟。殆至六旬。得遇天人。授飲美酒。若醉斗許。面赤若醉。一醒之後。目至心靈。大有開悟。衍其功旨。左右逢源。百發百中。今見世醫多賴祖名。倚約醫方。恥問不學。特無更新之法。縱聞善說。反怒爲非。嗚呼。患者遇此之徒。十誤八九。豈念人命死而不復者哉。仁者鑒之。可不痛與。以此觀之。是未知陰陽變化之道。況木極似金。金極似火。火極似水。水極似土。土極似木。故經曰亢則害。承乃制。謂己亢極。反似勝己之化。俗流未知。故認似作是。以爲陰陽失其本意。經所謂誅罰無過。命曰大惑。醫徒執迷。反肆謗譏。縱用獲効。終無了然之悟。其道難與語哉。僕見如斯。首遇玄機。刊行於世者。已有宣明等三書。革庸病之謬。正俗論之舛訛。實揚古聖之法則。普救後人之命。今將餘三十年間。信如心手親用若神。遠取諸物。近取諸身。比物立象。直明眞理。治法方論。裁成三卷。三十二論。曰之曰素問病機氣宜保命集。此集非崖略之說。蓋得軒岐要妙之旨。故用之可以濟人命。捨之無以活人生。得乎心悱。秘之篋笥。不敢輕以示人。非絕仁人之心。蓋聖人之法。不遇當人。未易授爾。後之

素問病機氣宜保命集總目

卷上

原道論第一　原脈論第二
攝生論第三　陰陽論第四
察色論第五　傷寒論第六
病機論第七　氣宜論第八
本草論第九

卷中

中風論　濕痺附
痞風　破傷風
解利傷寒論　熱論
內傷論　疰論
吐論　霍亂論
瀉痢論　心痛論

卷下
咳嗽論
消渴論
眼目論
漏泄論
婦人論 附卷下
小兒斑疹論
虛損論
腫脹論 附小兒
痢瀉論 附痔口齒
痔疾論
大頭論
藥略針法論

素問病機氣宜保命集卷上

金　河間處士劉完素守眞述

原道論第一

經曰。觀天之道。執天之行。盡矣。蓋天一而地二。北辨而南交。入精神之運以行矣。擬之於象。則水火也。書之於卦。則坎離也。兩者相須。彌滿六合。物物得之。況於人乎。蓋精神生於道者也。是以上古眞人。把握萬象。仰觀日月。呼吸元氣。運氣流精。脫骨換形。執天機而行六氣。分地紀而運五行。食乳飲血。省約儉育。目終時。此其道生之要也。夫道者。能却老而全形。身安而夜流光。獨立守神。肌肉若一。故能壽敝天地。無有終時。此其道生之要也。夫道者。能却老而全形。身安而無疾。夫水火。用法象也。坎離。言交變也。萬億之喜。故以水爲命。以火爲性。士爲人。人爲主性命者也。是以主性命者在乎人。去性命者亦在乎人。何則。脩短壽夭。皆自人爲。故經曰。精神內守。病安從來。又曰。務快其心。逆於生樂。所以然者。性命在乎人。故人受天地之氣以化生性命也。是知形者。生之舍也。氣者。生之元也。神者。生之制也。形以氣克。氣耗形病。神依氣立。氣納神存。脩眞之士。法於陰陽。和於術數。持滿御神。專氣抱一。以神爲車。以氣爲馬。神氣相合。可以長生。故曰。精有主。氣有元。呼吸元氣。合於自然。此之謂也。智者明乎此理。吹噓呼吸。吐故納新。熊怪鳥伸。導引按蹻。所以調其氣也。平氣定息。握固凝想。神宮內視。五臟照徹。所以守其氣也。法則天地。順理陰陽。交構坎離。濟用水火。所以交其氣也。神水華池。舍盧鼓嗽。通行榮衛。入於元宮。漱五臟。服氣於朝。閑想於晝。陽不欲逃。陰不欲覩。錄陰陽也。

以致起居適早晏。出處協時令。忍怒以全陰。抑喜以全陽。泥丸欲多揩。天鼓欲常鳴。形欲常鑑。津欲常嚥。體欲常運。食欲常少。眼者。身之鑑也。常居欲頻脩。耳者。體之牖也。誠腑欲頻治。面者。神之庭也。神不欲擾。髮者。腦之華也。盛不欲誇。體者。精之元也。精不欲竭。明者。身之智也。明不欲耗。補瀉六腑。澡鍊五精。可以固形。可以全生。此皆脩眞之要也。故脩眞之要者。水火欲其相濟。土金欲其相養。是以全生之術。形氣貴乎安。安則有倫而不亂。精神貴乎保。保則有要而不耗。故保而養之。初不離於形氣精神。及其至也。可以通神明之出。皆在於心。獨不觀心爲君主之官。得之所養。則血脈之氣。主而不衰。生之本無得而搖也。神之變無得而測也。腎爲作強之官。得所養。則骨髓之氣榮而不枯。垂對藏之本無得而奪也。夫一身之間。心居而守正。腎下而立始。精神之居。此皆不可太勞。亦不可錫。故精太勞則竭。其處在腎。可以專固之也。神太用則勞。其藏在心。靜以養之。唯精專。然後可以內守。故昧者不知於此。欲拂自然之理。謬爲求補之術。是以僞勝眞。以人助天。其可得乎。

原脈論第二

大道之渾淪。莫知其源。然至道無言。無以明其理。大象無形。非立象無以測其奧。道象之妙。非言不明。嘗試原之。脈者何也。非氣非血。動而不息。榮行脈中。衛行脈外。經曰。脈者血之府也。所不載。無傳記而莫明其名。揭然而玄機奧妙。聖意幽微。雖冥後明哲之士。非輕易可得而悟也。夫脈者。果何物乎。脈者有三名。一曰命之本。二曰氣之神。三曰形之道。經所謂天和者是也。至於折一支。替二日。亦不爲害。生而脈不可須臾失。失則絕命害生矣。經曰。春弦。一曰夏洪。一曰鉤。秋毛。一曰毫。冬石。一曰沉。此言正脈同天眞造化之元氣也。巡於春夏秋冬。木火水金之位。生長收藏。參和應故。不能離於氣。故經曰。出入廢則神機化滅。升降息則氣立孤危。故氣化則物生。故於脈有生死之驗。經曰。脈者血之府也。如世之京都州縣。有公府廨署也。國因營者。所以禁小人爲非道也。公府不立。則善者無以仲其枉。惡者無以詰其罪。邪正混同。賢愚雜處。而亂之根也。經曰。五運陰陽。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。既陰陽爲神明之府。自素問而下。迄於今。經所不載。無傳記而莫明其名。揭然而玄機奧妙。聖意幽微。雖冥後明哲之士。非輕易可得而悟也。夫脈者。果何物乎。脈者有三名。一曰命之本。二曰氣之神。三曰形之道。經所謂天和者是也。至於折一支。替二日。亦不爲害。生而脈不可須臾失。失則絕命害生矣。經曰。春弦。一曰夏洪。一曰鉤。秋毛。一曰毫。冬石。一曰沉。此言正脈同天眞造化之元氣也。巡於春夏秋冬。木火水金之位。生長收藏。參和應故。不能離於氣。故經曰。出入廢則神機化滅。升降息則氣立孤危。故氣化則物生。故於脈有生死之驗。經曰。脈者血之府也。如世之京都州縣。有公府廨署也。國因營者。所以禁小人爲非道也。公府不立。則善者無以仲其枉。惡者無以詰其罪。邪正混同。賢愚雜處。而亂之根也。經曰。五運陰陽。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。既陰陽爲神明之府。脈爲血之府。而脈者

有之以爲利。無之以爲用。又曰。吾不知名字之曰道。強爲之名曰大。斯立脈之名之本意也。故道者。萬物之奧。脈者。百骸之靈。奧靈之妙。其道乃同。元氣者。無器不有。無所不至。血因此而行。氣因此而生。故榮行脈中。衛行脈外。瞬之在前。忽然在後。而不見者。皆由於脈也。分而言之。曰氣。曰血。曰脈。統而言之。惟脈運行血氣而已。故經曰。血氣者。人之神。不可不謹養也。陰陽別論曰。所謂陽者。胃脘之陽也。此陽者。言脈也。胃者。土也。脈乃天真造化之氣也。若土無氣。則何以生長收藏。若氣無土。何以養化萬物。是無生滅也。以平人之氣。常稟於胃。正理論曰。穀入於胃。脈道乃行。陰陽交會。胃和脈行。人稟天地之候。故春胃微弦曰平。得弦而無胃曰死。夏胃微鉤曰平。但鉤而無胃曰死。秋胃微毛曰平。但毛而無胃曰死。冬胃微石曰平。但石而無胃曰死。五藏爲陰。肝脈至中而無外。急如循刀刃。責責然。如按琴弦。心脈至堅而搏。如循薏苡仁。累累然。肺脈至大而虛。如毛羽中人。皮膚。腎脈至搏而絕。如以指彈石辟辟然。脾脈弱而乍數乍疎。夫如此脈者。皆爲藏脈。獨見而無胃脈。長短大小。皮堅肉厚。各隨其狀而脈應之。常以一息四至爲準者。言呼出心與肺。吸入腎與肝。五者胃雜保其生之要者。五穀五菓五蓄五菜也。脾胃待此而食盡備三焦待此而道路通。榮衛待此以清以濁。筋骨待此以柔以正。故經云。蓋五味相濟。斯無五宮之傷。所以養其形也。雖五味爲之養形。若味過於酸。肝氣以津。脾氣乃絕。味過於鹹。大骨氣勞。短肌必氣抑。味過於甘。心氣喘滿。色黑。腎氣不衡。味過於苦。脾氣不濡。胃氣乃厚。味過於辛。筋脈沮弛。精神乃央。所謂失五味之常。而損其形也。王注曰。味有偏絕。此之謂也。飲食者養其形。起居者調其神。是以聖人春三月夜臥早起。被髮緩形。見於發陳之時。且曰使志生。夏三月夜臥早起。無厭於日。見於蕃秀之時。且曰使志無怒。使氣得泄。秋三月早臥早起。與雞俱興。見於容平之時。收斂神氣。且曰使志安寧。以應秋氣。冬三月早臥晚起。去寒就溫。見於閉藏之時。且曰使志若伏若匿。若有私意。若已有得。此順生長收藏之道。春夏養陽。秋冬養陰。順四時起居法。所以調其神也。經所謂逆於春氣。則少陽不生。肝氣內變。逆於夏氣。則太陽不長。心氣內洐。逆於長氣。則秋收。肺氣焦滿。逆於冬氣。則少陰不藏。腎氣獨沉。此失四時之氣。所以傷其神也。智者順四時。不逆陰陽之道。而不失五味損益之理。故形與神俱久矣。乃盡其天年而去。與夫務快其心。逆於生樂者。何足與語此道哉。故聖人行之。賢者佩之。豈虛語哉。

陰陽論第四

論曰。天地者。陰陽之本也。陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。故陰陽不測謂之神。神用無方謂之聖。倘不如此。謂天自運乎。地自處乎。豈足以語造化之全功哉。火哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。所以天爲陽。地爲陰。水爲陰。火爲陽。陰陽者。男女之血氣。水火者。陰陽之徵兆。推水火既濟。血氣變革。然後剛柔有體。而形質立焉。經所謂天覆地載。萬物悉備。莫貴乎人。人稟天地之氣生。四時之法成。故人生於地。懸命於天。人生有形。不離陰陽。蓋人居天之下。地之上。氣交之中。不明陰陽而望延年。未之有也。何則。蒼天之氣。不得無常也。氣之不變。是謂非常。非則變矣。王注曰。且蒼天

布氣。尙不越於五行。人在氣中。豈不應於天道。左傳曰。違天不祥。繫辭云。一陰一陽之謂道。老子曰。萬物負陰而抱陽。故偏陰陽謂之疾。夫言一身之中。外爲陽。內爲陰。氣爲陽。血爲陰。背爲陽。腹爲陰。腑爲陽。臟爲陰。肝心脾肺腎五臟皆爲陰。胃大腸小腸膀胱三焦六腑皆爲陽。蓋陽中有陰。陰中有陽。豈偏枯而爲道哉。經所謂治心病者。必求其本。是明陰陽之大體。水火之高下。消衰之相濟。遠近之大小。陰陽之變通。夫如是。惟達道人可知也。

綵色論第五

論曰。聲合五音。色合五行。聲色符合。然後定立臟腑之綵。枯若滋榮者。其氣生如榮羽。雞冠。鴟腹。豕音。烏羽是也。枯夭者。其氣敗如草茲。脈血枳實。枯骨。如焰是也。至如青赤見於春。赤黃見於夏。黃白見於長夏。白黑見於秋。黑青見於冬。是謂五臟之生者。以五行之相勝也。得肝脈色見青白。心脈色見赤黑。脾脈色見黃青。肺脈色見白赤。腎脈色見黑黃。是謂其臟之見者。以五行之相克也。若乃肺風而眉白。心風而口赤。肝風而目青。脾風而鼻黃。腎風而肌黑。以風善行數變故爾。肺熱而左頰赤。肺熱而右頰赤。心熱而顏赤。脾熱而鼻赤。腎熱而頤赤。以諸熱皆屬火故爾。以至青黑爲痛。黃白爲熱。青白爲寒。以九氣不同故爾。鼻青爲腹水。黑爲水氣。白爲無血。黃爲胃寒。赤爲有風。鮮明爲留飲。而五色取決於此故爾。然審病者。又皆以其脾之爲本。蓋其脾之黃。是謂天之氣。五色又明。病難久而面黃必生者。以其其氣外榮也。此數者雖皆成法。然自非心潛見曉於冥冥。不能至於此。故五色徵診。可以目察尤難。難經曰。望而知之謂之神。爲見五色於外。故決死生也。

傷寒論第六

論曰。夫熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。止於六七日間。若兩感於寒者。必不免於死。經所謂人所傷於寒者。則爲病熱。熱雖甚不死。蓋傷寒者。非雜病所比。非仲景孰能明於此。故張機公深得玄機之理趣。達六經之標本。知汗下之淺深。若投湯劑。正與不正。禍福影響。何暇數日哉。然仲景分三百九十法。一百一十二方。其證有六。其治有四。經云。一日巨陽受之。其脈尺寸俱浮。二日陽明受之。其脈尺寸俱長。三日少陽受之。其脈尺寸俱弦。四日太陰受之。其脈尺寸俱沉。五日少陰受之。其脈尺寸俱微緩。六日厥陰受之。其脈尺寸俱沉而甚。其太陽病者。標本不同。標熱本寒。從標則太陽經病也。故宜發汗。其陽明病者。雖從中氣。標陽本實。從標則肌熱。從本則胃惡寒。若頭項痛。腰脊不得俯。陽明經病。故宜解肌。太陽傳陽明非表裏之傳。若譫語。從本爲實。故宜下便。王注曰。以陽感熱。其少陽病者。標陽本火。從標則發熱。從本則惡寒。前有陽明。後有太陰。若胃脇痛而耳聾。往來寒熱。少陽經病。故宜和解。其太陰病者。標陰本濕。從標則身目黃。從本則腹滿而嘔乾。太陰經病。故宜泄滿下濕。從其本治其標。少陰病者。標陰本熱。從標則爪甲青而身冷。從本則脈沉實而發渴。若口燥舌乾而渴。少陰經病。故宜溫標下本。其厥陰病者。故厥陰之中氣宜溫也。若煩滿靈縮。厥陰經病。故爲熱。宜苦辛下之。故經之。又曰。風淫於內。治以辛涼。肝欲散。急食辛以散之。故木主生榮而主春。其性溫。故風火則反涼而毀折。曰。所爲知標知本。萬舉萬當。不知標本。是爲妄行。又曰。各通其臟。乃懼汗泄非宜之謂也。故明斯六經之

標本。乃知治傷寒之規矩。此所謂證有六也。且如發汗。桂枝麻黃之輩。在皮者汗而發之。葛根升麻之輩。因其輕而揚之法也。承氣陷胸之輩。下者因而竭之法也。瀉心十棗之輩。中滿泄之注也。瓜蒂梔豉者。高者因而越之法也。故明此四治之輕重。可爲了傷寒之繩墨。此之謂其治有四也。若則六經四法。豈有發黃生斑者血之壞證。結胸痞氣之藥過。難經所謂未滿三日可汗而已。其滿三日可潰而已。故仲景曰。太陽病脈浮緊無汗。身疼痛。八九日不解。表證仍在。當發其汗。宜麻黃湯主之。少陰病得三二日口燥咽乾者。急宜大承氣下之。孰敢執於三四日汗泄之定法也。是以聖人尚不盡言。言不盡意。說其大略。此之謂也。經所謂發表不遠熱。攻裏不遠寒。余自製解通聖辛涼之劑。不遵仲景法。桂枝麻黃發表之藥。非余自衒。理在其中矣。故此一時。彼一時。奈五運六氣有所更。世態居民有所變。天以常火。人以常動。動則屬陽。靜則屬陰。內外皆擾。故不可峻用辛溫大熱之劑。縱獲一效。其禍數作。豈曉辛涼之劑。以蓋白鹽鼓大黃。病轉甚。發躁狂衄血。斑出。皆屬熱藥所致。故開發鬱結。不惟中病。令汗而愈。免致辛熱之藥攻表不中。其病轉甚。發躁狂衄血。斑出。皆屬熱藥所致。故善用藥者。須知寒涼之味。況兼施三才。造化通塞之理也。故經所謂不知年之所加。氣之盛衰。虛實之所起。不可以爲功矣。大抵雜病者。氣之常也。隨方面異。其治不全。卒病者。氣之異。其治則同。其愈則異。昔黃帝與四方之問。岐伯舉四治之能。故傷寒之法備矣哉。大矣哉。若視深淵。如迎浮雲。莫知其際。是以知發表攻裏之藥性。察標本虛實之併病。益老少壯弱之所宜。勢逆緩急之變性。切脈明陰陽之分部。詳證狀氣之淺深。故可宜會通之法矣。內經曰。謀慮陰陽。無與衆謀。此之謂也。

病機論第七

論曰。察病機之要理。施品味之性用。然後開病之本焉。故治病不求其本。無以去深藏之大患。故掉眩皆屬於肝。少虛無怒。風勝則動。肝者。罷極之本。魂之居也。其華在爪。其充在筋。以生血氣。其味酸。其色蒼。爲將軍之官。謀慮出焉。此爲陰中之少陽。通於春氣。其脈弦。其病掉眩。皆屬於肝。少虛無怒。風勝則動。肝者。罷極之本。魂之居也。其華在爪。其充在筋。以生血氣。其味酸。其色蒼。爲將軍之官。謀慮出焉。此爲陰中之少陽。通於春氣。其脈弦。王注曰。肝有二布葉。一小葉。如木甲折之狀。故經所謂其用爲動。乃木之爲動。火太過之政亦爲動。蓋火木之主暴速。所以掉眩也。掉搖也。眩亂也。旋運。皆生風故也。是以風火皆屬陽。陽主動。其爲病也。胃脘當心痛。上支兩脇。隔咽不通。食飲不下。甚則耳鳴眩轉。目不識人。善暴僵仆。嘔怒。如人將捕之。凡病肝木風疾者。以熱爲本。以風爲標。故火怒也。虛則目瞤瞖瞖而無所見。耳無所聞。善恐。如人將捕之。凡病肝木風疾者。以熱爲本。以風爲標。故火本不燔。過風例乃熄。肝本不甚熱。因金衰而主肺金不勝心火。木來侵於金。故諸病作矣。其爲治也。燥勝風。王注曰。風自木生。燥爲金化。風餘則制之以燥。肝勝治以清涼。清涼之氣。金之氣也。木氣之下。金氣承之。又曰。風淫於內。治以辛涼。肝欲散。急食辛以散之。故木主生榮而主春。其性溫。故風火則反涼而毀折。

是象金化制其木也故風病過極而反中外燥濕是反兼金化也故非爲金制其本是甚則如此中風偏枯者由心火暴勝而水衰不能制則火實尅金金不能平木則肝木勝而兼於火熱則卒暴僵仆凡治消瘅仆擊偏枯痿厥氣滿發肥貴膏粱之疾也故此藏氣乎則敷和太過則發生不及則委和

諸痛痒瘡皆屬於心靜則神明熱勝則厥心者生之本神之變也其華在面其充在血脈爲陽中之太陽通於夏氣其脈鉤其味苦其色赤爲君主之官神明出焉此陽中之陽也王注曰心形如未敷蓮花中有七空以導引天真之氣神明之宇也經所謂其用爲燥火性燥動其明於外熱甚火赫爍石流金火之極變也焰焰山川旋反屋宇火之災害也故火非同水水智而火愚其性暴迷其爲病也當胸中熱噫乾脇痛寒清於中感而猝太涼革候咳腹中鳴注瀉鶩溏咳逆心脇滿引小腹善暴痛不可反側噫乾面赤色惡腰痛丈夫癲疝婦人少腹痛浮虛飜胃陰股髀膕腨是病皆揭實則喘厥逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨腨則少氣不能振息耳聾嗌乾其爲治也熱勝燥燥自金生熱爲火化金餘則制之以火肺勝則治之以苦又曰金氣之下火氣承之燥淫于內治以苦溫佐以苦辛以苦下之若肺氣上逆急食苦以泄之

王注曰制燥之勝必以苦溫故受乾病生焉是以金主於秋而屬陰其氣涼涼極天氣清明而萬物反燥之以苦辛之以苦下之若肺氣上逆急食苦以泄之

燥之勝必以苦溫佐以甘苦以酸收之以苦發之心欲耎急食鹹以耎故燥若火是金極而反兼火化也故病血液衰也燥金之化極甚則煩熱氣鬱痿弱而手足無力不能收有緩急方有大小此之謂也是以熱耎于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之心欲耎急食鹹以耎之以苦辛以潤之以酸收之以苦泄之肺苦燥急食苦以燥之又曰燥淫所勝平以苦溫平以辛潤之以酸收之以苦泄之

王注曰百端之起皆自心生

天氣黅味而萬物反潤以水出液林木津流及體熱極而反汗液出是火極而反兼水化俗以難辯認以是作非不治已極反攻王氣是不明標本但隨兼化之虛象妄爲其治反助其病而害於生命多矣故此

燥平則升明大過則赫曦不及則伏明

王注曰百端之起皆自心生

諸濕腫滿皆屬脾土味和氣化濕勝則濡泄脾者倉廩之官又名諫議之官五味出焉此至陰之類通於土氣爲其華在唇其充在肌其味甘其色黃故爲倉廩之官又名諫議之官五味出焉此至陰之類通於土氣爲

氣論其五行造化之理同爲熱也故左腎屬水勇子以藏精女子以繫胞右腎屬火遊行三焦興衰之道由於此故七節之傍中有小心是言命門相火也經所謂其變凝冽其眚冰雹其爲病也寒客心痛腰腿諸寒收引皆屬於腎水

濕勝則浮腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮其充在骨其味鹹其色黑爲作強之官伎巧出焉爲陰中陰通於各氣其脈石王注曰腎藏有二形如瓜豆相并而曲附於脊筋外有脂裹裹白裹黑主藏精故德經曰心爲君火腎爲相火是言在腎屬火而不屬水也經所謂膻中者臣使之官喜樂出焉故膻中者在乳之間下合于腎水是火居水位得升則喜樂出焉雖君相二火之持也凡有聲之痛膺金之氣故此藏平氣則審平大過則堅成不及則不從革

諸寒收引皆屬於腎水

濕勝則濡瀉

王注曰脾形象馬歸內包胃腧象上形也其用爲化築四氣聚散復形羣品以主陰中至陰脾也其脈緩王注曰脾形象馬歸內包胃腧象上形也其用爲化築四氣聚散復形羣品以主

既濟肝心肺腎不主於時寄旺四季經所謂善不可見惡不可見也其變驟注其炎燥濕其爲病也附腫痛大關節不利屈伸不便若厥逆痛堅腹滿窘汗實則腹脛腫喘身重汗出惰風虛則胸中痛大小腹痛清厥意不樂王注曰大小腹大小腸也此所謂左腎水發痛也若夫右腎命門相火之爲病少氣癉瘍挾

濕勝則濡瀉

王注曰脾形象馬歸內包胃腧象上形也其用爲化築四氣聚散復形羣品以主

癰腫脇滿胸背首面四肢浮腫腹脹嘔逆痓痙骨痛節有動注下溫瘧腹中暴痛血溢流注精液目赤筋外有脂裹裹白裹黑主藏精故德經曰心爲君火腎爲相火是言在腎屬火而不屬水也經所謂膻中者臣使之官喜樂出焉故膻中者在乳之間下合于腎水是火居水位得升則喜樂出焉雖君相二火之

心熱甚則昏昧暴痛昏悶暴死癉氣結核并躁皆相火熱氣論其五行造化之理同爲熱也故左腎屬水勇子以藏精女子以繫胞右腎屬火遊行三焦興衰之道由於此故七節之傍中有小心是言命門相火也經所謂其變凝冽其眚冰雹其爲病也寒客心痛腰腿

之勝也其爲治也寒勝熱燥勝寒若熱淫于內治以鹹寒火淫所勝平以鹹冷故相火之下水氣承之如水本寒寒急則水冰如地而能載物水發而雹雪是水寒亢極反似火化謂兼化也所謂寒病

故水本寒寒急則水冰如地而能載物水發而雹雪是水寒亢極反似火化謂兼化也所謂寒病

極者反腎滿也左腎不足濟之以水右腎不足濟之以火故此藏水平則靜順不及則溷流大過則流衍諸厥固泄皆屬於下厥謂氣逆固謂氣則肝腎失守失守則不能禁因出入無度燥濕不恆故氣下則

盈也經所謂厥氣上行滿厥去形

諸喘嘔逆皆屬於上肺者藏之長也爲心之華蓋故肺熱葉焦發痿痙是氣鬱不利病喘息而嘔也嘔謂

嘔酸水。火氣炎上之象也。胃高熱甚則爲嘔也。若發火之炎。痰壅則氣。利肺之氣。喘息自調也。道路開通。吐嘔則除。凡病嘔涌溢食。皆屬火也。王注曰。內格嘔逆。食不得入。是有火也。經所謂三陽有餘。則爲痿易。王注曰。易有變常。用自癈弱無力也。故此者。熱之明矣。

諸熱瞀瘈。皆屬於火。熱氣勝。則濁亂昏昧也。瞀示乃昏也。經所謂病筋脈相引而急。名曰瘈者。故俗爲之搐是也。熱勝風搏併于經絡。故風主動而不寧。風火相乘。是以熱瞀瘈而生矣。治法祛風滌熱之劑。折其火勢。熱癒可立愈。若妄加灼火。或飲以發表之藥。則死不旋踵。

諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。禁慄。禁惑。如喪神守。悸動怔忪。皆熱之內作。故治當以制火。制其神守。血榮而愈也。

諸痙項強。皆屬于濕。寒濕同性。水火同居。故足大陽膀胱經。屬水而位下。所以濕可傷也。其脈起目內眥。上額交于巔上。其支別從巔入絡于腦。還出下項。故主項強。太陽表中風。加之以濕。客於經中。內挾寒濕。則筋脈抽急。故痙項強而不柔和也。此太陽寒濕。皆詳有汗無汗。治以流濕祛風。緩發表而愈也。

諸逆衝上。皆屬於火。衝攻也。氣炎上。故作嘔涌溢。食不下也。

諸眼腹大。皆屬於熱。肺主于氣。貴乎通暢。若熱甚則鬱于內。故肺脹而腹大。是以火主長而高茂。形現彰顯。升明舒榮。皆腫之象也。熱去而見白利也。

諸燥狂越。皆屬於火。火實則四支實而能登高也。故四肢者。諸陽之本。經所謂陰不勝陽。則脈流薄。疾病乃狂。是以陽盛。則使人妄語罵詈。不避親疎。神明之亂也。故上善若水。下愈若火。此之謂也。治之以補陰瀉陽。奪其食則病已。

諸暴強直。皆屬於風。暴虐而害也。強勁有力而不柔也。乃厥陰風木勢甚而成。王注曰。陽鬱於內而陰行於外。千金曰。強直爲風。治以瀉火補金。木能自平也。

諸病有聲。鼓之如鼓。皆屬于熱。腹脹大而鼓之有聲如鼓者。熱氣甚則然也。經所謂熱勝則腫。此之類也。是以熱氣內鬱。不攸而聚。所以叩之如鼓也。諸腹脹大而鼓之。皆爲裏證。何以明之。仲景曰。少陰病腹脹不大便者。急下之。宜大承氣湯。所謂土堅勝水則乾。急與大承氣湯下之。以救腎水。故知無寒。其熱明矣。

諸病胕腫。疼酸。驚駭。皆屬于火。胕腫。熱勝內。則陽氣滯。故也。疼酸者。肝之味也。故經所謂二陽一陰發病。主驚駭。王注曰。肝主驚。然肝主之原。其本也。所以驚則心動而不寧也。故火衰水平。治之本也。

諸轉反戾。水液渾濁。皆屬于熱。熱氣燥。燥于筋。故筋轉而痛。應風。屬于肝也。甚則吐不止。喝熱之氣。加之以濕。濕勝也。若三氣雜。乃爲霍亂。故仲景曰。嘔吐而利。名爲霍亂。故有乾霍亂。有濕霍亂。得其吐利。邪氣得出。名濕霍亂也。十存八九。若不得吐利。揮霍撩亂。邪無出路。故有此病。甚則吐不止。喝熱之氣。加之痛急。下利之病生矣。熱至則身熱吐下。發亂離祖。猪瘕。昏昧昏鬱。注下圊癰。腫脹吐噦。鼠血衄血。頭痛骨節變。肉痛。血溢血泄。淋閉之病生矣。王注曰。食已不飢。吐利腥穢。亦寒之疾也。暴痞胃昧。目不識人。躁擾而不渴。故井水煎沸。則自然渾濁也。

諸病水液。澄徹清冷。皆屬於寒。水液爲病寒也。故水清淨。其氣寒冷。水穀不化而吐利。其色白而腥穢。傳化失常。食已不饑。雖有邪熱不殺穀而不饑者。無倦而常好動。其便色黃而酸。王注曰。寒者上下所出。及吐出溺出也。又法曰。小寒之氣。溫以和之。

諸嘔吐酸。暴注下迫。皆屬於熱。流而不腐。動而不息。故吐嘔酸也。酸者。肝木之味。或言吐酸爲寒者。誤也。暴注者。注泄也。乃腸胃熱而傳化失常。經所謂清氣在下。則生飧泄。下迫者。後重裏急。窘迫急痛也。火性急速。而能造物故也。俗云。虛坐努責而痛也。

諸濇枯涸。乾勁皴揭。皆屬於燥。濇枯者。水液氣衰少。血不榮於皮肉。氣不通利。故皮膚皺揭而濇也。及甚則麻痺不仁。涸乾者。水少火多。鑠腐云。燥萬物者。莫熯乎火。故火極熱甚。水液乾而不潤於身。皮膚乃皆裂手足有如斧傷而深三二分者。冬月甚而夏月衰。故法曰。寒能收斂。收斂則燥濇皴揭。熱能縱緩。則滋榮潤澤。皆屬燥金之化也。王注曰。物之生滑利。物之死枯濇。其爲治也。宜開通道路。養陰退陽。涼藥調之。則麻痺不仁濇涸乾勁皴揭。皆得其所。慎無服烏附之藥。經所謂金木水火土運行之致。寒暑燥濕火風臨御之化。則失道可見。民病可謂。凡受諸病者。皆歸於五行六氣勝復盛衰之道矣。王注曰。人生有形。不能無患。既有其患。亦當有逆生化出陰陽者也。故曰。謹守病機。各司其屬。有者求之。無者求之。盛者責之。虛者責之。必先五勝疎其血氣。令得調達。而致和平。此之謂也。

氣宜論第八

論曰。治病必明六化分治。五味五色所主。五臟所宜。五行之運行數。六氣之臨御化。然後明陰陽三才之數。故數之可數者。人中之陰陽也。然所合之數。可得見也。夫陰陽者。不以數推。以象之謂也。經曰。丹天之氣。經于牛女戊分。翰天之氣。經于危室柳鬼。柔天之氣。經于亢氐昴畢。玄天之氣。經于張翼婁胃。所謂戊己分者。奎壁角軫。則天地之門戶也。是以將前三數。與天象。俱明始終之六氣所司之高下。在泉淺深之勝復。左右之間同與不同。三紀太過不及之理。故可分天地之化。產民病之氣宜矣。經所謂太陽司天之政。故歲宜苦以燥之。溫之。陽明司天之政。故歲宜辛苦汗之。清之。散之。又宜以鹹。少陽司天之政。故歲宜以鹹。宜辛。宜酸。滲之。泄之。發之。調氣。故宜以辛苦汗之。清之。散之。又宜以鹹。少陽司天之政。故歲宜以鹹。宜辛。宜酸。滲之。泄之。發之。調氣。塞溫。以調其氣。太陰司天之政。故宜苦燥之。溫之。甚者發之。泄之。不發不泄。則溫氣外淫。肉潰皮折。而水血交流。少陰司天之政。故歲宜以鹹以耎之。而調其上。甚則以苦泄之。厥陰司天之政。故歲宜以辛調之。以鹹潤之。人必折其鬱氣。先發其化源。是以迎而奪之。王氣之法也。故云六氣有餘。用熱遠熱。用溫遠溫。用寒遠寒。用涼遠涼。食宜同法。此其道也。故王注曰。反寒甚。犯熱寒不甚。則不可以犯也。若有裏證。若有表證。故注云。發表不遠熱。攻裏不遠寒。不發不攻。而犯寒犯熱。使寒熱內賊。其病益甚。故無者生之。有者甚之。所以不遠熱則熱至。不遠寒則寒至。其寒至則堅痞腹痛。急下利之病生矣。熱至則身熱吐下。發亂離祖。猪瘕。昏昧昏鬱。注下圊癰。腫脹吐噦。鼠血衄血。頭痛骨節變。肉痛。血溢血泄。淋閉之病生矣。王注曰。食已不飢。吐利腥穢。亦寒之疾也。暴痞胃昧。目不識人。躁擾

狂越讝語爲譫妄。亦熱之病也。故經所謂無失天信。無逆氣宜。無翼其勝。無費其復。是謂至也。倘不知斯寒熱內賊。失氣之宜。因不知四時五行。因加相勝。釋邪攻正。絕人長命。猶不通經。爲粗工之戒。是以六氣上司九宮。中司九元。下司九宜。三數俱明。各分主客。勝復淫治。赶伐主病。藏物氣味之厚薄。故經所謂氣味有厚薄。性用有躁靜。治保有多少。力化有淺深。故少陽在泉。寒毒不生。太陽在泉。燥毒不生。故其氣薄。其味正。少陰在泉。寒毒不生。太陰在泉。燥毒不生。此所謂天化地產。故天地氣合。氣合六節分而萬物化生矣。經所謂謹候氣宜。無失病機。病機者。寒暑燥濕風。金木水火土。萬病悉自此而生矣。故謹察病機之本。得治之要者。乃能愈疾。亦常有不明六氣五行之所宜。氣味之厚薄所用。入身爲病之所由。而能必獲其效者。尠矣哉。

本草論第九

論曰。流變在乎病主。治在乎物。制用在乎人。三者並明。則可以語七方十劑。宣、通、補、瀉、輕、重、澀、滑、燥、濕、是十劑也。大、小、緩、急、奇、偶、復、是七方也。是以制方之體。欲成七方十劑之用者。必本於氣味生成。而陰陽造化之機存焉。是以一物之中。氣味雖有一藥之內。理性不無。故有形者爲之味。無形者謂之氣。若有形以無形之治。喘急昏昧乃生。無形以有形之治。開腸洞泄乃起。經所謂陰味出下竅。陽氣出上竅。土注曰。味有質。故下流便瀉之象。氣無形。故上出呼吸之門。故陽爲氣。陰爲味。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。精食氣。形食味。王注曰。氣化則精生。味化則形長。是以有生之大形精爲本。故地產養形。形不足者。補之以氣。天產養精。精不足。補之以味。形精交養。充實無虧。雖有奇疾。弗能爲害。故溫之以氣者。是溫之以肺。補之以味者。是補之以腎。是以人爲萬物之靈。備萬物之養。飲和食德。以化津液。以淫筋脈。以行榮衛。故經所謂陰之所生。本在五味。五味入口。藏於五臟。五臟化氣。以生五精。五精和合。以養五神。此爲補養之要也。何氣味合而服之。以補精益氣。所以爲全生之術。故五穀之則。穀入於口。而聚於胃。胃爲水穀之海。喜穀而惡藥。藥之邪氣爲先。是以聖人論眞邪之氣者。謂汗生於穀。不歸於藥。石辯死生之候者。謂安穀則生。過期不惟數於五臟。凡明胃氣爲本。以此知五味能養形也。雖藥攻邪。如國之用兵。蓋出于不得已也。是以聖人養表不遠熱。攻裏不遠寒。辛甘發散爲陽。酸苦湧泄爲陰。故辛散酸收甘緩。苦堅鹹耎。隨五臟之病證。施藥性之品味。然後分奇偶大小緩急之制也。故奇偶者。七方四制之法。四制者。大小緩急也。所謂氣有多少。病有盛衰。治有緩急。方有大小。故大小者。君一臣二。奇之制也。君二臣四。偶之制也。又曰奇方云。君一臣二。君二臣四。君二臣六。偶方云。君二臣四。君二臣六。所以七方者。四制之法。奇偶四制。何以明之。假令小承氣湯。調胃承氣爲奇之小方也。大承氣抵當湯爲奇之大方也。所謂因其發而用之者。如此。桂枝麻黃爲偶之小方。葛根青龍爲偶之大方。所謂因其發而用之者。如此。經所謂近者奇之。遠者偶之。身之表者爲遠。身之裏者爲近。汗者不以奇。下者不以偶。不以者。不用也。故補上治上制以緩。補下治下制以急。急則氣味厚。緩則氣味薄。故味厚者爲陰。薄是陰之陽。爲味不純粹者也。故味所厚。則泄之以下。味所薄。則通氣者也。王注曰。味厚則泄薄。則通氣厚者爲陽之陰。氣不純粹者也。故氣所厚則發泄。陽氣炎上。故氣厚則發熱。氣所薄則發泄。經曰薄則發泄。厚則發熱。王注曰。陰氣調下。故味薄則發泄。陽氣炎上。故氣厚則發熱。味薄爲陰少。故通泄。氣薄爲陽少。故汗出。是以論氣味之薄厚。合奇偶之大小。故腎肝位遠。數多則其氣緩。不能速達於下。必大劑而數少。取其迅急。可以走下也。心肺位近。數少則其氣急。不能發散於上。必小劑而數多。取其氣易散。可以補上也。王注曰。肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之常數也。若奇之不去。則偶之。是謂重方也。偶之不去。則反佐以取之。是謂寒熱溫涼。反從其病也。王注曰。是以聖人反其佐以同其氣。令聲氣應合。復令寒熱參合。使其終異而始同。燥潤而敗堅。剛強必折。柔脆自消。衰敗故逆者正治。從者反治。從少從多。觀其可也。假令仲景曰。少陰病下利而脈微者。與白通湯。利不止。厥逆無脈者。乾嘔煩者。白通加豬膽人尿。注曰。若調寒熱之逆冷熱必行。則熱物冷服。下泄之後。冷體其消熱性便發。由是病氣隨愈。嘔穢皆除。情且不違。而致大益。此加人尿豬膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中。要其氣相從。可去格拒之寒也。經所謂熱因寒用。寒因熱用。塞因塞用。通因通用。必伏其所主。而先其所因。其始則同。其終則異。可使破積。可使潰堅。可使氣和。可使必已。此之謂也。若病所遠而中道氣味之者。食而過之。無越其制度。王注曰。假令病在腎。而心之氣味餌而治是。仍急過之。不但以氣味。腎藥凌心。心腹益衰。與上下遠近例同。是以聖人治上不犯下。治下不犯上。和中上下俱無犯。故經所謂誅罰無過。命曰大惠。此之謂也。有中外不相及。其治其主病。皆論標本。不令妄攻也。故從所來者爲本。其所受者爲標。是以內者內調。外者外治。內者調之。不言其治。外者治之。不言其調。經所謂上淫於下。所腹乎之。外淫於內。所勝治之。此之謂也。若從內之外。盛於外。先調其內。而後治其外。從外之內。而盛於內者。先治其外。而後調其內。王注曰。皆謂先除其根底。後削其枝條也。是故病發有餘。本而標之。後治其本。故仲景曰。傷寒腎下之結。得下利清穀。身疼痛者。急當救裏。身疼痛清便自調。急當救表。救表宜桂枝湯。故裏不足。必先救之。清便自調。知裏氣已調。然後急與桂枝湯以救表。是謂病發本而標之。先治其本。後治其標。此以寒爲本也。故知標本者。萬舉萬全。不知標本。是謂妄行。此之謂也。雖本草曰。上藥一百二十種爲君。應天中藥一百二十種爲臣。應人下藥一百二十種爲使。應地。若治病者。特謂此三品之說來也。經所謂有毒無毒。所治爲主。適其小大爲制也。故王病者爲之君。佐君者爲之臣。應臣者爲之使。非上中下三品之謂也。王注曰。但能破積愈疾。解急脫死。則爲良方。非必要以先毒爲是。後毒乃非。有毒爲是。無毒爲非。必盡病輕重大小之常也。帝曰。三品何謂也。岐伯曰。所以明善惡之殊貫也。是以聖人有毒無毒。服自有約。故病有新久。方有大小。有毒無毒。宜合常制矣。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉菓菜食養盡之。無使過之。傷其正也。不盡行復如法。王注曰。法。謂前四約也。餘病不盡。然再行之毒之。小大如約而止。必無大過矣。是以上古聖人謂重身之毒。有故無故。制其大半而止。故藥之性味本以藥治疾。誠能處以中庸。以疾適當。且如半而止之。亦何疑於攻治哉。

此之謂也。故非謂氣而得者。治之奈何。有毒無毒。何先何後。願聞其道。王注曰。夫病生類。其有四焉。一者始因氣動而內有所成。爲積聚癥瘕寒熱痞氣癰起結核瘰癧之類是也。二者始因氣動而外有所成者。謂雁臃腫疥瘡痔瘻浮腫目赤瘭胗附腫痛痒之類是也。三者不因氣動而病生於內。留飲癖食。饑傭勞損。宿食霍亂。悲恐喜怒。想慕憂結之類是也。四者不因氣動而病生於外。爲猝氣賊觸蠱毒蟲尸鬼擊衝薄。壓墜風寒暑濕。斫射刺割捶扑之類是也。如此四類者。有獨治內而可愈。大小承氣陷胸抵當汾三花神祐甑用之類是也。有兼治內而愈者。大小柴胡通聖洗心瀉肺黃連解毒之類是也。有獨治外而愈者。雷丸薯蕷散苦參散千金內托散之類是也。有先治內後治外而愈者。瘭胗丹毒痛瘡瘍獃豆之類。悉因三焦相火熱甚於內。必先疎啓其中。涼苦寒之劑。鹽澤膩附。或以砭射激掃塗抹於外者是也。有先治其外後治其內而愈者。傷寒刺割破傷皆因風寒之邪從外之內。先以發散其外。發之不已。益其淺深。候泄之。有齊毒而攻擊者。暴病大小便不利。胎死壓溺服之類是也。有復無毒而調引者。痰滯氣痞胃虛脾弱。氣不往來。以通經利其氣之藥之類是也。方法所施。悉宜通補瀉輕重澁滑燥濕。

或腸或復。寒者熱之。熱者寒之。溫者清之。散者收之。抑者折之。燥者潤之。急者緩之。剛者柔之。衰者補之。強者瀉之。堅者削之。留者攻之。客者除之。勞者溫之。溫養也。結者散之。燥者濡之。枯者濕之。補也。逸者行之。勞者動之。驚者平之。平常也。常見常聞上之。吐之下之。泄之。壓之。炎之。浴之。漚之。刼之。燔之。針刼其下。隔之。發之。適可爲故。各安其氣。必清必淨。則病氣衰去。歸其所宗。此治之大體也。是以聖人法無定體。體變布施。藥不執方。合宜而用。故論言治寒以熱。治熱以寒。而方士不能盡繩墨。而更其道也。有病熱者寒之而熱。有病寒者熱之而寒。二者皆在新病復起。奈何。治諸寒而熱者。取之以陰。熱之寒者。取之以陽。所謂求其屬也。王注曰。謂治之而病不衰退。反因熱寒而隨生寒熱病之新也。謂其益火之原。以消陰翳。壯水之主。以制陽光。故曰。求其屬也。夫取心者不必齊以熱。取腎者不必齊以寒。取但益心之陽。寒亦通行。若強腎之陰。熱之猶可。此論五味所歸五臟寒熱溫涼之主也。嗚呼。聖人之道。久塞而後之人獨不能之也。王注曰。言少可以貫多。舉淺可以料深。何法之明也。如此。故非聖人之道。孰能至於是耶。是以治病之本。須明氣味之厚薄。七方十劑之法也。方有七。劑有十。故方不七。不足以盡方之變。劑不十。不足以盡劑之用。方不對病非方也。劑不當疾非劑也。今列而論之。七方者大小緩急奇偶復。

大方之說有二。一則病有兼證而邪不專。不可以一二味治之。宜君一臣三佐九之類是也。二則治心肺在上而迫者。宜分兩多而頓復服之是也。

在下而遠者。宜分兩多而頻復服之是也。

小方之說有二。一則病無兼證邪氣專一。可以君一臣二小方之治也。二則治心肺在上而迫者。宜分兩少而頻復服之。亦爲小方之治也。

緩方之說有五。有甘以緩之爲緩方者。爲糖蜜甘草之類。取其繼續也。有丸以緩之爲緩方者。蓋丸之比湯散藥力宜行遲故也。有品味羣雜之緩方者。蓋藥味雜多。各不能騁其性也。有無毒治病之緩方者。蓋藥性無毒。則常補於上。比至其下。藥力既已衰。爲補上

治上之法也。

急方之說有四。有急病急攻之急方者。如顛心暴痛前後閉塞之類是也。有急風蕩滌之急方者。如上補下泄奪其病之不省口噤是也。取湯劑蕩滌取其易散而施攻速者是也。有藥有毒之急方者。如上補下治下之法也。大勢者是也。有氣味厚之急方者。藥之氣味厚者。直趣於下而力不衰也。謂補下治下之法也。

奇方之說有二。有古之單行之奇方者。爲獨一物是也。有病近而宜用奇方者。爲君一臣二。君二臣三。數合於陽也。故宜下不宜汗也。

偶方之說有二。有兩味相配而爲偶方者。蓋兩方相合者是也。有病遠而宜用偶方者。君二臣四。君四臣六。數合於陰也。故宜汗不宜下也。

複方之說有二。有二三方相合之爲複方者。如桂枝二越婢一湯之類是也。有分兩勻同之複方者。如胃風湯各等分之類是也。又曰。重複之複。二三方相合而用也。反復之復。謂奇之不去。則偶之是也。十劑者宜通補瀉輕重澁滑燥濕。

宜者。宜驀而不散。爲蘩必宜劑以散之。如痞滿不通之類是也。本草曰。宜可去壅。必宜劑以散之。如薑橘之屬。攻其裏則宜者上也。泄者下也。湯劑則瓜蒂梔豉之類是也。發汗通表亦同。

通。留而不行爲滯。必通劑以行之。如水病痰癖之類也。本草曰。通可去澁。通草防己之屬。攻其內則通者行也。甘遂滑石伏苓芫花大戟牽牛木通之類是也。

補。不足爲弱。必補劑以扶之。如氣形羸弱之類是也。本草曰。補可去弱。人參羊肉之屬。攻其裏則補養也。

經所謂言而徹。終日乃復言者。此奪氣也。故形不足。溫之以氣。精不足。補之以味。是以賁梁理疾。藥石獨疾。五穀五畜。能補善養也。

瀉。有餘爲閉。必泄劑以逐之。如腹脹脾約之類是也。本草曰。洩可去閉。即葶藶大戟牽牛木通之屬。

上。則生膜脹。故氣不施化而鬱閉不通。所以孳歷大黃味苦大寒。專能洩熱去濕下氣。仲景曰。跌陽脈浮而澁。浮則胃強。澁則小便數。浮相搏大便難。其脾爲約。束津液不得四布。苦寒之劑通瀉潤燥。而能泄胃強也。

輕。雪則氣壅欲其揚也。如汗不發而腠密。邪勝而中蘊。必輕劑以揚之。本草曰。輕可去實。麻黃葛根之屬。

經所謂邪在皮者。汗而發之。其實者。散而泄之。王注曰。陽實則浮。浮而澁。浮則胃強。澁則小便數。浮相搏大便難。其脾爲約。束津液不得四布。苦寒之劑通瀉潤燥。而能泄胃強也。

重。怯則氣浮。欲其鎮也。如喪神守而驚悸。氣上厥。以頭疾。必重劑以鎮之。本草曰。重可去怯。即礬石鐵粉之屬。經所謂厥成爲巔疾。故驚乃平之。所以鎮涎也。故使其物體之重。則涎而用之也。

澁。滑則氣脫。欲其收斂也。如開腸洞洩。便溺遺失。必澁劑以收之。本草曰。澁可去脫。則牡蠣龍骨之屬。如寧神寧聖之類是也。

滑。澁則氣着。欲其利也。如便難內閉。必滑劑以利之。本草曰。滑可去着。即冬葵榆皮之屬。滑能養竅。故謂利也。

燥。濕氣在膀胱。腫滿脾濕。必燥劑以除之。本草曰。燥可去濕。卽桑白皮赤小豆之屬。所以濕甚於上。以苦吐之。淡以泄之是也。

濕。津耗爲枯。五臟痿弱。榮衛澀流。必濕劑以潤之。本曰。濕可去枯。卽紫石英之屬。故痿弱者用之。王注曰。心熱甚。則火獨光。火炎上。腎之脈常不行令。火氣厥逆。火復內熠。陰上陽下。不守位。心氣通脈。故主脈痿。是故腕擗紐如折。去而不相屬。挈筋縱緩而不能任用故也。可下數百行而愈。故此十劑七方者。乃太古先師設繩墨而取曲直。何叔世方士出規矩以爲方員乎。注曰。嗚呼。人之死者但曰命性有盡也。制而用之。將使之無窮。夫惟性無盡。用無窮。故施於品劑以佐使斯人。其功用亦不可一而足也。於是相求者。有氣相感則以意使者。有質同而性異者。有名異而實同者。故蛇之性上竄而引藥。蟬之性脫而退翳。蚕飲血而用以治血。鼠毒穿而用以治瘡。所謂因其性而爲用者如此。彈丸速產以機發而不括也。其所勝下嗌。以杵築下也。謂因其用爲使者如此。葦不沉水。可以勝酒。獨活不搖風。可以治其風。所謂因其所勝而爲之用制也如此。麻木穀而治風。豆水穀而治水。所謂氣相同則相求者如此。牛主耆乳可以止渴。疾豕水畜。心可以鎭忧惚。所謂因其氣相對則相制也如此。熊肉振羆。兎肝明視。所謂因其氣相感則以意使者如此。蜂蜜成於蜂。蜜濕而蜂窒。油本生於麻。麻濕而油塞。蚕同蠶而異性也。醪無生於曾窖。蓬蒿生於覆盆。茲名異而實同者也。所勝而爲之用制也如此之類。不可勝舉。故天地感形。不離陰陽。形色自然。皆有法象。毛羽之類。生於陽而屬於陰。鱗介之類。生於陰而屬於陽。察青法水。色青而主肝。丹法火。色赤而主心。雲母法金。色白而主肺。礵石法水。色黑而主腎。黃石脂法土。色黃而主脾。故觀類而長之。莫不有自然之理也。欲爲醫者。上知天文。下知地理。中知人事。三者俱明。然後可以愈人之疾病。不然則如無目夜遊。無足登涉。動致顚殞。而欲愈疾之先後。人之壽夭生化之期。乃可以知人之形氣天。以天爲壽。雖蓋上聖救生之道。心明經脈藥石之妙。猶未免世中之醫斥也。卿乎醫者。幸詳究焉。

素問病機氣宜保命集卷中

中風論第一

論曰。經云。風者。百病之始。善行而數變。行者。動也。風本生於熱。以熱爲本。以風爲標。凡言風者。熱也。寒和云。熱則生風。冷生氣。是以熱則風動。宜以靜勝其躁。是養血也。治須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損榮。其汗下各得其宜。然後宜治在經。雖有汗下之戒。而有中臟中腑之說。中腑者宜汗之。中臟者宜下之。此雖合汗下。亦不可過也。仲景曰。汗多則亡陽。下多則亡陰。亡陽則損其氣。亡陰則損其形。經曰。血氣者人之神。不可不謹養也。初證表裏不和。須汗下之。表裏已和。是宜治之在經也。其中腑者。面加五色。有表證脈浮而惡寒拘急不仁。或中身之後。或中身之前。或中身之側。皆曰中腑也。其治多易。中臟者。唇緩口不收。舌不轉而失音。鼻不聞香臭。耳聾而眼昏。大小便秘結。皆曰中臟也。其治多難。經曰。六腑不和。流經溪蹺。五臟不和。九竅不通。若外無留結。內無不通。必知在經也。初證既定。宜以大藥發之。當順時令而調陰陽。安臟腑而和榮衛。察病機。辨氣宜。而少有愈者。若風中腑者。則大便多秘澁。宜以三化湯通其滯。表裏證已定。別無他變。故以大藥和治之。大抵中腑者多者四肢。中臟者。多滯九竅。雖中腑者多兼中臟之證。至於舌強失音。久服大藥能自愈也。有中風濕者。夏月多有之。其證身重如山。不能轉側。宜服除濕去熱之藥治之。不可用鍼。可用灸。今具六經續命湯通治八

風五痺痙厥等疾。以一歲爲總。以六經爲別。春夏加石膏知母黃芩。秋冬加桂附。又於六經別藥隨證細分加減。自古名醫不能越此。

凡發中風。必先審六經之候。愼勿用大熱藥烏附之類。故湯劑剛勝。積火燎原。爲消狂瘖狂厥之因。則天癸竭而榮衛涸。是以中風有此誡。故經所謂邪風之至。疾如風雨。易曰。撓萬物者。莫疾乎風。若感之淺者。留於肌膚。感之深者。達骨髓。蓋病患之機。藏於細微。非常人之豫見。及其至也。雖智者不能辭其後。是以聖人之教下。皆謂之虛邪賊風。避之有時。故中風者。俱有先兆之證。凡人如覺大拇指及次指麻木不仁。或手足不用。或肌肉蠕動者。三年內必有大風之至。經曰。肌肉蠕動名曰微風。宜先服八風散。愈風湯。天麻丸。各一料爲効。故手大指次指乎太陰陽明經風多者此經也。先服祛風滌熱之劑。辛涼之藥。治內外之邪。是以聖人治未病。不治已病。又曰。善治者。治皮毛。是止於萌芽也。故初感獲愈。固久者伐形。是治病之先也。

中風之人。如小便不利。不可以藥利之。既得自汗。則津液外亡。小便自少。若利之。使榮衛枯竭。無以制火。煩熱愈甚。當候熱退汗止。小便自行也。兼此證乃陽明大忌。利小便。須當識此中風之人能食者。凡中風病多能食。蓋甲己化土。脾盛故能食。由是多食則脾氣愈盛。土尅制腎水。水虧則病增劇也。病宜廣服藥。不欲服多食。病能自愈。中風多食。風木也。盛則尅脾。脾受敵。求助於食。經曰。實則夢取是也。當瀉肝木。治風安脾。脾安則食少。是其効也。

中風之人。不宜用淮牌犀珠。普之提鈴巡於街。使盜者伏而不出。益使風邪入於骨髓。如油入麵。莫能出也。此之類焉。若痰潮不省。昏憒不知事。宜用藥下其痰涎。故風者。乃百病之長。

小續命湯

麻黃去節　人參　黃芩

川芎　甘草各一兩　防風一兩半　附子半兩　杏仁一兩

右除附子杏仁外。搗爲麤末。後入二味。令勻。每服五七錢。水一盞半。生薑五片。煎至一盞。去滓稍熱服。食前。

凡中風下審六經之加減。雖治之不能去其邪也。內經云。開則淅然寒。閉則熱而鬥。知暴中風邪。宜先以加續命湯隨證治之。

中風無汗惡寒。麻黃續命主之。

麻黃　防風　杏仁

依本方添加一倍。宜鍼太陽至陰出血。是奪舉蹻。

中風有汗惡風。桂枝續命主之。

芍藥　防己　桂枝

桂枝　芍藥　杏仁

依本方添加一倍。宜鍼風府。已上二證。皆太陽經中風也。

中風無汗身熱。不惡寒。白虎續命主之。

石膏　知母一料中各加二兩　甘草依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風。葛根續命主之。

葛根二兩　桂枝　黃芩依本方加一倍

宜鍼陷谷。刺滑肉門。鍼陷谷去陽明之賊。刺滑肉門者。瀉陽明經之賊也。已上二證。陽明經中風也。

中風無汗身涼。附子續命主之。

附子加一倍　乾薑加二兩　甘草加三兩

宜刺陷白穴。去太陰之賊也。此陰經中風也。

中風有汗無熱。桂枝續命主之。

桂枝　附子　甘草依本方加一倍

宜鍼太谿。此證少陰經中風也。中風六證混淆。繫之於少陽厥逆。翹續命主之。

小續命　加羌活四兩　連翹六兩

右之續命混淆。無六證之別。今各分經療治。又分經鍼刺法。厥經絕骨。灸以引其熱。是鍼灸同象法治之大體也。

中風外無六經之形證。內無便溺之阻格。知血弱不能養筋。故手足不能運動。舌強不能言語。宜養血而筋自榮。大秦艽湯主之。

秦艽三兩　甘草二兩　川芎二兩　當歸二兩　白芍藥二兩　細辛半兩　川羌活　防風　黃芩各一兩　石膏二兩　白芷一兩

右十六味。剉。每服一兩。水煎去滓。溫服無時。如遇天陰。加生薑七八片。如心下痞。每兩加枳實一錢同煎。

中風外有六經之形證。先以加減續命湯隨證治之。內有便溺之阻格。復以三化湯主之。

厚朴　大黃　枳實　羌活　各等分

右剉如麻豆大。每服三兩。水三升。煎至一升半。終日服之。以微利爲度。無時。法曰。四肢不舉。俗曰攣緩。故經所謂太過則令人四肢不舉。又曰土太過則敦阜。阜高也。敦厚也。既厚而又高。則令除去。此眞所謂齊梁之疾。非肝腎經虛。何以明之。經所謂三陽三陰發病。爲偏枯痿易。四肢不舉。王注曰。三陰不起。以發偏枯。三陽有餘。則爲痿易。易爲變易常用。而痿弱無力也。其治則瀉令氣弱。陽益土平而愈。或三化湯。調胃承氣湯。選而用之。若脾虛則不用也。經所謂十不及。則卑陷。卑下也。陷坑也。故脾病四肢不用。四肢皆稟氣於胃。而不能至經。必因於脾。乃不得稟受也。今脾不能與胃行其津液。四肢不能稟水穀氣。日以衰。脈道不利。筋骨肌肉皆無氣以生。故不用焉。其治可補。十全散。加減四物。去邪留正。

愈風湯　中風證。內邪已除。外邪已盡。當服此藥。以行導諸經。久服大風悉去。縱有微邪。只從此藥加減治之。然治病之法。不可失其通塞。或一氣之微汗。或一句之通利。如此爲常治之法也。久則清濁自分。榮衛自和。如初覺風動。服此不致倒仆。

羌活　甘草　防風　蔓荊子　川芎　細辛　枳殼　人參　甘菊　薄荷　枸杞子　黃耆　知母　地骨皮　杜仲　獨活　吳白芷　秦艽　柴胡　半夏　前胡　厚朴　生地黃　蒼朮　各四兩　桂枝　一兩　已上三十味。選七十三味。　熟地黃　防己　各二兩　茯苓　各五兩

右剉。每服一兩。水二盞。煎至一盞。去渣。溫服。如遇天陰。加生薑煎。空心一服。臨臥再煎藥渣服。俱要食遠服。空心一服。曛下二丹元爲之輕劑。動以安神。靜以清肺。假令一氣之微汗。用愈風湯三兩。麻黃一兩。均作四服。一服生薑五片。空心服。以粥投之。得微汗則佳。如一旬之通利。用愈風三兩。大黃一兩。亦均作四服。如前煎。臨臥服。得利則妙。常服之藥。不可失四時之轉。如望春大寒之後。加半夏二兩。通四兩。人參二兩。通四兩。謂迎而奪少陽之氣也。初夏之月。半加石膏二兩。通六兩。黃芩二兩。通五兩。知母三兩。通四兩。謂迎而奪陽明之氣也。季夏六月。加防己二兩。通四兩。白朮二兩。茯苓三兩。謂勝脾土之濕也。初秋大暑後。加厚朴二兩。通四兩。藿香三兩。桂一兩。通二兩。謂迎而奪太陰之氣也。霜降之後。望冬加附子一兩。桂一兩。通二兩。常儲二兩。通四兩。謂勝少陰之氣也。得春減冬。四時類此。雖立法於四時之加減。又宜臨病之際。審病之虛實熱寒。土地之宜。邪氣之多少。此藥具七情六慾四氣。無使五

臟偏勝。及不動於榮衛。如風秘服之永不燥結。如久瀉服之則能自調。初從風氣便能服此藥。及新方中天麻丸。各一料。相爲表裏。治末病之聖藥也。及已病者。更宜常服。無問男子婦人。及小兒。疑痢搐急慢慓風等病。服之神效。如解利四時傷風。隨四時加減法。又療脾腎虛筋弱語言難。精神昏憒。及治內弱風濕。內弱者。乃風濕火先體重者。乃風濕土餘內弱之爲病。或一臂肢體偏枯。或肥而半身不隨。或恐而健忘。喜以多思。故思忘之道。皆悖不足也。是以心亂則百病生。於心靜則萬病悉去。故此能安心養神。調陰陽。無偏勝。及不動榮衛。

四白丹　能治消痞氣。養魄。醒中風者多昏冒。氣不清利也。

白朮　半兩　白芷　一兩　白茯苓　半兩　白檀　一兩　人參　半兩　羌活　二錢半　薄荷　三錢半　獨活　二錢半　防風　川芎　各五錢　甜竹葉　香附子　五錢炒　龍腦　半錢另研　麝香　一字另研　牛黃　半錢　右件二十味。計八兩六錢。三字爲細末。煉蜜爲丸。每兩作十丸。臨臥嚼一丸。分五七次嚼之。上清肺氣。下強骨髓。

二丹丸　治健忘。養神定志。和血。內安心神。外葆腠理。

丹參　一兩半　丹砂　二錢爲衣　遠志　去心　半兩　茯神　一兩　菖蒲　五錢　熟地黃　一兩半　天門冬　一兩半去心　麥門冬　一兩半去心　甘草　一兩　右爲細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸至一百丸。空心食前。常服。安神。故清中者歸肺。以助天真。清中濁者。壓強骨髓。血中之清。榮養於神。血中之濁。榮華腠理。如素有痰。久病中風。津液涌溢在胸中。氣所不利。用獨聖散吐之後。用利氣瀉火之劑。本方在後。

瀉青丸　治中風自汗。昏冒發熱。不惡寒。不能安臥。此是風熱煩燥。

當歸　龍膽　川芎　梔子　羌活　大黃　防風　各等分

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。竹葉湯化下。

天麻丸　係新方中。

天麻　三兩酒浸三日曝乾秤　牛膝　六兩酒浸　當歸　十兩　杜仲　七兩炒去絲　羌活　十兩　蕙蓉　六兩別爲細末秤　生地黃　十六兩　附子　一兩　玄參　六兩

801

右爲細末。煉蜜爲丸如桐子大。常服五七十丸。空心食前溫酒或白湯下。平明服藥。至日高饑則止。服藥大忌壅塞。失於通利。故服藥半月。稍覺經微以七宣丸輕緩之。使藥再爲用也。牛膝草蘇治筋骨。杜仲筋骨相著。天麻羌活利風之勝藥。當歸地黃養血。能和榮衛。玄參主用。附子佐之行經也。

獨聖散　治諸風隔疾。諸痾痰涎。津液渴澁。藥病亦然。

瓜蒂　一兩

右剉如麻豆大。炒令黃色。爲細末。每服量虛實久新。或三錢藥末。茶一錢。醋漿汁一盞。調下。若用吐法。天氣晴朗。陰晦無用。如病卒暴者。不拘於此法。吐時辰巳午前。故內經曰。平旦至日中。天之陽。陽中之陽也。論四時之氣。仲景曰。大法春宜吐。是天氣在上。人氣亦在上。一日之氣。卯辰寅候也。故宜早。不宜夜也。先令病人隔夜不食。服藥不吐。再用熱蘆水投之。如吐風癇病者。加金蠍半錢微炒。如有蟲者。加狗油五七點。雄黃末一錢。甚者加莞花末半錢。立吐其蟲出。如濕腫滿者。加赤小豆末一錢。故此不可常用。大要辯其虛實。實則瓜蒂散。虛則梔子豉湯。滿加厚朴。不可一槩用之。吐能可服降火利氣安神定志之劑。治風癇病不能愈者。從厚朴丸。宜春秋加添外。又於每一料中加。

人參　茜草　大黃　芒硝　法神　去木各一兩半

右依腫朴丸春秋加減法。和劑服。餌厚朴丸方在吐論中。

防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃　芒硝　連翹　薄荷　麻黃　不去節各半兩　石膏　桔梗　黃芩　各一兩　白朮　山梔子　荊芥穗　各二錢半　滑石　三兩　甘草　廿草

右爲麤末。每服一兩。生薑同煎溫服。日再服。勞汗當風。汗出爲酸鬱乃壅。勞汗出於玄府。脂液所凝。去芒硝。倍加芍藥。當歸。發散玄府之風。當調其榮衛。俗云。風刺。或生瘾疹。或赤或白。倍加麻黃。瞤跳惕白。出其汗。麻黃去節。亦去芒硝。瞤走血而內凝。故不用。發汗能。按前方中加四物湯。黃連解毒三藥合而飲之。日二服。故內經曰。以苦發之。謂熱在肌表。連內小便淋閉。去麻黃。加滑石連翹。煎藥湯調木香末二錢。麻黃主表。不主於裏。故去之。腰臍痛走注疼痛者。加硝石。當歸甘草一服。各二錢。調車前子末。海金砂各一錢。內經曰。腰者腎之府。破傷風者。如在裏則辛以散之。在裏則苦以下之。兼散之。汗下後。通利血氣。祛逐風邪。每一兩內加荊芥穗。大黃各二錢。調全蠍末一錢。羌活末一錢。諸風潮搐。小兒急慢驚風。大便秘結。邪熱暴甚。腸胃乾燥。寢汗咬牙。上鬚睡語。筋

惕搐搦。悸動不寧。每一兩加大黃二錢。梔子二錢。調茯苓二錢。如肌肉蠕動。每一兩加牛夏桔梗紫花各二錢。如打撲傷損。腹節疼痛。腹中惡血不下。每一兩加當歸大黃各三錢半。調沒藥乳香末各二錢。解利四時傷寒。內外所傷。每一兩內加益元散一兩。葱白十莖。鹽豉一合。生薑半兩。水一碗。用煎至五七沸。或煎一小碗。溫冷服一半。以筋投之即吐。能後服一半。稍熱服汗出立解。如飲酒中風。身熱頭痛如破者。加黃連各二錢。葱白十莖。依法立愈。頭旋腦熱。鼻塞濁涕時下。每一兩加薄荷黃連各二錢半。內經曰。膽移熱於腦。則辛類鼻淵。鼻淵者。濁涕下不已也。王注曰。膽移熱於腦。則辛類鼻淵也。此爲足太陽脈與陽明脈俱盛也。如氣逆者。調木香末一錢。

痙風論第二

內經曰。痙風者。有榮氣熱附其氣不流。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。故先風寒客於脈而不去。名曰痙。又曰脈風成於腐。俗云癩病也。故治法云。大風骨節疼。鬚眉墮。名曰木風。刺肌肉病故汗出百日。王注曰。泄衛氣之怫熱。痺骨髓汗出百日。泄榮氣之怫熱。凡三百日。鬚眉生而止。鍼怫熱解退。陰氣內復。故多汗出。鬚眉生也。先樺皮散。從少至多。服五七日後。灸承漿穴七壯。灸訖。更灸兩手大指甲後。各一壯。灸訖。更灸後服二聖散。泄熱祛血之風邪。戒房室三年。鍼灸藥止。並類象形。此治肺風之法也。然非止肺臟有之。俗云。鼻爲肺面病。盛於肺。端而言之不然。如此者。既鼻準腫赤脹。但爲瘡之類。乃謂血隨氣化。既氣不施化。則血聚矣。血既聚。使肉腐爛而生蟲也。謂厥陰王生五蟲。厥陰爲風木。故木生五蟲。蓋三焦相火熱甚而制金。金衰故木來剋侮。經曰。侮勝也。宜瀉火熱。利氣之劑。蟲自不生也。法云。流水不腐。戶樞不蠹。此之謂也。故病風者。陽氣先受上也。明矣。當以藥緩疎泄之。煎局方內升麻湯下錢氏內瀉青丸。余合隨經言之。故病風之故。

樺皮散　治肺臟風毒遍身瘡疥。及癩疹搔之成瘡。又治面風刺。及婦人粉刺。

樺皮　四兩　燒灰　荊芥穗　二兩　甘草　半兩　炙

杏仁　二兩。去皮尖。用水一碗。於銀器內煮去水一半。放令乾。　枳殼　四兩。去瓤。用麩火燒。於溫經上令冷。

右件除杏子外。餘藥爲末。將杏子別研細。次用諸藥令均。磁盒放之。每服三錢。食後溫酒調下。

二聖散　治大風癩疾。

大黃　半兩　皂角刺　三錢　燒灰

右將皂角刺一二斤。燒灰研細。煎大黃半兩。湯調下二錢。早服樺皮散。中煎升麻湯。下瀉青丸。晚服二聖散。此數等之藥。皆爲緩疎泄血之風熱也。

七聖丸　局方中　七宣丸　局方中

皆治風壅邪熱。潤利大腸中風。風癇。癲風。大便秘澁。皆可服之。此方局方中治法曰。雖呵子味苦澁。而能止瀉痢。此利藥中用呵子。令大黃枳實緩緩而推陳泄去邪氣。若年老風秘澁者。乃津液內亡也。故不可用峻劑攻之。內經。年四十而氣自半也。起居衰矣。年五十體重耳目不聰明矣。年六十陰痿氣大衰。九竅不利。下虛上實。涕泣出矣。故曰。知之則強。不知則老。舉世皆言年老之人。無熱俱虛。豈不明年四十而陰氣自半。故陰虛陽盛明矣。是以陰虛其下。陽甚於上。故上實下虛。此理明矣。

破傷風論第三

論曰。夫風病者百病之始也。清淨則腠理閉拒。雖有大風苛毒。而弗能爲害也。故破傷風者。通於表裏。分別陰陽。同傷寒證治。閭閻往往有不知者。只知有發表。不知有攻裏者。和解者。此汗下和三法也。亦同傷寒證有在表者。有在裏者。有半在表者。半在裏者。在裏宜下。在表宜發汗。在表裏之間。宜和解。然汗下亦不可過其法也。故破傷風者。從外至內。甚於內者。則病也。因此卒暴傷拒風襲之間。傳播經絡。至使寒熱更作。身體反強。口噤不開。甚者邪氣入臟。則分汗下之治。諸瘡不差。榮衛虛。肌肉不生。瘡眼不合者。風邪亦能外入於瘡。爲破傷風之候。故諸瘡不差。吁。世皆言着灸爲上。是爲熱瘡。而不知火熱客毒。逐經絡。諸變不可勝數。微則發熱甚。則生風而搐。或角弓反張。口噤。自邪皆因瘡鬱結於榮衛。不得宣通而生亦有破傷不灸而病此者。瘡着白痂。瘡口閉塞。氣難通泄。故陽熱易爲鬱結。而熱甚則生風也。故表脈浮而無力。太陽也。脈長而有力者。陽明也。脈浮而弦小者。少陽也。太陽宜汗。陽明宜下。少陽宜和。若明此三法。而治不中病者。未之有也。

羌活防風湯　治破傷風邪初傳在表

羌活　防風　川芎　藁本　當歸　各一兩　甘草　各二兩　華細辛　各二錢

右㕮咀。每服五七錢。水一盞半。同煎至七分。去滓。熱服。不拘時候。盡緊慢加減用之。熱則加大黃。

羌活防風湯　治破傷風邪傳在裏

羌活　防風　川芎　菊花　麻黃　各一兩　石膏　前胡　黃芩　細辛　甘草　各二錢　枳殼　白茯苓　藎荊子　各一兩半　薄荷　吳白芷　各半兩

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。入生薑五片同煎至一盞。去滓。稍熱服。不拘時候。日進二服。

羌活湯　羌活湯者。治半在表半在裏也。

羌活　菊花　麻黃　川芎　防風　石膏　前胡　黃芩　細辛　甘草　枳殼　白茯苓　藎荊子　薄荷　吳白芷　各半兩

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。入生薑五片同煎至一盞。去滓。稍熱服。不拘時候。日進二服。

防風湯　治破傷風。同傷寒表證未解入裏。宜急服此藥。

防風　羌活　獨活　川芎　各等分

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。溫服。不拘時候。

螵蛸散

螵蛸一對　雄黃一錢　防風二錢　草烏一錢

右爲細末。每服一字。溫酒調下。裹和至愈可服。裹不和不可服。

螵蛸散

螵蛸一對　鱉五錢　左盤龍五兩。炒。頭尾爲度。餘蛇薦是也。

右件爲細末。每服一錢。清酒調下。治法依前用。裹和至愈可服。有裹不和證不可服。次當下之。用前螵蛸散四錢。燒飯爲丸。如發豆大。每服一丸。漸加六七丸。清酒調螵蛸散少許送下。宜利爲度。內外風去。可當服羌活湯。緩緩而治。不拘時候服之。

羌活湯　羌活湯者。治半在表半在裏也。

羌活　菊花　麻黃　川芎　防風　石膏　前胡　黃芩　細辛　甘草　枳殼　白茯苓　藎荊子　薄荷　吳白芷　各半兩

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。入生薑五片同煎至一盞。去滓。稍熱服。不拘時候。日進二服。

防風湯　治破傷風。同傷寒表證未解入裏。宜急服此藥。

防風　羌活　獨活　川芎　各等分

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。煎至七分。去滓。溫服。不拘時候。

螵蛸散

螵蛸一對　鱉三錢

右爲細末。用防風湯調下。如前藥解表不已。覺轉入裏。當服左盤龍丸。微利。看大便硬軟。加巴豆霜

803

服之。

左龍丸

左盤龍（五錢炒）　白礬（鹽各一錢）　雄黃（二錢）

右爲細末。燒餅爲丸。如桐子大。每服十五丸。溫酒下。如裏證不已。當於左龍丸一處半內入巴豆霜半錢。燒餅爲丸。如桐子大。每服一丸。同左龍丸一處合服。每服藥中一丸。如此漸加。服至痢爲度。若痢後更服後藥。若搐搦不已。亦宜服後藥光活湯也。

羌活湯

羌活　獨活　防風　地黃　芍藥　地榆（各一兩）　川芎　細辛（各五錢）

右咬咀。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。如有熱加黃芩。有涎加半夏。若病日久。氣血漸虛。邪氣入胃。宜養血爲度。

養血當歸地黃散

當歸　地黃　芍藥　防風　白芷（各一兩）

右咬咀。依前煎服。

雄黃散　治表藥

天南星（三錢）　半夏（二錢）　天麻（各五錢）　雄黃（半）

右爲細末。每服一錢。溫酒調下。如有涎。於此藥中加大黃爲下藥。

地榆防風散　治破傷中風。半在表。半在裏。頭微汗。身無汗。不可發汗。宜表裏治之。

地榆　防風　地丁香

右件爲細末。每服三錢。溫米飲調下。

雄黃散　治表藥

右咬咀。依前煎服。

白朮湯　治破傷風。大汗不止。筋攣搐搦。

白朮　葛根（各一兩）　升麻

右咬咀。每服一兩。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。不拘時候。

江鱭丸　治破傷風。驚面發搐。臟腑秘澁。知病在裏。可用江鱭丸下之。

江鱭（半兩炒）　野鴈糞（半兩炒）　白礬（半兩）　蜈蚣（一對）　雄黃（一錢）　天麻（一兩）

右件爲細末。又將藥末作三分。用二分燒餅爲丸。如桐子大。秫米爲衣。後將一分入巴豆霜一錢

同和。亦以燒餅爲丸。如桐子大。不用秫米爲衣。每服秫米爲衣者二十九。入巴豆霜者一九。第二服二丸。加至痢爲度。再服秫米爲衣。藥病愈止。

沒藥散　治刀箭所傷。止血定痛。

定粉（一兩）　風化灰（一兩）　枯白礬（三錢另研）　乳香（半錢）　沒藥（一字各研）

右件各研爲細末。同和均。再研搽之。

解利傷寒論第四

傷寒之法。先言表裏。及有緩急。三陽表當急。裏當緩。三陰表當緩。裏當急。又曰。脈浮當汗。脈沉當下。浮汗急而下緩。三陽表也。脈沉下急而汗緩。謂三陰裏也。麻黃湯謂之急。麻黃附子細辛湯謂之緩。內云。有證形以爲汗。爲汗之緩。裏之表也。又曰。在皮者汗而發之。爲汗之急。表之表也。急汗者太陽。緩汗少陰。是臟腑之輕應也。假令麻黃附子細辛湯。是少陰證。始得發熱。脈沉裏和無汗。故證形以爲汗。假麻黃湯。是太陽證。頭項痛。腰脊強。脈浮無汗。裏和是也。在皮者汗而發之也。經曰。治主以緩。治客以急。

同和。亦以燒餅爲丸。如桐子大。不用秫米爲衣。每服秫米爲衣者二十九。入巴豆霜者一九。第二服二丸。加至痢爲度。再服秫米爲衣。藥病愈止。

沒藥散　治刀箭所傷。止血定痛。

定粉（一兩）　風化灰（一兩）　枯白礬（三錢另研）　乳香（半錢）　沒藥（一字各研）

右件各研爲細末。同和均。再研搽之。

解利傷寒論第四

傷寒之法。先言表裏。及有緩急。三陽表當急。裏當緩。三陰表當緩。裏當急。又曰。脈浮當汗。脈沉當下。浮汗急而下緩。三陽表也。脈沉下急而汗緩。謂三陰裏也。麻黃湯謂之急。麻黃附子細辛湯謂之緩。內云。有證形以爲汗。爲汗之緩。裏之表也。又曰。在皮者汗而發之。爲汗之急。表之表也。急汗者太陽。緩汗少陰。是臟腑之輕應也。假令麻黃附子細辛湯。是少陰證。始得發熱。脈沉裏和無汗。故證形以爲汗。假麻黃湯。是太陽證。頭項痛。腰脊強。脈浮無汗。裏和是也。在皮者汗而發之也。經曰。治主以緩。治客以急。

麻黃湯

麻黃（去節五錢）　桂枝（三錢）　甘草（二錢炙）　杏仁（去皮尖炒二十箇）

右咬咀。都作一服。水煎去滓溫服。

假令得肝脈。其外證善潔。面青善怒。其三部脈俱弦而浮。惡寒裏和。羌活防風各三錢。謂肝主風。是臟經受病。大便秘。或泄下赤水無數。皆裏不和也。假令得心脈。其外證面赤。口乾。善喉。其尺寸脈俱浮而洪。惡寒裏和。謂清便自調也。麻黃湯內加黃芩石膏各三錢。謂心主熱。是小腸受病也。

假令得脾脈。其外證面黃。善噦。善思。善味。尺寸脈俱浮而緩。裏和惡寒。麻黃湯內加白朮防己各五錢。謂脾主濕。是胃經受病也。

假令得肺脈。其外證面白。善嚏。悲愁不樂。欲哭。其尺寸脈俱浮而澁。裏和惡寒。麻黃湯內加桂枝生薑各三錢。謂肺主燥。是大腸受病也。

假令得腎脈。其外證面黑。善恐。其尺寸脈俱浮。裏和惡寒。其麻黃湯內。加附子生薑。謂腎主寒。是膀胱受病也。

已上各五證。皆裏之表。謂在皮者急汗而發之也。皆腑受病。裏之裏者。下之當緩。謂隨臟裏證。外顯尺寸脈俱浮而復有裏證。謂發熱飲水。便利赤澁。或泄下赤水。按之內實。或痞。麻黃湯去麻黃杏仁。與隨藏元加藥同煎。作五服。每下一證。初一服加大黃半錢。邪未盡。第二服加大黃一錢。邪未盡。第三服加大黃一錢半。如邪未盡。又加之。邪盡則止。此所謂先緩而後急。是裏之裏

證下之當緩也

麻黃附子細辛湯

麻黃 半兩去根節　細辛 半兩去苗土　附子 一錢二分半炮裂去皮臍

右㕮咀。都作一服。水煎去滓溫服。

假令得肝脈。其內證滿悶淋瀼。便難。轉筋。其尺寸脈俱沉而弦。裏和惡寒。肝經受病。麻黃附子細辛湯內加羌活防風各三錢。

假令得心脈。其內證煩心心痛。掌中熱而噦。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。肺經受病。加桂枝各三錢。

假令得脾脈。其內證腹脹滿。食不消。怠惰嗜臥。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。脾經受病。加白朮防己各三錢。

假令得腎脈。其內證嗌痛。嗽瀉。淅寒熱。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。腎經受病。更加附子生薑各三錢。

已上五證。裏之表也。宜潛形以爲汗。皆臟受病也。裏者下之當急。謂隨臟內證已顯。尺寸脈俱沉。復有裏證者。謂大小便秘澁。或泄下赤水。或瀉無數。不能飲食。不惡風寒。發熱引飲。其脈俱沉。或按之內實而痛。此謂裏實。宜速下之。麻黃附子細辛內去麻黃。與隨臟丸加藥內。分作三服。每下一證。初一服加大黃三錢。邪盡則止。如邪未盡。再一服。加大黃二錢。此先急而後緩。謂裏之裏也。常速下之也。通解利傷寒。不問何經所受。皆能混然解之。如不犯各經之受病。雖不解盡。亦無壞證。

羌活湯

羌活 二兩　防風 一兩　川芎 一兩　藁本 一兩

細辛 三錢　甘草 一兩炒　黑地黃 一兩炒　白朮 三兩如無用蒼朮加一兩

右㕮咀。每服五七錢。水二盞。煎至一盞。無時溫服。如發熱引飲。加黃芩甘草各一兩。更隨證加。頭痛惡風。於白朮湯一兩內。加羌活散三錢。都作一服。

羌活散

羌活 一兩　川芎 七錢　細辛根 二錢半

如身熱。依前加石膏湯四錢。

石膏湯

石膏 二兩　知母 半兩　白芷 七錢

如腹中痛者。加芍藥散。

芍藥散

芍藥 二兩　桂枝 五錢

如往來寒熱而嘔。加柴胡散二錢半。

柴胡散

柴胡根 一兩　半夏 五錢洗

加生薑煎。如心下痞。加枳實一錢。如有裏證。加大黃。初一服一錢。次二錢。又三錢。邪盡則止。

論曰。有汗不得服麻黃。無汗不得服桂枝。然春夏汗孔疎。雖有汗不當用桂枝。宜用黃芪湯和解。秋冬孔閉。雖無汗不當用麻黃。宜用川芎湯和解。春夏有汗。脈乃微而弱。惡寒者。乃陽明證。春夏之脈也。亦宜黃芪湯。無汗亦宜川芎湯。秋多有汗。脈盛而浮。發熱。身熱汗多。惡風甚者。加桂枝。

黃芪 白朮　防風 各等分

右㕮咀。每服五七錢至十餘錢。或半兩一兩。水煎溫服。清川芎湯　無汗則可發也。

川芎　白朮　羌活 各等分

右㕮咀。同黃芪湯煎法。稍熱惡寒。甚則及脈大浮。半加麻黃法云。五臟之脈。寸關尺也。今止言尺寸。陰陽也。如陽緩而陰急。表和而裏病也。陰緩而陽急。裏和而表病也。

若傷寒食少發渴。只可和胃止渴。不可太涼藥止之。然恐涼藥止之。損着胃氣。必不能食也。和胃白朮湯

白朮　茯苓

起臥不能謂之濕。身重是也。小柴胡湯。黃芩芍藥湯。

起臥不安。寐睡不穩。謂之煩。梔豉湯。竹葉石膏湯。解利四時傷寒。混解六經。不犯禁忌。

大白朮湯

白朮 二兩　防風　羌活

白芷 一兩半　石膏 二兩　知母 七錢

右爲麤末。每服半兩。服藥滓又作一服。春倍防風羌活。夏倍黃芩知母。季夏雨淫。倍白朮白芷。秋加桂枝五錢。冬桂枝八錢。或一兩。立夏之後至立秋處暑之間。傷寒者身多微涼。微有自汗。四肢沉重。謂之濕溫。又謂之濕痙。宜蒼朮石膏湯。

蒼朮石膏湯

蒼朮 半兩　石膏 三錢　知母 一錢半

右剉細。同和均。都作一服。水二盞。煎至一盞。溫服。若謂內有濕熱也。多不欲飲水。如身熱脈洪無汗多渴者。是熱在上焦。積於胃中。宜桔梗散治之。

桔梗散

薄荷　黃芩　甘草

山梔仁 各一錢半　桔梗 兩　連翹 二錢

右剉。每服五錢。或七錢。秤半兩。水煎。加竹葉。如大便秘結。加大黃半兩。

熱論第五

論曰。有表而熱者。謂之裏熱也。無表而熱者。謂之裏熱也。有暴發而爲熱者。乃久不實通而致也。有服溫藥過劑而爲熱者。有惡寒戰慄而熱者。蓋諸熱之屬者。心火之象也。王注曰。百端之起。皆自心生。是以上善若水。下愈若火。治法曰。少熱之氣。涼以和之。大熱之氣。寒以取之。甚熱之氣。則汗發之。發之不盡。則逆治之。制之不盡。求其屬以衰之。故曰。苦者。以治五臟。屬陰而居於內。辛者。以治六腑。六腑屬陽而在於外。故內者下之。外者發之。又宜養血益陰。其熱自愈。此所謂不治而治也。故不治。謂之常治。治之不治。謂之暴治。經所謂諸寒而熱者取之陰。諸熱而寒者取之陽。此所謂求其屬也。王注曰。益火之源。以消陰翳。壯水之主。以制陽光。此之謂也。

病有暴熱者。病在心肺。有積熱者。病在腎肝。暴熱者宜局方中雄黃解毒丸。積熱者局方中妙香丸。暴熱上喘者。病在心肺。謂之高喘。木香金鈴子散。上焦熱而煩悶者。牛黃散。腦脇秘者。大黃牽牛散。上焦熱無他證者。桔梗湯。有虛熱不能食而熱者。脾虛也。宜以厚朴白朮陳皮之類治之。有實熱能食而熱者。胃實也。如中外有熱者。作散劑。名解毒湯。或服滿嘔吐。欲作痫者。每服半兩。解毒湯中加半夏茯苓厚朴各三錢。生薑三片。如白膿下痢後重者。加大黃三錢。

涼隔散　加減附子後

連翹　山梔子　大黃　薄荷葉

黃芩 各半兩　甘草 一兩半　朴硝 二錢半

川芎 各一兩　黃芩 五錢　細辛 三錢

甘草 五錢或一兩　根實 五錢去核

右爲細末。每服五錢。水煎。溫服。食後服。以利爲度。嘔止卽止。

牛黃散　治上焦熱而煩。不能睡臥。

梔子 半兩　大黃 半兩　麝金 半兩　甘草 二錢半

右爲細末。每服五錢。水煎溫服。食後微利卽已。

大黃牽牛散　治相火之氣。遊走臟腑。大便秘結。

大黃 一兩　牽牛 頭末 五錢

右爲細末。每服三錢。有厥冷用酒調三錢。無厥冷而手足煩熱者。蜜湯調下。食後微利爲度。此謂不時而熱者。濕熱也。

地黃丸　治久新憔悴。發汗發熱。五臟齊損。瘦瘁羸煩。腸澼下血。骨蒸。痿弱無力。不能運動。

熟地黃 一兩　山茱萸 四錢　乾山藥 四錢　牡丹皮　白茯苓　澤瀉 各三錢

右爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。如煩渴。皮盾煮澤。食後煎服。防風當歸飲子。空心服地黃丸。

柴胡　人參　黃芩　甘草 各一兩

大黃　當歸　芍藥 各半兩　滑石 三兩

右爲麤末。每服五錢。水一盞半。生薑三片。同煎至七分。去滓溫服。如痰實欬嗽。加半夏。如大便實。米穀完出。慓懼。瀉血。淋閉。欬血。衄血。自汗。頭痛。稍熱。肺痿後。服金花丸。

小金花丸

黃連　黃栢　黃芩　山梔子 各一兩

右爲細末。滴水爲丸。如小豆大。每服一百丸。溫水下。日二三服。或大便實。加大黃。白利不用大黃。如中外有熱者。作散劑。名解毒湯。或服滿嘔吐。欲作痫者。每服半兩。解毒湯中加半夏茯苓厚朴各三錢。生薑三片。如白膿下痢後重者。加大黃三錢。

右件爲麤末每服半兩水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙微煎溫服

內傷論第六

論曰人之生也由五穀之精化五味之偏故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食反過其節胸膈不利腹痞并涎嗽者加桔梗一兩荊芥穗半兩咳而嘔者加半夏二錢半生薑煎如鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩一料內　如淋閉者加滑石四兩茯苓一兩或閉而不通膀下狀如覆槐痛悶不可忍者乃腸胃乾涸膻中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故膻中者臣使之官名三焦相火下合右腎爲氣海也王注曰膀胱津液之府傷或失四時之調養故能爲人之病也經曰氣口緊面傷於食心胸滿而口無味與氣口同氣口者乃脾胞內居之小腹處間毛內藏胞器者得氣海之氣化則溲便注下氣海之不及則閉隱不通故不得便利也先用沉香木香各三錢酒調下或八正散甚則宜上湧之令氣通小便自通經所謂病在下上取之王注曰熱攻於上不利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之可也

當歸承氣湯

當歸　大黃各一兩　甘草半兩　芒硝九錢

右銼如麻豆大每服二兩水一大碗入生薑五片棗十枚同煎至半碗去滓熱服若陽狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加生薑泉胃因土此引至於胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利爲度微緩以瓜蒂散加防風藜蘆吐其病自愈後調洗心散涼膈散解毒湯藥調治之

牛黃寧　治熱入血室發狂不認人者

牛黃半兩二錢　硃砂　麝金　牡丹皮各三錢　膽子　甘草各一錢

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大新水化下

治暴熱者局方中雄黃解毒丸

治久熱者局方中麝香丸

治虛勞骨蒸煩熱下血者錢氏地黃丸

治虛熱不能食者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之

治實熱能食者胃實也宜以梔子黃芩或三黃丸之類治之麝金柴胡亦可

治表熱惡寒而渴白虎湯也

治膚如火燎而熱以手取之不甚熱爲肺熱也目白晴赤煩燥或引飲獨黃芩一味主之水煎

兩脇下肌熱脈浮弦者柴胡飲子主之

兩脇肋熱或一身盡熱者或曰肺肌熱者皆爲血熱也四順飲子主之

夜發熱主行陰乃血熱也四順桃仁承氣選用當視其腹痛血刺痛與有妄入裏腹中轉失氣燥結之異證則明了夜則證語四順飲子證與桃仁承氣相似不可不辯也發熱雖無脇熱亦爲柴胡證證則

行陽二十五度氣也大抵柴胡夜則行陰二十五度大抵四順飲子

內傷論第六

論曰人之生也由五穀之精化五味之偏故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食反過其節胸膈不利腹痞并涎嗽者加桔梗一兩荊芥穗半兩咳而嘔者加半夏二錢半生薑煎如鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩一料內　如淋閉者加滑石四兩茯苓一兩或閉而不通膀下狀如覆槐痛悶不可忍者乃腸胃乾涸膻中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故膻中者臣使之官名三焦相火下合右腎爲氣海也王注曰膀胱津液之府傷或失四時之調養故能爲人之病也經曰氣口緊面傷於食心胸滿而口無味與氣口同氣口者乃脾胞內居之小腹處間毛內藏胞器者得氣海之氣化則溲便注下氣海之不及則閉隱不通故不得便利也先用沉香木香各三錢酒調下或八正散甚則宜上湧之令氣通小便自通經所謂病在下上取之王注曰熱攻於上不利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之可也

當歸承氣湯

當歸　大黃各一兩　甘草半兩　芒硝九錢

右銼如麻豆大每服二兩水一大碗入生薑五片棗十枚同煎至半碗去滓熱服若陽狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加生薑泉胃因土此引至於胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利爲度微緩以瓜蒂散加防風藜蘆吐其病自愈後調洗心散涼膈散解毒湯藥調治之

牛黃寧　治熱入血室發狂不認人者

牛黃半兩二錢　硃砂　麝金　牡丹皮各三錢　膽子　甘草各一錢

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大新水化下

治暴熱者局方中雄黃解毒丸

治久熱者局方中麝香丸

治虛勞骨蒸煩熱下血者錢氏地黃丸

治虛熱不能食者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之

治實熱能食者胃實也宜以梔子黃芩或三黃丸之類治之麝金柴胡亦可

治表熱惡寒而渴白虎湯也

治膚如火燎而熱以手取之不甚熱爲肺熱也目白晴赤煩燥或引飲獨黃芩一味主之水煎

兩脇下肌熱脈浮弦者柴胡飲子主之

兩脇肋熱或一身盡熱者或曰肺肌熱者皆爲血熱也四順飲子主之

夜發熱主行陰乃血熱也四順桃仁承氣選用當視其腹痛血刺痛與有妄入裏腹中轉失氣燥結之異證則明了夜則證語四順飲子證與桃仁承氣相似不可不辯也發熱雖無脇熱亦爲柴胡證證則

治飲食不化心腹膨悶檳榔丸主之

檳榔丸

檳榔一錢半　陳皮去白一兩　木香二錢半　牽牛頭末一兩半　青皮去白一兩　枳實麩炒一兩　白朮一兩

右爲細末燒餅爲丸如桐子大每服五十丸米飲下

如甚則脇肋虛脹。養黃丸主之。
治氣不下降。飲食難消。金露丸主之。

諸蹙論第七

經曰。夏傷於暑。秋必病瘧。蓋傷之淺者。近而暴發。傷之重者。遠而該瘧者。久瘧也。是知夏傷於暑。濕熱閉藏而不能發泄於外。邪氣內行。至秋而發寒瘧也。初不知何經受之。隨其動而取之。有中三陽者。有中三陰者。大抵經中邪氣。其證各殊。同傷寒論之也。故內經曰。五臟皆有瘧。其治各別。在太陽經者謂之風熱瘧。治多汗之。此三陽經受病。皆謂之暴瘧。發在夏至後處暑前。此乃傷之淺者。近而暴也。在陰經則不分三經。總謂之濕瘧。當從太陰經。則不分其病發在處暑後多至前。此乃傷之重也。遠而該瘧者老也。故謂之久瘧。氣居西方。宜寒藥療之。瘧之爲疾。因內積暑熱之氣。不能宣泄于外。而爲瘧也。當盛夏之時。能食寒涼之物。而助陰氣者。縱使有暑熱之氣。微者自消矣。更時復以藥疎利臟腑。使邪氣自下。內經曰。春食涼。夏食寒。秋食濕。冬食熱。是謂春夏發陽。秋冬養陰。人能於飲食起居之間。順四時之氣而行之。邪氣何由得生也。

治瘧病。處暑前頭痛項強。脈浮惡風有汗。桂枝羌活湯。

桂枝　羌活　防風　甘草　炙各
右爲麤末。每服半兩。水一盞半。煎至一盞。溫服清。迎發而服之。如吐者。加半夏麴等分。

治瘧病頭痛項強。脈浮惡風無汗者。麻黃羌活湯。

麻黃　去節　羌活　防風　甘草　炙各
同前服。如吐者。加半夏麴等分。

治法瘧如前病證。而夜發者。麻黃桂枝湯主之。

麻黃　一兩　去節　甘草　三錢　桂枝　三錢　桃仁　三十箇　去皮尖　黃芩　五錢
右五味同爲細末。依前服。桃仁味苦甘辛。肝者血之海。血衆則肝氣燥。經所謂肝苦急。急食甘以緩之。故桃仁散血緩肝。解邪氣深遠而入血。故夜發。乃陰經有邪。此湯發散血中風寒之劑。

治瘧病。身熱目痛。熱多。寒少。脈長。睡臥不安。先以大柴胡湯下之。微利爲度。如下過外。微邪未盡者。宜服白芷湯。以盡其邪。

白芷　一兩　知母　一兩　七錢　石膏　四兩
右爲麤末。同前煎服。

治瘧無他證。隔日發。先寒後熱。寒少熱多。宜桂枝石膏湯。

桂枝　五錢　石膏　知母　各一兩半　黃芩　一兩

右爲麤末。分作三服。每服水一盞。同前煎服。間日者。邪氣所舍深也。

治瘧寒熱大作。不論先後。皆太陽陽明合病也。謂之大事。寒作則必戰動。經曰。熱勝而動也。發熱則必汗泄。經曰。汗出不徹。知爲熱也。陽盛陰虛之證。當內實外虛。不治必傳入陰經也。當用桂枝湯主之。

桂枝　三錢　黃芩　知母　石膏　芍藥　各一兩
右爲麤末。每服五七錢至半兩。水煎如前。藥服之寒熱轉大者。知太陽陽明少陽三陽合病也。宜桂枝黃芩湯和之。

桂枝黃芩湯

柴胡　一兩二錢　黃芩　四錢半　人參　甘草　各四錢半
右爲麤末。依前服之。服藥已。如外邪已罷。內邪未已。再鍼下藥。從卯至午時發者。宜以大柴胡承氣湯主之。

前項下藥微利爲度。以小柴胡湯徹其微邪之氣。立秋之後及處暑前發瘧漸瘥。不能食者。謂之瘧瘧。此邪深遠而中陰經。爲久瘧也。

治久瘧不能飲食。胸中鬱鬱如吐。欲吐不能吐者。宜吐則已。當以藜蘆散、雄黃散吐之。

藜蘆散

大藜蘆末半錢。溫鹽水調下。以吐爲度。

雄黃散

雄黃　瓜蒂　赤小豆　各一錢
右爲細末。每服半錢。溫鹽水調下。以吐爲度。

治秋深冬瘧。胃中無物。又無痰癖。腹高而食少。俗謂瘧氣入腹。宜蒼耳湯主之。

蒼耳　四兩　草烏頭　一錢　杏仁　三十箇
右爲麤末。都作一服。水三升。煎至一半。均作三服。一日服盡。迎發而服。

局方中七宣丸。治瘧之聖藥也。

局方中神效飲子。乃瘧疾之聖藥也。

又名交結飲子。

從酉至子時發者。或至寅時。知邪氣在血也。宜桃仁承氣湯下之。

微利後宜調制之　在柱枝黃芩湯調下。

吐論第八

論曰。吐有三氣積塞也。皆從三焦論之。上焦在胃口上通於天氣。主納而不出。中焦在中脘。上通天氣。下通地氣。主出而不納。是故上焦吐者。皆從於氣。氣者天之陽也。其脈浮而洪。其證食已暴吐。渴欲飲水。大便燥結。氣上衝而胸發痛。其治也當降氣和中。中焦吐者。皆從於積。有陰有陽。食與氣相假爲積而痛。其脈浮而虛。其證或先痛而後吐。或先吐而後痛。治法當以毒藥去其積。檳榔木香行其氣。下焦吐者。皆從於寒。地道也。其脈沉而遲。其證朝食暮吐。暮食朝吐。小便清利。大便秘而不通。治法當以毒藥通其閉塞。溫其寒氣。大便痛通。復以中焦藥和之。不令大便秘結而自愈也。

治上焦氣熱上衝。食已暴吐。脈浮而洪。宜先和中桔梗湯。

桔梗　一兩　半夏麴　二兩
白茯苓　一兩去皮　白朮　一兩半
陳皮　一兩去白　枳實　一兩麩炒
厚朴　一兩薑炒香

右㕮咀。每服一兩。水一盞。煎至七分。取清溫澈。調木香散二錢。隔夜空服。食前服之。三服之後。氣漸下。吐漸止。然後去木香散。加芍藥二兩。黃芩一兩半。每料中扣算。加上件分兩。依前服之。病愈則已。如大便燥結。食不盡下。以大承氣湯去硝微下之。少利爲度。再服前藥補之。如大便復結。又依前再微下之。

木香散

木香　檳榔　各等分

右爲細末。煎藥調服。

治暴吐者。上焦氣熱所衝也。經曰。諸嘔吐酸。暴注下迫。皆屬於火。脈洪而浮。荊黃湯主之。

荊芥穗　一兩　人參　五錢
甘草　二錢半　大黃　三錢

右爲麤末。都作一服。水二盞。煎至一盞。去滓。調檳榔散二錢。空心服。

檳榔散

檳榔　二錢　木香　一錢半

右爲細末。用前藥調服。如爲丸亦可。用水浸蒸餅爲丸。如小豆大。每服二十丸。食後服。

治上焦吐。頭發痛有汗。脈弦。青鎖丸主之。

柴胡　二兩去苗　黃芩　七錢半　甘草　半兩　半夏　湯洗半兩
右爲細末。蜜汁浸蒸餅爲丸。如桐子大。每服五十丸。生薑湯。食後服。

白朮湯　治胃中虛損。及痰而吐之。

半夏麴　半兩　白朮　一錢　檳榔　二錢半　木香　一錢
右六味。同爲細末。每服二錢。煎生薑湯調下。食前吐而食。脈弦者。肝盛於脾而吐。乃由脾胃之虛。宜治風安脾之藥。

金花丸

半夏　湯洗一兩　檳榔　二錢　雄黃　一錢半
右爲細末。蜜汁浸蒸餅爲丸。如桐子大。小兒另丸。生薑湯下。從少至多。漸次服之。以吐止爲度。竊緣肺於脾。故欲食自下。

紫沉丸　治中焦吐食。由食積爲寒氣相假。故吐而痛。宜服之。

半夏麴　三錢　烏梅　二錢去核　代赭石　三錢　杏仁　一錢去皮尖　丁香　二錢　縮砂仁　三錢　沉香　一錢
檳榔　二錢　木香　一錢　陳皮　五錢　白豆蔻　半錢　白朮　一錢
右爲細末。入巴豆霜少許。醋糊爲丸。如黍米大。每服五十丸。吐愈則止。小兒另丸。治小兒食積吐食。亦大妙。

一法治胃口吐食。用橘皮一箇。浸少時。去白。裹生薑一塊。麪裹紙封。燒令熟。去麪外生薑爲三番。並橘皮煎湯。下紫沉丸一百丸。一日二服。得大便通。至不吐則止。此主治寒積氣皆可。

治噁吐。腹中痛者。是無積也。胃弱而吐食。特宜繁痛。是以腹中痛矣。

木香白朮散

木香　一錢　白朮　半兩　半夏麴　一兩　檳榔　二錢
右爲細末。濃煎芍藥生薑湯調下一二錢。有積而痛。手按之愈痛。無積者。按之不痛。治下焦吐食。朝食暮吐。暮食朝吐。大便不通。宜附子丸。

附子　炮五錢　巴豆霜　一錢　研
右同研極細。鎔黃蠟爲丸。如桐子大。每服一二丸。冷水送下。利則爲度。後更服紫沉丸。常服不令再閉。

厚朴丸　主反胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾加法在後烏頭減半更炒

厚朴 二兩 薑汁炙　黃連 二兩 去苗　紫菀 去土 洗　吳茱萸 湯洗七次 焙　蒼朮 泔浸

紫胡 去苗　桔梗　皂角子炙 去皮弦　茯苓 去皮　官桂 別

乾薑 炮各二兩　人參 二兩　川烏頭 炮裂去皮臍二兩半　蜀椒 二兩去目閉口 炒出汗

右爲細末入巴豆霜一兩和均煉蜜和爲丸別旋丸桐子大每服三丸漸次加至以利爲度生薑湯食後臨臥服

此藥治癉與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間臟腑寒下利大效春夏再加黃連二兩秋冬再加厚朴二兩

治風癇病不能愈者從厚朴丸依春秋加添外又於每料中加人參蒼朮茯苓各一兩半

右依前法和劑爲服餌治蕃胃又大便不通者是腸胃也服局方中厚朴丸一二百丸如大使祕用後藥

附子 半兩 炮　巴豆 二粒 研　砒 一豆許

右爲極細末生薑糊爲丸如菉豆大每服一丸白湯下

霍亂論第九

論曰醫之用藥如將帥之用兵本草曰良醫不能以無藥愈疾猶良將無兵不足以勝敵也故用藥如用兵轉筋霍亂者治法同用兵之急不可緩也故吐瀉不止者其本在於中焦或因渴大飲或因飲面過量或陰而飽甚或濕內甚故陰陽交而不和是爲吐瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉此爲急病也然吐利爲急十死其一二如揮霍撩亂而不得吐瀉此名乾霍亂必死法曰既有表宜緩形形動則肝木乃榮反靜榮則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木脾土損矣輕則滄泄身熱脈洪穀不能化重則下痢膿血稠黏若屬於火經曰暑傷於風夏必滄泄此逆四時之氣人所自爲也

霍亂論第十

論曰太陰脾經受濕而爲水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜瀉之法云宜補宜瀉脈弦而大其證多種大抵從風濕熱論是知寒少而熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰如吐瀉不止身出冷汗無脈者可服後瀉痢論中藥水散兼桂枝湯白朮湯皆可服後痢門中藥亦可選用

凡霍亂不可飲熱白米粥飲之死必不救切須愼之

白朮　人蔘　乾薑　甘草 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸冷水化下

白朮　茯苓　木豬苓 各一兩　澤瀉 二兩

右爲細末冷水調下或水煎三沸冷服亦得

白朮　人蔘　乾薑　甘草 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸冷水化下

白朮　茯苓　木豬苓 各一兩半　澤瀉 二兩半　桂枝 一兩半

右爲細末渴者冷水調下不渴者溫水調下不拘時候服

五苓散

白朮　茯苓　木豬苓 各一兩半　澤瀉 二兩半

右爲細末冷水調下或水煎三沸冷服亦得

理中丸

白朮　人蔘　乾薑　甘草 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸冷水化下

右爲細末渴者溫水調下不渴者溫水調下不拘時候服

五苓散

白朮　茯苓　木豬苓 各一兩半　澤瀉 二兩半

右爲細末冷水調下或水煎三沸冷服亦得

理中丸

白朮　人蔘　乾薑　甘草 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸冷水化下

如吐瀉不止身出冷汗無脈者可服後瀉痢論中藥水散兼桂枝湯白朮湯皆可服後痢門中藥亦可選用

凡霍亂不可飲熱白米粥飲之死必不救切須愼之

霍亂論第九

論曰醫之用藥如將帥之用兵本草曰良醫不能以無藥愈疾猶良將無兵不足以勝敵也故用藥如用兵轉筋霍亂者治法同用兵之急不可緩也故吐瀉不止者其本在於中焦或因渴大飲或因飲面過量或陰而飽甚或濕內甚故陰陽交而不和是爲吐瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉此爲急病也然吐利爲急十死其一二如揮霍撩亂而不得吐瀉此名乾霍亂必死法曰既有表宜緩形形動則肝木乃榮反靜榮則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木脾土損矣輕則滄泄身熱脈洪穀不能化重則下痢膿血稠黏若屬於火經曰暑傷於風夏必滄泄此逆四時之氣人所自爲也

霍亂論第十

論曰太陰脾經受濕而爲水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜瀉之法云宜補宜瀉脈弦而大其證多種大抵從風濕熱論是知寒少而熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰如吐瀉不止身出冷汗無脈者可服後瀉痢論中藥水散兼桂枝湯白朮湯皆可服後痢門中藥亦可選用

凡霍亂不可飲熱白米粥飲之死必不救切須愼之

白朮　人蔘　乾薑　甘草 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸冷水化下

白朮　茯苓　木豬苓 各一兩　澤瀉 二兩

右爲細末冷水調下或水煎三沸冷服亦得

理中丸

白朮　人蔘　乾薑　甘草 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸冷水化下

右爲細末渴者溫水調下不渴者溫水調下不拘時候服

五苓散

白朮　茯苓　木豬苓 各一兩半　澤瀉 二兩半　桂枝 一兩半

右爲細末冷水調下或水煎三沸冷服亦得

宣通其氣。如痢或泄而嘔者。胃中氣不和也。上焦不和。治以生薑橘皮。中焦不和。治以芍藥當歸桂茯苓。下焦不和。寒治以輕熱甚以重熱藥。□□□□□大便虛祕。灌久不愈。恐太陰傳少陰。多傳變爲痢。太陰是爲賊邪。先以枳實厚朴湯以防其變。若四肢懶倦。小便少或不利。大便走沉困。飲食減。宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味。水煎服。以白木之甘。能入胃而除脾胃之濕。芍藥之酸。瀉除胃中之濕熱。四肢困。茯苓之淡泄。能通水道走濕。此三味。泄痢須用此。如發熱惡寒。腹不痛。加黃芩爲主。如未見膿而惡寒。乃太陰欲傳少陰。加黃連爲主。桂枝佐之。如腹痛甚者。加當歸。倍芍藥。如見血。加黃連爲主。桂當歸佐之。如燥屎。或先白膿後血。或發熱。或惡寒。非黃芩不止上部血也。如惡寒脈沉。或腰痛。或血痢下痛。非黃連不能止此中部血也。如惡寒脈沉。先血後便。非地榆不能止此下部血也。如便膿血相雜。而脈浮大。愼不可以大黃下之。下之必死。謂氣下竭也。而陽無所收也。凡陰陽不和。惟可以分陰陽藥治之。又云。暴泄非陽。久泄非陰。大便完穀下。有寒有熱者。脈疾。身多動。晉聲發亮。暴注下迫。此陽也。寒者脈沉而細疾。身不動作。目睛不了了。飲食不下。鼻準氣息者。並附湯主之。若身重四肢不舉。亦附湯主之。

黃芩芍藥湯　治泄痢腹痛。或後重身熱。久而不愈。脈洪疾者。及下痢膿血稠黏。

黃芩	各一兩	芍藥	各一兩
甘草	五錢		

右爲麤末。每服半兩。水一盞半。煎至一盞。溫清。溫服無時。如痛甚加桂少許。

大黃湯　治泄痢久不愈。膿血稠黏。裏急後重。日夜無度。久不愈者。大黃一兩。

右細剉。好酒二大盞。同浸半日許。同煎至一盞半。去大黃。將酒分爲二服。頓服之。痢止。再服。以利爲度。服芍藥湯以和之。痢止再服黃芩湯和之。以徹其毒也。

芍藥湯　下血調氣。經曰。溲而便膿血。氣行而血止。行血則便血自愈。調氣則後重除。

芍藥	一兩	當歸	各半兩	黃連	各半兩
檳榔	二錢	木香	二錢	甘草	二錢炙
大黃	三錢	黃芩	半兩	官桂	一錢半

右㕮咀。每服半兩。水二盞。煎至一盞。食後溫清服。如血痢則漸加大黃。如汗後邪毒加黃柏半兩。依前服。

白朮黃芪湯　服前藥痢雖已除。猶宜此藥和之。

白朮	一兩	黃芪	七錢	甘草	三錢

右㕮咀。拌作三服。水一盞半。煎至一盞。去滓。溫清服之。

防風芍藥湯　治泄痢腹痛。及頭痛微汗。

防風	芍藥	各半兩	黃芩	半兩	

右㕮咀。每服半兩。或一兩。水三盞。煎至一盞。溫清溫服。

治太陰脾經受濕。水泄注下。體微重。微滿。困弱無力。不欲飲食。暴瀉無數。水穀不化。先宜白朮芍藥湯和之。身重暴下。是大勢來。亦宜和之。

白朮芍藥湯

白朮	一兩	芍藥	一兩	甘草	五錢

右㕮。每服一兩。水二盞。煎至一盞。溫清溫服。如痛甚者宜。

蒼朮芍藥湯

蒼朮	二兩	芍藥	一兩	黃芩	半兩

右㕮。每服一兩。加薑味桂半錢。水一盞半。煎至一盞。溫服清。如脈弦頭微痛者宜。

蒼朮防風湯

蒼朮	防風	各二兩	上使		

右㕮。同前煎服。如下血者宜。

蒼朮地榆湯

蒼朮	二兩	地榆	一兩	下使	

右㕮。同前煎服。

已上證。如心下痞。每服加枳實一錢。如小不利。各加茯苓二錢。如腹痛源已。瀉下微少。宜呵子散止之。法云。大勢已去。而宜止之。

呵子散

呵子	一兩半生半熟	木香	半兩	黃連	三錢	甘草	三錢

右爲細末。每服二錢。以白朮芍藥湯調下。如止之不已。宜歸而送之也。邪氣也。虛滑久不愈者。多傳變爲痢疾。太陰傳少陰是爲鬼邪。先以厚朴枳實湯。防其傳變。

厚朴枳實湯

厚朴	一兩	枳實	一兩	呵子	一兩半生半熟	木香	半兩
黃連	二錢	甘草	三錢炙	大黃	二錢		

右爲末。每服三五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。

漿水散　治暴泄如水。周身汗出。一身盡冷。脈微而弱。氣少而不能語。甚者加吐。此謂急病。治之

宜以此。

半夏 二兩 湯洗　附子 半兩 炮　乾薑 五錢

右爲細末。每服三五錢。漿水二盞。煎至一盞。和滓熱服。甚者三四服。微者三服。太陽經動下痢爲緊。邪大服不能禁固。卒然而下。或小泊光色。其中或有硬物。欲起而又下。欲了而不了。小便多清。此寒也。宜溫之。春夏桂枝湯。秋冬白朮湯。

桂枝湯

桂枝　白朮　芍藥 各半兩　甘草 二錢 炙

右剉。每服半兩。水一盞。煎至七分。去滓取清。宜溫服之。

白朮湯

白朮　芍藥 各三錢　乾薑 半兩 炮　甘草 二錢 炙

右剉。爲麤末。如前服之。甚則去乾薑。加附子三錢。辛能發也。治厥陰動爲瀉痢者。寸脈沉而遲手足厥逆。下部脈不至。咽喉不利。或嘔唾膿血。寫痢不止者。爲難治。宜升麻湯。或小續命湯以發之。法曰。謂表邪縮於內。故下痢不止。當散表邪。於四肢布於絡脈外。無其邪。則臟腑自安矣。諸瀉痢入胃。名曰溢飲。滑泄。渴能飲水。水下復瀉而又渴。此無藥證。當灸大椎。諸瀉痢久不止。或糞下者。皆太陰守病。故不可離于芍藥。若不受濕。不能下痢。故須用白朮。是以聖人立法。若四時下痢。於芍藥白朮內。春加防風。夏加黃芩。秋加厚朴。冬加桂附。然更詳外證寒熱處之。如裏急後重。須加大黃。如身困倦。須加白朮。如通身自汗逆冷氣息微。加桂附以溫之。如或後重。膿血稠黏。雖在盛冬。於溫藥內亦加大黃。諸下痢之後。小便利而腹中虛痛不可忍者。此謂陰陽交錯。不和之甚也。當服神効越桃散。

大梔子 三錢　高良薑 三錢

右和均。每服三錢。米飲或酒調下。其痛立效。

治大便後下血。腹中不痛。謂之溫毒下血。宜服黃連湯。

黃連 去蘆 當歸 各半兩　甘草 二錢 炙

右㕮咀。每服五錢。水一盞。煎至七分。食後溫服。

治大便後下血。腹中痛者。謂熱毒下血。當服芍藥黃連湯。

芍藥　當歸　黃連 各半兩　大黃 一錢　桂 淡味半錢　甘草 二錢 炙

右㕮咀。每服半兩。同煎服。如痛甚者。調木香檳榔末一錢服之。

治久病腸風痛痒不任。大便下血。宜服地榆湯。

苦參 去皮 四兩　地榆 二兩

右㕮咀。每服一兩。水一盞。煎至七分。食前多服。除根。

治濕瀉狀若湯

白朮 一兩　茯苓 去皮七錢半

右㕮咀。水煎一兩。食前服。食入而瀉。謂胃中有宿穀也。當加枳實芩五錢。

治寒積痢。男子小兒婦人。皆不問赤白。或清痢如水。不後重者。寒也。虛寒中有積。宜附子巴豆之類下之。見痢則愈。空心服。

治瀉痢久。臟腑不止。虛滑。穀不化用。蒼朮湯下桃花丸。

蒼朮 二兩　防風 一兩

右剉爲細末。用水一碗。煎至一大盞。絞清汁。下桃花丸八十九立愈。如小便難少。以五苓散下桃花丸。或赤白石脂丸。小便利則愈矣。

太陽爲協熱痢。涼膈散主之。

陽明爲瘟痢。進退大承氣湯主之。琥珠丸中有少陽風氣自動。其脈太陰濕勝溏瀉。不可利而可溫。四逆湯主之。

少陰熱封不動。禁固可澀。赤石脂丸乾薑湯主之。

厥陰風泄。以風治風。小續命湯。消風散主之。

治下痢膿血。裏急後重。日夜無度。治氣湯。

芍藥 一兩　當歸 五錢　大黃　黃芩 各二錢半　黃連 錢半

右爲末。每服三五錢。水一盞。煎至七分。去滓溫服。如未止。再服。不後重則止。

木香 各一錢　檳榔 一錢

諸例

瀉而便膿血者。大腸泄也。脈五至之上浮者。宜以七宣丸。如脈平至立秋宜芍藥槐皮丸。四季通用。宜加減平胃散。七宣丸之類。後芍藥槐皮丸

芍藥　黃槐 各等分

右爲細末。醋糊爲丸。如桐子大。每服五七十丸至二百丸。溫水下。食前服。

加減平胃散

白朮　厚朴　陳皮　各一兩　甘草　七錢　桔梗　三錢　木香　三錢

桃仁　黃連　人參　阿膠　各半兩　白茯苓　去皮　半兩

右爲細末。同平胃散煎服。

血多加桃仁。　泄加黃連。

小便澁加茯苓。

氣不下。後重。加檳榔木香。

腹痛加芍藥甘草。　膿加阿膠。

濕加白朮。　脈洪加大黃。

四時以胃氣爲本。久下血痢。則脾虛損而血不旋於四肢。入於胃中爲血。宜滋養脾胃則愈。

夫五洩者之病。其治法各不同者。外證各異也。

胃泄者。飲食不化多黃。承氣湯下。

脾泄者。腹脹滿泄注。食即嘔吐逆。建中及理中湯。

大腸泄者。食已窘迫。大便色白。腸鳴切痛。乾薑炙附子湯。

小腸泄者。溲便膿血。少腹痛。承氣湯。

大瘕泄者。裏急後重。數至圊而不能便。是少陰是也。蜜中痛。急利小便。此五泄之病也。胃小腸大瘕之證。皆清涼伏子主之。其泄自止。後厥陰少陰二經證。多裏急後重。故加大黃。令急推過。物去則輕矣。內肝也。內經曰。肝苦急。急食甘以緩之。少陰經證。多口燥咽乾。急食甘以緩之。又有太陰陽明二經證。當進退大承氣湯主之。太陰經曰。因其重而減之。又曰。在下者引而竭之。又曰。中滿者瀉之於內。此說在難經二十二難。是三節內。包十五法。初以暴藥中以的對證藥後。疾得中也。末治久泄法。仲景論證不能食。當先補而後瀉之。乃進藥法也。先煎厚朴半兩。俱文本方加製。水一盞半。煎至一半服之。若三兩服後未已。謂有宿食不消。又加枳實二錢同煎。服三兩服。泄又未已。如稍加食。食有熱毒。又加大黃三錢推過。泄止住藥。如泄未止。謂腸胃有久處垢滯黏。加芒硝半合。宿垢去盡則愈矣。

陽明證。能食是也。當先瀉而後補。謂退藥法也。先用大承氣湯五錢。水一盞。作前法。煎至七分。稍熱服。如泄未止。去芒硝後。稍熱退。減大黃一半。煎兩服。如熱氣雖已。其人必腹滿。又減去大黃。枳實厚朴湯又煎三兩服。如是腹脹滿退。泄亦自愈。後服厚朴湯數服則已。

又寒熱水洩之例于後

洩者。一也。經包五法。謂之六義。曰六解。難經有傷寒五泄。叔和云。濕多成五泄。仲景解四經泄利。有不可汗。有不可下者。可吐可灸者。仲景隨經自言之。假令汎引飲者。是熱在膈上。水多入則下隔入胃中。胃經本無熱。不勝其水。名曰水慾。故使米穀一時下。此證當灸大椎二五壯立已。乃瀉悸也。如用藥。乃使車前子搗丸白朮茯苓之類。可選用之。五苓散亦可。

又有寒泄者。大腹滿而泄。又有鶩溏者。是寒泄也。鴨溏者。大便如水。中有少結糞者是也。如此者。當用天麻附子乾薑之類是也。

又法曰。泄有虛實寒熱。虛則無力黏衣。不便已泄出。謂不能禁固也。實則數至圊而不能便。俗云虛坐努責散也。裏急後重。皆依前法。進退大承氣湯主之。一說梁訓云。寒傷于風。及必滄泄。又云。久風爲滄泄者。乃水穀不化而完出爾。非水口胃而成。此證非前水慾也。此一證。不飲水而穀完出。名曰滄泄。治法于後。先以宣風散導之。出錢氏方中。四味者是也。後服蒼朮防風湯。

蒼朮防風湯

蒼朮　去皮　四兩　麻黃　去根節　四兩　防風　去蘆頭　五錢

右爲麤末。每服一兩。生薑七片。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。泄止後。服椒朮丸。

椒朮丸

蒼朮　二兩　小椒　一兩去目炒

右爲極細末。醋糊爲丸。如桐子大。每服二十丸。或三十丸。食前溫水下。一法。惡痢久不愈者。加枯如小兒病丸。如黍米大。

治瀉痢膿血。乃至脫肛。地榆芍藥湯。

蒼朮　一兩　地榆　二兩　卷栢　三兩　芍藥　三兩

右咬咀。每服一兩。水一大盞半。煎至一半。溫服。病退藥止。

五泄傷寒乃分三節

初說暴　次說中　後說久泄

治久泄法。先進縮煎小縮命湯。是發其汗。使邪氣不能以外侵于內。然後治其痢。秋冬間下痢。風吐論中。加減厚朴丸大效。

凡臟腑之祕不可一例治療。有虛祕。有實祕。胃實而祕者。能飲食。小便赤。當以麻仁湯七宣丸之類主之。

胃虛而祕者。不能飲食。小便滑利。厚朴湯主之。

厚朴 生薑炒 一兩　陳皮 去白 二兩　甘草 三兩 炙
厚朴 五兩　白朮 五兩　半夏 二兩　枳實 炒 一兩

右爲麤末。每服一兩。水二盞。半生薑五片。棗三枚。煎至一盞。去滓溫服。空心。實祕者。物也。虛祕者。氣也。

平胃丸

治病久虛弱。脈脈不能食。而臟腑或祕或瀉。此胃氣虛弱也。當服和中消痰去濕。及厚腸胃。進飲食。

厚朴 一兩　白朮 一兩　陳皮 去白 八錢　木香 一錢
枳殼 五錢　甘草 三錢 炙　生半夏 湯洗 一兩

右爲細末。薑汁浸。蒸餅丸。如桐子大。每服五十丸。生薑湯。或溫水下。

心痛論第十一

論曰。諸心痛者。皆少陰厥氣上衝也。有熱厥心痛者。身熱足寒。痛甚則煩燥而吐。額自汗出。知爲熱也。其厥洪大。當灸大鄧及崑崙。謂表裏俱瀉之。是謂熱病汗不出。引熱下行。表汗通身而出者。愈也。灸畢。服金鈴子散。痛止服枳朮丸。去其餘邪也。有大實心中痛者。因食受時氣。卒然發痛。大便或祕。久而注悶。心胸高起。按之愈痛。不能飲食。急以瀉黃丸利之。利後以藍本湯去其餘邪。有寒厥心痛者。手足逆而通身冷汗出。便利溺清。或大便利而不渴者。氣微力弱。急以朮附湯。溫寒厥暴痛。非久病也。朝發暮死。當急救之。是知久痛無寒。而暴痛非熱。

治熱厥心痛。或發或止。久不愈者。當用金鈴子散。

金鈴子 玄胡 各一兩

右爲細末。每服三錢。酒調下。

大實心痛瀉黃丸

雄黃 一兩 研　巴豆 五錢。去皮生用。研細入雄黃末。

右再研二味。白麵二兩。同和再研均。滴水丸如桐子大。每服時。先煎漿水令沸。下柴二十四丸。煮一二十沸。撈入冷漿水。沉冷一時。服二九。一日二十四丸。加至微利爲度。用煮藥水送下。此治腸下痃痛如神。

治大實心痛。大便已利。宜藍本湯。徹其毒也。

藍本 半兩 蒼朮 一兩

右爲麤末。每服一兩。水二盞。煎至一盞。溫服。渣。

治寒厥暴痛。脈微。氣宜煮附湯

附子 一兩 炮去臍 細切 一兩　白朮 一兩　甘草 二兩 炙

右爲麤末。入附子令均。每服三錢。水一大盞半。入生薑五片。棗一枚。煎至一盞。去滓溫服。空心。實祕者。物也。虛祕者。氣也。

食前。

此藥又治風濕相搏。身重疼煩。不能轉側。不嘔不渴。大便堅硬。小便自利。及風虛頭目眩重者。不知食味。除肌補中。助陽氣。止自汗。

治男子婦人心經搖熱。如痫病狀。宜服妙香丸。

風癇者。煎羌活爲引。下妙香丸。血癇當歸湯引下。刺心痛諸穴于後。

真心痛。手足青至節。痛甚。旦發夕死。夕發旦死。

心痛腹服。當當然。大便不利。取足太陰。

心痛引腰脊。欲嘔。取刺足少陰。

心痛引小腹滿。上下無常處。便溺難。刺足厥陰。

心痛短氣。刺手太陰。

心痛腹服。當當然。大便不利。取足太陰。

心痛引腰脊。欲嘔。取刺足少陰。

心痛與背相接。善恐。如從後觸其心。偏傴者。腎心痛也。先刺經背。昆侖。不已刺合骨。

心痛腹服。胸滿。心尤痛者。胃心痛也。刺太都、太白二穴。

心痛如錐刺。乃脾心痛也。刺然谷。大鄧。

心痛若然如死狀。終日不得休息。乃肝心痛。取行間。太衝。

心痛臥若徙居。心痛間。動作益痛甚者。其色不變。此肺心痛也。刺魚際。大淵。宣通氣行。無所凝滯。則病愈也。

心痛當九穴。刺之立已。不已上下求之。得之則已。

按經三法

素問病機氣宜保命集卷下

欬嗽論第二十一

論曰。欬謂無痰而有聲。肺氣傷而不清也。嗽是無聲而有痰。脾濕動而爲痰也。欬嗽謂有痰而有聲。蓋因傷於肺氣。動於脾濕。欬而爲嗽也。脾濕者。秋傷於濕。積于脾也。故內經曰。秋傷於濕。冬必欬嗽。大抵諸秋之氣宜清。須反動之氣。必上衝而爲欬。甚則動于脾濕。發而爲痰焉。是知脾無留濕。雖傷肺氣。而不爲痰也。有痰。寒少而熱多。故欬嗽者。非專主于肺而爲病。以肺主皮毛而司于外。故風寒先能傷之也。內經曰。五臟六腑皆能令人欬。非獨肺也。各以其時主之而受病焉。非其時各傳而與之也。所病不等。寒暑燥濕風火六氣。皆令人欬。唯濕病。痰飲入胃。留之而不行。止入于肺。則爲欬嗽。假令濕在于心經。謂之熱痰。濕在脾經。謂之風痰。濕在肺經。謂之氣痰。濕在腎經。謂之寒痰。所治不同。宜隨證而治之。若欬而無痰者。以辛甘潤其肺。故欬嗽者。治痰爲先。治痰者。下氣爲上。是以南星半夏勝其痰。而欬嗽自愈。枳殼陳皮利其氣。而痰自下。痰而能食者。大承氣湯微下之。少利爲度。痰而不能食者。厚朴湯治之。夏月嗽而發熱者。謂之熱痰。小柴胡四兩。加石膏一兩。知母半兩治之。冬月嗽而發寒熱。謂之寒嗽。小青龍加杏仁服之。然此爲大例。更當隨證隨時加減之。量其虛實。此治法之大體也。

蜜煎生薑湯　蜜煎橘皮湯　燒生薑胡桃

此者。皆治無痰而嗽者。常以辛甘潤其肺故也。如但使清陳皮藥。皆常去白。本草云。陳皮味辛。理上氣。去痰氣滯塞。青皮味苦。理下氣。二味俱用散三焦之氣也。故聖濟云。陳皮去痰。穰不除。卽生痰。麻黃發汗。節不去而止汗。

治風痰熱嗽。嗽其脈弦而青。四肢滿悶。便溺秘澁。心多燥怒。水煮金花丸。

南星　半夏　各一兩　生川　天麻　五錢　薑黃　二錢　白礬　三兩

右爲細末。滴水爲丸。每服五七十丸至百丸。煎漿水湯下。藥煮令沸浮爲度。漉出淡漿水。另用生薑湯下。或逍遙加半夏及局方中川芎丸。防風丸。皆可用也。

小黃丸。治熱痰欬嗽。脈洪而赤。煩熱心痛。唇口乾燥。多喜笑。宜小黃丸。

南星　薑湯洗　半夏　洗各一兩　黃芩　一兩半

右爲細末。生薑汁浸。蒸餅爲梧子大。每服五十丸至七十丸。食後薑湯下。及小柴胡湯中加半夏亦可。

白礬丸。治痰濕欬嗽。脈緩而黃。支體沉重。嗜臥不收。腹脹而食不消化。宜白礬丸。

南星　半夏　俱濕洗　各一兩　白礬　一兩半

右爲細末。糊爲丸。桐子大。每服五七十丸。生薑湯下。及局方中防己丸亦可用。

玉粉丸。治氣痰欬嗽。脈濡而白。上喘氣促。酒漸壅塞。愁不樂。宜服之。

南星　半夏　俱濕洗各一兩　官桂　去皮一兩

右爲細末。薄糊爲丸。如桐子大。每服五七十丸。生薑湯下。食後。及局方中防己丸亦可。玉粉丸加減在後。心下否者。加枳實伍錢。身熱甚者。加黃連五錢。體重者。加茯苓一兩。氣上逆者。加苦葶藶五錢。氣促者。加人參桔梗各五錢。浮腫者。加郁李仁杏仁各伍錢。大便秘者。加大黃五錢。

變玉散。治痰熱而喘。痰湧如泉。

寒水石　石膏　各等分

右爲細末。煎人參湯調下三錢。食後服。

治痰千緡湯。

半夏　生末一兩　大皂角　去皮子半兩劑

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片同煎。至一半。以手搓洗之。取清汁。分作三服。食後併服。三服効。

防風丸。治痰嗽胸中氣不清利者。　枳朮丸亦妙。

防風 半兩　枳殼 半兩去瓤炒　白朮 一兩
雄黃 少許

右細末。燒餅爲丸。每服五七十丸。生薑湯下。

天麻丸

天麻 一兩　半夏 南星 各一兩　雄黃 少許

右以白麵二兩。滴水爲丸。如桐子大。每服五十丸至百丸。煎淡水令沸。下藥五十餘沸。漉出。食前生薑湯下。

利膈丸。主胸中不利。痰嗽喘促。利脾胃壅滯。調秘瀉藏。推陳致新。消進飲食。治利膈氣之勝藥也。

木香 一錢　檳榔 一錢半　人參 三錢　當歸 二錢　縮香 一錢半

大黃 酒浸焙　厚朴 薑制 各一兩　枳實 一兩炒　甘草 三錢炙

右爲細末。滴水和丸。如桐子大。每服三五十丸。食後諸飲皆下。

歐氣丸　治久嗽痰喘。肺氣浮脹。

青皮 去白　陳皮 去白　檳榔

茯苓　澤瀉　當歸　蘆薈

木香　杏仁 去皮尖　郁李仁 去皮

人參　防己 各五錢　桑牛 攻頭末一兩

右爲細末。生薑汁麵糊爲丸。如梧子大。每服一二十丸。加至五七十丸。生薑湯下。食後服。

玉粉丸　治痰結咽喉不利。語音不出。

半夏 洗五錢　草烏 一字炒　桂 一字多

右同爲末。生薑汁浸蒸餅爲丸。如雞頭大。每服一丸。至夜含化。多藏不愈者。亦効。

枳殼湯　治久痰胸膈不利者。多上焦發熱。

枳殼 鉄炒去瓤三兩　桔梗 三兩　黃芩 一兩半

右同剉。每日早用二兩半。水三盞。煎至二盞。勻作三服。午時一服。申時一服。臨臥時一服。三日七兩半。藥盡服生半夏湯。

生半夏湯

半夏 不以多少洗七遍切作片子

右每服秤三錢。水一盞半。入生薑五大片同煎。至一盞。和滓食後服。一日三二服。服三日畢。再服枳朮丸。盡其痰爲度。論曰。先消胸中氣。後去兩上痰。再服枳朮丸。謂首尾合盡消其氣。謂令痰不復作也。

清鎭丸　治熱嗽

小柴胡湯內加人參一倍　青黛 半兩

右爲細末。麵糊丸。如桐子大。每服五十丸。生薑湯下。

半夏丸　治因傷風而痰作喘逆。兀兀欲吐。惡心欲倒。已吐。加檳榔三錢。

半夏 一兩湯洗切　雄黃 研三錢

右同爲末。生薑汁浸蒸餅爲丸。桐子大。每服三十丸。生薑湯下。小兒丸如黍米大。

白朮散　治夏暑大熱。或醉飲冷。痰濕不止。腸不利。

白朮　茯苓　半夏 洗　黃芩 各等分

右爲細末。每服五錢至七錢。水二盞。入生薑十片。煎至一盞。去滓。調陳皮末一錢。神麴末一錢。食後服。

法曰。大熱大飲。蓋酒味熱而引飲冷。冷與熱凝於胸中不散而成濕。故痰作矣。甚者宜吐之。吐後服五苓。甘露。勝濕去痰之劑。

白朮湯　治痰潮上如湧泉。久不可治者。

白朮　白茯苓　半夏 等分

右爲末。每服半兩。病大者一兩。水二盞。生薑七片。煎至一盞。取滓。調神麴末二錢。頓服之。病甚者。下玉壺丸一百丸。大効。永除根。

天門冬丸　治婦人喘。手足煩熱。骨蒸寢汗。口乾引飲。面目浮腫。

天門冬 十兩去心　麥門冬 八兩去心　生地黃 三斤取汁焙乾

右二味爲末。蒸餅和丸。如梧子大。每服五十丸。煎逍遙散送。逍遙散中去甘草。加人參。或服王氏博濟方中人參荊芥散亦可。如面腫不已。經曰。面腫曰風。故宜汗。麻黃桂枝可發其汗。後服柴胡飲子去大黃。故論曰。治濕者治其會。治府者治其合。浮腫者治其經。治會者治其土也。治合者亦治其土也。如兵家圍魏救趙之法也。

虛損論第二十二

論曰。虛損之疾。寒熱因虛而盛也。盛寒則損陽。陽虛則陰盛。損自上而下。治之宜以辛甘淡。過于胃則不可治也。盛熱則損陰。陰虛則陽盛。故損自下而上。治之宜以苦酸鹹。過于脾則不可治也。自上而損者。一

損于肺。皮聚而毛落。二損損于心。血脈虛少。不能榮于藏府。婦人月水不通。三損損于胃。飲食不爲肌膚。自下而損者。一損于腎。骨痿不能起于床。二損損于肝。筋緩不能自收持。三損損于脾。飲食不能消磨。論曰。心肺損而色蔽。腎肝損而形痿。皮毛損而脾損。或此病者。皆損之病也。漸漬之深。皆虛勞之疾也。養血益腎。

茯苓　各等分　人參　黃耆

右爲細末。粟肉爲丸。如梧子大。每服一百丸至二百丸。食前米飲下。或酒。治血虛久痔甚効。經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通氣五味子味酸。故酸以收之。此雖陽盛不燥熱。乃是五藏虛損於內。故可益血收氣也。此藥類象神品藥也。

茯苓　各等分　芍藥　甘草　等分

治陽虛陰盛。心肺不足。宜八味丸。若形體瘦弱。無力多困。未知陰陽先損。夏月宜八味丸。

消渴論第二十三

論曰。消渴之疾。三焦受病也。有上消。中消。腎消。上消者。上焦受病。又謂之兩消病也。多飲水而少食。大便如常。或小便清利。知其燥在上焦也。治宜流濕潤燥。中消者。胃也。渴而飲食多。小便黃。經曰。熱能消穀。如熱在中。法云。宜下之。至不欲飲食則愈。腎消者。病在下焦。初發爲膏淋。下如膏油之狀。至病成而面色黧黑。形瘦而耳焦。小便濁而有脂。治法宜養血以潤滑分其清濁。而自愈也。法曰。燥上而渴。辛甘而法用潤。肺故可用蜜煎生薑湯。大器頓之。時時呷之。法云。心肺之病。葵藿類面少飲。內經云。補上治宜以緩。又曰。辛以潤之。開腠致津液。通則肺氣下流。故氣下火降而燥衰矣。其渴乃止。又經曰。二陽結爲消。王注曰。二陽結於胃及大腸俱熱也。腸胃燥熱。則蒸消水穀。可甘辛降火之劑。黃連末一斤。生地黃自然汁。白蓮花藕自然汁。牛乳汁各一斤。熬成膏子劑。黃連末爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。少呷溫水送下。日進十服。渴病立止。

治上焦消而不欲多食。小便清利。宜小柴胡湯。或加白虎湯。或錢氏方中地骨皮散。內加　芍藥　黃

者　石膏　黃芩　桔梗之類是也。

人參　半兩　石膏　一兩　知母　七錢　甘草　四錢

入參石膏湯。治煩消。上焦煩渴。不欲多食。

牛膝　酒浸　菟絲子　酒浸　白蒺藜　各等分　防風　桂枝　減半

右細末。酒煮豬腰子搗丸。桐子大。空心酒下。五七十丸。

牛膝　酒浸　蓯蓉　菟絲子　破故紙　等分　桂　半錢

右爲麤末。每服五錢至七錢。水煎食後溫服。

順氣散。治消中。熱在胃而能食。小便赤黃。微利之爲効。不可多利。服此藥漸漸利之。不欲多食則愈。

厚朴　薑制　一兩　大黃　四兩　枳實　二錢　炒

右剉。每服五錢。水煎食遠服。

茴香散。治腎消病下焦初證。小便如膏油。

茴香 炒　苦楝 炒

右細末。酒調二錢。食前服。

八味丸。治腎消大病加減法。

本方內倍加山藥外。桂附從四時加減。假令方內桂附一兩。春各用三錢。夏用一錢。秋用五錢。冬全用一兩。

珠粉丸。治白淫夢泄遺精。及消出而不收。

黃栢一斤 於新瓦上煙令過赤爲度　眞蛤粉一斤

右爲細末。滴水丸如桐子大。每服一百丸。空心酒下。法曰。盛陽乘陽。故精泄也。黃栢降火。蛤粉醎而補腎陰也。又治思想無窮。所願不得之證。

竹葉散。治消渴。

五蠱脹　黑豆 去皮 碾

右等爲細末。每服三錢。冬瓜湯調下。無冬瓜。茼葉皆可。日二服。小渴二三服。効。渴定不可服。熱藥。唯服八味丸。去附子加五味子。 小兒

腫脹論第二十四 附

蠱極脹論云。帝問岐伯。脹形何如。岐伯曰。夫心脹者。煩心氣短。臥不安。肺脹者。虛滿而喘欬。肝脹者。脇下滿而痛引少腹。脾脹者。善噦。四肢煩悗。體重不能勝衣。臥不安。腎脹者。引背央央然。腰脾痛。六腑脹。胃脹者。腹滿胃脘痛。鼻間焦臭。妨于食。大便難。大腸脹者。腸鳴痛而濯濯。冬日重於寒。則飧泄。食不化。小腸脹者。小腹膹滿。引腰而痛。膀胱脹者。少腹氣滿而氣癃。三焦脹者。氣滿于皮膚中。輕輕然而不堅。膹脹者。脇下痛。口苦。善太息。又水脹篇云。帝問岐伯。水脹何如。答曰。水始起也。目窠上微腫。如新臥起之狀。其頸脈動。欬陰股間寒。足脛腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。帝曰。脹何如。岐伯曰。脹者。寒氣客于皮中。鼓空空然不堅。腹身大。盡腫。皮厚。按其腹。窅而不起。腹色不變。此其候也。鼓脹何如。答曰。腹脹身皆大。大與腸等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸覃何如。答曰。寒氣客于腸外。與衛相搏。氣不得榮。因有所繫。癖而內著。惡氣乃起。瘕肉乃生。其始大也。大如雞子。稍以益大。至其成。如懷子狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事不以時下。此其候也。石瘕何如。答曰。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。閉塞氣不通。惡血當瀉不瀉。因以留止。日以益大。狀如懷子。月事不時。皆生于女子。可導而下。帝曰。脹鼓脹可刺邪。曰。先瀉其脹之血絡。復調其經。刺去其血絡也。

經云。平治權衡。去菀陳莝。微者。疎滌腸胃也。開鬼門。潔淨府。平治權衡者。察脈之浮沉也。去菀陳莝者。疎滌腸胃也。開鬼門。潔淨府者。發汗利小便也。又鼓脹之病。治以雞屎醴。名醫云。其腫有短氣不得臥。爲心水。兩脇痛爲肝水。大便鴨溏爲肺水。四肢皆腫爲脾水。腰痛足冷爲腎水。口苦咽乾爲膽水。乍虛乍實爲大腸水。各隨其經絡分其內外。審其脈證而別之。又有風水。皮水。石水。黃汗。歸各藏以論之。風合歸腎。風水脈浮。必惡風。皮水脈亦浮。按下沒指。石水脈沉。腹滿不喘。黃汗脈沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫脈浮。發數。卽是虛寒潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽虛陰實。爲水必矣。要知水脈必沉是也。論曰。脈出者死。與病不相應也。諺云。黑則傷肝。缺盆平則傷心。脣出則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者。必不可療也。治法云。膝以上宜發汗。膝以下利小便。錢氏論虛實腹脹。實則不因吐瀉。久病之後。亦不因下利。脹而喘急悶亂。更有痰有熱。及有宿食不化。而脹者。宜先服瀉大小便。如俱不通。先利小便。後利大便。虛則久病吐瀉後。其脈微細。肺主曰。胞膠虛腫。手足冷。之更辨認大小便。如俱不通。先利小便。後利大便。虛則久病吐瀉後。其脈微細。肺主曰。胞膠虛腫。手足冷。當先服塌氣丸。後服異功散。及和中丸。益黃散。溫其氣。 因于氣脹者。橘皮煎丸。 因于濕爲腫。煎防己黃耆湯。調五苓散。 因于熱爲腫者。服八正散。

之。更辨認大小便。如俱不通。先利小便。後利大便。虛則久病吐瀉後。其脈微細。肺主曰。胞膠虛腫。手足冷。當先服塌氣丸。後服異功散。及和中丸。益黃散。溫其氣。 因于氣脹者。橘皮煎丸。 因于濕爲腫。煎防己黃耆湯。調五苓散。 因于熱爲腫者。服八正散。

病之後。亦不因下利。脹而喘急悶亂。更有痰有熱。及有宿食不化。而脹者。宜服大黃丸。白薑子。紫霜丸。下石合歸腎。風水脈浮。必惡風。皮水脈亦浮。按下沒指。石水脈沉。腹滿不喘。黃汗脈沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫脈浮。發數。卽是虛寒潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽虛陰實。爲水必矣。要知水脈必沉是也。論曰。脈出者死。與病不相應也。諺云。黑則傷肝。缺盆平則傷心。脣出則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者。必不可療也。治法云。膝以上宜發汗。膝以下利小便。錢氏論虛實腹脹。實則不因吐瀉。久病之後。亦不因下利。脹而喘急悶亂。更有痰有熱。及有宿食不化。而脹者。宜服大黃丸。白薑子。紫霜丸。下

潔淨府者。發汗利小便也。又鼓脹之病。治以雞屎醴。名醫云。其腫有短氣不得臥爲心水。兩脇痛爲肝水。大便鴨溏爲肺水。四肢皆腫爲脾水。腰痛足冷爲腎水。口苦咽乾爲膽水。乍虛乍實爲大腸水。各隨其經絡分其內外。審其脈證而別之。又有風水。皮水。石水。黃汗。歸各藏以論之。風合歸腎。風水脈浮。必惡風。皮水脈亦浮。按下沒指。石水脈沉。腹滿不喘。黃汗脈沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫脈浮。發數。卽是虛寒潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽虛陰實。爲水必矣。要知水脈必沉是也。論曰。脈出者死。與病不相應也。諺云。黑則傷肝。缺盆平則傷心。脣出則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者。必不可療也。治法云。膝以上宜發汗。膝以下利小便。錢氏論虛實腹脹。實則不因吐瀉。久病之後。亦不因下利。脹而喘急悶亂。更有痰有熱。及有宿食不化。而脹者。宜服大黃丸。白薑子。紫霜丸。下

五蠱脹　黑豆 去皮 碾

右等爲細末。每服三錢。冬瓜湯調下。無冬瓜。茼葉皆可。日二服。小渴二三服。効。渴定不可服。熱藥。唯服八味丸。去附子加五味子。 小兒

腫脹論第二十四 附

蠱極脹論云。帝問岐伯。脹形何如。岐伯曰。夫心脹者。煩心氣短。臥不安。肺脹者。虛滿而喘欬。肝脹者。脇下滿而痛引少腹。脾脹者。善噦。四肢煩悗。體重不能勝衣。臥不安。腎脹者。引背央央然。腰脾痛。六腑脹。胃脹者。腹滿胃脘痛。鼻間焦臭。妨于食。大便難。大腸脹者。腸鳴痛而濯濯。冬日重於寒。則飧泄。食不化。小腸脹者。小腹膹滿。引腰而痛。膀胱脹者。少腹氣滿而氣癃。三焦脹者。氣滿于皮膚中。輕輕然而不堅。膹脹者。脇下痛。口苦。善太息。又水脹篇云。帝問岐伯。水脹何如。答曰。水始起也。目窠上微腫。如新臥起之狀。其頸脈動。欬陰股間寒。足脛腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。帝曰。脹何如。岐伯曰。脹者。寒氣客于皮中。鼓空空然不堅。腹身大。盡腫。皮厚。按其腹。窅而不起。腹色不變。此其候也。鼓脹何如。答曰。腹脹身皆大。大與腸等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸覃何如。答曰。寒氣客于腸外。與衛相搏。氣不得榮。因有所繫。癖而內著。惡氣乃起。瘕肉乃生。其始大也。大如雞子。稍以益大。至其成。如懷子狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事不以時下。此其候也。石瘕何如。答曰。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。閉塞氣不通。惡血當瀉不瀉。因以留止。日以益大。狀如懷子。月事不時。皆生于女子。可導而下。帝曰。脹鼓脹可刺邪。曰。先瀉其脹之血絡。復調其經。刺去其血絡也。

經云。平治權衡。去菀陳莝。微者。疎滌腸胃也。開鬼門。潔淨府。平治權衡者。察脈之浮沉也。去菀陳莝者。疎滌腸胃也。開鬼門。潔淨府者。發汗利小便也。又鼓脹之病。治以雞屎醴。名醫云。其腫有短氣不得臥爲心水。兩脇痛爲肝水。大便鴨溏爲肺水。四肢皆腫爲脾水。腰痛足冷爲腎水。口苦咽乾爲膽水。乍虛乍實爲大腸水。各隨其經絡分其內外。審其脈證而別之。又有風水。皮水。石水。黃汗。歸各藏以論之。風合歸腎。風水脈浮。必惡風。皮水脈亦浮。按下沒指。石水脈沉。腹滿不喘。黃汗脈沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫脈浮。發數。卽是虛寒潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽虛陰實。爲水必矣。要知水脈必沉是也。論曰。脈出者死。與病不相應也。諺云。黑則傷肝。缺盆平則傷心。脣出則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者。必不可療也。治法云。膝以上宜發汗。膝以下利小便。錢氏論虛實腹脹。實則不因吐瀉。久病之後。亦不因下利。脹而喘急悶亂。更有痰有熱。及有宿食不化。而脹者。宜服大黃丸。白薑子。紫霜丸。下

白茯苓湯名變水

白茯苓　澤瀉 各二兩　郁李仁 二錢

右㕮咀。作一服。水一椀。煎至一半。常服無時。從少至多服。或煎得澄入生薑自然汁在內。和麵或做粥飮作常食。五七日後。卽腹下再中以白朮散。

白朮　澤瀉 各半兩

右爲細末。每服三錢。煎茯苓湯調下。或丸亦可。服三十丸。

末治之藥。服黃耆芍藥雞中之類。以調養之。平復後。忌房室豬魚鹽麪等物。

治水氣蠱脹潔淨府椵實子丸

椵實子 一斗水二斗煮成實子　白丁香 一兩　伏苓 三兩 去皮

右三味。爲細末。用椵實汁爲丸。如梧子大。不計丸數。從少至多服。至小便清利。及腹脹減爲度。後服中

治藥末治藥調養藥疏啓其中忌甘苦酸補其下五補七宣。

取穴法

治腫治其經治金火也井、榮、俞、經、陰經金也。金、木、水、火、陽經火也。

治腫木香散

木香　大戟　白牽牛　各等分

右爲細末每用三錢猪腰子一對批開摻藥在內燒熟空心服之如左則塌左右則塌右如水腫不能全去於腹上塗甘遂末在遠臍滿腹少飲甘草水其腫便去也。

治水腫

檳蔕去頭尾與葡萄心同研露七日曝乾爲細末淡酒調下累月濕用尤佳。

又方

漉一斗鍋內入水上有四指用大戟并根苗蓋之遍盆合之煮熟爲度去大戟不用旋旋喫無時盡裘決愈神効。

眼目論第二十五

論曰眼之爲病在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏宜發血安神蓄發者爲裏而易治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸主之婦人熟乾地黃丸是也或有膿肥氣盛風熱上行目昏澁者槐子散主之此由胸中氣濁上行也亟則爲痰厥亦能指曰當使胸中氣清無此病也又有因目疾服藥多而損氣者久之眼漸昏弱乍明乍暗不欲視物此曰少血之驗也熟乾地黃丸消風散定志丸相須而發之或有視物不明見黑花者此謂之腎氣弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰及閉之此風邪內滿當有不測之疾也翳膜者風熱重而有之或瘴入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣當發散而去之反疎利則邪氣內搪爲翳則深也邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之冰翳而沉邪氣牢而深者謂之陷翳當以漸發之物使其邪氣再動翳膜乃浮輔之退翳之藥則能自去也病久者不能速効當以歲月除之。

治眼赤暴發腫散熱飲子

防風　羌活　黃芩　黃連　各一兩　當歸二錢　甘草一錢

右銼細每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如大便秘澁加大黃一兩如痛甚者加當歸地黃如煩燥不能眠睡加梔子一兩。

川芎散治風熱上衝頭目眩熱腫及胸中不利。

川芎　槐子　各一兩

治藥末治藥調養藥疏啓其中忌甘苦酸補其下五補七宣。

取穴法

治腫治其經治金火也井、榮、俞、經、陰經金也。金、木、水、火、陽經火也。

治腫木香散

木香　大戟　白牽牛　各等分

右爲細末每用三錢猪腰子一對批開摻藥在內燒熟空心服之如左則塌左右則塌右如水腫不能全去於腹上塗甘遂末在遠臍滿腹少飲甘草水其腫便去也。

治水腫

檳蔕去頭尾與葡萄心同研露七日曝乾爲細末淡酒調下累月濕用尤佳。

又方

漉一斗鍋內入水上有四指用大戟并根苗蓋之遍盆合之煮熟爲度去大戟不用旋旋喫無時盡裘決愈神効。

眼目論第二十五

論曰眼之爲病在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏宜發血安神蓄發者爲裏而易治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸主之婦人熟乾地黃丸是也或有膿肥氣盛風熱上行目昏澁者槐子散主之此由胸中氣濁上行也亟則爲痰厥亦能指曰當使胸中氣清無此病也又有因目疾服藥多而損氣者久之眼漸昏弱乍明乍暗不欲視物此曰少血之驗也熟乾地黃丸消風散定志丸相須而發之或有視物不明見黑花者此謂之腎氣弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰及閉之此風邪內滿當有不測之疾也翳膜者風熱重而有之或瘴入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣當發散而去之反疎利則邪氣內搪爲翳則深也邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之冰翳而沉邪氣牢而深者謂之陷翳當以漸發之物使其邪氣再動翳膜乃浮輔之退翳之藥則能自去也病久者不能速効當以歲月除之。

治眼赤暴發腫散熱飲子

防風　羌活　黃芩　黃連　各一兩　當歸二錢　甘草一錢

右銼細每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如大便秘澁加大黃一兩如痛甚者加當歸地黃如煩燥不能眠睡加梔子一兩。

川芎散治風熱上衝頭目眩熱腫及胸中不利。

川芎　槐子　各一兩

右細末三錢如胸中氣滯不利生薑湯調日疾茶調風熱上攻咬咀一兩水煎食後服。

治眼久病昏澁因發而久不愈地黃湯。

防風　羌活　黃芩　黃連　各等分
地黃　當歸　人參　茯神　各等分

右爲細末每服五七錢水一盞半煎至一盞去滓溫服食後。

槐子散

槐子　黃芩　木賊　菊花　各等分

右細末茶清調下食後。

治眼生翳膜及瘴入眼熱赤已過者瀉青丸主之當半減大黃如大便秘。

治冰翳久不去者羚羊角散主之。

羚羊角　升麻　細辛　各等分　甘草半之

右爲細末一半爲散一半蜜爲丸如桐子大每服五七十丸以羚羊角散下之食後臥米泔水煎服。

治太陽經衝盡血實腫人臉重頭中濕淫腐脈睛痛肝風盛眼黑腎虛枯梗丸。

桔梗　一斤　牽牛　頭末三兩

右二味爲末煉蜜爲丸如桐子大每服四五十丸加至百丸食前溫水下日二服。

金絲膏　點眼藥

生薑　四兩取汁　白沙蜜　一斤煉去滓　豬膽汁　三錢　黃連　四兩細用水一斗浸煎取五升。

右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨次入下項藥末。

腦子　四錢　麝香　三錢　硼砂　四錢　鵬砂　三錢　輕粉　五錢　熊膽　四錢　青鹽　三錢

右極細揩勻熬合稀許點用。

治眼暴赤發腫痛不可忍者救苦丸。

黃連　一兩　當歸　二錢　甘草　一錢

右同剉細新水半椀浸一宿以慢火熬約至一半以綿濾去滓以滓爲妙用火再熬作稠膏子爲度擘在枕上倒合以物蓋之用熟艾一大彈子許底下燃之用艾盡爲度取入下項藥。

朱砂　一錢飛　腦子　半錢　乳香　沒藥　等分

819

右同研極細。入黃連苦肉搜和丸如米大。每用二九。點眼大角內。仰面臥。藥化則起。

治眼發赤腫。澁氣侵睛。眼痛宜澁散。

盆硝　雄黃　乳香　沒藥　各等分

右爲極細末。以少許鼻內嗑之。

治眼風澁發腫。鼻中欲嚏。嗽多大損而生瘡宣風散。

川芎　甘菊　各二錢　乳香　沒藥　各一錢

右和勻。再研極細。少許鼻內嗑之。

目能遠視不能近視。局方中定志丸。目能近視不能遠視。萬壽地芝丸。

生薑　四兩　天門冬　四兩去心　枳殼　三兩去瓤炒　甘菊　二兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。茶清或溫酒下一百丸。食後。此藥能愈大風熱。

洗眼藥

呵子　二兩　青升　四兩　蜜　八兩　柳枝　四十寸

右以河水二椀。煮至半椀。用一錢熱水化洗之。石器內煮。

治眼赤腫。以青鹽擂不以多少。淘淨晒乾。末之。含嗽人仰臥合目。用藥一錢。散在眼上。須臾藥行。待少時去藥。赤腫亦無。

治倒睫　無名異末之。摻捲在紙中。作撚子。點着到藥處。吹殺。以烟熏目。睫自起。

瘡瘍論第二十六

論曰。瘡瘍者。火之屬。須分內外。以治其本。內經曰。膏粱之變。足生大丁。其原在裏。發于表也。受持如虛。言內結而發諸外。未知從何道而出。皆是從虛而出也。假令太陽經虛。從背而出。少陽經虛。從鬢而出。陽明經虛。從髀而出。皆是從虛而出。又經曰。地之濕氣感則害人皮肉筋脈。其在外盛則內行。若其脈沉實。病瘡已發。微覺腫硬。皮血不變色。脈沉不痛者。當外灸之。引邪氣出而方止。如以有膿水者。不可灸。當刺之。淺者。亦不灸。經曰。陷者灸之。如外微覺木硬。面不痛者。當急灸之。是邪氣深陷也。淺者不可灸。慎之。諸病瘡瘍。如嘔者。是濕氣浸于胃也。藥中宜倍加白朮服之。

內疎黃連湯。治嘔噦心通發熱面煩。脈沉而實。腫硬木悶。面皮內不變色。根深大。病在內。藏府秘澁。當用疎利之。

黃連　芍藥　當歸　檳榔　木香　山梔子　薄荷　桔梗　甘草　已上各一兩　連翹　二兩

右除檳榔木香二味爲細末外。並剉。每服一兩。水一盞半。煎至一盞。先喫一二服。次每服加大黃一錢。再服加一錢。以利爲度。如有熱證。止服黃連湯。大便秘澁。加大黃。覺無熱證。少煎沒藥內托復煎散。時時服之。如胃無熱及大小便通。止服復煎散。稍有熱證。却服黃連湯。秘則加大黃。如此內外皆通。榮衛和調。則經絡自不邊絕矣。

治腫瘍于外。根蒂不深。形證在表。其脈多浮。痛在皮肉。邪氣盛則必侵于內。急須內托以救其裏也。服內托複煎散。

地骨皮　黃耆　芍藥　黃芩　白朮　人參　柳桂　味淡者　甘草　防己　當歸　已上各一兩　防風　二兩

右㕮咀。先煎黃芪一斤。用水五升。煎至三升。去芪滓。入前藥十二味再煎至三四盞。絞取清汁。作三四服。終日服之。又煎黃芪滓爲湯。去滓再依前煎服十二味滓。此除濕散熱。使胃氣和平。如或未已。再

820

作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使藥衛俱行邪氣不能內陷也

治諸瘡瘍腐已行如痛不可忍者可服當歸黃耆湯并加減在後

當歸　黃耆　地黃　地骨皮　川芎　芍藥　等分

右㕮咀每服一兩水一碗煎至五分去滓溫服如發熱者加黃芩煩熱不能臥者加梔子如嘔是濕氣伐胃也倍加白朮

骨槽方

好芝蔴油半斤　當歸半兩　杏仁四十九個去皮尖　桃柳枝各四十九條長四指

右用桃柳二大枝新綿一藥包藥繫於一枝上內油中外一枝攪於鐵器內煎成入黃丹三兩一處煮水中滴成不散如珠子爲度

治金絲瘡一云紅絲瘡其狀如線或如繩巨細不等經所謂丹毒是也但比標毒不甚盛悶人患此疾頭手有之下行至心則死下有之上行亦然法當於瘡頭截經面剩之以出血後嚼萍草根塗之立愈

治從高墜下挺潮昏冒此瘡恐得也苦杖散

苦杖不以多少

右細末熱酒調下如產後瘀血不散或聚血皆治之

治丁瘡奪命散

烏頭尖　附子庭　蝎稍　雄黃各一錢　蜈蚣一對　礜砂半錢

粉霜　輕粉　麝香　乳香各半錢

右爲細末先破瘡出惡血畢以草杖頭用紙帶入于內以深爲妙諸瘡腫已破未破膿血當歸散主之當歸　黃耆　搗製

治瘡難消不能作膿痛不止木香散

地骨皮一兩去土皮　木香半兩　穿山甲二錢半炙黃　乳香半錢　麝香一字

右爲細末酒調下三錢及小兒疽後生癰米飲調下效如神

治丁瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁　蟬殼　管仲各半兩　丁香　乳香各一錢

右細末每服二錢溫酒調下

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香　輕粉　粉霜　雄黃　麝香各一錢

右同研細新餓和作錠子用之

治諸瘡大腫痛不辨肉色證候光色名曰附骨癰如神三生散

露蜂房　蛇退皮　頭髮洗淨等分

三味燒灰存性研細酒調三錢

治膀胱移熱于小腸上爲口糜好飲酒人多有此疾當用導赤散治少陰口瘡半夏散若聲絕不出者是風寒遏絕陽氣不伸也

半夏一兩生用　桂一錢　甘草一寸　白礬一塊　烏頭一字

右同爲一麤末水分作二服其效如神

治太陰口瘡甘礬散

生甘草一寸　白礬一塊

右嚥化嚥津

治舌口瘡乳香散

乳香　沒藥各一錢　白礬飛半兩　銅綠少許

右爲細末掺用

治諸瘡腫痛色變紫黑者回疽金銀花湯　金銀花四兩　黃耆四兩

右三味剉細酒一升入瓶內閉口重湯內煮三二時取出去滓諸瘡腫已破未破膿血當歸散主之　當歸　黃耆　搗製

右爲粗末每一兩如瘡面大便秘加大黃三錢

治瘡口痛大者　寒水石燒一兩　滑石一兩　乳香　沒藥各五錢　腦子少許

右各研細同和勻少掺瘡口上

治瘡有惡肉不能去者　雄黃研　巴豆一顆去皮研

右二味同研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去也

木香散　治瘡日久不斂

木香　黃連等分

木香　檳榔　各一錢　黃連二錢

右爲細末。摻上。如痛。加當歸一錢貼之。自收飲。

又方　小椒去口炒黑色　定粉一錢另研　風化灰五錢　白礬二錢半生用

右爲細末。摻瘡口上。

鍼頭藨　治瘡瘍腫木硬。蜥蜴　麝香　各一錢

各同研極細。以兒乳汁調和泥。入合縫內盛。乾不妨。每月以唾津調搽少許於腫處。更以膏藥傳之。毒氣自出。不能爲瘡。雖有瘡亦輕。

治白口瘡沒藥散

沒藥　乳香　雄黃　各一錢　輕粉半錢　巴豆霜少許

右細末。乾摻。

瘧瘧論第二十七

夫瘧瘧者。經所謂結核是也。或在耳前後。連及頤頷。下連缺盆。皆爲瘰癧。或在胸及胸之側。下連兩脇。皆爲馬刀。手足少陽主之。此經多氣少血。故多堅而少軟。膿白而稀如泔水狀。治者。求水清可也。如瘰癧生去別經。臨時於銅人內隨其所屬經絡部分對證之穴灸之。并依經內藥用之。獨形而小者爲結核。積數連結者爲瘰瘧。形表如蛤者爲馬刀。

治馬刀連翹湯

連翹二斤　甘草一兩　大黃三兩　甘草一兩

右㕮咀一兩。水兩碗。煎至一盞半。早食後巳時服。在頃兩邊。是屬少陽經。服藥十餘日後。可於隨泣穴灸二七壯。服藥不可住了。至六十日決效。有一方。加大黃不用甘草。更加貝母五兩。雄黃七分。檳榔半兩。同末。熱水調下三五錢。

治瘰癧文武膏　熟者　生也

文武蜜二斗熬

右以布袋取汁。銀石器中熬成膏。白湯點一匙。日三服。

痔疾論第二十八

論曰。手陽明大腸名曰害盡。書生也　六元正紀論陽明又曰司殺府。手陽明大腸金　大腸名害盡。謂金能害五虫。又曰司殺府。謂金主殺。既有此二名。何以自生虫。蓋謂三焦相火盛。而能制陽明金。故木來相侮。內經曰。侮

謂勝己也。木主生五虫。叔和云。氣主生于脾藏。榜。大腸瘕痛。陣難當。漸侵稍瀉三焦熱。莫護多方立紀綱。此言飲酒多食熱物。脾生大熱。而助三焦氣盛。火能生虫也。當瀉三焦火熱退。使金得氣。而反制木。木受制。則五虫不生。病自愈矣。

芩連澤瀉丸

芩連　四兩去皮　澤瀉二兩　枳實二兩　地榆一兩　皂子二兩燒存性

右爲細末。燒飯爲丸。桐子大。每服三十丸。食前。酒或米飲下。

又方

川烏炮　古石灰等分　依前丸服。

淋洗藥

天仙子　劄芥　小椒　藍荊子等分

右以水煎洗。

黑地黃丸。治痔之聖藥也。在虛損門下有方。

婦人胎產論第二十九

論曰。婦人童幼天癸未行之間。皆屬少陰。天癸既行。皆從厥陰論之。天癸已絕。乃屬太陰經也。治胎產之病。從厥陰經者。是謂生化之源也。厥陰與少陽相爲裏裏。故治法無犯胃氣。及上二焦爲三禁。不可汗。不可下。不可利小便。發汗者。同傷寒下早之證。利大便。則內亡津液。胃中枯燥。變藥之法。能不犯三禁。則榮衛自和。榮衛和而寒熱止矣。外則和于榮衛。內則調于清便。先將此法爲之初治。次後詳而論之。見證消息。同壞證傷寒。爲之緩治。或小便不利。或大便秘結。或積熱於腸胃之間。或以成痰。或散血氣。而爲浮腫。蓋產理多門。故同傷寒壞證。如發渴而白虎。氣弱則黃耆。血瘕痛而用以當歸。腹中痛而加之芍藥。已上例證。不犯三禁。皆產後之久病也。凡產後暴病。禁犯不可拘也。如產後熱入血室者。桃仁承氣抵當湯之類是也。胃堅燥者。大承氣不可以瀉藥言之。產後世人多用烏金四物。最不知四時之寒熱。不明血氣之虛與實。昏然一服用藥。如此而愈加增劇。是醫人誤之耳。大抵產病天行。從增損柴胡。雜證從加添四物。然春夏雖從柴胡。秋冬約同四物。藥性寒熱。病證虛實。不可不察也。四物湯常病服。餌四時各有增損。今具增損于后。

春倍川芎。一日卷二日服　夏倍芍藥。一日五二日服　秋倍地黃。一日秋二日服　冬倍當歸。一日冬二日服流。

芎藭三日頭痛　芍藥洪三日渴　地黃三日鼻虛　當歸三日寒而不食　此當服順

四時之氣。而有對證不愈者。謂失其輔也。春防風四物。加防風倍川芎。夏黃芩四物。加黃芩倍芍藥。秋天門冬四物。加天門冬倍地黃。冬桂枝四物。加桂枝倍當歸。此四時常服。隨證用之也。如血虛而腹痛。微汗而惡風。四物加茂桂。謂之服痛。

六合。如風虛眩運加秦艽羌活。謂之風六合。如氣虛弱。起則無力。匡然而倒。加厚朴陳皮。謂之氣六合。如發熱而煩。不能安臥者。加黃連梔子。謂之熱六合。如虛寒厥微。氣難布息。不渴清便自調。加乾薑附子。謂之寒六合。如中濕身沉重無力。身涼微汗。加白朮茯苓。謂之濕六合。此婦人常病及產後病通用之藥也。

治婦人虛勞。局方中謂之首尾六合者。如人蔘散。下熟乾地黃丸。是治無熱虛勞。專其發也。中道藥也。牡丹煎丸。空心食前。人參荊芥散。臨臥食後。是治有熱虛勞藥也。

治婦人懷胎腹脹。枳殼湯

枳殼　三兩　炒　黃芩　一兩

右爲麤末。每服半兩。水一盞半。煎一盞。去滓溫服。

治產前腹滿。身體沉重。枳殼湯。中加白朮一兩。

治產前寒熱。小柴胡湯中去半夏。謂之黃龍湯。

治懷孕胎漏二黃散

生地黃　熟地黃　各等分

右爲細末。加白朮枳殼湯調下一兩。日二服。

治有孕胎漏。地黃當歸湯。

當歸　一兩　熟地黃　二兩

右爲麤末。作一服。水三升。煎至升半。去滓頓服。

束胎丸

白朮　枳殼　去穰炒　等分

右爲末。燒飯爲丸。如桐子大。又月一日食前服三五十丸。溫熟水下。胎痩易生也。服至產則已。

產間藥

治胎衣不下。或子死腹中。或血衝上昏悶。或血暴下。及胞乾而不能產者。宜服半夏湯。

半夏麴　一兩　桂　七錢半　去皮　大黃　五錢　桃仁　三十箇去皮尖炒

右爲細末。先服四物湯三兩服。次服半夏湯三錢。生薑三片。水一盞。煎去三分。食後如未效。次服下胎丸。

下胎丸

半夏　生　白斂　各半兩

右爲細末。滴水爲丸。如桐子大。食後用半夏湯下三二丸。續續加至五七丸。如有未效者。須臍大其藥。

治產後經水通斷。或子異證。手足牽掣。咬牙昏冒。宜增損柴胡湯。

產後藥

治產後經水通斷。或子異證。手足牽掣。咬牙昏冒。宜增損柴胡湯。

柴胡　八錢　黃芩　四錢半　人參　三錢　半夏　三錢　石膏　四錢　知母　二錢　黃者　五錢　甘草　四錢炙

右爲麤末。每服半兩。生薑五片。棗四箇。水一盞半。煎至一盞。溫服。病無時。

前證已去。次服秦艽湯。去其風邪。

秦艽　八錢　人參　三錢　防風　四錢半　芎藭　半兩　柴胡　八錢　黃芩　四錢半　半夏　三錢　甘草　四錢炙

右爲麤末。每服五七錢。水一盞。煎至七分。溫服。病無時。二三日經水復行。前證退。宜服荊芥散。小柴胡湯中加荊穗五錢。枳殼五錢。數炒去穰。同小柴胡湯煎服。三二日後。宜正脾胃之氣。兼除風邪。宜服防風湯。

芍藥　四兩　防風　三兩　當歸　一兩半　羌活　一兩半

右爲粗末。每服一二兩。水三盞。煎至一盞半。取清。續續當服。無時。

凡胎前之藥。無犯胎氣。產後變化。並同傷寒壞證。盡從加減四物湯調治。

治產後腹大堅滿。喘不能臥。白聖散。

樗柳根　三兩　大戟　一兩半　甘遂　一兩　炒

右爲極細末。每服二三錢。熱湯調下。取大便宜利爲度。此藥主水氣之勝藥也。

治產後風氣在表。面目四支浮腫。宜加減局方中七聖丸。每服二十丸。白湯下。日加三四丸。以利爲度。

浮腫喘嗽。加木香檳榔倍之。謂氣多浮則腫。如頭目昏冒。加羌活川芎。謂多風也。如只浮腫。依七聖丸本方服之。

治產後日久虛勞。雖日久而脈浮疾者。宜服三元湯。

柴胡　八錢　炙　黃芩　人參　半夏　洗　甘草　炙　已上各三錢

右爲麤末。每服二三錢。熱湯調下。

川芎　芍藥　熟地黃　當歸　各二錢半

右爲麤末。同小柴胡湯煎服。

治日久虛勞。微有寒熱。脈沉而浮。宜柴胡四物湯。

川芎　熟地黃　當歸　芍藥　各一兩半　柴胡　八錢

人參　黃芩　甘草　半夏麴　已上各三錢

右爲細末。同四物煎服。

如日久虛勞。鍼灸小藥俱不效者。宜服三分散。

白朮　茯苓　黃耆　川芎　芍藥　熟地黃　當歸各一兩　柴胡一兩　黃芩六錢　人參一兩　六錢半夏六錢　甘草六錢

右爲細末。每服一兩。水一盞。煎至半盞。溫服。淸日一服。

治產後虛勞不能食。宜十全散。

白朮　茯苓　黃耆各二兩　人參　川芎　芍藥　熟地黃　當歸各一兩　桂一兩半　甘草一兩　牛炙

右劑如麻豆。每服半兩。水一盞半。入生薑五片。棗三枚。同煎至七分。空心食前溫服。

凡虛損病者。後探。治有次第。虛損論中詳論之。

治產後諸風痙。擊無力。血風證。

羌活　防風　白芷　川芎　芍藥　當歸　地黃　白朮　茯苓各等分

右爲細末。一半煉蜜丸如桐子大。一半散。溫酒臨下九子。五七十九甚妙。

治產後諸積不可攻。當養陰去熱。其病自退。宜服芍藥湯。

芍藥一兩半　黃芩　茯苓各六錢

右三味爲麤末。每服半兩。水煎。日三服。去滓溫服。

治產後兒枕大痛。黑白散。

烏金石燒紅醋七遍。另爲細末　寒水石燒存性末　各三錢

右二味各等分。另頓放臨服各抄末一錢半。粥飲湯下。痛止便不可服。未止再服大效。

治產後不須而渴。桃花散。

新石灰一兩半　黃丹一兩

右細末。渴時冷漿水調一錢服。

治產後衝服。胸中有物狀。是噎氣不降。紫金丹。

代赭石　硫礵石各等

右爲細末。醋糊爲丸。如桐子大。每服三五十九。酒下。胷中痛加當歸湯下。久服治血癖。

又方

代赭石一兩　桃仁三錢炒去皮尖　大黃五錢

右爲末。薄荷水爲糊丸。如桐子大。每服三五十丸。溫水下無時。

治臍腹痛不可忍。四物湯一兩加玄胡三錢半。

治血癖腹痛。及血崩腰痛。四物湯細末二兩。加酒煑玄胡細末三兩。

治血逆、血結、血聚於胸中。或偏于少腹。或逆于肋脇。四物湯四兩。倍當歸川芎。加鬼箭紅花玄胡各一兩。同爲末。如四物湯煎服。取淸調沒藥散服之。

沒藥散

虻虫一錢去足羽炒　水蛭一錢炒　麝香一錢　沒藥三錢

右爲細末。煎前藥調服。血下痛止。只服前藥。

治產後頭痛。血虛痰癖。寒厥。皆令頭痛。加減四物湯。

羌活　川芎　防風　香附子炒　白芷各等分　細辛二錢　當歸五錢　熟地黃一兩　甘草五錢　蒼朮一兩六錢去皮

右爲麤末。每服一兩。水煎服。無時。如有汗者。是氣弱頭痛也。方中加芍藥三兩。桂一兩半。加生薑煎。如痰癖頭疼。加半夏三兩。茯苓一兩半。加生薑煎。如熱厥頭痛。加天麻三兩。附子一兩半。生薑煎。

治產後風虛血眩。精神昏昧。荊芥散。

荊芥穗一兩　桃仁五錢去三錢皮尖炒

右爲細末。溫水調服三錢。微喘加杏仁去皮尖炒　甘草炒　各三錢。

治產前證。胎不動。如重物下墜。腹冷如冰。立效散。

川芎　當歸各等分

右爲麤末。每服秤三錢。水三盞。煎至一盞。去滓。食前服。

治婦人胎漏。及因事下血。枳殼湯

枳殼半兩　黃芩半兩　白朮一兩

右爲麤末。每服五七錢。水一盞。煎至七分。食前空心服。

治婦人筋骨痛。及頭痛。脈弦。增寒如瘧。宜服風六合湯。四物湯。四兩。加羌活防風各一兩。

治婦人血氣上衝心腹。肋下悶。宜服治氣六合湯。

四物四兩。加木香檳榔各半兩。

治婦人臍下冷腹痛。腰脊痛。宜服玄胡六合湯。

四物內加玄胡苦楝炒各一兩。

治婦人氣充經脈。月事頻併。臍下痛。宜芎藥六合湯。

四物內倍加芎藥。

治婦人經事欲行。臍腹絞痛。宜服八物湯。

四物內加玄胡苦楝各一兩。檳榔木香各半兩。

治婦人經水過多。別無餘疾。

四物內加黃芩白朮各一兩。

治婦人經水澁少。

四物內加葵花煎。

治婦人虛勞氣弱。喘嗽胸滿。宜氣六合湯。

四物內加厚朴一兩。製枳實半兩。炒

已上煎法。並同四物服之。

四物主治法

熟地黃　補血。如臍下痛。非熟地黃不能除。此通腎經之藥也。

川芎　治風。瀉肝木。如血虛頭痛。非芎不能除去。此通肝經之藥也。

芍藥　和血理脾。治腹痛。非芍藥不能除。此通脾經之藥也。

當歸　和血。如血刺痛。非當歸不能除。加血氣之壯。此通心經之藥也。

以上四味。治法如前一證。於四物湯中各加二味用之。如少腹痛。四物湯四兩。加玄胡苦楝各一兩。經水澁少。黃連。如夏月用。不去黃芩。經水如黑豆水。加黃連黃芩各一兩。經水如紅花水。加紅花一錢。經水如豆汁。加黃連一錢。經水如清水。加白芍藥一錢。經水如瘀血。加桃仁一錢。經水如屋塵。加當歸一錢。經水如魚腦。加川芎一錢。經水如米泔。加熟地黃一錢。經水如豬肝。加芍藥一錢。經水如棗泥。加生地黃一錢。經水如茶褐。加黃芩一錢。經水如豉汁。加黃連一錢。經水如清血。加白芍藥一錢。經水如瘀血。加桃仁一錢。經水如屋塵。加當歸一錢。經水如魚腦。加川芎一錢。經水如米泔。加熟地黃一錢。經水如豬肝。加芍藥一錢。經水如棗泥。加生地黃一錢。經水如茶褐。加黃芩一錢。經水如豉汁。加黃連一錢。

帶下論附

論曰。赤者。熱入小腸。白者。熱入大腸。原其本也。皆濕熱結于脈。故津液湧溢。是爲赤白帶下。本不病。緣毛脈經虛。結熱屈滯于帶。故女子臍下痛。而綿綿陰器中時下也。故經曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。王注曰。任脈自胞上過帶脈。貫於臍上。故男子內結七疝。女子帶下瘕聚。帶狀。令濕熱冤結不散。故爲病也。經曰。脾傳之腎。病名曰瘕疝。小腹冤熱而痛。出白。一名曰蠱。所以爲帶下冤屈也。冤結也。屈滯而病熱不散。先以十棗湯下之。後服苦楝丸。大玄胡散調下之。熱去濕除。病自愈也。如女子不月。先瀉心火。血自下也。內經曰。二陽之病發心脾。有不得隱曲。故女子不月。其傳爲風消。注曰。大腸胃發病也。心脾受之。心主血。心病則血不流。脾主味。脾病則味不化。味不化。則精不足。精血不足。故其證不能已。虧則風邪勝而眞氣愈消也。又經曰。月事不來者。胞脈閉也。胞脈屬于心。而絡于胞中。今氣上迫肺。氣不得上通。故月事不來。先服降心火之劑。後服局方中五補丸。後以衛生湯。治脾養血氣也。

苦楝丸。治婦人赤白帶下。

苦楝　醉酒浸　茴香　炒　當歸

右等分爲細末。酒糊丸如桐子大。每服三五十丸。空心酒下。腰腿痛疼。四物四兩。加羌活防風各一兩。

衛生湯

當歸　白芍藥　各三兩　黃耆　三兩　甘草　一兩

右爲施末。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。空心。如虛者。加人參一兩。

大頭論第三十

夫大頭病者。是陽明邪熱太甚。資氣少陽相火而爲之也。多在少陽。或在陽明。或傳太陽。視其腫勢在何部分。隨經取之。濕熱爲腫。木盛爲痛。此邪見于頭。多在兩耳前後先出。皆主其病也。治之大不宜藥速。速則過其病。所謂上熱未除。中寒復生。必傷人命。此病是自外而之內者。是血病。況頭部分受邪。見于無邪部分。是逆之。治當先緩而後急。先緩者。謂邪氣在上者無形之分部。既若無形。無所不至。若用重劑速下。過其病出。能作泄次。便小兒易禁也。身溫者順。身涼者逆。則宜服防風湯以和之。

防風湯

防風一兩　地骨皮　貫衆　芍藥　枳殼　劑芥穗

右爲細末。溫水調下。或爲飯末。煎服二三錢更妙。

治大便秘而內實。宜微疎利之。若內虛而利者。不宜用。

當歸五錢　黃連二錢半　大黃二錢　甘草一錢炙

先將當歸熬作膏子。入藥三味爲丸。漸次服十丸。妙治瘡疹大便秘結。壯變百辭丸。

大戟去骨一兩　棗三箇去核

右二味。用水一椀。煎至水盡爲度。去大戟不用。將棗焙乾。可和劑旋丸。從少至多。以利爲度。

雷頭風附

夫治雷頭者。諸藥不效。爲與證不相對也。夫雷頭者。震卦主之。震仰盂。故予製藥內加荷葉。謂象其震之形。其色又青。乃述類象形也。當煎局方中升麻湯。

升麻湯一兩　蒼朮一兩　荷葉一箇全者

右爲細末。每服五錢。水一盞。煎七分。溫服。食後。或燒全荷葉一箇。研細調煎藥服亦妙。

耳論附

論曰。耳者。蓋非一也。以數言之。金也。以經言之。手足少陽俱會其中也。有從內不能施者。主也。有從外不能入者。經也。有若蟬鳴者。有若鐘聲者。有若火嬉嬉狀者。各隨經見之。其間虛實不可不察也。假令耳聾者。腎也。何謂治肺。肺主聲。鼻塞者。肺也。何謂治心。心主炁。如推此法。皆從受氣爲始。腎受氣于己。心受氣于亥。肝受氣于甲。肺受氣于寅。脾正四季。此法皆長生之道也。

小兒斑疹論第三十一

論曰。斑疹之病。其狀各異。皆發於腑于外。屬少陽三焦相火。謂之斑。小紅點行于皮膚之中不出者。屬少陰君火也。謂之疹。凡顯斑證者。若自吐瀉者。慎勿治。則多吉。謂邪氣上下皆出也。大凡痲疹首尾皆不可下。恐妄動而生變。此謂少陽通表。宜和之也。當先安其裏以解毒。次微發之。安裏解毒者。謂能安和五藏。防風湯是也。如大便不祕。次微發之。微發之藥。錢氏方甚多。宜選用之。如大便過祕。宜微利之。當歸丸是也。如大便不祕。次微發之。微發之藥。變百祥丸是也。初知是斑疹。若便發之。令斑併出。小兒難禁。是使別生他證也。首尾不可下者。首曰上焦。尾曰下焦。若已吐利。不可下也。便宜安和藥。三五服。如能食。大便祕者內實。宜微疎利之。若內虛而利者。宜安和藥三五服。末後一服。調微發之藥服之。大抵用安和之藥多。發表之藥少。祕則微疎之。邪氣不併出。能作泄次。便小兒易禁也。身溫者順。身涼者逆。則宜服防風湯以和之。

防風湯

防風一兩　地骨皮　貫衆　芍藥　枳殼　劑芥穗

右爲細末。溫水調下。或爲飯末。煎服二三錢更妙。

治大便祕而內實。宜微疎利之。若內虛而利者。

當歸五錢　黃連二錢半　大黃二錢　甘草一錢炙

先將當歸熬作膏子。入藥三味爲丸。漸次服十丸。妙治瘡疹大便祕結。壯變百辭丸。

大戟去骨一兩　棗三箇去核

右二味。用水一椀。煎至水盡爲度。去大戟不用。將棗焙乾。可和劑旋丸。從少至多。以利爲度。

散。爲衄有身熱濕瘧之類。當用解毒之藥。

藥略第三十二　針法附

羌活　治支節痛。太陰經風藥也。　防風　祛風。通用。　甘草　和中調藥。

麻黃　發太陽太陰經汗。　桃仁　潤血。破血。　黃芩　瀉肺。

知母　滋腎火。助陰。　石膏　瀉肺火。是陽明大涼藥　半夏　去痰。

人參　補氣和中。　瓜蔕　治濕在上。頭吐藥　赤豆　利小便。

草烏頭　熱行經。　南星　治風痰須用。　大麻　治頭風。

肉桂　溫氣助陽。　桂枝　閉汗和表。

雄黃　去風。　白芷　治正陽明頭痛。

柴胡　治少陽厥陰寒熱往來。　苦藥　止脾痛。安太陰。

杏仁　潤肺除痰。　芫花　瀉中去濕熱強胃。

神麯　消食強胃。　白朮蒼朮同功。

小腹痛。刺少陽井穴關衝。

陰頭中痛不可忍者。卒痛也。婦人陰中痛。皆刺足厥陰井大敦穴。

素問元氣五行稽考

洛瑛子云。天元一氣。定侯伯之遷衆。蓋論元氣也。許員曰。本瘦。金方。火尖。根。富貴壽夭係之。由有胆氣而論考。亦有壯盛而暴亡。元氣固藏。則胆氣通。虛而生神。乾體成焉。乾爲天。天一生水。故一水二火三木四金五土。五危。是以元氣爲根本。五行爲枝葉。夫元氣者。兒之位也。元始之祖。先天地及其生焉。各類五行形體殊異。是故西北之民金水象。金方水肥。人方正肥厚。東南之人木火象。木瘦火尖。人多瘦長尖小。北人肥。南人瘦。理宜然也。北人賦性沉厚。體貌肥。上長下短。頭骨大。腰骨小。此本體也。若光明磊落。機見疾速。腰背豐隆者。元氣固藏。富貴壽考。坎中藏眞火。升眞水。面爲雨露也。南人賦性急暴。體貌尖瘦。下長上短。頭骨偏。腰骨輭。此本體也。若寬宏大度。機謀詳緩。腸額間豐。元氣固藏。富貴壽考。離中藏眞水。降眞火。而爲利氣也。又有南人似北人。北人似南人。不富則貴。以此推之。要在察元氣。觀五行。分南北。定壽夭。則攻守有方。調養有法。不妄藥人也。亦猶有刑罰總其權。使執法者不私。巡禁者申以警。使出塗者不擾。朝廷在於上明賞罰於百官。施利氣於萬民。故君得不生。若臣和於上。百官和於朝。萬民和於下。庶物和於野。頤而行之。千萬年計也。醫者。明方術。制法度。以療民病。養性之藥。訪其漸也。猶巡尉也。治病之藥。醫其毒。猶守令也。保命之藥。防其危。猶朝廷也。良工總其要。明虛實於三部。調和氣於百骸。故心得之大柴胡。知者□思過半矣。

輕怙虛薄綴淺假。重實潤深眞急。宜平者。宜中。徐形色性味皆上。厚隨藏府所宜。此處方用藥之大柴胡。知者□思過半矣。

流注鍼法

心痛脈沉。腎經原穴。　弦。肝經原穴。　澁。肺經原穴。

浮。心經原穴。　緩。脾經原穴。

腰痛　身之前。是陽明原穴。衝陽。身之後。足太陽原穴。京骨。身之側。足少陽原穴。丘墟。

針之最要

兩脇痛。針少陽經丘墟。　心痛。針少陰經太谿滎及足厥陰原穴。　腰痛不可忍。針足厥陰太陽經血。太陽喘滿痰實。口中如膠。針太谿穴。　嘘唏無度。針手厥陰太陵穴。原穴。　熱無度不可止。刺陷骨穴出血。　骨熱不可治。面赤乾燥。當灸厥陰肝經太衝穴。　血不止。鼻衄。大小便皆血。血崩。當刺足太陰井。隱白。　喉閉。刺少陽手足井。井刺少商及足太陰井。　大煩熱。晝夜不息。刺十指間出血。謂之八邪大刺。　目節疼痛。舊無所知。三稜針刺絕骨出血。　眼大皆痛。刺手太陽井穴少澤。

小腹痛。刺少陽井穴關衝。

陰頭中痛不可忍者。卒痛也。婦人陰中痛。皆刺足厥陰井大敦穴。

素問元氣五行稽考

洛瑛子云。天元一氣。定侯伯之遷衆。蓋論元氣也。許員曰。本瘦。金方。火尖。根。富貴壽夭係之。由有胆氣而論考。亦有壯盛而暴亡。元氣固藏。則胆氣通。虛而生神。乾體成焉。乾爲天。天一生水。故一水二火三木四金五土。五危。是以元氣爲根本。五行爲枝葉。夫元氣者。兒之位也。元始之祖。先天地及其生焉。各類五行形體殊異。是故西北之民金水象。金方水肥。人方正肥厚。東南之人木火象。木瘦火尖。人多瘦長尖小。北人肥。南人瘦。理宜然也。北人賦性沉厚。體貌肥。上長下短。頭骨大。腰骨小。此本體也。若光明磊落。機見疾速。腰背豐隆者。元氣固藏。富貴壽考。坎中藏眞火。升眞水。面爲雨露也。南人賦性急暴。體貌尖瘦。下長上短。頭骨偏。腰骨輭。此本體也。若寬宏大度。機謀詳緩。腸額間豐。元氣固藏。富貴壽考。離中藏眞水。降眞火。而爲利氣也。又有南人似北人。北人似南人。不富則貴。以此推之。要在察元氣。觀五行。分南北。定壽夭。則攻守有方。調養有法。不妄藥人也。亦猶有刑罰總其權。使執法者不私。巡禁者申以警。使出塗者不擾。朝廷在於上。明賞罰於百官。施利氣於萬民。故君得不生。若臣和於上。百官和於朝。萬民和於下。庶物和於野。頤而行之。千萬年計也。醫者。明方術。制法度。以療民病。養性之藥。訪其漸也。猶巡尉也。治病之藥。醫其毒。猶守令也。保命之藥。防其危。猶朝廷也。良工總其要。明虛實於三部。調和氣於百骸。故心得之大柴胡。知者□思過半矣。

輕怙虛薄綴淺假。重實潤深眞急。宜平者。宜中。徐形色性味皆上。厚隨藏府所宜。此處方用藥之大柴胡。知者□思過半矣。

流注鍼法

心痛脈沉。腎經原穴。　弦。肝經原穴。　澁。肺經原穴。

浮。心經原穴。　緩。脾經原穴。

神鼎盛。內有思想之患。外有愛惡之勞。血氣方剛。不畏寒暑。和之違也。勞傷筋骨。冒犯八邪。和之傷也。以酒爲漿。醉以入房。其治之之道。辯八邪。分勞佚。行守令之法。宜治病之藥。當減其毒。以全其眞。五十歲至七十歲者。和氣如秋。精耗血衰。血氣凝泣。思慮無窮。形體傷憊。和之違也。百骸疎漏。風邪易乘。和之傷也。破風傷風。牙關緊急。角弓反張。便與神聖散吐之。後汗之下之效。三法俱用之。

有人患蛟龍瘕痛。久不愈。欲死。用毬糖膏吐之。吐出其物。形如蠍蝎。長七八寸。立可。

物易傷。衣飲厚薄。和之傷也。大寒振慄。大暑煩燔。其治之之道。登精華。處奧庭。行相傳之道。變理陰陽。周流和氣。宣延年之藥。以全其眞。夫如是。則調御中節。治療得法。陰陽協和。榮衛流暢。凡厥有生。同斷當越矣乎。

諸吐方法三十四

仲景云。傷寒三四日。邪氣未傳於裏。其邪氣在上。用瓜蒂散吐而差。豈可俟其汗。又云。傷寒六七日。胸中微痞。不欲言。懊憹昏眩。無下證。仲景用梔子豉湯吐之立可。又忽然中風不知人事。亦不須汗。痰中呷呷聲。用稀涎散吐之亦可。又有小兒驚風潮搐。手足掣縮。用驗命散吐之。又云。風頭痛。經云。若不吐涎。久則皆目而不治。用瓜蒂散吐之。三吐而差。又暴喘風。涎上壅。咽噎不利。用茶調散吐之。

又陽痫久不愈。未成痴癎。用稀涎散吐之。

又陰痫。用二聖散吐之。

又胃藥之人。食物多食。生膿胸中。不下。化蟲伏於口中。胸膈不快。噎食不下。用藜蘆散吐之。

又久病患膈痛。諸藥莫能治。用獨聖散。加蝎稍半錢吐之。

諸痰不時發作。不知人事。用半生半熟湯吐之。

暗風病久不差。發過如故。用礬金散吐之。

瘧據久不差。發寒熱無時。用常山散吐之。

蛟龍瘕痛。腹脹如鼓。用毬糖散吐之。

人初患高食。或用冷身腹悶亂。身熱見食即嘔。用赤小豆散吐之。

婦人符鍛骨痛。用神應散吐之。

或曰。筋病吐之何爲。答曰。木鬱達之。所謂達者。令其條達也。或又有打撲墜墮。先吐之。用金花散。後下之。用承氣湯。蓋承者順也。

僵仆證。半身不遂是也。用追風散吐之。須風後有自疾服有半明可救之。用防風湯吐之。

小兒上喘潮熱。先用蔚金散吐之。後用鎮庭散下之。立效。

治癲狂病久不已。用三聖散吐之。後大下之。

諸風掉搖。強直不知人事。便可懸豆豉。涎出立效。

胸膈滿悶。皆痛。或腎痛。可先用祛風湯吐之。後服爲藥散。盧風或搶瘧惡瘧。便用二聖散吐之。後服苦參

丸。

破諸風。牙關緊急。角弓反張。便與神聖散吐之。後汗之下之效。三法俱用之。

又方。好川常歸四兩。用浮子酒浸七日。青礬四兩。製煅赤色。成朱子。爲細末。百草霜三兩。同研細。用當歸酒同研細。爲丸。如梧桐子大。每服五丸至七丸。服後一月。黃去立效。此方祖傳七世。

治諸氣腫获荅散

莞花 醋拌炒	澤瀉	郁李仁	甜葶力
陳皮 去白	白茯苓	白椵娜	檳榔

各半兩　滑石　各七錢半　大戟　各二錢半　蜜本　各二錢半

右爲細末。每服一錢。濃煎雙白皮湯。空心調下。取下碧綠水。如烟羊脂即效。如未盡。隔日又服。腫消不服。忌食鹽一百日。

治癮疹方。爛至胸前。兩腋下有塊。如茄子大。或塞至兩肩上。四五年不能痊者。並宜治之。其驗如神。常州府武進縣朱守仁傳。其項不能回頭。數日漸可。漸可始者。疹爛破胸前者。用荊芥根下段鍋煎。煎沸。待溫洗疹。良久看疹爛破處。紫黑。用鍼刺。一一出血。再洗三四次洗。

右眞芝蘇油將章腦　雄黃爲細末。用油調雞翎掃疹上。以出水。下次口再洗。仍用前藥補三日。又用韭菜地上蚯蚓糞。五更早晨收作長庇口大。用炭火上燒煅紅。取出。研碾爲末。每一九添乳香汝藥輕粉各半錢少些。穿三甲九片。煅紅色爲末。令用芝蘇油調敷患處。其妙如神。

千金湯煮湯。加心棕櫚。

點眼神效紫金膏

輕粉	雄黃	銅青	川芎	龍腦

射香　黃連　青鹽

海螵蛸　當歸　鍮砂　乳香

沒藥　一錢　熁干石　二兩　童便製七次

先將十九味乳製極細無聲。

白砂蜜一斤先將黃連末熬後下熁干石黃丹前藥用槐枝攪不住手煎如紫色用磁器盛用油紙七片封口窖土內去火七日方用。

血蝎　已上淨　五分　硃砂　朱砂　各三錢

黃丹　二兩　白丁香　二分

每服一錢。

脾胃論目錄

卷上
脾胃盛衰傳變論
藏氣法時升降浮沈補瀉之圖
脾胃勝衰論
補脾胃瀉陰火升陽湯
肺之脾胃虛論
升陽益胃湯
君臣佐使法
分經隨病制方
通氣防風湯
用藥宜禁論
仲景引內經所說脾胃
卷中
氣運衰旺圖說
飲食勞倦所傷始爲熱中論
補中益氣湯
脾胃虛弱隨時爲病隨病制方
黃耆人參湯
調中益氣湯
長夏濕熱胃困元甚用清暑益氣湯論
清暑益氣湯
隨時加減用藥法
腸澼下血論
涼血地黃湯
升陽除濕防風湯
脾胃虛不可妄用吐藥論
安養心神調治脾胃論
凡治病當問其所便
胃氣下溜五臟氣皆亂其爲病互相出見論
陰病治陽陽病治陰
三焦元氣衰旺
卷下
大腸小腸五臟皆屬於胃胃虛則俱病論
脾胃虛則九竅不通論
胃虛臟腑經絡皆無所受氣而俱病論
胃虛元氣不足諸病所生論
忽肥忽瘦論
天地陰陽生殺之理在升降浮沈之間論
陰陽寒天論
五臟之氣交變論
陰陽升降論
調理脾胃治驗
治法用藥若不明升降浮沈差互反損論
羌活勝濕湯

清神益氣湯
人參芍藥湯
升麻散火湯
清胃散
胃風湯
陽明病渴勝自汗論
調衛湯
濕熱成痿肺金受邪論
清燥湯
升陽湯
益胃湯
強胃湯
和中丸
異功散
飲食傷脾論
論飲酒過傷
葛花解醒湯
橘皮枳朮丸
木香乾薑枳朮丸
木香人參生薑枳朮丸
和中丸
三稜消積丸
神保丸
蠲飲枳實丸
神應丸
聖餅子
訶梨勒丸
脾胃損在調飲食適寒溫
胃風湯
白朮散
半夏白朮天麻湯
麻黃人參芍藥湯
安胃湯
濟陽湯
助陽和血補氣湯
升陽除濕湯
生薑和中湯
溫胃湯
藿香安胃散
五苓散
枳朮丸
半夏枳朮丸
變蒸丸
備急丸
雄黃聖餅子
感應丸
白朮安胃散
當歸和血散
三黃丸
加減平胃散

散滯氣湯
潤腸丸
丁香茱萸湯
神圣復氣湯
攝養
省言箴
通幽湯
導氣除燥湯
草豆蔻丸
脾胃將理法
益欲

脾胃論卷上

金李杲著

脾胃虛實傳變論

五臟別論云。胃大腸小腸三焦膀光此五者。天氣之所生也。其氣象天。故實而不能久留輸瀉者也。所謂五臟者。藏精氣而不瀉也。故滿而不能實。六腑者。傳化物而不藏。故曰實而不滿。滿而不實也。陰陽應象大論云。谷氣通於脾。六經爲川。腸胃爲海。九竅爲水注之氣。九竅者。五臟主之。五臟皆得胃氣。乃能通利。通評虛實論云。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生也。胃氣一虛。耳目口鼻俱爲之病。經脈別論云。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於腑。腑精神明。留於四臟。氣歸於權衡。權衡以平。氣口成寸。以決死生。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合於四時。五臟陰陽。揆度以爲常也。又云。陰之所生。本在五味。陰之五宮。倉在五味。至於五味。口嗜而欲食之。必自裁制。勿使過焉。過則傷其正也。謹和五味。骨正筋柔。氣血以流。腠理以密。如是則骨氣以精。謹道如法。長有天命。平人氣象論云。人以水穀爲本。故人絕水穀則死。脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者。非肝不弦。腎不石也。脏觀諸

篇帝參考之則元氣之充足皆由脾胃之氣無所傷而後能滋養元氣若胃氣之本弱飲食自倍則脾胃之氣既傷而元氣亦不能充而諸病之所由生也內經之旨皎如日星猶恐後人有所未達故靈樞經中復申其說經云水穀入口其味有五各注其海津液各走其道胃者水穀之海其輸上在氣街下至三里衝脈者十二經之海其輸上在大迎下合缺盆以下循胸裏入於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉榮氣者泌其精粹蒸津液化爲血以注十二經脈以應刻數焉衛者出其悍氣之慓疾而行於四末分肉皮膚之間而不休者也又云中焦之所出亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌精粹蒸津液化爲精微上注於肺脈乃化而爲血以奉生身莫貴於此聖人諄復其辭而不憚其煩者仁天下後世之心亦惓惓矣故夫飲食失節寒溫不適脾胃乃傷此因喜怒悲恐損耗元氣資助心火火與元氣不兩立火勝則乘其土位此所以病也調經論云病生陰者得之飲食居處陰陽喜怒又云陰虛則內熱有所勞倦形氣衰少穀氣不盛止焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故爲內熱脾胃一傷五亂互作其始病偏身壯熱頭痛目眩肢體沈重四肢不收食惰嗜臥爲熱所傷元氣不能運用故四肢困怠如此聖人著之於經謂人以胃土爲本成文演義互相發明不一而止蘊工不解讀妄意施用本以活人反以害人今舉經中言病從脾胃所生及養生當實元氣者條陳之生氣通天論云蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也此因時之序故聖人傳精神服天氣而通神明失之內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之削也陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲耳閉潰潰乎若壞都故曰天之氣貴清淨陽氣惡煩勞病從脾胃生者一也五常政大論云陰精所奉其人壽陽精所降其人天陰精所奉謂脾胃既和穀氣上升春夏令行故其人壽陽精所降謂脾胃不和穀氣下流收藏令行故其人天病從脾胃生者二也六節藏象論云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也名曰器能化精粕轉味而入出者也其華在唇四白其充在肌其味甘其色黃此至陰之類通於土氣凡十一臟皆取決於膽也肥而四肢不舉蓋脾實而邪氣盛也又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削即食雖有賊邪弗能害也此因時之序故聖人傳精神服天氣而通神明失之內閉九竅外壅肌肉衛氣散解也叔和云多食亦肌虛此之謂也夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時而顯火上獨燔其面黃帝鍼經云面熱者是陽明病胃既病則脾無所稟受脾爲死陰不主時也故亦從而病焉體勞役則脾病病脾則怠惰嗜臥四肢不收大便溏瀉脾既病則其胃不能獨行津液故亦從而病焉抵脾胃虛弱陽氣不能生長是春夏之令不行五臟之氣不生脾病則下流乘腎土尅水則骨之孤力爲骨痿令人骨髓空虛足不能履地是陰氣重疊此陰盛陽虛之證大法云汗之則愈下之則死若用甘之藥滋胃當升當浮使生長之氣旺言其汗者非正發汗也爲助陽也夫胃病其脈緩脾病其脈遲其人當脾有勁氣按之牢若痛若火乘土位其脈洪緩更有身熱心中不便之證此陽氣衰弱不能生長當於五臟中用藥法治之當從藏氣法時論中升降浮沈補瀉法用藥耳如脈緩病愈惰嗜臥四肢



不收。或大便泄瀉。此濕勝。從平胃散。若脈弦。氣弱自汗。四肢發熱。或大便泄瀉。或皮毛枯槁。髮脫落。從黃耆建中湯。脈虛而血弱。於四物湯中摘一味。或二味。以本經證中加之。或眞氣虛弱。及氣短脈弱。從四君子湯。或渴或小便閉澁。亦黃多少。從五苓散去桂。摘一二味加正藥中。已上五藥。當於本證中隨所兼見證加減。假令表虛自汗。春夏加黃耆。秋冬加桂。如腹中急縮。或脈弦。加防風。急甚加甘草。腹中窄狹。或氣短者。亦加之。腹滿氣不轉者勿加。雖氣不轉。而脾胃中氣不和者勿去。但加厚朴以破滯氣。然亦不可多用。於甘草五分中加一分可也。腹中夯悶。此非腹脹。乃散而不收。可加芍藥收之。如肺氣煩促。或不足者。加人參白芍藥。中焦用白芍藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也。腹中窄狹及縮急者去之。及諸酸澁爲腳下隱痛。或水附木勢而上爲眼澁。爲眵。爲冷淚。此皆由肺金之虛而寡于畏也。夫脾胃不足。皆爲血病。是陽氣不足。陰氣有餘。故九竅不通。諸陽氣根於陰血中。陰血受火邪。則陰盛。陰盛則上乘陽分。而陽道不行。猥生發升騰之氣也。夫陽氣走空竅者也。陰氣附形質者也。如陰氣附於上。陽氣升於天。則各安其分也。今所立方中有辛甘溫藥者。非獨用也。復有甘苦大寒之劑。亦非獨用也。以火酒二製爲之使引。苦甘寒藥至頂而復入於腎肝之下。此所謂升降浮沈之道。自耦而奇。奇而至耦者也。（脾分奇陰分耦）瀉陰火以諸風藥升發陽氣以滋肝膽之用。是令陽氣生上出于陰分。末用辛甘溫藥。接其升藥。使大發散於陽分。而令走九竅也。經云。食入于胃。散精於肝。淫氣於筋。食入于胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於腑。且飲食入胃。先行陽道。而陽氣升浮也。浮者陽氣。散滿皮毛。升者充塞頭頂。則九竅通利者。若飲食不節。損其胃氣。不能尅化。散於肝。歸於心。溢於肺。食入則昏冒欲睡。得臥則食在一邊。氣習得舒。是知升發之氣不行者此也。經云。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上

蟄荊子　白芷　石膏　黃芩佐　知母　滑石

肺金受邪。由脾胃虛弱。不能生肺。乃所生受病也。故咳嗽。氣短氣上。皮毛不能禦寒。精神少而渴。情惱懷。而不樂。皆陽氣不足。陰氣有餘。是體有餘而用不足也。

人參君　白朮佐　白芍藥佐　橘皮臣　青皮以瀉氣　黃耆臣

桂枝佐　桔梗引用　桑白皮佐　甘草諸酸之藥皆可　木香佐　檳榔

五味子佐地三味除客氣

腎水反來侮土。所謂者妄行也。作涎及清涕。唾多溜多。而惡寒者是也。土火復之。及二脈爲邪。則足不任身。足下痛。不能踐地。骨之無力。喜睡兩丸冷。腹陰陰而痛。妄聞妄見。腰脊背脾皆痛。

乾薑君　白朮臣　蒼木佐　附子佐炮少許　肉桂去皮少許　川烏頭臣

茯苓佐　澤瀉使　猪苓佐

夫飲食入胃。陽氣上行。津液與氣。入於心貫於肺。充實皮毛。散于百脈。脾禀氣于胃。而澆灌四旁。榮發氣血者也。今飲食損胃。勞倦傷脾。脾胃虛。則火邪乘之而生大熱。當先於心分補脾之源。益土生於火。象於脾胃中瀉火。主生生化之源。足陽明爲十二經之海。主經營之氣。諸經皆禀之。言陽明厥陰。與何經相併而爲病。酌中以用藥。如權之在衡。在兩則有在斤之中也。所以言此者。發明脾胃之病。不可一例而推之。不可一途而取之。欲人知百病皆由脾胃衰而生也。毫釐之失。則災害立生。假如時在長夏。於長夏之令中立方。謂正當主氣衰。而客氣旺之時也。後之處方者。當從此法。加時令藥名。曰補脾胃瀉陰火升陽湯。

補脾胃瀉陰火升陽湯

柴胡一兩五錢　甘草炙　黃耆臣

升麻八錢　人參臣　黃芩已上各七錢

石膏少許長夏濕用過時去之從權

右伴呅咽。每服三錢。水二盞。煎至一盞。去渣。大溫服。早飯後午飯前。間日服。服藥之時。宜減食。宜美食。服藥訖。忌語話。一二時辰許。及酒濕麵大料物之類。恐大濕熱之物。復助火邪而愈損元氣也。亦忌冷水及寒涼淡滲之物。及諸果。恐陽氣不能生旺也。宜溫食及薄滋味。以助陽氣。大抵此法此藥。欲令陽氣升浮耳。若滲泄淡味。皆爲滋陰之味。爲大禁也。雖然亦有從權而用之者。如見腎火旺及腎任衝三脈盛。則用黃檗知母。酒洗訖。火炒製加之。若分兩則臨病斟酌。不可久服。恐助陰氣而爲害也。小便赤或澁當利之。大便澁當行之。此亦從權也。得利則勿再服。此雖立食禁法。若可食之物。一切禁之。則胃氣失所發也。亦當從權而食之。以滋胃也。

肺之脾胃虛論

脾胃之虛。怠惰嗜臥。四肢不收。時值秋燥令行。濕熱少退。體重節痛。口苦舌乾。食無味。大便不調。小便頻

數。不嗜食。食不消。雖見肺病。濕淅惡寒。慘慘不樂。面色惡而不和。乃陽氣不伸故也。當升陽益胃。名之曰升陽益胃湯。

升陽益胃湯

黃耆二兩　半夏湯洗此一味脈濇者宜用　人參去蘆

防風以其秋旺故以辛溫瀉之　羌活　獨活已上各五錢

澤瀉不淋勿用　柴胡　白朮已上各三錢　黃連二錢

何故秋旺用人參白朮芍藥之類。反補肺。爲脾胃虛。則肺最受病。故因時而補易爲力也。

右呅咽。每服三錢。生薑五片。棗二枚去核。水三盞。同煎至一盞。去粗。溫服。早飯午飯之間服之。禁忌如前。其藥漸加至五錢。止服藥後。如小便罷而病加增劇。是不宜利小便。當少去茯苓澤瀉。若喜食。初一二日不可飽食。恐胃再傷。以藥力尚少。胃氣不得轉運升發也。須薄滋味之食。或美食助其藥力。益升浮之氣。而滋其胃氣也。愼不可淡食。以損藥力。而助邪氣之降沈也。可以小役形體。使胃與藥得轉運升發。愼勿大勞役使復傷。若脾胃得安靜。尤佳。若胃氣少。食果以助穀藥之力。經云五穀爲

至異要大論云。有毒無毒。所治爲主。主病者爲君。佐君者爲臣。應臣者爲使。一法力大者爲君。凡藥之所用。皆以氣味爲主。補瀉在味。隨時換氣。氣薄者爲陽中之陰。氣厚者爲陽中之陽。味厚者爲陰中之陽。辛甘淡中熱者爲陽中之陽。辛甘淡中寒者爲陰中之陽。味酸苦鹹之熱者爲陰中之陽。辛甘淡酸苦鹹之寒者爲陰中之陰。氣厚者爲陰中之陰。酸苦鹹之寒者爲陰中之陰。味酸苦鹹之熱者爲陽中之陽。辛甘淡中寒者爲陽中之陰。氣厚者爲陽中之陽。酸苦鹹之寒者爲陰中之陰。酸苦鹹之熱者爲陽中之陽。辛甘淡中寒者爲陰中之陰。氣厚者爲陰中之陽。辛甘淡中熱者爲陽中之陽。辛甘淡酸苦鹹乃氣之陰陽。又爲天之陰陽也。氣味生成而陰陽造化之機存焉。一物之內。氣味俱有。一藥之中。理性具焉。主對治療。由是而出。假令治表實麻黃葛根。表虛桂枝。黃耆裏實枳實大黃。裏虛人參芍藥。熱者黃芩黃連。寒者乾薑附子之類。爲君。君藥分兩最多。臣藥次之。使藥又次之。不可令臣過於君。君臣有序。相與宣攝。則可以御邪除病矣。如傷寒論云。陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛。以芍藥之酸。於土中瀉木。爲君。飴糖炙甘草甘溫。補脾養胃。爲臣。水挾木勢亦來侮土。故脈弦而腹痛。肉桂大辛熱。佐芍藥以退寒。水蓄濕甘辛溫發散陽氣。行於經脈皮毛。爲使。建中之名。於此見焉。有緩急收散。升降浮沈濇滑之類。非一。從權立法于後。

○如皮毛肌肉之不仲。無大熱不能食而渴者。加葛根五錢。燥熱及胃氣上衝。爲衝脈所逆。或作逆氣而裏急者。加炒黃檗知母。醫胸中熱而不渴。加炒黃芩。如胸中結滯氣濇。或有熱病者。亦各加之。如食少而小便少者。津液不足也。勿利之。益氣補胃自行矣。

○如氣弱氣短者。加人參。只升陽之劑。助陽。尤勝加人參。惡寒發熱而躁渴。脈洪大。白虎湯主之。或喘者。加人參。如渴不止。寒水石石膏各等分。少少與之。即錢氏方中甘露散。主身大熱而小便數。或上欲下

○如脈弦只加風藥。不可用五苓散。如小便行。病增者。此內燥津液不能停。當致津液加炒黃檗赤芍藥一錢。附子半錢。蒼朮二錢。

○如心下痞悶者。加黃連一。黃芩三。減諸甘藥。不能食。心下軟而痞者。甘草瀉心湯則愈。（痞有九種。治有五方。詳見心胃論）

○如喘滿者。加炙厚朴。

○如胃虛弱而痞者。加甘草。

○如喘而小便不利者。加苦葶藶。（小便不利者加之小便利爲緩急也）去甘草加厚朴。然不若苦味泄之。而不令大便行。

○如氣短氣弱而腹微滿者。不去人參。去甘草倍黃連。加黃檗。更加三味五苓散少許。此病雖宜升宜汗。如汗多亡陽。加黃芩。四肢煩熱。肌熱與羌活柴胡升麻葛根甘草則愈。

○如鼻流清涕惡風。或項背脊強痛。羌活防風甘草等分。黃耆加倍。臨臥服之。

○如有大熱。脈洪大。加苦寒劑而熱不退者。加石膏。如脾胃中熱。加炒黃連甘草。

○凡治此病脈數者。當用黃檗。或少加黃連。以柴胡蒼朮黃耆甘草。更加升麻。得汗出。則脈必下。乃火鬱則發之也。

○如證退而脈數不退。不洪大而疾有力者。多減苦藥。加石膏。如大便鞕或泄者。加桔梗。食後服之。此藥若誤用。則其害非細。用者當斟酌旋旋加之。如食少者不可用石膏。石膏善能去脈數疾。病退脈數不退者。不可治也。如不大渴。亦不可用如脈弦而數者。此陰氣也。風藥升陽以發火鬱。則脈數峻退矣。已上五法。加減未盡。特以明大槩耳。

○如便白膿。少有滑頻見汗衣者。氣脫。加附子皮。甚則加米殼。

○如氣澁者。只以甘藥補氣。當安臥不語。以發其氣。

分經隨病調方

脈經云。風塞汗出。肩背痛。中風。小便數而欠者。風熱乘其肺。使肺氣鬱甚也。當瀉風熱以通氣。防風湯主之。

通氣防風湯

柴胡　升麻　黃耆已上各一錢　羌活　防風　橘皮　人參　甘草已上各五分　藁本三分　青皮　白豆蔻仁　黃連已上各二分

右㕮咀。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗溫服。食後氣盛者。宜服。面白脫色。氣短者勿服。

○如小便遺失者。肺氣虛也。宜安臥養氣。禁勞役。以黃耆人參之類補之。不愈。當責有熱。加黃檗生地黃。津液不能停。禁發汗。利小便。爲重指津液。此二禁也。足少陽膽經。行身之側。在太陽陽明之間。病則往來寒熱。口苦胸脇痛。祇宜和解。且膽者。無出無入。又主發生之氣。下則犯太陽。汗則犯陽明。利小便則使生發之氣反陷入陰中。此三禁也。三陰非胃實不當下。爲三陰無病。禁者。如陽氣不足。陰氣有餘之病。則凡飲食及藥。忌助陰瀉陽。諸淡食及淡味之藥。瀉升發以助收斂也。諸苦藥皆洗瀉陽氣之散浮。諸薑附官桂辛熱之藥。及濕麵酒大料物之類。助火而瀉元氣。生冷硬物。損陽氣。皆所當禁也。如陰火欲衰而退。以三焦元氣未盛。必口淡淡。如鹹物亦所當禁。藥禁者。如胃氣不

羌活勝濕湯

羌活　獨活已上各一錢　甘草炙　防風已上各五分　藁本　蔓荊子三分　川芎二分

右件㕮咀。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗溫服。食後如身重腰沈沈然。乃經中有濕熱也。更加黃檗一錢。附子半錢。蒼朮二錢。

○如腿脚沈重無力者。加酒洗漢防己半錢。輕則附子。重則川烏頭少許。以爲引用而行血也。

○如臥而多驚。小便淋瀝者。邪在少陽厥陰。亦用太陽經藥。更加柴胡半錢。如淋加澤瀉半錢。此下焦風藥行經不可也。

○如大便後有白膿者。或只便白膿者。因勞役氣虛傷大腸也。以黃耆人參湯補之。如裏急頻見者。血虛也。更加當歸。

○如肺脘膨膨而喘咳。胸高氣滿。壅盛而上奔者。多加五味子。人參次之。麥門冬又次之。黃連少許。

○如甚則變兩手而昏者。眞氣大虛也。若氣短加黃耆五味子人參。氣盛加五味子人參黃芩。剉芥穗。多月去剉芥穗。加草豆蔻仁。

○如陰痛頷腫。脈洪大面赤者。加黃芩桔梗甘草各五分。

○如耳鳴目黃。頰頷腫。頸肩臑肘臂外後廉痛。面赤。脈洪大者。以羌活防風甘草等本通其經血。加黃芩黃連消其腫。以人參黃耆益其元氣。而瀉其火邪。如脈緊者。寒也。或面白善嚏。或面色惡。皆寒也。亦加羌活等四味。當瀉足太陽。不用連芩。少加附子。以通其脈。面色惡多悲恐者。更加桂附。

○如便白膿。少有滑頻見汗衣者。氣脫。加附子皮。甚則加米殼。

○如氣澁者。只以甘藥補氣。當安臥不語。以發其氣。

用藥宜禁論

凡治病服藥。必知時、禁經、禁病、禁藥、禁夫時禁者。必本四時升降之理。汗下吐利之宜。大法春宜吐。象萬物之發生。耕耨科斫。使陽氣之鬱者易達也。夏宜汗。象萬物之浮而有餘也。秋宜下。象萬物之收成。推陳致新而使陽氣易收也。冬周密。象萬物之閉藏。使陽氣不動也。夫四時陰陽者。與萬物浮沈於生長之門。逆其根。伐其本。壞其眞矣。又云。用溫遠溫。用熱遠熱。用涼遠涼。用寒遠寒。無翼其勝也。故冬不用白虎。夏不用青龍。春夏不服桂枝。秋冬不服麻黃。不失氣宜。如春夏而下。秋冬而汗。是失天時。伐天和也。有病則從權。過則更之。經禁者。足太陽膀胱經。爲諸陽之首。行於背。表之表。風寒所傷。則宜汗。傳入本則宜利小便。若下之太早。必變證百出。此一禁也。足陽明胃經。行身之前。主腹滿脹大。便難。宜下之。蓋陽明化燥火。津液不能停。禁發汗。利小便。爲重指津液。此二禁也。足少陽膽經。行身之側。在太陽陽明之間。病則往來寒熱。口苦胸脇痛。祇宜和解。且膽者。無出無入。又主發生之氣。下則犯太陽。汗則犯陽明。利小便則使生發之氣反陷入陰中。此三禁也。三陰非胃實不當下。爲三陰無病。禁者。如陽氣不足。陰氣有餘之病。則凡飲食及藥。忌助陰瀉陽。諸淡食及淡味之藥。瀉升發以助收斂也。諸苦藥皆洗瀉陽氣之散浮。諸薑附官桂辛熱之藥。及濕麵酒大料物之類。助火而瀉元氣。生冷硬物。損陽氣。皆所當禁也。如陰火欲衰而退。以三焦元氣未盛。必口淡淡。如鹹物亦所當禁。藥禁者。如胃氣不

行。內亡津液而乾涸。求湯飲以自救。非渴也。乃口乾也。非渴勝也。乃血病也。當以辛酸苦之。而淡滲五苓之類。則所當禁也。汗多禁發汗。咽痛禁發汗。利小便。小便多禁發汗。利小便。若大便快利不得更利。大便祕澁。以當歸桃仁麻子仁郁李仁皂角仁和血潤腸。如燥藥則所當禁者。吐多不得復吐。如吐而大便虛軟者。此上氣壅滯。以瓜橘之屬宣之。吐而大便不通。則利大便。上藥則所當禁也。諸病惡瘡及小兒瘡後。大便實者。亦當下之。而瓜橘之類則所當禁也。又如脈弦而服平胃散。脈緩而服黃耆建中湯。乃實實虛虛。皆所當禁也。人稟天之濕。化而生胃也。胃之與濕。其名雖二。其實一也。濕能滋養于胃。胃濕有餘。亦當瀉濕之太過也。胃之不足。惟濕物能滋養。仲景云。胃勝思湯餅。而胃虛食湯餅者。往往增劇。濕能助火。火旺而不通。主大熱。初病火旺不可食。以助火也。察其時。辯其經。審其病。而後用藥。四者不失其宜。則善矣。

著論處方已詳矣。然恐或者不知其源。而無所考據。復以黃帝內經仲景所說脾胃者。列于左。

太陰陽明論云。太陰陽明為表裏。脾胃脈也。生病而異者。何也。岐伯曰。陰陽異位。更虛更實。更逆更從。或從內。或從外。所從不同。故病異名也。帝曰。願聞其異狀也。岐伯曰。陽者天氣也。主外。陰者地氣也。主內。故食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於腑。腑精神明。留於四臟。氣歸於權衡。權衡以平。氣口成寸。以決死生。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合於四時。五臟陰陽。揆度以為常也。五常政大論有太過不及。太過者。薄所不勝。乘所勝也。不及者。至而不至。是為不及。所勝妄行。所生受病。所不勝者。乘之也。仲景云。人受氣於水穀。以養神。水穀盡而神去。故云安穀則昌。絕穀則亡。水去則榮散。穀消則衛亡。榮散衛亡。神無所依。又云水入於經。其血乃成。穀入於胃。脈道乃行。故血不可養。衛不可不溫。血溫衛和。得盡天年。

春不死。持於夏。起於長夏。暖溫食飽食。濕地濕衣。脾病者。盛在庚辛。庚辛不死。加於甲乙。甲乙不死。持於丙丁。起於戊己。脾病者。日昳慧。日出甚。下晡靜。脾欲緩。急食甘以緩之。用苦瀉之。甘補之。又云。脾病者身重善飢。足痿。足痿能行善瘛。卻下痛。虛則腹滿腸鳴。飧泄。食不化。取其經。太陰陽明少陰血者。經脈別論。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於腑。腑精神明。留於四臟。氣歸於權衡。權衡以平。氣口成寸。以決死生。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合於四時。五臟陰陽。揆度以為常也。五常政大論有太過不及。太過者。薄所不勝。乘所勝也。不及者。至而不至。是為不及。所勝妄行。所生受病。所不勝者。乘之也。仲景云。人受氣於水穀。以養神。水穀盡而神去。故云安穀則昌。絕穀則亡。水去則榮散。穀消則衛亡。榮散衛亡。神無所依。又云水入於經。其血乃成。穀入於胃。脈道乃行。故血不可不養。衛不可不溫。血溫衛和。得盡天年。

脾胃論卷中

氣運衰旺圖說　　察病神機

天地互為體用四說　　風脾生

濕胃化　熱小腸長

脾陷下不足先補則

黃耆　人參　甘草　當歸身　柴胡

乃辛甘發散以助春夏生長之用也

七脾形　火心神　木肝血

皆大盛上乘生長之氣後瀉則

甘草梔子之甘寒瀉火升於肺逆於胸中傷氣者也

黃芩之苦寒以瀉胸中之熱瞤氣上奔者也

紅花以破惡血已用黃芩大補腎水益肺之氣瀉血中火燥者也

瀉大腸收氣

寒勝脫藏氣

皆大旺後瀉則

黃者之甘溫止自汗實表虛使不受寒邪
當歸之辛溫能潤燥更加桃仁以通幽門閉塞利其陰路除大便之難燥者也
水腎精　金肺氣
皆虛衰不足先補則
黃蘗之苦寒除濕熱爲臣乘於腎救足膝無力亦除陰汗陰痿而益精
甘草梢子黃芩補肺氣泄陰火之下行肺苦氣上逆急食苦以泄之也
此初受熱中常治之法也非權也
權者臨病制宜之謂也
常道病則反常矣
春夏乃天之用也是地之體也
秋冬乃天之體也是地之用也
此天地之常道既病反常也
春夏天之用人亦應之
食能四肢踡健精氣神皆出九竅通利是也口鼻氣息自不聞其音語聲清聲如鐘
春夏地之體人亦應之
食罷皮肉筋骨血脈皆滑利屈伸柔和而骨剛力盛用力不乏
飲食勞倦所傷始爲熱中論
古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內外經悉言人以胃氣爲本蓋人受水穀之氣以生所謂清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃爲水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也若飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣既脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負皆寒證從復法相報中來也經云大勝必大復從熱病中變而作也非傷寒厥陰之證也潘井丸主之

補中益氣湯
黃耆病若甚者一錢勞役熱　甘草已上各五分炙　人參去蘆三分有嗽去之
已上三味除濕熱煩熱之聖藥也
當歸身二分酒焙乾或晒乾以和血脈　橘皮不去白二分或三分以導氣又能健脾乃可若痛用瀉脾胃
升麻二分或三分引胃氣上騰而升之令　柴胡二分或三分引清氣少陽之氣上升
白朮三分除胃中熱和胃而血　
右件藥㕮咀都作一服水二盞煎至一盞畫氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去粗食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病日久者以權立加減法治之
○如腹中痛者加白芍藥五分炙甘草三分
○如惡寒冷痛者加去皮中桂一分或三分桂心是也
○如惡熱喜寒而腹痛者於已加白芍藥二味中更加生黃芩三分或二分
○如夏月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也
○如天涼時惡熱而痛於已加白芍藥甘草黃芩中更少加桂
○如天寒時腹痛去芍藥味酸而寒故也加益智二分或三分或加半夏五分生薑三片
○如頭痛加蔓荊子二分或三分
○如痛甚者加川芎二分
○如頂痛腦痛加藁本三分或五分
○如苦痛者加細辛二分辛能除痛者
○諸頭痛者併用此四味足矣
○如頭上有熱則此不能治別以清空膏主之
○如髀下痛者加真熟地黃五分其痛立止如不已者乃大寒也更加肉桂去皮二分或三分內經所說少腹痛乃血結下腸胱也
皆寒證從復法相報中來也經云大勝必大復從熱病中變而作也非傷寒厥陰之證也潘井丸主之
○如胸中氣塞滯加青皮二分如氣促少氣者去之
○如身有疼痛者濕若身重者亦濕加去桂五苓散三錢
○如風濕相搏一身盡痛加羌活防風藁本根已上各五分升麻蒼朮已上各一錢勿用五苓所以然者爲風藥已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以諸風之藥損人元氣而益其病故也
○如大便祕澀加當歸梢一錢閉澀不行者煎成正藥先用一口調玄明粉五分或一錢得行則止此病不宜下下之恐變凶證也
○如久病痰嗽者去人參初病者勿去之冬月或春寒或秋涼時各宜加去根節麻黃五分

837

○如寒令大溫。只加佛耳草三分。款冬花一分。

○如夏月病嗽。加五味子二十枚。麥門冬去心二分。

○如舌上白滑胎者。是胸中有寒。勿用之。

○如夏月不嗽。亦加人參二分。或并五味子麥門冬各等分。散肺受火邪也。

○如病人能食而心下痞。加黃連一分。或三分。

○如不能食。心下痞。勿加黃連。

○如脇下痛。或脇下急縮。俱加柴胡三分。梢二分。

右一方加減。是飲食勞倦。喜怒不節。始病熱中。則可用之。若末傳爲寒中。則不可用也。蓋甘酸遏足陰其病爾。如黃耆人參甘草芍藥五味子之類也。今詳內經。鍼經熱中寒中之證列于左。

劉經論云。血并於陽。氣并於陰。乃爲昏中。血并於上。氣并於下。心煩悗瞀。悉又云。其生於陰者。得之飲食居處。陰陽喜怒。又云所有勞倦形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脫不通。胃氣熱。熱氣熏胸中。故曰內熱。陰盛生內寒。厥氣上逆。寒氣稽於胸中而不瀉。不瀉則溫氣去。寒獨留。寒獨留則血凝泣。血凝泣則脈不通。其脈盛大以濇。故曰寒中。

先病熱中證者。衛脈之火。附二陰之裏。傳之督脈。督脈者。節二十一節下長強穴是也。與足太陽膀胱寒氣爲附經。督脈。其盛也。如五川之水。疾如奔馬。其勢不可遏。太陽寒氣細細如線。逆太陽寒氣上行衝頂。入額下鼻尖。入手太陽於胸中。手太陽者。丙熱氣也。足膀胱者。壬寒氣也。壬能尅丙。寒熱逆於胸中。故脈盛大。其手太陽小腸熱氣不能交入膀胱經者。故十一經之盛氣。積於胸中。故其脈盛大。其膀胱逆行盛之極。子能令母實。手陽明大腸經金。即其母也。故燥旺。其燥氣挾子之勢。故脈濇而大便不通。以此言脈盛大以濇者。手陽明大腸脈也。

黃帝鍼經胃病者。腹脹胃脘當心而痛。上支兩脇。膈咽不通。飲食不下。取三里以補之。若見此病中一證。皆大寒禁用諸甘酸藥。上已明之矣。

脾胃虛弱隨時爲病隨病制方

夫脾胃虛弱。必上焦之氣不足。過夏天氣熱盛。損傷元氣。晚寒厥。日高之後。陽氣將旺。復熱如火。乃陰陽氣血俱不足。目中溜火。而視物朦朧無所見。小便頻數。大便難而結祕。胃脫當心而痛。兩脇痛。或急痛。臍下周圍如繩束之急。甚則如刀刺。腹難舒伸。胸中閉塞。時頭嗢噦。或有痰嗽。口沃白沫。舌強腰背肿。眼皆痛。頭痛時作。食不下。或食入卽飽。全不思食。自汗尤甚。若陰氣發在皮毛之上。皆天氣之熱。助本病也。乃庚大腸。辛肺金爲熱所乘而作。當先助元氣。理治庚辛之不足。黃耆人參湯主之。

黃耆人參湯

黃耆一錢如白汗過　升麻六分　人參去蘆　橘皮不去白　麥門冬去心
黃耆多更加一錢

黃芪無汗更加至五分　白芷已上各五分　黃蘗酒洗以款炒麴已上各三分　當歸身酒洗　炙甘草已上各二分

五味子九個

右件同咬咀。都作一服。水二盞。煎至一盞。去渣。稍熱服。食遠或空心服之。忌酒濕麵大料物之類。及過食冷物。

○如心下痞悶。加黃連二分或三分。

○如胃脘當心痛。減大寒藥。加草豆蔻仁五分。

○如脇下痛。或縮急。加柴胡二分或三分。

○如頭痛目中溜火。加黃連二分或三分　川芎三分

○如頭痛目不清利。上壅上熱。加蔓荊子川芎已上各三分　羌本生地黃已上各二分　細辛一分

○如氣短。精神如夢寐之間。困乏無力。加五味子九個

○如大便澁滯。隔一二日不見者。致食少。食不下。血少血中伏火。而不得潤也。加當歸身生地黃。麻子仁泥已上各五分　桃仁三枝湯泡去皮尖另研

○如大便通行。所加之藥勿再服。

○如大便又不快利。勿用別藥。少加大黃錢五分

○如不利者。非血結血祕而不通也。是熱則生風。其病人必頭風證。單血藥不可復加之。止常服黃耆人參湯。藥只用羌活防風已上各五錢　二味咬咀。以水四盞。煎至一盞。去租。空心服之。其大便必大走也。一服便止。

○如胸中氣滯。加青皮可愛者一分或二分　并去白橘皮倍之。去其邪氣。此病本元氣不足。惟當補元氣。不當瀉之。

○如氣滯大甚。或補藥太過。病人心下有痞滯鬱結之事。更加木香縮砂仁已上各二分或三分　白豆蔻仁二分　與正藥同煎。

○如腹痛不思寒者。加白芍藥五分　黃芩二分　掃減五味子。

夫脾胃虛弱。遇六七月間。河濕霖雨。諸物皆潤。人汗沾衣。身重短氣。甚則四肢痿軟。行步不正。脚軟腹黑。欲倒。此腎水與膀胱俱竭之狀也。當急救之。滋肺氣以補水之上源。又使庚大腸不受邪熱。不令汗大泄也。汗泄甚則亡津液。亡津液則七神無所依。經云。津液相成。神乃自生。津者庚大腸所主。三伏之義。爲庚金受囚也。若亡津液。汗大泄。濕令亢甚。則清肅之氣甚燥。金受囚。風木無可以制。故風濕相搏。骨節煩疼。一身盡痛。亢則害承。乃制是也。孫思邈云。五月當服五味子。是瀉內火。補庚大腸。益五臟之元氣。壬膀胱之寒。已絕於巳。癸腎水已絕於午。今更逢濕旺。助熱爲邪。西方北方之寒清絕矣。聖人立法。夏月宜補者。補天元之真氣。非補熱火也。令人夏食寒是也。爲熱傷元氣。以人參麥門冬五味子生脈。脈者元氣也。人參之甘。補元氣。瀉熱火也。麥門冬之苦寒。補水之源。而清肅燥金也。五味子之酸。以瀉火補庚大腸。與肺

金也。當此之時。無病之人。亦或有二證。或避暑熱。納涼於深堂大廈得之者。名曰中暑。其病必頭痛惡寒。身形拘急。肢節疼痛而煩心。肌膚大熱無汗。爲房屋之陰寒所遇。使周身陽氣不得伸越。世多以大順散主之是也。若行人或農夫。於日中勞役得之者。名曰中熱。其病必苦頭痛。發躁熱惡熱。捫之肌膚大熱。必大渴引飲。汗大泄無氣以動。乃爲天熱外傷肺氣。苦炭白朮湯主之。潔古云。動而得之爲中熱。靜而得之爲中暑者。陰證當發散也。中熱者陽證。爲熱傷元氣。非形體受病也。若虛損脾胃有宿疾之人。遇此天暑。將理失所。違時伐化。必困乏無力。懶語氣短。氣弱氣促。似喘非喘。骨乏無力。其形如夢寐。腰膝如煙霧中。不知身所有也。必大汗泄。若風犯汗眼。皮膚必搐。項筋皮枯毛焦。身體背重。肢節時有煩疼。或一身盡痛。或渴或不渴。或小便黃澀。此風濕相搏也。頭痛或頭重。上熱鬱盛。口鼻氣短氣促。身心煩亂。有不樂生之意。情思慘慽。此陰勝陽之極也。病甚則傳腎肝。爲痿厥。寒厥則腹中有寒。熱厥則腹中有熱。爲脾主四肢故也。若肌肉濡潰。痺而不仁。傳爲肉痿。證中背有脯疾。用藥之人。當以此調之。氣上衝胸。皆厥證也。痿者四肢痿軟而無力也。其心煩冤不止。厥者氣逆也。甚則大逆。故曰厥逆。其厥痿多相須也。於前已立黃耆人參五味子麥門冬湯中每服加白茯苓二分澤瀉四分猪苓白朮已上各一分

○如小便快利不黃澀者。只加澤瀉二分與二朮上下分消其濕。

○如行步不正。脚膝痿弱。兩足欲側者。已中痿邪。加酒洗黃檗知母。三分減五分　令二足通出氣力矣。

○如汗大泄者。津脫也。急止之。加五味子六枚炒黃檗五分炒知母三分不令妨其食。當以蘆根酌若妨食則止。候食進則再服。三里氣衝。以三稜鍼出血。若汗不減不止者。於三里穴下三寸。上廉穴出血。禁酒溫麵。

○夫痿者。濕熱乘腎肝也。當急去之。不然則下焦元氣竭盡而成軟癱。必腰下不能動。心煩冤而不止也。若身重減氣不短。小便如常。及濕熱之令退時。或所增之病氣退者。不用五味子。澤瀉茯苓猪苓。黃檗知母。苦朮白朮之藥。只依本病中證候加減。常服藥。亦須用酒黃檗。二分減三分　如更時令。濕燥之氣大行。却加辛溫瀉之。若濕氣勝。風證不退。眩運麻木不已。除風濕羌活湯

羌活一兩　防風去蘆　蒼朮酒浸去皮　黃耆已上各一錢　升麻七分　炙甘草　獨活　柴胡已上各五分　川芎去蘆如痛　黃檗　橘皮　藁本已上各三分　澤瀉去蘆一分　猪苓去黑皮　茯苓已上各二分　黃連一分

右㕮咀。每服秤三錢或五錢。水二盞煎至一盞。去粗。稍熱服。最虛實施用。如有不盡證候。依加減法用之。

○夫脈弦洪緩而沈按之中之下。得時一澁。其證四肢滿悶。肢節煩疼。難以屈伸。身體沈重。煩心不安。忽肥忽瘦。四肢懶倦。口失滋味。腹難舒伸。大小便清利而數。或上飲下便。或大便澁滯不行。一二日一見。

夏月經泄米穀不化。或便後見血。見白膿。胸滿短氣。痞悶不通。或痰嗽稠粘。口中沃沫。食入反出。耳鳴耳聾。目中流火。視物昏花。努肉紅絲。熱壅頭目。不得安臥。晴臥無力。不思飲食。調中益氣湯主之。

黃耆一錢　人參去蘆頭有嗽者去之　甘草　蒼朮已上各五分　陳皮如腹中氣不得調和更加一錢　升麻已上各二分　木香一分或二分

右作劑。麻豆大都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。帶熱宿食消盡服之。寧心絕思。藥必神效。蓋病在四肢血脈空腹在旦是也。

○如時令顯熱躁。是下元陰火蒸蒸發也。加真生地黃一分　黃檗三分無此則去之　當歸身三分

右作劑。麻豆大都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。帶熱宿食消盡服之。寧心絕思。藥必神效。蓋病在四肢血脈空腹在旦是也。

○如大便硬。坐不得。或大便了而不了。腹中常逼迫。血虛血澁也。加當歸身。三分

○如身體沈重。雖小便數多。亦加茯苓二分　蒼朮一錢　澤瀉五分　黃檗三分　時令而加減之　中被風濕相合而煩亂

○如胃氣不和。加湯洗半夏五分　生薑三片有嗽加生薑生地黃二分減半夏五分減生薑

○如痰厥頭痛。非半夏不能除。此足太陰脾所作也。

○如傷躁熱。加黃檗生地黃已上各二分

○如無已上證。只服前藥。

右件劑如麻豆都作一服。水一大盞。去粗帶熱食遠服之。

○如夏月須加白芍藥三分

○如夏月腹中痛。尤宜加。

○如惡熱而渴。或腹痛者。更加芍藥五分　生黃芩二分

○如惡寒腹中痛。加中桂三分　去黃芩。即之桂枝芍藥湯。亦於芍藥湯中加之同煎。

○如多月腹痛。不可用芍藥。蓋大寒之藥也。只加乾薑二分或加半夏五分減少許亦生

○如秋冬之月。胃脈四道爲衝脈所逆。并脇下少陽脈二道而反上行。病名曰厥逆。內經曰。逆氣上行。滿脈去形。明七神昏絕。離去其形而死矣。其證氣上衝咽。不得息而喘息有聲。不得臥。加吳茱萸一錢減五分

○如夏月有此證。爲大熱也。蓋此病隨四時爲寒熱溫涼也。宜以酒黃連酒黃檗酒知母各等分　爲細末。熱湯爲丸。梧桐子大。每服二百丸。白湯送下。空心服。仍多飲熱湯。服畢少時。便以美飲食壓之。使不令胃中留停。直至下元。以瀉衝脈之邪也。大抵治飲食勞倦所得之病。乃虛勞七損證也。當用溫平甘多辛少之藥治之。是其本法也。

○如時上見寒熱病四時也。又或將理不如法。或酒食過多。或辛熱之食作病。或寒冷之食作病。或居大寒大熱之處。蓋有病。當臨時制宜。暫用大寒大熱治法而取效。此從權也。不可以得效之故而久用之。

839

必致難治矣。

黃帝鍼經云。從下上者。引而去之。上氣不足。推而揚之。蓋上氣者。心肺上焦之氣。陽病在陰。從陰引陽。宜以入腎肝下焦之藥引甘多辛少之藥。使升發脾胃之氣。又從而去其邪氣于腠理皮毛也。又云。視前痛者。當先取之。是先以經絡之邪者。爲血凝而不流。故先去之。而後治他病。

長夏濕熱胃困尤甚用清暑益氣湯論

東垣論云。氣虛身熱。得之傷暑。熱傷氣故也。痿論云。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。腎者水臟也。今水不能勝火。則骨枯而髓虛。足不任身。發爲骨痿。故下經曰。骨痿者生於大熱也。此濕熱成痿。令人骨乏無力。故治痿獨取於陽明。時當長夏。濕熱大勝。蒸蒸而熾。人感之多四肢困倦。精神短少。懶於動作。胸滿氣促。肢節沈疼。或氣高而喘。身熱而煩。心下膨痞。小便黃而數。大便溏而頻。或痢出黃如糜。或如泔色。或渴或不渴。不思飲食。自汗體重。或汗少者。血先病而氣不病也。其脈中得洪緩者。血氣相搏。必加之以遲遲病難互換。少差。其天暑濕令。則一也。宜以清燥之劑治之。內經曰。陽氣者衛外而爲固也。炅則氣泄。今暑邪干衛。故身熱自汗。以黃耆甘溫補之。爲君。人參橘皮當歸甘草甘微溫補中益氣。爲臣。蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕。升麻葛根甘苦平。善解肌熱。又以風勝濕也。濕勝則食不消而作痞滿。故炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣。腎惡燥。急食辛以潤之。故以黃檗苦辛寒。借甘味瀉熱補水。虛者。泄其化源。以人參五味子麥門冬酸甘微寒。救天暑之傷於庚金。爲佐。名曰清暑益氣湯。

清暑益氣湯

黃耆汗少減　蒼朮泔浸去皮　升麻一錢　人參去蘆　澤瀉　神麴炒黃　橘皮　白朮已上各五分　麥門冬去心　當歸身　炙甘草已上各三分　青皮去白二分

黃檗酒洗去皮二分減三分　葛根二分　五味子九枚

右件同㕮咀。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去渣。大溫服。食遠。劑之多少。臨病斟酌。此病皆由飲食勞倦。損其脾胃。乘天暑而病作也。但藥中犯澤瀉猪苓茯苓燈心通草。本通潛滲利小便之類。皆從時令之旺氣。以瀉脾胃之客邪。而補金水之不及也。此正方已是從權而立之。若於無時病濕熱脾旺之證。或小便已數。腎肝不受邪者。誤用之。必大瀉其陰。竭絕腎水。先損其兩目也。復立變證加減法於後。

○心火乘脾。乃血受火邪而不能升發陽氣。復於地中。地者。人之脾也。必用當歸和血。少用黃檗以益其陰。

○脾胃不足之證。須少用升麻。乃足陽明太陰引經之藥也。使行陽道。白脾胃中右邊少陽行春令。生萬化之根蒂也。更少加柴胡使諸經右邊生發陰陽之氣。以滋養之和氣也。

○脾虛綠心火亢甚。而乘其土也。其次肺氣受邪。爲熱所傷。必須用黃耆最多。甘草次之。人參又次之。三者皆甘溫之陽藥也。脾始虛。肺氣先絕。故用黃耆之甘溫以益皮毛之氣。而閉腠理。不令自汗而損其元氣也。上喘氣短懶語。須用人參以補之。心火乘脾。須用炙甘草以瀉火熱。而補脾胃中元氣。甘草最

少恐脅滿也。若脾胃之急痛。并脾胃太虛。腹中急縮。腹皮急縮者。却宜多用之。經云。急者緩之。若從權。必加升麻以引之。恐左遷之邪。堅盛。卒不肯退。反致項上及臂肩肉消而反行陰道。故使引之以行陽道。使清氣之出地右遷而上行。以和陰陽之氣也。若中滿者。去甘草。咳甚者去人參。如口乾嘔乾者。加乾葛。

○脾胃既虛。不能升浮。爲陰火傷其生發之氣。榮血大虧。榮氣伏於地中。陰火熾盛。日漸漂爍。血氣虧少。且心包與心主血。血減則心無所養。致使心亂而煩悶。病名曰悗悗者。心惑而煩悶不安也。是清氣不升。濁氣不降。清濁相干。亂於胸中。使周身氣血逆行而亂。內經云。從下上者。引而去之。故當加辛溫甘溫之劑生陽。陽生則陰長。已有甘溫三味之論。或曰甘溫何能生血。又非血藥也。曰。仲景之法。血虛以人參補之。陽旺則能生陰血也。更加當歸和血。又宜少加黃檗以救腎水。蓋甘寒瀉熱火。火減則心氣得平而安也。如煩亂猶不能止。少加黃連以去之。蓋將補腎水。使腎水旺而心火自降。扶持地中陽氣矣。

○如氣浮心亂。則以硃砂安神丸鎮固之。得煩減。勿再服。以防瀉陽氣之反陷也。如心下痞。亦少加黃連。氣亂於胸。爲清濁相干。故以橘皮理之。又能助陽氣之升而散滯氣。又助諸甘辛爲用也。

○長夏濕土客邪大旺。可從權加蒼朮白朮澤瀉。上下分消其濕熱之氣也。濕氣大勝。主食不消化。故食減不知穀味。加炒麴以消之。復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣。助秋損也。此三伏中長夏正旺之時藥也。

隨時加減用藥法

○濁氣在陽。亂於胸中。則脘滿閉塞。大便不通。夏月宜少加酒洗黃檗。大苦寒之味。多月宜加吳茱萸。大辛苦熱之藥以從權。乃隨時用藥。以泄濁氣之下降也。借用大寒之氣於甘味中。故曰甘寒瀉熱火也。亦須用發散寒氣。辛溫之劑多。黃檗少也。

○清氣在陰者。乃人之脾胃氣衰。不能升發陽氣。故用升麻柴胡助辛甘之味。以引元氣之升。不令餐泄也。

○堵塞咽喉。陽氣不得出者曰壅。陰氣不得下降者曰噎。夫噎塞迎逆於咽喉胸膈之間。令諸經不行。則口開目瞪。氣欲絕。當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本。加堵塞之藥以瀉其標也。寒月陰氣大助陰邪於外。於正藥內加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣。暑月陽盛。則於正藥中加青皮陳皮益智黃檗散寒氣。泄陰火之上逆。或以消痞丸合滋腎丸。滋腎丸者。黃檗知母。微加肉桂。三味是也。或更以黃連別作丸。二藥七八十丸。空心約宿食消盡服之。待少時。以美食壓之。不令胃中停留也。

○如食少不饑。加炒麴。

○如食已心下痞。別服橘皮枳朮丸。

○如脈弦。四肢滿。閉便難而心下痞。加甘草黃連柴胡。

○如腹中氣上逆者。是衝脈逆也。加黃檗三分。黃連半分。以泄之。

○如大便祕燥。心下痞。加黃連桃仁。少加大黃當歸身。
○如心下痞。夯悶者。加白芍藥黃連。
○如心下痞。腹脹。加五味子白芍藥縮砂仁。
○如天寒。少加乾薑或中桂。
○如心下痞。中寒者。加附子黃連。
○如心下痞。嘔逆者。加黃連生薑橘皮。
○如冬月。不加黃連。少入丁香藿香葉。
○如口乾燈乾。加五味子乾葛。
○如脇下急。或痛甚。俱加柴胡甘草。
○如胸中滿悶鬱鬱然。加橘紅青皮木香少許。
○如頭痛有痰。沈重懶倦者。乃太陰痰厥頭痛。加半夏五分生薑二分或三分
○如腹中或周身間有刺痛。皆血澁不足。加當歸身。
○如裏急後重。又不去者。當下之。
○如有傳變隨證加減。
○如腹中動搖有水聲。而小便不調者。停飲也。診顯何臟之脈。以去水飲藥瀉之。假令脈洪大。用瀉火利小便藥之類是也。
○如胃虛不能食。而大渴不止者。不可用洪滲之藥止之。乃胃中元氣少故也。與七味白朮散補之。
○如發熱惡熱。煩躁大渴不止。肌熱不欲近衣。其脈洪大。按之無力者。或兼目痛鼻乾者。非白虎湯證也。此血虛發躁。當以黃耆一兩當歸身二錢。咬咀水煎服。
○如大便閉塞。或裏急後重。數至圊而不能便。或少有白膿。或少有血。愼勿利之。利之則必致病重。反覺結而不通也。以升陽除濕防風湯。舉其陽。則陰氣自降矣。

升陽除濕防風湯

蒼朮（泔浸去皮炒四錢）　防風二錢　白朮　白茯苓　白芍藥（已上各一錢）　熟地黃　當歸（已上各五分）

右件咬咀。除蒼朮另作片子。水一碗半。煮至一大盞。去租。稍熱服。空心食前。
○如此證。發泄不禁。以此藥導其濕。如發泄及泄不止。以風藥升陽。蒼朮燈燈胃去濕。脈皆臟服。閉塞不通。從權以苦多甘少藥泄之。如得通。復以升陽湯助其陽。或便以升陽湯中加下泄藥。

脾胃虛不可妄用吐藥論

六元政紀論云。木鬱則達之。者蓋木性當動蕩軒舉。是其本體。今乃鬱於地中。無所施爲。卽是風失其性。人身有木鬱之證者。當開通之。乃可用吐法。以助風木。是木鬱則達之之義也。又說木鬱達之者。蓋謂木初失其性。鬱於地中。今既開發行於天上。是發而不鬱也。是木復其性也。有餘也。有餘則棄其所勝。脾土受邪。見之於木鬱達之條下。不止此一驗也。又厥陰司天。亦風木旺也。厥陰之勝。亦風木旺也。俱是脾胃

受邪。見於上條。其說一同。或者不悟木鬱達之四字之義。反作木鬱治之。重實其實。脾胃又受木制。又復其木。正謂補有餘而損不足也。既脾胃之氣先已不足。豈不因此而重絕乎。再明胸中窒塞。嘗吐氣口三倍大於人迎。是食傷太陰。上部有脈。下部無脈。其人當吐不吐則死。以其下部無脈。知其木鬱在下也。塞道不行。而肝氣下絕矣。雖肺金主塞而不降。爲物所隔。金能剋木。肝木受邪。食塞胸咽。故曰在下者因而越之。仲景云。宿頃以瓜蒂散吐之。如經汗下。謂之虛煩。又名懊憹。煩躁不得眠。知其木鬱也。以梔子豉湯吐之。味者將隔咽不通。上支兩脇。脇脹。胃虛不足。乃濁氣在上。則生脹脹之病。吐之。況胃虛必怒風木已來乘陵胃中。內經以鐵鉞鍼陰之。豈可反吐。助其風木之邪。不主吐而吐。其差舛如天地之懸隔。大抵胸中窒塞。煩悶不止者。宜吐之耳。

安發心神調治脾胃論

靈樞祕典論云。心者君主之官。神明出焉。凡怒忿悲思恐懼。皆損元氣。夫陰火之熾盛。由心生疑滯。七情不安故也。心脈者神之舍。心君不寧。化而爲火。火者七神之賊也。故曰。陰火太盛。經營之氣不能頤養於神。乃脈病也。神無所養。津液不行。不能生血。脈也。心之神。真氣之別名也。得血則生。血生則脈旺。脈者神之舍。若心生疑滯。七神離形。而脈中唯有火矣。醫治斯疾者。惟在調和脾胃。使心無疑滯。或生懼忻。或逢喜事。或天氣暄和。居温和之處。或食滋味。或眼前見欲愛事。則翕然如無病矣。蓋胃中元氣得舒伸故也。

凡治病當問其所便

黃帝鍼經云。中熱消穀。則便寒。寒中之屬。則便熱。胃中熱則消穀。令人懸心善饑。臍已上皮熱。腸中熱。則出黃如糜。臍已下皮寒。胃中寒則腹脹。腸中寒則腸鳴飧泄。

一說腸中寒則食已寘迫。腸鳴切痛。大便色白。腸中熱。而且泄。非獨腸中熱則泄。胃中寒傳化亦泄。

胃欲熱飲。腸欲寒飲。雖好惡不同。春夏先治標。秋冬先治本。衣服寒無悽愴。暑無出汗。熱無灼灼。寒無悽愴。中暑者治在背上小腸腧。中濕者治在胃腧。中燥者治在大腸腧。此皆六淫客邪有餘之病。皆瀉在背之腧。

此規矩法度。乃常道也。正理也。揆度也。當臨事制宜。以反常合變也。

胃氣下溜五臟氣皆亂其爲病互相出見論

黃帝曰。何謂逆而亂。岐伯曰。清氣在陰。濁氣在陽。榮氣順脈。衛氣逆行。清濁相干。亂於胸中。是爲大惋。故氣亂於心則煩心密嘿。俛首靜伏。亂於肺則俛仰喘喝。按手以呼。亂於腸胃則爲飧泄。亂於胃經。則爲四厥。亂於頭。則爲厥逆。頭重眩仆。

大法云。從下上者引而去之。又法云。在經者宜發之。黃帝曰。五亂者。刺之有道乎。岐伯曰。有道以來。有道以去。審知其道。是爲身寶。黃帝曰。願聞其道。岐伯曰。氣在於心者。取之手少陰心主之輸。神門太陰

滋以化源。補以甘溫。瀉以甘寒。以酸收之。以小苦通之。以微苦辛甘輕劑。同精導氣。使復其本位。

太陰以苦甘寒乃亂於胸中之氣。以分化之味去之。若成痿者。以導濕熱。若善多涕。從權治以辛熱。仍引胃氣前出陽道。不令濕土尅腎。其穴在太谿。

氣在於肺者。取之手太陰榮。足少陰輸。魚際井太淵輸

氣在於腸胃者。取之足太陰陽明。不下者。取之三里。巨虛上廉三里

因足太陰虛者。於募穴中導引之於血中。有一說腑輸。去腑病也。胃虛而致太陰無所禀者。於足陽明胃之募穴中引導之。如氣逆上而嘔亂者。取三里。氣下乃止。不下復始。

氣在於頭。取之天柱大杼。不知。取足太陽榮輸。通谷束骨

先取天柱大杼。不補不瀉。以導氣而已。取足太陽膀胱經中。不補不瀉。深取通谷束骨。丁心火。已脾土。穴中以引導去之。如用藥於太陽引經藥中。少加苦寒甘寒以導去之。清涼餘之輔佐及使。

氣在於臂。足取之先去血脈。後取其陽明少陽之榮輸。二間三間深取之內庭昭谷深取之

視其足臂之血絡盡取之。後治其痿厥。皆不補不瀉。從陰深取引而上之。上之者出也。去也。皆陰火餘陽氣不足。伏匿於地中者。血榮也。當從陰引陽。先於地中升舉陽氣。次瀉陰火。乃導氣同精之法。

黃帝曰。補瀉奈何。岐伯曰。徐入徐出。謂之導氣。補瀉無形。謂之同精。是非有餘不足也。亂氣之相逆也。帝曰。允乎哉道。明乎哉論。請著之玉版。命曰治亂也。

陰病治陽陽病治陰

陰陽應象論云。審其陰陽。以別柔剛。陽病治陰。陰病治陽。定其血氣。各守其鄉。血實宜決之。氣虛宜導引之。

夫陰病在陽者。是天外風寒之邪。乘中而外入。在人之背上腑腧。腧。是人之受天外客邪。亦有二說。中於陽則流於經。此病始於外寒。終歸外熱。故以治風寒之邪。治其各臟之腧。非止風寒而已。六淫濕暑燥火。皆五臟所受。乃筋骨血脈受邪。各有背上五臟腧以除之。傷寒一說。從仲景。中八風者有風論。中暑者治在背上小腸腧。中濕者治在胃腧。中燥者治在大腸腧。此皆六淫客邪有餘之病。皆瀉在背之腧。

陰陽應象論云。審其陰陽。以別柔剛。陽病治陰。陰病治陽。定其血氣。各守其鄉。血實宜決之。氣虛宜導引之。

陰中火旺。上騰於天。致六陽之病。在陰者。病從陰引陽。是水殼之寒熱。感則害人六腑。又曰。飲食失節。及勞役形質。陰火乘於坤土之中。致殺氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升。滋於六腑之陽氣。是五陽之氣先絕於外。外者天也。下流伏於坤土陰火之中。皆先由喜怒悲憂恐爲五賊所傷。而後胃氣不行。勞役飲食不節。繼之則元氣乃傷。當從胃合三里穴中。推而揚之。以伸元氣。故曰從陰引陽。若元氣愈不足。治在腹上諸腑之募穴。若傳在五臟。爲九竅不通。隨各竅之病。治其各臟之募穴於腹。故曰五臟不平。乃六腑元氣閉塞之所生

也。又曰。五臟不和。九竅不通。皆陽氣不足。陰氣有餘。故曰陽不勝其陰。凡治腹之藏。皆爲元氣不足。從陰引陽勿慌也。若錯補四末之論。錯瀉四末之餘。錯瀉者。差尤甚矣。按岐伯所說。況取穴於天上。天上者。人之背上。五臟六腑之輸。豈有生者乎。與言及此。寒心徹骨。若穴淫客邪。及上熱下塞。筋骨皮肉血脈之病。錯取穴於胃之合。及諸腹之募者。必危。亦岐伯之言。下工豈可不慎哉。

三焦元氣衰旺

黃帝針經云。上氣不足。腦爲之不滿。耳爲之苦鳴。頭爲之傾。目爲之瞑。中氣不足。溲便爲之變。腸爲之鳴。下氣不足。則爲痿厥。心悅補足外踝下留之。

此三元眞氣衰旺。皆由脾胃先虛。而氣不上行之所致也。加之以喜怒悲憂。恐。危亡速矣。

脾胃論卷下

大腸小腸五臟皆屬於胃胃虛則俱病論

黃帝針經云。手陽明大腸。手太陽小腸。皆屬足陽明胃。小腸之穴。在巨虛下廉。大腸之穴。在巨虛上廉。此二穴。皆在足陽明胃三里穴下也。大腸主津。小腸主液。大腸小腸。無所稟受。故津液滲入皮毛。充實腠理。若飲食不節。胃氣不及。大腸小腸無所稟受。故津液澀竭焉。內經云。耳鳴耳聾。九竅不利。皆胃氣不及大腸故有此證。然亦止從胃弱而得之。故聖人混大腸胃之所生也。此胃弱不能滋養手太陽小腸手陽明大腸之所生也。或曰。子謂混言腸胃所生。亦有據乎。予應之曰。玉機眞藏論云。脾不及。令人九竅不通。言腸胃之所生也。或曰。子謂混言腸胃所生。亦有據乎。予應之曰。玉機眞藏論云。脾不及。令人九竅不通。謂脾爲死陰。受胃之陽氣。能上升水穀之氣於肺。上充皮毛。散入四臟。今脾無所稟。不能行氣於臟腑。故有此證。此則脾虛九竅不通之謂也。雖言脾虛。亦胃之不足所致耳。此不言脾。不言腸胃。而言五臟者。又何也。予謂此說與上二說無以異也。蓋謂脾不受胃之稟命。致五臟所主。九竅不能上通。天氣皆閉塞不利也。故以五臟言之。此三者止是胃虛所致耳。然亦何止於此。胃虛則五臟六腑十二經十五絡四肢皆不得營運之氣。而百病生焉。豈一端能盡之乎。

脾胃虛則九竅不通論

眞氣。又名元氣。乃先身生之精氣也。非胃氣不能滋之。胃氣者。穀氣也。榮氣也。運氣也。生氣也。清氣也。銳

氣也。陽氣也。又天氣入氣地氣。乃三焦之氣。分而言之則異。其實一也。不當作異名異論而觀之。飲食勞役所傷。自汗小便數。陰火乘土位。清氣不生。陽道不行。乃陰血伏火。津液不能停。且小便與汗皆亡。津液至中宮。變化爲血也。脈者。血之腑也。血亡則七神何依。百脈皆從此中變來也。人之百病。莫大於中風。有汗則風邪客之。無汗則陽氣固密。腠理閉拒。諸邪不能傷也。或曰。經言陽不勝其陰。則五臟氣爭。九竅不通。又脾不及。則令人九竅不通。名曰重強。又五臟不和。則九竅不通。又頭痛耳鳴。九竅不通。利腸胃之所生也。請析而解之。答曰。夫脾者。陰土也。至陰之氣。主靜而不動。胃者。陽土也。主動而不息。陽氣在於地下。乃能生化萬物。故五運在上。六氣在下。其脾長一尺掩太倉。太倉者。胃之上口也。脾受胃稟。乃能蒸腐熟五穀者也。胃者十二經之源。水穀之海也。平則萬化安。病則萬化危。五臟之氣。上通九竅。五臟稟受氣於六腑。六腑受氣於胃。六腑者。在天爲風。寒。暑。濕。燥。火。此無形之氣也。胃氣和平。榮氣上升。始生溫熱。溫熱者。春夏也。行陽二十五度。六陽升散之極。下而生陰。陰降則下行爲秋冬。行陰道爲寒涼也。胃既受病。不能滋養。故六腑之氣已絕。致陽道不行。陰火上行。五臟之氣各受一腑之化。乃能滋養皮膚血脈筋骨。故言五臟之氣已絕於外。是六腑生氣先絕。五臟無所稟受而火所乘。穀氣閉塞而下流。卽清氣不升。九竅爲之不利。胃之一腑病期十二經元氣皆不足也。氣少則津液不行。津液不行則血虛。故筋骨皮肉血脈皆弱。是氣血俱虛弱矣。勞役動作。飲食饑飽。可不愼乎。凡有此病者。雖不變易他疾。已損其天年。更加之鍼灸用藥差慢。欲不夭枉。得乎。

胃虛感腑經絡皆無所受氣而俱病論

夫脾胃虛。則溼土之氣潛於腑下。腎與膀胱受邪。膀胱主運腎爲陰火。二者俱弱。潤澤之氣不行。大腸者。庚也。燥氣也。主津。小腸者。丙也。熱氣也。主液。此皆胃虛。胃虛則無所受氣而亦虛。津液不滿。睡覺口燥咽乾而皮毛不澤也。甲膽屬也。溫也。主生化周身之陽氣。亦皆稟氣於胃則能浮散也。升發也。胃虛則膽及小腸溫熱生長之氣俱不足。伏留於有形血脈之中。爲熱病。爲中風。其爲病不可勝紀。青赤黃白黑五腑皆滯。三焦者。乃下焦元氣生發之根蒂。爲火乘之。是六腑之氣俱衰也。腑者。府庫之府。包含五臟及形質之物而藏焉。且六腑之氣外無所主。內有所受。感天之風氣血生甲膽。感暑氣而生丙小腸。感濕化而生戊胃。感燥氣而生庚大腸。感寒氣而生壬膀胱。感天一之氣而生三焦。此實父氣無形也。風寒暑濕燥火。乃溫熱寒涼之別稱也。行陽二十五度。右邊而升浮降沈之化也。其虛也。皆由脾胃之弱。以五臟論之。心火亢甚。乘其脾土曰熱中。脈洪大而煩悶。難經云。脾病當鱗有動氣。按之牢若痛。動氣築築然堅牢如有積而硬。若似痛也。甚則亦大痛。有是則脾虛病也。無則非也。更有一辯。食入則困倦。精神昏冒而欲睡者。脾虛弱也。且心火大盛。左遷入於肝木之分。風濕相搏。一身盡痛。其脈

洪大而弦時緩。或爲眩運戰搖。或爲麻木不仁。此皆風也。脾病體重節痛。爲痛痺。爲寒痺。爲濕痺。爲緩風。其證不可勝紀。木旺運行北越。左遷入地。助其腎水。水得子助。入脾爲瘧。瀉。自入爲嗽。入肝爲淚。入肺爲涕。乘肝木而反尅脾土明矣。當先於陰分補其陽氣升騰。行其陽道而走空竅。次加寒水之藥降其陰火。黃蘗黃連之類是也。先補其陽。後瀉其陰。脾胃俱旺。而復於中焦之本位。則陰陽氣平矣。火曰。炎上。水曰潤下。今言腎主五液。上至頭出於空竅。俱作泣涕。損傷脾氣。下溜或下泄。而久不能升。是有秋冬而無春夏。乃生長之用。陷于殺之氣。而百病皆起。或汗涎唾者。何也。曰病痼者。涎沫出於口。冷汗出於身。滴涕出於鼻。皆陽蹻陰蹻督衝四脈之邪上行。腎水不任。煎熬。濕騰上行爲之也。此奇邪爲病。不繫五行陰陽十二經所拘。當從督衝二蹻四穴中奇邪之法治之。

五藏外有所主。內無所受。謂外主皮毛血脈肌肉筋骨及各空竅是也。若胃氣一虛。無所稟受。則四藏經絡皆病。況脾全籍胃土平和。則有所受而生榮。周身四藏皆旺。十二神守職。皮毛固密。筋骨柔和。九竅通利。外邪不能侮也。

胃虛元氣不足諸病所生論

夫飲食勞役皆自汗。乃足陽明化燥火。津液不能停。故汗出。小便數也。邪之大者。莫若中風。風者百病之長。善行而數變。雖然無虛邪。則風雨寒不能獨傷人。必先中虛邪。然後賊邪得入矣。至於痿厥逆。皆由汗出而得之也。且多陽氣伏藏於水土之下。如非常泄精。陽氣已竭。則春令從何而得萬化俱失所矣。在人則飲食勞役。汗下時出。諸病遂生。予所以諄諄如此者。蓋亦欲人知所慎也。

忽肥忽瘦論

黃帝鍼經云。寒熱。少氣血上下行。夫氣虛不能溫。血虛不能熱。血氣俱虛。不能寒熱。而胃虛不能上行。則肺氣無所稟。故少氣。衛氣既虛。不能寒也。下行乘腎肝。助火爲害。則陰分氣衰血虛。故寒熱。少氣血上下行者。足陽明胃之脈。衰。則衛脈并陽明之脈上行於陝分。逆行七十二度。脈之火大旺。逆陽明脈中。血上行。其血衝滿於上。若火時退伏於下。則血下行。故言血上下行於陝分。逆行七十二度。脈之火大旺。逆陽明脈中。血上行者。足陽明胃之脈衰。則衝脈并陽明之脈上行於陝分。逆行七十二度。脈之火大旺。逆陽明脈中。血上行。其血衝滿於上。若火時退伏於下。則血下行。故言血上下

清中濁者。榮華腠理。
清陽發腠理。毛竅
清陽實四肢。眞氣充實四肢。
濁陰爲地。蓋陰成地。出天氣。雨出地氣。五穀五味之精。是五味之化也。血榮也。維持神明也。血之精會也。故
濁中濁者。榮養於神。即至中脫而爲血。故
濁陰出下竅之竅也。前陰膀胱
濁中濁者堅強骨幽。
濁陰走五藏。散於五藏之血也。養血脈。潤皮膚肌肉筋者是也。血生肉者此也。
濁陰歸六腑。謂毛脈合精經氣歸於腸者是也。
天氣清靜光明者也。藏德不止。故不下也。天明則日月不明。邪害空竅。陽氣者閉塞。地氣者冒明。雲霧不精。則上應白露不下。交通不表萬物命故不施。不施則名木多死。惡氣不發。風雨不節。白露不下。則菀槁不榮。胎風數至。暴雨數起。天地四時不相保。與道相失。則未央絕滅。唯聖人從之。故身無苛病。萬物不失生氣不竭。

此說人之不避大寒傷形。大熱傷氣。四時節候變更之異氣。及飲食失節。妄作勞役。心生好惡。皆令元氣不行。氣化爲火。乃失生天折之由耳。

調理脾胃治驗

治法用藥若不明升降浮沈差互反損論

予病脾胃久衰。視聽半失。此陰盛乘陽。加之氣短。精神不足。此由弦脈令虛。多言之過。皆陽氣衰弱不得舒伸。伏匿於陰中耳。癸卯歲。六七月間。淫雨陰寒。踰月不止。時人多病泄利。濕多成五泄故也。一日予體重肢節疼痛。大便泄并下者三。而小便閉塞。思其治法。按內經標本論。大小便不利。無問標本。先利大小便。又云在下者引而竭之。亦是先利小便。當又云諸泄利。小便不利。先分別之。又云治濕不利小便。非其治也。皆當利其小便。必用淡味滲泄之劑以利之。是其法也。噫。聖人之法。雖布在方册。其不盡者。可以求諸范天騭之內。素有脾胃之證。時顯煩躁。胸中不利。大便不通。初冬出外而晚歸。爲寒氣情慾悶亂大作。火燥之極。金伏之際。而寒水絕體於此時也。故急救之。以生脈散除其濕熱。以滋其太甚。肺欲收。心苦緩。皆酸以收之。心火盛。則甘以瀉之。故人參之甘。佐以五味子之酸。孫思邈云。夏月常服五味子。以補五臟氣是也。麥門冬之微苦。寒能滋水之源。於金之位。而清肅肺氣。又能除火刑金之嗽。兩救其痰邪。復微加黃蘗之苦寒。以爲守位。滋水之流。以鎮墜其浮氣。而除兩足之痿弱也。不得伸故也。腎疑有熱。治以疎風丸大便行而病不減。又疑藥力小。復加七八十丸。下兩行。前證仍不減。復添吐逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。服黑頭旋。惡心煩悶。氣短促。上喘無力。不欲言。心神頓倒。兀兀不止。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。余謂前證乃胃氣已損。復下兩次。則重虛其胃。而痰厥頭痛作矣。製半夏。白朮天麻湯主之而愈。

半夏白朮天麻湯

黃蘗二分	乾薑二分	天麻	蒼朮
澤瀉	人參已上各五分	白朮	炒麴已上各一錢
橘皮錢已上各五分			半夏湯洗七次

右件咬咀。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去粗滓。熱服。食前。此頭痛苦甚。謂之足太陰痰厥頭痛。非半夏不能療。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能除。其苗爲定風草。獨不爲風所動也。黃者甘溫。瀉火補元氣。人參甘溫。瀉火補中益氣。二朮俱甘苦溫。甘除濕。補中益氣。澤瀉利小便。導濕。橘皮苦溫。益氣調中升陽。麴消食。蕩胃中滯氣。大麥蘗麴。胃中助胃氣。乾薑辛熱。以散中寒。黃蘗苦大寒。洒洗以主冬天少火在泉發躁也。

戊申六月初。樞判白文舉。年六十二。素有脾胃虛損病。目疾時作。身面目睛俱黃。小便或黃或白。大便不調。飲食減少。氣短上氣。怠惰嗜臥。四肢不收。至六月中。目疾復作。醫以瀉肝散下數行。而前疾增劇。予謂

人參芍藥湯

麥門冬二分　當歸身　人參已上各三分　炙甘草
五味子五個

右件咬咀。分作二服。每服用水二盞。煎至一盞。去粗稍熱服。既食。繼而多居曠室。臥熱炕而吐血數次。予謂此人久虛弱。脾有形而有大熱在內。上氣不足。陽氣外虛。當補表之陽氣。瀉裏之虛熱。多居曠室。表服復冒薄是重虛其陽。裏有大寒。裏邊熱火邪不得舒伸。故血出於口。因思仲景太陽傷寒。當以麻黃湯發汗。而不與之。遂成衄血。却與之立愈。與此甚同。因與麻黃人參芍藥湯。

麻黃人參芍藥湯

人參去蘆頭其實其炭也　麥門冬已上各三分　桂枝以補衰虛　當歸身各五分
麻黃去其外節　炙甘草補其脾　白芍藥　黃耆已上各一錢　五味子二個安其腑氣

右件咬咀。都作一服。水三盞。煮麻黃一味。令沸去沫。至二盞。入餘藥同煎至一盞。去粗熱服。臨臥。

升陽散火湯

治男子婦人。四肢發熱。肌熱筋痺。熱骨髓中。熱發困熱如燎。捫之烙手。此病多因血虛而得之。或胃虛過食冷物。抑遏陽氣於脾土。火鬱則發之。

生甘草二錢　防風二錢五分　炙甘草三錢　升麻
白芍藥　羌活　人參已上各五錢　柴胡八錢

右咬咀。每服秤半兩。水三大盞。煎至一盞。去粗稍熱服。忌寒涼之物及冷水月餘。

安胃湯

治因飲食汗出日久。心中虛風虛邪。令人半身不遂。見偏風痿痺之證。當先除其汗。懍悍之氣。按而收之。

黃連去鬚淨洗　五味子去子　烏梅去核　生甘草已上各五分　熟甘草三分　升麻稍二分

右咬咀。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去粗溫服。食遠。忌濕麵酒五辛大料物之類。

清胃散

治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍。牽引頭腦滿熱發大痛。此足陽明別絡入腦也。寒寒惡熱。此陽明經中熱盛而作也。

真生地黃　當歸身已上各三分　牡丹皮半錢　黃連去鬚淨六分如煩渴不好更加二分如夏月倍之大抵黃連臨時增減參症
升麻一錢

右爲細末。都作一服。水一盞半。煎至七分。去粗。放冷服之。

清陽湯

治口喝頻頸急緊。胃中火盛。必汗不止。而小便數也。

紅花　酒黃檗　桂枝已上各一分　生甘草　蘇木已上各五分
葛根一錢五分　當歸身　升麻　黃耆已上各二錢

右件咬咀。都作一服。酒三大盞。煎至一盞二分。去粗。稍熱服食前。服訖。以火熨摩緊結處而愈。夫口喝筋急者。是筋脈血絡中大寒。此藥以代燔鍼劫刺。破血以去其凝結。內則泄衝脈之火熾。

胃風湯

治風證能食。麻木牙關急搐。目內蠕瞤。胃中有風。猶面腫。

蔓荊子一分　乾生薑二分　草豆蔻　黃檗　炙甘
藁本已上各三分　麻黃五分不去節　當歸身　蒼朮　葛根已上一錢
炙甘草一錢五分　升麻二錢　棗四枚

右件對如麻豆大。分二服。每服水二盞。煎至一盞。去粗熱服。食後。

陽明病濕勝自汗論

或曰。濕之與汗。陰乎陽乎。曰。西南坤土也。脾胃也。人之汗。猶天地之雨也。陰液其濕。即水穀之津液。如從毛竅中出。濕若中水也。相家有說。土音如居深谿中。言其塞也。遠也。不出也。其爲濕審矣。又知此二者。一爲陰寒也。內經曰。氣虛則外寒。雖見熱中蒸蒸爲汗。終傅大寒。知始爲熱中表虛亡陽。不任外寒。終傅寒中多成瘅寒矣。色以候天脈。以候地形者。乃候地之陰陽也。故以脈氣候之。皆有形無形可見者也。

調衛湯

治濕勝自汗。補衛氣虛弱。表虛不任外寒。

蘇木　紅花已上各一分　猪苓二分　麥門冬　生地黃已上各三分
生黃芩　生甘草　當歸梢已上各五分　羌活七分　麻黃根　半夏湯泡七次
五味子七枚

右咬咀如麻豆大。作一服。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱服。中風證必自汗。汗多不得重發汗。故禁麻黃而用根節也。

濕熱成瘧肺金受邪論

六七月之間。濕令大行。子能令母實而熱旺。濕熱相合。而刑庚大腸。故寒涼以救之。燥金受濕熱之邪。絕塞水生化之源。源絕則腎虧。瘧厥之病大作。腰已下痿軟癱瘓。不能動行走不正。兩足欹側。以滑燥湯主之。

滑燥湯

黃連去鬚　酒黃檗　縮砂一分　麥門冬　當歸身
炙甘草　猪苓　麩炒二分　人參　白茯苓

橘皮　白朮　澤瀉已上各五分　蒼朮一錢　黃耆一錢五分　五味子九枚

右咬咀如麻豆大。每服半兩。水二盞半。煎至一盞。去粗稍熱。空心服。

助陽和血補氣湯

治眼發後上熱盛。白睛紅多眵淚。無疼痛而攏澁難開。此服苦寒藥太過。而眞氣不能通九竅也。故眼昏花不明。宜助陽和血補氣。

香白芷二分　葳荊子三分　炙甘草　防風已上各七分　黃耆一錢　當歸身洗　柴胡已上各五分　升麻

右咬咀都作一服。水一盞半。煎至一盞。去粗熱服。臨臥避風處睡。忌風寒及食冷物。

升陽湯

治大便一日三四次。溏而不多。有時泄瀉。腹中鳴。小便黃。

柴胡　益智仁　當歸身　橘皮已上各三分　升麻六分　甘草二錢　黃耆三錢　紅花少許

右咬咀。分作二服。每服水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱服。

升陽除濕湯

治脾胃虛弱。不思飲食。腸鳴腹痛。泄瀉無度。小便黃。四肢困弱。

甘草　大麥蘗麵如有客腹者加　益智仁　半夏　防風　陳皮　豬苓已上各三分　澤瀉　神麯　升麻　柴胡　羌活已上各五分　蒼朮一錢

右咬咀作一服。水三大盞。生薑三片。棗二枚。同煎至一盞。去粗空心服。

益胃湯

治頭悶。勞動則微痛。不喜飲食。四肢怠惰。躁熱短氣。口不知味。腸鳴大便微溏。黃色身體昏悶口乾。不喜食冷。

黃耆　甘草　半夏已上各二分　柴胡　陳皮　升麻已上各五分　蒼朮一錢五分　當歸稍　人參

右咬咀作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱服。食前。忌飲食失節。生冷硬物。酒濕麵。

生薑和中湯

治食不下。口乾。虛渴。四肢困倦。

生甘草　炙甘草已上各一分　酒黃芩　人參　葛根　雜本　生黃芩二錢　柴胡　橘皮已上各二分　升麻三分　白朮已上各五分　羌活七分　蒼朮一錢

右咬咀作一服。水二盞。生薑五片。棗二枚。擘開同煎至一盞。去粗稍熱。空心服。

強胃湯

治因飲食勞役所傷。腹脇滿悶短氣。過春口淡無味。過夏雖熱而惡寒。常如傷。不喜食冷物。

黃芪　甘草已上各五分　升麻　柴胡　生薑　麵已上各一錢五分　草豆蔻二錢　半夏

右咬咀。每服三錢。水二大盞。煎至一盞。去粗溫服。食前。

溫胃湯

專治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

人參　甘草　益智仁　縮砂仁　乾生薑　澤瀉　藿香已上各三分　黃耆

右件爲極細末。每服三錢。水一盞。煎至半盞。溫服。食前。

和中丸

人參　乾生薑　橘紅已上各一錢　乾木瓜二錢　炙甘草三錢

右爲細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。溫水送下。食前服。

藿香安胃散

治脾胃虛弱。不進飲食。嘔吐不待腐熟。

藿香　丁香　人參已上各二錢五分　橘紅五錢

右件四味爲細末。每服二錢。水一大盞。生薑一片。同煎至七分。和粗冷服。食前。

異功散

治脾胃虛冷。腹鳴腹痛。自利不思飲食。

人參　茯苓　白朮　甘草　橘皮已上各五分

右爲散。每服五錢。水二大盞。生薑三片。棗二枚。同煎至一盞。去粗溫服。食前。先用數服。以正其氣。

飲食傷脾論

四十九難曰。飲食勞倦。則傷脾。又云。飲食自倍。腸胃乃傷。腸澼爲痔。夫脾者。行胃津液。磨胃中之穀。主五味也。胃既傷。則飲食不化。口不知味。四肢倦困。心腹痞滿。兀兀欲吐。而惡食。或爲餐泄。或爲腸澼。此胃傷脾亦傷明矣。大抵傷飲傷食。其治不同。傷飲者。無形之氣也。宜發汗利小便以導其濕。傷食者。有形之物也。輕則消化。或損其穀。此最爲妙也。重則方可吐下。今立數方。區分類析。以列于後。

五苓散

治煩渴。飲水過多。或水入卽吐。心中痰涎。停溼在內。小便不利。

桂一兩　茯苓　猪苓　白朮兩五錢　澤瀉二兩

右爲細末。每服二錢。熱湯調服。不拘時候。服訖多飲熱湯。有汗出即愈。

如瘧熱在裏。身發黃疸。濃煎茵陳湯調下。食前服之。

如疸發渴。及中暑引飲。亦可用水調服。

論飲酒過傷

夫酒者。大熱有毒。氣味俱陽。乃無形之物也。若傷之。止當發散。汗出則愈矣。其次莫如利小便。二者乃上下分消其酒病者。往往服酒癖丸大熱之藥。口之又有用牽牛大黃下之者。是無形元氣受病。反下行形陰血乖慌甚矣。酒性大熱。以傷元氣。而復重瀉之。況亦損腎水。真陰及有形陰血俱爲不足。如此則陰血愈虛。真水愈弱。陽邪之熱大旺。反增其陰火。是以元氣消耗。折人長命。不然則虛損之病成矣。酒疸下之。久久爲黑疸。慎不可犯。以葛花解醒湯主之。

葛花解醒湯

治飲酒太過。嘔吐痰逆。心神煩亂。胸膈痞塞。手足戰搖。飲食減少。小便不利。

六六

葛花	去蘆	猪苓	去黑皮
縮花	青皮去瓤三分	木香	五分
神麯	炒黃	澤瀉	
砂仁	已上各五錢	乾生薑	白朮已上各二錢
橘皮	去白	人參	去蘆已上各一錢
白茯苓	已上各錢半		

右爲極細末。秤和勻。每服三錢七。白湯調下。但得微汗。酒病去矣。此藥不得已而用之。豈可恃頼。日日飲酒。此方氣味辛辣。偶因酒病服之。則不損元氣。何者。敵酒病也。

枳朮丸

治痞消食強胃

枳實	麩炒黃色去瓤一兩	白朮	二兩

右同爲極細末。荷葉裹燒飯爲丸。如梧桐子大。每服五十九。多用白湯下。無時。白朮者。本澁不收其食。遠化但令人胃氣強。不復傷也。

橘皮枳朮丸

治老幼元氣虛弱。飲食不消。膨脹不調。心下痞悶。

枳實	麩炒去瓤	橘皮	已上各一兩
白朮	二兩		

右件爲細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每服五十九。溫水送下食遠。夫內傷用藥之大法。所貴服之。強人胃氣。令胃氣益厚。雖猛食多食重食。而不傷。此能用食藥者也。此藥久久益胃氣。令不復致傷也。

半夏枳朮丸

治因冷食內傷。

半夏	湯洗七次焙乾	枳實	麩炒黃色
白朮	已上各二兩		

右同爲極細末。荷葉裹燒飯爲丸。如梧桐子大。每服五十九。溫水送下。食前。

可。

如食傷。寒熱不調。每服加上三黃丸十九。白湯下。更作一方。加澤瀉一兩爲丸。有小便淋者用。

木香乾薑枳朮丸

破除寒濕氣消寒飲食

木香	三錢	乾薑	五錢炮
枳實	一兩炒	白朮	一兩五錢

右爲極細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每三五十九。溫水送下食前。

木香大腹生薑枳朮丸

開胃進食。

乾生薑	二錢五分	木香	三錢
人參	三錢五分	陳皮	四錢
枳實	一兩炒黃	白朮	一兩五錢

右爲細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每服三五十九。溫水送下食前忌飽食。

和中丸

治病久虛弱。脈脈不能食。面黯腑或瀉。此胃氣虛弱也。常服則和中理氣。消痰去濕。厚腸胃。進飲食。

木香	二錢五分	枳實	麩炒
炙甘草	已上各三錢半	縮砂	四錢五分
厚朴	去皮製炒各一兩	白朮	已上一兩二錢
陳皮	去白八錢	半夏	湯洗七次

右爲細末。生薑自然汁浸。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十九。溫水送下。食前或食遠。

交泰丸

升陽氣。瀉陰火。調榮氣。進飲食。助精神。寬腹中。除怠惰嗜臥。四肢不收。沈困懶倦。

乾薑	炮製三分	巴豆霜	五分
人參	去蘆	肉桂	去皮各一錢
白朮	已上各五分	厚朴	去皮劑炒秋冬加七錢
川烏頭	炮去皮臍五分	酒炙苦練皮	
知母	四錢一半炒一半酒洗焙乾	皂角	水洗燒去皮弦
紫菀	去苗已上各六錢	吳茱萸	湯洗七次五錢
黃連	去鬚秋冬加一錢半		

右除巴豆霜另入外。同爲極細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十九。溫水送下。臨臥加減。

三稜消積丸

治傷生冷硬物。不能消化。心腹滿悶。

丁皮	益智已上各三錢	巴豆	炒和熨米去米薑香
京三稜	炮	廣茂	炮
炒麴	已上各七錢		

右件爲細末。醋打麵糊爲丸。如梧桐子大。每服十九至二十九。溫生薑湯送下。食前。虛實加減。得更衣。止後服。

陳皮	去白八錢	半夏	湯洗七次
枳實	麩炒黃一兩	白朮	一兩五錢

右爲細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每服五十九。溫水送下。食前忌飽食。

六八

縮砂	四錢	枳實	麩炒黃一兩
白朮	一兩五錢		

右爲細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每三五十九。溫水送下。食前。

陳皮	青橘皮已上各五錢		

右件爲細末。醋打麵糊爲丸。如梧桐子大。每服十九至二十九。溫生薑湯送下。食前。虛實加減。得更衣。止後服。

治心腹百病卒痛。如錐刺。及脹滿不快氣急。並治之。

錦紋川大黃爲末　乾薑炮爲末　巴豆泥裹出油用霜

右件三味等分。同一處研勻。煉蜜成劑。臼內杵千百下。丸如大豌豆大。夜臥溫水下一丸。如氣實者加一丸。如卒病不計時候服。婦人有孕不可服。如所傷飲食在胸膈。兀兀欲吐。反覆悶亂。以物探吐去之。

神保丸

治心腹痛。腹痛。血痛。腎氣痛。脇下痛。大便不通。氣壅。宿食不消。

木香　胡椒已上各二錢　巴豆十枚去皮心膜研　乾蝎七枚

右件四味爲末。湯浸蒸餅爲丸。臍子大。硃砂三錢爲衣。每服五丸。

如心腸痛。柏蘗燈心湯下。

如腹痛。柏蘗煨薑煎湯下。

如血痛。炒薑醋湯下。

如腎氣痛。脇下痛。茴香酒下。

如大便不通。蜜調檳榔末一錢下。

如氣噎。木香湯下。

如宿食不消。茶酒漿飲任下。

雄黃聖餅子

治一切酒食所傷。心腹痛不快。

雄黃五錢　巴豆一百個去油心膜　白麵一十兩重過

右件三味。內除白麵八九兩。餘藥同爲細末。共麵和勻。用新水和作餅子。如手大。以漿水煮。煮至浮於水上。漉出控旋。看硬軟。捻作餅子。每服五七餅子。加至十餅十五餅。咽破一餅。利一行。二餅利二行。茶酒任下。食前。

調飲枳實丸

逐飲消痰導滯清膈。

枳實炒去瓤　半夏湯洗　陳皮去白各二兩　巴上黑牽牛炒八兩內取末三兩

右爲細末。水煮酒糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。食後生薑湯下。

感應丸

治虛中積冷氣弱。有傷停積胃脘。不能傳化。或因氣傷冷。因饑飽食。飲酒過多。心下堅滿。兩脇脹痛。心腹大痞。霍亂吐瀉。大便頻。後重遲澁。久痢赤白。膿血相雜。米穀不消。愈而復發。又治中酒嘔吐。痰逆惡心。喜唾頭旋。胸膈痞悶。四肢倦怠。不欲飲食。又治妊娠傷冷。新產有傷。若久有積寒。喫熱藥不效者。並悉治之。又治久病形羸。往往歲月。漸致虛弱。面黃肌瘦。飲食或進或退。大便或利或泄。不拘久新積冷。並皆治之。

乾薑炮製一兩　南木香去蘆　丁香已上各一百四十個湯浸杏仁浸去皮尖研膏　百草霜二兩　肉豆蔻十個去皮三　巴豆去皮心膜油研七十個

右七味。除巴豆粉百草霜杏仁三味外。餘四味搗爲細末。却與三味同拌。研令細。用好蠟臘和。先將蠟六兩溶化作汁。以重綿濾去粗。更以好酒一升。於銀石器內煮蠟。溶澈數沸。傾出候酒冷。其蠟自浮於上。取蠟秤。開丸。杵五百下。修合。用滴油一兩。於銚內熬。令末散香熟。次下酒煮蠟四兩。同化作汁。就鍋內乘熱拌和前項藥末。杵多修合。用滴油一兩五錢。同煎煮熟作汁。和匱藥末成劑。分作小錠子。以油單紙裹之。旋丸服耳。

神隱丸

治因一切冷物。冷水及濇乳酪水。腹痛腸鳴。米穀不化。

丁香　木香已上各二錢　巴豆　杏仁

黃蠟二兩

右先將黃蠟。用好醋煮去粗穢。將巴豆杏仁同炒黑。煙盡。研如泥。將黃蠟再上火。煮及入小油五錢。秋多入小油八錢。溶開入在杏仁巴豆泥子內。同攪。旋下丁香木香等藥末。研均。搓作錠子。油紙裹了。旋丸用。每服三五十丸。溫米飲送下。食前日三服。大有神效。

白虎安胃散

治一切瀉痢。無問膿血相雜。裏急窘痛。日夜無度。又治男子小腸氣痛。及婦人臍下虛冷。并產後兒枕塊痛。亦治虛後虛弱。發熱不止者。

五味子　烏梅取肉炒乾已上各五錢　車前子　米殼三兩去瓤蓋蒂炒乾　茯苓

右爲末。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去粗。空心溫服。

聖餅子

治瀉痢赤白。臍腹撮痛。久不愈者。

黃丹二錢　定粉　舶上硫黃　陀僧已上各三錢　輕粉少許

右細剉爲末。入白麵四錢匕。薑水和。如指尖大。捻作餅子。陰乾。食前溫漿水磨服之。大便黑色爲效。

當歸和血散

治腸澼下血。濕毒下血。

川芎四分　荊皮　槐花　荊芥穗　當歸身　升麻已上各一錢

熟地黃　白朮已上各六分

右件爲細末。每服二三錢。清米飲湯調下。食前。

訶梨勒丸

治休息痢。晝夜無度。腥臭不可近。臍腹撮痛。諸藥不效。

訶子（五錢去核）　椿根白皮一兩　母丁香（三十個）

右爲細末。醋麵糊丸。如梧桐子大。每服五十丸。陳米飯湯。入醋少許。送下。五更三日三服效。

脾胃損在調飲食適寒温

十四難曰。損其脾者。調其飲食。適其寒温。夫脾胃大腸小腸三焦膀胱。倉廩之本。營之所居。名曰器。能化精粕。轉味而出入者也。若飲食熱無灼灼。寒無淒淒。寒温中適。故氣將持。乃不致邪僻。或飲食失節。寒温不適。所生之病。或溏泄無度。或心下痞悶。腹脇臍腹。口失滋味。四肢困倦。脊傷於脾胃所致。而然也。腸胃爲市。無物不受。無物不入。若風寒暑濕燥一氣偏勝。亦能傷脾損胃。觀證用藥者。宜詳審焉。

脾胃　右圖所主其脈緩　如得

- ○弦脈風邪所傷。甘草芍藥湯。黃芩連中湯之類。或甘酸之劑。皆可用之。
- ○洪脈熱邪所傷。三黃丸瀉黃散。調胃承氣湯。或甘寒之劑。皆可用之。
- ○緩脈木經太過。濕邪所傷。平胃散加白朮茯苓。五苓散。或除濕滲泄之劑。皆可用之。
- ○濇脈熱傷氣。勞功散加茯苓。四君子湯加熟地黃。或甘溫甘潤之劑。皆可用之。
- ○沈細脈寒邪所傷。益黃散。調胃丸。理中丸。理中湯加減。或加附子。甘熱之劑。皆可用之。

前項所定方藥。乃常道也。如變則更之。

胃風湯

治大人小兒。風冷乘虛。入客腸胃。水穀不化。泄瀉注下。腹脇虛滿。腸鳴疼痛。及腸胃濕毒下如豆汁。或下瘀血。日夜無度。並宜服之。

人參去蘆　白茯苓去皮　芎藭　桂去粗皮　當歸去苗　白芍藥　白朮（已上各等分）

右爲麤散。每服二錢。以水一大盞。入粟米數百餘粒。同煎至七分。去粗稍熱服。空心食前。小兒量力減之。

三黃丸

治丈夫婦人。三焦積熱。上焦有熱。攻衝眼目赤腫。頭項頭痛。口舌生瘡。中焦有熱。心膈煩燥。不美飲食。下焦有熱。小便赤澁。大便祕結。五臟俱熱。卽生癰癤瘡疥。及治五般痔疾。婁門腫痛。或下鮮血。

黃連去蘆　黃芩去蘆　大黃（已上各一兩）

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。用熱水吞下。如臟腑壅實。加服丸數。小兒積熱宜服之。

白朮散

治虛熱而渴。

人參去蘆　白朮　木香　白茯苓去皮　藿香葉去土　甘草（已上各一兩）

乾葛二兩

右件爲麤末。每服三錢。水一盞。煎至五分。温服。如飲水者。多煎與之。無時服。如不能食而渴。潤古先師倍加葛根。如能食而渴。白朮湯加人參服之。

加減平胃散

治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿氣短。噯噦惡心。噫氣吞酸。面色萎黃。肌體瘦弱。怠惰嗜臥。體重節痛。常多自利。或發瘧亂。及五噎八痞。膈氣反胃。

甘草二兩（炒）　厚朴去粗皮薑製炒香　陳皮去白（已上各二兩）　蒼朮泔浸去粗皮（米二兩）

右爲細末。每服二錢。水一盞。入生薑三片。乾棗二枚。同煎至七分。去粗温服。或去薑棗。帶熱服。空心食前。入鹽一捻。沸湯點服亦得。常服調氣暖胃。化宿食。消痰飲。辟風寒冷濕。四時非節之氣。

如小便赤澁。加白茯苓澤瀉。

如米穀不化。食飲多傷。加枳實。

如胸中氣不快。心下痞氣。加枳殼木香。

如脾胃困弱。不思飲食。加黃耆人參。

如心下痞悶。腹脹者。加厚朴甘草減半。

如遇夏則加炒黃芩。

如遇雨水溼潤時。加茯苓澤瀉。

如遇有痰涎。加半夏陳皮。

凡加時。除蒼朮厚朴外。依例加之。如一服五錢。有痰。用半夏五分。

如嗽。飲食減少。脈弦細。加當歸黃耆。

如脈洪大緩。加黃芩黃連。

如大便硬。加大黃三錢。芒硝二錢。先嚼麩炒桃仁數個。以藥送下。

散滯氣湯

治因憂氣結。中脘腹皮底微痛。心下痞滿。不思飲食。雖食不散。常常有痞氣。

當歸身二分　陳皮三分　柴胡四分　炙甘草一錢　半夏五分　生薑五片

紅花少許

右件對如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱服。食前。忌溼麵酒。

通幽湯

治幽門不通。上衝吸門不開。噎塞氣不得上下。治在幽門閉。大便難。此脾胃初受熱中。多有此證。名之曰下脫不通。

850

桃仁泥　紅花已上各一分　生地黃　熟地黃已上各五分　當歸身　炙甘草
升麻已上各一錢

右㕮咀，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去粗稍熱服之食前。

潤腸丸

治飲食勞倦，大便祕澁，或乾燥，閉塞不通，全不思食，乃風結血結，皆能閉塞也，潤燥和血疎風，自然通利也。

大黃去皮　當歸梢　羌活已上各五錢　桃仁去皮尖一兩　麻子仁去皮取仁一兩二錢五分

右除麻仁另研如泥外，搗羅爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用白湯送下。

導氣除燥湯

治飲食勞倦，而小便閉塞不通，乃血澁致氣不通而痰澁也。

滑石妙黃　茯苓去皮各二錢　知母細銼酒洗　澤瀉已上各三錢　黃連去皮四錢酒洗

右㕮咀，每服半兩，水二盞，煎至一盞，去粗稍熱服，空心，如急不拘時候。

丁香茶茵陳湯

治胃虛喘嗽吐逆，膈咽不通。

乾生薑　黃芪已上各二分　丁香

半夏已上各五分　升麻七分　吳茱萸

當歸身一錢　蒼朮二錢　炙甘草　柴胡　橘皮

右件，到如麻豆大，每服半兩，水二盞，煎至一盞，去粗稍熱服，食前。忌冷物。

草豆蔻丸

治脾胃虛而心火乘之，不能滋榮上焦元氣，遇冬腎與膀胱之寒水旺時，子能令母實，致肺金大腸相輔而來，故心乘脾胃，此大復其讎也，經云：大勝必大復，故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外，又大寒大燥二氣併乘之，則苦惡風寒，耳鳴及腰背相引胸中而痛，鼻息不通不聞香臭，額寒腦痛，目時眩，不欲開，腹中爲寒水反乘痰唾沃沫，食入反出，常痛及心胃痛，脇下急縮，有時面痛，腹不能努，大便多瀉而少祕，下氣不絕，或腸鳴，此脾胃虛之極也，胸中氣亂，心煩不安，而爲雀亂之漸，膈咽不通，陰寒極則有聲，喘喝閉塞，或日陽中或暖房內稍緩口吸風寒，則復作四肢厥逆，身體沈重，不能轉側，頭不可以回顧，小便溲而時躁，此藥主秋冬寒涼大復氣之藥也。

草豆蔻仁　神麯　麥蘗面已上各四分　當歸身　生甘草　熟甘草　青皮已上各六分　陳皮　益智仁　黃耆　柴胡　橘皮

右件㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去粗，入此藥再上火煎至一大盞，去粗稍熱服，食前。忌冷物。

白粥糜米，蔻豆小豆，豌豉之類，皆滲滲利小便，且小便數，不可更利，況大瀉陽氣，反行陰道，切禁濕麵，如食之覺快，勿禁。

藥中不可服澤瀉豬苓茯苓燈心琥珀通草木通滑石之類，皆行陰道而瀉陽道也，如渴如小便不利，或閉塞不通則服，得利勿再服。

忌大鹹助火邪而瀉腎水眞陰，及大辛味，蒜韭五辣醋，大料物官桂乾薑之類，皆傷元氣。

若服升洗之藥，先一日將理，次日腹空服，服畢，更宜將理十日，先三日尤甚，不然則反害也。

夫諸痢四時用藥之法，不問所病，或溫或涼或熱或寒，如春時有疾，於所用藥內，如清涼風藥，及月有疾，

1445963
081·18
0022

加大寒之藥。秋月有疾。加温氣藥。冬月有疾。加大熱藥。是不絕生化之源也。發仲陽醫小兒。深得此理。內經必先歲氣。毋伐天和。是爲至治。又曰。無伐生生之氣。皆此常道也。用藥之法。若反其常道。而變生異證。則當從權施治。假令病人飲酒。或過食寒。或過食熱。皆可以增病。如此則以權衡應變之藥。豈可常用之。

調養

忌浴。常風汗。當風。須以手摩汗孔合。方許見風。必無中風中寒之疾。

過辛。傷氣。寒衣服不能禦者。則宜爭勞周身之氣。以當之。氣弱不能禦者病。

如衣薄而氣短。則添衣。於無風處居止。氣尚短。則以沸湯一碗。熏其口鼻。卻不短也。

如衣厚。於不通風處居止而氣短。則宜減衣。摩汗孔合。於漫風處居止。

如居高屋。或天寒陰濕所過。令氣短者。亦如前法熏之。

如居密小室。或大熱而處寒涼。氣短。則出就風日。凡氣短。皆宜食滋味湯飲。令胃開和。

誠其飲食。能食而渴。惡寒飲。當從權以飲之。然不可貪嗜。如冬寒喜熱物。亦依時暫食。

夜不安寢。食厚熱。亦故也。當急去之。仍拭汗。或蒸而不安。卽加之。睡自醒也。饑而睡不安。則宜少食。飽而睡不安。則少行坐。

過天氣變更。風寒陰晦。宜預避之。大抵宜温暖。避風寒。省語。少勞役爲上。

避欲

名與身孰親。身與貨孰多。以隋侯之珠。彈千仞之雀。世必哂之。何取之輕而棄之重耶。殘軀六十有五。耳目手足。皆弭弛。以己之所有。豈止隋侯之珠哉。安於淡薄。少思寡欲。省語以養氣。不妄作勞以發形。虛心自守。病安增劇。苟能持此。亦庶幾於正。可謂得其眞趣矣。

省言箴

氣乃神之祖。精乃氣之子。氣者精神之根蒂也。大矣哉。積氣以成精。積精以全神。必清必靜。御之以道。可以爲天人矣。有道者能之。予何人哉。切宜省言而已。

21101000175001

[General Information]
书名=丛书集成新编　四五
作者=
页数=852
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传